

ترجمان زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد

خريف نمبر 2025ء

زمرعی سہلی



تعلیمی ترقی، صنعتی و زرعی روابط، شفافیت،
ڈیجیٹلائزیشن اور خود روزگاری میری ترجیحات ہیں
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کا ایوان زرعی ڈائجسٹ میں اظہارِ خیال
شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے صوبہ پنجاب میں
زرعی تعلیم و تحقیق ٹاسک فورس قائم کی جا رہی ہے
سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں خطاب



نظامتِ مطبوعات، جامعہ زمرعی فیصل آباد



نامور زرعی سائنسدان ممتاز معلم، محقق اور منتظم پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے مستقل وائس چانسلر تعینات



گورنر پنجاب/چانسلر جامعہ زریعہ سردار سلیم حیدر خان نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے مایہ ناز سپوت اور عالمی شہرت کے حامل جوان سال زرعی سائنسدان ممتاز معلم، محقق اور منتظم پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا وائس چانسلر تعینات کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی ادا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اقبال آڈیٹوریم، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ اکیڈمک ایکسیلنس، انڈسٹری اکیڈمی ریلیشن شپ، شفافیت، پیشہ وارانہ مہارت، ڈیجیٹل ٹرانزیشن اور خود روزگاری (انٹرپرائیو ریشپ) میری ترجیحات میں شامل ہیں۔ ہمارے پروفیسرز کو چاہیے کہ وہ زرعی ترقی اور ملکی معیشت کی بہتری کے لئے قابل عمل منصوبہ جات سامنے لائیں اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے قومی اور بین الاقوامی اداروں سے فنڈنگ حاصل کریں۔ جامعہ کے اساتذہ، انتظامیہ اور طلباء و طالبات نے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کو رئیس جامعہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکبادیں دیں اور پھول پیش کئے۔ یاد رہے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کو صدر پاکستان نے بھی 2020ء میں HEC کا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا تھا اور قبل ازیں انہیں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کی جانب سے 2017ء میں بائیو ٹیکنالوجی گولڈ میڈل سے نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد اس عہدے کا چارج سنبھالنے سے قبل OIC کے ذیلی شعبہ اسلامک آرگنائزیشن آف فوڈ سیکورٹی (IOFS) کے صدر مقام آستانہ قازقستان میں بطور ڈائریکٹر پروگرام اینڈ پلاننگ خدمات سرانجام دے رہے تھے۔



رجسٹرڈ ایل نمبر 7793 جلد نمبر 60 شمارہ نمبر 1-2

انکمپٹاٹس

(جنوری تا جون)

ISSN 2521-0416

خريف نمبر 2025

سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی (وائس چانسلر)

مدیر اعلیٰ مظفر حسین سالک پرنسپل آفیسر (پبلیکیشنز)

مجلس مشاورت

کنوینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال

ممبران

پروفیسر ڈاکٹر محمد کاشف سلیمی	ڈاکٹر محمد رفیع منزل	ڈاکٹر مظہر حسین رانجھا
پروفیسر ڈاکٹر شازیہ رمضان	ڈاکٹر یاور عباس	ڈاکٹر شبیر احمد
پروفیسر ڈاکٹر بلال اسلم	ڈاکٹر شازیہ شکر اللہ	محمد آصف صدیق
پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد	ڈاکٹر مدیحہ ناز	ممتاز علی
ڈاکٹر فہد رسول	ڈاکٹر محمد مبشر ظفر	مسٹر عظمت علی سیکرٹری
ڈاکٹر عرفان احمد	ڈاکٹر محمد خون	

ادارتی بورڈ

ممتاز علی	مینجنگ ایڈیٹر
محمد آصف صدیق	ایڈیٹر (کوآرڈینیشن)
محمد اسماعیل	ایسوسی ایٹ ایڈیٹر
عظمت علی	
محمد آصف	
محمد امین	ترتیب و تدوین
حافظ شہزاد مجید	
آصف محمود	
قیصر محمود	معاون



نظامت مطبوعات، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

Contact: 041-9200161-69 Ext. 3405, 041-9201820

email: oubmuaf@gmail.com www.uaf.edu.pk

لائف ٹائم ممبرشپ 5000 روپے
سالانہ ممبرشپ 300 روپے
سٹوڈنٹ ممبرشپ 200 روپے

فہرست

اداریہ	03	اپنی بات: پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی تیار کردہ گندم کی نئی قسم ”چناب پاسہ-24“ کی باضابطہ منظوری، زرعی حدت کے میدان میں اہم پیش رفت.....	مدیر اعلیٰ
جامعہ نامہ	04	ایوان زرعی ڈائجسٹ: رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کے ساتھ ایک نشست.....	مظفر حسین سالک
	10	پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کو رئیس جامعہ کالج سنبھالنے پر مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کی جانب سے اظہار تحنیت.....	ادارہ
	11	زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر پالیسی، قانون و گورنس کے زیر اہتمام زرعی پالیسی ورکشاپ کا انعقاد.....	ادارہ
	12	سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا جامعہ زرعیہ فیصل آباد کا دورہ.....	ادارہ
	13	زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جانوروں کے وزن، دودھ اور خوبصورتی کے مقابلہ جات کا انعقاد.....	ادارہ
	14	اورک (ORIC) فورم، بین الاقوامی کانفرنس بعنوان ”غذائی نظام کی تبدیلی اور غذائیت پر تحقیقاتی ایجنٹس کے لیے ترجیحات کا تعین“.....	ادارہ
	15	وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی زیر سرپرستی جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی قومی اور بین الاقوامی اداروں سے شراکت داری.....	ادارہ
ٹیکنالوجی برائے فصلات	17	گندم کی امدادی قیمت..... سیاسی و حکومتی فیصلہ سازی، ملکی معیشت اور زرعی منصوبہ بندی پر اثرات کا جائزہ.....	پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں
	20	کما د کی پیداواری ٹیکنالوجی.....	ڈاکٹر محمد ضیاء الحق
	22	پیداواری منصوبہ برائے کپاس.....	ڈاکٹر محمد سرور
	29	چاول کی کاشت کے بہترین پیداواری طریقے اور بیماریوں کا سدباب.....	محمد حذیفہ تنویر
	33	سویا بین کی کاشت: پاکستان کی زرعی ترقی کی کلید.....	تحسین جاوید
	36	کلرلٹی زمینوں میں نامیاتی مادے کی اہمیت.....	ڈاکٹر حماد رضا احمد
	37	موسم گرما کے چاراجات، ان کی بیماریاں اور تدارک.....	شہباز یاض
	40	جدید دور میں صنعتی نقطہ نظر سے بھنگ کی کاشت اور اہمیت.....	نعتلین مراد
ہائیکلچر	42	کیمومائل کی کاشت اور فوائد.....	نوبہ احمد
	44	کلرلٹی کی کاشت اور اس کی ادویاتی اہمیت.....	کریم یار عباسی
	46	بھجوں کے پرکشش اجزاء کی مدد سے ڈروموفلازوں کی کھپلاؤ کی روک تھام کے لیے حکمت عملی.....	عائشہ اسلم
جوانیات	48	جانوروں کو فربہ کرنے کے اصول اور خوراک کا زانچہ.....	ڈاکٹر محمد محبوب علی حامد
	49	مویشیوں کی منافع بخش پیداوار کے لیے پاکستان میں چاراجات کی کاشت.....	آصت اقبال
	50	خشک لاروے: ایک سرکلر اکانومی ماڈل.....	ڈاکٹر عرف بن طاہر
	52	جانوروں میں بڑھتی ہوئی بیماری اور ممکنہ اثرات.....	ڈاکٹر فیصل مسعود
	53	چھوٹے بگالی کرنے والے جانوروں کی طاعون و جوبت، وبائیات، تشخیص، علاج، روک تھام اور کنٹرول.....	ڈاکٹر معینت اعجاز طوی
	55	شجری سوراخوں میں ڈھنگی چھروں کی نشوونما اور ان کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات.....	تحسین جاوید
متفرقات	57	کیڑے مار زرعی زہروں کے مؤثر اور محفوظ استعمال کے لئے بنیادی اور سنہری اصول.....	ڈاکٹر محمد دلہرا خاں گوگی
	59	چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں بروقت تشخیص اور غذا کا کردار.....	پروفیسر ڈاکٹر عمران پاشا
	61	ٹماٹر کی اہمیت اور اس کے فوائد.....	حفصہ جنت
	63	مکئی کے تنے کی مڈی (MAIZE STEM BORER).....	ڈاکٹر زبیر اسلم
	65	کھجور: تاریخ، تہذیب اور تندرستی کا علامتی پھل.....	پروفیسر ڈاکٹر شازیہ رمضان
	66	کھانے کی مصنوعات میں موجود آگینو فاسفیٹ کیڑے مار ادویات کے انسانی صحت پر مضر اثرات اور ان سے بچاؤ کے طریقہ کار.....	ڈاکٹر سدرہ الطاف
	68	گائے ریڈ گولڈ آف پاکستان.....	پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال
پنی ایچ ڈی کارز	69	بائیو ایکٹیو میڈرک فاسفیٹ اور ڈی اے پی کھادوں کا مشترکہ استعمال.....	محمد عرفان الحق
	70	ناٹروجن کے اخراج کو کم کرنے اور چاول اور گندم کی فصل کے نظام میں پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کیلئے یوریا پیم کے تیل کی کوننگ کا جائزہ.....	الدناز
	71	چنے کا مچھاؤ اور اس کا تدارک.....	کینز فاطمہ
	72	بیلکیریا کے استعمال سے کپڑے رنگنے والی فیکٹریوں سے نکلنے پانی کو صاف کرنا.....	خزیمہ تنویر
	73	آم کے باغوں میں پائے جانے والے حشرات پر موسمیاتی تبدیلی کا اثر.....	شہلاز گس
	74	ریمونڈ آفٹر ٹائٹس میں ارٹھ اور اسگند کی افادیت.....	آصت حسین
	75	برقی و مقناطیسی رد عمل کے لیے میٹا میٹریل رکاوٹوں کا تجزیاتی اور عددی مطالعہ.....	محمد اعظم
	75	پودوں کی بنیاد پر تیار کئے گئے دھاتی نینو پارٹیکلز (Ag, Au, Cu and Fe) کی معالجاتی قابلیت.....	سمیر امتیاز

پبلشر مظفر حسین سالک نے زرعی یونیورسٹی پریس فیصل آباد سے چھپوا کر شعبہ تصنیف و تالیف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے شائع کیا

پنجاب سیڈ کونسل کی جانب سے جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی تیار کردہ گندم کی نئی قسم

”چناب پاستہ-24“ کی باضابطہ منظوری، زرعی جدت کے میدان میں اہم پیش رفت


وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی قیادت میں تیار کی گئی۔ گندم کی نئی قسم ”چناب پاستہ-24“ کی پنجاب سیڈ کونسل نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے جو زرعی جدت کے میدان میں ایک اہم پیشرفت ہے۔ ”چناب پاستہ-24“ ڈورم گندم کی نئی قسم ہے جو خشک سالی اور گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ پیشرفت پاکستان میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور قومی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ڈورم گندم جسے عام طور پر پاستہ یا میکرونی گندم کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں سمولینا آٹے کے لیے قیمتی سمجھی جاتی ہے جو پاستہ، بیکری مصنوعات، اور دیگر خوراک کی اشیاء میں استعمال ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں پاستہ اور گندم پر مبنی خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر، پاکستان میں ”چناب پاستہ-24“ کی کاشت سے صنعتی، اقتصادی، اور برآمدی مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے، ساتھ ہی خوراک کی تیاری میں مصروف عمل کمپنیوں اور اداروں کی کاوشوں کو بھی استحکام ملے گا۔ گندم کی اس نئی قسم کو نہری اور بارانی دونوں علاقوں میں کاشت کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے جو کہ مختلف موسمیاتی خطوں میں کسانوں کے لیے اس کی دستیابی کو بڑھاتا ہے مزید یہ کہ شدید موسمی حالات میں اس کی مزاحمت کی صلاحیت اسے ان کسانوں کے لیے امید کی کرن بناتی ہے جو موسمیاتی تبدیلی، پانی کی کمی، اور غیر یقینی کاشت کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جامعہ زرعیہ کی یہ کاوش موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں زراعت کو فروغ دینے کی وسیع تر مہم کا حصہ ہے۔ یہ نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرے گی بلکہ گندم کی درآمدات میں کمی اور اعلیٰ معیار کی گندم کی ملکی سطح پر پیداوار میں خود کفالت کے حصول میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ جامعہ کے اساتذہ، محققین اور طلبہ پر مشتمل کمیونٹی نے اس کامیابی پر فخر کا اظہار کیا ہے اور اسے زرعی ترقی میں ایک تاریخی کامیابی قرار دیا ہے، جو مستقبل میں فصلوں کی ترقی کے لیے نئی تحقیق اور جدت کا سبب بنے گی۔ یونیورسٹی اب تک مختلف فصلوں، پھلوں، اور سبزیوں کی 50 سے زائد بہتر اقسام رجسٹرڈ کروا چکی ہے، جو زرعی تحقیق، پائیداری، اور غذائی تحفظ میں اس کے قائدانہ کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت رئیس جامعہ کا منصب جامعہ کے اس نامور سپوت اور جواں سال زرعی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کے پاس ہے جو پاکستان کے مایہ ناز بریڈر اور عالمی سطح پر بطور سائنسدان ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہ فصلوں کی بہت سی ترقی دادہ اقسام کے بانی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نہ صرف مذکورہ بالا گندم کی نئی قسم ”چناب پاستہ-24“ کے بنانے والے ہیں بلکہ وہ قبل ازیں گندم کی دوغلی اقسام بھی تیار کر چکے ہیں جو سخت موسمیاتی حالات اور کم پانی سے زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ وہ اس وقت گندم کی (Hybrid) اقسام کی تیاری میں مصروف عمل ہیں تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ کیا جاسکے۔ گندم کی درج بالا ترقی دادہ اقسام کے بانی وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی چھ (6) کتابوں کے مصنف ہیں جبکہ 19 کتب میں انہوں نے مختلف ابواب تحریر کئے ہیں۔ چار (4) بین الاقوامی اور دو (2) قومی پمپٹنس ان کے نام ہیں۔ 20 طلبہ کو ڈاکٹریٹ اور ایک سو سے زائد طلباء و طالبات کو ایم ایس سی (آنرز) کی ڈگریاں مکمل کروا چکے ہیں۔ ان کے 118 مقالے قومی اور بین الاقوامی اعلیٰ سطح کے جرائد کی زینت بن چکے ہیں جن کا ایپکٹ فیکٹر 340 ہے۔ وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور پروفیسر، محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں بانی چیئر مین شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اور آئی سی کی ذیلی تنظیم اسلامک آرگنائزیشن برائے نوڈسیکورٹی (IOFS) میں بطور ڈائریکٹر پروگرام اینڈ پلاننگ کام کر چکے ہیں۔ ان کی مثالی کارکردگی کے حوالے سے صرف یہی کہا جاسکتا ہے، ”جہاں گئے داستان چھوڑ آئے“۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی تعلیمی اور تحقیقی خدمات کے صلے میں انہیں صدر پاکستان نے 2020ء میں HEC کا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ عطا کیا جبکہ قبل ازیں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز انہیں 2017ء میں بائیو ٹیکنالوجی میڈل سے نواز چکی ہے۔ اُمید ہے ان کی جواں سال قیادت میں پاکستان کے کسانوں کو مختلف فصلوں کی نہ صرف مزید ترقی دادہ اقسام ملیں گی بلکہ ملکی زرعی معیشت کو بھی بام عروج تک پہنچانے میں اپنا کردار جاری رکھیں گے۔

مظفر حسین سالک مدیر اعلیٰ

رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کے ساتھ ایک نشست

انٹرویو پینل: پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال، مظفر حسین سالک، ممتاز علی، عظمت علی، محمد آصف
ترتیب و تدوین: محمد اسماعیل، محمد امین، حافظ شہزاد مجید، آصف محمود، قیصر محمود، فوٹو گرافی: سیف اللہ زاہد

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو
طلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے
راقم نے بطور پرنسپل آفیسر (نظامت مطبوعات) سہ ماہی
زرعی ڈائجسٹ کی ٹیم کا وائس چانسلر صاحب کے ساتھ
ایک نشست کا اہتمام کیا تاکہ اساتذہ، طلبہ،
کسان اور دیگر متعلقین نئے وائس چانسلر
صاحب کے وژن، مقاصد اور آئندہ چار
سالوں کے لائحہ عمل سے آگاہ ہو سکیں۔
پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے انٹرویو
پینل کو بتایا کہ بطور وائس چانسلر
ایڈمک ایکسیلنس، انڈسٹری اکیڈمی



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے جواں سال وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی
پاکستان کے صف اول کے زرعی سائنسدان اور پلانٹ بریڈر ہیں جنہوں
نے تدریس، تحقیق اور مختلف ادارہ جات کی قیادت میں مثالی خدمات سر انجام
دی ہیں۔ آپ نے نہ صرف علمی میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا بلکہ عملی تحقیق
کے ذریعے زرعی ترقی میں انقلابی اقدامات کئے۔ ڈاکٹر
صاحب کی تحقیق کا محور گندم کے پودوں کو موسمیاتی
تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرنا اور خود آبیاری کے قابل
بنانا ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی گندم کی تین ترقی دادہ
اقسام تیار کر چکے ہیں جن میں حال ہی میں
پنجاب سید کونسل کی جانب سے گندم کی نئی منظور
کردہ قسم ”چناب پاستہ-24“ نمایاں ہے۔ یہ قسم

تعلیمی ترقی، صنعتی اور زرعی روابط میں مضبوطی، شفافیت، پیشہ ورانہ مہارت، ڈیجیٹلائزیشن اور خود روزگاری میری ترجیحات میں شامل ہیں۔
ہمارے پروفیسرز کو چاہیے کہ وہ زرعی ترقی اور ملکی معیشت کی بہتری کے لئے قابل عمل منصوبہ جات سامنے لائیں اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے
قومی اور بین الاقوامی اداروں سے فنڈنگ حاصل کریں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کا دوران انٹرویو اظہار خیال

رہلیشن شپ، شفافیت، پیشہ ورانہ مہارت، ڈیجیٹلائزیشن اور خود روزگاری
میری ترجیحات میں شامل ہیں اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو درپیش
چیلنجز و مسائل کو حل کرنے اور علم پر مبنی معیشت کے ساتھ پیشرفت کرنے کے
لیے ٹھوس تحقیقی کام، تربیت یافتہ
افراد کی قوت، علمی اور تحقیقی مہارت،
مضبوط اکیڈمی انڈسٹری روابط اور
کاروباری مہارت پیدا کرنا ضروری
ہے۔ خوشحال معاشرے کے لیے
بھائی چارے اور نظم و ضبط کے کلچر کو
فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔



تکلم

مظفر حسین سالک

مدیر اعلیٰ



پاستہ بسکٹ جیسی اشیاء تیار کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس وقت وہ گندم کی کئی
ایک نئی اقسام پر کام کر رہے ہیں جن میں غذائیت سے بھرپور گندم کی ہائبرڈ اقسام
شامل ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی ایک باصلاحیت سائنسدان، قابل محقق اور اعلیٰ منتظم
ہیں۔ مشکل حالات و واقعات سے کبھی
پریشان نہ ہونے والے عقابانی نظر کے
مالک ایک بے دھڑک اور نڈر شخصیت
کے مالک ہیں۔ خالق و مالک کائنات
نے انہیں ایسی خوبیوں سے متصف کیا
ہے کہ وہ عام طور پر ناممکن سمجھنے والے
امور کو ممکن بنانے کا فن جانتے ہیں۔



ہمیں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈگری کورسز تیار کرنے ہوں گے تاکہ ہنرمند افرادی قوت پیدا کی جاسکے جو ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی 125 ملین نوجوان نسل کو تربیت یافتہ افرادی قوت بنانے کے لئے پیشہ وارانہ تعلیم کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لئے ٹھوس تحقیقات، تربیت یافتہ افرادی قوت اور شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ جدید تقاضوں سے آراستہ قوم ترقی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے ملک کو خوشحالی اور خوشیوں کا گہوارہ بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی

پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کوان کی تعلیمی اور تحقیقی خدمات کے نتیجے میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے انہیں 2020ء میں HEC بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا اور پاکستان آف اکیڈمی سائنسز نے 2017ء میں انہیں بائیوٹیکنالوجی گولڈ میڈل عطا کیا جبکہ وہ حکومت پاکستان کی جانب سے کئی ایک ریسرچ پروڈکٹو ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی درجن تعریفی خطوط بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں انہوں نے اسلامک آرگنائزیشن برائے فوڈ سیکورٹی میں بطور ڈائریکٹر پروگرام اینڈ پلاننگ اعلیٰ ترین خدمات سر انجام دی ہیں

یونیورسٹی میں تعلیم و تحقیق اور اخلاقیات کے ذریعے سنہری ماحول پیدا کرنا ہوگا جس کی خوشبو سے پورا معاشرہ معطر ہو سکے۔ زرعی یونیورسٹی کے ہر سائنسدان کے پاس کوئی ایسا منتخب منصوبہ ہونا چاہیے جس کے لئے بین الاقوامی یا قومی سطح پر فنڈنگ حاصل کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ یونیورسٹی کے ماحول میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے ڈیجیٹل ریزیشن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کیمپس کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ کیمپس کی فضا کو ادب اور بھائی چارے سے مزین کیا جاسکے تاکہ یہ شمع معاشرے میں بڑھتے ہوئے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر سکے۔ یونیورسٹی میں نصابی اور تحقیقی Excellence کے ذریعے ہمیں مربوط کاوشیں عمل میں لانا ہوں گی تاکہ مشترکہ کاوشوں سے یونیورسٹی کی بین الاقوامی رینٹنگ مزید بہتر ہو سکے۔ میری خواہش ہے کہ

سائنسدانوں پر زور دیا کہ وہ ٹھوس تحقیقی منصوبہ جات سے زراعت کو درپیش مسائل کے حل کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ اس شعبے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے اساتذہ کرام کو ان کی مشکلات حل کرتے ہوئے عدالتی معاملات سے نکال کر لیکچر روم اور تحقیقی فیلڈز میں لے کر آؤں۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے ان کے شعبہ زراعت سے تعلق اور تحقیقی محور کے حوالے سے اراکین پینل کو بتایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں میرا تعلق کسان فیملی سے ہے جس کی اقدار میں کھیتی باڑی کرنا فرض سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے خود دوران تعلیم بھی

کھیتی باڑی جاری رکھی تاکہ عملی طور پر زراعت کے مسائل اور بہتری سے آگاہی رہے، ابھی بھی میں زراعت سے عملی طور پر منسلک ہوں۔ بطور پلانٹ بریڈر میں جانتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے کون سی ورائٹرز ہونی چاہئیں، کلائمٹ چیلنج اور بیج کے کیا مسائل ہیں۔

اپنی اوائل عمری بارے ذکر کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بتایا کہ میرا تعلق ضلع لودھراں سے ہے۔ ابتدائی تعلیم ایک پسماندہ گاؤں سیال صدر سکول سے حاصل کی، یہاں سکول کے طلبہ کے لئے فرنیچر دستیاب نہ تھا اور بورے کے بنے ٹاٹ پر فرشی نشست کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا طلبہ اعزاز خیال کرتے تھے۔ ابتدائی دنوں میں ٹاٹ بھی میسر نہ تھے، کلاس میں بیٹھنے کے لئے کھاد کے خالی تھیلے، کتابوں کے لئے کپڑے کے سلائی کردہ سادہ تھیلے، سختی اور سلیٹ وغیرہ کو ہم اپنا کل مال و متاع سمجھتے

اور لیڈر شپ ٹریننگ کے کورسز کئے۔ میں نے زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد، محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان اور OIC کے ذیلی ادارے اسلامک آرگنائزیشن آف فوڈ سیکورٹی (IOFS) کے صدر مقام آستانہ قزستان میں اپنی تعلیمی اور تحقیقی خدمات سرانجام دی ہیں۔ اپنی ملازمت کا آغاز 1999ء میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں بطور لیکچرر کیا۔ 2005ء میں اسٹنٹ پروفیسر اور 2013ء میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کے عہدہ پر ترقی پائی جبکہ 2015ء میں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں بطور پروفیسر تعیناتی ہوئی وہاں پر تعلیمی اور تحقیقی حوالے سے خدمات سرانجام دیں جن میں بانی چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، بانی ڈائریکٹر گریجویٹ سٹڈیز، بانی ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ، بانی ڈائریکٹر ORIC قابل ذکر ہیں۔ یہاں بطور ممبر سینٹ، ممبر

پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بے شمار قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مختلف تحقیقی منصوبہ جات میں کام کیا ہے اور انہوں نے اس وقت تک 1600 ملین روپوں سے زیادہ مالیت کے قومی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مؤثر شراکت داری، مشترکہ کانفرنسوں اور کاروباری منصوبہ بندی کے مقابلوں کا اہتمام کیا ہے۔ OIC میں ان کی خدمات قابل ذکر ہیں انہوں نے جن قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تحقیقی منصوبہ جات مکمل کیے ہیں ان میں NSF+ERASMUS، USAID، DFID، UK-INNOVATE، ACIAR، JICA، DAAD، PARB، HEC، ICARDA، FAO، CIMMYT، IRRI، IWM، IFPRI وغیرہ شامل ہیں۔ جن بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ انہوں نے کام ہے ان میں ICARDA، FAO، CIMMYT، IRRI، IWM، IFPRI وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا کی جن مشہور یونیورسٹیوں کے ساتھ انہوں نے مختلف منصوبہ جات مکمل کیے ہیں ان میں UC-DAVIS، Washington State، CHAERNYS University، University، سیلیورڈ یونیورسٹی، میلبرن یونیورسٹی آف آسٹریلیا اور کوونٹری یونیورسٹی برطانیہ شامل ہیں

آف بورڈ آف ایڈوانس سٹڈیز اور ممبر سنڈیکیٹ کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض منصبی ادا کئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے بہت سے بین الاقوامی تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں بھی خدمات سرانجام دیں، جن میں انٹرنیشنل سنٹر فار بائیوٹیکنالوجی (IC-Biotec) اوسا کا یونیورسٹی (MEXT) جاپان یونیورسٹی آف سڈنی (آسٹریلیا)، جانگ سواکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز نیچنگ (چائینہ) شامل ہیں۔ انہوں نے 2015ء سے 2022ء کے دورانیہ میں ممبر ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ (PARB) لاہور میں بھی خدمات سرانجام دیں۔ ان سے کئے گئے سوال کہ آپ اپنی تیار کردہ فصلوں کی اقسام میں چناب نام کیوں استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ سندھ طاس معاہدے کے مطابق تین دریا بھارت کو مل گئے اور تین پاکستان

تھے۔ سکول میں چند ہونہار طلبہ کو وظیفہ کا امتحان دلویا جاتا تھا جس میں مجھے بھی منتخب کیا گیا۔ پرائمری اور مڈل کا امتحان وظیفہ کے ساتھ پاس کیا۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان میں داخلہ لیا جہاں ایف ایس سی کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد چلا آیا، 1996ء میں بی ایس سی (آنرز)، 1998ء میں ایم ایس سی (آنرز) اور 2004ء میں یہاں سے PhD کی ڈگریاں اعزاز کے ساتھ حاصل کیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 2007-08 کے دورانیہ میں یونیورسٹی آف سڈنی (آسٹریلیا) اور 2009ء سے 2011ء کے دورانیہ میں جیا ٹکسو اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز نیچنگ (چائینہ) سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں جبکہ مختلف اعلیٰ قومی اور بین الاقوامی اداروں سے 30 کے قریب تعلیم، تحقیق، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ

کوجن میں سب سے اہم دریا پنجاب ہے۔ اگر خدا خواستہ دریاے پنجاب کا پانی دانستہ یا نادانستہ طور پر روک دیا جائے تو پنجاب، چولستان، تھل اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے انٹرویو پینل کو ان کی تیار کردہ ٹیکنالوجی کا احاطہ کرتے ہوئے بتایا کہ سخت حالات سے مزاحم، کم پانی

پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اس وقت امریکن سوسائٹی آف اگراؤمی (ASA) انٹرنیشنل کاٹن ریسرچر ڈائریکٹری، بین الاقوامی کاٹن ایڈوائزری کمیٹی، انٹرنیشنل کاٹن جینیٹکس انیشی ایٹو کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر پاکستان بونیکل سوسائٹی اور پاکستان سوسائٹی آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی فیلوشپ کے حامل ہیں

پاکستان کے بہت سارے علاقے بخر ہو جائیں گے۔ میری یہ دانستہ کاوش ہے کہ میں پنجاب کے پانیوں کی حفاظت کے لیے اس نام کو ہر جگہ اُجاگر کروں یہی وجہ ہے کہ میری فصلوں کی اقسام میں آپ کو پنجاب کا نام نمایاں نظر آئے گا۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے مزید کہا کہ میں اس وقت کم گلوٹن کی حامل ہابرو گندم کی اقسام پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے اب تک ہابرو گندم کے اڑھائی ہزار سے زائد ٹیسٹ مختلف مقامات پر مکمل کر لئے ہیں۔ ہابرو گندم کی اقسام کی تیاری کی وجہ بی ٹی کاٹن کے بیج کے حوالے سے پاکستان میں کسانوں کو انتہائی ناگفتہ بہ صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھا تاکہ آئندہ ایسی صورتحال سے بچا جاسکے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہم مارکیٹ میں بیرون ملک سے آنے والے گندم کے ہابرو بیج کا سامنا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گندم کی ہابرو اقسام بنا کر دیگر تحقیقی اداروں NARC، بارانی یونیورسٹی، ایوب ریسرچ سنٹر و دیگر کو اس میں اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چیلنجز کا ہم مل کر مقابلہ کر سکیں کیونکہ اس وقت گندم نہ صرف ہماری غذائی ضرورت ہے بلکہ یہ ہماری نقد آور فصل بھی ہے۔



کون کون سے قومی و بین الاقوامی اداروں کے ساتھ انہوں نے تحقیقی یونیورسٹیوں کے ساتھ میں نے مختلف منصوبہ جات مکمل کئے ہیں ان میں

پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی بنیادی طور پر ریڈر ہیں اور انہوں نے گندم کی تین ترقی دادہ اقسام تیار کی ہیں جن میں حال میں پنجاب سیڈ کونسل کی جانب سے باقاعدہ منظور کی جانے والی ڈورم گندم کی جدید قسم چناب پاستہ-24 قابل ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تیار کردہ گندم کی اقسام سخت موسمیاتی حالات کی مزاحم اور کم پانی سے زیادہ پیداوار کی حامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب زرعی تحقیق اور انڈسٹریز کو آپس میں منطبق کرنے کے لیے خصوصی کاوشیں بروئے کار لائے ہیں اس وقت تک ان کے 118 سے زائد تحقیقی مقالہ جات قومی اور بین الاقوامی جرناؤں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا امپیکٹ فیکٹر 334 ہے۔ وہ چھ (6) کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے مختلف کتب میں 19 ابواب بھی تحریر کیے ہیں ان کے 4 پیٹنٹس منظور ہو چکے ہیں اور دو منظوری کے مراحل میں ہیں انہوں نے 28 سے زائد قومی اور بین الاقوامی ٹریننگ پروگرامز میں تربیت حاصل کی جبکہ 36 کانفرنسز، فورمز، فیسٹولز، تقریبات کا اہتمام کیا ان کی زیر نگرانی اب تک 12 سکارلر اپنی PhD کی ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے 100 کے قریب طالب علموں کو ان کی ایم ایس سی (آنرز) کی ڈگریاں مکمل کرنے میں بطور سپروائزر خدمات سرانجام دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت IOFS کے فوڈ سیکورٹی مینجین کے ایڈیٹر ان چیف، جبکہ پاکستان جرنل آف ایگریکلچر سائنسز اور ایگریکلچرل سائنسز کے سبجیکٹ ایڈیٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار علی پلانٹ سائنس فرنٹیئر، پلانٹ جنیٹکس اور کروموسوم بیاالوجی کے جائزہ ایڈیٹر بھی ہیں

Washington State University، UC-DAVIS، CHAERNYS University، سٹیورڈ یونیورسٹی، میلبورن یونیورسٹی آف آسٹریلیا اور کوونٹری یونیورسٹی برطانیہ شامل ہیں۔

قازقستان سے ایک ضخیم تنخواہ اور مراعات چھوڑ کر زرعی یونیورسٹی کی وائس چانسلر شپ قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کرونا جیسے موذی مرض سے صحت یابی عطا

منصوبہ جات مکمل کئے ہیں اور ان منصوبہ جات میں کتنی فنڈنگ حاصل کر چکے ہیں، اس سوال کے جواب میں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ میں نے بہت سے قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مختلف تحقیقی منصوبہ جات میں کام کیا ہے اور اس وقت تک 1600 ملین روپوں سے زیادہ مالیت کے قومی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مؤثر شراکت داری، مشترکہ کانفرنسوں اور کاروباری منصوبہ بندی کے مقابلوں کا اہتمام کیا ہے۔ OIC



کی تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں مجھے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے تفویض کی گئی ہے کہ میں اپنی ماد علمی اور مادر وطن کے لئے کچھ کر سکوں، یہی وجہ ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا ہوں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرا یہ عمل میرے آباؤ اجداد کی طرز پر ہے جو قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے

میں خدمات سرانجام دینا میرے لئے قابل فخر ہے۔ جن دیگر قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ میں نے تحقیقی منصوبہ جات مکمل کیے ہیں ان میں UK-INNOVATE، ACIAR، JICA، DAAD، PARB، HEC، NSF+ERASMUS، USAID، DFID جیسے ادارے شامل ہیں۔ جن بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ میں نے کام ہے ان میں ICARDA، FAO

پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد، محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان اور OIC کے ذیلی ادارے اسلامک آرگنائزیشن آف فوڈ سیکورٹی (IOFS) کے صدر مقام آستانہ قزقستان میں اپنی تعلیمی اور تحقیقی خدمات سرانجام دی ہیں۔ انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز 1999ء میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں بطور لیکچرر کیا۔ 2005ء میں اسسٹنٹ پروفیسر اور 2013ء میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کے عہدہ پر ترقی پائی جبکہ 2015ء میں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں بطور پروفیسر تعینات ہوئے وہاں پر انہوں نے تعلیمی اور تحقیقی حوالے سے بے پناہ خدمات سرانجام دیں جن میں بانی چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، بانی ڈائریکٹر گریجویٹ سٹڈیز، بانی ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ، بانی ڈائریکٹر ORIC قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے وہاں بطور ممبر سینٹ، ممبر آف بورڈ آف ایڈوائس سٹڈیز اور ممبر سنڈیکیٹ کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض منصبی ادا کئے




پاکستان آئے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان جا کر ان کا مستقبل کیسا ہو گا مگر انہوں نے نظریہ پاکستان سے وفا کی اور میرا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر شپ کا منصب سنبھالنا بھی اپنی مادر علمی سے وفا کے نظریے کو پروان چڑھانا اور اپنے والدین کی طرح پاکستان سے محبت رکھنا ہے۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کہنا تھا کہ استاد ایک بہت بڑا مقام ہے اور ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ طلبہ کے لئے ان کا کہنا تھا کہ طالب علم کا مقصد ہے علم کا متلاشی اس لئے طلباء و طالبات کو چاہیے کہ وہ علم کی تلاش میں بھرپور طریقے سے اپنے شب و روز بسر کریں جبکہ کسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں،

کسان کی خوشحالی میں ہمارے ملک کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی، تحقیقی اور توسیعی شعبہ جات آپس کے اشتراک عمل سے حکومت کی سرپرستی میں کسان کی رہنمائی اور زراعت کی ترقی کے لئے شاندار اور قابل عمل طریقہ ہائے کار تیار کریں۔

مجھے فخر ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں ہمارے خاندان کی اقدار میں کھیتی باڑی کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ کثیر تنخواہ کو چھوڑ کر جامعہ زرعیہ کی وائس چانسلر شپ سنبھالنا اپنی مادر علمی سے اسی طرح وفا کا اظہار ہے جیسے میرے بزرگوں نے نظریہ پاکستان سے وفا کرتے ہوئے ہجرت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر



پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کورئیس جامعہ کارج سنبھالنے پر مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کی جانب سے اظہار تہنیت

میں آیا تھا اور وہاں ہم متعدد پروگرام چلا رہے ہیں۔ ان کا ادارہ جدید علم، تنقیدی سوچ اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ذریعے بہترین افرادی قوت پیدا کرنے کے لئے پرعزم ہے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور کمالیہ یونیورسٹی کے شروع سے ہی بہترین تعلقات استوار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اور طلبہ زرعی یونیورسٹی سے استفادہ کرتے ہوئے تعلیم و تحقیق میں مزید بہتری لائیں۔ اسی مناسبت سے رئیس جامعہ کی دوسری اہم ملاقات وائس چانسلر UVAS ڈاکٹر محمد یونس سے ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز غذائی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے مشترکہ کوششوں میں وسعت لائیں گی تاکہ زرعی سیکٹر کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جاسکے۔ دونوں وائس چانسلرز نے اتفاق کیا کہ پاکستانی معیشت میں زراعت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جس کا جی ڈی پی میں 24 فیصد ہے۔



ہمارے ملک میں فی جانور دودھ اور گوشت پیداوار ترقی یافتہ ممالک کی نسبت کم ہے جس میں بہتری کے لئے ہمیں کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ موجودہ حالات میں پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پانی کی دستیابی جو ایک دہائی پہلے زرعی شعبے کے لئے 103 ملین ایکڑ فٹ تھی وہ کم ہو کر 92 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں جدت لانا ہوگی تاکہ دور حاضر کے چیلنجز سے نبرد آزما ہوا جاسکے۔ دونوں ذمہ داران اس بات پر بھی متفق تھے کہ معاشی ترقی، روزگار اور غربت کے خاتمے میں زرعی اور لائیو سٹاک سیکٹر اہم کردار ادا کرتا ہے، 8 ملین دیہی خاندانوں کا بنیادی انحصار لائیو سٹاک کی پیداوار پر ہے جو کہ ان کی کل آمدن کا 40 فیصد ہے۔ دونوں ادارے بہترین تعلقات استوار کئے ہوئے ہیں اور ملک کو درپیش چیلنجز کے حل کے لئے مشترکہ کوششیں عمل میں لا رہے ہیں جسے مستقبل میں بڑھا

ماہ ناز زرعی سائنسدان اور بین الاقوامی محقق و منتظم پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے وائس چانسلرز زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا چارج سنبھالا تو مختلف قومی، بین الاقوامی شخصیات نے انہیں مبارکباد اور تہنیتی پیغامات دیئے۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلرز ڈاکٹر راؤف اعظم (وائس چانسلر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد)، پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (وائس چانسلر گورنمنٹ وٹن یونیورسٹی، فیصل آباد)، پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک (ریکٹر یونیورسٹی آف فیصل آباد)، ڈاکٹر یاسر نواب (وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ) اور ڈاکٹر محمد یونس (یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز) مبارکباد دینے کے لئے جامعہ میں تشریف لائے۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف کمالیہ اور UVAS کے وائس چانسلرز نے تعلیمی اور تحقیقی میدان میں جامعہ زرعیہ سے شراکت داری کو بڑھانے کے حوالے سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔ ملاقات کے موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور

یونیورسٹی آف کمالیہ تعلیم و تحقیق کے میدان میں باہمی تعلقات کو فروغ دیں گے تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے مشترکہ چیلنجز سے نبرد آزما ہوا جاسکے۔ اس موقع پر رئیس جامعہ زرعیہ ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ ہر طالب علم کو اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر کئے جائیں تو اس سے نہ صرف معاشی و اقتصادی بہتری آئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کو روشنیوں کا گہوارہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ موجودہ حالات میں مشترکہ ڈگری پروگرام کے بھی مواقع دستیاب ہیں جس سے ایک دوسرے کی سہولیات سے مستفید ہوا جاسکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کمالیہ یونیورسٹی کو تمام ممکنہ معاونت فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی کی ترقی میں آفس آف ریسرچ، پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ، کوالٹی انہاسمنٹ سیل اور گریجویٹ سٹڈی ریسرچ بورڈ خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا



کر زراعت و لائیو سٹاک کو ترقی دی جاسکتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ زراعت و لائیو سٹاک ترقی ہی ملکی خوشحالی کی ضامن ہے۔

تھا کہ ہمارے یہ تمام شعبہ جات یونیورسٹی آف کمالیہ کو بھرپور معاونت فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر یاسر نواب نے انہیں بتایا کہ یونیورسٹی آف کمالیہ کا قیام 2022ء میں عمل

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر پالیسی، قانون و گورنس کے زیر اہتمام سنٹر فار ایڈوانسڈ سٹڈیز اینڈ فوڈ سیکورٹی میں زرعی پالیسی ورکشاپ کا انعقاد



دیگر اسٹیک ہولڈرز کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ زراعت کو موسمیاتی تبدیلی، پانی کی قلت، کم پیداوار اور دیگر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئر پرسن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ زراعت کا زوال شدید بحران کو جنم دے سکتا ہے جس سے بچنے کے لیے تحقیق پر مبنی مداخلت اور ٹھوس پالیسی اقدامات ناگزیر ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک کی فراہمی اور غربت کا خاتمہ ممکن بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صوبے میں تعلیم و تحقیق کی تبدیلی کے لیے پرعزم ہیں۔ آسٹریلیین نیشنل یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد اعجاز قریشی نے کہا کہ اس ورکشاپ کا مقصد زرعی پالیسی تحقیق میں تجرباتی، ابلاغی، اور قائدانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانا، پالیسی ڈیزائن اور نفاذ کی مہارتوں کو مضبوط کرنا، قومی ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ تحقیقاتی منصوبوں اور گرانٹس کے معیار کو بہتر بنانا، اسٹریٹجک ابلاغ کو فروغ دینا اور زرعی پالیسی اصلاحات کے لیے بین الشعبہ جاتی نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بنگلہ دیش ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد جہانگیر عالم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں غذائی تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے زراعت میں مضبوط ویلوجین بنانا ناگزیر ہے۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کینبرا کی ڈاکٹر سمیرا اعجاز قریشی نے پیچیدہ ڈیٹا کو موثر پالیسی فیصلوں میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر بات کی۔ اسی ادارے کی ڈاکٹر زینہ السمرانی نے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل تبدیلی کے دور میں تعلیم کے مستقبل پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر ڈاکٹر آصف کامران ڈائریکٹر ایگریکلچر پالیسی اینڈ آؤٹ ریچ نے وضاحت کی کہ زرعی فیصل آباد میں قائم ایگریکلچر پالیسی، لاء اینڈ گورننس سینٹر پالیسی تھنک ٹینکس اور پالیسی سازوں کے ساتھ مسلسل رابطے اور مشاورت کے لیے پرعزم ہے اور طلبہ و فیکلٹی کی اس حوالے سے استعداد کار بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ وہ پالیسی تحقیق کریں اور اپنی تحقیق کی بنیاد پر موثر پالیسی سفارشات تیار کر سکیں۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی زیر سرپرستی، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر پالیسی، قانون و گورنس کے زیر اہتمام سنٹر فار ایڈوانسڈ سٹڈیز اینڈ فوڈ سیکورٹی میں چار ہفتوں پر محیط زرعی پالیسی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے محرک و منتظم آسٹریلیین نیشنل یونیورسٹی کے سینئر اکیڈمک ممبر ڈاکٹر محمد اعجاز قریشی اور جامعہ زرعیہ کے ڈائریکٹر آؤٹ ریچ/ ایگریکلچر پالیسی ڈاکٹر محمد آصف کامران تھے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد زرعی شعبے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے زرعی پالیسی تجاویز مرتب کر رہی ہے تاکہ پیداوار میں اضافے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ زراعت کو ایک منافع بخش پیشہ بنایا جاسکے۔ اسی پروگرام کے تحت اس زرعی پالیسی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ورکشاپ ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر پالیسی، قانون و گورنس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، یو ایس ڈی اے کے انڈومنٹ فنڈ سیکریٹریٹ، پاک کوریونیٹریشن سینٹر، آسٹریلیین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ اور کامن ویلتھ سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ تقریب کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی سروے میں زراعت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر زرعی ماہرین کو پائیدار زرعی ترقی کے لیے قابل عمل پالیسی تجاویز مرتب کرنا ہوں گی تاکہ اس شعبے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے نہ صرف غذائی استحکام کو یقینی بنایا جاسکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشی معیشت کا حصول بھی ممکن بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ محققین کو ایسی پالیسی سفارشات مرتب کرنا ہوں گی جن میں طلب و رسد، پائیدار مارکیٹ ڈھانچے، کاشتکار کو آپریٹو تنظیمیں اور دیگر جملہ زرعی مسائل پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ پیداوار میں اضافے اور کاشتکاروں کی معاشی حالت کو بہتر کیا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ اقتصادی سروے کی روشنی میں پالیسی سازوں، سائنسدانوں، صنعت اور

شعبہ زراعت کی ترقی کے لئے صوبہ پنجاب میں زرعی تعلیم و تحقیق ٹاسک فورس قائم کی جا رہی ہے

سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں شعبہ زراعت سے متعلقہ قومی، تعلیمی و تحقیقی اداروں کے سربراہان سے خطاب



ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کپاس کی پیداوار کو ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے طویل المدتی پالیسی کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری زراعت نے فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہترین جرم پلازم کو متعارف کرانے، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ نئی اقسام کی دریافت اور کاشتکاروں کو معیاری بیج کی فراہمی کو بھی وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ رئیس جامعہ زرعیہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے زمین میں نامیاتی مادوں کی تیزی سے کمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اسے زمین کی زرخیزی اور پائیدار زراعت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام زرعی اداروں، جامعات اور تحقیقاتی مراکز کو مل کر زرعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی دیگر زرعی اداروں کے سائنسدانوں کو مختلف تحقیقاتی منصوبوں میں ایڈجسٹ پروفیسرز کے طور پر شامل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ

قلیل مدتی زرعی اصلاحاتی منصوبہ بندی میں دستیاب زرعی اجناس کی جانچ کرتے ہوئے گرمی و خشک سالی برداشت کرنے والی اقسام کا انتخاب ضروری ہے تاکہ پیداوار بہتر



حاصل کی جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ طویل المدتی بنیادوں پر جرم پلازم ریسورسز نرسری قائم کرنا ضروری ہے جس میں تمام زرعی ادارے اپنا جرم پلازم مہیا کریں تاکہ تمام سائنسدان بریڈنگ کے لیے اس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سپر کمپیوٹر موجود ہے اور بڑی مقدار میں ڈیٹا زرعی ترقی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے گزشتہ دنوں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا اور اس موقع پر شعبہ زراعت سے متعلقہ مختلف قومی، تعلیمی و تحقیقی اداروں کے سربراہان سے ملاقات کی۔ اس اجلاس میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی، چیئر مین نیشنل سیڈ اتھارٹی ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر جنرل ایوب ریسرچ ساجد الرحمان، چیف ایگزیکٹو PARB ڈاکٹر عابد محمود، کنسلٹنٹ پنجاب ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد انجم علی اور دیگر معروف زرعی ماہرین و محققین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی تعلیم، تحقیق اور انڈسٹری کا اشتراک عمل وقت کی ضرورت ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے صوبہ پنجاب میں زرعی تعلیم و تحقیق ٹاسک فورس قائم کی جا رہی ہے۔ جو اس شعبے کی بہتری کے لیے سفارشات پیش کرے گی تاکہ آنے والے برسوں میں زرعی ترقی

کی شرح چار فیصد تک یقینی بنائی جاسکے۔ افتخار علی سہو نے زور دیا کہ زرعی ادارے دیواریں گرا کر اکیڈمیہ، تحقیق اور صنعت کے درمیان تعاون کو فروغ دیں تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جاسکیں اور قومی سطح پر غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جاسکے۔

انہوں نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے قلیل، درمیانے اور طویل المدتی قابل عمل پالیسیاں تشکیل دے رہی ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نے مزید کہا کہ زرعی شعبے کی تجدید نو کے لیے حکومت فیضانہ وسائل فراہم کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے تمام شراکت داروں کا سیشن بھی منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید تحقیق کی روشنی میں عملی اقدامات

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جانوروں کے وزن، دودھ اور خوبصورتی کے مقابلہ جات کا انعقاد فیکلٹی آف اینیمل ہسبنڈری جامعہ زرعیہ فیصل آباد اور انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن کا اشتراک عمل

میں اضافے اور غذائی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے کسانوں میں احساس اُجاگر کرنا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میلہ یونیورسٹی کی سالانہ روایت ہے۔ اور یہ کاوش ایک ایسا شعوری ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے جس سے جانوروں کی بہترین نسلوں کی افزائش ممکن ہو، جو کاشتکاروں کی آمدن بڑھانے اور نوڈ سیوری کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی کسانوں اور زرعی



ماہرین کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے کے لیے ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر چیئر پرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے بھی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ زرعی ماہرین کی سفارشات کو کسان برادری تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور تخفیف غربت کے لئے زرعی ترقی ناگزیر ہے۔ ہمیں پیداوار میں اضافے کے لئے کسانوں کے ساتھ مل کر مشترکہ کاوشوں بروئے کار لانا ہوں گی۔ ڈین فیکلٹی پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال نے کہا کہ فیکلٹی آف اینیمل ہسبنڈری کاشتکاروں میں جدید

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں حسب روایت عید قربان سے قبل فیکلٹی آف اینیمل ہسبنڈری جامعہ زرعیہ فیصل آباد اور انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن کے اشتراک سے تین روزہ اونٹ، بیل اور بکریوں کے میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں جانوروں کے وزن، دودھ اور خوبصورتی کے مقابلہ شامل تھے۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اور چیئر پرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں تھے۔ تفصیلات کے مطابق

مقابلہ جات میں وزنی بکرا، خوبصورت و تیار بکرا، پیورٹیڈ بکرا، کراس ٹیڈی بکرا، ہیوی بچھڑا، ہیوی اونٹ، خوبصورت تیار اونٹ، وزنی چھترا، دودھ والی بکریاں شامل تھیں۔ اس میلے کا مقصد جہاں شہریوں کو تفریح فراہم کرنا ہے وہاں پر انہیں یہ بھی احساس دلانا ہے کہ وہ جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کریں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس میلے کا انعقاد فیکلٹی آف اینیمل ہسبنڈری زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقد کرتی ہے۔ پروگرام کے میزبان ڈین اینیمل ہسبنڈری ڈاکٹر قمر بلال، چیئر مین انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن



رمحانات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے پُر عزم ہے تاکہ فی جانور پیداوار میں اضافے کو یقینی بنایا جاسکے۔

چودھری عطا محمد گجر، چودھری محمد اشرف گجر اور ڈاکٹر سیف الرحمن تھے۔ ملک بھر سے کسان اس میلے میں حصہ لیتے ہیں اور اس میلے کا ایک اہم مقصد جانوروں کی پیداوار



اورک (ORIC) فورم

مسائل کے حل پر مبنی تحقیقات اور ٹیکنالوجی تیار کرنے کے لئے تحقیقی فریم ورک میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ علم پر مبنی معیشت کے حصول کے لئے اختراعی سوچ کو پروان چڑھانے اور مسائل کا حل سائنسی بنیادوں پر تلاش کیا جاسکے۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کا اورک (ORIC) فورم سے خطاب

پاک کوریونیٹریشن سنٹر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی ادارے GAIN کے اشتراک سے بین الاقوامی کانفرنس بعنوان ”غذائی نظام کی تبدیلی اور غذائیت پر تحقیقاتی ایجنڈے کے لیے ترجیحات کا تعین“ کا انعقاد



نے بڑھتی ہوئی بیماریوں کے تناظر میں غذائیت کی کمی سے نمٹنے اور فوڈ سیسٹمی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ پالیسی ایڈویکسی اور آؤٹ ریچ چیئر پاکستان کوریونیٹریشن سنٹر ڈاکٹر اللہ رکھانے کہا کہ سائنسدانوں، پالیسی سازوں، صنعت و دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچے غذائیت کی کمی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثرہ طبقہ ہیں۔ ڈاکٹر فیض رسول چوہدری نے کہا کہ نیوٹریشن ریسرچ ایجنڈا مثبت اور ٹھوس نتائج لائے گا۔ ڈاکٹر فینش سرور نے بہتر آگاہی اور علاج کے لیے نیوٹریشن کونسل قائم کرنے کی تجویز دی۔ ڈاکٹر فقیر انجم، ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، ڈاکٹر غیور سلطان، ڈاکٹر معیز اسلم و دیگر نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ کانفرنس تین روز تک جاری رہی جس میں قومی اور بین الاقوامی ماہرین خوراک نے خطابات کئے۔ اس کانفرنس کی سفارشات ان شاء اللہ 2026ء تک پہلا قومی غذائیت اور فوڈ سسٹم ٹرانسفارمیشن ریسرچ ایجنڈا مرتب کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوں گی۔

پاک کوریونیٹریشن سنٹر اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے گلوبل الائنس فار امپرووڈ نیوٹریشن (GAIN) کے تعاون سے ملک میں غذائی قلت کے شکار 40 فیصد آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2026ء تک پہلا قومی غذائیت اور فوڈ سسٹم ٹرانسفارمیشن ریسرچ ایجنڈا مرتب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے مرکز برائے اعلیٰ تعلیم کے آڈیٹوریم میں مشاورتی اجلاس برائے ”غذائی نظام کی تبدیلی اور غذائیت پر تحقیقاتی ایجنڈے کے لیے ترجیحات کا تعین“ منعقد ہوا۔ جس کا انعقاد پالیسی ایڈویکسی اور آؤٹ ریچ چیئر پاکستان کوریونیٹریشن سنٹر نے کیا۔ ڈین فوڈ سائنس ڈاکٹر عمران پاشا نے کہا کہ مذکورہ ایجنڈے کے تحت غذائیت کی کمی، فوڈ سیسٹمی، موسمیاتی تبدیلیاں، پوسٹ ہارویسٹ نقصانات، گورننس و دیگر شعبہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے گی تاکہ تحقیق کے دھارے کو مسائل کے حل کے لئے استعمال کرتے ہوئے ترقی کی نئی راہیں مرتب کی جاسکیں۔ GAIN کی کٹری ڈائریکٹر فرح ناز

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی زیر سرپرستی جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی قومی اور بین الاقوامی اداروں سے شراکت داری

جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی خوش قسمتی ہے کہ اسے صف اول کے جواں سال زرعی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی صورت میں ایک ایسی قیادت ملی ہے جو نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں اپنی خدمات سرانجام دے چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو ایک بہترین منتظم کی حیثیت سے بھی اپنالوا ہا منوا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اعلیٰ قومی و بین الاقوامی اداروں سے تعلق رکھنے والی شخصیات جوق در جوق زرعی یونیورسٹی میں تشریف لارہی ہیں اور رئیس جامعہ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے منصوبہ جات اور تعلیمی پروگرامز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر رہی ہیں۔ ان سرگرمیوں سے جہاں جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ کے استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے وہیں پر جامعہ کو اپنی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مختلف اداروں سے فنڈنگ بھی دستیاب ہو جاتی ہے۔ قبل ازیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاک کوریا نیوٹریشن سنٹر، NIFSAT، سنٹر فار ایڈوانسڈ سٹڈیز اینڈ فوڈ سیکورٹی، انڈو منٹ سیکریٹریٹ، کنفیووشس سنٹر اور D-8 ریسرچ سنٹر فار ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی برائے اعلیٰ تعلیم جیسے ادارے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی بین الاقوامی ریلیشن شپ کا مظہر ہیں جو اساتذہ، طلبہ اور دیگر متعلقین کی استعداد کار میں اضافے کا سبب ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی انڈونیشیا کے سفارتخانے کے چارج ڈی افیئر رحمت ہندیارتا کسوما کو سووینر پیش کر رہے ہیں



روس کے سفیر البرٹ خور یورٹس جامعہ سے اعزازی شیلڈ وصول کرتے ہوئے جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر ایکسٹرنل لینکجز ڈاکٹر محمد تحسین اظہر بھی موجود ہیں



ایشیائی ترقیاتی بینک کی سینئر نیچرل ریسورس اینڈ ایگریکلچر سپیشلسٹ نوریکوساتو رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی سے یادگاری شیلڈ وصول کرتے ہوئے



کینیا کے ہائی کمشنر لیفٹیننٹ جنرل (ر) پیٹر میوگو نجیور رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی سے اعزازی شیلڈ وصول کر رہے ہیں



جرمن سفارتخانے کے ہیڈ آف کیونیکشن اینڈ کلچرل آفئیر زجان گیرالڈ کراوس رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی سے یادگاری شیلڈ وصول کر رہے ہیں



سودام بیک، ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر کوریا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کا پاک کوریا نیوٹریشن سنٹر کے دورہ کے بعد اعزازی شیلڈ وصول کر رہی ہیں

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی زیر سرپرستی جامعہ زرعیہ فیصل آباد کی قومی اور بین الاقوامی اداروں سے شراکت داری



جامعہ زرعیہ کے طلبہ سے سول سروسز کے امتحانات کے حوالے سے خطاب کے بعد سول سروسز اکیڈمی لاہور کے ڈائریکٹر جنرل رئیس جامعہ سے یادگاری شیلڈ وصول کرتے ہوئے



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال



وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے کامرس رانا احسان افضل خاں جامعہ زرعیہ میں قائم نیشنل انکوبیشن سنٹر کی گریجوایشن تقریب میں شمولیت تقسیم کر رہے ہیں



ہینچی نیشنل یونیورسٹی کے وفد کے سربراہ کی رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی سے ملاقات اور دونوں جامعات کے درمیان اشتراک عمل کے حوالے سے بات چیت



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اور وائس چانسلر غازی یونیورسٹی، ڈیرہ غازی خان کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد باہمی تعاون کی یادداشت پر دستخط کر رہے ہیں



آسٹریلیو سنٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ اور کامن ویلتھ سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن کے وفد کی جامعہ میں آمد اور جاری پروگرامز کا جائزہ



جامعہ زرعیہ کے ڈاکٹر صدام حسین، وائس چیئرمین/ ڈین کنفیوشس انسٹیٹیوٹ، زین جیانگ زرعی یونیورسٹی چین کے صدر ڈاکٹر جیانگ پن گان سے ملاقات کر رہے ہیں



وفاقی وزارت تحقیق جرمی کے ڈاکٹر ریز موسز زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدان ڈاکٹر محمد ہارون الرشید کو ڈیپٹی گریڈ ٹیلنٹ ایوارڈ سے نوازا رہے ہیں

گندم کی امدادی قیمت..... سیاسی و حکومتی فیصلہ سازی، ملکی معیشت اور زرعی منصوبہ بندی پر اثرات کا جائزہ

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، چیئر پرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن لاہور

سال 2024ء میں گندم کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے 32 ملین میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار حاصل کی مگر شوخی قیمت حکومتوں نے اپنے وعدے کے برعکس کسان سے گندم کی خریداری نہیں کی جس کی وجہ سے منڈی میں گندم کی قیمتیں گر گئیں۔ مگر کسان کو اپنی فصلوں کے لئے ملنے والے مدخل (Input) کی قیمتیں بڑھتی گئیں جس کی وجہ سے اس کے پیداواری اخراجات میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی جانب سے گندم کے حوالے سے مستقبل کی پیش گوئی (سروے) کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس حوالے سے جولائی اور اگست 2024 کے دوران صوبہ پنجاب کے آٹھ اضلاع میں ایک سروے کا انعقاد کیا گیا جس کے نتائج مختصر آئیے ہیں۔ آئندہ ربیع کے سیزن میں گندم کے کاشت شدہ علاقے میں 17 فیصد تک کمی ہوگی۔ 26 فیصد بڑے کسان (25 ایکڑ سے زائد زمین کے مالک) متبادل فصلوں کے لئے تیاری کریں گے۔ 26 فیصد درمیانی اراضی ہولڈنگ (12.5 تا 25 ایکڑ کے مالک) کسان اور 13 فیصد چھوٹے کسانوں (12.5 ایکڑ سے کم زمین کے مالک) سے بھی ایسی ہی توقع کی جارہی تھی جبکہ دیگر طے شدہ عوامل میں حکومتوں کے ذریعہ پالیسی اقدامات، موسم اور پانی کی صورتحال اور متبادل فصلوں کی دستیابی شامل ہے۔ اب صوبہ پنجاب میں مذکورہ بالا سروے کے نتائج کے مطابق جائزہ لیا جائے تو اصل کاشت شدہ علاقہ (2025ء میں) 16.25 ملین ایکڑ رقبہ تھا، جبکہ یہ ایک سال پہلے 17.44 ملین ایکڑ تھا۔ پیداوار میں کمی ہمارے تخمینے سے کچھ کم ہے آپ ان مثبت اثرات کو آج محکمہ صوبائی زراعت پنجاب کی زیادہ گندم اکاؤنٹ سے منسوب کر سکتے ہیں۔

پالیسی سازوں کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کے پاس گندم کی پیداوار بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ مفروضہ زیادہ تر ایسی معیشت میں ہمیشہ درست ہوتا ہے جہاں چھوٹے کاشتکاروں کا غلبہ ہوتا ہے جن کا نقطہ نظر سب سے پہلے گھریلو غذائی ضروریات (فوڈ سکیورٹی) پوری کرنا ہوتا ہے۔

پچھلے مہینے، ہماری Percision ایگری کلچر لیبارٹری نے صوبہ پنجاب میں گندم کے رقبے کی سیٹلائٹ تصاویر (Images) کا تجزیہ کیا۔ جس سے یہ نتائج اخذ ہوئے کہ پچھلے

اسال گندم کی پیداوار میں کمی کے واضح ثبوتوں کے باوجود گندم کی منڈی غیر مستحکم ہے اور یہ بات بھی بالکل عیاں ہے گندم کی سیاسی معیشت ہمیشہ زرعی منصوبہ بندی کے لئے لازمی عنصر رہی ہے۔ ہمیں اپنی جسمانی ضرورت کے لئے کم سے کم کیلو ریز کو پورا کرنے کے لئے سالانہ اوسطاً فی کس 120 کلو گرام گندم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک تخمینے کے مطابق 2035ء تک ہر سال ہمیں 39 سے 40 ملین میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہوگی جبکہ متوقع پیداوار کا تخمینہ 33 ملین میٹرک ٹن ہے۔ سالانہ آبادی میں 2 فیصد اضافہ، بڑھتی ہوئی آبادی کو کھانا کھانا اور گندم کی پیداوار میں متوقع کمی سے نبرد آزما ہونے اور پیش آمدہ چیلنجز کو دور کرنے کے لئے ہمیں بھرپور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا انحصار ہمارے پاس کاشت شدہ علاقے اور آب و ہوا کے نتائج پر منحصر ہوگا اور آئندہ گندم کی درآمد ہے۔

بین الاقوامی سطح پر گندم کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے ممالک (ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، روس اور یوکرین) کی پیداوار میں کمی یا بیشی پر منحصر ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے ممالک میں، ساٹھ کی دہائی میں آنے والے سبز انقلاب سے لے اب تک گندم کی پالیسی ہمیشہ حکومتوں کی سرکاری زرعی پالیسی کے بیانیے پر غالب رہی ہے۔ ہمارے ہاں گندم کی مقامی قیمتیں اور حکومت کی اعلان کردہ امدادی قیمت (سپورٹ پرائس) کم سے کم عام طور پر بین الاقوامی مارکیٹ سے ہمیشہ کم رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق گندم کی عالمی منڈی کی قیمت اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں 3 فیصد کم ہے جس کے اثرات ہمارے ہاں بھی محسوس کئے جارہے ہیں۔ گندم کی کم امدادی قیمت کے باوجود ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں موجودہ مارکیٹ میں گندم کی قیمت زمینی لاگت کے مقابلے میں اب بھی تقریباً 30 فیصد زیادہ ہے۔

2023ء میں، جب سندھ حکومت نے 40 کلو گرام گندم کی امدادی قیمت 4,000 روپے جبکہ وفاقی حکومت نے 3,900 روپے کرنے کے اعلان کیا تو اس کے چند ماہ بعد کئی مارکیٹ میں گندم کی قیمت 5,000 روپے تک پہنچ گئی جو کسان نے بھی

اسی صورت میں مناسب ہوتی ہے جب حکومت کا قیمتوں پر کنٹرول ہو اور وہ کسانوں سے گندم کی خریداری کو یقینی بنائے۔ اگر اچانک حکومت اس مارکیٹ سے نکل جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بحران میں وقتی طور پر مارکیٹ کو تیزی سے ترقی کا موقع ملتا ہے تاہم اس کا فائدہ کسان کی بجائے آڑھتی (Middleman) حاصل کرتا ہے۔ حال ہی میں پنجاب حکومت نے الیکٹرانک گودام کی رسیدیں (EWR) سسٹم کا آغاز کیا ہے۔ یہ ایک قابل تائش اقدام ہے۔ تاہم اسے دیر سے شروع کیا گیا۔ اگرچہ یہ سود سے پاک سرمایہ کاری کا موقع فراہم کرتا ہے تاہم اس نظام کو پختہ ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم کی ترسیل اور مناسب اقدامات اسٹیک ہولڈرز کے مابین سست عمل ہے۔ ذخیرہ کاری، فصل کی درجہ بندی اور کوالٹی کنٹرول کو سامنے رکھتے ہوئے پیداواری لاگت (متوقع لاگت) کی قیمت پر مبنی گندم کی قیمتوں کے تعین کے کچھ بنیادی معیارات طے کرنا ضروری ہیں۔ مابقی ماحول کو برقرار رکھنے اور مافیاز کی حوصلہ شکنی کے لئے حکومت کی طرف سے سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔

سرحد پار سسٹم کی تبدیلی کے تجربے سے بھی سیکھا جاسکتا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت نے متعدد قوانین کے نفاذ سے فصلوں کی عوامی خریداریوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جس کی بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کے آس پاس طویل دھرنے کے ذریعہ کسانوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ اس کے بعد حکومت کو اپنے مارکیٹ اصلاحات کے قوانین واپس لینے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد دو بڑے اقدامات گوداموں میں ذخیرہ اندوزی پر مراعات اور سرکاری اسٹاک سے آٹے کی ملوں میں گندم کی فراہمی کے لئے سخت شرائط کو متعارف کروایا گیا۔ آٹے کی ملوں کو حکومت سے فراہم کردہ کوٹے کے لئے کوالیفائی کرنے کے لئے کھلی مارکیٹ سے خریداری کے ذریعے کم سے کم اسٹاک کی سطح کو برقرار رکھنے کو لازمی قرار دیا گیا۔ موجودہ سیزن میں، ہندوستان کی حالیہ اوسط 103 ملین میٹرک ٹن کے مقابلے میں 115 ملین میٹرک ٹن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع ہے۔ حکومت اور نجی شعبے دونوں (خاص طور پر فلور ملز) مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ کھلی منڈی کی قیمت حکومت کی پیش کردہ امدادی قیمت سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ حکومت نے اجناس کی ترسیل پر کسی طرح کی پابندی نہ لگانے کا انتخاب کیا ہے۔

روایتی 3 فیصد کے مقابلے میں فلور ملوں کا موجودہ مارکیٹ شیئر 10 فیصد کے قریب ہے۔ وہاں ان تمام اقدامات کا مقصد گندم خریداری مراکز میں موجود بدعنوان مافیاز کے منفعی کردار کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس وقت بھارت میں گندم کی خریداری کے حوالے

سال ((2024 کے مقابلے میں امسال (2025) کی فصل کے سیزن کے دوران گندم کے کاشتہ رقبے میں 9.63 فیصد کمی کا انکشاف ہوا۔ ہم نے پنجاب کے چار زرعی ماحولیاتی علاقوں (Ecological Zones) میں بائیوفزیکل ماڈلنگ کا استعمال کرتے ہوئے سیٹلائٹ پر مبنی پیداوار کا تخمینہ بھی لگایا۔ اس تجزیے میں 2024ء کی فصل کے مقابلے میں گندم کی پیداوار میں 7 فیصد کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ اوسط پیداواری ایکڑ 34.74 من فی ایکڑ تھی جو پچھلے سال کی نسبت کم ہے۔ ایک ساتھ مل کر، دونوں عوامل آؤٹ پٹ میں 12 فیصد کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ (اصل اعداد و شمار ایک مہینے کے وقت میں حاصل ہو جائیں گے۔)

کم فراہمی کے واضح ثبوتوں کے باوجود، گندم کی مارکیٹ مسلسل دوسرے سال گر کر تباہ ہوگئی ہے۔ اگرچہ میں عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) کی شرائط یا اس کے بغیر حکومت کے فیصلے کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گندم کی مناسب امدادی قیمت مقرر کی جائے اور خریداری کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہم اپنے کسان کو نقصانات سے بچاسکیں اور وہ ملکی معیشت میں اپنا کردار مناسب طریقے سے ادا کرتا رہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ حکومت شہری صارفین کی فلاح و بہبود کا اہتمام کرے مگر یہ کسان کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔

سال 2024ء میں گندم کی پیداوار 32 ملین میٹرک ٹن تھی جو ایک ریکارڈ ہے مگر شومی قیمت حکومتوں نے اپنے وعدے کے برعکس کسانوں سے گندم کی خریداری نہیں کی جس کی وجہ سے منڈی میں گندم کی قیمتیں گر گئیں۔ مگر کسان کو اپنی فصلوں کے لئے ملنے والے مدخل (Input) کی قیمتیں بڑھتی گئیں جس کی وجہ سے اس کے پیداواری اخراجات میں اضافہ ہوا اور پیداواریں زیادہ لاگت آئی۔

عام طور پر، امدادی قیمت پر عوامی خریداری 4 تا 6 ملین میٹرک ٹن ہے جبکہ آٹے کی ملیں اور دیگر تاجر گندم کے دوسرے بڑے خریدار تھے۔ دراصل امدادی قیمت کا تعین اجناس کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لئے برقرار رکھا جاتا تھا۔ مزید براں حکومت نے کوٹے کا اعلان کیا اور آٹے کی ملوں کے لئے قیمتیں جاری کیں۔ حکومت نے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی ختم کر دی تاہم، سرحد پار تجارت پر ابھی بھی حکومتی پابندیاں موجود ہیں۔ تاہم گندم کی ترسیل کے حوالے سے ایک منفی صورتحال اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب آٹے کی ملیں تازہ گندم مقامی مارکیٹ سے خریدتی ہے اور حکومت کے پاس پڑے ہوئے اسٹاک کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔

عام طور پر زرعی منڈیوں میں کاروبار قابل رشک نہیں ہوتا۔ گندم کی مارکیٹ صرف

پرائیویٹ بینکوں کے ذریعے قرضہ جات کی فراہمی ون ونڈو آپریشن کے ذریعے کسانوں کو فراہم کروا رہی ہیں۔ اس طرح کے مقاصد کے ساتھ گرین پاکستان انیشی ایٹو پروگرام کا گرین ایگری مال منصوبہ قابل تعریف ہے۔ حکومت پنجاب کے جاری کردہ کسان کارڈ سے 6 لاکھ کسان گھرانے مستفید ہو رہے ہیں۔

طویل المدتی زرعی ترقی کاراز اولین طور پر پانی کی بہتر مینجمنٹ میں مضمر ہے۔ اس کے بعد زمین کی صحت کو بہتر بنانا اور موسمی تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر کاشتکاری کے امور سرانجام دینا شامل ہیں۔

گندم ملک کی سب سے بڑی فصل ہونے اور فلڈ ایری گیشن کی وجہ سے سب سے زیادہ پانی استعمال کرتی ہے۔ گندم اور چاول میں استعمال ہونے والا پانی کل استعمال شدہ پانی کا 68 فیصد ہے۔ اگر فلڈ ایری گیشن کی بجائے کھیلوئوں پر فصلوں کی کاشت کو رواج دیں تو 40 فیصد پانی کی بچت ممکن ہے اور اس سے فصلوں کی اچھی نشوونما، جدید مشینری کا آسان استعمال اور پیداوار میں بہتری بھی آتی ہے۔

میری تجویز ہے کہ ہمارے پالیسی ساز ادارے کسانوں کو 5 لاکھ ٹریکٹر بمعہ بیڈ پلانٹرز 3 سے 5 سالہ آسان اقساط پر فراہم کریں تاکہ کسانوں کو روایتی کاشتکاری سے جدید کاشتکاری کی طرف راغب کیا جاسکے۔ اس منصوبے پر آنے والے اخراجات کا تخمینہ 250 ارب روپے ہے اور یہ اخراجات فلڈ ایری گیشن کو کھیلوئوں میں پانی کی فراہمی سے، پانی کی بچت سے ہی پورے کیئے جاسکتے ہیں۔

اس طرح کسان بہت تیزی سے فلڈ ایری گیشن سے فروا گیشن کی طرف مائل ہوں گے۔ گندم اور چاول کے نظام سے اتنا پانی بچ سکے گا کہ ہم مجوزہ نہر میں بنا کر ایک لمبے عرصے تک غذائی تحفظ کو یقینی بناسکیں گے۔

سے زراعت کی ترقی کے لیے مناسب لاگت، وسائل کا منوثر استعمال اور مناسب قیمتوں پر مشتمل طویل مدتی حل ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے گندم کو محفوظ کرنے کی بجائے اسے مسابقتی فصلوں میں تبدیل کیا جائے۔ اس حوالے سے مکئی اور چاول کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا بھر میں اب حکومتیں مارکیٹوں کو کنٹرول نہیں کرتی ہیں اور کسانوں نے فصلوں کی کاشت و برداشت کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجیز کے اطلاق میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔

گندم واحد سب سے بڑی فصل سیلاب کی آبپاشی کے ذریعے آبپاشی کے پانی کا سب سے بڑا حصہ بھی استعمال کرتی ہے۔ چاولوں کے گندم کا نظام 68 فیصد آبپاشی کا پانی کھاتا ہے۔ سیلاب سے فیرو/ بیڈ آبپاشی میں تبدیلی ان فصلوں پر لگائے جانے والے آبپاشی کے پانی کا 40 فیصد تک بچت کر سکتا ہے جس میں بیج کو نشر کرنے کی بجائے بیجوں کی کھدائی کی وجہ سے بہتر فصلوں کے اسٹیڈ اور پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مناسب زہروں سے علاج شدہ معیاری بیج، چھتر کی بجائے جدید مشینوں (ڈزلز) کے ذریعے کاشت، متوازن کھادوں کا استعمال، جڑی بوٹیوں کا تدارک اور برداشت کے وقت نقصانات کو روکنے کے لیے مکمل طور پر ہارویسٹرز کا استعمال ضروری ہیں۔

اوسط قومی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے کے ہم تمام فصلوں خصوصاً گندم کی 100 فیصد ممکنہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ ممکنہ پیداوار میں کمی کی ایک اہم وجہ ہمارا چھوٹا کسان ہے جسے جدید ٹیکنالوجی تک یا تو رسائی نہیں یا پھر اس کے پاس اس کے استعمال کی صلاحیت نہیں۔ اس وقت ٹیکنالوجی اور مشینری مشترکہ استعمال اور ویلیو چین سے متعلقہ کمپنیاں آگے آرہی ہیں۔ یہ کمپنیاں معیاری مداخل کی فراہمی، فارم مشینری اور

علم کے موتی: اقوال امیر المومنین مولاعلیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام

امیر المومنین مولاعلیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے لشکر کے سپہ سالار جناب مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بصرہ مقرر کیا اور اسے ایک خط بھیجا۔ اس خط کا متن ان کے خطبات کی شہرہ آفاق کتاب ”نہج البلاغہ“ میں موجود ہے۔ اس خط میں آپ فرماتے ہیں کہ:

”اے مالک اشتر بطور حکمران تین طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ 1۔ بزدل، 2۔ بخیل، 3۔ چغل خور کیونکہ بزدل سے جب بھی مشورہ مانگو گے دیرانہ مشورہ نہیں دے گا، بخیل (یعنی نجوس) کی ہر بات لالچ پر مبنی ہوگی اور چغل خور تجھے تیری رعایا سے دور کر دے گا اگرچہ اس کی کچھ باتیں سچ بھی ہوں گی۔ تجھے چاہیے کہ تو خاندانی اور اعلیٰ اخلاق و اقدار کے لوگوں کو اپنے مصائب میں شامل رکھے اور اپنے رعایا کی غلطیوں اس طرح پردہ پوشی کرے جس طرح تیرے خالق نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔“ انتخاب از (نہج البلاغہ)

کھاد کی پیداواری ٹیکنالوجی

ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، محمد عثمان ابراہیم، محمد نواز..... شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اہمیت

بیج، شرح بیج اور پودوں کی تعداد

کھاد کی کاشت کے لئے بیماری اور کیڑوں سے پاک بیج استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ موڈھی گری ہوئی یا کھرے سے متاثرہ فصل کا بیج استعمال نہ کیا جائے اور بیج والے گنے سے کھوری اتارنے کا عمل درانتی کی بجائے ہاتھوں سے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 آنکھوں والے 30 ہزار اور 3 آنکھوں سے 20 ہزار سے یعنی 60 ہزار آنکھیں فی ایکڑ استعمال کی جائیں اور سموں کی یہ تعداد 100 یا 120 من کھاد یا 12 تا 16 مرلے کھاد درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیج کو ٹاپلن ایم کے 3 فیصد محلول میں 5 منٹ کے لئے بھگو کر کاشت کر دیا جائے اس طریقہ کار سے کاشتہ فصل میں 60 ہزار گنے پیدا ہو سکتے ہیں یعنی ایک ہزار تا 1200 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

گنے کی اقسام

دریائی علاقوں کے لئے سی پی ایف 253، سی پی ایف 237، سی پی ایف 252، ایچ ایس ایف 240 اور سی پی ایف 400-77 جبکہ دیگر علاقوں کے لئے سی پی ایف 250، سی پی ایف 251 اور جنوبی پنجاب کے لئے جس میں بہاولپور، راجن پور اور رحیم یار خان کے اضلاع شامل ہیں۔ 234 کاشت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

کھاد میں اور خوراک اجزاء

کمزور اور کلرٹھی زمینوں کے لئے 120:69:50 بھاری میرا وصحت مند زمین میں 92:46:50 کلو گرام بالترتیب پوناش، فاسفورس، نائٹروجن فی ایکڑ استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر دو بوری ڈی اے پی، تین بوری یوریا، ڈیڑھ بوری ایس او پی، 2، 2 کلو گرام زنک اور بوران اور پانچ کلو گرام میگنیشیم سلفیٹ فی ایکڑ ڈالنے سے بہترین پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

آپاشی اور آبی ضروریات

بھاریہ کھاد کو 16 تا 20 مرتبہ آپاشی یا 64 انچ فی ایکڑ جبکہ سبھ کھاد کو 80 انچ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

بیماریاں اور انکداد

پنجاب میں گنے کی سب سے خطرناک اور نقصان دہ بیماری رتاروگ ہے جبکہ دیگر مختلف بیماریوں کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔

گنے کا شمار پاکستان کی اہم نقد آور فصلوں میں ہوتا ہے جو گندم، کپاس اور چاول کے علاوہ سب سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ گنے کی دس کلو فصل سے ایک کلو چینی دستیاب ہوتی ہے اور اس چینی سے سینکڑوں قسم کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ گنے کی ملوں سے نکلنے والا چُور اگتا اور کاغذ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی فٹریٹ یا پریس مد سے نہ صرف کمپوسٹ بنائی جاتی ہے بلکہ زمینی اصلاح میں انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ کھاد کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اچھی اقسام اور جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے۔

کھاد کی کاشت کے لئے موزوں زمین

کھاد کی بہتر پیداوار کے لئے میرا اور بھاری میرا زمین انتہائی ضروری ہے۔ کلرٹھی اور ایسی زمینیں جہاں سخت تہہ موجود ہو وہاں آگاہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہلکی میرا اور ریتی زمین کھاد کی بھرپور پیداوار کے لئے موزوں نہیں ہوتی کھاد کی بوائی سے پہلے زمین کو لیزر لیولنگ سے تیار کر کے ایک مرتبہ سب سائلر یا چیزل ہل چلا کر زمین کو گہرائی تک تیار کیا جائے اس کے بعد گوہر کی گلی سڑی کھاد ڈال کر روناویٹر کی مدد سے زمین میں ملادیں اور چار چار فٹ کے فاصلے پر ایک فٹ چوڑے پینڈے، ڈیڑھ فٹ گہرائی والی کھالیاں بنائی جائیں جن کے کناروں کا فاصلہ اڑھائی فٹ ہو۔

موسم اور آب و ہوا

گنے کی بھرپور پیداوار کے لئے فروری کے آخر یا مارچ میں درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو نہ صرف گنے کا آگاہ بہتر ہوتا ہے بلکہ شگوفے بھی زیادہ بنتے ہیں جبکہ ستمبر کاشتہ کھاد کی بوائی ستمبر کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں کی جانی چاہیے کیونکہ موسمی تغیرات کی وجہ سے درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے اور گنے کا آگاہ متاثر ہوتا ہے۔

ستمبر کاشتہ فصل کا کھرے سے بچاؤ

موجودہ موسمی حالات میں ستمبر کاشتہ کھاد کو کھرے سے شدید نقصان پہنچتا ہے۔ کھرے سے بچاؤ کے لئے کھاد میں مخلوط فصلیں مثلاً کینولا، رایا، سور، چنے، گندم اور سبزیات کاشت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے اس کے علاوہ کھرے سے بچاؤ کے لئے فصل کو پوناشیم کی تجویز کردہ کھاد ڈالی جاتی ہے۔

رتاروگ

کی دھاریاں بن جاتی ہیں اور بعض اوقات گنے کے پتوں پر سرخ رنگ کی دھاریاں بن جاتی ہیں اور بعض اوقات گنے کا اوپر والا حصہ گل سر ہوتا ہے اور مردار جیسی بد بو آتی ہے اس سے بچاؤ کے لئے بیماری کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جائیں۔

چوٹی کا سرانڈ

یہ بیماری ایک پھپھوندی سے پھیلتی ہے اس سے متاثرہ پودوں کے پتوں پر پہلے رنگ کے دھبے بنتے ہیں اور گنے کا اوپر والا حصہ چڑمڑ ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایک پودے سے دوسرے پودے تک ہوا یا بارش کے ذریعے پھیلتی ہے، اس سے بچاؤ کے لئے اچھی قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جائیں۔

کمد کے کیڑے مکوڑے

کمد کی چوٹی کا گڑواواں، تنے کا گڑواواں، روٹ بور، سفید مکھی، دیمک اور گھوڑا مکھی وغیرہ شامل ہیں۔

تنے کا گڑواواں

اس سنڈی کارنگ سفید یا زرد اور بھورے رنگ کی دھاریوں سے بھرا ہوتا ہے یہ کیڑا اپریل سے جون کے مہینے تک حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے متاثرہ پودوں کے پتوں کو با آسانی کھینچ کر دیکھا جاسکتا ہے اس سے متاثرہ پودوں میں نیچے سے مزید شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لئے ایجنٹ (بائر) اور وراثت کو (سیلنچٹا) نامی زہر جس میں سپروئل اور مکرو بیٹرائیڈل پرولپس تھا یا میتھوکوزم استعمال کی جاتی ہیں۔

جو کا گڑواواں یا روٹ بور

اس کیڑے کے پروانے کا رنگ ہلکا زردی مائل ہوتا ہے اس سے متاثرہ پودوں میں سنڈی زمین کی سطح کے برابر مڈھوں سے فصل کے اندر داخل ہوتی ہے جس سے پودے کی کوئیل کے ساتھ ایک دوپتہ خشک ہو کر مر جھکا جاتے ہیں اس کے لئے تریسٹرا (ایف سی) نامی زہر جس میں کلورو نیٹرائیڈل پرولپس تھا یا میتھوکوزم استعمال کی سفارش کی جاتی ہے۔

چوٹی کا گڑواواں

یہ کیڑا کمد کی فصل کا سب سے نقصان دہ کیڑا سمجھا جاتا ہے اس کا حملہ کمد کی فصل پر خشک ساحلی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے فیوران (ایف ایم سی) اور منیروئل نامی زہر جس میں کاربو مینوران اور فہروئل ہوتا ہے استعمال کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

(باقی صفحہ 35 پر)

یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو چینی کی پیداوار کو 80 فیصد تک متاثر کر سکتی ہے گنے کو چیر کر دیکھیں تو پوریوں کا گودا ہلکا سرخ نظر آتا ہے اس وجہ سے اس بیماری کو رتاروگ کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری گنے کے بیج سے پھیلتی ہے اگر کمد کو ٹاپسٹن ایم کے محلول میں ڈبو کر کاشت کیا جائے تو اس بیماری کی شدت کم ہوتی ہے۔

کاٹگیاری

یہ بیماری اکثر موڈھی فصل پر آتی ہے بیج ایس ایف 240 اس بیماری سے بہت متاثر ہونے لگی ہے کاٹگیاری سے پودوں کی چوٹیاں چھانٹنے کی طرح نیم دائروی شکل کی ہو جاتی ہیں اور پتوں پر کالا سفوف بن جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لئے متاثرہ پودوں کو بار بار کاٹ کر تلف کیا جاتا ہے۔ موڈھی فصل رکھنے کے لئے کٹائی کے بعد ٹاپسٹن ایم 30WP، اریٹا (تھائی فینیٹ میتھائل) 400 گرام فی ایکڑ کے حساب سے پھرے کی جاتی ہے۔

گراسی شوٹ

یہ بیماری موڈھی فصل پر دو تین ماہ میں نئی پھوٹ شروع ہونے کے پہلے دو تین ماہ کے دران ظاہر ہوتی ہے اس بیماری میں پتے پہلے یا سفید نظر آتے ہیں۔ شوگ فے بیشمار نکلتے ہیں اس بیماری کی علامات آئرن کی کمی سے ملتی جلتی ہیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لئے ایک کلو گرام آئرن سلیفٹ اور 10 کلو گرام میکینیشیم سلیفٹ اور 2 کلو گرام کاپر سلیفٹ یا نیلا تھو تھا کھادوں کے ساتھ ملا کر ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مزید برآں اس سے بچاؤ کے لئے جعفر ایگریوز (کاپر ہائیڈرو آکسائیڈ) 250 گرام فی ایکڑ کے حساب سے پھرے تجویز کی گئی ہے۔

میتیلو لیٹ وائرس

میتیلو لیٹ وائرس کی وجہ سے گنے کے پتے دو ماہ پہلے ہی پہلے ہو جاتے ہیں گنے کی بعض اقسام SPF-234 اور CPF-246 پر اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیماری سے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام جیسا کہ CPF-248 اور US-778 کی سفارش کی جاتی ہیں۔

آنکھ نمادھے

یہ بیماری ایک پھپھوندی کی وجہ سے پھیلتی ہے اس سے بچاؤ کے لئے کاپر آکسی کلورائیڈ پلس مینکو زیب استعمال کی جاتی ہے۔

کمد کی برگی دھاریاں

یہ بیماری بیکٹیریائی کی وجہ سے پھیلتی ہے اس سے متاثرہ گنے کے پتوں پر سرخ رنگ

پیداواری منصوبہ برائے کپاس

ڈاکٹر محمد سرور، ڈاکٹر محمد فرخ سلیم، ڈاکٹر محمد اشفاق واحد، ڈاکٹر ہارون زمان خان، محمد وقاص، حمزہ مقصود..... شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

میں برداشت (کٹائی) ہوتی ہے۔ چنانچہ دستیابی وسائل اور موسمی حالات کے پیش نظر کپاس کو بیشتر فصلی ترتیب میں کاشت کیا جاسکتا ہے جن میں زیادہ منافع بخش درج ذیل ہیں۔

کپاس بی ٹی (آغاز مارچ)، کپاس (فروری) غائیو ال کے گرد و نواح

کپاس بی ٹی (آغاز مارچ)، مٹر (نومبر)، کپاس (اپریل)

کپاس + ٹینڈے (مارچ)، مٹر (اکتوبر)، کپاس (مارچ)

کپاس بی ٹی (مارچ)، آلو (اختتام اکتوبر، نومبر)، کپاس (مارچ)

موزوں زمین کا انتخاب

کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے زرخیز، میراؤ بھاری میرا، ہموار اور اچھے نکاس والی زمین جس میں نامیاتی مادہ کی مقدار بہتر اور پانی جذب کی اچھی صلاحیت ہونہایت موزوں ہیں۔ چکنی اور سخت زمین میں کپاس کی جڑیں زیادہ گہرائی تک نہ جانے کے باعث پودے کا قد چھوٹا رہنے سے مجموعی پیداوار متاثر ہوتی ہے جبکہ کمزور اور ریتی زمینوں میں کپاس ہوتو جاتی ہے البتہ اسکی اچھی پیداوار حاصل نہیں کی جاسکتی۔ کلرٹھی و سیم زدہ اور سخت اندرونی تہہ والی زمین کپاس کی پیداوار کو بری طرح متاثر کرتی ہے لہذا کلرٹھی زمینوں میں کپاس کی کاشت کھیلوں یا پٹریوں پر کرنی چاہیے۔

زمین کی تیاری

کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے زمین کی تیاری اس طرح کی جائے کہ زمین بھر بھری، دانے دار اور ہموار ہو۔ زمین کی بہتر تیاری کیلئے روٹا ویٹر سے پچھلی فصل کی باقیات کو زمین میں اچھی طرح ملا دیں تاکہ زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار بہتر ہو سکے۔ کپاس کے پودے کو خوراک اور پانی کی یکساں فراہمی کے حصول کے لئے زمین کو ہموار کرنے کیلئے لیٹر لیٹنگ ٹیکنیک سے استفادہ کرنا چاہیے چونکہ کپاس کی جڑیں زمین میں سیدھی اور گہرائی تک پھیلتی ہیں لہذا قبل از کاشت راجہ بل یا پیچرل سے زیر زمین سخت تہہ کو توڑ لینا چاہیے تاکہ جڑوں کی نشوونما بہتر اور پودا تندرست و توانا ہو سکے۔ زمین کو 2-3 ہل مع سہاگہ چلا کر بھر اور دانے دار کریں تاکہ بیج کا گاؤ بہتر اور جڑ کی نشوونما گہرائی تک ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کی نمی جذب کرنے اور وتر رکھنے کی صلاحیت بہتر ہو نکال لیں، یہی اوسط بیج کا فیصد اگاؤ ہوگا۔

کپاس پاکستان کی اہم نقد آور اور ریشہ دار جنس ہے جس کے باعث اسے ملکی معیشت میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ کپاس کو کپڑے اور گچی کی صنعت میں بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات کا زیادہ تر حجم کپاس اور اس سے بنی مصنوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان رقبے کے اعتبار سے چوتھے جبکہ پیداواری لحاظ سے ساتویں نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا کی 10 فیصد کپاس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خام دھاگہ برآمد کرنے والا دوسرا جبکہ کپڑا برآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ کپاس کی کل پیداوار کا تقریباً 70 فیصد پنجاب میں پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام ترجیحات کے قیام کے ہماری ملکی اوسط پیداوار تقریباً 19 من ہے جو کہ کپاس پیدا کرنے والے ممالک کے مقابل بہت کم ہے مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے ترقی پسند کاشتکار ملکی اوسط پیداوار سے دو گنا حاصل کر رہے ہیں جو اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری زمین، آب و ہوا اور اقسام کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لئے موثر (معاون) ہے۔ اگر ہمارے کاشتکار درج ذیل پیداواری طریقہ کار یا زرعی عوامل پر عمل پیرا ہوں تو کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ کپاس کے مسائل اور ان کا حل درج ذیل ہے۔

پیداواری مسائل

کپاس کے پیداواری مسائل میں ناقص بیج، اقسام کا گورکھ دھندا، بیج کی عدم دستیابی، فی ایکڑ پودوں کی کم تعداد، زمینی مسائل، ناگہانی موسمی حالات، جڑی بوٹیاں، کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ اور متزلزل مائیکینگ نظام شامل ہیں۔

آب و ہوا

کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے گرم اور خشک آب و ہوا نہایت موزوں ہے۔ کپاس کی اچھی پیداوار فضائی نمی اور بارش پر منحصر ہوتی ہے۔ بوائی کے دوران اگر گرم لوند چلے اور موسم گرم و خشک رہے تو فصل کا اگاؤ بہتر اور یکساں ہوتا ہے۔ جولائی، اگست میں اگر بارش کم ہوں تو کیڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے۔ اگر بارشیں ہوں تو کپاس کا قد بڑھنے سے نہ صرف پھل کم لگتا ہے بلکہ کیڑوں کا حملہ بھی شدید ہوتا ہے۔

فصلی ترتیب

گزشتہ برسوں سے کپاس کی ایسی اقسام کاشت ہو رہی ہیں جو چھوٹا قد ہونے کے ساتھ ساتھ کھیت میں کم عرصہ کھڑی رہتی ہیں۔ مارچ کاشت اقسام اکتوبر جبکہ مئی کاشت اقسام نومبر

منصوبہ بندی، وقت کاشت اور سفارش کردہ اقسام

علاقہ بندی	وقت کاشت	سفارش کردہ اقسام
مرکزی علاقہ جات (ملتان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن)	یکم اپریل تا 31 مئی	ایف ایچ پی، ایف ایچ 490، بی ایس 20، سی آئی ایم 633، سی آئی ایم 343، حتف 3، کیمب کلین کاٹن 3، ایم این ایچ 1016، ایم این ایچ 1020، ایم این ایچ 1026، ایم این ایچ 1035، آئی سی آئی 2424، آئی یو بی 13، آئی یو بی 222، بی ایس 15، سائیڈو 179، سی آئی ایم 598، سی آئی ایم 600، سی آئی ایم 602، ایف ایچ لالہ زار، ایف ایچ 114، ایف ایچ 142، آرا ایچ 668، نیاب 545، نیاب 879، نیاب 1048 اور ایم این ایچ 886
ثانوی علاقہ جات (فیصل آباد، ساہیوال، قصور ڈویژن، ضلع بھکر اور ضلع میانوالی)	یکم اپریل تا 15 مئی	ایف ایچ پی، ایف ایچ 490، بی ایس 20، سی آئی ایم 633، سی آئی ایم 343، حتف 3، کیمب کلین کاٹن 3، ایم این ایچ 1016، ایم این ایچ 1020، ایم این ایچ 1026، ایم این ایچ 1035، آئی سی آئی 2424، آئی یو بی 13، آئی یو بی 222، بی ایس 15، سائیڈو 179، سی آئی ایم 598، سی آئی ایم 600، سی آئی ایم 602، ایف ایچ لالہ زار، ایف ایچ 114، ایف ایچ 142، آرا ایچ 668، نیاب 545، نیاب 879، نیاب 1048 اور ایم این ایچ 886

نوٹ: گلابی سنڈی کے حملے سے بچنے کیلئے کپاس کی کاشت یکم اپریل سے پہلے ہرگز نہ کریں البتہ بی ٹی کپاس کی کاشت کی صورت میں 10 فیصد رقبے پر روایتی اقسام کاشت کریں تاکہ گلابی سنڈی یا دوسری حملہ آور سنڈیوں میں بی ٹی اقسام کے خلاف مدافعت پیدا نہ ہو سکے۔

وقت بوائی میں جلدی و تاخیر کے فوائد و نقصانات

کپاس کا پودا گرم اور خشک موسم کو پسند کرتا ہے۔ بعض کاشتکار دوسری فصلات سے جلد خالی ہونے والی زمینوں میں وائرس کے غرضے سے ٹٹنے کیلئے کپاس جلد کاشت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگیتی کاشتہ فصل پر گلابی سنڈی اور رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس پیچھیتی کاشتہ (جون) فصل کو ابتدائی بڑھوتری کی حالتوں میں زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے پودے کی ابتدائی نشوونما کم ہوتی ہے۔ نیز زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے کپاس کے ابتدائی مراحل میں سفید مکی کا حملہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید برآں مون سون بارشوں کی وجہ سے نمی کے بڑھنے سے چت تیلہ کا حملہ بھی ہوتا ہے لہذا بہتر پیداوار حاصل کرنے کیلئے کپاس کو سفارش کردہ وقت پر کاشت کرنا چاہیے۔

معیاری بیج کا انتخاب، تیاری اور شرح بیج

کسی بھی فصل کا بہتر اگاؤ اسکی اچھی پیداوار کا ضامن ہوتا ہے جبکہ شرح اگاؤ بیج کے معیاری و خالص پن اور تندرستی کے مرہون منت ہوتا ہے لہذا کپاس کی بہتر پیداوار کے لئے خالص و تندرست، معیاری اور بڑا ترا بیج استعمال کرنا چاہیے۔ قبل از کاشت کمزور، ناقص اور بیمار بیج الگ کر دینا چاہیے۔

بیج سے بڑا تارنا

بیج سے بڑا تارنے کیلئے گندھگ کا تیزاب بحساب ایک لیٹر فی 10 کلو گرام بیج استعمال کرنا چاہیے۔ بڑا تارنے کیلئے بیج کو پلاسٹک ٹب میں ڈال کر اس پر گندھگ کا تیزاب آہستہ آہستہ چھڑک کر بیج کو کھلوی کی چھڑی سے آہستہ آہستہ بلانا چاہیے تاکہ تیزاب تمام بیج پر یکساں لگ جائے۔ بیج سیاہی مائل چمکدار ہونے پر اس کو 3 سے 4 بار پانی سے دھونا چاہیے تاکہ بیج تیزاب سے پاک ہو جائے۔ بیج دھوتے وقت پانی کی سطح پر تیرنے والے بیجوں کو الگ کر دیں اور نیچے بیٹھے ہوئے بیجوں کو کسی ہوادار اور سایہ والی جگہ پر خشک کرنا چاہیے۔

بیج کا اگاؤ معلوم کرنا

بیج کا شرح اگاؤ جانچنے کیلئے 400 بیجوں کا نمونہ لیں اور اسے چھ تاسات گھٹنوں کے لئے پانی میں بھگوئیں۔ 2 نم دار بوریوں یا تولیوں میں سے ایک کو کسی صاف خشک اور سایہ دار جگہ پر بچھا کر اس پر بھگوئے ہوئے بیج کے نمونے، موسودانے چار جگہوں پر علیحدہ علیحدہ بکھیر دیں اور دوسرے نم دار بوری یا تولیے سے بیج کو ڈھانپ دیں۔ بیج کو اگاؤ کیلئے نمی فراہم کرنے کیلئے ڈھکے ہوئے بیجوں پر دن میں دو تین مرتبہ پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ چار یا پانچ دنوں بعد اوپر والی بوری یا تولیے کو اٹھا کر ہر ڈھیری سے اگنے والے بیجوں کو گن لیں اور انکی اوسط

بیج کو زہر آلود کرنا

باعث کرڈ کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ اس طریقہ کاشت میں پانی کی بچت کے ساتھ ساتھ وٹر خشک ہونے کا اندیشہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کاشت چکنی اور کمر اٹھی زمینوں میں فی ایکڑ پودوں کی تعداد برقرار رکھنے کیلئے بہت مفید ہے۔ پٹر یوں یا کھیلوں کی نرم اور بھر بھری مٹی بیج کے اگاؤ اور پودوں کی اچھی نشوونما کیلئے معاون ثابت ہوتی ہے۔

پٹر یوں/کھیلوں کی تیاری اور بیج لگانے کا طریقہ

زمین کی تیاری کے بعد 8 تا 10 انچ اونچی اڑھائی فٹ کے باہمی فاصلے پر اڑھائی فٹ چوڑی پٹر یاں (بیڈ) بنائیں۔ ان پٹر یوں پر مشین یا ہاتھ (چوبا) سے بیج لگایا جاسکتا ہے۔ مشین کاشتہ میں پہلے پلانٹر سے پٹر یوں کے دونوں کناروں پر بیج لگائیں اور پھر نالیوں میں کاشت شدہ بیج سے دوانچہ نیچے تک پانی لگادیں جبکہ ہاتھ سے کاشت کرنے کیلئے پہلے نالیوں میں پانی لگائیں اور پھر سطح آب سے ایک انچ اوپر مطلوبہ فاصلہ پر بیج پٹری کے دونوں اطراف لگادیں۔ اس طریقہ کاشت میں بیج کے اچھے اگاؤ کیلئے دوسرا پانی 4 سے 5 دن بعد لگائیں۔

ناغے پر کرنا

کپاس کا بیج عمومی طور پر کاشت کے 4 سے 5 دن میں آگ آتا ہے۔ اگاؤ کے بعد جدھر ناغے ہوں وہاں سے اوپر والی سطح کی خشک مٹی ہٹا کر 5 تا 6 گھنٹے پانی میں بھگوئے ہوئے 4 تا 5 بیج لگا کر وٹر والی مٹی سے ڈھانپ دیں۔ ناغے بروقت لگانے چاہیے، ناغے زیادہ ہونے کی صورت میں بوئی دوبارہ کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات اگر دوران کاشت نالی بند ہونے سے زیادہ لمبے فاصلے تک اگاؤ متاثر ہوا ہو تو اسی وٹر میں ایک نالی والی ڈرل سے دوبارہ بوائی کی جاسکتی ہے۔

کپاس کی اچھی پیداوار کے حصول میں قطاروں میں پودوں کا باہمی فاصلہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے تاکہ پودے دستیاب جگہ کی مناسبت سے بڑھوتری کر سکیں۔ چھدرائی کا عمل 20 تا 25 دن بعد از کاشت یا پہلے پانی سے قبل یا خشک گوڈی کے بعد ایک ہی مرحلہ میں مکمل کرنا چاہیے۔ وائر سے متاثرہ علاقوں میں چھدرائی کا عمل پہلے پانی کے بعد کرنا چاہیے اور وائر سے متاثرہ پودوں کو ممکن حد تک نکال دینا چاہیے۔ پودوں کے باہمی فاصلہ کا تعین، زمین کی زرخیزی، کپاس کی قسم، وقت کاشت، ثمر دار شاخوں کی لمبائی اور غیر ثمر دار شاخوں کی تعداد کے مطابق کرنا چاہیے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

فصل کو ابتدائی بڑھوتری کے ایام میں رس چوسنے والے کیڑوں خصوصاً سفید مکھی جو کہ پتہ مروڑ وائرز کی بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے سے محفوظ رکھنے کیلئے بیج کو قبل از کاشت کیڑے مارزہر لگانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قبل از کاشت بیج کو کسی بھی مناسب کیڑے مارزہر مثلاً امیڈاکلو پریڈ 70 ڈیلیو ایس بحساب 10 گرام فی کلوگرام بیج پر لگائیں۔

شرح بیج

کسی بھی فصل کا شرح بیج اس کے معیاری وخالص پن، بیماریوں سے پاک، فیصد اگاؤ، طریقہ کاشت اور وقت کاشت پر منحصر ہوتا ہے لہذا فی ایکڑ مطلوبہ پودوں کی تعداد کے حصول کیلئے ڈرل کاشت کی صورت میں 8 تا 10 کلوگرام بڑا ترا ہوا جبکہ پٹر یوں یا کھیلوں کے طریقہ کاشت کی صورت میں 6 تا 5 کلوگرام بڑا ترا ہوا فی ایکڑ بیج استعمال کرنا چاہیے۔

طریقہ کاشت

بذر یعہ ڈرل

اس طریقہ میں کپاس کی کاشت خریف ڈرل سے سیدھی قطاروں میں اڑھائی فٹ کے باہمی فاصلے پر کی جاتی ہے اور بیج کی گہرائی 2 تا اڑھائی انچ لگی جاتی ہے۔ بعد از بوئی (کاشت) اگر بارش کے باعث کرڈ بن جائے تو فی الفور دوبارہ بوئی کر دینی چاہیے۔ پہلی آبپاشی کے بعد یا پھر فصل کا قد ڈیڑھ تا 2 فٹ ہونے پر پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا کر پٹر یاں بنادیں جس کے درج ذیل فوائد ہوتے ہیں۔

☆ 20 تا 30 فیصد پانی کی بچت

☆ جڑی بوٹیوں کا آسان انداد

☆ کھاد کا بہتر استعمال

☆ بہتر نکاسی آب

☆ آسان پیرے

☆ زیادہ پیداوار

☆ ڈوڈیوں اور ٹینڈوں کے گرنے میں کمی

کھیلوں/پٹر یوں پر کاشت

پٹر یوں یا کھیلوں پر طریقہ کاشت فصل کو ناگہانی بارشوں کے نقصانات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس طریقہ کاشت میں ڈرل کاشتہ فصل کی نسبت اگاؤ بہتر اور بارش کے

پودوں کے درمیانی فاصلے بارے تفصیلات

وقت کاشت	پودے سے پودے کا فاصلہ	کھیلیوں کا باہمی فاصلہ	فی ایکڑ پودوں کی تعداد
یکم اپریل تا 30 اپریل	12 انچ	اڑھائی فٹ	17500
یکم مئی تا 31 مئی	6 تا 9 انچ	اڑھائی فٹ	23000 تا 35000

جڑی بوٹیاں: عموماً کپاس کے ضرر رساں (نقصان دہ) کیڑوں اور وائرس کے حملہ کا آغاز وٹوں، کھالوں اور سرخوں کے کناروں پر اُگی جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے لہذا قبل از کاشت ان جگہوں سے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا چاہیے۔ کپاس کی جڑی بوٹیوں میں مدھانہ گھاس، اٹ سٹ، قلفہ، تاندلہ، ہزار دانی، جنگلی چولائی اور ڈیلا شامل ہیں۔

جڑی بوٹیوں کے تدارک کے طریقے

(1) بذریعہ گوڈی (2) بذریعہ جڑی بوٹی مارز ہریں

بذریعہ گوڈی

گوڈی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے ساتھ ساتھ کھیت میں نمی رہنے اور زمین سے ہوا کے گزرنے کا باعث بنتی ہیں۔ رجر سے گوڈی آسان اور کم لاگت ہوتی ہے۔

خشک طریقہ

پہلے پانی کے بعد دی ہوئی خشک گوڈی جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لئے کافی مؤثر ہوتی ہے۔ وٹر کو ضائع ہونے سے بچانے کیلئے اس میں گوڈی کی گہرائی 2 تا اڑھائی انچ ہونی چاہیے۔ مزید برآں بارش کے بعد گوڈی لازم کریں۔

وٹر طریقہ: وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آبپاشی اور بارش کے بعد گوڈی کریں۔ گوڈی کا عمل اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کپاس کے پودے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ گوڈی مناسب وٹر میں کرنی چاہیے تاکہ ڈھیلے نہ بنیں۔

جڑی بوٹی مارز ہریں: دو قسم کی جڑی بوٹی مارز ہریں کپاس کی فصل سے جڑی بوٹیوں کا تدارک کر سکتی ہیں۔

فصل کے اگاؤ سے قبل جڑی بوٹی مارز ہروں کا استعمال

☆ قبل از راؤنی تیار شدہ زمین پر یکساں سپرے کر کے راؤنی کر دیں۔ ☆ راؤنی کی ہوئی زمین کو وٹر حالت میں رجر (سہاگہ یا بلیڈ) لگا کر یکساں سپرے کریں اور سپڈ بیڈ تیار کر کے ہوائی کر دینی چاہیے۔ ☆ سپڈ بیڈ تیار کرتے وقت آخری بل لگانے سے قبل ہموار زمین پر یکساں سپرے کرنے کے بعد بل اور سہاگہ لگا کر ہوائی کر دینی چاہیے۔

یہ طریقہ بہترین ہونے کے علاوہ موافق نتائج کا حامل ہے۔ مگر وقت کم ہونے کے باعث ذرا سی غفلت و تر خشک ہونے کا سبب بن سکتی ہے جس سے اگاؤ میں کمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پٹریوں پر کاشتہ کپاس میں ہوائی کے فوراً بعد سے 24 گھنٹوں کے اندر جڑی بوٹی مارز ہر کا سپرے کریں۔ یہ طریقہ صرف پٹریوں پر کاشتہ فصل پر استعمال کرنا چاہیے۔ ان زہروں کو زمین میں ملانے سے اگاؤ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ پودے اگاؤ کے فوراً بعد مر جاتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے اگنے کے بعد بھی جڑی بوٹی مارز ہر کا سپرے کرنا چاہیے۔

اگاؤ سے پہلے استعمال ہونے والی جڑی بوٹی مارز ہریں

نام زہر	فی ایکڑ مقدار	طریقہ استعمال اور تلف ہونے والی جڑی بوٹیاں
پینٹی میٹھالین 33 فیصد ای سی	ایک لیٹر	کاشت سے قبل زمین میں جلانیں یا کاشت کے فوراً بعد وٹر میں سپرے کریں۔ یہ چھڑ، ڈیلا، بھکڑا، اور مجبت بوٹی کے علاوہ تمام جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔
ایس میٹولا کلور 960 ای سی	800 ملی لیٹر	پٹریوں/کھیلیوں پر چوپے لگانے کے 24 گھنٹے کے اندر کھیلیوں کے اندر سپرے کریں۔

(b) فصل اور جڑی بوٹیوں کے اگاؤ کے بعد زہروں کا استعمال

اس طریقہ میں جڑی بوٹی مارز ہروں کا سپرے فصل یا جڑی بوٹیوں کے اگنے کے بعد کیا جاتا ہے۔

اگاؤ کے بعد استعمال ہونے والی جڑی بوٹی مارزہریں

نام زہر	فی ایکڑ مقدار	تلف ہونے والی جڑی بوٹیاں
ہیلوکسی فپ 10.8 ای سی	400 ملی لیٹر	سوانچی
گلافوسیٹ	1200 ملی لیٹر	تمام جڑی بوٹیوں کے لئے شید لگا کر پھرے کریں۔

آپاشی: آپاشی زمین کی زرخیزی، موسمی حالات، طریقہ کاشت، کپاس کی قسم اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے۔ کھیت کے اونچے حصے میں پانی کی کمی کی علامات نسبتاً پہلے ظاہر ہوتی ہیں جن میں پتوں کا نیلگوں ہونا، سفید پھول کا چوٹی پر آنا، او پروالی شاخوں کی درمیانی لمبائی میں کمی، چوٹی کے پتوں کا کھردار ہونا اور تنے کے اوپر کے حصہ کا تیزی سے سرخ ہونا شامل ہے لہذا ان علامات کے ظاہر ہونے سے قبل فصل کی آپاشی کر دینی چاہیے۔

طریقہ کاشت	آپاشی
ڈرل کاشتہ/ قطاروں میں کاشتہ کپاس	پہلی آپاشی بوائی کے 30 تا 35 دن بعد اور بقیہ آپاشی 12 تا 15 دن کے وقفہ سے جاری رکھیں نیز آپاشی کی ضرورت کے پیش نظر ہلکا سا پانی لگائیں کپاس کے بعد گندم کاشت کرنے کی صورت میں آخری آپاشی 10 اکتوبر تک کر دیں۔
پٹر یوں/ کھیلیوں پر کاشتہ کپاس	پہلی آپاشی 3 تا 4 دن بعد جبکہ دوسری تیسری اور چوتھی آپاشی 6 تا 9 دن کے وقفہ سے کریں اس کے بعد موسمی حالات کے مطابق 10 تا 12 دن کے وقفہ سے آپاشی جاری رکھیں کپاس کے بعد گندم کاشت کرنے کی صورت میں آخری آپاشی 15 اکتوبر تک کرنی چاہیے۔

پٹر یوں پر کاشتہ کپاس میں کھیلیوں کی وجہ سے بظاہر تو کم جگہ کو سیراب کرنے سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ مگر اس طریقہ کاشت میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے مسلسل آپاشی کرنا پڑتی ہے۔ یہ طریقہ کاشت صرف ان علاقوں کے لئے موزوں ہے۔ جہاں وسائل آب وقفہ وقفہ سے مسلسل دستیاب ہوں۔ اس کے برعکس ڈرل کاشتہ کپاس میں پہلی آپاشی عمومی طور پر 35 تا 40 دن بعد جبکہ کچھ اقسام میں 55 تا 60 دن بعد کرنی پڑتی ہے لہذا ایسے علاقے جہاں پانی کی کمی کے باعث آپاشی وقفہ وقفہ سے مسلسل نہیں کی جاسکتی وہاں ڈرل کاشتہ طریقہ مناسب اور موزوں ہے۔

کھادوں کی سفارشات

بی ٹی اقسام کے لئے کھادوں کی سفارشات (i) ثانوی علاقہ جات (پنجاب)							
زمین کی کیفیت	اجزائے خوراک کلوگرام فی ایکڑ			کھادوں کی مقدار			
	نائٹروجن	فاسفوس	پوٹاش	یوریا	ڈی اے پی	ایس او پی	ایم او پی
کمزور	90	40	30	سواتین بوری	پونے دو بوری	سوا بوری	ایک بوری
درمیانی	80	35	30	تین بوری	ڈیڑھ بوری	سوا بوری	ایک بوری
زرخیز	70	30	30	اڑھائی بوری	سوا بوری	سوا بوری	ایک بوری
(ii) مرکزی علاقہ جات (پنجاب)							
کمزور	100	40	38	ساڑھے تین بوری	پونے دو بوری	ڈیڑھ بوری	سوا بوری
درمیانی	90	35	38	سواتین بوری	ڈیڑھ بوری	سوا بوری	سوا بوری
زرخیز	80	30	38	تین بوری	سوا بوری	ڈیڑھ بوری	سوا بوری

نان بی ٹی (روایتی) اقسام کے لئے کھادوں کی سفارشات

کھادوں کی مقدار				اجزائے خوراک کلوگرام فی ایکڑ		
ایم او پی	ایس او پی	ڈی اے پی	یوریا	K	P	N
(i) مرکزی علاقہ جات (پنجاب)						
پونی بوری	ایک بوری	ڈیڑھ بوری	اڑھائی بوری	25	35	69
(ii) ثانوی علاقہ جات (پنجاب)						
پونی بوری	ایک بوری	ڈیڑھ بوری	دو بوری	25	35	58

کھادوں کا طریقہ استعمال

فاسفورس، پوناش اور ایک تہائی نائٹروجن پر مشتمل کھاد بوائی کے وقت استعمال کرنی چاہیے۔ ایک تہائی نائٹروجن پہلے پانی جبکہ باقی ماندہ نائٹروجن دوسرے پانی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور پر نائٹروجنی کھاد 15 اگست تک ہر صورت ڈال دینی چاہیے۔ کپاس کی قسم، فصل کی حالت، زمینی ساخت اور موسمی حالات کے پیش نظر نائٹروجن کی مقدار اور اقسام میں کمی و بیشی اور وقت استعمال میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ کھادوں کی بہتر افادیت حاصل کرنے کے لئے کھادیں بذریعہ رجر سے ڈیڑھ تا اڑھائی انچ کی گہرائی اور 2 تا 3 انچ کے فاصلے پر ڈالنی چاہیے۔ نائٹروجن کھاد آبپاشی کے بعد وتر حالت میں رجر کے ذریعے استعمال کی جاسکتی ہے۔ وائرس کے حملہ کی صورت میں پہلی چار آبپاشیوں کے ساتھ آدھی بوری یوریا ڈالیں۔ نائٹروجنی کھاد ٹینڈے بنتے وقت استعمال کرنی چاہیے۔ یوریا کا چھوٹا تر وتر حالت میں یا پھر یوریا چھوٹے کرنے کے بعد فوراً آبپاشی لگانی چاہیے۔ زنک اور بوران کی کمی کی صورت میں ساڑھے سات کلوگرام زنک جبکہ 3 کلوگرام بوران فی ایکڑ بوقت کاشت استعمال کرنی چاہیے۔ زنک اور بوران بذریعہ پیرے سے بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

ضرر رساں کیڑے اور ان کا انداد (تدارک)

نام کیڑا	نقصان کی معاشی حد	وقت نقصان	سفارش کردہ زہریں اور مقدار (فی ایکڑ)
سفید مکھی	4 سے 5 بالغ یا بچے فی پتہ	فصل کے آغاز سے اختتام تک حملے کا خدشہ ہوتا ہے	پازی پروکسی فن 500 ملی لیٹر، مووینٹو 125 ملی لیٹر، بائیوپاور 250 ملی لیٹر، اولالا 80 گرام، پولو 500 ایس سی 250 ملی لیٹر، موبلان 20 ایس پی 125 گرام، میٹیرین 500 ملی لیٹر، فلونیکا میڈ 80 گرام اور پیر و فیزین 600 گرام
بزیمیلہ یا چت تیلہ (حیدر)	ایک بالغ یا بچہ فی پتہ	فصل کے آغاز سے اختتام تک حملے کا خدشہ ہوتا ہے	نائیٹن پائرام 200 ملی لیٹر، فلونیکا مائیڈ 60 گرام، ڈائوٹی فیوران 20% ایس بی 100 گرام، سلفا کسافلور 30 گرام
تھرپس	8 سے 10 بچے یا بالغ فی پتہ	فصل کے اگاؤ سے لے کر ستمبر اکتوبر تک	ایسی فیٹ 300 گرام، کلورینا پائز 100 ملی لیٹر، سیمیٹورام 60 ملی لیٹر
سیاہ تیلہ یا سست تیلہ	15 بچے یا بالغ فی پتہ	ستمبر اکتوبر، اس کا حملہ نوزائیدہ فصل پر بھی ہوتا ہے۔	پولو 500 ایس سی 200 ملی لیٹر، ایڈوانٹیج 20 ای سی 500 ملی لیٹر، امیڈاکلو پرڈ + فپیرول WG 80% بحساب 60 گرام
امریکن سنڈی	5 انڈے یا 3 لاروے 25 پودوں پر	پھول آنے سے فصل کے آخر تک	ایما میکٹن 9EC.1 بحساب 200 ملی لیٹر، بیٹ 50 ملی لیٹر، سپائنتورام 20 ایس سی بحساب 60 ملی لیٹر، بوراجن 200 ایس سی 80 ملی لیٹر

نام کھیرا	نقصان کی معاشی مد	وقت نقصان	سفارش کردہ زہریں اور مقدار (فی ایکڑ)
گلابی سڈی	5 سڈیاں فی 100 ٹینڈے یا اگست میں 10 فیصد یا ستمبر میں 5 فیصد نقصان	پھول آنے سے لے کر فصل کے اختتام تک	کراٹے 5.2 ای سی 400 ملی لیٹر، ٹرائی ایز و فاس 1000 ملی لیٹر + ڈیلٹا میٹھرین 400 ملی لیٹر، سپینٹوریم 120 ایس سی بحساب 80 ملی لیٹر، بائی فنڈھرین 10 ای سی بحساب 250 ملی لیٹر، لیمڈ اسائی ہیلوٹھرین 2.5 ای سی بحساب 330 ملی لیٹر
لشکری سڈی	کھیت میں حملہ نظر آنے پر	جولائی سے اکتوبر تک	پرولیم 200 ملی لیٹر، بیلٹ 25 ملی لیٹر، میچ 200 ملی لیٹر، لیو فوران 5% ای سی 200 ملی لیٹر، فلو بینڈی امانیڈ 480 ایس سی بحساب 50 ملی لیٹر
جونیں	نقصان کی علامات ظاہر ہونے پر	فصل کی ابتداء سے اختتام تک	ہیگزی تھایازوکس 1 2 5 گرام، فین پارکوسی فیت 50 فیصد ایس سی 200 ملی لیٹر
چٹمبری سڈی	3 سڈیاں فی 25 پودے یا 10 فیصد ڈوڈیوں، پھولوں اور ٹینڈوں کا نقصان	پھل آنے سے فصل کے آخر تک	کلورپنٹر انیلپ رول 200 ایس سی بحساب 50 ملی لیٹر، لیمڈ اسائی ہیلوٹھرین 5.2 ای سی بحساب 300 ملی لیٹر

بروقت اور محتاط چٹائی

کپاس کی چٹائی کرتے وقت درج ذیل امور کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ آکلائشوں سے پاک صاف ستھری پٹھٹی حاصل ہو سکے۔

- ☆ چٹائی تقریباً 40 تا 50 فیصد ٹینڈے کھلنے پر کرنی چاہیے۔
- ☆ چٹائی شبنم ختم ہونے پر کریں اور پٹھٹی چن کر خشک اور صاف جگہ پر رکھنی چاہیے۔
- ☆ کھلی کپاس کو ضائع ہونے سے بچانے کیلئے دیسی کپاس کی چٹائی آٹھ دن بعد جبکہ دیگر اقسام کی چٹائی پندرہ تا بیس دن بعد کرنی چاہیے۔
- ☆ چٹائی، سٹورینج اور ترسیل کیلئے سوتی کپڑا یا اس سے بنی بوریاں استعمال کرنی چاہیے جبکہ پلاسٹک اور پٹن کی بوریوں سے گریز کرنا چاہیے۔
- ☆ چٹائی کے بعد کپاس کی مختلف اقسام کو الگ الگ ذخیرہ کرنا چاہیے۔
- ☆ آخری چٹائی کے بعد کھیت میں بھیڑ بکریاں چرائی چاہیے تاکہ باقی ماندہ پتوں اور ٹینڈوں کا خاتمہ ہو سکے جس سے پتوں اور ٹینڈوں میں موجود کیڑوں خصوصاً گلابی سڈی کی تلفی ہو جاتی ہے۔
- ☆ کپاس کی چھڑیوں کو روٹاویٹر یا پل کے ذریعے زمین میں دبانے سے زیر زمین امریکن اور لشکری سڈی کے پیوپے تلف ہو جاتے ہیں جس سے فروری میں نکلنے والے پروانوں کو روک کر ان کی نسل کا پھیلاؤ کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

احادیث

☆ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیاریؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ان دو افراد نے بتایا جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حجتہ الوداع کے موقع پر حاضر ہوئے تھے جبکہ آپ ﷺ صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت ان دونوں افراد نے بھی نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی دیتا ہوں لیکن اس مال صدقہ میں مالدار اور تندرست شخص کا جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو کوئی حصہ نہیں ہے۔ (ابوداؤد، نسائی) ☆ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو آپ ﷺ لانے والے سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہ بدیہ ہے یا صدقہ؟ اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ ﷺ مستحق صحابہ سے فرماتے تم کھاؤ اور خود نہ کھاتے۔ اگر کہا جاتا کہ بدیہ ہے تو اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالتے اور خود بھی صحابہ کے ساتھ تناول فرماتے۔ (متفق علیہ)

چاول کی کاشت کے بہترین پیداواری طریقے اور بیماریوں کا سدباب

محمد حذیفہ تنویر، مومن اسحاق، ڈاکٹر محمد امجد علی، ڈاکٹر امجد عباس، ڈاکٹر محمد دلدار گوگی..... شعبہ امراض و نباتات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، شعبہ حشرات شناسی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

چاول کی تعارفی اہمیت

دنیا کی نصف آبادی کی خوراک کا انحصار چاول کی پیداوار پر ہے۔ اس کے پودے کا تعلق گھاس کے خاندان سے ہے جبکہ بہترین غذائی اجزاء ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں خوراک کے طور پر اور بعض علاقوں میں شوق کے طور پر دسترخوان کا حصہ بناتے جاتے ہیں۔ اس میں فائبر، پروٹین، آئرن کے علاوہ وٹامن بی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اناج کے علاوہ چاول کے پودے کی باقیات کو مویشیوں کی غذا یا پھر بطور ایندھن استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اکثر اوقات تعمیری مواد کے طور پر یا پھر صنعتی استعمال جیسا کہ کاغذ کی تیاری میں بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ چاول جہاں غذائیت کے لحاظ سے پاکستان کی دوسری بڑی فصل ہے وہیں زرمبادلہ کے لیے بھی سرفہرست فصلوں میں شامل ہے۔

پاکستان میں ہر سال چاول کی ریکارڈ پیداوار ہوتی ہے اگر بات کی جائے سال 2021-2022 کی تو پاکستان میں ٹوٹل چاول کی پیداوار 8.9 ملین ٹن تھی جو کہ سال 2023 کے مقابلے میں زیادہ تھی کیونکہ گزشتہ سال کی ریکارڈ پیداوار 8.4 ملین ٹن تھی۔ عالمی رینٹنگ میں پاکستان چاول کی پیداوار کے لحاظ سے دسواں ملک ہے۔ چاول کی دنیا بھر کی کل تجارتی برآمدات کا 8 فیصد حصہ پاکستان پیدا کرتا ہے۔ خریف کی یہ فصل پاکستان کی معاشی لحاظ سے اہم فصلوں میں سے ایک ہے۔ پنجاب چاول کی پیداوار کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے خاص طور پر راوی اور چناب کا درمیانی علاقہ باسیتی چاول کی پیداوار کے لئے دنیا بھر میں قابل ذکر ہے۔ چاول کی سالانہ فصل مئی سے نومبر کے درمیان لگائی جاتی ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان تینوں صوبوں کی زمین چاول کی پیداوار کے لئے انتہائی زرخیز ہیں۔ یہاں کی اکثریت آبادی کی خوراک اور معاش کا انحصار چاول کی پیداوار پر ہے۔ پاکستان میں کاشت کی جانے والی مقبول ترین قسم باسیتی ہے چونکہ یہ قسم بہترین ذائقے اور معیاری وجہ سے پسندیدہ ہے جبکہ دوسری وجہ منفرد خوشبو اور اناج کی لمبائی ہے۔ صوبہ پنجاب باسیتی کی پیداوار کے لحاظ سے سرفہرست ہے۔ چاول کی سب سے بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے حافظ آباد چاولوں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں کاشت کی جانے والی زیادہ تر اقسام میں باسیتی 385، باسیتی 386 اور سپر کرنل ہیں۔ پاکستان میں کل چاول کی پیداوار کا 30 فیصد صوبہ سندھ سے آتا ہے جبکہ سندھ میں باسیتی قسم کا چاول کاشت نہیں ہوتا کیونکہ سندھ کے بیشتر علاقے باسیتی قسم کی پیداوار کے لئے غیر مناسب ہیں۔ پنجاب کا حصہ 52 فیصد اور

بلوچستان کا 8 فیصد حصہ کل پیداوار میں شامل ہے۔ پنجاب میں چاول کی بہترین پیداوار کے لئے اضلاع گو جرانولہ، سیالکوٹ، اوکاڑہ، حافظ آباد، شیخوپورہ، منڈی بہاوالدین اور جھنگ میں جبکہ کل پیداوار کا 70 فیصد ان اضلاع سے حاصل ہوتا ہے۔

پیداواری طریقے

بہترین آبپاشی والے علاقوں میں ہی چاول کی کاشت ممکن ہے۔ اس فصل کی کاشت کے لیے بہترین مٹی اور جدید آلات کا استعمال ضروری ہے تاکہ مطلوبہ پیداوار حاصل کی جاسکے۔ بنیادی طور پر مارکیٹ میں چاول کی تین اقسام قابل ذکر ہیں۔ Mild، بھوری رنگت اور کھردری سطح والی اقسام۔

چاول کی کاشت کے طریقے

بیج کا بھرا

درجہ حرارت کا انکرن کے مرحلے پہ بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ انکرن کے اگنے کے لئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30-25 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ درجہ حرارت اگر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جائے تو پودوں کے مرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اگر یہی درجہ حرارت ایک مخصوص حد سے کم ہو جائے یعنی 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے تو بیج کا ابھرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جس طرح پودوں کو زندہ رہنے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح آکسیجن بھی پودوں کی نشوونما کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ چاول کے پودوں کو نشوونما کے لئے پنی ایم 6-5 آکسیجن درکار ہوتی ہے اور اگر پودوں کو مناسب حد تک آکسیجن نہ فراہم کی جائے تو انکی جڑوں کی نشوونما انتہائی ناقص ہوتی ہے۔

کاشت کے لیے بیج کا انتخاب

کسی بھی فصل کی کاشت سے پہلے بہترین بیج کا انتخاب انتہائی ناگزیر اقدام ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ قسم کے بیج کا انتخاب کریں مطلوبہ فصل کے علاوہ کسی اور فصل یا جڑی بوٹی کے بیج سے پاک ہو۔ بیج کے انتخاب سے پہلے یقینی بنایا جائے کہ بیماریوں کے حملے سے پاک ہو اور بیج سائز میں پورا ہو۔ منتخب کردہ قسم میں اگنے کی شرح 85 فیصد یا اس سے زیادہ ہو۔ اعلیٰ کوالٹی مکمل بیماریوں سے پاک اور خاص بیج کا انتخاب تقریباً 10 فیصد سے زیادہ پیداوار میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ معیاری بیج کا انتخاب بہترین

انکرن، تیزی سے ابھرنے اور بھرپور نشوونما کو یقینی بنانے کا ضامن ہوتا ہے۔

چاول کی کاشت کے لیے پنی کی تیاری

چاول کی کاشت سے پہلے پنی کی تیاری کی جاتی ہے اور پھر اس پنی کو کھیت میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پنی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے اور نیچوں کو تیار شدہ زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر 45 سے 50 دن کے بعد جب چاول کے پودے 10-5 سینٹی میٹر (4-2 انچ) تک کے ہوتے ہیں تو انکو زمین سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور پودوں کو کھیت میں جو پہلے سے زیر آب ہوتا ہے اس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔

پاکستان میں عام طور پر چاول کی کاشت کے لیے روایتی طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی پنی کے ذریعے کاشت کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ بیج کے ذریعے براہ راست کاشت بھی ممکن ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں براہ راست کاشت کو ہی ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ پنی کے ذریعے کاشت کے لیے زیادہ مزدوری اور اخراجات درکار ہوتے ہیں اور پیداوار میں کمی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر چاول کو براہ راست طریقے سے کاشت کیا جائے تو نہ چاول کی کوئی متاثر ہوتی ہے بلکہ پیداوار میں بہتری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے جبکہ قلیل مدت میں زیادہ رقبہ کاشت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ دھان کی براہ راست کاشت کے لیے زمین کا ہموار ہونا ضروری ہے تاکہ پانی کے انتظام میں آسانی ہو، فصل کا گاؤ اور نشوونما بہتر ہو سکے۔

زمین کی تیاری

چاول کی کاشت کیلئے زمین کی تیاری کا روایتی طریقہ ہے کہ خشک زمین میں دو دفعہ ہل چلائیں۔ پھر آبپاشی کر دیں تاکہ کھیت میں جڑی بوٹیاں اور دوسرے پودے اگ آئیں اسکے بعد دوبارہ پانی میں ہل چلا دیں۔ کھڑے پانی میں ہل چلانے کو کد کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مقصد نئی اگنے والی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے۔ اسکے بعد سہاگہ مارنے سے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ پھر 4-5 دن کیلئے پانی کھیت میں کھڑا رہنے دیں اسکے بعد دوبارہ ہل چلانے اور سہاگہ کرنے کے بعد پنی کی کھیت میں لگا دیں۔

چاول کی کاشت کا دوسرا طریقہ جو بڑی تیزی سے پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے وہ ہے خشک طریقہ کاشتکاری۔ وہ علاقے جو پانی کی کمی کا شکار ہیں وہاں یہ طریقہ رائج ہے۔ اس طریقے میں زمین کو لیزر کے ساتھ ہموار کرنے کے بعد 8 کلونی ایکڑ کے حساب سے مونجی کا بیج بکھیرنے کے بعد ہل چلائیں یا درہے کی ہل کی گہرائی 4 انچ سے زیادہ نہ ہوتا کہ بیج زمین میں 4 انچ تک دھنس جائے اور ہل کے ساتھ ساتھ سہاگہ بھی مار دیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہل اور سہاگہ ایک ساتھ چلائے جائیں تاکہ جیسے ہی بیج زمین کی گہرائی میں دفن ہو تو ساتھ ہی

سہاگہ کی مدد سے زمین ہموار ہو جائے اسکے بعد کھیت میں پانی لگا دیں یا درہے کہ پانی زمین میں کھڑا نہ رہے بلکہ اتنا پانی لگائیں کہ کھیت صرف تر ہو۔ پنی کی منتقلی کے بعد محکمہ زراعت کی سفارش کردہ ادویات کا استعمال کریں تاکہ جڑی بوٹیوں کے انتقام کو یقینی بنایا جاسکے جبکہ خشک طریقہ کاشت کی صورت میں جب چاول کے پودے ایک فٹ کے ہو جائیں تو پانی لگا کر کھڑے پانی میں اسپرے کر دیں تاکہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاسکے۔ پھر فصل کے تیار ہونے تک کچھ وقت کے لیے پانی کھیت میں کھڑا رہنے دیں اور پھر اضافی پانی کھیت سے نکال کر کھیت خشک ہونے دیں تاکہ ہوا پودوں کو میسر آ سکے۔

کھادوں کا استعمال

چاول کے کھیت میں زنک 2 پیکنٹ فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں اور محکمہ زراعت کی سفارش کردہ مقدار کے مطابق کاشت کے 20-15 دن کے وقفے سے یوریا کھاد کھیت میں استعمال کریں۔

چاول کی بیماریاں

دھان کا جھماؤ

علامات

پاکستان بھر میں ریکارڈ ہونے والی اس بیماری کے آغاز میں ہلکے رنگ کے بیضوی دھبے جو سائے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں پتوں پر رونما ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دھبے گول بھی ہوتے ہیں اور بعد میں یہی دھبے یکجا ہو کر ایک بھورے رنگ کے لکیری دھبے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ متاثرہ پتے بعد ازاں زرد رنگ میں تبدیل ہو کر مر جھا جاتے ہیں۔ بیج کی ترتیب کا متاثر ہونا، بانجھ پن، سڑاؤ، سکڑنے اور انتہائی ناقص انکرن کا موجب بنتا ہے۔ اس بیماری کی باقیات مٹی اور پودوں کے ملبے میں زندہ رہنے کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں جبکہ زرعی آلات، ہوا اور پانی اس بیماری کی منتقلی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

کاشتکاروں کے لیے ضروری ہدایات

- جس زمین میں پہلے سے بیماری کی باقیات موجود نہ ہوں اس میں کاشت کو یقینی بنائیں یا پھر بیماری سے پاک مزاحمت والی اقسام کا کاشت کے لیے انتخاب کریں۔
- فصلوں کی گردش کے عمل کو یقینی بنائیں اور زرعی آلات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ فنگس پانی اور ہوا کے علاوہ زرعی آلات سے بھی پھیل سکتی ہے یہاں تک کہ پودوں کے زخمی ہونے کی صورت میں بھی۔
- بوائی سے پہلے بیج کا فنگسائیڈ سے علاج کریں یا گرم پانی جس کا درجہ حرارت 54

ڈگری سینٹی گریڈ ہو 10 منٹ کے لیے علاج کریں۔

- گزشتہ فصل کی باقیات کو جمع کر کے تھک کر دیں یا پھر مناسب وقت پہ پر فنگسٹاز کا اسپرے کریں۔

انتظامی اقدامات

- گزشتہ فصل کی باقیات اور متاثرہ پودوں کو الگ کر کے جلادیں یا تھک کر دیں۔
- بوائی کے لیے ہمیشہ مہتمم اقسام کو ترجیح دیں۔ کوشش کریں کہ فصل کی کاشت ابتدائی مراحل میں ممکن ہو۔

سیاہ سمٹ

- سیاہ یا کرنل سمٹ کہلائی جانے والی یہ بیماری چاول اگائے جانے والے بیشتر علاقوں میں رپورٹ کی جاتی ہے۔ متاثرہ پودوں میں بننے والے دانے سیاہ پاؤڈر سے بھرے ہوتے ہیں اور دانوں کو توڑ کر انکا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ متاثرہ پودوں میں دانے مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اگر بیماری کا حملہ شدید نہ ہو تو پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے مگر بیج اگ سکتے ہیں۔ یہ بیماری مٹی سے پیدا ہونے والے حیاتیات سے ہوتی ہے۔

کاشتکاروں کے لیے ضروری ہدایات

- کاشت کے لیے مزاحمت والی اقسام کا انتخاب کریں۔
- جس قدر ممکن ہو صحت مند بیج کاشت کے لیے استعمال کریں۔
- بوائی کے لیے ایسی اقسام استعمال کریں جن کو پکنے کے لیے قلیل مدت درکار ہو۔
- نائٹروجن کھاد کی شرح کم استعمال کریں۔
- متاثرہ پودوں کو کھیت میں سے نکالتے وقت خیال رہے کہ پودوں کو چھنچھوڑنے سے گریز کریں۔
- متاثرہ پودوں کے حصوں کو الگ کر کے جلادیں۔
- بوائی سے پہلے بیج کا کیمیکل سے علاج ممکن بنائیں۔

دھان کا بھسکا

- گردن کا سدا کہلائی جانے والی یہ بیماری اکثر چاول کی کاشت کے ممکنہ علاقوں میں رپورٹ کی جاتی ہے۔ ننھے ننھے دھبے پتوں، نوڈز، پینیکلز اور دانوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ آناز میں چھوٹے دھبے سفید، سرمئی یا پھر نیلی رنگت کے نقاط کی صورت میں پانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ بعد میں یہی دھبے بڑے ہو کر مرکز سے بھوری رنگت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھورے سے سیاہ رنگت والے یہ دھبے پھولوں کے علاوہ بھوسے یعنی (گلز) پر بھی بنتے ہیں۔ متاثرہ پودوں کے سر پھٹے ہوئے جبکہ رنگت سفید دیکھائی دیتی ہے۔ بیمار پودوں میں پینیکلز گر جاتے ہیں جبکہ اناج کی نشوونما اور کوالٹی دونوں متاثر ہوتے ہیں۔

کھیت میں موجود پرانے پودوں کی باقیات، متاثرہ بیج اور جنگلی جڑی بوٹیاں اس بیماری کے پھیلنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

انتظامی اقدامات

- گزشتہ فصل کی باقیات اور متاثرہ پودوں کو الگ کر کے جلادیں یا تھک کر دیں۔
- بوائی کے لیے ہمیشہ مہتمم اقسام کو ترجیح دیں۔ کوشش کریں کہ فصل کی کاشت ابتدائی مراحل میں ممکن ہو۔

- اس بیماری سے بچنے کے لیے صحت مند بیج کا استعمال کریں۔

- خیال رہے کہ پودے زیادہ گھنے نہ ہوں۔ کھیت میں سے جڑی بوٹیوں اور گھاس کے خاتمے کو یقینی بنائیں۔

- Organo-mercurials کا سپرے فصل پر کریں۔ اگر ممکن ہو تو بوائی سے نامیاتی فنگسائیڈز سے بیج کی ڈرینگ لازمی کریں۔

چاول کا جراثیمی جھلساؤ

چاول کی فصل میں بیشتر بیماریوں کا سبب درجہ حرارت اور نمی کا تناسب ہے۔ اسی طرح جب درجہ حرارت 36 ڈگری اور نمی کا تناسب 60 فیصد سے زیادہ ہو تو جراثیمی جھلساؤ بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے پتے جھلس جاتے ہیں اور پیداوار بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔

انتظامی طریقے / امداد / سدباب

اس بیماری کو انتہائی گرم اور خشک علاقے جہاں سپر باسٹمی قسم چاول کی کاشت کی جاتی ہے ان علاقوں میں اس بیماری کو قابو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے لیے چاول کی اگیتی کاشت سے گریز کریں اور غیر روایتی علاقوں کے لیے مہتمم اقسام کو ترجیح دیں۔

جوز کا بیکٹریل سداؤ

پتوں کی بیرونی پرت پہ پانی سے بھرے گھاؤ نمودار ہوتے ہیں جو بعد میں بیکٹریل نوڈز، پتوں اور جڑوں تک پھیلاؤ کر لیتے ہیں متاثرہ پودوں کے پتوں کے بلیڈز پتلی رنگت اختیار کر لیتے ہیں جبکہ بیماری کے آخری مراحل میں پودوں کے تنے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے متاثرہ حصوں سے ناخوشگوار بدبو پیدا ہوتی ہے جو خصوصاً اسی بیماری سے منسلک ہے اور دوسری بیماریوں سے اسکو علیحدہ کرتی ہے۔ جڑ کا سداؤ بیماری کی وجہ تقریباً 40-30 فیصد ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے۔

انتظامی طریقے

وہ علاقے جہاں درجہ حرارت اور نمی کا تناسب زیادہ ہو جبکہ مٹی میں نائٹروجن کی وسیع

ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ متاثرہ پینیکلز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں پتوں کی اوپری سطح پر موجود بیکٹیریا کی آبادی بعد میں پودوں کے بالائی حصوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ پھر پھولوں اور اناج کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر اناج بننے کے مرحلے پر یہ بیماری شدید ہو تو اناج کا گرنا اور سڑاؤ کی کیفیت عام ہے۔ متاثرہ دانوں کی رنگت ہلکی بھوری ہوتی ہے جبکہ متاثرہ اناج کے تلے والے حصے سبز رنگ کے ہی رہتے ہیں۔ اناج کی رنگت کا بھورا ہونا اور متاثرہ اناج سے نیچے والے حصوں کا سبز ہونا اس بیماری کی اہم علامات ہیں۔

یہ بیماری مختلف ذرائع سے پھیلتی ہے جیسا کہ متاثرہ بیجوں کو انکرن کے طور پر استعمال کرنا یا پھر بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہوں پہ منتقل کرنا۔ اسکے علاوہ اگر کھیت میں پودوں کی آبادی کی کثرت ہو تو بیماری کو فروغ ملتا ہے۔ اگر بوائی سے پہلے بیج کا سفارش کردہ ادویات سے علاج کیا جائے اور گزشتہ فصل کی باقیات کو صحیح طرح سے تلف کر دیا جائے تو بیماری کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اسکے علاوہ چاول کی فصل کی کاشت کا مناسب وقت بھی بیماری کو قابو کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

مقدار موجود ہو تو پاؤں کا سڑاؤ بیماری کو فروغ ملتا ہے۔ یہ بیماری ان علاقوں میں عام ہے جہاں نکاسی آب کے انتظامات ناقص ہوں اسکے علاوہ ہائبرڈ اقسام کی بانسبت لوکل اقسام بہت کم متاثر ہوتی ہیں۔ بیماری کے پھیلاؤ کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھیت میں نکاسی آب کے انتظامات بہتر بنائے جائیں اور تمام پودوں تک ہوائی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کاشت کے 25-20 دن بعد بین کاشتکاری کے عمل کو فروغ دیں۔ کھیت میں مٹی کی بہتری کیلئے چیم اور پوٹاش کا مناسب استعمال کریں۔

پینیکلز، بیکٹریل سڑاؤ

بیج اوٹنی سے مشترکہ طور پر پیدا ہونے والی بیکٹیریا کی انتہائی نقصان دہ بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری نہ صرف چاول کی پیداوار بلکہ کمرشل سطح پر بھی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے 70 فیصد تک ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری انتہائی گرم اور خشک موسم یعنی اگر درجہ حرارت 37-30 سینٹی گریڈ کے درمیان ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہو۔ اسکے علاوہ اگر موسم ابر آلود اور بارشوں کا سامنا ہو تو انفیکشن کو پھیلاؤ میں فروغ ملتا ہے۔ انفیکشن کے تیسرے دن ہی پینیکلز پر علامات ظاہر ہونا شروع

بقیہ: شجری سوراخوں میں ڈینگلی مچھروں کی نشوونما اور ان کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات

استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ ان سوراخوں کو مناسب طریقے سے کور کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ چونکہ ایڈز اسپیکٹائی (ڈینگلی مچھر) بنیادی طور پر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتے ہیں اس لیے ان سے حفاظت کے لیے ایسی ہی حکمت عملی شامل ہونی چاہیے۔ ویکٹر کنٹرول سرگرمیوں کو ان تمام علاقوں پر توجہ مرکوز کرانی چاہیے جہاں ویکٹر کا انسانوں سے رابطہ براہ راست دیکھا گیا ہو ان میں زیادہ تر کام کی جگہیں اور اسکول شامل ہیں اس لیے ویکٹر کنٹرول سرگرمیوں میں ہفتہ وار بنیادوں پر گھریلو پانی کے ذخیرہ کنٹینرز کو ڈھانپنا، نکالنا اور صاف کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پینے کے پانی کی کلورینیشن اور آؤٹ ڈور کنٹینرز میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب لارواکش اور کیڑے مار ادویات کا استعمال شامل ہو سکتا ہے جو خاص طور پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کی تجویز کردہ ہوں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

چونکہ ایڈز اسپیکٹائی مچھر بنیادی طور پر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتے ہیں اس لیے ذاتی حفاظتی اقدامات جیسے کہ ڈینگلی مچھر کے حملہ آور ہونے سے پہلے جلد کو کور کرنا اور پھر مچھر مارنے والے مادے لگانا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مچھروں کی افزائش کے مقامات، ویکٹر ز کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کو بڑھایا جانا چاہیے۔ اس میں لاروا اور بالغ مچھروں کے لیے ویکٹر کنٹرول حکمت عملی، ماحولیاتی انتظام صفائی اور کیمیائی کنٹرول کے اقدامات کے ساتھ ساتھ لوگوں اور گھرانوں کی حفاظت کے لیے حکمت عملی شامل ہے۔ اور سماجی سطح پر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ جگہ جگہ گندہ ڈالیں اور اپنی احتیاط کے لیے رات کو سونے کے لیے جالیوں کا استعمال کریں تاکہ ہر ممکن حد تک مچھروں کے منفی اثرات سے بچا جاسکے۔ ان اقدامات میں ویکٹر کنٹرول کرنے اور گھریلو کھڑے پانی کو صاف کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پینے کے پانی کی کلورینیشن اور آؤٹ ڈور کنٹینرز میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب لارواکش اور کیڑے مار ادویات کا

ابو الخیر نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے نبی کریمؐ سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا لکھا دیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ فرمایا کہ یوں کہا کرو۔ اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا پس مجھے بخش دے کیونکہ مغفرت تیری طرف سے ہے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

احادیث

سویا بین کی کاشت: پاکستان کی زرعی ترقی کی کلید

تحسین جاوید، ڈاکٹر وسیم اکرم، ڈاکٹر محمد طیب، محمد عثمان رفیق..... شعبہ حشرات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

زمین اور اس کی تیاری

سویا بین معتدل یا ملکی تیزابی صلاحیت رکھنے والی زمین پر بہت اچھی پیداوار دیتی ہے لیکن نسبتاً کمزور یا ریتیلی زمین میں کھاد کے استعمال سے اس کی کاشت کامیابی سے ہو سکتی ہے۔ سیم زدہ، کلر اٹھی اور نشیبی زمین اس کی کاشت کے لیے غیر موزوں ہے۔ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کو راوٹی کے بعد مناسب وتر آنے پر تین سے چار دفعہ ہل چلا کر اور دو ہر اسہاگہ دے کر اچھی طرح بھر کر لیا جائیے۔ اچھی طرح ہل چلانے اور دو ہر اسہاگہ دینے سے زمین نرم ہو جاتی ہے اور دیر تک وتر قائم رکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔

وقت کاشت

زیادہ بارش والے علاقوں میں جب گرمی کم ہو جائے اور ہوا میں نمی کی مقدار بڑھ جائے یعنی جولائی کے شروع میں مون سون کی پہلی بارش کے بعد سویا بین کی کاشت کر دینی چاہیے۔ زیادہ گرم علاقوں میں جون اور جولائی میں کاشت کی گئی فصل پر زرد موزیک کی بیماری کے حملے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں جب گرمی کم ہو جائے تو اگست کے شروع میں اس کی کاشت کر دینی چاہیے۔ موسم خزاں میں پودا چار سے پانچ دن بعد زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد کاشت کی گئی فصل نومبر یا دسمبر کے مہینے میں کم درجہ حرارت کی وجہ سے دیر سے پکتی ہے اور پودوں کی نشوونما بھی کم ہو جاتی ہے جس سے پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گندم کی بوائی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ فیصل آباد میں کیے گئے تجربات کے مطابق اگست کے مہینے میں کاشت کی گئی فصل سے 15 سے 20 من فی ایکڑ تک پیداوار حاصل کی گئی۔

طریقہ کاشت

سویا بین کا بہتر اگاد حاصل کرنے کے لیے اس کی بوائی سہاس ہونے والی سنگل رو کاٹن ڈرل سے کرنی چاہیے۔ دوپہر کے وقت زیادہ گرمی اور گرم ہوا چلنے سے وتر خشک ہو جاتا ہے اور اگاد کم ہوتا ہے۔ سویا بین کی کاشت قطاروں میں کرنی چاہیے اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ ڈیڑھ فٹ ہونا چاہیے اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 3 سے 5 انچ ہونا چاہیے۔ اس طرح پودوں کی صحیح تعداد حاصل ہوتی ہے جو اچھی پیداوار کی ضمانت ہے۔

شرح بیج

موسم خزاں میں چونکہ درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جس سے وتر جلد خشک ہو جاتا اور

سویا بین ایک بڑی کارآمد اور منافع بخش فصل ہے۔ اس کی کاشت دنیا کے ترقی

یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، چین، جاپان اور برازیل میں بہت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ سویا بین پھلی دار اجناس مثلاً لوبیا، ماش، مونگ، برسیم اور گوارا کے خاندان کی ایک اہم رکن ہے اور زمین میں پائے جانے والے جراثیم (بیکٹیریا) اس کے پودوں کی جڑوں پر کاٹھیں (Nodules) بناتے ہیں۔ ان کاٹھوں میں پائے جانے والے جراثیم ہوائی نائٹروجن کو اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ جس سے سویا بین کی فصل بذات خود اس کے بعد آنے والی فصل کے لیے بھی ایک چھوٹی کھاد فیکٹری کے طور پر کام آتی ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ اپنے بعد آنے والی فصل کے لیے بھی ایک بوری یوریا کی ایکڑ کے برابر نائٹروجن زمین میں چھوڑتی ہے۔ یہ ایک واحد روغن دار فصل ہے جو زمین کی زرخیزی کو بحال رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسے واپس لوٹاتی ہے۔ سویا بین میں 18 فیصد اجزاء تیل اور وافر مقدار میں حیاتین پائے جاتے ہیں۔ اس کا تیل کھانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔

اس کے علاوہ سویا بین انسانی خوراک میں بطور سو یا دودھ، سو یا مکھن ڈیری کی ان گنت اشیاء میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کا آنا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سویا بین کا تعلق پھلی دار اجناس کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اس کی کاشت سے زمین کی زرخیزی بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ موسم خزاں میں سویا بین کی فصل تقریباً 3 ماہ میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے بڑی آسانی سے فصلوں کے ہیر پھیر میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً گندم، سویا بین، گندم بہار یہ سورج مکھی، سویا بین، گندم، بہار یہ کئی سویا بین گندم فصلوں کے مذکورہ ہیر پھیر کے تحت پاکستان میں سویا بین کی کاشت کے امکانات بہت روشن ہیں۔ لہذا خوردنی تیل میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے سویا بین کی کاشت زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کرنی چاہیے۔ کاشتکاروں کی راہنمائی کے لیے اس کی کاشت متعلق ضروری گزارشات درج ذیل ہیں:

آب و ہوا

یہ فصل درجہ حرارت، روشنی، نمی اور دیگر موسمی تبدیلیوں سے بہت حد تک متاثر ہوتی ہے۔ سویا بین کی کامیاب فصل کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ تاہم پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔

بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی بلکہ بعض حالات میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے اور زمیندار کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ یہی حال سویا بین کا ہے۔ اس فصل میں ڈیلا، کھیل، اٹسٹ، چلائی، مدھانا گھاس کے علاوہ دیگر جڑی بوٹیاں بھی بہتات سے اگتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے درج ذیل سفارشات تحریر کی جاتی ہیں:

گوڈی

پہلی گوڈی پہلے پانی کے بعد کمولے سے کرنی چاہیے اور دوسری گوڈی دوسرے پانی کے بعد بل کے ذریعے بھی کی جاسکتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی نہایت ضروری ہے۔ ان کو ہر قیمت پر تلف کریں خواہ ہاتھ سے نکالیں یہی اصل نقصان پہنچاتی ہیں۔

کیمیائی تلفی

اٹسٹ کا مسئلہ شدید ہو تو راؤنی سے پہلے پنڈی میتھالین 330 سی سی بحساب 25.1 فی ایکڑ سپرے کریں۔ اگر ڈیلے کی کثرت ہو تو ڈیوال گولڈ بحساب 800 سی سی فی ایکڑ کے حساب سے فوراً بعد تر خشک ہونے سے پہلے سپرے کریں۔ سپرے کے لیے 120 لیٹر پانی فی ایکڑ استعمال کریں۔ نیز یہ دونوں ادویات ملا کر سپرے نہ کریں۔ کیڑے مکوڑے اور بیماریاں موسم خزاں میں سویا بین کیچر مندرجہ ذیل کیڑے مکوڑے اور بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔

میلہ اور سفید مکھی

یہ دونوں کیڑے پتوں کا رس چوس کر پودوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں سفید مکھی زرد موزیک کی بیماری کو ایک پودے سے دوسرے پودے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کے تدارک کے لیے میٹائٹاکس بحساب 500 سی سی فی ایکڑ سپرے کرنا چاہیے۔ کیڑے مکوڑوں کے کنٹرول کے سلسلہ میں اپنے علاقہ کے محکمہ زراعت (توسیع) کے عملہ سے رہنمائی حاصل کریں۔

بائیو فریٹلائزریا جراثیمی ٹیکہ

آدھ کلو گرام بیج کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پودوں کی جڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہوا کی نائٹروجن کو جذب کر کے پودے کے قابل استعمال بناتے ہیں۔ 1/2 کلو گرام ایک ایکڑ کے لیے کافی ہے۔ NARC میں Soil Biology کے سیکشن میں بتا ہے اور اس کی قیمت صرف 100 روپے فی پیکٹ ہے۔

برداشت

خریف کی فصل 90 سے 120 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ برداشت کے وقت درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے بیج کی نشوونما صحیح ہوتی ہے۔ سویا بین کے بیج کو مناسب درجہ

گاونے کم ہوتا ہے۔ اس لیے اس موسم میں 40 سے 45 کلو گرام بیج فی ایکڑ ڈالنا چاہیے۔ بیج کی قسم وقت روئیدگی وقت کاشت، موسمی حالات اور زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح بیج میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ بوائی سے قبل بیج کی مدت روئیدگی اچھی طرح پرکھ لینی چاہیے جو 90 سے 100 فیصد ہو چاہیے۔

زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بیج کو جراثیمی ٹیکہ لگا کر کاشت کرنا چاہیے تاکہ ہوائی نائٹروجن جذب کرنے والے جڑوں (بیکٹیریا) پودوں کی جڑوں پر گانٹھیں (Nodules) بنا کر اپنا عمل موثر طور پر کر سکیں۔ اس طرح جذب شدہ نائٹروجن سے سویا بین کی فصل بذات خود اور اس کے بعد آنے والی فصل بھی مستفید ہوتی ہے۔ روئیدگی کے فوراً بعد حملہ کرنے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بیج بحساب 2 گرام فی کلو گرام بعلیٹ لگا کر بوائی کرنی چاہیے۔

کھاد کا استعمال

سویا بین کے لیے کھاد کی مقدار کا دار و مدار زمین کی قسم، زمین کی زرخیزی اور سابقہ فصل پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نائٹروجن اور فاسفورس میں تناسب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ موسم خزاں میں نائٹروجن اور فاسفورس کا تناسب 25:50 ہونا چاہیے۔ جو ایک بوری پور یا اور پانچ بوری سنگل سپر فاسفیٹ سے حاصل ہوتا ہے جو کہ بوائی کے وقت زمین میں ڈالنا چاہیے۔ سویا بین کے لیے نائٹروجن کھاد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیوں کہ زمین کے اندر ایسے جڑوں (بیکٹیریا) موجود ہوتے ہیں جو خلاء میں موجود نائٹروجن کو زمین میں مکس (Mix) کرتے ہیں اور اپنی ضروری پوری کر لیتی ہے۔ اپنی ضروری پوری کرنے کے بعد علاوہ ازیں بعد میں آنے والی فصل کے لیے بھی ایک بوری یوریا فی ایکڑ کے برابر نائٹروجن زمین میں چھوڑتی ہے۔

آپاشی

اگر گرمی کی شدت سے پودے مر جھاتے نظر آئیں تو پانی لگائیں۔ اس طرح ایک تو فصل کی بڑھوتری زیادہ نہ ہوگی دوسرے جڑی بوٹیوں کا اکاؤدیر سے ہوگا۔ اگر پہلا پانی پھول آنے پر دیر سے لگائیں تو نتائج بہتر حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ پھول آنے پر پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا پہلے 3 سے 4 ہفتے بعد لگائیں۔ دوسرا پانی پھلیاں بننے پر اور تیسرا پانی اگر ضرورت ہو تو دانے بننے پر لگائیں۔ اگر زمین میں دیر تک وتر قائم رہے تو تیسرے پانی کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی

کھیت سے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے کوئی بھی فصل جڑی بوٹیوں کی تلفی کے

سے 50 ارب ڈالر کمائے ہیں۔ یہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس رقم سے پاکستان میں کاشتکاروں کو مفت کھاد دی جائے تو دس سال تک بھی یہ پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ سال 2021 میں پاکستان نے 1.09 بلین ڈالر (جو کہ آج کل تین کھرب چودہ ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں) کی سویا بین درآمد کی، اور اس طرح دنیا میں سویا بین 13 واں بڑا درآمد کنندہ بن گیا۔ اسی سال سویا بین پاکستان میں سب سے زیادہ درآمد کی جانے والی 11 ویں مصنوعات تھی۔ پاکستان بنیادی طور پر برازیل (698 M \$)، امریکہ (347MS)، کینیڈا (47.3M\$)، بھلیز (1.04، \$) اور یوکرین (552k \$) سے سویا بین درآمد کرتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

حرارت پر سٹور کرنا چاہیے۔ تاکہ اس کی روئیدگی متاثر نہ ہو۔ فصل پکنے پر پتے زرد ہو کر جھڑ جاتے ہیں اور پھلیوں کا رنگ خاکستری بھورا ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر دانوں میں نمی تقریباً 15 فیصد تک ہو جاتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو فصل کی برداشت میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فصل کو کاٹ کر چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی میں دھوپ میں خشک کرنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کی گہائی ٹریکٹر یا تھریشر سے کرنی چاہیے۔

بیج کا ذخیرہ

عام حالات میں پرانے بیج کی قوت روئیدگی کافی حد تک ضائع ہو جاتی ہے اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ذخیرہ کرتے وقت بیج میں نمی 10 فیصد سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور اسے نسبتاً ٹھنڈی جگہ پر ذخیرہ کرنا چاہیے امریکہ نے اس سال صرف سویا بین کی ایکسپورٹ

کماد کی پیداواری ٹیکنالوجی

بقیہ:

سفید مکھی

کماد کی فصل میں جنگلی پالک، جنگلی چولانی، جنگلی ہالوں، دمی سٹی، بہلی، مورک، مینا، ہزار دانی، باتھو، بلی بوٹی، کرنڈ اور کارا بارز زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ فصل میں جڑی بوٹیوں کے اگاؤ تک کے تدارک کے لئے ایٹرا زین 80 تا 100 گرام فی ایکڑ وتر میں سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے جبکہ اگاؤ سے پہلے وتر حالت میں ایس مینٹولا کلور بحساب 1000 ملی لیٹر یا میمزوٹرائی اون + اسٹیرازین بحساب 1000 گرام فی ایکڑ سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

کماد کی فصل کی کٹائی

بہار یہ فصل اگیتی اقسام نومبر میں، درمیانی اقسام دسمبر میں اور لیٹ اقسام مارچ میں کٹائی کے لئے تیار ہو جاتی ہیں جبکہ ستمبر کاشت فصل اگیتی اقسام اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں کٹائی کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔

پیداوار

ہماری ان تمام سفارشات پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں با آسانی 900 من فی ایکڑ بہار یہ فصل جبکہ 1200 من فی ایکڑ ستمبر کاشت، فصل کی پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے مزید برآں ستمبر کاشت فصل کو خوراک کی ضروریات کا دانشمندی کے ساتھ استعمال اور گرنے سے بچاؤ کے تحت 2000 من فی ایکڑ تک پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس کیڑے کے بچے پہلی بگ سے ملتے جلتے ہیں اس کا حملہ فضا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے بڑھ جاتا ہے متاثرہ پتے نہ صرف کالے ہو جاتے ہیں بلکہ ان پر پھپھوندی لگ جاتی ہے اس کے لئے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام ایچ ایف ایف 240 اور 248 کاشت کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

گھوڑا مکھی

اس مکھی سے متاثرہ پودوں کے نچلی سطح پر کالے رنگ کی پھپھوندی لگ جاتی ہے اور پودوں کے پتوں میں خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے اور پیداوار کم آتی ہے اس سے بچاؤ کے لئے طفیلی کیڑوں کا استعمال نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

کماد کی گلابی گدھڑی

اس قسم میں کماد کے پتے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیڑا پتے اور تنے کا رس چوستا ہے اور اپنے جسم پر سفید رنگ کے سفوف کے ساتھ ایک ہزار تک انڈے دیتا ہے جو بعد ازاں بچوں کی شکل میں تبدیل ہو کر فصل کو مزید نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اس سے بچاؤ کے لئے بیماریوں اور کیڑوں سے پاک بیج کا انتخاب کیا جائے۔

کماد کی فصل کی جڑی بوٹیاں اور ان کا انکداد

الحديث

حضرت عطاء بن یسار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مالدار شخص کے لئے صدقہ لینا یا اس کا استعمال جائز نہیں لیکن پانچ افراد کو اجازت ہے۔ (۱) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (۲) زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ (۳) تالوان کی رقم دینے والا۔ (۴) یا ایسا شخص جو صدقہ کے مال کو خریدے۔ (۵) وہ شخص جس کے پڑوسی کو کسی نے صدقہ کا مال دیا اور اس نے اپنے مالدار پڑوسی کو ہدیہ کر دیا ہو۔ (ابوداؤد)

کلراٹھی زمینوں میں نامیاتی مادے کی اہمیت

ڈاکٹر حماد رضا احمد**، ڈاکٹر محمد سرفراز*، اسد عباس*، ڈاکٹر حسن بشیر*

انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز*، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، تحقیقاتی ادارہ، شورزدہ الارضیات، پنڈی بھٹیاں*

زمین کی زرخیزی کا انحصار زیادہ تر نامیاتی مادے پر ہوتا ہے۔ نامیاتی مادہ زمین کا بڑا ضروری عنصر ہے بلکہ اس کو زمین کی روح کہنا بالکل درست ہوگا۔ کیوں کہ یہ نہ صرف پانی اور خوراک کے اجزاء زمین کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ فصلوں کیلئے موزوں اور مناسب حالات پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین میں پانی اور ہوا کا گزر آسان ہو جاتا ہے۔

چکنی اور ریتیلی زمینوں میں اس کے استعمال سے زمین کی ساخت اور طبعی خامیاں بہتر ہو کر زمین میں زیادہ پانی جذب کرنے اور دیر تک وتر قائم رکھنے کی باعث بنتی ہے۔ اگر زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار تسلی بخش ہو تو پھر زمین میں موجود خوراک کی اجزاء پودوں کو آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین میں پانی جانے والے کیمیائی کھادوں کے فائدے بڑھ جاتے ہیں۔ نامیاتی مادے کی وجہ سے زمین میں موجود فائدے مند جراثیموں کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے۔

کلراٹھی زمینوں کیلئے اس کی افادیت اور بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہ اگر زمین میں اس کی وافر مقدار موجود ہو تو زمین تھور سے کافی حد تک محفوظ رہتی ہے۔ نامیاتی مادے کے زمین میں گھسنے سے زمین کی وجہ سے تیزابی مادے (تیزاب) پیدا ہوتے ہیں۔ یہ زمین کو کلر اور تھور سے بچانے میں کافی معاون ہیں اور زمین میں موجود مضر نمکیات کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری اکثر زمینوں میں نامیاتی مادوں کی کمی پائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گرمیوں کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور دوسری وجہ مثینی کاشت ہے جس کی وجہ سے زمینی نامیاتی مادے کا بیشتر حصہ جل کر ضائع ہو جاتا ہے۔

زمیندار مویشی کم رکھتے ہیں اور گوہر کی کھاد کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے اس لیے زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی کو پورا کرنے کیلئے کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر سبز فصلوں کو زمین میں دبایا جائے تو اس کے گھسنے سے زمین کا عمل آہستہ آہستہ زمین کے اندر مکمل ہوتا رہتا ہے جس کے کمیائی عمل کی وجہ سے زمین میں کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو کلراٹھی زمینوں کی اصلاح کیلئے بہت ہی مفید ہے۔ عام طور پر سبز کھاد کیلئے پہلی دار فصلوں کا استعمال کیا جاتا

ہے کیونکہ ان کے پودوں کی جڑوں میں نائٹروجن جمع کرنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ پہلی دار فصلیں زمین میں آسانی سے گل سڑ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے نامیاتی مادے کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ موسم خریف میں ڈھانچہ، جنتر، گوارہ، لہسن اور موسم زریع میں برسم، بوسرن کو بطور سبز کھاد استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن زیادہ تر ترجیح ڈھانچہ اور جنتر کو دی جاتی ہے کیونکہ یہ کلراٹھی زمینوں کے واسطے بڑی فائدہ مند ہے۔ ڈھانچے کی جڑیں سخت زمین میں چلی جاتی ہیں جس سے ہوا اور پانی کا گزر آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری زمینوں کی جھاڑ کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ نامیاتی مادے کی کمی ہے اور اگر سبز کھادوں کا استعمال باقاعدگی سے کیا جائے تو اس کمی کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

ڈھانچے یا جنتر کی فصل کو پھل آنے سے ذرا پہلے سبز کھاد کے طور پر زمین میں بل چلا کر دبایا جائے تو اس وجہ سے ہزاروں کلو گرام نامیاتی مادہ حاصل ہونے کے علاوہ اچھی مقدار میں نائٹروجن بھی ملتی ہے۔ اس لیے زمیندار بھائیوں سے عرض ہے کہ ان روایتی فصلوں کی بجائے سبز کھاد والی سبزیاں آگاہ کر دیا کریں تو زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے اور زمین کی زرخیزی بھی بحال رہے گی۔

اس کے علاوہ ہمارے زمیندار بھائیوں کو چاہیے کہ گندم، چاول اور گنا کے باقیات کو آگ نہ لگایا کریں بلکہ ان کو ڈسک بل چلا کر اچھی طرح زمین میں دبایا کریں۔ اگر روٹا ویٹر میسر ہو تو کمیائی بات ہے کیونکہ یہ باقیات کو باریک کاٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے باقیات بڑی آسانی سے زمین میں گل سڑ جاتے ہیں اور زمین میں موجود نامیاتی مادے کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

کاشتکاروں کو فصلوں کے باقیات اچھی طرح بل چلا کر زمین میں دبادینے چاہیے تاکہ یگل سڑ کر زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار میں اضافہ کریں۔ اگر گھسنے سے زمین کا عمل سست ہو تو 20-25 کلو گرام فی ایکڑ پور یا استعمال کرنے سے گھسنے سے زمین کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے۔

الحديث

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب حسن بن علیؓ نے صدقہ کی ایک کھجور منہ میں رکھ لی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اس کو دور کرو اور تھوک دو پھر فرمایا: تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (متفق علیہ)

موسم گرما کے چار اجات، ان کی بیماریاں اور تدارک

شہلار یاض*، ہما عباس*، ساجد علیم خان*، رمیشہ امجد علی**، عمران الحق*1، حنا صفر***، 3، اسماء صفر***

ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ پیٹھالوجی،*، ڈیپارٹمنٹ آف اینٹومولوجی، زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد**، ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ پیٹھالوجی، کالج آف ایگریکلچر، یونیورسٹی آف سرگودھا***

چارے سے نواز اسے۔ مثال کے طور پر، چارے میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو سردیوں میں سرد موسم کو برداشت کرنے میں مدد کرتی ہے، لیکن گرمیوں میں زیادہ درجہ حرارت کے مضر اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ان چاروں کو چارے کی پیداواری عمر اور مختلف موسموں کے مطابق تقسیم کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ذیل میں درج ہے۔

سدا بہار چارہ (بارہ ماسی)

یہ چارہ ہے جو صرف ایک بار لگایا جاتا ہے اور سال بھر یا کئی سالوں تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ چارے لو سرن، موٹ گراس، بوڈان گھاس وغیرہ ہیں۔ سردیوں کے چارے

یہ چارے سردیوں کے شروع میں اگائے جاتے ہیں۔ وہ سردی کے موسم میں چارے کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں اور گرمیوں میں پھٹکی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چارے برسم، جینی، رائی گھاس وغیرہ ہیں۔ گرمیوں کے موسم کے چارے

یہ چارے موسم گرما کے شروع میں اگائے جاتے ہیں یہ موسم سرما کے آغاز تک چارے کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ چارے مکئی، جوار، باجر وغیرہ ہیں۔ چارے کی فصل میں نقصانات

پاکستان میں چارے کی طلب اور سرد مختلف قسم کے تحفظات سے متاثر ہوتی ہے جن میں ملک میں مویشیوں کی تعداد، آب و ہوا کی صورتحال، زرعی طریقوں اور معاشی رجحانات اور فصلی بیماریاں شامل ہیں۔ چارے کی طلب اور رسد اور اچھے بیج کی کمی کے درمیان فرق کو پورا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مکئی میں بیماریوں کی وجہ سے 12 فی صد، جینی میں 21 فی صد اور جوار میں 9 فی صد نقصان دیکھا گیا ہے۔ ذیل میں موسم گرما کے چارہ جات کی نمایاں بیماریوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

مکئی کی بیماریاں

مکئی کا جھلاؤ، بیماری کا سبب اور موافق حالات

بیماری پھیلانے والے عناصر میں پائیتھیم، فیومیریم، ایگریمونیم، اسکیر وٹیم،

پاکستان کے پاس متنوع اقتصادی بنیاد ہے۔ ملکی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ زراعت کا شعبہ 24 فیصد جی ڈی پی اور 37.4 فیصد روزگار میں حصہ ڈالتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں لائیو اسٹاک کا حصہ 60.85 فیصد ہے، جبکہ یہ جی ڈی پی میں 14.6 فیصد کا حصہ ڈالتا ہے۔ اگنامک سروے آف پاکستان (2023-24) کے مطابق پاکستان میں 80 لاکھ سے زیادہ دیہی خاندان اپنی آمدن کا 40-35 فی صد لائیو اسٹاک کی صنعت سے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں مویشیوں کی آبادی 201.9 ملین جانوروں (بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، گدھے اونٹ، گھوڑے اور بچر) پر مشتمل ہے۔ جانوروں کی آبادی میں اضافے کی وجہ سے، مویشیوں کے کاروبار کو آب پائیدار پیداوار کے لیے مزید خوراک کی ضرورت ہے۔ دودھ، گوشت، مکھن، اور دیگر مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ آبادی کے مسلسل دباؤ اور معیار زندگی میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں جانوروں کی اکثریت اپنی مطلوبہ خوراک چارے کی فصلوں سے حاصل کرتی ہے۔ ترقی یافتہ علاقوں میں جانوروں کو مختلف اقسام کے اناج دیے جاتے ہیں، لیکن اناج کھانا عام نہیں ہے کیونکہ جانوروں کی غذائی ضروریات کا بیشتر حصہ چارے سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پچانوے فی صد مویشی اپنی غذائی ضروریات چارے سے پوری کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مویشیوں کی محدود پیداوار کی بنیادی وجہ چارے کی عدم دستیابی ہے۔ حکومت گوشت، دودھ اور دودھ کی ضمنی مصنوعات کی درآمد پر سالانہ غیر ملکی کرنسی (2,911 ملین روپے) خرچ کرتی ہے۔ پاکستان میں مویشیوں کی ضروریات اور سال بھر سبز چارے کی مسلسل فراہمی کے لیے ماضی میں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ ملک کی کل کاشت شدہ زمین کا صرف 8.95 فی صد چارے کی فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں 2.38 ملین ہیکٹر مختلف چارے کی فصلوں کے لیے وقف ہے اور سالانہ چارے کی پیداوار 45 ملین ٹن فی ہیکٹر ہے (پاکستان کے زرعی اعداد و شمار، 2023-2024)۔ 1976-77 میں زمینی رقبہ 2.77 ملین ہیکٹر سے کم ہو کر 2.38 ملین ہیکٹر رہ جانے کے باعث، چارے کی پیداوار ملک میں موجودہ مویشیوں کی آبادی کی نصف ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے۔

چارے کی فصلوں کی اقسام

اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں میں جانوروں کی ضروریات کے مطابق طرح طرح کے

کھیتی کی کوئی بھی ایسی صورت جو کہ مٹی کو مکئی کی باقیات کے ساتھ رابطے میں رکھی ہے اور ان کے گلنے کو فروغ دیتی ہے، موافق ہے۔ مینکو زیب (0.25%) کو بطور کیمیکل استعمال کریں۔

صدرن لیف بلائٹ

بیماری کا سبب اور موافق حالات: اس بیماری کا سبب باپٹولیرس میڈس نامی پھپھوندی ہے۔ پھپھوندی کی نشوونما کے لیے بہترین درجہ حرارت فارن ہائٹ 68-90 ہے اور زیادہ نمی درکار ہے۔ یہ موسم سرما میں مک کے ملبے میں بیضہ یا مائیکسلیم کے طور پر گزارتی ہے۔ بیماری کا پھیلاؤ ہوا اور پانی کے چھینٹوں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ انفیکشن اور نوآبادیات کے بعد گھاؤ سے سپورولیشن ثانوی پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔

علامات

پتوں کے اوپر 1 سے 4 سم کے تیرے کی شکل کے گہرے سرمئی رنگ کے بھورے کناروں والے دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ بیماری کی علامات پتوں تک محدود ہو سکتی ہیں یا میانون، ڈھنٹلوں، بھوسیوں، کانوں اور چھلی پر ظاہر ہوتی ہیں۔ دھبے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں جو کہ مل کر بڑے مردہ حصے بنا دیتے ہیں۔ پیچنگی پر پتوں کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر جل جاتا ہے۔

تدارک

بیماری کے خلاف قوت مدافعت والے پودے لگائیں۔ مینکو زیب کا دس دن کے وقفے سے تین بار استعمال بیماری کے خلاف مؤثر ہے۔ دو پھپھوندی کش زہر جیسے پروپیونازول یا کلورو تھالوٹل کا پودوں پر استعمال بیماری کی شدت کو کم کرنے میں موافق ہے۔

چارکول ٹاک روٹ/ چارکول سٹراؤ (سراٹھ)

بیماری کا سبب اور موافق حالات

اس بیماری کا سبب مٹی میں رہائش پزیر پھپھوندی میکروفوفیا فزولینا ہے۔ بیماری کی نشوونما تاج بننے کے مرحلے کے دوران زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی نشوونما کے لئے گرم اور خشک موسم موافق ہیں۔

علامات

بیماری کا حملہ سب سے پہلے نئے پودوں کی جڑوں پر ہوتا ہے۔ جڑوں پر چھوٹے چھوٹے دھبے نمودار ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھورے اور پھر کالے ہو جاتے ہیں۔ فصل کی پیچنگی کے ساتھ ساتھ بیماری ڈٹھل کے نچلے حصے میں پھیل جاتی ہے۔ ڈٹھل

ریز وکٹونیا، ڈپلوڈیا، وغیرہ شامل ہیں۔ پھپھوندی کی نشوونما کے لیے مٹی کا درجہ حرارت 50 فارن ہائٹ موافق ہے۔ ٹھنڈی اور گیلی مٹی کے اثر کے علاوہ، بیج کے عوامل، عمر، تکمیل یا پیچنگی کی ڈگری، میکینیکل نقصان، اور جینیاتی مزاحمت بیج کے سڑنے اور بیج کے جھلنے کی شدت کو متاثر کرتی ہے۔

علامات

بیماری سے متاثرہ بیج نرم اور بھورے ہوتے اور سائز میں نارمل بیج سے بڑے ہوتے ہیں۔ مکئی کے جھلاؤ میں علامات دو حالتوں میں نمودار ہوتی ہیں پہلی حالت میں علامات پودے کے بیج سے نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں جبکہ دوسری حالت میں متاثرہ پودے کی جڑیں گنا شروع ہو جاتی ہیں اور پورے سوکھ جاتے ہیں۔

تدارک

متاثرہ فصل کے ٹکڑوں کو جلادیں یا انہیں زمیں میں گہرا نل چلا کر بادیں کیپٹن، تھیرم، میٹالیکسائل/میٹینو زان کے ساتھ بیج کا علاج کریں۔ فصلوں کا ادل بدل ایک مؤثر طریقہ ہے جو فصل کی باقیات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

نادرن لیف بلائٹ

بیماری کا سبب اور موافق حالات: متاثرہ پودوں سے جو پھپھوندی تجربہ گاہ میں علیحدہ کی گئی اس کا نام ایکرو بائیکم ہے۔ پھپھوندی کی نشوونما کے لیے موافق درجہ حرارت سینٹی گریڈ 18-27 ہے۔

یہ سردیوں میں مائی سلیم اور کوئیڈیا کی صورت میں فصلوں کے ملبے میں اپنی ریاست بناتی ہے۔

علامات

بیماری کی پہلی علامت میں چھوٹے پانی میں بھیگے دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ جو کہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دھبے بڑے ہو کر بیضوی یا ساگار شکل کے، سرمئی، سبز رنگ کے اور لمبائی میں تقریباً 5 سے 10 سم لمبے جبکہ چوڑائی میں 1 سم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دھبے بڑے ہوتے ہیں یا ان میں سے چند ایک ساتھ مل کر بڑے مختلف دھبے بناتے ہیں بھر کے ساتھ ساتھ دھبوں کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔

تدارک

مکئی کی مندرجہ اقام بیماری کے خلاف مزاحمت رکھتی ہیں، این اے سی 6002، این اے سی 6003، اور این اے سی 6004۔

فصلوں کا ادل بدل باقیات کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے اس کے علاوہ بل اور

کے اندرونی حصے کٹے ہوئے اور سرخی مائل سیاہ ہوتے ہیں۔

تدارک

بیماری کو برداشت کرنے والی اقسام مثلاً ایس این-65، ایس ڈبلیو ایس-8029، ڈیوا اور زینٹ اگائیں۔ بیماری کا حل ٹیلنگ کے بعد مٹی کی نمی کو برقرار رکھنے سے بھی ممکن ہے۔ کیمیائی تدارک کے لیے پھپھوندی کش زہر کپٹن اور کوٹوزین موافق ہیں۔

پتوں کا جراثیمی جھساؤ

بیماری کا سبب اور موافق حالات

یہ بیماری ایک جڑوں سے سوڈوموناس ایوبنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دو ہفتے تک مٹی میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مردہ پودے میں دو ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ علامات: پتوں کی بالائی سطح پر پانی میں بھیکے سیدھے دھبے نمودار ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھورے یا سفید ہو جاتے ہیں۔ دھبوں کے کنارے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ٹیلنگ کے بعد یہ دھبے مزید نہیں بڑھتے اور نہ ہی نئے دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ مکئی کی حساس اقسام میں فصل کی پختگی کے وقت پتے گر جاتے ہیں۔

جوار کی بیماریاں

منہ سوزی یا رتہ روگ، بیماری کا سبب اور موافق حالات

یہ بیماری ایک پھپھوندی کو لیٹوٹرا نیکم گرامینیکو لم کی وجہ سے ہوتی ہے مسلسل بارشیں بیماری کے لیے موافق ہیں۔ بیماری کے لیے موزوں درجہ حرارت سینٹی گریڈ 20-30 ہے۔

علامات

یہ بیماری پتے کی دونوں سطحوں پر چھوٹے سرخ رنگ کے دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ رتہ روگ کی ظاہری علامات میں سرخ یا مٹیالے رنگ کے ابھرے ہوئے دھبوں کا نمایاں ہوتا ہے۔ ان دھبوں کا مرکز سفید رنگ کا ہوتا ہے جن کے کنارے سرخ یا نارنجی مائل ہوتے ہیں متاثرہ تناور میان سے کاٹنے پر سرخ رنگ ظاہر کرتا ہے۔

تدارک

بیجوں کو کپٹن یا تھیرم کے ساتھ 4 فی کلو گرام کے حساب سے ٹریٹ کریں۔ فصل پر مینیکوزیب 2 کلو گرام فی ہیکٹر کے ساتھ سپرے کریں۔

جوار کی کاگیاری، بیماری کا سبب اور موافق حالات

یہ بیماری ایک پھپھوندی سپیلیوٹھیکا سورگی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی نشوونما کے

لیے اوسط درجہ حرارت سینٹی گریڈ 20-30 بہت سازگار ہے۔

علامات

بیماری کی علامات کان میں دانہ بننے کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری کی ظاہری علامات دانوں کی جگہ پوری دمی یا دمی کے کسی خاص حصے میں کنگیاری کے سوراخی کا بننا ہے۔ سوراخی گولی سفید سے بھورے رنگ کی، بیضوی شکل کی ہوتی ہے جو کہ ایک سخت سفید کریم رنگ کی جلد سے ڈھکی ہوتی ہے۔

جوار کی لمبی کاگیاری

بیماری کا سبب

یہ بیماری ایک پھپھوندی ٹولپوپسوریم ایبرگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

علامات

یہ بیماری عموماً دمی کے کچھ حصے تک ہی محدود ہوتی ہے۔ بیماری کی ظاہری علامات میں لمبے، بیلاکاری، نسبتاً موٹے بھوری جھلی کے ساتھ قدرے مزے ہوئے سوراخی شامل ہیں۔ یہ سوراخی ٹوٹ کر سیاہ رنگ کے بیضوں کو خارج کرتے ہیں۔

سرخی کنگیاری

بیماری کا سبب

یہ بیماری ایک پھپھوندی سفیلوٹھیکا ریلیاناک کی وجہ سے ہوتی ہے۔

علامات

بیماری کی ظاہری علامات میں دمی کے تمام دانوں کا سوراخی میں تبدیل ہو جانا ہے۔ یہ سوراخی بھورے سفید رنگ کی جھلی سے ڈھکا ہوتا ہے جو کہ سر/دمی کے نکلنے سے پہلے پھٹ جاتی ہے اور کچی رنگ کے بیضی خارج کرتی ہے۔

تمام طرح کی کاگیاری کا تدارک

ایگر وٹن بی کے ساتھ خشک بیجوں کی ڈرینگ سب سے آسان اور عام عمل ہے۔ پاؤڈر کی شکل میں سلفر (113-56 گرام فی کلو گرام بیج) اور تھیرام (2-1 گرام فی کلو گرام بیج) کا استعمال کافی مؤثر ہے۔ جوار کی ایسی اقسام جن کے پاس بیماری کے خلاف قوت مزاحمت ہو استعمال کریں۔ جیسا کہ میلو ہیگاری، فیٹریا اور شانٹوگ۔ بیجوں کو پھپھوندی سے پاک کرنے کے لیے انہیں 31:5 فارملین میں دو گھنٹے بھگونے کے بعد خشک کریں اور کارپر سلیفٹ کے محلول میں 15 منٹ تک بھگو کر دوبارہ خشک کر لیں۔

(باقی صفحہ 41 پر)

جدید دور میں صنعتی نقطہ نظر سے بھنگ کی کاشت اور اہمیت

ثقلین مراد، ڈاکٹر زبیر اسلم، ڈاکٹر صدام حسین..... شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

صنعتی بھنگ (*Cannabis sativa L.*) ہزاروں سالوں سے کاشت کی جا رہی ہے اور اسے کپڑے، کاغذ، خوراک اور تعمیراتی مواد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم، اس کاشت پر قانونی پابندیاں عائد کی گئیں کیونکہ اس کا تعلق نشہ آور بھنگ سے جوڑا گیا۔ آج، جب مختلف صنعتوں میں پائیدار متبادل کی طلب بڑھ رہی ہے، صنعتی بھنگ کی کاشت عالمی سطح پر دوبارہ مقبول ہو رہی ہے۔

یہ مضمون صنعتی بھنگ کی اہمیت کو ماحولیاتی، معاشی اور صنعتی چیلنجوں کے تناظر میں بیان کرتا ہے، اور سائنسی حوالہ جات سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔

1۔ صنعتی بھنگ کی کاشت کے ماحولیاتی فوائد

1.1۔ کاربن ذخیرہ کاری اور ماحولیاتی تبدیلیوں میں کمی

بھنگ ایک تیزی سے بڑھنے والی فصل ہے جو بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) جذب کرتی ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ صنعتی بھنگ ایک ہیکٹر زمین میں 8 سے 15 ٹن CO_2 جذب کر سکتی ہے، جو کہ زیادہ تر تجارتی فصلوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ (ٹانگ اور ساتھی، 2023)۔

1.2۔ مٹی کی صحت میں بہتری

بھنگ ایک قدرتی طور پر مٹی کی صحت میں بہتری لانے والی فصل ہے جو مٹی بھاری دھاتیں اور آلودگی دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی جڑیں مٹی کے سٹراکچر کو روکتی ہیں، ہوا کی آمد و رفت کو بہتر بناتی ہیں اور کیمیائی کھادوں کی ضرورت کو کم کرتی ہیں۔ (ایٹنجلو اور ساتھی، 2021)۔

1.3۔ پانی اور کیڑے مارا دیات کی کم ضرورت

کپاس کے مقابلے میں، صنعتی بھنگ 50 فیصد کم پانی استعمال کرتی ہے اور اس پر قدرتی طور پر کیڑے کم حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیڑے مارا دیات کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے (اماڈوچی اور ساتھی، 2020)۔

2۔ صنعتی بھنگ کی معاشی اہمیت

2.1۔ مختلف صنعتوں میں استعمال

صنعتی بھنگ ایک کثیر المقاصد فصل ہے جو کئی صنعتوں میں استعمال کی جاتی ہے۔

کپڑا سازی

بھنگ سے بنی ریشے دار کپڑے زیادہ پائیدار اور ماحول دوست ہوتے ہیں۔

تعمیرات

بھنگ سے تیار کردہ "ہیمپ کریٹ" چونے اور بھنگ کے امتزاج سے بنتا ہے، جو سیمنٹ کا پائیدار متبادل ہے۔

کاغذ سازی

بھنگ سے بنایا گیا کاغذ لکڑی کے گودے کے مقابلے میں زیادہ پائیدار اور کم کیمیکل استعمال کرتا ہے۔

حیاتیاتی ایندھن

بھنگ سے بائیو ایٹھانول اور بائیو ڈیزل تیار کیا جاسکتا ہے۔

حیاتیاتی پلاسٹک

بھنگ سے تیار کردہ پلاسٹک بائیو ڈیگرڈیبل ہوتا ہے، جو پلاسٹک آلودگی کے مسئلہ کا ایک حل ہے۔

2.2۔ کسانوں کے لیے اقتصادی مواقع

بھنگ کی کاشت کی قانونی حیثیت بڑھنے سے کسانوں کو زیادہ پیداوار اور منافع بخش فصل کے مواقع مل رہے ہیں۔

عالمی صنعتی بھنگ کی مارکیٹ 2027 تک 18.6 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے (گریینڈ ویوریس رچ، 2023)۔

2.3۔ روزگار کے مواقع اور دیہی ترقی

بھنگ پر مبنی صنعتوں میں زراعت، پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے دیہی معیشتوں کو فروغ ملے گا۔

3۔ صنعتی بھنگ اور پائیدار زراعت

3.1۔ فصلوں کی گردش اور مٹی کی بحالی

بھنگ کو فصلوں کی گردش (Crop Rotation) میں شامل کرنے سے مٹی کی صحت میں بہتری آتی ہے، کیڑوں اور جڑی بوٹیوں کی روک تھام میں مدد ملتی ہے (کیمبل اور ساتھی، 2022)۔

3.2۔ جنگلات کی کٹائی کا متبادل

فوائد سے مکمل استفادہ حاصل کرنے کے لیے حکومتوں، محققین اور صنعت سے وابستہ افراد کو پالیسی میں اصلاحات، مارکیٹ کی ترقی اور تکنیکی جدت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے

بھنگ ہر ایکڑ میں درختوں کے مقابلے میں چار گنا زیادہ فائبر پیدا کر سکتی ہے اور چند ماہ میں آگ سکتی ہے، جس سے یہ کاغذ اور لکڑی کی صنعت کے لیے ایک پائیدار متبادل ثابت ہو سکتی ہے (سمال اور مارکس، 2020)۔

4۔ چیلنجز اور پالیسی کے معاملات

4.1۔ قانونی رکاوٹیں اور غلط فہمیاں

صنعتی بھنگ کے ماحولیاتی اور معاشی فوائد کے باوجود کئی ممالک میں یہ ابھی تک قانونی مسائل کا شکار ہے، کیونکہ اسے نشہ آور بھنگ سے جوڑا جاتا ہے۔ پالیسیوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صنعتی بھنگ اور نشہ آور بھنگ کے درمیان واضح فرق کیا جاسکے (جانسن، 2021)۔

4.2۔ تحقیق اور ترقی کی ضرورت

بھنگ کی پیداوار اور منافع کو بڑھانے کے لیے مزید تحقیق درکار ہے تاکہ اس کی جینیات، کاشتکاری تکنیکوں اور پروسیڈنگ ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جاسکے۔

4.3۔ مارکیٹ اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی

بہت سے علاقوں میں صنعتی بھنگ کی پروسیڈنگ کی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کے لیے پروسیڈنگ یونٹس اور سپلائی چین میں سرمایہ کاری ضروری ہے۔

نتیجہ

صنعتی بھنگ ایک ماحول دوست اور اقتصادی طور پر فائدہ مند فصل ہے، جس کا استعمال مختلف صنعتوں میں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی کاربن جذب کرنے کی صلاحیت مٹی کی صفائی، پائیدار مینوفیکچرنگ، اور دیہی ترقی میں کردار ادا کرے۔ سبز معیشت میں ایک اہم عنصر بناتا ہے۔ تاہم، ان

- اماڈوچی، ایس۔، اور ساتھی۔ (2020)۔ "بھنگ: مستقبل کی ایک پائیدار فائبر فصل۔" انڈسٹریل کراپس اینڈ پروڈکٹس، 112393.150۔
- ایملو، وی۔، اور ساتھی۔ (2021)۔ "بھنگ میں بھاری دھاتوں کا جمع ہونا اور اس کا مٹی کی بجالی میں استعمال۔" انوائرنمنٹل سائنس اینڈ پلوشن ریسرچ، 10361-10352(5)28۔
- کیسبل، ایم۔، ایم۔، اور ساتھی۔ (2022)۔ "صنعتی بھنگ کی فصل کی گردش کے فوائد۔" ایگریکلچرل سائنس، 13(4)، 250-265۔
- گرینڈ ویو ریسرچ۔ (2023)۔ "صنعتی بھنگ کی مارکیٹ کا سائز اور رجحانات۔" (آن لائن دستیاب)۔ www.grandviewresearch.com۔
- جانسن، آر۔ (2021)۔ "بھنگ کی قانونی حیثیت اور اس کی معاشی صلاحیت۔" جرنل آف ایگریکلچرل پالیسی، 18(3)، 176-192۔
- سمال، ای۔، اور مارکس، ڈی۔ (2020)۔ "بھنگ: قدیم فائبر جو جدید ضروریات کے لیے موزوں ہے۔" بوٹینیکل جرنل آف دی لینن سوسائٹی، 192(1)، 14-27۔
- تانگ، ایکس۔، اور ساتھی۔ (2023)۔ "صنعتی بھنگ کی کاربن ذخیرہ کاری کی صلاحیت۔" کلائمیٹ چیلنج ریسرچ، 28(6)، 104-118۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

موسم گرما کے چار جات، ان کی بیماریاں اور تدارک

بقیہ:

ان کو اپنے کھیتوں میں لگانا چاہیے اور آج کل خاص کر گرم خشک موسم میں ان کی بڑھوتری تیز ہوتی ہے اور یہ بار بار پھوٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے تمام سال ان کی کٹائیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان کی موڈھی فصل بھی اچھی طرح کامیاب رہتی ہے اور ایک دفعہ بوئی ہوئی فصل کئی سال تک چارے کی بہم رسانی کا مستقل ذریعہ بنی رہتی ہے چونکہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور ان کی کاشت آسان ہے لہذا تھوڑے خرچ سے یہ چارے کی بہت زیادہ پیداوار دیتے ہیں اور ملک پاکستان میں چارے کی کمی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔

اور کھادوں اور پانی میں اضافی اخراجات کرنے پڑتے ہیں لیکن دوامی چاروں کو سال میں صرف ایک بار لگانے سے یہ کئی سال تک چارہ مہیا کرتے ہیں۔

دوامی چارے موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی کا باعث بنتے ہیں کیونکہ یہ کم مقدار میں گیس کا اخراج کرتے ہیں۔ عام چاروں کو نائٹروجن اور دوسرے غذائی اجزاء کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لہذا عام چارے زیادہ گیس کے اخراج میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔

قارئین کرام اس سارے مضمون کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو دوامی اقسام (Perennial fodders) جو کہ سالہا سال تک زندہ رہنے والے چارے ہیں

کیمومائل کی کاشت اور فوائد

نوید احمد، ڈاکٹر افتخار احمد..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

موسم اور آب ہوا

پنجاب کے میدانی علاقوں اور خطہ پوٹھوہار میں کیمومائل کی دونوں اقسام کی کاشت موسم سرما کی فصل کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ اکتوبر نومبر میں بیج کی بوائی کی جاسکتی ہے جبکہ گلگت بلتستان، چترال، کشمیر اور بلوچستان کے سرد علاقوں میں کیمومائل کی کاشت موسم گرما کی فصل کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ پنجاب کے موسمی حالات میں 20 دسمبر تا 20 جنوری درجہ حرارت کی کمی اور دھند کی وجہ سے بڑھوتری کا عمل سست ہے تاہم اگست تا جنوری یا فروری کے دوران جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو پودوں کی بڑھوتری میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور مارچ میں پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیمومائل کی کاشت زیادہ تر سرد علاقوں میں موسم گرما کی فصل کے طور پر کی جاتی ہے تاہم مصر میں اس کی کاشت موسم سرما کی فصل کے طور پر کی جاتی ہے۔

زمین کی تیاری

کیمومائل کی کاشت کے لیے زیادہ زرخیز زمین کی ضرورت نہیں ہوتی تاہم بوائی سے پہلے ہل چلا کر زمین کو نرم کرنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں کھیت کا جوی بوٹیوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کیمومائل کی کاشت کے لیے زیادہ زرخیز زمین کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایسی زمین جس کی پی ایچ آٹھ سے زیادہ ہو اور سوڈیم کی مقدار بھی زیادہ ہو وہاں کیمومائل کی کاشت کی جاسکتی ہے۔ کچھ ممالک میں اسے غیر زمینوں میں کاشت کیا جاتا ہے تاکہ ان کی زرخیزی کو بہتر کیا جاسکے اور انہیں کاشت کے لیے بحال کیا جاسکے۔

کھادیں

زمین کی تیاری کے وقت 25 کلو گرام ڈے اے پی کھاد فی ایکڑ میں ڈالیں اور فلاورنگ سے پہلے پوناش کافولیئر چھڑکاؤ کریں۔ اس سے نائٹروجن، فاسفورس اور پوناش کی ضروریات پوری کی جاسکتی ہیں۔ زیادہ مقدار میں نائٹروجن پر مشتمل کھادوں کا استعمال پھولوں میں موجود تیل کی مقدار میں کمی کا باعث بنتا ہے اور تیل میں پائے جانے والے ایک کیمیائی مرکب کیمازولین کی مقدار میں کمی بھی کرتا ہے۔

طریقہ کاشت

کیمومائل کی افزائش بذریعہ بیج کی جاتی ہے۔ 50 تا 100 گرام بیجوں سے ایک ایکڑ میں کاشت کے لیے کیمومائل کی پیوری تیاری کی جاسکتی ہے۔ بیج بہت زیادہ باریک

کیمومائل، سورج مکھی خاندان تعلق رکھنے والا ایک قدیم ادویاتی پودا ہے جسے طبی فوائد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کیمومائل کی کاشت زیادہ تر یورپ کے ممالک میں کی جاتی ہے۔ بلکہ یہ یورپ کے کئی علاقوں میں خود رو ہے۔ بلغاریہ کی کاژنلک ویلی جہاں ڈیماسینا گلاب وسیع پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے، کیمومائل کی کاشت بھی کی جاتی ہے اور اس کے پھولوں سے تیل کشید کیا جاتا ہے اور ہائیڈروسول تیار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مصر میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ یورپ میں اس کی کاشت موسم گرما کی فصل کے طور پر کی جاتی ہے جبکہ مصر میں اس کی کاشت موسم سرما کی فصل کے طور پر کی جاتی ہے۔ اس کی دو اقسام کو تیل کشید کرنے اور ہربل چائے کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ ان دو میں سے ایک جرمن کیمومائل اور دوسری قسم رومن کیمومائل ہے۔ جرمن کیمومائل کا تیل گہرے نیلے رنگ کا اور رومن کیمومائل کے تیل کی رنگت براؤن ہوتی ہے یا ہلکی نیلی رنگت۔ کیمومائل کے تیل کی نیلی رنگ اس میں پائے جانے والی ایک مرکب کیمازولین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جرمن کیمومائل کا نباتاتی نام میٹرکیلیر یا کیموملا (*Matricaria chamomilla*) ہے اور رومن کیمومائل کا نباتاتی نام اینتھیمس نوبلس (*Anthemis nobilis*) ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائی جانے والی ایک نوع اینتھیمس کوٹلا (*Anthemis cotula*) ہے جس کے خشک پھولوں کو گل بابونہ کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اینتھیمس کوٹلا کا عام نام سنڈنگ کیمومائل ہے۔ اس کے پھولوں میں پائی جانے والی بواچی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا رومن کیمومائل بھی قدرتی طور پر پاکستان میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ سنڈنگ کیمومائل کے خواص رومن اور جرمن کیمومائل سے مختلف ہیں۔ جرمن کیمومائل کا تیل کیمازولین پر مشتمل ہوتا ہے جو سوزش اور درد کی شدت کو کم کرتا ہے۔ کیمومائل کا قبوہ کوک (Colic) کے درد کو کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔

ڈیل ڈول

کیمومائل کے پودے کا قد 40 تا 70 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ شاخوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر شاخ مزید باریک شاخوں پر مشتمل ہوتی ہے جن پر پھول لگتے ہیں۔ پتے باریک ہوتے ہیں۔ پھول کی پتیاں سفید رنگ کی جبکہ درمیانی ڈسک ابھری ہوئی اور پہلے رنگ کی ہوتی ہے۔ پھول کا قطر ڈیڑھ تا اڑھائی سینٹی میٹر ہوتا ہے۔

ہونے سے پہلے پھولوں کی تڑائی ضروری ہے۔ کچھ ممالک میں کیمومائل کے پھولوں کی تڑائی مشینی طریقے سے کی جاتی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کاشت فصل کے لیے سیشل پنچے دستیاب ہیں جنہیں پھولوں کی تڑائی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کیمومائل کے پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لہذا ایک ایک پھول کو توڑنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ دھوپ کی بجائے پھولوں کو سایہ دار جگہ پر خشک کرنا چاہیے لیکن ایسی جگہ سے ہوا کا گزر ضروری ہے۔ خشک کرنے کے بعد سوکھ گرام پھولوں سے 20 تا 25 کلو پھول حاصل ہوتے ہیں۔ خشک اور تازہ دونوں طرح کے پھولوں سے تیل کا حصول ممکن ہے۔

استعمالات

کیمومائل کے پھولوں کو کاسمیٹک اور فوڈ انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے خشک پھولوں سے ہربل ٹی تیار کی جاتی ہے جس کے کئی فوائد ہیں۔ کیمومائل کی چائے ذہنی تناؤ، بے خوابی اور بے چینی کو دور کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پھولوں سے تیل کشید کیا جاتا ہے جو کئی فوائد کا حامل ہے۔ کیمومائل کا تیل قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔

تیل کشید کرنے کا طریقہ

کیمومائل کے پھولوں میں صفر اعشاریہ چار تا ایک فیصد تک تیل پایا جاتا ہے جو کہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ تیل کشید کرنے کے لیے سٹیم ڈسٹیلیشن اور سالوینٹ ایکسٹریکشن کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر سٹیم کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تیل کافی گاڑھا ہوتا ہے لہذا کنڈینسر کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ کنڈینسر کو ہکا گرم کرنے سے چپکا ہوا تیل بازیافت کیا جاسکتا ہے۔ کیمومائل کے تیل میں پیرافن کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے لہذا تیل کشید کرنے کے لیے قدرے زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہوتے ہیں لہذا پہلے پینری تیار کی جاتی ہے جسے بعد ازاں کھیت میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پینری کھیت میں منتقلی کے لیے چار تا چھ ہفتے میں تیار ہو جاتی ہے۔ قطاروں کا فاصلہ ڈیڑھ فٹ اور پودے سے پودے کا فاصلہ ایک فٹ رکھا جاسکتا ہے۔ زمین کی تیاری کے بعد کھیت میں کھیلیاں بنائیں اور آبپاشی کریں اور کھڑے پانی میں کھیلیوں پر پینری منتقل کریں۔ پینری کی کھیت میں منتقلی کے بعد کیمومائل کی فصل کو کٹائی تک چار سے چھ دفعہ آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ضرر رساں کیڑے اور بیماریاں

کیمومائل کے پودوں اور ضرر رساں کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ نہیں دیکھا گیا۔ شاید اس کے پتوں اور پھولوں میں تیز بو پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کیڑے اور بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ موسم بہار میں دوسری فصلوں پر جب تیلے کا شدت سے حملہ ہوتا ہے، کیمومائل کے پودے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔

گروتھ ہارمونز کا استعمال

کیمومائل کے پھولوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے گروتھ ہارمونز کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پچاس پی پی ایم کے حساب سے جبریلک ایسڈ کا استعمال انتہائی موثر ہے۔ جبریلک ایسڈ کے پیرے سے پودوں کی بڑھوتری میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ بڑھوتری کی صورت میں فصل کو گرنے سے بچانے کے لیے ٹریل (Cycocel) سی کا پیرے کیا جاسکتا ہے۔ ٹریل سی کے پیرے سے تیل کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹریل سی پودے کی شاخوں کو مضبوط کرتا ہے اور گرنے سے بچاتا ہے۔

پھولوں کی تڑائی

مارچ اپریل میں کیمومائل کے پھول تڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیجوں کے

موشیوں کی منافع بخش پیداوار کے لیے پاکستان میں چار اجات کی کاشت

بقیہ:

عرصے تک بیضہ دانیال پیدا کرتے ہیں اور مردہ حصوں کی تشکیل دیتے ہیں۔ ان مردہ حصوں میں بڑے پیمانے پر بیضے ہوتے ہیں۔ یہ بیضے زمین کے اندر پانچ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔

تدارک

بیضوں کو دفن کرنے کے لیے گہرا ہل چلائیں۔ متاثر پودوں کو تلف کر دیں۔ فصلوں کا ادل بدل بیضوں کو کم کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے۔ ایسی اقسام جن کے پاس بیماری کے خلاف قوت مزاحمت ہو کا استعمال کریں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

باجرے کی بیماریاں

گرین ایر/عمومی مادہ

بیماری کا سبب اور موافق حالات

اس بیماری کا سبب سکلیروپور اگریمنیکولانا میچھوندی ہے۔ میچھوندی کی نشوونما کے لیے زیادہ گرمی اور ٹھنڈا موسم (25-15 سیلسیوس) درکار ہوتا ہے۔

علامات

باجرے کا شاخ ایک سبز رنگ کے پتوں والے ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو کہ اس بیماری کی ایک مخصوص علامت ہے۔ متاثرہ پتے اور پھول مرطوب حالات میں کافی

کلونجی کی کاشت اور اس کی ادویاتی اہمیت

کریم یار عباسی، ڈاکٹر خرم ضیاف، ڈاکٹر عرفان اشرف، ڈاکٹر بلال سعید خاں..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کھسلیوں پر 4 سے 4 انچ فاصلہ پر چوکے لگائے جائیں اور اس میں بیج ڈال کر مٹی کی ہلکی سی تہہ سے بیج کو ڈھانپ دیا جائے۔

ہموار زمین پر بھی اس کی کاشت کی جاسکتی ہے۔ راؤنی کے بعد دو دفعہ بل اور پھر سہاگہ پھیر کر کھیت میں بیج کا یکساں چھٹہ دیں اور بارہیر و سے بیج زمین میں ملادیں اس پر ہلکا سہاگہ پھیر دیں 10-12 دن بعد گاؤ مکمل ہو جائے گا۔

آپاشی

کھسلیوں پر بیج بونے کے بعد فوراً پانی دیں تاکہ نمی بیج تک پہنچ جائے۔ پانی اتنا ہو کہ کھسلیاں ڈوبنے نہ پائیں۔ اگر کھسلیاں ڈوب گئیں تو بیج کا اگاؤ صحیح نہ ہوگا۔ پانی اتنا کم بھی نہ دیں کہ اس کی نمی بیجوں تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرا پانی ایک ہفتے بعد دیں تاکہ بیج آگ سکیں اس کے بعد یہ دو ہفتے بعد پانی دیں۔

ہموار سطح پر بوائی کی صورت میں فصل اُگنے کے بعد پندرہ بیس روز تک پانی نہ دیں تاکہ پودے اچھی طرح جوڑ پکڑ سکیں۔ اس کے بعد دو ہفتے کے وقفہ سے پانی دیتے رہیں۔

چھدرائی کرنا

جب پودے تین چار انچ تک ہو جائیں تو ان کی چھدرائی کر دینی چاہیے کیونکہ زیادہ گھنے پودوں پر پھل کم لگتا ہے۔

گوڈی کرنا

دو تین دفعہ گوڈی کر دینی چاہیے تاکہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں۔

برداشت

آخر مارچ سے وسط اپریل تک فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور کاٹ لی جاتی ہے۔ جب فصل سوکھ جائے تو کوٹ کر دانے الگ کر دیئے جاتے ہیں اور صفائی کر کے بور یوں میں بھر لیے جاتے ہیں۔

پیداوار فی ایکڑ

کلونجی کی پیداوار فی ایکڑ 320 کلوگرام تک حاصل کی جاسکتی ہے۔

فائدے

- حدیث میں آیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے۔
- اس کے بیج معدے کی درنگی کے لیے بہت مفید ہیں۔

کلونجی (علمی نام Nigella Saliva) ایک سالانہ پودا ہے جس کی کاشت جنوب مغربی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور بلقان میں ہوتی ہے۔ یہ پودا دنیا میں مصالکے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

توصیف ترمیم

کلونجی اصل میں خاندان Ranunculaceae اور جنس Nigella سے تعلق رکھنے والا ایک پودا ہے۔ اس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر سے 30 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

کلونجی کی کاشت

کلونجی ایک قیمتی اور منافع بخش فصل ہے اس کا پودا تقریباً 2 فٹ بلند ہوتا ہے اس کے بیج ہانسمہ دار اور معدہ کے فعل کو درست رکھتے ہیں لہذا اچار اور کئی قسم کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔

زمین اور آب ہوا

زرخیز اور ہلکی زرخیز جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہو اس کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ کمر اور سیم دالی زمینوں میں یہ پودا نہیں ہوتا۔

زمین کی تیاری

زمین میں تین چار مرتبہ بل چلائیں اور ہر دفعہ سہاگہ پھیریں تاکہ زمین اچھی طرح باریک ہو جائے۔ اگر زمین کی سطح ایک جیسی نہ ہو تو اس کو ہموار کر لینا چاہیے تاکہ یکساں مقدار میں سارے کھیت کو پانی دیا جاسکے۔ اگر زمین میں مٹی کے ڈھیلے ہوں تو پانی دے کر اور سہاگہ پھیر کر ان کو توڑ دینا چاہیے۔ آٹھ دس ٹریلیاں فی ایکڑ گوہر کی کھاد جو اچھی طرح گلی سڑی ہو زمین تیار کرتے وقت کھیت میں ڈال دی جائیں تو فصل کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

وقت بوائی

20 ستمبر سے 20 اکتوبر کا عرصہ اس کی بوائی کے لیے نہایت موزوں ہے۔

شرح بیج

3 کلو بیج فی ایکڑ جو تندرست ہو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ تندرست بیج سے ہی صحت مند

پودے پیدا ہوں گے۔

طریقہ کاشت

اچھی طرح ہموار زمین میں ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر کھسلیاں بنائی جائیں اور ان

- کاتیل دن میں دوبار پئیں۔

- ## بلند فشار خون

- گرم چائے یا کافی میں نصف چائے کا چمچہ کلوخنی کا تیل ڈال کر دن میں دوبار استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ روزانہ دودھ جو لہسن بھی استعمال کریں۔

- استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ روزانہ دود جو لہسن بھی استعمال کریں۔

خون کی کمی

پودینہ کے پتوں کی ایک شاخ کو پانی میں ابال کر ایک پیالی جوش بنائیں۔ نصف چائے کا ہچچکہ کھجی کا تیل ملا کر دن میں دو بار صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل پئیں یہ نسخہ دن تک استعمال کریں۔

چائے کا چمچہ کلو بخجی کا تیل ملا کر دن میں دو بار صبح نہا منہ اور رات سونے سے قبل پیئیں یہ نسخہ دن تک استعمال کریں۔

سائنسی حقیقت

بے خوابی

آرام دہ نیند کے لیے رات کھانے کے بعد نصف چائے کا چمچہ کلو نجی تیل ڈال کر صبح ناشتہ سے قبل اور رات سونے سے پیشتر پیئیں۔

نصف چائے کا چمچہ کونجی کا تیل میں دو چمچہ شہد نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں دو بار پیئیں۔ چاول سے پرہیز کریں۔

دل کا دورہ

دس گرام کلونچی کا تیل، تیس گرام زمیقن کا تیل اور تیس گرام مہندی سفوف کو اچھی طرح ملا کر اسے زبان کے اوپر دن میں دو بار رکھیں۔

پولیو اور لقوہ

دے سکتا ہے۔

کلوئچی میں موجود وٹامنز، امینو ایسڈز، پروٹینز، فیٹی ایسڈ، بکلیشیم و دیگر اجزاء اس کی

فادیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ کلونجی تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

کلوخچی کے بیج پیس کر انہیں شہد کی معمولی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنا زیادہ اشد کو بہتر بناتا ہے۔ اگر اس کے مکچر کو پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات پائی جاسکتی ہے۔ اس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں لانے میں بھی مدد ملتی ہے۔

در دهم

<<<<<<>>>>>>

الحديث: ☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

پھلوں کے پرکشش اجزاء کی مدد سے ڈروسوفلا سوزوکی کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حکمت عملی

عائشہ اسلم، ڈاکٹر محمد احسن خاں، تحسین جاوید، ڈاکٹر محمد طیب۔۔ شعبہ حشرات، جامعہ زریعہ فیصل آباد

پیوپا (15-3 دن)

تعارف

سندھیاں زمین پتوں میں چھپ کر غیر غذائی مرحلے یعنی پیوپا میں تبدیل ہو جاتی ہیں بالغ مکھی کا دورانیہ (9-2 ہفتے) پیوپا سے یہ مزید نمو پا کر بالغ مکھی میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ تین بالغ مکھیاں پھر سے انڈے دیتی ہیں۔ اور یہ سائیکل جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے کنٹرول کے مناسب حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کیا جائے کل دورانیہ

گر میوں میں: 10-8 دن، سال میں 15-10 نسلیں

پھلوں کے پرکشش اجزاء کا تعارف

پھلوں میں کئی اہم کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ شوگر (گلوکوز، فروکٹوز)، تیزابیت (مالیک ایسڈ، سیٹرک ایسڈ)، وٹامنز (وٹامن C)، وٹامن A اور خوشبو پیدا کرنے والے مرکبات شامل ہیں۔ سانس کی بنیاد پر یہ اجزاء ڈروسوفلا سوزوکی کو پھلوں کی طرف مائل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈروسوفلا سوزوکی کو میٹھے اور خوشبودار پھلوں میں زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے۔ پھلوں کے پرکشش اجزاء میں میتھائل یوجینول، ایسٹر، اور دیگر کیمیائی مرکبات شامل ہیں۔ یہ اجزاء ڈروسوفلا سوزوکی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں ٹپس میں پھنسانے کا کام کرتے ہیں۔ لیور (میٹ) کی کشش کو بڑھانے کے لیے میتھائل یوجینول ٹپس میں مختلف غذائی اجزاء کا اضافہ کرنے سے اسکی تاثیر میں مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔

لیور کے طور پر استعمال ہونے والے اجزاء

میتھائل یوجینول + لیموں کارس

میتھائل یوجینول + آم کارس

میتھائل یوجینول + وینیل

میتھائل یوجینول + اورنج (مالٹے) کارس

پرکشش اجزاء کے استعمال کے طریقے

ڈروسوفلا سوزوکی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پرکشش اجزاء جیسے خوشبو پیدا کرنے والے مرکبات یا فیرومونز کو ٹریپ یا پھندے بنانے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

لاچ والے ٹریپس

میتھائل یوجینول کو لاچ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ٹریپس لگائے جاتے ہیں۔

ڈروسوفلا سوزوکی جسے عام طور پر سپائڈ ونگ ڈروسوفلا کہا جاتا ہے، ایک خطرناک کیڑا ہے جو پھلوں اور سبزیوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کیڑا خاص طور پر نرم پھلوں جیسے اسٹرابیری، چیری، اور بلیویری وغیرہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پھلوں کے پرکشش اجزاء کا استعمال اس کیڑے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر اور ماحول دوست طریقہ ہے۔

ڈروسوفلا سوزوکی ایک چھوٹا سا کیڑا (مکھی) ہے جو اپنی خوراک کے ذرائع کے لیے پھلوں پر انحصار کرتا ہے اور ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ کیڑا عام طور پر پکے اور نرم پھلوں پر حملہ کرتا ہے اور ان میں انڈے دیتا ہے، جس سے پھلوں کا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ ڈروسوفلا سوزوکی کو اسٹرابیری فلائی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسٹرابیری اور دیگر نرم پھلوں پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتی ہے۔ ڈروسوفیل سوزوکی (میٹھو مور) نرم اور چھوٹے پھلوں کی فصلوں کا ایک معاشی طور پر اہم کیڑا ہے۔ دیگر مکھیوں کے برعکس یہ مکھی خاص طور پر مکمل پکے ہوئے اور جڑی طور پر پکے ہوئے پھلوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ پھل فروش طبقے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ مارکیٹ میں متاثرہ یا خراب پھلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نتیجتاً، بہت سے علاقوں میں کاشتکار ڈروسوفلا سوزو کے کنٹرول کے لیے طے شدہ وقت پر کیڑے مارا دیات کے استعمال پر انحصار کرتے ہیں۔

ڈروسوفلا سوزوکی حیاتیات اور رویہ

ڈروسوفلا سوزوکی کی زندگی کا دورانیہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں پر محیط ہوتا ہے۔ یہ کیڑا پھلوں کی سطح پر انڈے دیتا ہے، جس کے بعد نکلنے والے لاروی پھل کو اندر سے کھا کر ناکادہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیڑا گرم اور مرطوب ماحول میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ کچی پھلوں کی سطح پر اپنے تیز اووی پوزیٹرز کی مدد سے انڈے دیتی ہے۔ ایک مادہ اپنی زندگی میں تقریباً 300-400 انڈے دے سکتی ہے۔ یہ انڈے عام طور پر پھل کے گودے میں دیے جاتے ہیں۔ اس کالائف سائیکل مختصر ہونے کی وجہ سے یہ کیڑا تیزی سے پھیلتا ہے۔

انڈے دینے کا دورانیہ: (3-1 دن) مادہ مکھی پھلوں میں انڈے دیتی ہے۔

منڈی بننے کا دورانیہ

(13-3 دن) انڈے نمو پا کر منڈیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ منڈیاں پھل کا

گودا کھاتی ہیں۔

فیرومون ٹریپس

جبکہ کمرشل لالچ دینے والے مچھر مہنگے ہو سکتے ہیں (2000-500 روپے فی کلو)۔

فیرومون ٹریپنگ ایک موثر طریقہ ہے، جو کہ ڈروسوفلا سوزو کی کو محدود کرتا ہے۔

دستیابی

سرکہ، پھل، اور شراب آسانی سے بازار میں مل جاتے ہیں۔ کچھ کیمیائی مرکبات

اسپرے

زرعی دواخانوں یا آن لائن خریدے جاسکتے ہیں۔

پھلوں پر پرکشش اجزاء کا اسپرے کیا جاتا ہے تاکہ کیڑوں کو دور رکھا جاسکے۔

مانیٹرنگ اور تشخیص میں دشواری

ماحول دوست طریقے

ڈروسوفلا سوزو کی دوسری مکھیوں (جیسے عام ڈروسوفیلا) سے ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ

یہ طریقے کیمیائی کیڑے مار دویات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں۔

سے اس کی شناخت مشکل ہوتی ہے مانیٹرنگ کے لیے مخصوص مصنوعی ٹریپس اور lures

پرکشش اجزاء کے فوائد

کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسانوں کے لیے مہنگے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ماحول دوست

ڈروسوفلا سوزو کی آبادی میں کمی

طریقے سے براہ راست کنٹرول کی جاسکتی ہیں۔

فصلوں کے معیار اور پیداوار میں بہتری۔

ماحولیاتی اور موسمی اثرات

ماحول اور انسانوں کے لیے کم خطرہ۔

گرم اور مرطوب موسم میں اس کی آبادی تیزی سے بڑھتی ہے۔

پھلوں کے پرکشش اجزاء کا ڈروسوفلا سوزو کی کے رویے پر اثر

جنگلات اور غیر زرعی علاقوں سے یہ مکھی کھیتوں میں حملہ کر سکتی ہے، اس لیے ان کا

ڈروسوفلا سوزو کی اکثر ان پھلوں کو ترجیح دیتا ہے جو زیادہ میٹھے اور خوشبودار ہوتے

کنٹرول ضروری امر ہے اور سانس کی بنیاد پر تحقیقاتی نتائج اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ

ہیں۔ ان کی پسندیدہ پھلوں میں اسٹرابیری، جیری، اور بلویری شامل ہیں۔

پرکشش اجزاء کے ذریعے مکھی کے پھیلاؤ کو محدود کیا جاسکتا ہے۔

سانس کی بنیاد پر

نتیجہ

یکھی پھلوں میں موجود قیمتی اجزاء جیسے ایسٹرس، الیکٹول، اور تیزابیت کی بنیاد پر پھلوں

پھلوں کے پرکشش اجزاء کا استعمال ڈروسوفلا سوزو کی کے کنٹرول کا ایک مؤثر اور

کی طرف زیادہ اڑکیشن کا اظہار کرتی ہیں۔

ماحول دوست طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف فصلوں کو نقصان سے بچایا جاسکتا ہے

پرکشش اجزاء کی لاگت اور دستیابی

بلکہ پیداوار میں بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ فیلڈ سینی ٹیشن نمائش کا استعمال اور بائیو کنٹرول

ڈروسوفلا سوزو کی ایک نقصان دہ کیڑا ہے جو پھلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اسے کنٹرول

ایجنٹس اس سمت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ پھلوں کی

کرنے کے لیے پرکشش اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سرکہ، شراب، یا خاص

متبادل حفاظت کے اقدامات اور پرکشش اجزاء کی عملی سے استعمال اس مسئلے کو حل کرنے

کیمیائی مرکبات شامل ہیں۔

میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا کسانوں اور کاشتکاروں میں ان ترکیب کے مناسب

لاگت

گھریلو اجزاء جیسے سرکہ اور پھل کارس سے ہوتے ہیں (100-50 روپے فی لیٹر) اقدامات کے لیے آگے پیدا کرنی چاہیے۔

احادیث ☆ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ ایک صحابی ایک پہاڑی درے میں ایک چشمے پر پہنچے۔ چشمہ میٹھا اور جگہ صاف دیکھ کر دل میں کہا کہ یہ جگہ عبادت کے لئے بہت اچھی ہے، میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر یہیں قیام کر لوں۔ جب رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس خیال کا ذکر آپؐ سے کیا۔ نبی کریمؐ نے فرمایا ”ایسا نہ کرو اس لئے کہ ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے راستے (جہاد) میں کھڑا ہونا اپنے گھر میں رہ کر ستر سال کی نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں جنت میں داخل کرے۔ جاؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جو شخص تھوڑی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔“ (ترمذی) ☆ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ایک دن کا اسلامی (ملک کی) سرحدوں کی حفاظت کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (بخاری) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جہنم کہے گی کہ تیری عزت کی قسم بس بس۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریمؐ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا جو جہنمیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا، وہ کہے گا کہ اے رب! میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم، میں اس کے سوا کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔

جانوروں کو فربہ کرنے کے اصول اور خوراک کا زانچہ

ڈاکٹر محمد محبوب علی حامد، تحریر: احسن فاروق، محمد ارشد سلطان..... انسٹیٹیوٹ آف اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز، فیکلٹی آف اینیمل ہسپینڈری، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

بچائیں۔ اس کے علاوہ موسمی پیراسائٹ جیسا کہ مچھر، مکھیاں اور چھچھو وغیرہ بھی جانوروں کی صحت بہتر ہونے سے روکتی ہیں تو ان پر بروقت قابو پالینا چاہیے۔

4- طبی نگہداشت: کیڑے مارا دویات اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے ویکسین کا بروقت استعمال کریں۔ اگر جانور سستی یا خوراک میں عدم دلچسپی دکھائے تو فوری طور پر ماہر حیوانات سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ اندرونی کیڑوں کی روک تھام کے لیے ڈیورمنگ کروائیں تاکہ جانور اچھی شرح پر وزن میں اضافہ کرے۔

عید قرباں سے قبل جانور کو اگر چند بنیادی اہم اصولوں کے مطابق خوراک نہ دی جائے تو ان میں اچھا رے اور پیٹ لٹکنے جیسے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل سے گریز کرنے کے لیے درج ذیل خوراک کے زانچے پر عمل کریں۔

مدت	خوراک کی تفصیل	وضاحت
پہلا ہفتہ	نم چارہ (برسم، لوسرن) + تھوڑا سا ہاضم کو بہتر بنانے کے لیے ہلکی دالوں کا بھوسہ	خوراک
دوسرا ہفتہ	مکئی، جو، گندم کا چوکر، سبز چارہ + ونڈا	توانائی اور پروٹین میں اضافہ
تیسرا ہفتہ	چوکر، روٹی، گڑ، دالوں کا بھوسہ + ونڈا	وزن بڑھانے کے لیے غذائیت میں اضافہ
چوتھا ہفتہ	مکئی، روٹی، تل کا کھل، ونڈا + سبز چارہ	چربی کی مناسب مقدار بڑھانے کے لیے
پانچواں ہفتہ	تمام اجزاء کی متوازن خوراک، وافر پانی	جانوروں کو اچھی حالت میں رکھنا
چھٹا ہفتہ	حسب ضرورت مقدار میں متوازن خوراک، نمک، ملٹی نیوٹریٹ بلاک	

جانوروں کو فربہ کرنے کے لیے متوازن خوراک، بہترین نسل کا انتخاب، مناسب دیکھ بھال، اور طبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان تمام اصولوں پر عمل کیا جائے تو قربانی کے لیے ایک صحت مند، فربہ اور معیاری گوشت والا جانور حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جانوروں کا صحت مند اور فربہ ہونا بہتر گوشت کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے۔ گوشت کی مانگ میں بڑھتے اضافے کے پیش نظر اس کی فراہمی میں بڑھاؤ کی ضرورت ہے۔ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ ہمارے مقامی اعلیٰ نسل کے جانوروں کا گوشت بین الاقوامی سطح پر بھی برآمد ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں جانوروں کو فربہ کرنے کے لیے چند تکنیکی اصولوں پر عمل کرنا ہو گا تاکہ ہم جانوروں کی فلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس مضمون میں ہم جانوروں کو فربہ کرنے کے بنیادی اصول، اعلیٰ نسل کے جانوروں کا انتخاب، ماحول کے اثرات، اور مرحلہ وار بہترین خوراک کے زانچہ پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

جانوروں کو فربہ کرنے کے بنیادی اصول

جانوروں کو فربہ کرنے کے لیے نہ صرف انکی خوراک کا اہم کردار ہوتا ہے بلکہ ان کی نسل، جینیات، ماحولیاتی عوامل جیسے اثرات بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ذیل میں چند اصولوں پر تفصیلاً تبصرہ کیا گیا ہے۔

1- صحیح نسل کا انتخاب: اعلیٰ نسل کے جانور جلدی وزن بڑھاتے ہیں اور ان کا گوشت زیادہ معیاری ہوتا ہے۔ پاکستان میں کچھ نسلیں خاص گوشت کی پیداوار کے لیے جانی جاتی ہیں جیسا کہ بڑے جانوروں میں ریڈ سنڈھی، چولستانی، داجل، گنگاری وغیرہ اور چھوٹے جانوروں میں بیتل بکریاں، ببرک اور چولستانی بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ ان مخصوص نسلوں کے خصائص میں بڑا جسم اور انکی وقامت وغیرہ ہے۔ نیز جانور کی خریداری کے وقت اچھی نسل کے بڑے جسم سیدی ٹانگوں، چمکدار آنکھوں اور صحت مند جلد والے جانوروں کو ترجیح دیں۔

2- متوازن خوراک: جانوروں کو ایسی خوراک دی جائے جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، پکٹائی، وٹامنز اور معدنیات مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ اعلیٰ توانائی والی خوراک (مکئی، جو، گندم کا دلیہ) وزن بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔

3- ماحولیاتی عوامل: انورموسم کو لے کر بچہ حساس ہوتے ہیں۔ ماحول اور درجہ حرارت کی خرابی کیوجہ سے کسی بھی قسم کا تناؤ ان کی کارکردگی میں رکاوٹ کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جانوروں کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سخت موسمی حالات سے انھیں بچاؤ یقینی ہو۔ موسم اور درجہ حرارت کے مطابق جانوروں کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ نیز گرمیوں میں سایہ دار جگہ اور ٹھنڈے پانی کی وافر مقدار فراہم کریں اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا اور بارش وغیرہ سے

مولیشیوں کی منافع بخش پیداوار کے لیے پاکستان میں چاراجات کی کاشت

آصف اقبال، رانا ندیم عباس، ہارون زمان خان، فہد رسول، صفدر علی، محمد عبداللہ سلیم..... شعبہ اینگریز انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہیں۔ دوامی اقسام کے چارے سارا سال مسلسل چارے کی فراہمی کا باعث ہیں۔ دوامی اقسام کے چارے کی فراہمی سے مولیشیوں کی فی کس دودھ اور گوشت کی پیداوار ممکن ہے۔ مختلف دوامی اقسام کے چاروں میں لوسرن، برمودا گھاس، دوامی رائی گھاس، روڈ ز گھاس، سپر ممباسہ، پیئر گھاس اور ماٹ گھاس وغیرہ ایسے چارے ہیں کہ جن کی پیداوار اور کوٹائی روایتی چاروں مثلاً مکئی، چری، باجرا، جئی وغیرہ سے زیادہ ہے۔ دوامی اقسام (Perennial of fodders) لگانے کے کسان کو درج ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

1۔ غذائیت سے بھرپور چارہ

دوامی چارے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں پروٹین، فائبر وغیرہ کی کافی مقدار شامل ہوتی ہے جو کہ جانوروں کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ ان میں فائبر کی مناسب مقدار ہونے سے جانوروں کے ہاضمے کو درست رکھتے ہیں۔

2۔ وافر مقدار میں چارے کی فراوانی

دوامی چارے چونکہ بار بار کٹائیاں دیتے ہیں اور ایک سال میں تقریباً 6 تا 7 کٹائیاں چارے کی دیتے ہیں لہذا یہ سارا سال وافر مقدار میں چارہ فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ چارے کی قلت کے دورانیے کو بھی کم کرتے ہیں اور سارا سال ہم چارہ مہیا کرتے ہیں۔

3۔ زمین کی زرخیزی

دوامی چاروں کی جڑیں زمین میں زیادہ گہرائی تک جاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی بحال رہتی ہے۔ اس کے علاوہ لوسرن زمین میں نائٹروجن کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے کیونکہ اس کی جڑوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ہوا میں موجود نائٹروجن کو زمین میں ذخیرہ کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔

4۔ کسان کے سرمائے میں اضافہ اور بچت

دوامی چارے کسان کے سرمائے میں اضافے کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ان میں چارے کی زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ عام چاروں مثلاً مکئی، چری، باجرا وغیرہ کی بار بار زمین میں بوائی کرنی پڑتی ہے جس سے پیداوار لاگت بہت بڑھ جاتی ہے۔ (باقی صفحہ 43 پر)

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی خوراک کی قلت کے تشویش انگیز مسئلہ سے دوچار ہے۔ بالخصوص ترقی پذیر ممالک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہونے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ سائنسی معلومات کی روشنی میں کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک کا معیار بلند کیا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ متوازن بنایا جائے۔ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے لمبیاتی خوراک کی شدید ضرورت ہے اور یہ صحت و توانائی سے بھرپور خوراک مولیشیوں کے گوشت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مولیشیوں کی صحت اور نشوونما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انہیں پورا سال سبز چارہ مہیا کیا جائے کیونکہ سبز چارہ مولیشیوں کی تازہ خوراک ہے اور ان میں بھرپور غذائیت ہوتی ہے۔ غذائی ضروریات کا صافی حصہ خشک بھوسے سے پورا کیا جاتا ہے لیکن سائنسی تحقیقات کی رو سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سبز چارہ غذائیت کے اعتبار سے بہتر ہے کیونکہ اس میں حیاتین پائے جاتے ہیں چنانچہ سبز چارہ کی پیداوار بڑھانا دور حاضر کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ لہذا اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ چارے کی مختلف فصلیں بھی عام فصلوں کی طرح لگائی جائیں اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام جدید طریقے اسی طرح استعمال کیے جائیں جس طرح کہ نقد آور اجناس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چارے کی مطلوبہ مقدار کم سے کم رقبہ سے حاصل ہو سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اب تک مقامی چاروں کی فصلوں کی کافی اقسام متعارف کروائی جا چکی ہیں اور بہت سی نئی فصلیں بیرونی ممالک سے درآمد کرکے ممالک میں رائج کرنی کی کوشش کی جا رہی ہیں اور مختلف فصلوں کی کاشت کے بہتر طریقے دریافت کر لیے گئے ہیں جن کی بدولت الحمد للہ اب ہم فی ایکڑ پہلے کی نسبت زیادہ چارہ کی پیداوار حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔

جانوروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہم فی ایکڑ سبز چارہ کی پیداوار بڑھائیں اور کسان کے کاشتکاری کے خرچے کو کم کریں۔ ملک میں وقت چارے کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے ہمارے مولیشی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم روایتی چاروں سے ہٹ کر جو کہ عام طور پر ایک سال یا اس سے کم عرصے کے چارے میں دوامی (Perennial) قسم کے چاروں کی کاشت پر زور دیں کیونکہ دوامی قسم کے چارے (Perennial fodders) ہی سارا سال سبز چارہ کی فراہمی کا ذریعہ ہیں خاص کر جن ایام میں ہمارے ہاں چاروں کی قلت کے دورانیے ہوتے

خشک لاروے: ایک سرگرا کا نومی ماڈل

ڈاکٹر عرفہ بن طاہر، ڈاکٹر محمد سہیل ساجد، ڈاکٹر محمد عمیر سیال، ڈاکٹر حافظ محمد رضوان..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

گرم موسم بلیک سولجر فلائی کی نشوونما کے لیے مثالی ہے۔ بلیک سولجر فلائی کے لارو درجہ حرارت (27°C-29) اور 60-70% نمی والے ماحول میں بہترین طور پر پرورش پاتے ہیں، جو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان میں زرعی اور کھانے پینے کے صنعتوں سے پیدا ہونے والے نامیاتی فضلے کی بڑی مقدار بلیک سولجر فلائی کے لارو کی خوراک کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔

بلیک سولجر فلائی کے لارو کی افزائش کا عمل نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے لیے کچھ خاص شرائط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے، ایک مناسب سہولت گاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بند کمرہ ہو سکتا ہے جس میں درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اس کمرے میں بلیک سولجر فلائی کے لیے خاص ڈبے یا کنٹینر رکھے جاتے ہیں جن میں انڈے اور لارو پالے جاتے ہیں۔ بلیک سولجر فلائی کی افزائش کا عمل انڈوں سے شروع ہوتا ہے۔ بالغ بلیک سولجر فلائی مکھیاں انڈے دیتی ہیں جنہیں مخصوص شرائط میں رکھا جاتا ہے۔ تقریباً 4-5 دنوں میں، ان انڈوں سے چھوٹے لارو نکلتے ہیں۔ یہ لارو فوراً ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں

لارو کی خوراک کا انتظام بہت اہم ہے۔ وہ مختلف قسم کے نامیاتی فضلے کھا سکتے ہیں، جیسے کہ پھلوں اور سبزیوں کا فضلہ کھانے کا بچا ہوا حصہ، یا زرعی پیداوار کا فضلہ۔ یہ خوراک باقاعدگی سے فراہم کی جاتی ہے اور اس کی مقدار اور معیار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔

لارو کی پرورش کا عمل تقریباً 3-2 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران، وہ اپنے وزن میں کئی گنا اضافہ کرتے ہیں۔ جب وہ مکمل طور پر بڑے ہو جاتے ہیں، تو انہیں جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد، ان لارو کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر انہیں یا تو براہ راست استعمال کیا جاتا ہے یا پھر خشک کر کے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

بلیک سولجر فلائی فارمنگ سے حاصل ہونے والے لارو کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سب سے عام استعمال جانوروں کی خوراک کے لیے ہے۔ بلیک سولجر فلائی کے لارو کو مچھلیوں، مرغیوں، اور دیگر پالتو جانوروں کی خوراک میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ان جانوروں کی صحت اور نشوونما کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔

مچھلی پرورش کے شعبے میں بلیک سولجر فلائی کے لارو کا استعمال خاص طور پر اہم ہے۔ پاکستان میں مچھلی پرورش ایک بڑھتا ہوا کاروبار ہے، لیکن مچھلیوں کی خوراک کی

پاکستان کی زرعی معیشت میں ایک نئی اور انقلابی تبدیلی آرہی ہے جس کا نام ہے بلیک سولجر فلائی فارمنگ۔ یہ نہ صرف ایک منافع بخش کاروبار ہے بلکہ ملک کی غذائی سلامتی، ماحولیاتی استحکام اور برآمدات کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بلیک سولجر فلائی فارمنگ کا مطلب ہے بلیک سولجر فلائی کے لارو کی پرورش کرنا، جو ایک قسم کا کیڑا ہے جسے مچھلیوں، مرغیوں اور دیگر جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

بلیک سولجر فلائی (*Hermetia illucens*) ایک قسم کی مکھی ہے جو دنیا کے گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا لارو نامیاتی فضلے کو کھا کر اپنی نشوونما کرتا ہے اور اسے اعلیٰ معیار کی پروٹین میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ خصوصیت بلیک سولجر فلائی کے لارو کو ایک قیمتی وسیلہ بناتی ہے، خاص طور پر جانوروں کی خوراک کی صنعت میں۔

پاکستان میں بلیک سولجر فلائی فارمنگ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، ہمیں پہلے اس کے فوائد پر نظر ڈالنی چاہیے۔ سب سے پہلے، یہ ایک انتہائی پائیدار کاروبار ہے۔ بلیک سولجر فلائی کے لارو نامیاتی فضلے کو کھا کر اسے قیمتی پروٹین میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس طرح، وہ نہ صرف فضلے کی مقدار کو کم کرتے ہیں بلکہ اسے ایک مفید مصنوعات میں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ یہ عمل ماحولیاتی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ فضلے کے انتظام کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ بلیک سولجر فلائی کے لارو ایک اعلیٰ معیار کی پروٹین کا ذریعہ ہیں۔ ان میں تقریباً 40-50% پروٹین ہوتا ہے، جو کہ بہت سے دیگر پروٹین کے ذرائع سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ، بلیک سولجر فلائی کے لارو میں ضروری امینو ایسڈز، چربی، اور معدنیات بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں مچھلیوں، مرغیوں اور دیگر جانوروں کی خوراک کے لیے ایک بہترین اختیار بناتی ہیں۔

تیسرا، بلیک سولجر فلائی فارمنگ ایک کم لاگت والا کاروبار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک سولجر فلائی کے لارو کی پرورش کے لیے زیادہ جگہ یا مہنگے آلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ نامیاتی فضلے پر پلتے ہیں، جو کہ عام طور پر مفت یا بہت کم قیمت پر دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، بلیک سولجر فلائی کے لارو کی پیداوار کی لاگت بہت کم ہوتی ہے، جو اسے ایک منافع بخش کاروبار بناتی ہے۔

پاکستان میں بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے لیے موزوں ماحول موجود ہے۔ ملک کا

بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے کاروبار میں کچھ چیلنجز بھی ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج مارکیٹ کی طلب کو یقینی بنانا ہے۔ اگرچہ بلیک سولجر فلائی کے لاروا کی مانگ بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ اس نئے مصنوعے سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے، مارکیٹنگ اور آگاہی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔

دوسرا چیلنج مسلسل اور معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ بلیک سولجر فلائی کے لاروا کو باقاعدگی سے نامیاتی فضلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مقامی کھانے پینے کی صنعتوں، زرعی شعبے، یا دیگر ذرائع سے مستقل تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔

تیسرا چیلنج موسمی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے۔ اگرچہ پاکستان کا موسم عام طور پر بلیک سولجر فلائی کی پرورش کے لیے موزوں ہے، لیکن شدید گرمی یا سردی کے دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مناسب انفراسٹرکچر اور ایسی صلاحیت کی ضرورت ہے۔

چوتھا چیلنج قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک سے متعلق ہے۔ چونکہ بلیک سولجر فلائی فارمنگ ایک نیا شعبہ ہے، اس لیے اس کے لیے مخصوص قوانین اور ضوابط کی کمی ہے۔ حکومت کو اس شعبے کے لیے واضح قانونی فریم ورک تیار کرنا ہو گا تاکہ کاروباری افراد کو یقین دہانی ہو سکے۔ پاکستان میں بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے مستقبل کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت امید افزا نظر آتا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور کھانے کی ضروریات کے ساتھ، پروٹین کے متبادل ذرائع کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ بلیک سولجر فلائی کے لاروا اس ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ، پاکستان کی معیشت میں زراعت اور لائیو سٹاک کا اہم حصہ ہے۔ بلیک سولجر فلائی فارمنگ ان دونوں شعبوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ نہ صرف جانوروں کی خوراک کا ایک سستا اور غذائی اجزاء سے بھرپور ذریعہ فراہم کرے گی، بلکہ نامیاتی فضلے کے انتظام میں بھی مدد دے گی۔ مزید برآں، بلیک سولجر فلائی فارمنگ پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ دنیا بھر میں پروٹین کی مانگ بڑھ رہی ہے، اور بلیک سولجر فلائی کے لاروا اس مانگ کو پورا کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اس مارکیٹ میں اپنا حصہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنی برآمدات کو متنوع بنا سکتا ہے۔

آخر میں، بلیک سولجر فلائی فارمنگ ماحولیاتی استحکام کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ نامیاتی فضلے کو کم کرنے، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، اور قدرتی وسائل پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس طرح، یہ پاکستان کو اپنے ماحولیاتی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

بڑھتی ہوئی قیمتیں اس شعبے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ بلیک سولجر فلائی کے لاروا اس مسئلے کا ایک موثر حل پیش کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف سستے ہیں بلکہ ان میں پروٹین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، جو مچھلیوں کی تیز نشوونما کے لیے ضروری ہے۔

بلیک سولجر فلائی کے لاروا کا ایک اور اہم استعمال کھاد کے طور پر ہے۔ جب لاروا اپنی خوراک کھا لیتے ہیں، تو ان کا فضلہ ایک بہترین نامیاتی کھاد بن جاتا ہے۔ یہ کھاد زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہے اور پودوں کی نشوونما کے لیے بہت مفید ہے۔ اس طرح، بلیک سولجر فلائی فارمنگ زراعت کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

پاکستان میں بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، سب سے پہلے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ یہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ، یہ جگہ نامیاتی فضلے کے ذرائع کے قریب ہونی چاہیے تاکہ خوراک کی فراہمی آسان ہو۔ اگلا قدم ضروری سامان اور آلات کی خریداری ہے۔ اس میں بلیک سولجر فلائی کے لیے خاص ڈبے یا کنٹینر، درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کرنے والے آلات، اور لاروا کو جمع کرنے اور صاف کرنے کے لیے ضروری سامان شامل ہے۔ یہ سارا سامان مقامی طور پر دستیاب ہو سکتا ہے یا پھر اسے درآمد کیا جاسکتا ہے۔

بلیک سولجر فلائی فارمنگ شروع کرنے کے لیے ابتدائی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ دیگر زرعی کاروباروں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔ مثال کے طور پر، ایک چھوٹے پیمانے پر بلیک سولجر فلائی فارم کو شروع کرنے کے لیے تقریباً 5-6 لاکھ روپے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ رقم جگہ کے کرایے، سامان کی خریداری، اور ابتدائی آپریشنل اخراجات پر خرچ ہوتی ہے۔

بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے کاروبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے، مناسب تربیت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ابھی اس شعبے میں مہارت رکھنے والے ماہرین کی تعداد محدود ہے، لیکن یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کچھ زرعی یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے اس شعبے میں تربیت اور تحقیق کا کام شروع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، بین الاقوامی تنظیمیں بھی پاکستان میں بلیک سولجر فلائی فارمنگ کو فروغ دینے میں دلچسپی لے رہی ہیں۔

پاکستان میں بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے لیے حکومتی پالیسیوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس شعبے کو فروغ دینے کے لیے خاص پالیسیاں بنائے۔ اس میں ٹیکس چھوٹ، سبڈی، اور دیگر مالی مراعات شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، حکومت کو بلیک سولجر فلائی فارمنگ کے لیے معیار اور ضوابط بھی متعین کرنے چاہئیں تاکہ اس کاروبار کو منظم طریقے سے چلایا جاسکے۔

جانوروں میں برڈفلو کی بیماری اور ممکنہ اثرات

ڈاکٹر فیصل مسعود، اصفیٰ نعیم، ملائکہ فیصل..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

مارچ سے اکتوبر 2024 تک کی ایک تحقیق میں امریکہ کی چھ مختلف ریاستوں میں

46 انسانی کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے بیس افراد پرندوں میں وائرس کی وجہ سے اور بچیں افراد مویشیوں میں وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے، جبکہ ایک کیس میں وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ متاثرہ افراد نے ہلکی بیماری کی علامات ظاہر کیں، جن میں بنیادی علامت آشوب چشم تھی۔ انسانوں سے انسانوں میں کوئی منتقلی نہیں دیکھی گئی۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے انسانوں میں جانوروں سے اس وائرس کے نہ پھیلنے کی وجہ ان کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا تھا۔

وائرس کا پھیلاؤ

اس وائرس کا پھیلاؤ ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس کی نئی جینیاتی ترتیبات اسے مختلف انواع و اقسام کے جانوروں اور پرندوں میں بیماری پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ برڈفلو کا یہ وائرس مویشیوں، بلیوں اور سمندری جانوروں میں بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری وائرس کی براہ راست منتقلی، آلودہ ماحول یا پھر متاثرہ پرندے کو بطور خوراک استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ وائرس سانس یا معدے کے راستے جانور میں داخل ہوتا ہے جبکہ اس کے نکلنے کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کچے دودھ میں وائرس کی موجودگی انسانوں اور دیگر ممالیہ جانوروں میں منتقل ہونے کا خطرہ پیدا کرتی ہے۔ ہجرت کرنے والے پرندے پولٹری کی آبادی میں وائرس کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گھریلو پولٹری ناکافی بائیوسیکیورٹی کنٹرولز کے باعث خطرات کا شکار ہے، جو جنگلی پرندوں سے وائرس پھیلنے کی اجازت دیتے ہیں اور نئی اقسام کے قیام کا باعث بھی بنتے ہیں۔ انسانی معاملات میں ہلکے انفلوئنزا جیسی علامات سے لے کر مہلک نتائج تک شامل ہیں۔ انسان سے انسان میں منتقلی محدود ہے، لیکن مسلسل ارتقاء مستقبل قریب میں سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔

وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام

اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف ویکسینیں تیار کی گئیں۔ جن میں mRNA ویکسین، لائیو اٹینیویٹڈ ویکسین اور وائرل ویکٹر ویکسین شامل ہیں۔ امریکہ کی حکومت نے مستقبل کا خطرہ بھانپتے ہوئے اس وائرس کی ایک قسم A/Viet Nam/1203/2004 کی بنیاد پر 125 ملین خوراکیں کا ذخیرہ بنایا، (باقی صفحہ 60 پر)

انفلونزا ایک متعدی بیماری ہے جو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ وائرس پرندوں، سور، انسانوں، کے ساتھ ساتھ اب پالتو جانوروں میں بھی بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ عام زبان میں ہم اسے برڈفلو، سوائفلو، ہیومن فلو وغیرہ کہتے ہیں جبکہ بیماری کی شدت کی بنیاد پر، ہم نے برڈفلو کو شدید بیماری پیدا کرنے والے (HPAI H5N1) اور کم بیماری پیدا کرنے والے (LPAI) (H9N2) وائرس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ انفلونزا وائرس اپنے جینیاتی مواد میں کچھ ایسی تبدیلیاں لا سکتا ہے، جو اس وائرس کی نئی اقسام کی پیدائش کا باعث بنتی ہیں۔ اس وجہ سے انفلونزا وائرس پوری تاریخ میں بدلتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے انفلونزا وائرس جانوروں کی مختلف انواع و اقسام میں بیماری پیدا کر سکتا ہے جیسا کہ اب یہ پرندوں کے ساتھ ساتھ بلیوں، بھٹوں اور مویشیوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔

سب سے پہلے یہ وائرس 1996 / A/Goose/Guangdong/1 (H5N1) چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ میں ایک ہنس سے حاصل کیا گیا۔ پھر یہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی مدد سے عالمی سطح پر پھیلا، جس کے نتیجے میں مرغیوں، پرندوں اور یہاں تک کہ انسانوں کی موت واقع ہوئی۔

ہیم گلوبین پر وائرس کی ترتیب کی بنیاد پر، اس وائرس کو دس بنیادی اور ذیلی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک قسم (کلیڈ) 2.3.4.4b بہت خطرناک ہے اور عالمی سطح پر پھیل چکی ہے۔

پچھلے ایک سال میں صرف امریکہ کے اندر وائرس کی اس قسم نے مویشیوں، سمندری پرندوں، انسانوں اور مرغیوں کو متاثر کیا ہے۔ امریکہ کی اٹھارہ ریاستوں کے اندر نو سو بچا نوے مویشیوں میں اس بیماری کو دیکھا گیا۔ متاثرہ جانوروں میں سستی، دودھ کی پیداوار میں کمی اور بخار جیسی علامات دیکھی گئیں۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں موجودہ علم یہ بتاتا ہے کہ بلیاں اور کتے جنگلی پرندوں کے وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور بیماری شدید ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے نسل جانوروں میں منتقلی محدود ہے۔ ساقی جانوروں سے انسانوں میں HPAI کی منتقلی کی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن وائرس کی نئی جینیاتی ترتیب کا پیدا ہونا ان خدشات کو جنم دیتا ہے کہ بلیاں اور کتے انسانوں میں منتقلی کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ وائرس کی نئی قسم کے ظہور کے لیے ایک درمیانی میزبان کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

چھوٹے جگالی کرنے والے جانوروں کی طاعون و جوبات، وبائیات، تشخیص، علاج، روک تھام اور کنٹرول

ڈاکٹر مغیث اعجاز علوی، ڈاکٹر محمد سہیل ساجد، ڈاکٹر (ر) غلام محمد، ڈاکٹر محمد ثاقب، رافہا درکھل..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جوبات

چھوٹے جگالی کرنے والے جانوروں کی طاعون (PPR) ایک وائرل بیماری ہے جو پیرامیکس ویریڈی خاندان اور مرلی وائرس جنس سے تعلق رکھنے والے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس وائرس کو پہلے "Peste des petits ruminants" virus کہا جاتا تھا، مگر 2016ء میں اس کا نام "Small ruminant morbillivirus" رکھ دیا گیا۔ تاہم، فیلڈ میں کام کرنے والے ماہرین آج بھی اسے PPRV کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وائرس ایک ہی سیر وٹائپ میں پایا جاتا ہے، لیکن نیولک ایڈیکوٹنسنگ کے ذریعے اسے چار مختلف نسب میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ وائرس رنڈر پیسٹ، خسرہ اور کینائٹ ڈسٹیمپر وائرس کے ساتھ اینٹی جینک مشابہت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دیگر وائرل بیماریوں کے ساتھ کچھ مشترکہ خصوصیات رکھتا ہے۔

پاکستان میں جانوروں کی طاعون ایک اہم مسئلہ ہے جو معیشت اور لائیو سٹاک سیکٹر پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ ملک میں چھوٹے جگالی کرنے والے جانوروں کی آبادی 90 ملین سے زائد ہے، جو اس بیماری کے لیے حساس ہیں۔ اگر قومی سطح پر PPR کی وبا پھیل جائے اور یہ 15 فیصد جانوروں کو متاثر کرے تو اس سے تقریباً 20.5 بلین روپے سالانہ کا اقتصادی نقصان ہو سکتا ہے۔ مختلف صوبوں میں جانوروں کی طاعون کی موجودگی مختلف ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق، سندھ میں اس بیماری کی موجودگی 61 فیصد، پنجاب میں 54 فیصد، بلوچستان میں 53 فیصد، خیبر پختونخوا میں 44 فیصد، اور گلگت بلتستان و آزاد جموں و کشمیر میں 51 فیصد پائی گئی ہے۔

وائرس کی جسمانی اور کیمیائی عوامل کے خلاف مزاحمت

یہ وائرس مخصوص درجہ حرارت اور کیمیائی عوامل کے خلاف مختلف مزاحمتی صلاحیت رکھتا ہے۔ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کی نصف عمر 3 گھنٹے تک ہوتی ہے، جبکہ 56 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ 2.2 منٹ میں غیر فعال ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس pH کی ایک خاص حد میں مستحکم رہتا ہے، یعنی pH 5.0 سے 10.0 کے درمیان زیادہ مؤثر ہوتا ہے لیکن اگر pH کی سطح 4.0 سے کم یا 11.0 سے زیادہ ہو جائے تو وائرس غیر فعال ہو جاتا ہے۔

یہ وائرس عام جراثیم کش ادویات جیسے الکحل، ایتر اور صابن کے محلول سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، فینول اور 2 فیصد سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول میں 24 گھنٹوں

کے اندر یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم، یہ وائرس سرد یا منجمد شدہ بافتوں میں طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔

وبائیات

یہ بیماری زیادہ تر ان علاقوں میں دیکھی گئی ہے جہاں بکریاں اور بھیڑیں پالنا عام ہے۔ اگر کسی جانور میں وائرس موجود ہو اور وہ غیر متاثرہ جانوروں کے قریب ہو تو بیماری تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ حساس جانوروں میں اس بیماری کی شرح 90 سے 100 فیصد تک پہنچ سکتی ہے، اور شدید صورتوں میں اموات کی شرح 50 سے 100 فیصد ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر بکریوں کو متاثر کرتی ہے، جبکہ بھیڑیں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ کچھ بکریوں کی خاص نسلیں اس بیماری کے لیے زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، کئی قسم کے جنگلی جگالی کرنے والے جانور بھی اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غزال، بشک، امپالا، برال، سندھی آئینیکس، جنگلی بکریاں، اور افغان مارخور۔ گائے بھی اس وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے، تاہم ان میں بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں اور نہ ہی وہ اس وائرس کو آگے پھیلاتی ہیں۔ تجربہ گاہ میں کیے گئے تجربات میں خنزیر بھی اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے اسے منتقل کیا۔ مگر فیلڈ میں ان کے ذریعے پھیلاؤ ثابت نہیں ہوا۔ منتقلی

یہ بیماری زیادہ تر متاثرہ جانوروں کے قریبی رابطے کے ذریعے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ ہوا میں موجود وائرس، متاثرہ جانوروں کی جسمانی رطوبتیں، اور غیر جاندار اشیاء جیسے کہ بستر، چارہ، پانی کے برتن اور چراگاہیں اس بیماری کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ بیماری کے پھیلاؤ میں موسمی اثرات بھی دیکھے گئے ہیں۔ زیادہ تر وبائیں برسات یا سردیوں کے خشک موسم میں دیکھی گئی ہیں، کیونکہ ان اوقات میں جانوروں کی نقل و حرکت اور تجارت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وائرس زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔

تشخیص

چھوٹے جگالی کرنے والے جانوروں کی طاعون کا انکیوبیشن پیریڈ عام طور پر 4 سے 6 دن ہوتا ہے، تاہم بعض اوقات یہ 3 سے 10 دن کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر متاثرہ جانوروں میں علامات 3 سے 6 دن کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس بیماری کی عام علامات میں تیز بخار، بھوک میں کمی، ناک سے گاڑھی رطوبت کا اخراج، سانس کی تکلیف،

سیل کلچر ویکسین (زندہ) بھی شامل ہے۔ ٹشو کلچر پیڈ لائیو فریز ڈرائیڈ PPR وائرس (1-75 PPR) ویکسین بھی پاکستان میں تیار کی گئی ہے، جو بکریوں میں PPR کی بیماری کو محدود کرنے اور اقتصادی نقصانات کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔

درآمد شدہ ویکسینز

پاکستان میں درآمد شدہ ویکسینز بھی دستیاب ہیں اور نجی مارکیٹ میں استعمال ہوتی ہیں۔ FAO کے تعاون سے چلائے گئے منصوبوں میں ان ویکسینز کا کامیاب استعمال دیکھا گیا ہے، جس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ MEVAC™ PPR ایک زندہ کمزور شدہ مونو ویلنٹ ویکسین ہے جو بکریوں اور بھیڑوں کو PPR وائرس سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

موجودہ ویکسینیشن، حکمت عملیاں اور چیلنجز

پاکستان اور ہمسایہ ترقی پذیر ممالک میں موجودہ ویکسینیشن حکمت عملیاں ناکافی ہیں۔ صحیح ویکسینیشن پالیسیوں، ویکسین کی پیداوار کی سہولیات، اور ویکسین کی ترسیل کے نظام کی کمی کی وجہ سے PPR کی روک تھام میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ مزید برآں، ویکسینیشن کی کم شرح کی وجہ سے غیر ویکسین شدہ جانوروں کے بچے بغیر ماں کی اینٹی باڈیز کے پیدا ہوتے ہیں، جو انہیں بیماری کے لیے زیادہ حساس بناتا ہے۔

حکومتی اقدامات

پاکستان کی حکومت نے PPR کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ قومی حکمت عملی کا منصوبہ: پاکستان میں PPR کی روک تھام کے لیے قومی حکمت عملی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔

ویکسین کی مقامی پیداوار میں اضافہ: FAO کی مدد سے مقامی ویکسین کی پیداوار کو مضبوط کیا گیا ہے تاکہ ویکسین کی دستیابی میں بہتری آئے۔

ویکسینیشن مہمات: PPR کی تدریج کنٹرول اور خاتمے کے لیے حکمت عملی کے تحت ویکسینیشن مہمات چلائی جا رہی ہیں۔

نتیجہ

چھوٹے جگہ کی کرنے والے جانوروں کی طاعون ایک سنگین اور مہلک بیماری ہے، جو خاص طور پر بکریوں اور بھیڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر اس کا بروقت سدباب نہ کیا جائے تو یہ بیماری بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم، تشخیص، ویکسینیشن، قرنطینہ، صفائی، اور معاون علاج کے ذریعے اس بیماری پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ FAO اور OIE نے 2030 تک اس بیماری کے مکمل خاتمے کا ہدف مقرر کیا ہے۔

اور آنکھوں میں جلن شامل ہیں۔ بیماری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ منہ کے اندر زخم پڑ سکتے ہیں، جو شدید بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ شدید صورت میں خون آلود دست بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو 10 دن میں موت واقع ہو سکتی ہے۔

علاج

فی الحال اس بیماری کا کوئی مخصوص علاج موجود نہیں ہے، تاہم علاج میں معاون طریقے اپنائے جاسکتے ہیں تاکہ جانور کی حالت بہتر ہو اور ثانوی انفیکشنز کو روکا جاسکے۔

معاون علاج

- ☆ متاثرہ جانور کو آرام دہ اور صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے۔
- ☆ پانی اور غذائی ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ جانور میں پانی کی کمی نہ ہو۔
- ☆ بخار کو کم کرنے کے لیے اینٹی پیریٹک (مثلاً پینا ڈول یا اینٹی ایفلا میٹری ادویات) دی جاسکتی ہیں۔
- ☆ اگر جانور میں پانی کی شدید کمی ہو تو ڈریپ (IV فلوئیڈ تھراپی) لگائی جاسکتی ہے۔

علاماتی علاج

- ☆ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو اینٹی ہسٹامین اور بروئلڈ پیلیرز استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
- ☆ بیکٹیریل انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس (مثلاً اوکسی ٹیٹرا سائکلین) دی جاسکتی ہیں۔
- ☆ منہ کے زخموں کے لیے جراثیم کش محلول (مثلاً پوویڈون آؤڈین) کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

روک تھام اور کنٹرول

چھوٹے جگہ کی کرنے والے جانوروں کی طاعون سے بچاؤ کے لیے سب سے مؤثر طریقہ ویکسینیشن ہے۔ ایک بار ویکسین لگوانے کے بعد جانور میں زندگی بھر کے لیے اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں بیماری پھیل جائے تو فوری طور پر متاثرہ جانوروں کو قرنطینہ میں ڈال کر صحت مند جانوروں سے الگ کر دینا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور متاثرہ علاقوں میں جراثیم کش ادویات کا استعمال کیا جائے۔ شدید وباء کی صورت میں متاثرہ جانوروں کو ذبح کر کے مناسب طریقے سے تلف کیا جانا چاہیے تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے۔

پاکستان میں مستعمل PPR ویکسینز

پاکستان میں PPR کی روک تھام کے لیے مختلف ویکسینز استعمال کی جاتی ہیں:

مقامی طور پر تیار کردہ ویکسینز

ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور مختلف وائرس ویکسینز تیار کرتا ہے، جن میں PPR

شجری سوراخوں میں ڈینگی مچھروں کی نشوونما اور ان کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات

تحسین جاوید، ڈاکٹر وسیم اکرم، ڈاکٹر محمد طیب، ڈاکٹر عابد علی۔۔۔ شعبہ حشریات، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

شجری سوراخوں کا تعارف

شجری سوراخ مچھروں کی افزائش کے لیے ایک خاص قسم کا مسکن فراہم کرتے ہیں۔ عمل زیادہ تر پرانے درختوں کی مضبوطیت کے لیے مددگار ہے اور جانوروں کے لیے مسکن فراہم کرتا ہے۔

شجری سوراخوں کی اہمیت

درختوں کے سوراخ مختلف جانداروں کے لیے مناسب پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں جہاں وہ اپنے انڈے دیتے ہیں اور بچوں کو پرورش دینے کے لیے آتے ہیں۔ درختوں کے کھو کھلے حصے (شجری سوراخ) پرندوں، چھوٹے ممالیہ جانوروں (جیسے گلہریاں اور چمگادڑیں)، کیڑے مکوڑوں اور ریگنے والے جانوروں کے مسکن فراہم کرتے ہیں۔ بارش کا پانی درختوں کے ان کھوکھلے حصوں میں جمع ہوتا ہے، جو چھوٹے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور مختلف اقسام کے کیڑوں، پرندوں اور جانوروں کو افزائش نسل اور پناہ کی جگہ فراہم کرتے ہیں جس سے ماحولیاتی توازن برقرار رہتا ہے۔ یہ گڑھے مختلف اقسام کے مچھروں کی افزائش کا بھی ذریعہ بنتے ہیں جس میں خاص طور پر ایڈز مچھر جو ڈینگی زیکا اور چکن گونیا جیسی بیماریاں پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، شامل ہیں۔

شجری سوراخوں میں مچھری زندگی

شجری سوراخوں میں مچھری زندگی درخت کے سوراخوں میں موجود ماحول پر مبنی ہوتی ہے مچھر اپنے انڈے سوراخوں میں رکھتے ہیں جہاں اسکے انڈوں سے لاروا بنتا ہے۔ لاروا درختوں کے سوراخوں میں موجود پانی میں رہ کر بڑھوتری کے مختلف مراحل سے گزر کر بالغ مچھر میں نمونپاتے ہیں اس کے بعد وہ ہوا میں اڑ کر دوسرے مقامات پر جاتے ہیں اور اپنی بقا اور نسل کی افزائش کے لیے دوسرے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ مادہ مچھر دوسرے جانداروں کا خون پیتا ہے مچھر کا دورانیہ حدود دو ہفتوں سے ایک ماہ تک ہوتا ہے لیکن اس کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے اثرات زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں جو بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ مچھروں کی زندگی کا دورانیہ چار مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جن میں انڈا، لاروا، پیوپا اور بالغ مچھر شامل ہیں مادہ مچھروں کی مختلف اقسام مختلف مسکن پر انڈے دیتیں ہیں جہاں پانی کا ہونا لازمی ہے کچھ سچیشیز پانی کی موجودگی

میں ہی انڈے دیتی ہیں جبکہ ان میں ایک سچیشی ایڈز ایجیٹائی ایسی ہے جو فی والی جگہ پر انڈے دے سکتی ہیں جبکہ دو جنس اینوفلیز اور کیولکس ہمیشہ پانی کی موجودگی میں ہی انڈے دیتیں ہیں اور اگر پانی کسی وجہ سے خشک ہو جائے تو ان جنس کے انڈے خشک ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں جبکہ ایڈز ایجیٹائی کے انڈے پانی کی عدم موجودگی میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر درختوں کے سوراخوں میں مچھروں کی پیداوار کو دیکھا جائے تو زیادہ تر جو سچیشی درختوں کے سوراخوں میں اپنی نسل کو یقینی بناتی ہیں ان میں ڈینگی مچھر شامل ہے اور اگر پانی خشک بھی ہو جائے تو ایک سال تک ان کے انڈے زندہ رہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی پانی دوبارہ میسر ہو گا انڈے مزید نشوونما پا کر لاروے میں تبدیل ہو جائیں گے لاروا کا مرحلہ مزید چار مراحل پر مشتمل ہوتا ہے لاروے صرف پانی میں ہی رہتے ہیں یہ خوراک کے لیے چھوٹے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں اور 6 سے 7 دن میں اپنا دوران حیات مکمل کرتے ہیں۔ لاروا ان مختلف مراحل کے گزر جانے کے بعد بڑھوتری کے مزید اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے ہم پیوپا کہتے ہیں یہ زیادہ تر غیر غذائی مرحلہ ہوتا ہے جو دو دن تک محیط ہوتا ہے اور اس مرحلے میں نمونپا کر بالغ مچھر میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر بالغ مچھر پیوپل کیس سے باہر آتے ہیں اور پانی کی سطح ہے کچھ دیر آرام کرتے ہیں تاکہ ان کا بیرونی ڈھانچہ (ایگزوسکیلیٹل) مضبوط ہو جائے اور یہ پوری طرح سے اڑنے کے قابل ہو جائے بالغ مچھر ابتدائی دنوں میں خوراک کے لیے پھولوں کے جوس اور پودوں کے جوس پر انحصار کرتے ہیں۔ مادہ مچھر کو بلڈ میل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انڈوں کی افزائش کو یقینی بناسکیں۔ مادہ مچھر زیادہ تر بلڈ میل کے لیے انسانی میزبان کی تلاش کرتے ہیں اور اس طرح مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ مناسب حالات میں پورے ماحولیاتی اجزاء کی موجودگی میں مچھر کا دوران زندگی آٹھ سے دس دن تک ہوتا ہے۔

اگر درختوں کے سوراخوں میں مچھروں کی پیداوار کو دیکھا جائے تو زیادہ تر جو سچیشیز درختوں کے سوراخوں میں اپنی پیداوار کو یقینی بناتی ہیں ان میں ایڈز شامل ہے ایڈز کی مزید دو اقسام ہیں جو زیادہ تر شجری سوراخوں میں دیکھی گئی ان میں ایڈز ایلیپو پیٹکٹس اور ایڈز اسچپٹائی شامل ہیں۔

یہ مختلف قسم کے مسکن میں نشوونما پاتے ہیں ان میں درختوں کے سوراخ، بانس میں موجود سوراخ، دوسرے قدرتی اور مصنوعی پانی جمع کرنے والی جگہیں میں شامل ہیں۔

ایڈز ایلیوپٹیکس

یہ سببشی ایڈز ایلیوپٹیکس نام سے جانی جاتی ہے۔ جو مختلف قسم کے مساکن میں نشوونما پاتے ہیں ان میں درختوں کے سوراخ، بانس میں موجود سوراخ، دوسرے قدرتی اور مصنوعی پانی جمع کرنے والی جگہیں شامل ہیں۔ ایڈز ایلیوپٹیکس زیادہ تر بیرونی سببشی کے نام سے جانی جاتی ہے۔

ایڈز ایلیوپٹیکس

جبکہ ایڈز ایلیوپٹیکس اندرونی سببشی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مچھروں کی یہ سببشی مختلف طرح کی بیماریوں کے پھیلاؤ میں ویکٹرز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور یہ مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں جن میں ڈنگی، زیکا اور زرد بخار شامل ہے یہ سببشی بھی زیادہ تر درختوں کے سوراخوں میں اپنی پیداوار کو یقینی بناتی ہیں۔ جبکہ اس کاسب سے پسندیدہ مسکن گھروں کے اندر وہ جگہیں ہیں جہاں کم روشنی اور پانی جمع ہونے کے چانسز ہوں۔ جیسا کہ روم کولر، کپڑے دھونے والی مشین اور فریج وغیرہ۔

مچھروں کی زندگی کا دورانیہ

شجری سوراخوں میں مچھر پیدا ہونے کے اثرات

مچھر متاثرہ شخص کے جسم سے خون چوس کر براہ راست ایک نارمل شخص کے خون میں اپنے کاٹنے کے ذریعے اس مخصوص بیماری کے جراثیم داخل کرتے ہیں جس میں متاثرہ شخص مبتلا ہوتا ہے اسی طرح مچھروں کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو پھولوں کا رس چوستے ہیں اور براہ راست معشیت کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد پرانے درخت بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں ان پرانے درختوں میں سوراخ وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں میں ایڈز ایلیوپٹیکس اڈے دیتے ہیں۔ اور ان کے اڈے سوراخوں میں پانی کی موجودگی میں نشوونما پا کر لا روا پھر لا روا سے پیو پا اور پیو پاسے بالغ مچھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ مچھر اگر فی میل ہوئی تو اسے کسی میزبان کا (بلڈ میل) خون چوسنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح اگر اس فی میل مچھر نے کسی ایسے انسان کو کاٹا جو پہلے سے کسی وائرل بیماری میں مبتلا ہو تو یہ وائرس اس مچھر میں آجائے گا اور جب یہ مچھر کسی نارمل انسان کو کاٹے گا تو اس بیماری کے جراثیم ایک نارمل شخص میں منتقل ہو جائیں گے۔ ڈنگی کے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد 2023 میں رکارڈ کی گئی جس نے ڈبلیو ایچ او کے تمام خطوں کے 80 سے زیادہ ممالک کو متاثر کیا۔ 2023 کے آغاز سے لے کر اب تک جاری ٹرانسمیشن، ڈنگی کیسز میں غیر متوقع اضافے کے ساتھ 6.5 ملین سے زیادہ کیسز اور 7300 سے زیادہ ڈنگی سے ہونے والی اموات شامل ہیں۔ ڈنگی کی وبا کے پھیلاؤ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے

ساتھ کئی عوامل وابستہ ہیں۔ جن میں ویکٹرز کی بدلتی ہوئی تقسیم (بنیادی طور پر ایڈز ایلیوپٹیکس اور ایڈز ایلیوپٹیکس مچھر) بنیادی اہمیت کے حامل ہے۔

ڈنگی مچھر کی افزائش کی روک تھام کے لیے ہدایات اور تدابیر

البتہ مچھروں کی افزائش کو روکنا قدر مشکل کام ہے لیکن ہم کچھ احتیاطی تدابیر اپنا کر مچھروں کی افزائش مناسب حد تک روک سکتے ہیں چونکہ مچھروں کی زیادہ تر سببشی نمی والی جگہ پر اڈے دیتی ہیں اور نشوونما پانے کے لیے بھی نمی کا ہونا ایک لازمی جز ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمی والے مقامات کو کم سے کم کریں۔ اور ان سوراخوں کو بہترین طریقے سے بند کر نیکے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اور ہفتہ وار جا کر تجزیہ کیا جائے کہ اگر کوئی نیا سوراخ بنا تو اس کو مٹی اور پتوں سے بھر دیا جائے تاکہ شجری سوراخ مکمل طور پر بند ہو جائے۔

اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کے لیے باور کرایا جائے کہ شجری سوراخوں میں پانی جمع ہونے کا کوئی امکان نہ رہے تاکہ مچھروں کو افزائش کے لیے مسکن فراہم نہ ہو سکے۔ درختوں کے سوراخوں میں کھڑے ہونے پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام کیا جائے اس کے علاوہ جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں انہیں بھی مچھروں کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ مچھر بہت سے وائرسز کے ویکٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں یہ مچھر شجری سوراخوں میں جمع ہونے والے پانی میں اپنی پیداوار کو بڑھاتے ہیں اور اس طرح سے مختلف بیماریوں کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مچھروں کے لاروا کو مارنے کے لیے کیڑے مارا دویات کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ موسکیتو ریپیلنٹ کا استعمال کیا جائے اور سماجی سطح پر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ جگہ گندہ ڈالیں اور اپنی احتیاط کے لیے رات کو سونے کے لیے جالیوں کا استعمال کریں تاکہ ہر ممکن حد تک مچھروں کے منفی اثرات سے بچا جاسکے

ان اقدامات میں ویکٹرز کنٹرول کرنے اور گھر یلو کھڑے پانی کو صاف کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پینے کے پانی کی کلورینیشن اور آؤٹ ڈور کنٹینرز میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب لا روکش اور کیڑے مارا دویات کا استعمال شامل ہو سکتا ہے یا ان کو مناسب طریقے سے کور کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک بات گھر کے اندر کاٹنے کی ہے تو جلد پر مچھر بھگانے والے لوشن یا اسپرے، گھر یلو کھڑے مارا دویات ایروسل مصنوعات مچھروں کے کواٹل یا دیگر کیڑے مارا دویات کے استعمال کی ترغیب دلائی جائے جاسکے علاوہ گھر یلو تنصیبات جیسے کھڑکی اور دروازے کی سکرینیں وغیرہ صبح اور شام کے اوقات میں بند رکھیں اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشنرز وغیرہ کا استعمال بھی احتیاط سے کریں۔

(باقی صفحہ 32 پر)

کیڑے مار زرعی زہروں کے موثر اور محفوظ استعمال کے لئے بنیادی اور سنہری اصول

ڈاکٹر محمد دلدار خاں گوگی، ڈاکٹر محمد حامد بشیر، ڈاکٹر راشد رسول خان، ڈاکٹر محمد احسن خاں، ڈاکٹر وسیم اکرم، رابعہ رمضان، ڈاکٹر محمد طیب..... شعبہ حشرات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

لیبل کا باغور مطالعہ بھی زہروں کے موثر اور محفوظ استعمال کا ضامن ہے۔ لیبل کے اوپر زہروں کے متعلق بڑی اہم اور بنیادی معلومات (زہر میں موجود زہریلہ مادہ، زہر کا کیڑوں کا مارنے کا طریقہ، ہدف شدہ فصل، ہدف شدہ کیڑے، زہر کو استعمال کرنے کا طریقہ، زہر کو استعمال کرنے کیلئے مناسب حالات، طریقے اور سپریٹرز، احتیاتی اور حفاظتی اقدامات، زہروں کے سپرے اور فصل کی برداشت کا درمیانی وقفہ وغیرہ) لکھی ہوتی ہیں جن کو پڑنا اور ان پر عمل کرنا بڑی اہم ہوتا ہے۔ لہذا زہروں کے استعمال سے پہلے ان کے لیبل کو ضرور پڑھیں اور ان پر باقاعدہ عمل کریں۔

کیڑے مار زہروں کی مقدار اور سپرے مشین کی کیکل بریشن

سپرے مشین میں ڈالی جانے والی زہر اور پانی کی صحیح مقدار کا صحیح حساب لگانے اور سپرے مشین کے تمام حصوں اور ان کے افعال کو جاننے کے عمل کو کیکل بریشن کہتے ہیں۔ کیکل بریشن ناصرف زہروں کے نقصان دہ اثرات کو روکنے اور زہروں کے ضیاع کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ اچھی سپرے کو رینج کو یقینی بناتی ہے۔ اس لینے سپرے سے پہلے مکمل اور جامعہ کیکل بریشن نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر سپرے مشین کا کوئی حصہ متاثرہ ہو یا سفارش شدہ تفصیلات کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو تو اسکو تہذیب اور مشین کو صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے۔

صحیح نوزل کا استعمال

کیڑے مار زہروں کے موثر استعمال کیلئے ویسے تو سپرے مشین کا ہر حصہ اہم ہے مگر صحیح نوزل کا انتخاب نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ نوزل کا انتخاب سپرے کی جانے والی زہر کی قسم، سپرے کو رینج کی نوعیت، سپرے پیٹرن، اطلاقی قسم (براڈ کاسٹ، بینڈ، ڈائریکٹ سپرے وغیرہ) اور لیبل پر موجود سفارش شدہ تفصیلات کے مطابق کرنا چاہئے۔ کیڑے مار زہروں کے استعمال کیلئے کھلی مخروطی (Hollow Cone) نوزل کا استعمال اس وقت کریں جب اچھی سرایت اور کو رینج درکار ہو اور فلیٹ فین (Flate Fan) نوزل کا استعمال اس وقت کریں جب براڈ کاسٹ سپرے درکار ہو۔

کیڑے مار زہروں کا صحیح اور سفارش کردہ مقدار کے مطابق استعمال

ہمیشہ ٹینک میں کیڑے مار زہروں کی صحیح اور سفارش کردہ مقدار لیبل پر دی گئی ہدایات کے مطابق ڈالیں۔ سفارش شدہ مقدار سے کم یا زیادہ مقدار کے استعمال سے نہ تو

ہمارے ملک کے زرعی نظام میں زرعی زہروں کا استعمال ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں، جڑی بوٹیوں اور بیماریوں سے بچانے کیلئے لامحالہ کسان کو ان زرعی زہروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ان زرعی زہروں کا استعمال جہاں ناگزیر ہے وہاں ہمارے کسان اس کا بے جا اور غیر ضروری استعمال بھی کرتا ہے۔ ہمارے کسان ان زرعی زہروں کا استعمال یا تو صحیح طریقے سے نہیں کرتا یا پھر صحیح وقت پر نہیں کرتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسان ان بنیادی اصولوں کا ہرگز خیال نہیں کرتا جو کہ ان زرعی زہروں کے موثر اور محفوظ استعمال کے ضامن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسان ان زرعی زہروں کے بہت زیادہ استعمال کے باوجود نہ تو نقصان دہ کیڑوں، جڑی بوٹیوں اور بیماریوں کا مناسب اور موثر سدباب نہیں کر پاتا ہے اور نہ ہی اپنی فصل کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر پاتا ہے۔ کسان اگر زرعی زہروں کے موثر اور محفوظ استعمال کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھے تو وہ ناصرف اپنی فصلوں کو مضر کیڑوں، جڑی بوٹیوں اور بیماریوں سے بچا سکتا ہے بلکہ فصلوں کی پیداوار اور اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ کیڑے مار زرعی زہروں کے موثر اور محفوظ استعمال کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔

کیڑے مار زہروں کا صحیح انتخاب

کیڑے مار زہروں کا انتخاب فصل پر حملہ آور ضرر رساں کیڑوں کی شناخت کی بنیاد پر کریں۔ اگر حملہ آور کیڑے رس چوس کر نقصان پہنچانے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پودے میں سریت پذیری کی خاصیت رکھنے والی زہروں کا انتخاب کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر حملہ آور کیڑے کتر کر نقصان پہنچانے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پودوں کے حصوں پر لمسی خاصیت لی زہروں (Contact poisons) کا انتخاب کرنا چاہئے۔ اسی طرح کیڑے مار زہروں کا انتخاب انکی پی ایچ آئی (سپرے کے بعد اور فصل کی برداشت سے پہلے کام از کم دورانہ: Pre-Harvet Interval) کے مطابق کرنا چاہئے۔ اگر فصل کی برداشت نزدیک ہو تو ان زہروں کا انتخاب، جن کا پی ایچ آئی فصل کی برداشت کے وقت سے کم ہو، مناسب ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان زہروں کا انتخاب کریں جن کا پی ایچ آئی سپرے اور فصل کی برداشت کے درمیانی دورانیہ سے کم ہو۔

زہروں کے لیبل کا باغور مطالعہ

جہاں کیڑے مار زہروں کا صحیح انتخاب بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہاں ان کے

کیڑوں کا کنٹرول ہو پاتا ہے بلکہ الٹا زہروں کا ضیاع ہوتا ہے۔ کیڑے مار زہروں کے صحیح اور سفارش کردہ مقدار کے مطابق استعمال کو یقینی بنانے کیلئے ہمیشہ پہلے زہروں کی کیلی بریشن کریں۔

سپرے کے اوقات

کیڑے مار زہروں کے موثر استعمال میں سپرے کے بہترین اوقات کا انتخاب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سپرے کا نہایت موزوں اوقات وہ ہیں جب درجہ حرارت تقریباً 30 ڈگری (85 فارن ہائیٹ) سے نیچے ہو، ہوائی رفتار 3-8 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو، اور سپرے کے بعد کم از کم 6-8 گھنٹے تک باش کی پٹین گونی نہ ہو۔ صبح یا شام سپرے کیلئے نہایت موزوں اوقات تصور کئے جاتے ہیں۔

سپرے کرنے کا طریقہ

سپرے کو ہمیشہ ہوا کی مخالف سمت میں کرنے سے احتراز کریں۔ سپرے ہمیشہ ٹارگٹ پر کریں اور لہاتی یا زگ زیک سپرے کرنے سے احتراز کریں۔

ٹینک مکس کیلئے ہدایات پر عمل

کیڑے مار زہروں کا ٹینک مکس تیار کرنے کیلئے لیبل پر موجود ہدایات کو بغور پڑھیں اور لیبل پر موجود زہروں کی خصوصیات کے مطابق دو سے زیادہ زہروں کا ٹینک مکس تیار کریں۔ اگر لیبل پر کسی زہر کی کسی زہر کے ساتھ کیمیائی مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ٹینک مکس منع کی گئی ہو تو ان کا ٹینک مکس ہرگز تیار نہ کریں۔ اگر لیبل پر واضح ہدایات نہ ملیں تو ایک گلاس ٹسٹ ٹیوب، بیشیشہ کا گلاس وغیرہ لیں اور جن زہروں کا ٹینک مکس بنانا مقصود ہو ان کی تھوڑی تھوڑی مقدار اس میں ڈال لیں، اچھی طرح ہلائیں اور کچھ دیر رکھ دیں۔ ٹیسٹ ٹیوب یا بیشیشہ کے گلاس کو ہاتھ سے چھوئیں اگر گرم محسوس ہوں یا ان کے پینڈے میں پھسکڑیاں بن جائیں تو انکو ٹینک مکس میں ہرگز نہ ڈالیں۔

کیڑے مارزہروں کا محفوظ استعمال

کیڑے مارزہروں کے محفوظ استعمال کیلئے درج ذیل ہدایات پر عمل کریں

☆ سپرے کرنے سے پہلے تمام ذاتی حفاظتی اقدامات (PPEs: Personal Protective Equipments) مثلاً لونگ شوز، جگگزر، ماسک، دستانے، حفاظتی لباس وغیرہ ضرور پہنیں۔

☆ زہروں کو استعمال سے پہلے، استعمال کے دوران اور استعمال کے بعد ایسی جگہوں پر ہرگز نہ رکھیں، جہاں وہ انسان یا جانوروں کی پہنچ میں ہوں۔

☆ سپرے مکسنگ اور سپرے کرنے کے دوران کھانے، پینے یا سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔

☆ سپرے مکسنگ ہمیشہ کھلی اور ہوادار جگہ پر کریں۔

☆ اگر کپڑے یا جسم کا کوئی حصہ پیرے مخلول سے آلودہ ہو جائی تو فوراً ہر آلودہ کپڑوں کو اتار دیں اور ہر آلودہ جسم کے حصول کو اچھی طرح صاف پانی سے دھوئیں۔

☆ زہر آلودہ ہاتھوں سے آنکھوں اور جسم کے دسرے حساس حصوں کو ہرگز نہ چھوئیں۔

☆ زہروں اور ان کے باقیات، زہر آلودہ لوہنگ شوز، گولڈن ماسک، دستانے، حفاظتی لباس اور استعمال شدہ سپرے مشین گھر کے اندر یا جانور خانہ کے اندر ہرگز نہ رکھیں۔

☆ زہر آلودہ لونگ شوز، گولڈن ماسک، دستانے، حفاظتی لباس اور استعمال شدہ سپرے مشین کو اچھی دھوئیں اور پھر ان کو محفوظ مقام پر اور محفوظ طریقے سے رکھیں۔

☆ زہروں کو گریو استعمال کے خوراک کی کنٹینرز میں ہرگز نہ رکھیں بلکہ زہروں کو ان کے اصل پیکنگ میں رکھیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

☆ سپرے کے بعد زہروں کے پکینگ میٹیریل (کمٹینرز، ہیگز، پیپر ہیگز وغیرہ) اور دیگر باقیات کو مناسب محفوظ اور گھر سے دور مقام پر ڈمب کر دیں یا جلا دیں۔

گاتے۔ ریڈ گولڈ آف پاکستان

بقیہ:

میں پیدا ہونے والے پچھڑے گوشت کی پیداوار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان کو فربہ کرنے کے بعد مارکیٹ کیا جائے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ غیر ملکی خون 50 فیصد سے بڑھنے نہ پائے اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ 50 فیصد غیر ملکی خون کی حامل گائیوں کو 50 فیصد غیر ملکی خون کے حامل ساڈ بیلوں کے پاسمین سے نسل کشی کروائیں۔

<<<<<<<>>>>>>

اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ نیشنل بڑی ٹنگ پالیسی پر عمل کیا جائے اور مخلوط نسل کشی کے لیے عام دیسی گائے جن کی تعداد کافی زیادہ ہے ان کو استعمال میں لایا جائے۔ اگر ان دیسی گائیوں کو فریشن سیمن سے کراس کروایا جائے تو جو بچھڑیاں پیدا ہوں گی ان میں 50 فیصد غیر ملکی خون ہوگا۔ یہ گائیں ہمارے حالات میں پیداواری لحاظ سے موزوں ترین شمار ہوتی ہے۔ یہ گائیں تقریباً 16 سے 17 مہینے کی عمر پر بالغ ہو جائیں گی اور 30 مہینے کی عمر پر بچہ دیں گی۔ ان کی فی نباتت پیداوار بھی 3000 لیٹر کے قریب ہوگی۔ مخلوط نسل کشی کے نتیجے

چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں بروقت تشخیص اور غذا کا کردار

پروفیسر ڈاکٹر عمران پاشا، ماہ نور ظفر، سعدیہ عنصر..... نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

مطابق پاکستان میں کینسر کے واقعات میں ہر سال مسلسل 24.1 فیصد اضافہ ہوتا ہے جن میں چھاتی کا سرطان سب سے عام ہے۔ سال 2020 میں 25 ہزار 928 کیسز رپورٹ ہوئے جو دیگر چھاتی کے سرطان کے مقابلے میں 14 فیصد زیادہ تھے۔ تشخیص میں دیر ہونا شرح اموات میں اضافے کی نمایاں وجہ ہے جس میں اکثر سماجی و ثقافتی عوامل کا عمل دخل ہوتا ہے۔

خطرے کے عوامل

بہت سے عوامل چھاتی کے سرطان پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں جینز، عمر، موروثی عوامل اور طرز زندگی کا انتخاب شامل ہیں۔ دیگر عوامل میں قبل از وقت حیض، مینو پاز میں تاخیر، بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانا یا کم پلانا، مینو پازل ہارمون ری پلیسمنٹ تھراپی، موٹاپا اور جسمانی غیر فعالیت جو چھاتی کے سرطان کا سبب بنتے ہیں۔ جسم کے اضافی وزن کو پوسٹ مینو پازل چھاتی کے سرطان کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑا گیا ہے اور بڑھتے ہوئے شواہد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موٹاپا ابتدائی مرحلے کے چھاتی کے سرطان کی غلط تشخیص اور بروقت تشخیص نہ ہونے کا باعث ہے۔

متوازن غذا اور چھاتی کا سرطان

بچوں، سبزیوں، اناج اور صحت افزا فیٹس سے بھرپور متوازن غذا، پروسیڈ خوراک اور الکوحل سے پرہیز کے ساتھ مل کر، چھاتی کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ ٹرانس اور پیچور فیٹس کی زیادہ مقدار جو اکثر پروسیڈ خوراک اور سرخ گوشت میں شامل ہوتی ہیں، کو چھاتی کے کینسر کے عوامل میں سے ایک ہونے کے باعث اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسٹروجن کی سطح اور چھاتی کے سرطان کے درمیان تعلق بھی چھاتی کے سرطان کے واقعات پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔

بایو ایکٹو کمپاؤنڈز اور چھاتی کا سرطان

پودوں کی خوراک میں بایو ایکٹو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں فائو کیمیکل بھی کہا جاتا ہے۔ فائو کیمیکلز جیسے فینولک ایڈز، کیروٹینائڈز، فائو سیڈرولز، لیگننز، انفقو سائیننز، وٹامن ای اور پولی سیکیرائڈز اناج میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ قدرتی اجزاء جیسے فینولک، فلیوینائڈز، کیروٹینائڈز وغیرہ، بڑھتے ہوئے کارسینوجینک کمپاؤنڈز اور ریڈوکس رد عمل کے عدم توازن کی وجہ سے بڑھتی ہوئی علامات جیسے جینٹو

چھاتی کا کینسر دنیا بھر میں سب سے زیادہ پائے جانے والا اور عام کینسر میں سے ایک ہے۔ اس مرض میں کینسر کے خلیے چھاتی کے اندر بڑھتے ہیں اور بڑھ کر ٹیومر بناتے ہیں۔ یہ ٹیومر کبھی کبھار بینائٹ ہوتا ہے (جو آسانی سے نہیں پھیلتی) یا میٹاسٹیز ہوتا ہے (جو جسم میں غیر معمولی طور پر پھیلتا ہے)۔ کینسر کی مختلف اقسام اور مراحل ہوتے ہیں جنہیں بروقت تشخیص اور علاج سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔

چھاتی کے کینسر کا عالمی دن

ہر سال دو اکتوبر کو چھاتی کے کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اکتوبر کو چھاتی کے کینسر کی آگاہی کے مہینے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جس میں پنک ربن ایک "پنک ٹور" کے نام سے تیس دن کی آگاہی مہم چلتا ہے اور سماجی کارکنان، ماہرین صحت اور ماہرین غذا ایت سے لیکر قانون ساز ادارے سب شرکت کرتے ہیں۔ پنک ربن پاکستان میں پچھلی دو دہائیوں سے چھاتی کے کینسر پر کام کرنے والی واحد تنظیم ہے۔ اس کا مقصد چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہونے والی شرح اموات کو کم کرنا ہے۔ پنک ربن خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ انہیں ایک صحت مند طرز زندگی کو اپنانے اور چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے طریقے بتائے جاسکیں۔ تحقیق کے مطابق حفاظتی تدابیر اپنانے سے چھاتی کے کینسر کا خطرہ چالیس فیصد تک کم کیا جاسکتا ہے۔

علامات

جسمانی ظاہری شکل میں تبدیلیاں جیسے چھاتی کا سائز، نیل کی شکل میں تبدیلی، نیل کا لٹا ہونا، یا چھاتی میں گانٹھ کا ہونا۔ چھاتی کی جلد کے نیچے یا بازوؤں کے نیچے کے علاقے میں بڑے پیمانے پر گلی دیکھی جاسکتی ہے۔ چھاتی کے سرطان کے مریضوں میں نیل سے رطوبت کا اخراج بھی بہت عام ہے۔

اعداد و شمار

دنیا بھر میں 2020 میں کینسر کے 9.2 ملین نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے جن میں چھاتی کا سرطان (بی سی) سب سے زیادہ عام ہے جو کل کیسز کا 24.5 فیصد ہے۔ ہر سال کینسر سے 4.4 ملین اموات ہوتی ہیں۔ چھاتی کا سرطان 15.5 فیصد کے ساتھ دنیا بھر میں خواتین میں کینسر سے متعلق اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے

وٹامن ای ایک مقبول اینٹی آکسیڈینٹ وٹامن ہے جو موتیا، دل کے امراض، پھاتی، کولن اور پروسٹیٹ کینسر کے ساتھ ساتھ متعدد اعصابی امراض میں فری ریڈیکلز سے ڈی این اے کو پہنچنے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ فیٹس میں موجود فینولک مرکبات جیسے کہ ٹو کوٹرا اینولز اور ٹو کوفیرول (-B-Y، -، 5-ٹو کوفیرول) کے نام سے جانا جاتا ہے جو وٹامن ای کی اہم شکلیں ہیں۔ یہ پیر آکسیڈیشن کے عمل کو کنٹرول کر کے، جسم کی فری ریڈیکلز کی تخلیق کو محدود کرتے ہیں اور انسانوں میں سرطان کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔

چھاتی کے سرطان کی بروقت تشخیص

<<<<<<<>>>>>>

وٹامن ڈی مختلف قسم کے ہائیڈروفوبک مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی بنیادی شکل وٹامن ڈی 3 ہے، جسے کوئی کیلسیفر بھی لہجہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ کا کردار بھی ادا کرتا ہے، جو متعدد اینٹی آکسیڈنٹ انزائمز کے کام میں مدد دیتا ہے۔ مثال

بقية:

اسی طرح ایک LNP-mRNA ویکسین کا چوہوں میں تجربہ کیا گیا۔ اس ویکسین نے موجودہ وائرس کے خلاف ایک مناسب حد تک حفاظت مہیا کی اور یہ ثابت کیا کہ اس ویکسین کو مستقبل میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تجربہ میں پرندوں کے اس وائرس کی ویکسین کو گایوں میں لگایا گیا۔ اس ویکسین نے گایوں کے اندر ایک جلد اور مناسب مدافعت پیدا کی۔ یہ مدافعتی نظام اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے گایوں کے اندر وائرس کے پھیلاؤ کو کامیابی سے روکا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویکسین کے لگانے کی جگہ پر

<<<<<<>>>>>>

ٹماٹر کی اہمیت اور اس کے فوائد

حفصہ جنت، ڈاکٹر فہر رسول، ٹوبہ شہزاد، ڈاکٹر حسن منیر، حافظہ اقراء الماس، اقراء نعیم..... شعبہ باٹنی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پیداوار کا فرق 25.1 ٹن فی ہیکٹر ہے۔ ٹماٹر کی متوقع پیداوار سندھ میں 7.69 ٹن فی ہیکٹر، بلوچستان میں 9.78 ٹن فی ہیکٹر اور کے پی کے میں 11.64 ٹن فی ہیکٹر ہے۔

ٹماٹر کی اقسام

انسان صدیوں سے ٹماٹر کی کاشت کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں ٹماٹر تقریباً 10,000 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جن میں گلابی سے جامنی، پیلے سے سفید اور کچھ سیاہ بھی شامل ہیں۔ ٹماٹر کی کچھ اہم اقسام یہ ہیں:

- روما (Roma) (Sungold)
- سبز زبرا (Green Zebra)
- چروکی جامنی (Cherokee Purple)
- برانڈی وائن (Brandywine)
- مارنچ لفر (Mortgage Lifter)
- بغیر بیج کی کشمش (Currant)
- چیری (Cherry)

گلوب ٹماٹر

یہ ٹماٹر ایک عام قسم ہے جو بہت بڑے، گول اور سرخ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھی بڑی دکانوں سے مل سکتے ہیں۔ یہ ٹماٹر جنہیں سلائنگ ٹماٹر بھی کہا جاتا ہے سینڈ وچ اور سلاڈ کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔

چیری ٹماٹر

یہ ٹماٹر تھوڑا سا گول ہوتا ہے۔ چیری ٹماٹر کو جنگلی کرینٹ قسم کے ٹماٹروں اور گھریلو باغیچے کے ٹماٹروں کے درمیان جینیاتی مرکب سمجھا جاتا ہے۔ چیری ٹماٹر انگوٹھے کی نوک کی طرح چھوٹے، گولت بال کی طرح بڑے، کروی سے قدرے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔

☆ متعین ٹماٹر (Determinate tomatoes)

ایک بار جب پھول ٹہنیوں کے ٹرمینلز پر اگتے ہیں تو طے شدہ شکلیں (Determinate forms) ان کی پیداوار بند کر دیتی ہیں مثلاً Rutgers،

Roma وغیرہ۔

☆ غیر متعین ٹماٹر (Indeterminate tomatoes)

ٹماٹر کی غیر متعین اقسام ڈنٹھل (stalks) کے اطراف میں کھلتی ہیں پھر بھی وہ اس وقت تک بڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ موسم ناساز گار نہ ہو جائے مثلاً بیت اسٹیک (Beefsteak)، گولڈی (Goldie)، زیادہ تر چیری کی اقسام (most)

ٹماٹر ایک پھل یا سبزی ہے۔ جو ٹماٹر کے خاندان سولاناسی سے تعلق رکھتا ہے۔ انواع کی ابتدا جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ میں ہوئی۔

ٹماٹروں کو نباتاتی اعتبار سے پھل کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پھول سے اگتے ہیں اور ان میں بیج ہوتے ہیں۔ پھر بھی وہ بڑے پیمانے پر کھانا پکانے میں سبزیوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ٹماٹر ایک سالانہ پودا ہے جو گرم موسم میں اگایا جاتا ہے اور اس کا اوسط درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ سے 29 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کی دو فصلیں عام طور پر بہار اور خزاں کے موسموں میں آگائی جاتی ہیں۔

لائکوپین

ٹماٹر لائکوپین کا بنیادی ذریعہ ہیں جو ایک ایسا اینٹی آکسیڈینٹ ہے جو کہ صحت کے متعدد فوائد سے منسلک ہے۔ یہ دل کی بیماری اور کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اس میں وٹامن سی، وٹامن کے، پوٹاشیم اور فولیٹ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

لائکوپین ٹماٹر کے علاوہ دیگر سرخ پھل اور سبزیوں جیسے سرخ گاجر، تربوز، چکوترا اور پیسٹے میں پائی جاتی ہے جو ایک شاندار سرخ کیروٹینائیڈ ہائیڈروکاربن ہوتا ہے۔ یہ اسٹیریائی یا چیری میں نہیں پائی جاتی ہے۔

لائکوپین کے مضر اثرات

اس میں کم بلڈ پریشر، خون بہنے کا بڑھتا ہوا خطرہ اور معدے کے مسائل شامل ہیں۔ لائکوپینیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں لائکوپین سے بھرپور کھانا کھانے کے بعد جلد نارنجی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کی مجموعی فصل کا 70 فیصد دسمبر اور جون کے درمیان کاشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے قیمتوں میں اضافہ دستیابی کے نتیجے میں گر جاتا ہے تاہم چونکہ جولائی اور نومبر کے درمیان گل پیداوار کا صرف 30 فیصد کاٹا جاتا ہے۔ اس لیے قلت کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔

پاکستان میں ٹماٹر کی پیداوار

پاکستان میں سبزیوں کی کل پیداوار کا تقریباً 49 فیصد ٹماٹر کی کاشت پر مشتمل ہے۔ 2020 میں پاکستان نے تقریباً 5.5 ملین ٹن سبزیاں کاشت کیں۔

پاکستان ٹماٹر کی پیداوار میں دنیا میں 33 ویں نمبر پر ہے۔ عالمی اوسط پیداوار 35 ٹن فی ہیکٹر ہے تاہم پاکستان میں پیداوار 9.90 ٹن فی ہیکٹر ہے۔ جس کے نتیجے میں

Cherry-types) اور ورثے کے ٹماٹر (heirloom tomatoes)۔

ٹماٹر کو محفوظ کرنا

ٹماٹر کو منجمد (freeze) کرنے سے پہلے مکمل طور پر پلینج کیا جاسکتا ہے۔ ٹماٹروں کو دھو کر گول کاٹ لیں اور ابلتے ہوئے پانی میں پلینج کریں تاکہ انہیں منجمد کر سکیں۔ ٹماٹروں کو کوکی شیٹ (cookie sheet) پر چند گھنٹوں کے لیے یا اس وقت تک منجمد کریں جب تک کہ وہ مکمل طور پر جم نہ جائیں۔ ٹماٹروں کو فریزر بیگز یا ایئر ٹائٹ فریزر کنٹینرز میں محفوظ کریں۔ ٹماٹر کو کچپ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو چٹنی کے طور پر کھانے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

گندے پانی میں اگے ہوئے ٹماٹر کے مضر اثرات

جب آلودہ پانی کو فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو تحلیل شدہ بھاری دھاتیں پودوں کی نشوونما پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اور صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ گندہ پانی ایک پیچیدہ ذریعہ (complex resource) ہے جس کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں۔ گندے پانی کے استعمال کی بنیادی وجوہات میں متبادل پانی کی فراہمی کی کمی، گندے پانی کی فراہمی کا استحکام، غذائیت کی قیمت اور شہری بازاروں سے مطابقت شامل ہے۔ بہت زیادہ پانی کی فراہمی پکے ہوئے پھلوں کی جڑوں کو کمزور بنا دیتا ہے جو کہ ان کے ٹوٹنے اور پھٹنے کا سبب بنتا ہے۔ پانی کی کمی فصلوں کی پیداوار کو کم کر دیتی ہے اور بلا سم ایئر سروس جیسے مسائل کا سبب بنتی ہے۔

ٹماٹروں میں ہٹائین پایا جاتا ہے جو ایک ایسا کیمیکل ہے جو جلد پر غارش یا الرجی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں منہ، زبان اور پھرے پر سوجن کے ساتھ ساتھ چھینک اور گلے میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔

• ایڈر یفلکس / دل کی جلن (Heartburn / Acid Reflux)

• گردے کے مسائل (Kidney issues)

• خراش پذیر آنتوں کا سندروم (Irritable Bowel Syndrome)

• اسہال ضرورت سے زیادہ سوڈیم (Excessive Sodium)

• لائکوپینو ڈرمیا (Lycopene dermatitis)

• یورین کے مسائل (Urinary issues)

ٹماٹر کی دوغلی نسل (tomato of Hybrids)

پودوں کے پالنے والے ایک ہی پودے کی دو مختلف اقسام کے جینز کے تبادلے سے ہائبرڈ ٹماٹر بنتے ہیں جس کے نتیجے میں بیج یا ہائبرڈ دونوں پودوں کی بہترین خصوصیات

کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پودوں کی ایک ہی نسل کے ارکان کے درمیان کراس پولینیشن ایک فطری عمل ہے۔ روایتی ٹماٹر کے پودوں کی نسبت ہائبرڈ ٹماٹروں کا ایک اہم فائدہ بیماریوں کے خلاف مزاحمت کو بہتر بنانا ہے۔ ورٹیکسٹیم ولٹ اور فیوزیریم ولٹ دو فنکشنل بیماریاں ہیں جو ٹماٹر کے پودوں کو متاثر کرتی ہیں اور ان کے خلاف زیادہ مزاحمت فراہم کرنے کے لیے کئی ہائبرڈ قسمیں تیار کی گئی ہیں۔

ٹماٹر کی رنگ پر مبنی اقسام

سرخ ٹماٹر کی اقسام

سرخ ٹماٹر سب سے زیادہ پانی جانے والی قسم ہے۔ بیٹر بوائے (Better Boy)، اری گرل (Early girl) اور بیف سٹیک (Beefsteak) سرخ ٹماٹر کی کچھ مشہور اقسام ہیں۔

گلابی ٹماٹر کی اقسام

ان ٹماٹروں کا رنگ سرخ ٹماٹر کی قسم کے مقابلے میں قدرے ہلکا ہوتا ہے۔ ان میں درج ذیل شامل ہیں:

• گلابی برانڈی وائن (Pink Brandywine)

• کیپسین گلابی (Caspian Pink)

• تھائی گلابی انڈا (Thai Pink Egg)

اور خٹ ٹماٹر کی اقسام

ٹماٹر کی پرانی اقسام میں نارنجی ٹماٹر کی کمزورت سے پانی جاتی ہیں۔ نارنجی ٹماٹر درج ذیل اقسام میں پائے جاتے ہیں۔

• ہوائی انناس (Hawaiian Pineapple)

• کیلوگ کا ناشہ (Kellogg's Breakfast)

ٹماٹر کی سبز اقسام

عام طور پر سبز ٹماٹر کھانے کے طور پر استعمال نہیں ہوتے۔ ان میں درج ذیل اقسام شامل ہیں۔

• جرمن سبز پٹی (German Green Stripe)

• گرین مالڈوین (Green Maldovan)

• سبز زبرا (Green Zebra)

(باقی صفحہ 65 پر)

مکئی کے تنے کی سنڈی (MAIZE STEM BORER)

ڈاکٹر زبیر اسلم، محمد بلال ظفر، واجد علی، محمد عبداللہ طارق، رانا محمد مظاہر، محمد عبداللہ، ڈاکٹر شکیل احمد انجم..... شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

باجرہ: موتی باجرہ اور گول باجرہ بھی مکئی کے تنے کی سنڈی تھر تھراہٹ کے خطرے میں ہیں، انہیں بھی مکئی اور جوار کی طرح نقصان ہوتا ہے۔

3- دیگر ممکنہ میزبان

پنی سیٹم کی انواع (Pennisetum species) پیئر گھاس اور دیگر پنی سیٹم کی انواع مکئی کے تنے کی سنڈی کے متبادل میزبان بن سکتے ہیں، حالانکہ عام طور پر یہ حملے کم سنگین ہوتے ہیں۔

جنگلی جوار: کچھ جنگلی جوار کی اقسام مکئی کے تنے کی سنڈی آبادیوں کو پناہ دے سکتی ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ آبادیوں کو کاشت والی فصلوں میں پھیلنے میں مدد کر سکتی ہیں۔
گھاسیں (Grasses): کچھ جنگلی گھاسیں جیسے جاسن گھاس اور روڈ زگھاس کبھی کبھی مکئی کے تنے کی سنڈی کی میزبانی کر سکتی ہیں، لیکن ان کا آبادی کی بقا میں کیا کردار ہے یہ واضح نہیں ہے۔

اثرات اور نقصانات

مردہ دل (Dead heart): ابتدائی لارو اوٹلی پودوں کو کھاتے ہیں، جس سے مرجھانا اور روکھی ہوئی نمو ہوتی ہے۔

تنے میں سوراخ اور ٹوٹا: بڑے لارو تنے میں سوراخ کر دیتے ہیں، جس سے پودا کمزور ہو جاتا ہے اور ممکنہ طور پر وہ جھک سکتا ہے اور فصل کی پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے۔

اناج کی کم معیاری کیفیت ناقص پودے اکثر چھوٹے اور کم معیار کے دانے پیدا کرتے ہیں۔ معاشی نقصان شدید انجینئرنگ کاشتکاروں کے روزگار اور علاقائی خوراک کی سلامتی پر نمایاں طور پر اثر انداز کر سکتا ہے۔

مکئی کے تنے کی سنڈی کیوں ایک چیلنج ہے؟

مختلف پودوں کو متاثر کرتا ہے

مکئی کے علاوہ، یہ جوار اور گننا جیسی دیگر فصلوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس سے کنٹرول زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔

سال میں کچل

سازگار حالات میں، مکئی کے تنے کی سنڈی ایک ہی موسم میں کچل مکمل کر سکتا ہے، جس سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور فصلوں پر شدید باؤ پڑتا ہے۔

مکئی کے تنے کی سنڈی (Maize stem borer)، جسے Chilo

partellus بھی کہا جاتا ہے، ذیلی صحارا افریقہ کا ایک بدنام زمانہ کیڑا ہے، جو دنیا بھر میں مکئی کی پیداوار کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہ چھوٹے لیکن تباہ کن پیٹنگے مکئی کی فصلوں پر تباہی مچاتے ہیں، جس سے فصل کی پیداوار میں نمایاں کمی اور معاشی نقصان ہوتا ہے۔

حیاتیات اور ظاہری شکل

بالغ تقریباً 25-35 ملی میٹر پچھوں کے فاصلے کے ساتھ چھوٹے پیٹنگے، جن کی خصوصیات بھوسے کے رنگ یا بھورے رنگ کے آگے والے پنکھ اور سفید یا بلکے رنگ کے پچھلے پنکھ ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر رات کے وقت سرگرم ہوتے ہیں۔

لاروا: تباہی کرنے والا مرحلہ لمبائی میں 40 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ وہ کریم رنگ سے گلابی رنگ تک گہرے بھورے رنگ کے دسر کی کپسول اور جسم کے ساتھ چھوٹے سیاہ دھبوں کی قطاریں رکھتے ہیں۔ یہ لالچی لاروا مکئی کے تنے میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور اندرونی بافتوں کو کھاتے ہیں۔

حیاتیاتی سائیکل: انڈے پتوں یا تنوں پر خوشوں میں ڈالے جاتے ہیں، جن سے نکلنے والے لاروا پودے میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ وہ کئی مرحلوں سے گزرتے ہیں، اور ہر تبدیلی کے ساتھ بتدریج زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیوپے تنے کے اندر بنتے ہیں، اور آخر کار بالغ پتنگوں کے طور پر ابھر کر دوبارہ سائیکل شروع کرتے ہیں۔

میزبان پودے: (Host Plants)

1- مقدمہ میزبان

مکئی: مکئی کے تنے کی سنڈی کا پلندہ میزبان ہے اور اس کی تھر تھراہٹ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لارواتوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، جس سے مرجھانا، تنے کا ٹوٹنا اور پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔

2- ثانوی میزبان

جوار: مکئی کی طرح جوار پر بھی مکئی کے تنے کی سنڈی لاروا حملہ آور ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تنے میں سرنگیں بن جاتی ہیں، پیداوار کم ہو جاتی ہے اور جھکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
گننا: گننے کے موٹے تنے مکئی کے تنے کی سنڈی لاروا کے لیے مناسب رہائش فراہم کرتے ہیں، جس سے پیداوار میں کمی ہوتی ہے اور پنی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

دینے والی آبادی کم ہو جاتی ہے۔

فریکل رکاوٹیں

نوعمر پودوں کو ابتدائی لاروا کے حملے سے بچانے کے لیے نیٹ یا جال کی اسکرین استعمال کریں۔

3- حیاتیاتی کنٹرول

قدرتی دشمن مکئی کے تنے کی سنڈی کے انڈوں اور لاروا کو کھانے والے قدرتی دشمنوں جیسے بھرے، پیراسیٹک نیماٹوڈ اور شکاری کیڑوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی حفاظت کریں۔

حیاتیاتی کیڑے کش ادویات

ایسے بیکٹیریائی یا فنگل حیاتیاتی کیڑے کش ادویات استعمال کریں جو مخصوص طور پر مکئی کے تنے کی سنڈی کے لاروا کو نشانہ بناتے ہیں اور فائدہ مند کیڑوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔

4- کیمیاوی کنٹرول

کیڑے کش ادویات: آخری حربے کے طور پر رجسٹرڈ کیڑے کش ادویات کا استعمال کریں جو خاص طور پر مکئی کے تنے کی سنڈی کے لاروا کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں انڈے دینے یا نکلنے کے عروج کے دوران حکمت عملی کے ساتھ لگائیں۔

(Integrated Pest Management (IPM

سب سے موثر طریقہ اکثر ان میں سے کئی طریقوں کو IPM حکمت عملی میں جوڑنا شامل ہے۔ اپنے علاقے، فصل کے نظام اور مکئی کے تنے کی سنڈی کے دباؤ کے مطابق اپنے انداز کو ڈھالنے سے، آپ ماحولیاتی اثرات کو کم کرتے ہوئے پائیدار اور موثر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔

اضافی نکات

اپنے علاقے کے لیے IPM پروگرام تیار کرنے میں سفارشات اور مدد کے لیے مقامی زراعت کی توسیعی خدمات یا فصل کے ماہرین سے مشورہ کریں۔ مکئی کے تنے کی سنڈی کے ابتدائی حملے کی نشانیوں کے لیے اپنے کھیتوں کی باقاعدگی سے نگرانی کریں تاکہ بروقت کنٹرول کے اقدامات اٹھائے جاسکیں۔ اپنے منتخب انتظامات اور ان کی تاثیر کا درست ریکارڈ رکھیں تاکہ آنے والے سیزن کے لیے اپنے طریقہ کار کو بہتر بناسکیں۔ یاد رکھیں، مکئی کے تنے کی سنڈی کے انتظام کے لیے ایک ذہین اور کثیر الجہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان حکمت عملیوں کے مجموعے کو لاگو کر کے، آپ اپنی مکئی کی فصل کی حفاظت کر سکیں۔

کیڑے کش ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا

کیڑے کش ادویات پر زیادہ انحصار کیڑے کش دواؤں کے خلاف مزاحمت پیدا کر سکتی ہے، جس سے کنٹرول مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔

مکئی کے تنے کی سنڈی کا کنٹرول

خوش قسمتی سے، مکئی کے تنے کی سنڈی کی آبادیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف انتظامات کیے جاسکتے ہیں:

مکئی کے تنے کی سنڈی سے بچاؤ کی تدابیر

1- زرعی طریقے

فصل کی گردش

کیڑے کی افزائش کے چکر کو توڑنے اور مکئی کے تنے کی سنڈی کے حیاتیاتی سائیکل کو متاثر کرنے کے لیے مکئی کو بغیر میزبان فصلوں جیسے دالوں یا چاول کے ساتھ گھمائیں۔

انٹرکراپنگ

مکئی کے تنے کی سنڈی کو دور رکھنے کے لیے غیر میزبان فصلوں جیسے ٹریپ فصلات (جوار) یا مٹر گھاس کے ساتھ ساتھ مکئی لگائیں۔

جلدی پودا لگانا

فصل کی بروقت نموی اجازت دینے اور مکئی کے تنے کی سنڈی کے زیادہ حملے سے بچنے کے لیے موسم کے ابتدائی دور میں مکئی لگائیں۔

کھیت کی صفائی

فصل کی باقیات کو کاٹنے کے بعد تلف کریں تاکہ ایم ایس بی کے لاروا اور پیوپے کے سردیوں میں گھر ختم ہو جائیں۔

گہری جوتائی

فصل کاٹنے کے بعد گہری جوتائی کچھ پیوپے کو دفن کر سکتی ہے اور ان کے ابھرنے کو روک سکتی ہے۔

2- مکینیکل اور فزیکل کنٹرول

انڈے ہٹانا اور دیکھ بھال

کھیتوں کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور انڈے ہاتھ سے ہٹا دیں یا انہیں قدرتی دشمنوں جیسے پرندوں کی طرف راغب کریں۔

لائٹ ٹریپ

بالغ پتنگوں کو پھنسانے کے لیے لائٹ ٹریپ استعمال کریں، جس سے انڈے

کھجور: تاریخ، تہذیب اور تندرستی کا علامتی پھل

پروفیسر ڈاکٹر شازیہ رمضان..... ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومنیز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

صدیوں پہلے اشارہ کیا تھا۔ طبی لحاظ سے کھجور میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں:

1. توانائی کا قدرتی ذریعہ: کھجور میں قدرتی شکر (گلوکوز، فکٹوز) کی موجودگی فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔

2. ہاضمے میں بہتری: فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ معدے کی کارکردگی بہتر بناتی ہے اور قبض سے بچاتی ہے۔

3. دل کی صحت: پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے معدنیات دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔

4. حمل اور زچگی میں مفید: قرآن مجید میں حضرت مریم علیہا السلام کے واقعے میں درجہ کے دوران کھجور کے استعمال کا ذکر آتا ہے۔ جدید تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کھجور زچگی کو آسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔

5. اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ: کھجور میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فوری ریڈیکلز سے بچاتے ہیں، جو بڑھاپے اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔

نتیجہ: کھجور ایک ایسا پھل ہے جو محض غذائیں، بلکہ تاریخ، ثقافت، مذہب اور صحت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ہمارے روحانی ورثے کا حصہ بھی ہے اور سائنسی طور پر ثابت شدہ طبی نفع بھی۔ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس پھل کی اہمیت کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنی روزمرہ خوراک میں اسے شامل کر کے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیں۔

کھجور (Date) ایک ایسا پھل ہے جو نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہے بلکہ اسلامی تاریخ، تمدن اور معاشرت میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ قدیم تہذیبوں سے لے کر آج کے جدید معاشروں تک، کھجور کو روحانی، سماجی اور طبی لحاظ سے بے پناہ اہمیت حاصل رہی ہے۔

تاریخی اہمیت: کھجور کا استعمال انسان صدیوں سے کر رہا ہے۔ قدیم مصری، بابلی اور ایرانی تہذیبوں میں یہ پھل خوراک اور دوا دونوں حیثیتوں سے جانا جاتا تھا۔ عرب علاقوں میں کھجور کو بنیادی غذا کا درجہ حاصل تھا۔ یہ وہ پھل ہے جو صحرائی زندگی کے لیے نہایت موزوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ طویل عرصے تک ذخیرہ کیا جاسکتا ہے اور فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کھجور کا مقام: اسلامی تاریخ میں کھجور کی خاص اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں 20 سے زائد مقامات پر کھجور کا ذکر آیا ہے، جس سے اس کی روحانی و معاشرتی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی۔ آپ روزہ کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ایک حدیث کے مطابق: ”جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔“ (ترمذی) عید الفطر اور عید الاضحی جیسے مواقع پر بھی کھجور کا استعمال ایک روایت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔

طبی فوائد: جدید سائنس نے بھی کھجور کے فوائد تسلیم کیے ہیں جن کی طرف اسلام نے

ٹماٹر کی اہمیت اور اس کے فوائد

بقیہ:

جامنی ٹماٹر کی اقسام یا سیاہ ٹماٹر کی اقسام

- کیلوری: 18
- پانی: 95 فیصد
- پروٹین: 0.9 گرام
- کاربوہائیڈریٹس: 3.9 گرام
- چربی: 0.2 گرام
- فائبر: 1.2 گرام

ٹماٹر کی جلد کے فوائد

ٹماٹر کی جلد میں فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں۔ جو کہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ ٹماٹر میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم کے نقصان دہ فوری ریڈیکلز کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کمینسر اور دیگر مہلک بیماریوں سے بچا جاسکتا ہے۔

جامنی یا سیاہ ٹماٹر جو کہ جامنی رنگ کے ساتھ گہرے سرخ رنگ میں پک جاتے ہیں زیادہ تر دیگر کاشتوں کے مقابلے میں زیادہ کلوروفل برقرار رکھتے ہیں۔ ٹماٹر کے پودے مختلف شکلوں اور سائز میں دستیاب ہیں۔

☆ چروپی پربل (Cherokee Purple) ☆ سیاہ ایتھوپیا (Black Ethiopian)

☆ پال روبسن (Paul Robeson)

غذائیت سے متعلق حقائق

ٹماٹر میں پانی کی مقدار تقریباً 95 فیصد ہوتی ہے۔ باقی 5 فیصد خوراک کاربوہائیڈریٹس اور ریٹینول پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹماٹر میں مختلف غذائی اجزاء درج ذیل ہیں۔

کھانے کی مصنوعات میں موجود آرگینو فاسفیٹ کیڑے مارادویات

کے انسانی صحت پر مضر اثرات اور ان سے بچاؤ کے طریقہ کار

*ڈاکٹر سدرہ الطاف، **ڈاکٹر تصور اقبال..... *شعبہ فارمیسی، **انسٹیٹیوٹ آف فزیالوجی اینڈ فارماکالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

پیسٹ مینجمنٹ (IPM) کا استعمال ضروری ہے۔

ضابطہ کار فریم ورک اور حفاظتی معیارات

عالمی سطح پر آرگینو فاسفیٹ کیڑے مارادویات پر سخت ضوابط عائد کیے جاتے ہیں تاکہ خوراک کی حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے۔

زیادہ سے زیادہ بقایا حد روزانہ قابل قبول مقدار

خوراک میں MRL خوراک میں کیڑے مارادویات کے بقایا ذرات کو قابو میں رکھنے کے لیے متعلقہ حکام زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرتے ہیں جو کہ خوراک میں وہ مقدار ہے جو (ADI) قانونی طور پر اجازت یافتہ سب سے زیادہ سطح ہے۔ مزید برآں روزانہ قابل قبول مقدار انسان بغیر کسی خاص صحت کے نقصان کے خطرے کے لیے لے سکتا ہے۔

عمل درآمد اور نگرانی کی حکمت عملی

خوراک میں (OP) کیڑے مارادویات کے بقایا ذرات کی نگرانی کے لیے مختلف ممالک میں سرکاری اور نجی ادارے نگرانی اور ٹیسٹنگ کے سخت پروگرام چلاتے ہیں۔ غیر مطابقت پائے جانے پر مصنوعات کی واپسی، درآمد پر پابندی اور کاشتکاروں یا مینوفیکچررز پر جرمانے عائد کیے جاسکتے ہیں۔

آرگینو فاسفیٹ کیڑے مارادویات کے محفوظ اطلاق کے بہترین طریقے

O.P کیڑے مارادویات کی مناسب مقدار اور پتلا کرنے کے طریقے

کیڑے مارادویات کے استعمال میں سب سے اہم پہلو تجویز کردہ مقدار اور پتلا کرنے کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ حد سے زیادہ استعمال بقایا ذرات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے جبکہ کم مقدار میں استعمال کیڑے مارادویات کے اثر کو کم کر سکتا ہے۔

محفوظ اطلاق کی تکنیکیں

درست وقت: کم ہوا کے دباؤ اور ہلکی درجہ حرارت کے اوقات میں اسپرے کریں تاکہ زہریلی دھند کے پھیلاؤ کو روکا جاسکے۔

موسمی حالات: بارش میں اسپرے کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کیڑے

آرگینو فاسفیٹ (OP) کیڑے مارادویات زراعت میں کیڑوں پر قابو پانے اور فصل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تاہم ان کے ذرات خوراک پر باقی رہ کر انسانی صحت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتے ہیں، جن میں اعصابی زہر اور اینڈوکرائن سسٹم کی خرابی شامل ہیں۔ ان خطرات کو کم کرنا خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے اور صارفین کی صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ضابطہ کار ادارے خوراک میں قابل قبول مقدار مقرر کرتے ہیں۔ لیکن درست اطلاق اور فصل کی کٹائی کے بعد کے طریقے کیڑے مارادویات کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرتے ہیں۔

آرگینو فاسفیٹ کیڑے مارادویات کو سمجھنا

آرگینو فاسفیٹ کیڑے مارادویات فاسفورک ایسڈ سے حاصل کردہ ایک کیمیائی گروپ ہیں جو ایسیڈائٹ کولین ایسٹراز نامی ایک اہم نامہ (انزائم) کو روک کر کیڑوں کے اعصابی نظام پر اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اعصاب ضرورت سے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں جس سے فالج اور کیڑوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

عام استعمال ہونے والی آرگینو فاسفیٹ کیڑے مارادویات

کیڑے مارادویات میں کلورپائز فاس، میلاتھیان، ڈائزینون اور پیرتھیان شامل ہیں۔ یہ کیمیکیل آرگینو فاسفیٹ زرعی مقاصد کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی مختلف کیڑوں پر قابو پانے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور زرعی نقصان کو کم کرتے ہیں۔

ممکنہ صحت کے خطرات اور ماحولیاتی عدشات

یہ کیڑے مارادویات مؤثر ہونے کے باوجود صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ قلیل مدتی نمائش سے اعصابی مسائل، سانس کی بیماریوں اور اینڈوکرائن سسٹم کی خرابی کا خطرہ ہوتا ہے۔ جبکہ طویل مدتی نمائش بچوں کی نشوونما کے مسائل اور کینسر جیسے امراض سے جوڑی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیڑے مارادویات مٹی اور پانی کو آلودہ کر کے غیر بدنی جانداروں جیسے کہ شہد کی مکھیاں اور آبی حیات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان خطرات کو کرنے کے لیے مناسب طریقے، متبادل کیڑوں پر قابو پانے کے طریقے جیسے کہ انٹیگرٹڈ

مارادویات ضائع ہو سکتی ہیں۔

پکانا اور بالنا

کچھ کیڑے مارادویات گرمی کے عمل سے بے اثر ہو جاتی ہیں۔

آلات کی درنگی: سپرے کرنے والے آلات کو باقاعدگی سے صاف کریں اور ان کی جانچ کریں۔

متبادل کیڑوں کے کنٹرول کے طریقے

متبادل قدرتی کیڑے مارادویات
نیم کے تیل، بیکٹیریل کیڑے مارادویات جیسے نیکسیل تھورنچینس کا استعمال۔

ہدفی اطلاق: مخصوص مقامات پر اطلاق سے کیڑے مارادویات کے غیر ضروری استعمال کو کم کیا جاسکتا ہے۔

حیاتیاتی کنٹرول

کسانوں اور مزدوروں کے لیے حفاظتی تدابیر

قدرتی شکاری جیسے کہ لیڈی بگ اور نیماڈوڈز کی مدد سے کیڑوں کا خاتمہ۔

☆ دستانے، لمبے بازوؤں والے کپڑے، چٹخے، ماسک اور بوٹ پہنیں۔

صارفین کی آگاہی اور حفاظتی تدابیر

☆ ذاتی حفاظتی سامان

آگاہی مہمات

☆ محفوظ ذخیرہ: کیڑے مارادویات کو بچوں، خوراک اور پانی کے ذرائع سے دور رکھیں۔

صارفین کو بقایا ذرات کم کرنے کے طریقوں کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے۔

محفوظ خوراک کی خریداری

☆ تربیت اور آگاہی: کارکنوں کو حفاظتی تدابیر اور زہریلے مادوں سے بچاؤ کی تعلیم دی جانی چاہیے۔

مصدقہ حیاتیاتی مصنوعات کو ترجیح دی جائے۔

چیلنجز اور مستقبل کی تجاویز

بقایا ذرات کو کم کرنے کے بعد اطلاق حکمت عملی

کسانوں کی مزاحمت، متبادل طریقوں کی زیادہ قیمت اور قوانین پر عمل درآمد میں

قبل از سٹائی کا وقفہ پر عمل

کئی جیسے چیلنجز موجود ہیں۔ ماحول دوست کیڑے مارادویات بائیو ڈیگریڈیبل فارمولیشنز اور

یہ وہ وقت ہے جو آخری سپرے اور فصل کی کٹائی کے درمیان ہونا چاہیے تاکہ

جدید نگرانی کی ٹیکنالوجیز مستقبل میں اس مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ایسے

کیڑے مارادویات کی مقدار محفوظ سطح پر آجائے۔

آلات بنائے جائیں۔

خوراک کی دھلائی، جھیلنے اور پروڈیگ کے طریقے

نتیجہ

دھونا: سبزیوں اور پھلوں کو بہتے پانی میں دھونا بقایا ذرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

محفوظ زراعت اور صحت مند خوراک کے لیے کیڑے مارادویات کے درست

چھیلنا

استعمال، ضوابط پر سخت عمل درآمد اور صارفین کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔

سیب، کھیرے اور آلو جیسے پھلوں اور سبزیوں کو جھیلنے سے بقایا ذرات کم ہو جاتے ہیں۔

احادیث مبارکہ

☆ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں روات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ چمک دار تاروں سے زیادہ چمکیلے اور حسین ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہوں گے۔ آپس میں بغض و حسد کا نشان نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی زوجیت میں دو حوریں ہوں گی۔ ان کی پنڈلیوں کا مغز ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ ☆ حضرت ابو مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جس نے دو آیتیں پڑھیں، حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھیں تو وہ اس کو کفایت کریں گی۔ ☆ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آدمیوں کے سوا کوئی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور اس کے ساتھ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ ☆ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ جب بیمار ہو جاتے تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں انہیں آپ پر پڑھتی اور ان کی برکت کی امید رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ پھیرا کرتی۔

گائے۔ ریڈ گولڈ آف پاکستان

پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال..... ڈین فیکلٹی آف اینیمل ہسپنڈری، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

چولستانی گائے ساہیوال کی نسبت زیادہ سخت جاں ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہے۔
4۔ ساہیوال اور چولستانی کے پچھڑے گوشت کی پیداوار کے لئے بہترین ہیں اور فارمرز کی سطح پر ان کی پسندیدگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔
5۔ ہماری گائیوں میں غیر ملکی گائیوں کے مقابلے میں گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہے۔ ہمارے گائیوں کے لئے کنٹرول شیڈ کی ضرورت نہیں۔ گرمیوں میں درختوں کے نیچے باندھنے سے بھی ان گائیوں کو گرمی سے بچایا جاسکتا ہے۔

6۔ لوکل گائیوں میں شرح زرخیزی زیادہ ہے۔ اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ دوغلی نسل کی گائے تین سے چار بچے دینے کے بعد حاملہ نہیں ہوتی۔ ان گائیوں میں اندرونی مسائل خصوصاً سسٹک اوریز (Cystic Ovaries) کی شرح وقوع پذیری کافی زیادہ ہے۔ دوغلی نسل یا خالص نسل کی گائے لوکل نسل کے مقابلے میں اپنی زندگی میں کم بچے دیتی ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ہمارے فارمرز کی اکثریت چھوٹے فارمرز ہیں یعنی وہ چند جانور ہی رکھتے ہیں۔ ان کی مالی استطاعت بھی کم ہے اور وہ اپنے جانوروں کی خوراک اور دیکھ بھال پر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ ملکی سطح پر دودھ میں اضافے، ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور فارمرز کی معاشی حالت میں بہتری لانے کے لئے لوکل گائیوں کی پرورش، نگہداشت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ دوسری طرف بڑے فارمرز جو غیر ملکی گائیوں یا دوغلی نسل کی گائیوں کی فارمنگ کی استطاعت رکھتے ہیں وہ لازمی رکھیں۔

پاکستان میں پانی جانے والی گائے کی نسلوں خصوصاً ساہیوال نسل کو اگر ریڈ گولڈ آف پاکستان کہا جائے تو بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان گائیوں کی موروثی صلاحیت سے مکمل طور پر استفادہ کیا جائے تو نہ صرف جانور پال حضرات کے مالی حالات بہتر ہوں گے بلکہ ملکی معیشت کو مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکورٹی یعنی دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بھی یقینی اضافہ ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دودھیل گائیوں کو خالص حالت میں رکھا جائے اور ان کی آبادی میں اضافہ کریں۔

(باقی صفحہ 58 پر)

پاکستان میں پانی جانے والی گائیوں کی نسلوں میں تین طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں دودھیل نسلیں (ساہیوال، ریڈ منڈی، چولستانی)۔ دوسری خصوصیات کی حامل نسلیں (تھر پارک، تھری) اور جفاکش اور کام کرنے والی نسلیں (بھاگ ناڑی، جھنی، روجھان، لوبانی) شامل ہیں۔ اس وقت گائیوں کی تعداد 57 ملین ہے۔ دودھ کی کل سالانہ پیداوار 70 ملین ٹن ہے جس میں سے تقریباً 36 فیصد دودھ گائیوں سے حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح گوشت کی پیداوار میں بھی یہ جانور اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ گائیوں سے متعلقہ چند اہم حقائق درج ذیل ہیں۔

1۔ دودھ کے حوالے سے ساہیوال گائے ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کا آبائی وطن دریائے ستلج اور راوی کے درمیان علاقہ ہے جسے گجی بار کہا جاتا ہے۔ گائے کی یہ نسل نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں تک پھیل چکی ہے بلکہ دنیا کے کئی ممالک مثلاً کینیڈا، افریقہ اور آسٹریلیا نے بھی اس کی بہترین کارکردگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس نسل کی منفرد خوبیوں کو تسلیم کیا اور اب یہ ممالک ساہیوال گائے کے خالص جانور دوسرے ممالک کو برآمد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے جانوروں کی کمی نہیں جو روزانہ 12 سے 15 لیٹر دودھ دے رہے ہیں اور ایسے جانور بھی موجود ہیں جنہوں نے مقابلہ جات میں 40 لیٹر دودھ دیا۔ ملکی سطح پر اس کی فی بیانت پیداوار اوسطاً 1800 سے 2000 لیٹر ہے لیکن اس کو بہتر پرورش و نگہداشت سے بڑھایا جاسکتا ہے۔

2۔ دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے ریڈ منڈی نسل دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ نسل سندھ کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ساہیوال نسل کی طرح اس نسل کے جانور بھی موسمی حالات اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت رکھتے ہیں۔

3۔ گائے کی چولستانی نسل دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اس نسل کا آبائی وطن بہاولپور علاقہ چولستان ہے۔ یہ نسل شدید موسمی حالات، خوراک کی قلت میں بھی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے اگر اس کی دیکھ بھال سائنسی انداز سے کی جائے یعنی اس کی غذائی ضروریات اور پرورش و نگہداشت پر توجہ دی جائے تو اس کی پیداوار تقریباً ساہیوال نسل کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب اس نسل کے جانور چولستان کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فارمرز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ

پنی ایچ ڈی سکارل: محمد عرفان الحق نگران: ڈاکٹر محمد یسین شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوال اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

گندم پاکستان اور دنیا کی اہم غذائی فصلوں میں سے ایک ہے۔ روزمرہ خواراک کے طور پر یہ تقریباً دنیا کی 35% آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ فاسفورس پودے کے لیے اہم غذائی اجزاء میں سے ایک ہے۔ جو توانائی کی فراہمی، ضیائی تالیف، عمل تنفس اور موروثی مواد (ڈی این اے اور آر این اے) وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کمی کے نتیجے میں پودوں کے پستہ قدرتنے کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پاکستانی زمینوں کی مٹی 80 تا 90 فیصد حصہ فاسفورس کی کمی کا شکار ہے۔ جبکہ پودوں کو ڈالی جانے والی کھادوں کا بھی بہت کم تناسب ((20-5% پودوں کے استعمال میں آتا ہے۔ راک فاسفیٹ ایک جزوی حل پذیر معدنی ذریعہ ہے جسے فاسفورس کھاد کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

راک فاسفیٹ کو مختلف کیمیائی اور حیاتیاتی / جراثیمی عوامل سے حل پذیر بنایا جاسکتا ہے۔ حیاتیاتی یا جراثیمی طریقہ کار ایک ماحول دوست سائنسی اختراع ہے۔ جس میں نامیاتی اور معدنی تیزابوں کے اخراج کے ذریعے ناقابل حل پذیر کیشیم ٹرائی فاسفیٹ کو حل پذیر ڈائی اور مونو کیشیم فاسفیٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جس سے راک فاسفیٹ میں سے پودوں کو دستیاب فاسفورس کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا مختلف نامیاتی ذرائع مثلاً مرغیوں کی بیٹ یا پولٹری کھاد، جانوروں کی کھاد کے ساتھ راک فاسفیٹ کو بائیو آکسیڈائیشن اور بائیو سٹیمولیشن کے طریقہ ہائے کار کے ذریعے بائیو ایکٹیو میٹڈ راک فاسفیٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بائیو آکسیڈائیشن کے عمل کے دوران فاسفیٹ کو حل پذیر بنانے والے بیکٹیریا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ بائیو سٹیمولیشن کے عمل میں ان مفید بیکٹیریا کو اہم غذائی اور بڑھوتری والے اجزاء یعنی کاربن اور نائٹروجن کی سہل اور دافر مقدار مہیا کی جاتی ہے۔ جس سے ان کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا مشترکہ استعمال دراصل تیز رفتار شرح سے بہت کم وقت تقریباً چالیس دن میں ایک بہترین نامیاتی کھاد (بائیو ایکٹیو میٹڈ راک فاسفیٹ) تیار کرتا ہے۔ مزید براں بائیو ایکٹیو میٹڈ راک فاسفیٹ اور ڈی اے بی کا مشترکہ اور مربوط استعمال فاسفورس استعمال کرنے کی صلاحیت اور فصل کی

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا: لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہؐ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا زمانہ شرک قریب ہے۔ وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس پر انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہ لیا۔ فرمایا: تم اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو۔

69

نائٹروجن کے اخراج کو کم کرنے اور چاول اور گندم کی فصل کے نظام میں پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کیلئے یوریا پر نیم کے تیل کی کوٹنگ کا جائزہ

پی ایچ ڈی سکالر: اللہ نواز نگران: ڈاکٹر طارق عزیز شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

جسے ناکو-2 (NOCU2) اور چھ ماہ پرانا تیل ناکو-1 (NOCU1) کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انار (*Punica granatum*) کے پتوں کا عرق ملا یوریا پلٹیکو (PLECU) اور ڈائی سائیڈ امانیڈ (DCD) کیساتھ ملا یوریا DCD کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ نیم کے تیل کی دو قسموں کا استعمال ان کی کارکردگی کا موازنہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس تناظر میں پانچ مطالعات کی گئیں۔ مطالعہ-1 کے دوران، NIs کوٹڈ یوریا کے اثرات کا مطالعہ مٹی میں 60 دنوں تک معدنی نائٹروجن (امونیکل اور نائٹریٹ نائٹروجن) کے اخراج کے انداز پر کیا گیا تھا، اور لیبارٹری میں نائٹریفیکیشن کی روک تھام اور ظاہری نائٹریفیکیشن کی شرحوں کا حساب لگایا گیا۔ پہلے مطالعہ کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ DCD نے زیادہ سے زیادہ نائٹریفیکیشن انہیبیشن کو 64-26 فیصد کی حد میں دکھایا اور پلٹیکو ٹریٹمنٹ کے ذریعے کم از کم نائٹریفیکیشن انہیبیشن 39-4 فیصد دیکھی گئی۔ یوریا ٹریٹمنٹ میں 73 فیصد کی زیادہ سے زیادہ ظاہری نائٹریفیکیشن کی شرح کا حساب لگایا گیا تھا لیکن DCD کے ذریعے سب سے کم ظاہری نائٹریفیکیشن کی شرح 32 فیصد دکھائی گئی۔ مطالعہ-2 کے دوران، امونیا کے اتار چڑھاؤ اور نائٹرس آکسائیڈ کے اخراج کو بیک وقت ایک پوٹینیل گیس اینالاؤز کے ساتھ جامد ہوا بند چیمبر تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا۔ اس مطالعہ کا مقصد لیبارٹری میں کنٹرول شدہ حالات میں نائٹروجن کے اخراج کو کم کرنے پر کوٹڈ یوریا کے اثرات کا جائزہ لینا تھا۔ دوسری تحقیق کے نتائج نے اشارہ کیا کہ نائٹرس آکسائیڈ (N₂O) کے مجموعی بہاؤ میں زیادہ سے زیادہ 42-37 فیصد کی کمی DCD کے ذریعے ہوئی تھی اور N₂O کے مجموعی بہاؤ میں سب سے کم 16-11 فیصد کی کمی کو پلٹیکو نے ظاہر کیا۔ تاہم، زیادہ سے زیادہ (54-43 فیصد) مجموعی امونیا (NH₃) بہاؤ کی نشاندہی بھی DCD کے ذریعے دیکھی گئی تھی، اور مجموعی NH₃ بہاؤ (14-5 فیصد) میں سب سے کم اضافہ یوریا پر پلٹیکو نے ٹریٹمنٹ سے دیکھا گیا۔ مطالعہ 3 اور 4 کے دوران، دو انکیوبیشن مطالعات کے نتائج چاول اور گندم کی فصلوں پر گھمٹ اور کھیت کے حالات کے تحت جانچے گئے۔ یہ مطالعہ فصل کی پیداوار اور نائٹروجن کے استعمال کی کارکردگی کو بڑھانے میں ترمیم شدہ یوریا کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ فیلڈ مطالعہ کے نتائج نے گندم میں N₂O کے اخراج میں 12 سے 40 فیصد اور چاول کی فصلوں میں 12 سے 45 فیصد تک کمی ظاہر کی۔ تاہم، گندم میں NH₃ کے اخراج میں 12 سے 38 فیصد اور چاول کی فصلوں میں یوریا کے مقابلے میں

پاکستان کم آمدنی والے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے، اور زراعت اس کا سب سے اہم شعبہ ہے کیونکہ یہ اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرتا ہے۔ عالمی فوڈ سکیورٹی انڈیکس میں پاکستان 77 ویں نمبر پر ہے جہاں کی 22 فیصد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ پاکستان میں اشیائے خورد و نوش کی غیر محفوظ پوزیشن کا تعلق زرعی ترقی کی رکتی ہوئی شرح سے ہے۔ مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی نے خوراک کی طلب اور رسد کے توازن کو واضح طور پر بگاڑ دیا ہے۔ 2 فیصد کی موجودہ شرح نمو کے ساتھ اس کی آبادی 2050 تک دوگنی ہونے کی توقع ہے جو اس کو پانچواں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بنادے گی۔ غذائی تحفظ کی مستحکم پوزیشن حاصل کرنے اور غریبوں کی حامی زرعی پیداوار کے حصول کے لیے پاکستان کو تمام غذائی فصلوں خصوصاً گندم اور چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک جامع تکنیک اپنانے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پر مصنوعی کھادوں نے پائیدار خوراک کی پیداوار کے ذریعے پچھلی صدی میں آبادی میں اضافے کو برقرار رکھا ہے۔ ان کھادوں میں خوراک کی نشوونما میں ایک اہم لاگت خاص طور پر پاکستان میں نائٹروجنی کھادیں ہیں۔ نائٹروجنی کھادوں کے بین الاقوامی استعمال میں 1960 اور 1995 کے درمیان سات گنا اضافہ ہوا ہے، اور اگر کھاد کی بازیابی کی کارکردگی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا ہے تو 2050 تک مزید تین گنا اضافہ متوقع ہے۔ 1961-2013 کے دوران ترقی یافتہ (166 فیصد) اور کم ترقی یافتہ ممالک (2274 فیصد) کے درمیان کیمیائی نائٹروجنی کھادوں کے استعمال میں اضافے کے حوالے سے بہت زیادہ فرق دیکھا گیا ہے۔ نائٹروجنی کھادوں کا یہ بڑھتا ہوا استعمال نائٹروجن کے بڑھتے ہوئے نقصان سے منسلک ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں 1995-2030 کے دوران ہر سال 67 سے 93 ٹیرا گرام نقصانات متوقع ہیں۔ نائٹروجن کے استعمال کی کارکردگی (NUE) سنجیدگی سے کم ہے اور عام طور پر 40-30 فیصد کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ خطرناک حد تک کم نائٹروجن کے استعمال کی کارکردگی پیداوار کی زیادہ لاگت اور ماحولیاتی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ نائٹروجن کے استعمال کی کارکردگی کو بڑھانے، نائٹروجن کے اخراج اور لچک نگ نقصانات کو کم کرنے کیلئے مانیٹرینگ یا معدنی کھادوں کو نائٹریفیکیشن انہیبیٹر (NIs) اور یوریز انہیبیٹر (UIs) کے ساتھ استعمال کرنا قابل عمل طریقوں میں سے ایک ہے۔ دانے دار یوریا کی تبدیل شدہ شکل کو دو قسم کے نیم (*Azadirachta indica*) کے تیل کے ساتھ ملا کر تیار کیا گیا تھا۔ تازہ نکالا ہوا تیل

ٹیسٹس کی وجہ سے چاول اور گندم کے موسموں میں، بالترتیب 72 فیصد اور 66 فیصد کی زیادہ سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ اس کام نے واضح طور پر ظاہر کیا ہے کہ نائٹریفیکیشن انہیٹرز ترمیم شدہ یوریا نائٹریفیکیشن کی شرح کو روکنے، نائٹرس آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے، اناج میں نائٹروجن کی بحالی، فصل کی پیداوار کو بڑھانے اور نائٹریٹ نائٹروجن کی حرکیات کو کنٹرول کرنے میں موثر پایا گیا۔ نیم کے تیل کی دو اقسام میں سے، NOCU1 کے مقابلے NOCU2 نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ DCD نائٹریفیکیشن کی شرح اور نائٹرس آکسائیڈ کے اخراج کو روکنے میں سب سے زیادہ مؤثر پایا گیا۔ نیم کوٹڈ یوریا نے نائٹروجن ریکوری اور فصل کی پیداوار کو بڑھانے میں بہتر کارکردگی دکھائی جبکہ پلکیو نے امونیا کے اخراج میں کم سے کم اضافے کی نشاندہی کی اور نچی گہرائیوں میں نائٹریٹس کے ارتکاز کو نمایاں طور پر کم کیا۔

11 سے 34 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ ناکو-2 کے ذریعہ گندم میں 10 فیصد اور چاول کے دانے کی پیداوار میں 12 فیصد کا زیادہ سے زیادہ اضافہ دکھایا گیا۔ گندم میں ناکو کی وجہ سے اناج میں زیادہ سے زیادہ نائٹروجن ریکوری (54 سے 58 فیصد) اور (43) جزوی فیکٹر پروڈکٹیوٹی (PFP) اور چاول میں (15 سے 18) فیصد نائٹروجن ریکوری اور 16 جزوی فیکٹر پروڈکٹیوٹی دیگر تمام ٹیسٹس کے مقابلے میں زیادہ دکھائی گئی۔ گملوں کے مطالعہ کے نتائج میں ٹیسٹس کے رویوں کا رجحان فیڈل تجربات جیسا ہی تھا۔ مطالعہ 5 میں نائٹریفیکیشن انہیٹرز کوٹڈ یوریا کے اثرات کا مطالعہ 90 سینٹی میٹر تک مٹی میں نائٹریٹ نائٹروجن کی حرکیات پر بھی کیا گیا، جس کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ نائٹریفیکیشن انہیٹرز والی کھاد کے ایک بار استعمال نے یوریا کی حرکیات میں نمایاں ترمیم کی۔ مٹی کی مختلف تہوں میں نائٹریٹ نائٹروجن کی پیداوار اور جمع ہونے میں کمی آئی۔ یوریا پر پلکیو

چنے کا مرجھاؤ اور اس کا تدارک

پنی ایچ ڈی سکالر: کنیز فاطمہ نگران: ڈائریکٹر عامر حبیب شعبہ پلانٹ پتھالوجی

سندھ کے دائیں جانب صوبہ خیبر پختونخواہ میں واقع ہے۔ اور زیریں قحل جیسے سندھ ساغر دو آب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صحرائی علاقے پر مشتمل ہے جو دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان صوبہ پنجاب کا حصہ ہے۔ پٹھوہار کے علاقے میں چنے کی کاشت ماضی میں وسیع رقبے پر کی جاتی رہی ہے۔ ان علاقوں میں خوشاب، جھنگ اور میانوالی کے اضلاع شامل ہیں۔ چنے کی کاشت کے لیے موزوں زمین کا انتخاب ضروری ہے۔ کلر اٹھی اور شورزدہ زمین موزوں نہیں ہیں۔ بارانی علاقوں میں جہاں بوائی کا انحصار بارش سے محفوظ کردہ نمی پر ہوتا ہے۔ وہاں بارش کے موسم میں گہرا اہل چلا کر سہاگہ پھیرنا ضروری ہے تاکہ نمی کو محفوظ کیا جا سکے۔ چنے کے مختلف علاقوں کے پیداواری حالات زمین کی اقسام بارشیں وغیرہ ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ اس لیے ماہرین کے خیال کے مطابق مختلف موزوں اقسام اپنے علاقے میں بہتر نتائج دے سکتی ہیں۔ اس لیے ہر علاقے میں اس کی آب و ہوا کے لحاظ سے سفارش کردہ اقسام ہی کاشت کرنی چاہیں۔ چنے کی پیداواری صلاحیت میں زمین کی قسم، نمی کی دستیابی اور مناسب کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ان عوامل کے علاوہ بیج کا نامناسب استعمال اور بہت سی بیماریوں کا فصل پر حملہ بھی فصل کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ چنے کی اہم بیماریوں میں جراثیمی مرجھاؤ قحل کے علاقوں میں چنے کی پیداوار کو خاطر خواہ متاثر کر رہی ہے۔ اس بیماری کی اہم علامت میں ابتدائی مراحل میں فصل کے

دالوں میں چنے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جدید زرعی تجربات اور مشاہدات سے اس فصل کے فوائد مسلمہ ہیں۔ چنے کی کاشت سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے چنے کی برداشت کے بعد کاشت کی جانے والی فصلات کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ فصلوں کے ہیر پھیر میں چنے کی شمولیت سے جزوی بوٹیوں، کیڑوں اور بیماریوں کے روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ چنے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کم زرخیز زمینوں اور کم بارشوں والے علاقوں میں دوسری فصل کی نسبت منافع بخش پیداوار فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کی آبادی کا بڑا حصہ غذائیت بالخصوص لحمیات کی کمی سے دوچار ہے۔ ان حالات میں جبکہ جانوروں سے حاصل شدہ لحمیات کافی مہنگی ہیں۔ چنے اور دیگر دالوں کے استعمال سے غذائیت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ چنے کا شمار ان فصلوں میں ہوتا ہے۔ جو زمانہ قدیم سے برصغیر پاک و ہند کے نظام زراعت کا اہم جز رہی ہیں۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے چنا تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ مگر برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ چنے کی فصل کاشت ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت ایف اے او کی رپورٹ کے مطابق زیر کاشت رقبے کا 10 فیصد حصہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ یوں دنیا میں چنے کی کاشت کے لحاظ سے پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پنجاب میں چنے کی پیداوار کے اہم علاقے قحل اور پٹھوہار ہیں۔ قحل کے علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ بالائی قحل جو دریائے

ہوائی کے وقت جراثیم کش ادویات بحساب تین گرام فی کلو گرام بیج کے حساب سے استعمال ابتدائی طور پر پودے کو مرجھاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چنے کے مرجھاؤ کے علاج کے لیے سکور، ٹاپسن ایم اور بوسٹن کا سپرے کے ذریعے سپرے کے ذریعے استعمال بہت موثر ثابت ہوتا ہے۔ ٹرائیکو ڈرما ہرزیا نیئم (Trichoderma harzianum) چنے کے مرجھاؤ کے لیے حیاتیاتی قابو کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان ادویات کے ساتھ بیج کو ہوائی سے پہلے جراثیمی ٹیکہ لگانا بھی ضروری ہے۔ جو اس میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔

پتوں کا پیلا پڑنا ہے۔ تنے میں سرائٹ کا بننا اور جڑ کا اکھیرا شامل ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے تھل کے علاقوں میں 10-15 فیصد تک پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ بیماری کی شدت ضلع لیہ میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر اضلاع بھکر، خوشاب، میانوالی اور جھنگ میں بھی قابل غور نقصانات دیکھے گئے ہیں۔ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سفارش کردہ اقسام کاشت کرنا ضروری ہے۔ چنے کی سفارش کردہ اقسام میں تھل، بیٹل 98، سی ایم 98، بلکسر 2000، ونہار، پنجاب 2008، بکھر 2011، بیٹل 2016 اور نایاب 2016 شامل ہیں اور کابلی اقسام میں 91، سی ایم 2008، ٹمن 2013 اور نور 2013 شامل ہیں۔ چنے کی

بیکٹیریا کے استعمال سے کپڑے رنگنے والی فیکٹریوں سے نکلتے پانی کو صاف کرنا

پنی ایچ ڈی سکالر، خزمہ تصویر نگار: ڈاکٹر شاہد محمود شعبہ مائیکرو بائیولوجی

سے بنیادی طریقے استعمال کر کے اور مختلف ٹیسٹ کر کے بیکٹیریا کو پہچانا گیا اور پھر رنگوں اور دھاتوں کی مختلف مقداروں کو ان بیکٹیریا کے ساتھ انکوبیٹ کیا گیا اس طرح بہت سے بیکٹیریا نے رنگوں کو مختلف مقداروں میں کم یا ختم کیا۔ بھاری دھاتوں اور رنگوں کو الگ الگ ہر بیکٹیریا کے ساتھ معلوم کیا گیا۔ دھاتوں اور رنگوں کی مقدار کی بیکٹیریا کے استعمال سے پہلے اور بعد میں جانچ کے لیے خاص آلات اور مشینیں استعمال کی گئیں۔ دھاتوں کی مقدار کو جانچنے کے لیے آٹومیک ایز وریٹیشن سپیکٹروفوٹومیٹر استعمال ہوا جس نے دھاتوں کے محلول کو مختلف بیکٹیریا کے استعمال سے پہلے اور بعد میں جانچ۔ اس طرح معلوم ہوا کہ ایک بیکٹیریم دھات کو ختم کرنے کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ اس طرح سب حاصل کردہ 36 جراثیم کے ساتھ کیا گیا۔ ان حاصل کردہ 36 جراثیم کے ساتھ اسی طرح رنگوں کی مقدار کو کم کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی جانچا گیا۔ رنگوں کی مقدار کو ناکے لیے یو وی ویزیبیل سپیکٹروفوٹومیٹر استعمال ہوا۔ اور اس کی روشنی والی ریج 400-700mm کو استعمال کیا گیا۔ محلول میں رنگوں کی روشنی کو جذب کرنے کی صلاحیت (ایبزورپشن) کو بیکٹیریا سے پہلے اور بعد میں جانچا گیا۔ جن بیکٹیریا نے رنگوں اور دھاتوں کو ختم کرنے کی صلاحیت کا بہت اچھا مظاہرہ کیا ان کو ماحولیاتی آبی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر امیدوار تصور کیا گیا۔ ان میں بیکٹیریا جیوٹاگلی کوکس ہوا کوئی، کو ماموناس ایکویٹیکا، بے سی لس سب ٹی لس، ایرو ماموناس وے رونائی، سٹے فی لوکوس سانی یوری اور مورینگزیا سرفہرست ہیں۔ دس دنوں میں بے سی لس سب ٹی لس، سٹے فی لوکوس سانی یوری نے کالے اور لال رنگ کو بالترتیب 90 فیصد، 86 فیصد اور 84 فیصد، 86 فیصد ختم کر دیا۔ رنگ جب ٹوٹتے ہیں تو اکثر مزید زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ رنگوں کے ٹوٹنے سے مزید زہریلے مادوں کی

ماحولیاتی آلودگی خاص طور پانی کی آلودگی پاکستان جیسے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ پانی کی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ کپڑا رنگنے والی فیکٹریوں سے خارج ہونے والا پانی ہے جو بغیر کسی قسم کی صفائی کے براہ راست صاف پانی کے نالوں اور دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ فیکٹریوں سے خارج ہونے والا یہ گند پانی بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اور اس میں موجود بے شمار کیمیائی اجزاء خاص طور پر بھاری دھاتیں اور مختلف اقسام کے رنگ پانی کو استعمال کے لیے انتہائی مضر بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں فیکٹریوں سے آنے والے پانی کو صاف کرنے کے لیے کوئی بھی مناسب طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ پانی صاف پانی میں شامل ہو کر ماحول اور لوگوں کی صحت پر بہت بڑے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سائنس میں گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے بہت سا کام ہو چکا ہے۔ موجودہ تجربہ میں جراثیم کو اس گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس مد میں جراثیم کو مقامی کپڑا رنگنے والی فیکٹریوں کے گندے پانی سے حاصل کیا گیا اور انہیں جراثیم کو بھاری دھاتوں اور رنگوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 36 قسم کے جراثیم حاصل ہوئے جن کے ناموں کو مختلف تجربات سے ثابت کیا گیا چار قسم کے رنگ اور چار قسم کی بھاری دھاتیں استعمال کی گئی جن کے نام یہ ہیں کالا رنگ (سی آئی ری ایکٹو بلیک 5) نیلا رنگ (سی آئی ری ایکٹو 21)، پیلا رنگ (سی آئی ری ایکٹو پیلو 195) اور لال رنگ (سی آئی ری ایکٹو 195)، بھاری دھاتیں جو اس تجربہ میں استعمال کی گئیں ان کے نام یہ ہیں لیڈ، کوپر، کرومیم اور کیڈمیم سب سے پہلے بیکٹیریا (جراثیم) کو الگ کیا گیا تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ کون سا جراثیم (بیکٹیریم) رنگوں اور دھاتوں کو توڑنے اور ان کے خاتمے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ مائیکرو بائیولوجی کے بہت

بیکٹیریا کے نام شامل ہیں کو ماموناس، جیوٹاگیلی کوکیس، ایروموناس اور بے سیس۔ سب سے آخر میں ایف ٹی آئی آر تجربہ بھی کیا گیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بیکٹیریا کے غلیے دیوار کے فنکشنل گروپس میں فرق تو نہیں آتا۔ دھاتوں اور رنگوں کے خاتمے کے دوران یہ دیکھا گیا کہ کچھ کمیمیائی تبدیلیاں جراثیم کے غلیوں کی دیواروں پر رونما ہوتی ہیں جیسا کہ C-H بوڈ، O-H اور C=O بانڈز کی حرکت میں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔

پیداوار کو جانچنے کے لیے لال خون کے غلیوں پر ایک تجربہ کیا گیا۔ ان رنگوں کے محلول (جن میں رنگوں کو بیکٹیریا نے کافی کم کر دیا تھا) کو لال خون کے غلیوں پر ڈالا گیا اور ان کے زہریلے پن کو خون کے غلیوں کے مرجانے سے یا زندہ رہ جانے سے ناپا گیا۔ تو معلوم ہوا کچھ بیکٹیریا نہ صرف رنگوں کے خاتمے کے لیے مفید ہیں۔ بلکہ ان کے ٹوٹنے سے جو اور زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی کم کرنے میں مددگار ہیں اور ان میں

آم کے باغوں میں پائے جانے والے حشرات پر موسمیاتی تبدیلی کا اثر

پی ایچ ڈی سکالر: شہلا نرگس نگران: ڈاکٹر نورین رانا شعبہ: زوالوجی

اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ جانوروں کی کمیونیٹر عام طور پر ماحولیاتی اثرات یعنی درجہ حرارت، نمی سے متاثر ہوتی ہیں۔ مٹی کے حشرات کی نسبتاً کثرت اور کائناتی نوعیت ان کے اجتماعی ڈھانچے کو زرعی ماحولیاتی نظام کی اقسام اور زمین کے انتظام کے طریقوں کے درمیان موازنہ کرنے میں ان کی افادیت میں معاون ہے۔ درحقیقت، مٹی کے جانوروں کی کمیونیٹر کو مٹی کی زرخیزی کے لحاظ سے حیاتیاتی اشارے کے طور پر فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔

یہ ماحولیاتی نظام کے اہم اجزاء ہیں، ان کے کام کرنے کی وجہ سے جیسے کہ مٹی کو ہوا دینا، پھلوں کو جگ لگانا اور کیڑوں کے لیے حیاتیاتی کنٹرول۔ بہت سے کیڑے جیسے کہ ٹیٹل اسکو و بنجر زمین، پودوں اور جانوروں کی مردہ باقیات کو کھاتے ہیں اس لیے مٹی میں موجود غذائی اجزاء کو رسی سائیکل کرتے ہیں۔ گلنے سڑنے کے طور پر، کیڑے مٹی کی اوپری غذائیت سے بھرپور تہہ بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ جو مٹی میں پودوں کو اگلنے میں مدد کرتا ہے۔ چیونٹیاں اور ٹیٹل جیسے کیڑے مٹی میں سرنگیں بناتے ہیں جو پودوں کی طرف پانی کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اپنے فضلے سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء سے مٹی کو کھاد بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اور رتیلیاں پودوں اور درختوں کے جڑوں میں مدد کرتی ہیں۔ موکس اور کچھڑی کے گلنے اور ہوا کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مٹی کے اختلاط کے لیے ان کی دفن سرگرمیوں کی وجہ سے چیونٹیوں، دیمکوں اور کینچوں کو ایک سسٹم انجینئر کہا جاتا ہے۔ کچھ سپر وٹیکس نے مٹی میں کوڑے کی خرابی کی تاہم، دفن کرنے کی سرگرمی مٹی کے سوراخوں، پانی کو روکنے کی صلاحیت اور دراندازی کو بڑھاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مٹی کے پروفائل کی ساخت کو تبدیل کریں۔

درجہ حرارت اور نمی کا خوراک کی دستیابی، قدرتی دشمن، جڑی بوٹیوں والی آبادی کے ساتھ حشرات الارض کی آبادی کے تعین پر گہرا اثر پڑتا ہے اور مٹی کی آبادی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ معتدل درجہ حرارت میں زیادہ آبادی کی شرح کے ذریعے اور شدید بارش،

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پھلوں کی پیداوار اس کی معیشت کا لازمی حصہ ہے۔ آم (مینیگیفیرا انڈیکا) کھایا جانے والا ایک رس دار پھل ہے جس کا تعلق خاندان ایکارڈینسی خاندان اور مینیگیفیرا کی نسل سے ہے۔ یہ پاکستان کا قومی پھل ہے۔ اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں مالٹے کے بعد اگلے والا دوسرا بڑا پھل ہے۔ یہ برصغیر سمیت دنیا بھر میں شدید گرم اور ذیلی نیم گرم علاقوں میں اگایا جاتا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا مقامی پھل ہے، جہاں سے یہ دنیا بھر میں پھیلا ہے خاص طور پر گرم علاقوں میں سب سے زیادہ کاشت شدہ پھل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں معدنیات، وٹامنز اور دیگر غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ آم کے پودوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، جو کہ 160 سے زائد ہیں، پاکستان میں سب سے مشہور اقسام سونارو، چونہ، شربہشت، لنگڑا اور سندھڑی وغیرہ ہیں۔

ماحولیاتی تنوع سے زندگی کی مختلف اقسام جیسا کہ مائیکرو لیول سے حیاتیاتی تنظیم شامل ہے وجود میں آتی ہیں۔ اس میں انواع کا اقسام، ماحولیاتی نظام کی اقسام اور جینیاتی اقسام شامل ہیں اور یہ ایونٹک ماحول کے ساتھ بھی تعامل کرتا ہے۔ ماحولیاتی نظام میں متحرک سطحوں پر کام کرنے والے مختلف نظام کے کام کرنے جیسا کہ سڑنے میں حصہ لیتا ہے۔ لہذا انسان کے معیار زندگی کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے ہیو میٹیکیشن، نائٹیفیکیشن اور مختلف مشاورتی فرموں، حکومتوں، غیر سرکاری اداروں اور صنعت میں انتظامی سفارشات دینے کے لیے ماحولیاتی نظام کی سطح تک انواع کے اقسام کی گہری سمجھ ضروری ہے۔ مٹی کے کیڑے مٹی کی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں کیونکہ وہ نامیاتی مادے کے گلنے، مٹی کی ہوا اور پانی کی روانی کے ذریعے مٹی کی ساخت کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے وہ پودوں کی نشوونما کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ زرعی ماحولیاتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے اور مٹی کے مختلف عمل جیسے کہ مٹی کے سڑنے اور غذائی اجزاء کی سائیکلنگ پر متحرک

ہوتی ہے۔ جب مٹی خشک ہوتی ہے تو یہ مٹی کے وجود میں موجود کوکبی حیوانات کو براہ راست متاثر کرتی ہے خاص طور پر پچھوئندی خور کیڑے اعلیٰ درجہ حرارت پر ان کی خوراک کی دستیابی میں خلل کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں۔

زیادہ درجہ حرارت اور کم درجہ حرارت اور نمی کے دوران بھی حشرات کی آبادی متاثر ہوتی ہے۔ ماحولیاتی عوامل درجہ حرارت اور نمی میں ہونے والی تبدیلیوں نے بھی حیوانات کی تقسیم کے انداز پر گہرا اثر ڈالا۔ دریں اثنا مٹی کی نمی بھی کیڑوں کے پروانوں پر اثر انداز

ریکمونڈ آر تھرائٹس میں ارنڈ اور اسگند کی افادیت

پنی ایچ ڈی سکارل: آصف حسین نگران: ڈاکٹر بلال اسلم شعبہ: انسٹی ٹیوٹ آف فزیالوجی اینڈ فارماکالوجی

اسکریننگ نئی ادویات کی دریافت کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ جسمی اور متبادل علاج کا استعمال پودوں پر مبنی ادویات سے علاج کے انوکھے مواقع فراہم کرتا ہے۔ روایتی دواؤں سے علاج کا پچھلا اور حالیہ علم نئے مرکبات تیار کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے تیار کردہ طریقے فائو کمپاؤنڈز کو الگ کرنے میں نمایاں طور پر معاون ہیں جو بیماریوں کے علاج کے لئے مفید ہیں۔ حالیہ تحقیق میں بائیو ایکٹو فائو کمپاؤنڈز کی ارنڈ کے پتوں اور اسگند کی جڑوں میں موجودگی کی وجہ سے نمایاں اینٹی آکسائیڈنٹ صلاحیت اور دونوں پودوں کی خوراک پر منحصر جانوروں کے ماڈل میں بخار، درد اور سوزش میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ جانوروں کے ریوٹائڈ آرتھرائٹس ماڈل میں دونوں پودوں نے جوڑوں کی سوزش، آرتھرائٹک سکور اور آرٹیکلر ٹشو ہونے والے نقصان میں واضح کمی کی۔ جینیاتی تجزیہ میں پرو انفلیمیٹری سائٹو کائنز (IL-4, INF-X, OPG) کے لیول میں کمی اور اینٹی انفلیمیٹری سائٹو کائنز کے لیول میں اضافہ دیکھا گیا۔ مزید برآں، موجودہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے دونوں پودوں کے سترہ دن روزانہ استعمال نے جسم کے وزن، تھائیمس اور تلی کے وزن، خون کی گتھلیوں، لمفڈس اور پروٹین کے بلڈ پروفائل کو بہتر بنایا۔ نیز، دونوں پودوں کے استعمال نے جگر کی اجری کو روکا اور جگر کے ٹشو میں افزودہ خامروں کی سطح میں کمی اور اینٹی آکسائیڈنٹ انزائمز کی سطح کو بڑھایا۔ حالیہ تحقیق سے اخذ کیا گیا کہ ارنڈ کے پتے اور اسگند کی جڑوں کی بخار، درد، سوزش اور ریوٹائڈ آرتھرائٹس میں تاثیر دونوں پودوں کو مستقبل میں علاج کے نقطہ نظر کے لئے ممکنہ امیدوار کے طور پر تجویز کرتی ہے۔

<<<<<<<>>>>>>

ریموٹائڈ آتھرائٹس، جسے سوزشی گنٹھیا بھی کہا جاتا ہے ایک دائمی آٹو امیون بیماری ہے جس میں جوڑوں کی سوزش اور زخم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جو آہستہ آہستہ معذوری کا باعث بنتی ہیں۔ یہ بیماری عالمی آبادی کے تقریباً 5.0 سے 1 فیصد کو متاثر کرتی ہے۔ عام طور پر مردوں کی نسبت خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ بیماری بڑھنے سے متعدد جوڑ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ریموٹائڈ آتھرائٹس کے مریضوں میں کم درجے کا بخار، تھکاوٹ، وزن میں کمی، خون کی کمی، معدے اور انتوں کی سوزش کی علامت بھی ہوتی ہیں۔ ریموٹائڈ آتھرائٹس کے مریضوں میں اموات کی بنیادی وجوہات انفیکشن، قلبی بیماری اور کینسر ہیں۔ تاحال ریموٹائڈ آتھرائٹس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے لیکن علاج کی حکمت عملی بنیادی طور پر مرض کی علامات کم کرنا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش جوڑوں کی لچک کو بہتر بناتی ہے۔ بہت سی دوائیں ریموٹائڈ آتھرائٹس کے علاج میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ لیکن ان کے طویل استعمال سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فی الحال استعمال کی جانے والی ادویات کا مقصد جوڑوں کی درد، سوزش اور زخم کو کم کرنا ہے۔ لیکن ان ادویات کے طویل استعمال سے خون کی کمی، گردوں کا متاثر ہونے کے باعث مریض متبادل طریقہ علاج پر انحصار کرتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی جڑی بوٹیوں کو متعدد بیماریوں کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ترقی پزیر ممالک کا ایک خاص تناسب مختلف بیماریوں کے علاج کے لئے جڑی بوٹیوں سے بنی ادویات پر انحصار کرتا ہے۔ کیمیائی ادویات کے استعمال کے باوجود جڑی بوٹیاں قدرتی ذرائع پر مبنی ادویات فراہم کرتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کو طبی مصنوعات یا اکسٹریکٹس کے طور پر بڑے پیمانے پر تجویز کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے فائو کیمنیکلز بھی نامعلوم ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی فائو کیمنیکل خصوصیات اور فرماکولوجیکل

☆ ابو عثمان کا بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم نبی کریمؐ کے ہمراہ تھے۔ پس جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر زنی کرو کیونکہ تم بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے بلکہ اس کو پکارتے ہو جو مستند دیکھتا اور قریب ہے۔ پھر آپؐ میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میں لاقوۃ کہہ رہا تھا تو آپؐ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے عبد اللہ بن قیس، لاحول ولا قوۃ کہو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بیان کرنے پر مجبور کروں کہ اسے رسول اللہؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

احادیث:

برقی و مقناطیسی رد عمل کے لیے مینٹا میٹر میل رکاوٹوں کا تجزیاتی اور عددی مطالعہ

پنی ایچ ڈی سکالر: محمد اعظم نگران: ڈاکٹر عبدالغفار شعبہ: فزکس

نظریاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ چوتھے حصے میں اس مقالے میں ایک یونی ایکسل کرٹسل سلیب کے ساتھ برقی مقناطیسی چین و یو کے تعامل کی نظریاتی تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے۔ کو بوفارملز پر مبنی سطح کی موثر طرز عمل کا استعمال موٹی جوہری گرافین لیئر کے ماڈل کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ میٹامیٹرل کی تجزیاتی ماڈلنگ میں کایوبلیٹی اصول پر مبنی کرامرز کرونگ ریلیشن کا فریم ورک استعمال کیا گیا ہے۔ ان گرافین پر مبنی میٹامیٹرلز کے ڈھانچے کو جانچنے کے لیے امپیدانس باؤنڈری کنڈیشن کو اپنایا گیا ہے۔ کریکٹرٹکس کروائٹوالیشن فیز کانسنٹنٹ یا پروگیٹیشن لاس پروگیٹیشن لیڈنگتھ اور نورملائزڈ فیلڈ ڈسٹریبوشن کے ہر نمونہ کو عددی طور پر جانچا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گرافین کے پیرامیٹرز میں ریلیکیشن ٹائم کے ساتھ کیمیائی صلاحیت، چرالیٹی طاقت اور پلازما پیرامیٹرز کو مجوزہ نمونہ کے لیے سطحی ریزوننس پلازمون کی فریکوئنسی کو ماڈیول کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ عددی نتائج کو جانچنے کے لیے خصوصی شرائط پر کام کیا گیا ہے۔ جو شائع شدہ نتائج کے ساتھ ملتے ہیں مجوزہ کام کی پلازمونک مبنی لاجک ڈیزائن قابل تجدید توانائی کے آلات، سطحی ویو گائیڈز اور قریبی مواصلاتی آلات میں ممکنہ اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔

<<<<<<>>>>>>

مادے کے ساتھ روشنی کا تعامل مواد کی برقی اور مقناطیسی خصوصیات کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مواد کی برقی اور مقناطیسی کنٹرول روشنی اور مادے کے تعامل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میٹا میٹریلز مصنوعی طور پر تشکیل شدہ مواد ہیں۔ جو روشنی اور مادے کے تعاملات پر بے مثال کنٹرول فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ روشنی کے ساتھ ایک خاص برقی اور مقناطیسی رد عمل پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کئے گئے ہیں اور متعدد خصوصیات کا ادراک کر چکے ہیں۔ جن کو قدرتی طور پر پائے جانے والے مواد سے حاصل کرنا مشکل ہے۔ موجودہ کام میں مختلف قسم کے میٹا میٹریلز جو گرافین پر مبنی ہیں یعنی ڈی۔ این جی ڈی پلازمہ، چیرل میٹا میٹیریل، یونی ایکسل میٹریل کا مختلف اسپیکرول ریجنر میں برقی اور مقناطیسی خصوصیات کا مطالعہ نظریاتی طور پر کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں میٹا میٹریل سے بھرے ڈبل لیئر ڈیو گرافین ڈھانچے کا تائید شدہ سطحی توانائی کے طریقوں کو میٹا میٹریل کی دو تشکیلوں کے لیے کمپیوٹ کیا گیا ہے۔ یعنی ڈی پی ایس اور ڈی این جی پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں مقناطیسی پلازمہ فلم میں سطحی پلازمون پو الریٹونز کا نظریاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ جس کی دیواریں دو گرافین کی تہوں سے بنی ہوئی ہیں۔ تیسرے حصے میں، گرافین پر توں سے گھرا ہوا چیرال میٹریل سے بھر ہوا پلازمونک ویو گائیڈ میں ہائبرڈ سطحی پلازمون پو الریٹونز کا

پودوں کی بنا پر تیار کئے گئے دھاتی نینوپارٹیکلز (Ag, Au, Cu and Fe) کی معالجاتی قابلیت

پنی ایچ ڈی سکالر: سمیرا ممتاز نگران: ڈاکٹر ارضیہ ندیم شعبہ: کیمسٹری

وقت میں بغیر کسی انسانی کیمیکل کے تیار کئے گئے اور ان کو AgMkNPs، AgPINPs، CuPINPs، AuOsNPs، AuMkNPs، AuPINPs، AgOsNPs، FeOsNPs اور FeMkNPs، FePINPs، CuOsNPs، CuMkNPs کا نام دیا گیا۔ نیو پاریٹنگز کا ابتدائی جائزہ، UV/Visible سپیکٹروسکوپ کی مدد سے کیا گیا۔ جس میں درج ذیل ویو لینتھس ملاحظہ کی گئیں: AgPINPs اور AgMkNPs (420nm)، AgOsNPs (440nm)، AuPINPs اور AuMkNPs (540nm)، AuOsNPs (530nm)، CuPINPs (580nm)، CuMkNPs اور FePINPs، CuOsNPs اور FeMkNPs (620nm) اور FeOsNPs

حالیہ دہائیوں میں صحت کے شعبہ میں قیمتی نینو میٹریلز کا استعمال نینو میڈیسن کی دریافت میں بڑھ چکا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گرین سنتھیز کا طریقہ ایک نہایت ماحول دوست، آسان اور بغیر کسی مضر اثر کے اپنایا گیا ہے۔ ماحول دوست طریقے میں ایسے پودے استعمال کئے گئے ہیں جن میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ بیماریوں کے خلاف مفید ہوں۔ ہماری سٹی میں پولی ایلنٹھیا لائیو فلیا (اشوکا) و موریا کو نیجائی (کڑی پتا) اور اسیم سیکنٹم (تلی) کے پتوں کو ایکٹریکٹ (پانی میں) تیار کر کے ان کو دھاتوں کے نینو پارٹیکلز مثال کے طور پر سلور، گولڈ، کاپر اور آئرن بنانے میں استعمال کیا گیا۔ دھاتوں کے نینو پارٹیکلز (Ag, Au, Cu and Fe) ان پودوں کے ساتھ ایک ہی

جبکہ سب سے کم AuOSNPs ($45.65 \pm 0.83 \mu\text{gGAE}/\text{mg}$) میں دیکھی گئی ٹول آکسی ڈینٹ (TAC)، RPA، DPPH، NO اور H_2O_2 ان تمام نینو پارٹیکلز میں نمایاں مشاہدہ کی گئیں۔ اسی طرح سے جب ان نینو پارٹیکلز کا بیکٹریل اور فنگل اسٹریز کے خلاف چیک کیا گیا تو انہوں نے مؤثر طریقے سے ان مائیکروبز کی نشوونما کو بڑھنے سے روکا۔ سب سے زیادہ E.coli ($15 \pm 0.35 \text{ mm}$) بیکٹریا کی نشوونما FePINPs نے روکی۔ یہ قیمت سٹینڈرڈ (Chloramphenicol) سے بھی زیادہ ملاحظہ کی گئی اور ایسے ہی AgPINPs اور CuPINPs نے فنگل اسٹریز کی نشوونما کو روکا۔ ان نینو پارٹیکلز کی MIC اور MBC خصوصیات کا معائنہ بھی کیا گیا۔ ہیمولیتک تجزیے کے دوران ان نینو پارٹیکلز کی غیر نقصان دہ ہونے کا پتہ چلا۔ تاہم FeOSNPs نے باقی نینو پارٹیکلز کے مقابلے میں زیادہ ہیمولیتک رویہ ($13.54 \pm 0.37\%$) دکھایا۔ جب ان تمام خصوصیات کو جانچا گیا تو اس کے نتیجے میں چھ دھاتوں کے نینو پارٹیکلز (AgMkNPs، AgPINPs، AgOSNPs، CuPINPs، AuPINPs، FePINPs) کو چُنا گیا جن پر سائٹو ٹاکسیکسٹیز تجزیہ MTT طریقے کی مدد سے کیا گیا۔ اس کے لیے دو انسانی سیل لائنز کا استعمال کیا گیا۔ HeLA اور AU565 سیل لائنز $100 \text{ mg}/\text{mL}$ کی مقدار پر AgMkNPs نے AU565 کے خلاف سیل واپائی کو 23.65% (IC₅₀: $47.5 \text{ mg}/\text{mL}$) حد تک کم کیا جبکہ AgPINPs نے HeLA سیل لائنز کو 30.54% (IC₅₀: $40.24 \text{ mg}/\text{mL}$) کم کیا۔ اس کے بعد آخر کار Wistar rats پر ان نینو پارٹیکلز کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں rats کے جگر کے مختلف ٹیسس پیرامیٹر اور مخصوص ٹشوز کا ہسٹوپتھیا لوجی چیک کیا گیا۔ ان تمام پیرامیٹرز کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان نینو پارٹیکلز نے کوئی مضر اثر جانوروں پر نہیں دکھایا۔ ان تمام نتائج کو دیکھتے ہوئے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ پودوں کے عرقیات کی مدد سے تیار کئے جانے والے دھاتوں کے نینو پارٹیکلز نہایت مؤثر امیدوار کے طور پر ابھرے جن کا استعمال مہلک بیماریوں کے خلاف ادویات بنانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔

(610nm) ان دھاتوں کے نینو پارٹیکلز پر ماحول اور اراد گرد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے پودے کے ایکسٹریکٹ کا والیوم، دھات کے سالٹ کی مقدار، درجہ حرارت، پی ایچ اور وقت جو نینو پارٹیکل کی تیاری کے لیے درکار تھا اس کا تجربہ کیا گیا۔ یہ تمام اثرات بھی UV/Visible سپیکٹروسکوپی کی مدد سے ہی جانچ کئے گئے۔ جس کے دوران یہ مشاہدہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ سالٹ کی مقدار (0.1M) آزن نینو پارٹیکلز کی تیاری میں استعمال ہوئی جبکہ سب سے کم AuOsPNs (1nM) بنانے میں استعمال ہوئی۔ اس طرح سے کم والیوم (3mL) ایکسٹریکٹ نے AgOsPNs بنا دیئے اور (75mL) والیوم FeMkNPs کی تیاری میں استعمال ہوا۔ جب درجہ حرارت کا معائنہ کیا گیا تو AuOsPNs، AgsPNPs اور CuOsPNs کی تیاری کے لیے زیادہ درجہ حرارت (700C) جبکہ FeMkNPs کی تیاری میں کم درجہ حرارت (250C) برقرار رکھنا پڑا۔ پی ایچ کے معاملے میں زیادہ تر نینو پارٹیکلز معتدل (7) پی ایچ پر ہی تیار کیئے گئے یا اس کے آس پاس کی پی ایچ (6 یا 8) ان نینو پارٹیکلز کی تیاری تقریباً 6 سے 48 گھنٹوں کے درمیان ہوئی۔ ابتدائی جائزہ کے بعد FTIR سپیکٹروسکوپی، SEM، TEM، XRD اور EXD کی ٹیکنیکس کا بھی استعمال کیا گیا۔ جن کے ذریعے بہت ساری مفید معلومات حاصل ہوئیں مختلف فنکشنل گروپس جیسا کہ الکھول (O-H)، امائینو (N-H)، سائیکلک الکینز، ایڈی ہائڈک گروپس (-CHO)، تھائیول (S-H)، نائٹرو (N-O)، کاربوکسک (-COOH) الکین یا الکینین، ایرومیٹک ایڈر پودے کے ایکسٹریکٹس میں ملے جن کا کردار دھاتوں کے نینو پارٹیکلز کی تیاری میں ثابت ہوا۔ سلور نینو پارٹیکلز کا سائز 20 سے 50 نینو میٹر کے درمیان پایا گیا۔ جب TEM سے تجزیہ کیا گیا اور ساتھ ہی گول (دائرہ نما) شکل بھی گولڈ کاہر اور آزن نینو پارٹیکلز کی خصوصیات کا معائنہ SEM، XRD اور EDX کی مدد سے کیا گیا۔ جس میں ان نینو پارٹیکلز کی قماۃ اور دھاتی خوبیاں نظر آئیں۔ بائیولا جیکل خصوصیات کی جانچ کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی مائیکروبیل، ہیمولیک کے طریقے استعمال کئے گئے ان تمام طریقوں کے دوران نینو پارٹیکلز کی مختلف مقدار استعمال کی گئی۔

احادیث ☆ حضرت مقدم ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بیشک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ (بخاری) ☆ پھر ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے رب، اے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اسے حرام غذا کھلائی جاتی ہے۔ بھلا اس کی التجا کیسے قبول کی جائے۔ (مسلم) ☆ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع فرمایا اور کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے نیز لعنت فرمائی ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، گودنے والی، گدوانے والی اور تصویر بنانے والے پر۔ (بخاری)

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



وزیر اعظم کے مشیر برائے پلٹیکل آفیسر رانا ثناء اللہ خاں، چیئر پرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر ذوالفقار علی فیصل آباد و دیگر اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔



ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ٹیکنیکل سٹاف آفیسر رانا آصف صدیق آٹھ گالا کا دورہ کر رہے ہیں



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی، پرنسپل آفیسر سکول ڈاکٹر عبد الغفار، پرنسپل لیبارٹری سکول محمد جمیل طلبہ کو سالانہ تقسیم انعامات سے نواز رہے ہیں



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی مریم ہال میں پودا لگا رہے ہیں جبکہ اس موقع پر چیف ہال وارڈنز پروفیسر ڈاکٹر انوار الحق اور پروفیسر ڈاکٹر سدرہ اعجاز اور ممبر سینڈ کیٹ مسٹریاء الحق و دیگر موجود ہیں

فہرست مطبوعات

نظامت مطبوعات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت

تعلیمی و تحقیقی مفید مطبوعات کسان بھائیوں اور تحقیق کاروں کے لیے دستیاب ہیں جو حسب ضرورت بذریعہ مئی آرڈر منگوائی جاسکتی ہیں۔

نمبر شمار	عنوان (مکمل طور پر)	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
50	تر شاہ پھلوں اور امر دہ کی صحت مند زمری اگانے کے لیے ماڈل زمری کا قیام	15/-
51	زرعی مقاصد کے لیے کھارے پانی کے استعمال کی تزکیات	25/-
52	مذکورہ پر قاپو پاؤ۔ دودھ کی پیداوار بڑھاؤ	10/-
53	چار سے کی مسلسل فراہمی کیوں اور کیسے؟	25/-
54	باس کی کاشت	15/-
55	تر شاہ پھلوں پودوں میں بذریعہ ناپ ورنگ اقسام کی تبدیلی	15/-
56	قدرتی طریقے سے تیار شدہ خشک گجور	20/-
57	جانور کے لیے پیر جوس	20/-
58	سالا ڈیکلنڈر: آم کے باغات کی دیکھ بھال	20/-
59	سالا ڈیکلنڈر: تر شاہ باغات کی دیکھ بھال	20/-
60	گھڑ پوس کی کاشت: منافع بخش کاروبار	20/-
61	آلو کی کاشت	40/-
62	نعلی واؤ کی گھمدا کاشت کا سالا ڈیکلنڈر	20/-
63	گلاب کی گھمدا کاشت کا سالا ڈیکلنڈر	20/-
64	دودھ کی پیداوار بڑھانے کا عملی پروگرام	20/-
65	دیکھ کا کھارک	20/-
66	پاکستان میں پنجاب کے مختلف علاقوں کے کارآمد درخت	20/-
67	بگن کا ڈنگ	20/-
68	سڑا پیری کی کاشت، گھمدا کاشت اور برداشت	30/-
69	آبیچر شہتوت اور چاس کی کاشت	40/-
70	گجور کاری کے لئے زمری کا قیام	50/-
71	چارہ سازی کی اہمیت و افادیت	40/-
72	فصلوں میں چڑی بوٹیوں کا انسداد	40/-
73	مٹی اور سولیا پین کی گھول کاشت	40/-
74	مرچ لکائی اور پیسہ کس	20/-
75	نئی فصلوں کی کاشت (چروڑ)	70/-
76	دھان کی پیداوار کے لئے جدید غارشات	70/-
77	کی پیلیٹ (ایک پیپر اقتصادی تیل و فصل)	20/-
78	وڈن 2030، زرعی ترجیحات، نصب العین اور لائحہ عمل	50/-

نمبر شمار	عنوان (خصوصی شمارہ جات)	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
1	ڈیری فارم مینجمنٹ (ڈیری گائیڈ)	150/-
2	بکری مصبوعات، پھلوں اور سبز یوں کو محفوظ کرنا	150/-
3	پرنٹنگ ڈیری فارم	150/-
4	ماڈرن پلٹری پروڈکشن (پلٹری گائیڈ)	180/-
5	بھیر بکریاں پانا	150/-
6	کپاس کی کاشت	50/-
7	گندم کی کاشت	70/-
8	دھان کی پیداوار کی تکنیکی	40/-
9	شجر کاری بدلتے ہوئے ماحولیاتی تناظر میں	60/-
10	سبز یوں کی کاشت	160/-
11	کھاد کی کاشت	60/-
12	پھلوں کی کاشت	140/-

علاوہ ازیں دفتر کتب و رسائل و جرائد جامعہ کے زیر اہتمام سہ ماہی زرعی ڈائجسٹ شائع کیا جاتا ہے جس کے ریگولر شمارے کی قیمت 60/- روپے، سٹوڈنٹس سالانہ نمبر شپ 200/- روپے، بشمول ڈاک خرچ، سالانہ عام ممبر شپ 300/- روپے، بشمول ڈاک خرچ جبکہ لائف ٹائم ممبر شپ 5,000/- روپے، بشمول ڈاک خرچ ہے۔ ممبر شپ کے لیے مئی آرڈر بنام انچارج دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ارسال کر دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود ہمارے ممبر بنیں گے بلکہ دیگر شائقین علم و ادب کو بھی اس کی ممبر شپ حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پاکستان بھر میں مطبوعات منگوانے کے لیے دی گئی قیمتوں کے ساتھ ڈاک خرچ بھی ارسال کریں۔

نمبر شمار	عنوان (مکمل طور پر)	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
1	زراعت۔ وسائل اور مستقبل (ایک جائزہ)	30/-
2	کبیر یوں میں مصنوعی نسل کشی	25/-
3	چیر کی اقسام اور ان کی کاشت	20/-
4	راجہ سائے کا شکاران گجور	30/-
5	گا جری کاشت، صحت مند اور منافع بخش	15/-
6	پیاز کی پیداوار کی تکنیکی	20/-
7	سارے فاسفورس کھادیں	20/-
8	یو ایف 11	10/-
9	تھور باڑہ زمین کے لیے اصلاحی طریقے دیکھنا (نفع بخش کاشت)	25/-
10	کھارے پانی کے استعمال سے تھور باڑہ زمین میں کاشت دھان اور گندم کی پیداوار	10/-
11	آم۔ پھلوں کا بادشاہ	50/-
12	امروہی پیاریوں سے پاک زمری اگانے کے جدید طریقے	15/-
13	کلر ایچ زمینوں کے لیے نئی غذائی غذاؤں و فصل (تھور)	15/-
14	سوبا پھلوں میں ثروت، دریافت اور پیداوار بڑھانے کا قدرتی، آسان اور مستطریقہ	15/-
15	سلی میرین، امر ایش، گجور میں امپیک کران	10/-
16	کلی اشرفی	10/-
17	یو بی انگریز واپار (زیادہ پیداوار، بہتر کوالٹی اور صحت مند نشوونما بڑھانے والے صغیرہ کی پرہیز)	15/-
18	قربانی کے جانور، خرید گھمدا کاشت اور زرخ کرنا	15/-
19	گجور کی اقسام	25/-
20	ماٹ گراس بے مثال چار	15/-
21	بدلتے ہوئے شہریہ موئی حالات میں نماز کی کاشت	15/-
22	بدلتے ہوئے شہریہ موئی حالات میں موسم گرما کی سبز یوں کی کاشت	10/-
23	کلر وڈ زمینوں میں سبز یوں کی کاشت کے لیے غارشات	20/-
24	نسل میں بھرے کی کاشت	15/-
25	تر شاہ باغات میں چڑی بوٹیوں کا کھارک اور فیکٹیشن	25/-
26	تر شاہ باغات میں آبپاشی بڑھانے کا پرنٹیشن	20/-
27	پاکستان میں تر شاہ پھلوں کے امراض اور ان کا انسداد	10/-
28	بھٹی کے چ کی فصل	20/-
29	سی ایس کیٹنا کوئی	15/-
30	مڑ کے چ کی فصل	20/-
31	آئینہ شرم کی کاشت	60/-
32	بہن شرم کی کاشت	20/-
33	مونیٹوں میں شرم کی کاشت، تشخیص، علاج اور رکھنا کا ایک عملی پروگرام	15/-
34	جانوروں کی صحت اور افزائش سے متعلق اہم غارشات	15/-
35	دو دھل جانوروں کی خوراک سے متعلق مفید مشورے	15/-
36	جانوروں کی خوراک میں یوریا کھاد کا استعمال (شیر و بکریاں)	15/-
37	پاکستان میں شرم کی پانی کی کمی، اثرات اور احتیاطی تدابیر	15/-
38	شہروں سے خارج ہونے والے فاسفورس کا آبپاشی کے لیے استعمال اور اس کے نقصانات	15/-
39	غیرہ چار	15/-
40	پاکستان میں آگنی جانے والی قربانی کی اقسام	20/-
41	تعمیراتی موئی حالات میں بھٹی توری کی کاشت	15/-
42	نسل میں شرم کی کاشت	20/-
43	نماز کی نسل میں کاشت	15/-
44	کھارے پانی سے فصلات کی کاشت اور تھور باڑہ زمین کی اصلاح	10/-
45	رہنما کتابچہ: آم کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کا متناسب استعمال	30/-
46	تر شاہ پھلوں کی تبدیلی شدہ زمری کی داغ بیل اور گلوں میں بیماری کا رجحان	25/-
47	تر شاہ پھلوں کے باغات کی دیکھ بھال کے چند بنیادی اصول	30/-
48	گا جری کاشت اور چ کی پیداوار	25/-
49	آبپاشی کے ساتھ کھادوں کا استعمال و فیکٹیشن	20/-

نظامت مطبوعات، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

فون نمبر 3405 Ext. 69-9200161-041، ای میل oubmuaf@gmail.com