

ترجمان زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد

زندگی کا حسن

جولائی تا ستمبر
2022ء



بے چراغ کنیا میں، بے لباس جسموں میں
زندگی سسکتی ہے، زندگی کی بارش میں

کھلے آسمان تلے بے خانماں، زراعت و متاع حیات
سے محروم 3 کروڑ پاکستانیوں کے لیے زراعت کی ازسرنو
بحالی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سیلاب متاثرین کی تباہ حال زراعت
کی بحالی کے لیے سبزیوں، گندم کے بیج، زرعی آلات، شیشی
چولہوں کی فراہمی کے حوالے سے یونیورسٹی انڈوومنٹ فنڈ
کے علاوہ مرکزی و صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطے میں ہے
رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)

شعبہ تصنیف و تالیف
جامعہ زمرعیہ فیصل آباد



جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، پونیورسٹی آف فلوریڈا کی ڈاکٹر کیرن اے گیرٹ، ڈاکٹر اسماعیل عبدالحمید، ڈاکٹر محمد جلال عارف، ڈاکٹر نواز بیکین، ڈاکٹر سلطان حبیب اللہ، نبال احمد خاں و دیگرانہ پیشکش سپوزیم برائے فوڈ سیکورٹی سے خطاب کر رہے ہیں



نامور ماہر معاشیات ڈاکٹر عشرت حسین، رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، پارب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عابد محمود، ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر ڈی بی ریسرچ ڈاکٹر نواز بیکین خصوصی سیمینار و تربیتی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈین کلیہ ویٹرنری سائنسز ڈاکٹر قمر بلال، چوہدری محمد اشرف و دیگر ولڈ کیمل ڈے کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈائریکٹر فارمرز کے زیر اہتمام گندم بارو سیٹنگ مہم کا افتتاح کر رہے ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خاں، بارانی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر قمر الزماں، ڈاکٹر شوکت علی و دیگر سینئر ٹیوشن اور سنگت تھیر کے اشتراک سے منعقدہ چوگ کسمبے دی ڈرامہ کے اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خاں، ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر سرور خاں، ڈین کلیہ سائنس ڈاکٹر محمد اصغر و دیگر بین الاقوامی ورکشاپ برائے بائیو ٹیکنالوجی، بائیو انفورمٹیکس و بائیو کیمسٹری سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خاں، ڈاکٹر محمد پونس اور ڈاکٹر احسن طلبہ میں سکالرشپ تقسیم کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خاں عالمی یوم ارض کے موقع پر آگاہی واک کی قیادت کر رہے ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، ڈاکٹر انوار الحق ودیگر ولڈانوار نمٹل ڈے کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈین کلیہ عزامت ڈاکٹر امان اللہ ملک، ڈاکٹر افتخار احمد خاں، ڈاکٹر ذوالفقار علی، ڈاکٹر خالد عزیز، ڈاکٹر محمد اسلم ودیگر دکنی کی پیداوار کے چیلنجز اور مواقع پر منعقدہفرنس سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، ڈاکٹر ظفر جاوید، ڈاکٹر عائشہ ریاض، شیراز شان ودیگر ٹیکنیکل سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، پروفیسر ڈاکٹر انس سرور قریشی ودیگر یونیورسٹی میں منعقدہ بیہر راعت ناچ ایچینج سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں

شعبہ تصنیف وتالیف زرع یونیورسٹی فیصل آباد

فون نمبر 041-9200161-69 ای میل اڈریس oubmuaf@gmail.com



رجسٹرڈ ایل نمبر 7793 جلد نمبر 57 شمارہ نمبر 3

نگار خانہ

جولائی تا ستمبر 2022ء

ISSN 2521-0416

سرپرست اعلیٰ

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)
وائس چانسلر

مجلس تنظیم

پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف
مدیر تنظیم / انچارج شعبہ تصنیف و تالیف
ڈاکٹر شوکت علی ایسوسی ایٹ پروفیسر
(ایڈیٹر/سیکرٹری)

ممبران

پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد
پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال
پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود چوہدری
پروفیسر ڈاکٹر بشری سعدیہ
ڈاکٹر محمد اقبال
ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان
ڈاکٹر بلقیس فاطمہ
ڈاکٹر عرفان افضل
ڈاکٹر محمد دلدار خاں گوگی
ڈاکٹر محمد سہیل ساجد
ڈاکٹر محمد عتیق
ڈاکٹر بنیش اسرار

ترتیب و تدوین

مظفر حسین سالک ریسرچ آفیسر
محمد آصف یونیورسٹی آرٹس/گرافک ڈیزائنر
عظمت علی آرٹس
محمد اسماعیل آفس اسٹنٹ
محمد امین، آصف محمود اردو ٹائپسٹ
قیصر محمود معاون
ممتاز علی اسسٹنٹ رجسٹرار، انچارج یونیورسٹی پریس
احمد شہریار پبلک ریلیشنز آفیسر (بی آر پی)
ڈاکٹر شازیہ رمضان انتخاب آیات و احادیث
سیف اللہ زاہد عکاسی

شائع کردہ:

شعبہ تصنیف و تالیف
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



لاف نام نمبر شپ 5000 روپے
سالانہ نمبر شپ 300 روپے
سٹوڈنٹ نمبر شپ 200 روپے

Phone: 041-9200161-69 Ext. 3405
email: oubmuaf@gmail.com www.oubm.org / www.uaf.edu.pk

فہرست

تقدیم	03	زرعی تغیر نو کا عزم	پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف
اداریہ	04	اپنی بات: موجودہ سیلاب اور غذائی عدم تحفظ	ڈاکٹر شوکت علی
رپورٹ	07	فوڈ سکیورٹی کے تناظر میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ملک و قوم کی توقعات	پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارۂ امتیاز)
	10	سیلاب کی تباہ کاریاں، لوگوں کی درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات	پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف
	13	کالا باغ ڈیم کی اہمیت اور ڈریجنگ و نواتانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد
	15	گھریلو باغبانی میں آکسوسٹریم کی کاشت کے لیے سفارشات	ڈاکٹر محمد منزل جہانگیر
	19	جانوروں میں بھی سکین کی بیماری	پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال
	22	دہشت گردی میں خواتین کا کردار	ڈاکٹر نیش اسرار
	24	پاک کوریائیوٹریشن سنٹر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا انعقاد	مریم جلال
	25	چنے کی کاشت	ڈاکٹر محمد فرخ سلیم
	27	Floods and food insecurity	Prof. Dr. Iqar Ahmad Khan (S.I.)
ٹیکنالوجی برائے فصلات	32	پاکستان میں سویا بین کی کاشت میں درپیش مسائل	محمد اویس ارشد
	34	گوار کی پیداواری ٹیکنالوجی	ڈاکٹر عمران خان
ہائیکچر	37	بیاض کی کاشت اور اس کے افزائے جھلساؤ کا تدارک	محمد طلحہ اشرف
	39	چنددرجی غذائی اہمیت اور محفوظ کاشت	ڈاکٹر فہر رسول
	42	بھلوں اور سبز پلوں کو مستور تاج کے دوران خراب کرنے والے اہم عناصر اور ان کا تدارک	ڈاکٹر محمد انعام الرحیم
	44	آسم کی پیداوار، بیماریاں اور ان کا تدارک	میمنہ بشیر
	47	پاکستان کے علاقائی پھل اور ان کی افادیت	آمنہ کوثر
	49	مشروم (کھمبی) کی غذا	ڈاکٹر ناصر احمد خاں
	50	انٹرایکٹیم کٹ فلاور کی پیداواری ٹیکنالوجی	ڈاکٹر احسن اکرم
لائبوسٹاک	52	صوبہ پنجاب میں مویشی پال کسانوں کے بگڑتے حالات کا تحقیقی جائزہ	ڈاکٹر محمد افتخار
	53	جنگلی حیات کو درپیش خطرات	شرہ ناز
	56	فینسی مرغیوں کی انوٹرمنٹ کنٹرول کرنے کا جدید طریقہ کار	ڈاکٹر فواد احمد
متفرقات	59	زمینی کلر کی پہچان بذریعہ ریوٹ سسٹم	محمد بیضال
	60	شہد کی مکھیاں، ان کی اقسام اور دشمن کیڑے	بلال سعید خان

زرعی ریسرچ کارنر (پی ایچ ڈی اسکالرز کی تحقیق کے اہم نتائج و سفارشات)

انٹو مالوجی	64	حشرات کی بڑھوتری کو کنٹرول کرنے والے نباتاتی مرکبات اور ذخیرہ شدہ اجناس کا تحفظ	شیریں رضا حیدری
	65	ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ماحول دوست زرعی ادویات کی افادیت	محمد یاسر
	65	ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں میں مدافعت کا نظام	فیضان امجد
پی بی جی	67	کم دور ایسے میں تیار ہونے والی کپاس کی نائٹروجن کی مختلف سطحوں کے تحت جینیات	سدرہ عاشق رانا
ایگرا نومی	68	دھان، گندم کے فصلی نظام میں کم زرعی مداخل اور زیروچ ٹیکنالوجی کے ذریعے دھان کے مڈھوں کا زمینی زرخیزی کے لیے استعمال اور گندم کی پیداوار میں اضافہ	غلام مصطفیٰ
سوائل سائنس	69	پیداواری ٹیکنالوجی برائے سورج گھمھی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات	محمد اویس
فریالوجی اینڈ فارماکالوجی	70	بائیو لوجیکل فلوئڈز میں پھسلین اور سلفونا مائڈز کے باقیات کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے سٹرپ ٹیسٹ	ندانورین
کیب (CABB)	71	کما دیں حیاتیاتی مسائل کو کم کرنے اور فطرت کے خلاف دفاعی نظام مضبوط کرنے کیلئے اس کے جیز کا مطالعہ	اقصیٰ پرویز
فارمٹری	71	نیم بارانی علاقوں میں سبز زہد زمینوں کی حالت زار اور درختوں کی مختلف اقسام کی بڑھوتری پر سبز زہد زمین کے اثرات اور ان کا تدارک	حافظ محمد فرقان شاہین
فوکس	72	نینیو میڈیکل کیمیا کی طبی اطلاقی	کنول اختر
نباتات و جینیات	73	گندم میں خشک سالی کے خلاف مدافعت کے لیے این ایف وائی (NF-Y) جینز کا کردار	عمر افتخار خاں
فوڈ ٹیکنالوجی	74	کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی غذائی بار	سدرہ چہیں
رورل سوشالوجی	74	خواتین کا زراعت میں کردار اور درپیش مسائل	درتہوار
ایگری ایکسٹینشن	75	پاکستان میں زرعی پانی کی قلت کی وجوہات اور اس کے اثرات	محمد اویس علی خان

پبلشر پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف نے زرعی یونیورسٹی پرلین فیصل آباد سے چھپوا کر شعبہ تصنیف و تالیف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے شائع کیا

تقدیم

پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف

زرعی تعمیر نو کا عزم

امسال ہونے والی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے جہاں ملکی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے وہاں لوگوں کی زندگی کو ایک بار پھر سے طوفان نوح کا سامنا ہے۔ 3 کروڑ سے زائد متاثرہ افراد کی فصلوں، گھروں اور املاک سے محرومی قیامت صغریٰ کے مترادف ہے۔ کھیتوں، سڑکوں، پلوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کی سہولیات سمیت بنیادی انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ تمام چھوٹی بڑی فصلوں سمیت کثیر تعداد میں مویشی آبی موت کی نذر ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 10 بلین ڈالر کا نقصان عوام اور حکومت کے لیے کڑا امتحان ہے۔ 1.9 ہیکٹر پر کاشت کی گئی 45 فیصد کپاس بری طرح متاثر ہوئی۔ 3 لاکھ ایکڑ پر گنے کی فصل، 30 فیصد چاول کی فصل دریاؤں کی طغیانی اور سیلابی ریلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ تاریخ کے اس بدترین سیلاب نے جہاں دیہی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے وہاں کسان کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ زرعی سرگرمیاں تعطل کا شکار ہیں۔ مال مویشی، خوراک کے ذخائر اور جمع پونجی سب کچھ طغیانیوں کی نذر ہو چکا ہے۔ سیلاب زدگان نا اُمیدی اور مایوسی کی دلدل میں دھنسے کسان کا ہاتھ تھامنے اور اسے ایک بار پھر زرعی سرگرمیوں میں مشغول کرنے کے لیے ملک کی سب سے بڑی علوم زراعت کی دانش گاہ میدان عمل میں موجود ہے، تباہ حال زراعت کی بحالی اور تعمیر نو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے زرعی ماہرین نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) کی مدبرانہ قیادت میں حسب روایت ملکی زراعت کی از سر نو تعمیر کا عزم کیا ہے۔ جنوبی پنجاب، بالائی پنجاب، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے یونیورسٹی کی جانب سے 1000 من گندم کا بیج مفت فراہم کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید براں ہوم گارڈنگ پروجیکٹ کے تحت سبزیوں کے بیج کی فوری تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ جامعہ کی طرف سے ملازمین کی دودن کی تنخواہ سمیت ضروریات زندگی کی اشیاء و خوراک متاثرین سیلاب تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جامعہ زرعیہ فیصل آباد ان تمام تر مشکلات کا سامنا کرنے اور ملکی زراعت کی از سر نو تعمیر کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا کرے گی۔ 3 کروڑ پاکستانیوں کا جانی، مالی، زمینوں اور فصلوں کا نقصان اس حد تک زیادہ ہے جسے مکمل طور پر بحال کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ قائد زراعت ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی طرف سے بنائی دو کمیٹیوں کے کنوینر ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو سیلاب کی تباہی کے متعلق نقصانات کا اندازہ لگانے اور اپنی سفارشات پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ چیئر مین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کمیٹی کے کنوینر کی ذمہ داری ڈاکٹر اقرار احمد خاں کو سونپی ہے۔ زمینوں کی بحالی، نشاندہی اور یونیورسٹی کا بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ان تمام مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو نئے قرضے فراہم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔

اپنی بات

ایڈیٹر: زرعی ڈائجسٹ

موجودہ سیلاب اور غذائی عدم تحفظ

تحریر: پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)، وائس چانسلر، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ترجمہ: ڈاکٹر شوکت علی، ایڈیٹر، زرعی ڈائجسٹ

پاکستان، پائیدار ترقی کے اہداف برائے 2030 کو پورا کرنے کا پابند ہے لیکن اقوام متحدہ کے ان اہداف خصوصاً بھوک کے خاتمہ کا حصول ملک بھر میں سیلاب اور موسمیاتی تباہی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ پاکستان پہلے ہی سالانہ 10 ارب ڈالر کی ضروری اشیاء بشمول گندم درآمد کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ چاول، آلو اور مکئی پاکستان کی برآمدات میں شامل ہیں لیکن درآمدات کے خوفناک اعداد و شمار ملک میں غذائی عدم تحفظ کی بھی عکاس ہیں۔ ہمارے ہاں غذائی تحفظ کا مطلب گندم، گھی اور چینی کی دستیابی ہے۔ بھوک کے خاتمے کا مطلب محض پیٹ بھرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا تک رسائی بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک کے مکمل خاتمے کا خواب عوام کو متوازن خوراک مہیا کئے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں آنے والے موجودہ سیلاب، دراصل موسمیاتی تبدیلی کا شاخسانہ ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ قدرتی آفات کا خمیازہ بھگتنے والے زیادہ تر ممالک موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پاکستان میں موسم کی تبدیلی کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج کی مقدار انتہائی کم ہونے کے باوجود یہاں ابھرنے والے سپرفلڈ نے غذائی خود کفالت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔



وطن عزیز میں غذائی خود کفالت کا حصول گندم کی بھرپور پیداوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ موسم میں غیر متوقع تبدیلیاں ہمارے ہاں گندم کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ خصوصاً موسم بہار کے آغاز میں بڑھنے والا درجہ حرارت گندم کی فی ایکڑ پیداوار کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گزشتہ دو سالوں سے گندم درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ 2022-23 کے لیے بھی گندم کی طلب کا تخمینہ 30 ملین ٹن جبکہ پیداوار 26 ملین ٹن کے لگ بھگ متوقع تھی لیکن سیلاب کے بعد 26 ملین ٹن کی پیداوار بھی کوئی آسان ہدف نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس وقت ملک کا ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ گندم کی کاشت کا تقریباً 13 فیصد رقبہ سندھ میں ہے جو آجکل سیلاب کے نشانے پر ہے۔ اسی طرح پنجاب کے وہ علاقے جہاں سے صوبے کی تقریباً ایک چوتھائی گندم حاصل ہوتی ہے، زیر آب ہیں۔ پاکستان میں 22 ملین ایکڑ پر گندم کاشت کی جاتی ہے جس کے لیے 1.14 ملین ٹن بیج درکار ہوتا ہے۔ ملک میں تصدیق شدہ بیج کی پہلے ہی کمی ہے جس کا مجموعی ذخیرہ 0.5 ملین ٹن ہے۔ زیادہ تر کاشتکار، گھر میں محفوظ شدہ گندم کو بطور بیج استعمال کرتے ہیں لیکن حالیہ صورت حال میں محفوظ شدہ گندم بھی سیلاب کی نذر ہو چکی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گندم کی بروقت کاشت کے لئے زمین کی دستیابی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔

گندم کے علاوہ چاول، کپاس، گنا، مرچ، پیاز، چارہ، کھجور اور سبزیاں وغیرہ بھی زیر آب ہیں۔ فصلوں کے ساتھ ساتھ



مویشی بھی سیلاب سے یکساں متاثر ہوئے ہیں۔ جانوروں میں کئی طرح کی امراض پھوٹ رہی ہیں اور یہ صورت حال دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔

موجودہ سیلابی صورتحال ایک آنے والے قحط کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کو پاؤں پر آنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ گندم کی پیداوار میں کمی کو درآمدات سے پورا کیا جاسکتا ہے لیکن روس اور یوکرین تنازعہ کے نتیجے میں عالمی قیمتیں پہلے ہی بڑھ چکی ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے اگلے سال سبزیوں اور تیل دار اجناس کی پیداوار بھی کم ہونے کا امکان ہے، جس سے درآمدی بل میں مزید اضافہ ہوگا۔

ورلڈ فوڈ پروگرام کی گلوبل فوڈ رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 55 ممالک میں شامل ہے جہاں بھوک اور غذائیت کی کمی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے خشک سالی و سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حیرت انگیز طور پر 51 فیصد لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 20 فیصد سے کم پاکستانی بچوں کی ہی کم از کم متوازن غذا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ان حالات میں پانچ سال سے کم عمر کے 45 فیصد سے زائد بچے دائمی غذائیت کا شکار ہیں اور موجودہ سیلابی صورت حال میں اب یہ مسئلہ مزید سنگین ہونے کا امکان ہے۔ سیلابی حالات نے محض غذائی تحفظ کے اہداف کو ہی متاثر نہیں کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مستحکم زراعت، دیہی انفراسٹرکچر، زرعی تحقیق و ٹیکنالوجی، تجارتی پابندیوں اور مستحکم منڈیوں کے امکانات کو بھی کلیتہً خطرے میں ڈال دیا ہے۔

سیلاب کی کوکھ سے جنم لینے والے ممکنہ غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اور ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ گندم کی بروقت درآمد اس بحران کے حل کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ چاول، آلو اور مکئی کی برآمدات کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں گندم کے آٹے میں 10 فیصد مکئی کا آٹا شامل کرنے سے بھی گندم کی طلب کو کم کیا جاسکتا ہے۔ فلور ملوں کو اگر لازمی احکامات جاری کر دیئے جائیں تو مکئی و گندم پر مشتمل آٹا با آسانی مارکیٹ میں لایا جاسکتا ہے۔ اس طرح آٹے کی غذائیت بھی بہتر ہوگی اور گندم کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں گی۔ دودھ کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے خشک دودھ کی درآمد کو آسان بنایا جانا چاہئے۔ اسی طرح نزدیکی ممالک سے ضروری سبزیوں (پیاز، ٹماٹر، مرچ) کی درآمد کی جانی چاہئے تاکہ ان ضروری غذائی اجناس کی قیمتیں زیادہ بڑھنے نہ پائیں۔

تباہ شدہ کھیتوں کی بحالی کے لیے ایک مارشل پلان کی ضرورت ہے۔ اس میں سیلابی پانی کی نکاسی، سیلابی طبع و دلدلی گارے سے خلاصی اور تباہ شدہ زرعی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو شامل ہے۔ شدید سیلاب نے زمین کی حد بندیوں کے نقش تک مٹا دیئے ہیں۔ محکمہ ریونیو کے عملے خصوصاً پیٹرواریوں کو ریکارڈ کی گرد جھاڑنی ہوگی تاکہ مٹ جانے والی حد بندیوں کو نئے سرے سے تشکیل دیا جاسکے۔ ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ امیجز کا استعمال حد بندی کے کام کو آسان بنا سکتا ہے۔ اسی طرح بھاری مشینری اور عام کھیتی کے آلات بھی یکساں طور پر مطلوب ہیں۔ تباہ شدہ آبپاشی اور نکاسی آب کے گھسے پٹے نظام کی جگہ اب موقع ہے کہ بہتر نظام تشکیل دیا جائے۔ مزید برآں کاشتکاروں کو رعایتی نرخوں پر بیج، کھاد، زرعی ادویات وغیرہ دی جانی چاہئیں اور انہیں سستے قرضہ جات بھی فراہم کئے جانے چاہئیں۔

تباہی کے ساتھ ساتھ اس سیلاب نے ہمیں تعمیر نو کا ایک موقع بھی فراہم کیا ہے تاکہ ہم پائیدار ترقی کے لیے ایک مستحکم اور موثر حل کی بنیاد رکھ سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم امید کا دامن تھامے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور سیلابی علاقوں میں امید کے بیج بوئیں تاکہ وہاں زندگی نشوونما پا سکے۔ واضح رہے کہ اجڑے ہوئے لوگوں کو واپس پلٹنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ واپس پلٹ کر بسنے میں انہیں کئی سال لگ جائیں۔

فوڈ سیکورٹی کے تناظر میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ملک و قوم کی توقعات

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو برصغیر پاک و ہند میں علوم زراعت کی اولین درسگاہ کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ یونیورسٹی 1906ء سے زرعی شعبہ کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت کی تیاری کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔ اس درسگاہ سے فارغ التحصیل ہوئیوالے سائنسدانوں کی بڑی تعداد بین الاقوامی اور ملکی زرعی شعبے کی تعمیر و ترقی میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملکی آبادی محض ساڑھے تین کروڑ نفوس پر مشتمل تھی۔ پاکستان میں آبادی کی شرح مسلسل تیزی کے ساتھ فروغ پذیر رہی ہے اب 22 کروڑ آبادی کا حامل یہ ملک اپنی غذائی ضروریات کے ساتھ ساتھ مغربی سرحد پر واقع ہمسایہ ملک کی خاطر خواہ ضرورت بھی پوری کر رہا ہے۔ یہ بات کسی سے



ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے تربیت یافتہ سائنسدانوں نے مختلف مرکزی و صوبائی زرعی تحقیق کے ادارہ جات میں یہاں سے سیکھی ہوئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے بیجوں کی دریافت میں حیران کن کامیابیاں حاصل کیں ہیں۔ ان کی مسلسل کوششوں کی بدولت پاکستان کچھ عرصہ پہلے تک کپاس، چاول اور آم کی پیداوار میں دنیا کا چوتھا دودھ، چینی اور کھجور میں پانچواں چنے میں تیسرا، خوبانی میں چھٹا، کینوا اور ترشاوہ پھلوں کی پیداوار میں دنیا کا چھٹا جبکہ گندم اور پیاز کی پیداوار میں دنیا کا ساتواں بڑا ملک ہے اور غذائی استحکام کے تناظر میں اہم ترین کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ جب بھی پاکستان میں غذائی استحکام کی بات ہوتی ہے تو پالیسی سازوں اور حکمرانوں کی نظر سب سے پہلے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پر پڑتی ہے، زرعی شعبہ تین طرح کے کردار قومی سطح پر نبھا رہا ہے جس میں عام آدمی کے لیے خوراک اور صنعت کے لیے ریشہ جبکہ ملک کے لیے خطیر زرمبادلہ کے ساتھ ساتھ صنعتی سامان اور مشینری کے لئے مارکیٹ کا بندوبست شامل ہے۔ زرعی شعبہ پاکستان میں اقتصادیات کے لئے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے باوجود اس کے جی ڈی پی کی شرح نمو ملک کی آزادی کے بعد سے بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1949-50ء میں ملکی شرح نمو میں زراعت کا حصہ 53 فی صد تھا جو کہ 2016-17ء میں کم ہو کر محض 19.8 فی صد تک رہ گیا ہے، ہمیں زرعی شعبے کی تنزلی کے اسباب و عوامل کا ٹھنڈے دل سے بغور جائزہ لینا ہوگا۔ 1947ء سے پاکستان ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں کے لئے خام پیداوار مہیا کرنے میں مصروف عمل ہے جس کی وجہ سے ویلیو ایڈیشن پر وہ توجہ مرکوز نہیں کی



جاسکی جس کا تقاضا ہماری معیشت مسلسل کرتی چلی آرہی ہے۔ قیام پاکستان سے لیکر کئی دہائیوں تک بہترین نہری نظام اور اعلیٰ زبانی وسائل کی بدولت پاکستان میں زرعی پیداواری لاگت خطے کے دیگر ممالک اور بین الاقوامی مارکیٹ کے مقابلے میں بہت کم مگر وقت کے ساتھ ساتھ زرعی مداخل، بجلی اور تیل وغیرہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور اجناس کی قیمتوں میں کمی جیسے مسائل کے باعث ہمارا شعبہ زراعت زوال پذیر ہو رہا ہے۔

بدقسمتی یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد غلہ منڈیوں کی تعداد میں حسب ضرورت اضافے کے ساتھ ساتھ غلہ گوداموں اور کولڈسٹوریج کا جال نہ بچھایا جاسکا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر حاصل ہونیوالی پیداوار بیرونی اور بین الصوبائی منڈیوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ 1960ء کا سبز انقلاب کئی حوالوں سے پاکستانی زراعت کے لیے ایک ایسے سنگ میل کی حیثیت کا حامل تھا جس کا تسلسل یقینی بناتے ہوئے پاکستان کو دنیا کے صف اول کے پیداواریت کے حامل ممالک کی صف میں شامل کیا جاسکتا تھا۔ سبز انقلاب کے پیچھے چھوٹے قد والی غذائی فصلات اور کھادوں کا استعمال اہم ترین عناصر تھے جس کے بعد فصلات کی ورائٹیوں میں جدت دیکھنے میں آئی۔ گندم اور دیگر اجناس کی سرکاری سرپرستی میں خریداری اور ذخیرہ کاری کا نظام وضع کیا گیا اور دو بڑے ڈیم، تربیلا اور منگلا بھی اسی دہائی میں تعمیر کیے گئے۔ بعد ازاں آنے والی حکومتوں نے پانی کے ذخائر کے لئے ڈیمز کی تعمیر پر توجہ نہ دی جس کی وجہ سے پاکستان کے زیر زمین آبی وسائل کے استعمال میں مسلسل اضافہ وقوع پذیر ہونے لگا اور اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان پانی کی شدید کمی کے شکار ممالک میں شامل ہونے لگا ہے۔ ہم ہر سال پانی کے ذخائر کی عدم دستیابی کی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریوں کی بدولت بھاری جانی و مالی نقصان کے ساتھ ساتھ فصلات کی تباہی کی صورت میں زرعی پیداوار کی کمی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 1960ء کی دہائی میں سالانہ شرح نمو 5.07 فی صد تھی جو کہ 1970ء کی دہائی میں حکومت کی جانب سے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے اقدام کی وجہ سے کم ہو کر 2.37 فی صد تک محدود ہو گئی۔ اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ پاکستانی کرنسی مسلسل زوال پذیر رہی جس کی وجہ سے مہنگائی اور گرانی میں اضافہ دیکھنے میں آیا جس کے اثرات سب سے زیادہ چھوٹے کاشتکار پر مرتب ہوئے جس کے لیے نئی فصل کی کاشت کے حوالے سے حکومتی سرپرستی میں آسان قرضوں کی فراہمی ایک مسئلہ بن کر رہ گئی۔ 1980ء کی دہائی میں کپاس کی بہترین پیداوار کی بدولت ایک بار پھر شرح نمو میں 5.4 فی صد کی صورت میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ایک نئی زرعی پالیسی متعارف کرائی گئی جس میں عالمی مارکیٹ کے ساتھ مطابقت کی حامل کسانوں کے لیے فارم پرائس کو یقینی بنانے پر توجہ دی گئی۔ اس مقصد کے لیے ایگری کلچرل پرائس کمیشن تشکیل دیا گیا تاکہ فصلات کے لیے سپورٹ پرائس کا بندوبست کیا جاسکے۔ 1990ء کی دہائی میں زرعی شعبے کی کارکردگی متزلزل رہی اور اس دہائی کے آغاز میں ملکی زرعی برآمدات کی مرکزی فصل کپاس کو پتہ مروڑ وائرس جیسے موذی مرض کا سامنا کرنا پڑا جس سے ملکی برآمدات میں انتہائی کمی دیکھنے میں آئی۔ تاہم اسی دہائی میں لائیو سٹاک سیکٹر کو فروغ پذیر ہونے کا موقع ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے لائیو سٹاک مجموعی زرعی شرح نمو میں ایک تہائی حصہ ڈالنے کے قابل ہو گیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نہ صرف تربیت یافتہ افرادی قوت کی مسلسل فراہمی کا فریضہ انجام دیتی رہی بلکہ یہاں سے تحقیق کے لئے نئے زاویے تلاش کرنے کا کام بھی جاری و ساری رہا۔ 2008ء میں یونیورسٹی کی تمام تر تحقیقی و سائنسی کامیابیوں کو لائبریریوں کی الماریوں میں بند کرتے چلے جانے کی روش کو ترک کرتے ہوئے راقم الحروف نے آؤٹ ریچ میکانزم پر کام کا آغاز کیا جس کے تحت سال میں دو مرتبہ خریف اور ربیع کی فصلات کے آغاز پر کسان میلے منعقد کیے جانے لگے جس میں زرعی شعبہ سے وابستہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول انڈسٹریل سیکٹر، مارکیٹنگ شعبہ، نجی ادارہ جات کے ساتھ ساتھ سرکاری وغیرہ سرکاری اداروں کو ایک چھت تلے جمع کر کے ملک بھر سے کسانوں کو ان میلوں میں شرکت کی دعوت دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فیصل آباد شہر کا سب سے بڑا ثقافتی میلہ کاروپ

دھارنے لگا۔ لوگ جوق در جوق نیزہ بازی، فینسی بڑشو، جانوروں کے مقابلہء حسن و دودھ کی پیداوار اور زرعی نمائش دیکھنے کے لئے یونیورسٹی کا رخ کرنے لگے۔ ہفت روزہ سال میں دو مرتبہ منعقد ہونے والے ان میلہ جات میں کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لئے آڈیٹوریم میں کسان کنونشن کا انعقاد بھرپور دلچسپی کا حامل رہا ہے۔ یہ روایت دس سال تک پورے آب و تاب سے جاری و ساری رہی اور یونیورسٹی کے کردار کو قومی سطح پر بھرپور پذیرائی میسر رہی اس عرصہ میں راقم الحروف کو زرعی پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملا جبکہ یونیورسٹی کی جانب سے دیگر زرعی تحقیقی و توسیعی اداروں کے ساتھ ملکر کسانوں کی دہلیز تک جدید ٹیکنالوجیز کی منتقلی کا کام بھرپور انداز سے جاری رکھا گیا۔ یہ وہ اجتماعی کوششیں ہیں جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے دیگر سرکاری و غیر سرکاری زرعی ادارہ جات کے ساتھ ملکر ملکی زرعی ترقی کے لئے بروئے کار لاتے ہوئے حیران کن کامیابیوں کا سفر قیام پاکستان سے لیکر آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ 1947ء میں گندم کی پیداوار 3.30 ملین ٹن تھی جو کہ 2014ء میں 25 ملین ٹن تک جا پہنچی۔ یہی صورت حال دیگر فصلات کی پیداواریت میں دیکھنے میں آئی کپاس کی پیداوار 0.18 ملین ہیکٹر سے بڑھ کر 2.374 ملین ہیکٹر، آم 0.13 میٹرک ٹن سے 1.716 میٹرک ٹن ترشادہ پھل 0.088 ملین ٹن سے 2.396 ملین ٹن اور پیاز کی پیداوار 0.056 ملین ٹن سے 1.671 ملین ٹن ہو گئی۔ ابھی زرعی شعبے کی ترقی کے لئے ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے 20 ہزار نو جوانوں کا ہراول دستہ حکومت پنجاب کی زیر سرپرستی زرعی توسیعی عملہ کے ہمراہ صوبے کے طول عرض میں کھیتوں کھلیانوں میں پہنچ کر کسانوں کو گندم کی بوائی میں نئی جدتوں سے وشناس کراتا رہا اور اب یہ مشن دیگر فصلات کی کاشت کے موقع پر دہرانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام نظریں بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہم پر مرکوز ہیں اور ہم ملکی زراعت کو ترقی سے ہمکنار کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ملک کی 50 فی صد آبادی غذائیت کی کمی کا شکار ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں گندم کے ساتھ مکئی، جو اور دیگر اجناس مکس کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ جبکہ لوگوں میں متوازن غذاؤں کے حوالے سے شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر کوریاء کے ادارے 'کویکا' (KOICA) اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے جامعہ میں پاک کوریائیونیورسٹیشن سینٹر (PKN) کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اس قومی ادارے کے پلیٹ فارم سے ملک میں غذائی کمی جیسے اہم مسائل پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی۔ قبل ازیں یو ایس ایڈ کے مالی تعاون سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی معاونت سے 'سنٹر فار ایڈوانسڈ سٹڈیز برائے خوراک و زراعت CAS' کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے جس میں آٹھ جدید ترین لیبارٹریز کے قیام کے علاوہ سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا جس میں امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلی فورنیا ڈیویس UC Davis میں چھ چھ ماہ کے لیے میرٹ پر پی ایچ ڈی سکالرز کو بھجوا گیا جبکہ فیکلٹی ایکسچینج پروگرام میں دونوں جامعات کے سائنسدان بھی اس کا حصہ رہے۔ CAS میں جینوم ایڈیٹنگ منصوبے کا آغاز ملکی زراعت کو پلانٹ بریڈنگ کے شعبے میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے اور موسمی تبدیلیوں کے تناظر میں بیجوں کی تیاری کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت پس ماندہ علاقوں اور مالی استطاعت نہ رکھنے والے نوجوانوں کی تعلیم کے لیے کثیرالوجہ سہولتوں کی فراہمی کا یہ کام جاری ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوم گارڈنگ کا منصوبہ انڈوومنٹ فنڈ کے مالی تعاون سے شروع کیا گیا ہے جس کے ذریعے ملک بھر میں ہوم گارڈنگ کے فروغ پر جدید انداز میں پیش رفت جاری ہے اس منصوبے کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں سبزیاں اگانے کے حوالے سے عملی مدد اور ٹیکنالوجی کی فراہمی سائنسدانوں کی ٹیم کے ذریعے یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہوم گارڈنگ کو شہروں میں وسیع پیمانے پر فروغ دیکر صاف ستھری سبزیوں کی پیداوار گھریلو سطح پر بڑھائی جاسکے۔ زرعی یونیورسٹی نے قبل ازیں آم کی روایتی وراثیوں میں وسعت لانے کے لیے 10 نئی وراثیوں کو متعارف کرایا ہے جبکہ سیڈ لیس کیٹو کی تیاری میں یونیورسٹی کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باغبانوں نے اُس کی پیداوار میں کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ ملکی سطح پر پانی کے سمٹتے ہوئے وسائل کے تناظر میں یونیورسٹی کا وائریمینٹ ریسرچ سنٹر، بیڈ پلانٹیشن، ڈرپ اریگیشن، سپرنکل ٹیکنالوجی اور ہائیڈروپونک ٹیکنالوجیز پر کام جاری ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد گلوبلائزیشن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور اس مقصد کے لئے دنیا بھر کی جامعات اور سائنسی اداروں کے ساتھ مفاہمت کی متعدد یادداشتوں کے نتیجے میں مربوط اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ راقم الحروف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میٹگوانسائیکلو پیڈیا کے دو ابواب تحریر کیے ہیں جسے سائنسی برادری میں بے حد سراہا گیا ہے۔ یونیورسٹی قدم بہ قدم کامیابیوں کی جانب رواں دواں ہے اور ہم جنگی بنیادوں پر غذائی استحکام کی منزل کے حصول کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر یالیوں اور خوشحالیوں کی جو توقعات قوم نے ہم سے کر رکھی ہیں وہ جہد مسلسل اور عزم کے ساتھ پوری ہو کر رہیں گی۔ (انشاء اللہ)

سیلاب کی تباہ کاریاں، لوگوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات

پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف

حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے صوبہ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخواہ تک کے وسیع علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ لاکھوں افراد اس غیر معمولی مون سون کے سیزن اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ کپاس، گنا، چاول، مکئی، سبزیات و دیگر فصلیں جبکہ گندم اور چاول کے ذخیرے بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں مون سون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے این ڈی ایم کے مطابق اڑھائی ماہ میں 1136 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر تین کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ آبادی اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے کا تخمینہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک ملک کے 110 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے جہاں ساڑھے 10 لاکھ سے زائد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے وہیں دہکی علاقوں میں سات لاکھ سے زیادہ مویشی بہہ گئے ہیں صوبہ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں 23 اضلاع آفت زدہ ہیں جبکہ ایک کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثرین میں



شامل ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 34 اضلاع اور 91 لاکھ 82 ہزار سے زیادہ افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے کل 8 اضلاع اور وہاں کی 48 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 43 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق اس سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے عمل میں پانچ برس لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تناظر میں 16 کروڑ ڈالر امداد کی ہنگامی اپیل جاری کی ہے۔ (<https://www.bbc.com/urdu/live/pakistan-62667938>)۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سیلاب نے جن علاقوں کو متاثر کیا ہے وہاں رہنے والے 5 میں سے 4 افراد کی زندگی کا انحصار ہی زراعت پر تھا۔ ماہرین کے محتاط اندازے کے مطابق صرف زرعی شعبے کو سیلاب سے ہونے والے مالی نقصانات اربوں روپے ہیں جبکہ انفراسٹرکچر کی تباہی، مویشیوں کی ہلاکت اور دیگر نقصانات کو شامل کر لیا جائے تو نقصانات کا تخمینہ کھربوں تک جا پہنچتا ہے۔ جہاں تک صوبہ پنجاب کا تعلق ہے اس

کے جنوبی اضلاع اس سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کپاس کی فصل بالکل ضائع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری فصلیں گنا، چارہ جات اور سبزیات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ آم کے باغات میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے PHYTOPHTHORA نامی پھپھوندی کے ذریعے سوکے کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ہمارا ملک جو ترقی اور بحالی کے سفر پر گامزن تھا چند ہفتوں کی بارشوں اور سیلاب نے کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس سیلاب کو بدترین قدرتی آفت قرار دے کر ساری دنیا سے مدد کی بھرپور اپیل کی ہے۔ سیلابی ریلوں سے زیادہ تباہی یکے بعد دیگر سیلابی ریلے آنے اور پیراجوں کے حفاظتی بند اور نہریں بلا پلاننگ توڑنے کے باعث ہوئی ہے کیونکہ سیلاب اپنے روایتی راستوں سے ہٹ گیا اور بہت زیادہ تباہی کا باعث بنا۔ آج اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو اتنی تباہی نہ ہوتی بلکہ ضائع ہونے والے پانی سے سارا سال فصلیں سیراب ہوتیں اور ملک تباہی سے بھی بچ جاتا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں چوروں ڈاکوؤں نے بھی وارداتیں کیں۔ سیلاب سے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اور نقصانات عمومی اندازوں سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں جن کی تفصیلات مرتب کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ جامعہ زریعہ فیصل آباد نے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کے حکم پر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اپنی عملی کاوشوں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ اس قدرتی آفت کا نشانہ بننے والے پاکستانی بھائیوں کو دوبارہ اپنے علاقوں میں باعزت طور پر بسایا جاسکے اور انہیں دوبارہ خوشیاں دلائی جاسکیں۔ اس سلسلے میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لئے یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر لگائے جانے والے کمپ میں نقد رقم و امدادی سامان عام افراد اور محیر حضرات نے جمع کروانا شروع کر دیئے ہیں جو آفت زدہ علاقوں میں بہترین طریقے سے ضرورت مندوں اور حقداروں کو پہنچایا جائے گا۔



اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کاشتکاروں کی مالی معاونت اور فصلوں کی کاشت کے لیے کھاد بیج اور دیگر زرعی آلات کے لیے بلا سود چھوٹے زرعی قرضے فراہم کرے۔ سیلاب سے متاثرہ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں نقصانات دیانتدارانہ سروے کرنے کے فوری بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع ہو جانا چاہیے۔ میانوالی، بھکر، لیہ، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خاں، راجن پور اور رحیم یار خاں میں سیلاب سے انفراسٹرکچر کی تباہی، انسانی جانوں کا ضیاع اور املاک کے نقصان سے زراعت اور معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ حالیہ سیلاب میں 5 ہزار کلو میٹر سڑکیں، 250 سے زائد پل اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے، کپاس کی 45 فیصد فصل پانیوں کی نذر ہو چکی ہے۔ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے حالیہ مون سون میں 40 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 1355 اموات ہو چکی ہیں۔ ساڑھے 7 لاکھ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر ساڑھے دس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ سیلاب سے جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، بحالی امداد کی بھی اتنی ہی جہتیں ہیں۔ ان سیلابی تباہ کاریوں کے بعد جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں انہیں امدادی سامان پہنچانا اور ان کی زندگی معمول پر لانا بھی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے جس کے لیے سرکاری اداروں اور ملکی وغیر ملکی تنظیموں کو باہمی تعاون و اشتراک سے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کرنا ہوں گی لیکن کچھ انفرادی کام ایسے ہیں جو بظاہر معمولی نوعیت کے ہیں مگر انہیں انجام دے کر بہت سی



جانیں بچائی جاسکتی ہیں اور متاثرہ افراد کو نہایت کم وسائل میں وبائی امراض سے ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جاسکتا ہے۔ ان تدابیر کو ”اپنی مدد آپ“ کے تحت بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پینے کا پانی اکثر نایاب ہے اور آلودہ پانی پینے سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں جو بعض اوقات وبائی شکل اختیار کر سکتی ہیں لہذا متاثرہ علاقوں میں صاف پانی کی بروقت فراہمی سے بہت سی انسانی جانیں بچائی جاسکتی ہیں۔ اگر کسی سیلاب زدہ علاقے کے کنویں زیر آب نہ آئے ہوں تو ان کا پانی بڑی حد تک آلودگی سے پاک ہی رہتا ہے۔ اس کے باوجود احتیاط یہی ہے کہ کنویں سے نکالنے کے بعد بھی پانی کو اچھی طرح اُبال کر پیا جائے۔ اگر کنویں بھی زیر آب آچکے ہوں تو سیلاب اترنے کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کنویں کی اندرونی دیواروں پر کائی کی وافر مقدار تو نہیں آگئی ہے اور پانی کے رنگ، بو اور ذائقے میں تو کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، اگر ان میں سے کوئی بات بھی ہو تو کنویں کا پانی پینے میں احتیاط برتنا ضروری ہے۔ متاثرہ علاقوں کے کسانوں سے ایک خصوصی گزارش کرنی ہے کہ وہ ہمت سے کام لے کر بہادری سے حالات کا مقابلہ کریں۔ انشاء اللہ جلد ہی وہ پھر ملک کے دیگر کسان بھائیوں کے برابر آجائیں گے جیسا کہ انہیں علم ہے کہ سیلابی پانی اترنے کے بعد قدرتی طور پر زمین کی زرخیزی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور کئی سالوں تک یہ زمین تیل دار اجناس کی پیداوار کے لیے انتہائی سودمند ہے۔ اگر ان علاقوں میں سورج مکھی کینولہ اور دیگر تیل دار اجناس کو وقت پر کاشت کیا جائے تو کسان بغیر کسی زیادہ مشقت کے فی ایکڑ 35 سے 40 ہزار روپے فی ایکڑ منافع کما سکتے ہیں، ان شاء اللہ۔ سیلاب اگرچہ ایک آفت ہے مگر اس کے وقوع پذیر ہونے میں ہماری کوتاہیاں شامل ہیں، بحیثیت قوم ہمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے کاموں کو جنگی بنیادوں پر شروع کرنا ہوگا، پاکستان کی مسلح افواج اور مختلف این جی اوز نے اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے ادا کی ہیں۔ ہم سب کو اس مصیبت کی گھڑی میں بے خانماں گھرانوں، لٹے پٹے خاندانوں اور مال مویشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کا ہاتھ تھامنا ہوگا، آج معیشت، معاشرت، اقتصادیات، اخلاقیات اور انسانیت ہاتھ پھیلائے سسک رہی ہے، لوگ کھلے آسمان تلے خلاؤں میں گھور رہے ہیں، اب تک اربوں روپے کے نقصانات ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے گھر ہی نہیں ان خواب ٹوٹ گئے، ان کے ارمان بکھر گئے ہیں، ہمیں ان کا مدد کرنے کے لیے اپنی اپنی بساط سے کہیں زیادہ آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم آگے نہ بڑھیں تو ملکی ترقی کے خواب بہت پیچھے رہ جائیں گے۔

وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے متعدد پراجیکٹ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں ان میں دو کمیٹیوں کے کنوینر نیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) ہیں۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد نے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو سیلاب کی تباہی کے متعلق نقصانات کا اندازہ لگانے اور سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے اپنی سفارشات پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی ایک کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کے کنوینر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کا کہنا ہے کہ زرعی یونیورسٹی سیلاب متاثرین کے لیے دودن کی تنخواہ، سبزیوں اور گندم کے بیج فراہمی، زراعت کی ازسرنو بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جامعہ کی طرف سے امدادی سامان کے علاوہ خطیر رقم بھی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔

کالا باغ ڈیم کی اہمیت اور ذریعہ توانائی

پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد..... فیکلٹی آف ایگری انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہمارے طاقتور دریا سندھ، کابل، جہلم اور چناب خدا کا تحفہ ہیں اور پاکستان کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو ہمیز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر سب سے بڑے دریا سندھ کے سیلابی پانی کو سمندر میں ضائع ہونے کی بجائے ذخیرہ کر کے استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ ملک کو خوراک میں خود کفیل بنانے اور 30,000 میگا واٹ سے زیادہ سستی بجلی پیدا کرنے کے علاوہ لاکھوں ایکڑ بنجر غیر سیراب اراضی کو سیراب کرنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو ہنگی تھرمل پاور کی جگہ لے سکتا ہے۔ اس سے سیلاب پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ تباہ کن سیلابوں کو ذخیرہ کرنے والے ڈیموں کے ذریعے قابو کیا جاسکتا ہے اور ذخیرہ شدہ پانی کو دریا کے کم بہاؤ کی مدت میں آبپاشی کے لیے سستی بجلی پیدا کرنے اور ماحولیاتی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناقص کنٹرول والے دریاؤں میں شدید سیلاب لوگوں کے تباہی کا باعث بنتے ہیں اور سمندر میں جانے سے پہلے انسانوں موشوں فصلوں اور مواصلاتی نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔



اگر پاکستان خوراک کی فراہمی میں خود کفیل ہو جائے تو ہم ہر سال کھانے پینے کے اناج خوردنی تیل اور اسی طرح کی دیگر مصنوعات کے ذریعے خرچ ہونے والے اربوں ڈالر کے زرمبادلہ کو بچا سکتے ہیں۔ ملک ہر سال اربوں ڈالر کی بچت بھی کر سکتا ہے جو تھرمل پاور کی پیداوار کے لیے ایندھن کے تیل کی درآمد پر خرچ ہوتے ہیں۔ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہماری خوراک اور دیگر زرعی مصنوعات کی ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے دریاؤں کی زرخیز زمینیں بہترین آب و ہوا اور محنتی لوگوں سے نوازا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم گندم خوردنی تیل والوں حتیٰ کہ پیاز اور آلو کے بھی بھاری درآمد کنندگان بن چکے ہیں۔

تربیلا منگلا اور چشمہ کی جھیلیں 15.5 ملین ایکڑ فٹ ڈیزائن کردہ پانی کو سٹور کرنے کی گنجائش سے بتدریج مٹی کے جمع ہونے کی وجہ سے صلاحیت کھو رہے ہیں اب تک تقریباً 35 فیصد گنجائش کم ہو چکی ہے اور 10 سال کے اندر نہری آبپاشی کے ذخیرے سنگین بن جائیں گے۔ ان ذخیرہ کرنے والے ڈیموں کی صلاحیت میں یہ مسلسل کمی ہماری زرعی پیداوار کو بری طرح متاثر کرے گی۔

چاروں صوبوں کے درمیان تاریخی پانی کا معاہدہ 1991 میں بڑے دھوم دھام سے کیا گیا تھا اور ہمارے پانی اور بجلی کے وسائل کی تیز رفتار ترقی کی امید تھی۔ اس معاہدے کے مطابق پنجاب کے پاس پانی کا صرف 37 فیصد حصہ ہے جو کہ سندھ کے پانی کے برابر ہے۔ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کو بھی بالترتیب 14% اور 12% ملے گا۔ اس سے تمام صوبوں میں نہری سیراب شدہ رقبہ کو 35 ملین ایکڑ سے بڑھا کر 45 ملین ایکڑ سے زیادہ کرنے کی امید تھی۔ 10 ملین ایکڑ سے زیادہ نئی بنجر لیکن بہترین زرعی

ارضی کی آبپاشی ملک کو نہ صرف خوراک کی فراہمی میں خود کفیل بنا سکتی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اضافی خوراک اور دیگر زرعی مصنوعات کی برآمد بھی ہو سکتی ہے۔ کالاباغ ڈیم پراجیکٹ کو تکنیکی طور پر ایک مضبوط اور معاشی طور پر قابل عمل منصوبہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور اس کے عوام کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی شرائط کے مطابق کالاباغ ڈیم پر کام 1960 میں شروع کیا گیا تھا جس کی فریہیلٹی رپورٹ 1959 میں منظور ہوئی تھی۔ کالاباغ ڈیم کا منصوبہ تربیلا ڈیم سے 192 کلومیٹر نیچے اور جناح بیراج سے 26 کلومیٹر اوپر دریائے سندھ پر واقع ہے۔ کالاباغ ڈیم جو کہ بھاشا اور داسوجیسے مزید ڈیموں کا پیش خیمہ تھا اس پر 1991 میں مکمل اتفاق رائے ہوا تھا اور یہ پانی کے معاہدے کا سنگ بنیاد تھا۔ یہ بد قسمتی کی بات ہے کہ یہ اہم منصوبہ شاید واحد منصوبہ ہے جس کے لیے قومی اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نتیجتاً قوم تاخیر اور غفلت کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ کالاباغ ڈیم اب کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں رہا یہ صرف بقا کا مسئلہ اور سیاسی قیادت کے لیے چیلنج ہے۔

کثیر المقاصد کالاباغ ڈیم منصوبے کے بنیادی مقصد

- 1- زرعی صنعتی اور گھریلو صارفین کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کم قیمت پر ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی بڑی مقدار پیدا کرنا۔
- 2- پانی کا اضافی ذخیرہ فراہم کرنا اور اس طرح آبپاشی میں دستیاب پانی کی مقدار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ زیادہ پانی کی سپلائی کے لیے بہتر نظام کنٹرول اور انتظام فراہم کرنا۔
- 3- تربیلا اور کالاباغ ڈیم کے ذخائر کے مشترکہ آپریشن کے ذریعے تربیلا پاور اسٹیشن کی توانائی کی پیداوار میں اضافہ کرنا۔
- 4- تھرمل میں استعمال ہونے والے غیر درآمد شدہ فوسل ایندھن پر انحصار کو کم کرنا۔
- 5- سسٹم میں موجودہ آبی ذخائر کے سلائیٹنگ کی وجہ سے ضائع ہونے والے ذخیرہ کی تلافی کرنا۔
- 6- نیچے کی طرف سیلاب سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے انتہائی سیلابی چوٹیوں کو منظم اور کنٹرول کرنا۔
- 6- تعمیر کے دوران 30,000 افراد کے لیے روزگار پیدا کرنا اور کمیشن کے بعد مزید ہو سکتا ہے۔

ترمیم شدہ کالاباغ ڈیم کی نمایاں خصوصیات

دریائے سندھ

کچھنٹ ایریا: 110,500 مربع میل

زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا سیلاب 1,200,000 کیوسک

بجلی کی سہولیات

پین اسٹاک 12 نمبر 36x فٹ

پاور ہاؤس اندور کی قسم

نصب صلاحیت 2400MW (ابتدائی طور پر) 3600MW (حتمی)

ذخائر

کل اسٹوریج 7.9 ملین ایکڑ فٹ

قابل استعمال اسٹوریج 6.1 ملین ایکڑ فٹ

زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کی سطح 915 فٹ (SPD)

کم از کم برقرار رکھنے کی سطح 825 فٹ (SPD)

ڈیم

زیادہ سے زیادہ اونچائی (دریا کے اوپر) 260 فٹ

کل لمبائی 11000 فٹ

کل فل کا حجم 30 ملین مکعب گز

سپل وے: سپل وے کی گنجائش 1,070,000 کیوسک

ٹربائن: فرانس کی قسم

ٹربائن ڈیزائن ہیڈ 107 فٹ

گھریلو باغبانی میں آکسٹر مشروم کی کاشت کے لیے سفارشات

ڈاکٹر محمد مزمل جہانگیر*، پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف**، ڈاکٹر محمد طیب**، ڈاکٹر راشد وسیم خاں قادری*، ڈاکٹر محمد عتیق***، ڈاکٹر محمد دلدار گوگی**، ڈاکٹر محمد سفیان**، ڈاکٹر محمد اعظم*، منیب الرحمن*.....* انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز،** شعبہ انٹومالوجی،*** شعبہ پلانٹ پتھالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

موسم سرما میں پاکستان میں عام طور پر جو سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ اُن میں پھول گو بھی، بند گو بھی، گانٹھ گو بھی، مٹر، پیاز، لہسن، ٹماٹر، پالک، میتھی، سلاد، مولیٰ، شلغم، گاجر، چقندر، آلو، سرسوں کا ساگ، کیل، بروکولی، سیلری، لیک، پارسلی، کوہلرابی اور مشروم شامل ہیں۔ عمومی طور پر موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت کا آغاز ستمبر اور اکتوبر سے ہوتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس امر کو محسوس کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گھریلو باغبانی میں آکسٹر مشروم کی کاشت دن بدن مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم پاکستان میں گھریلو باغبانی میں آکسٹر مشروم کی کاشت صرف ایک محدود پیمانے پر کی جاتی ہے اور ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس مضمون میں عوام میں گھریلو باغبانی میں آکسٹر مشروم کی کاشت کو مقبول بنانے کے لیے اس کی پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔



آکسٹر مشروم زمانہ قدیم سے انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ خوراک کے اہم اجزاء جیسا کہ پروٹین اور وٹامن وغیرہ کا اہم ذریعہ ہے۔ ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق آکسٹر مشروم خون میں کو لیسٹرول اور چکنائی کی مقدار کو کم کر کے بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے جبکہ سوزش اور جسم میں رسولیاں بننے کے عمل کو روکتی ہے۔ پاکستان میں گندم کا بھوسہ، چاول کی پرالی اور کاٹن جینگ ویسٹ وافر مقدار میں ارزاں نرخوں پر موجود ہے جو کہ زیادہ تر اینٹوں کے بھٹوں میں آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔

گندم کا بھوسہ، چاول کی پرالی اور کاٹن جینگ ویسٹ کو آکسٹر مشروم کی کاشت کے لیے پورے ملک میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پاکستانی آبادی اس وقت غیر معیاری اور غیر صحت افزا خوراک کے مسائل سے دوچار ہے پاکستانی آبادی کی پروٹین کی ضروریات تقریباً 45.92 گرام فی دن ہے جبکہ موجودہ پروٹین کی کمی تقریباً 7,78,304 ٹن سالانہ ہے۔ اس موجودہ صورت حال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پروٹین کی فراہمی کے دوسرے کم خرچ بالائین وسائل کو پہچانا جائے اور ان کو بروئے کار لایا جائے۔ آکسٹر مشروم ملک میں پروٹین کی شدید کمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قابل عمل اور معاشی لحاظ سے فائدہ مند انتخاب ہے۔

مالی فوائد

پاکستان میں کسان روایتی طور پر گندم، کپاس، چاول اور کئی کی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ ان فصلوں کی کاشت کا عمومی دورانیہ تقریباً چھ ماہ ہے اور ان سے کسان کو موجودہ حالات میں خاطر خواہ منافع بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کسانوں میں نئی غیر روایتی فصلیں کاشت کرنے کے عمل کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس امر کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں خواتین زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں اور انہیں مختلف معاشرتی وجوہات کی بناء پر ابھی بھی گھر پر رہ کر کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ ان حالات میں کسی ایسے کاروبار کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جس میں خواتین گھر میں رہ کر ہی اپنے گھروں میں کوئی فصل اُگاسکیں اور اس کو بیچ کر اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کر سکیں اور معاشرے کی مفید شہری بن سکیں۔ آئنسٹر مشروم کی کاشت ہمارے کسانوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین کی آمدنی کو بڑھانے کے لئے ایک نعم البدل ہے۔ ہم آئنسٹر مشروم کی سال میں با آسانی چار فصلیں کاشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہر فصل کی کاشت کا دورانیہ تقریباً دو سے اڑھائی ماہ ہے اور اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ زمین کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک 10×10 فٹ کے کمرے سے دو سے اڑھائی ماہ میں تقریباً 200 کلو مشروم حاصل کی جاسکتی ہے اور اس کو بیچ کر تقریباً 20 سے 30 ہزار روپے کی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے جو کسی بھی روایتی فصل کی آمدنی سے زیادہ ہے۔

آئنسٹر مشروم کی کاشت کے مراحل

کاٹن ویسٹ کے استعمال سے میڈیا کی تیاری

آئنسٹر مشروم کی کاشت کے لئے پیداوار کے لحاظ سے سب سے بہترین نتائج کپاس کی روی یا کاٹن ویسٹ پر حاصل ہوتے ہیں۔ کاٹن ویسٹ پر کاشت کرنا ہو تو اسے پہلے پانی میں اچھی طرح بھگو لیں پھر فرش پر ڈھیر لگا دیں۔ کم از کم 2 من کاٹن ویسٹ کے ڈھیر میں ساڑھے 3 کلو چونا ملا نا چاہیے۔ پھر اس ڈھیر کو 5 سے 7 روز تک پلاسٹک سے ڈھانپ دیں بعد ازاں کاٹن ویسٹ شیشہ پلاسٹک کے لفافوں (12×8) میں بھر لیں اور اوپر سے دھاگوں یا ربڑ بینڈ سے باندھ دیں۔

گندم کے بھوسے کے استعمال سے میڈیا کی تیاری

آئنسٹر مشروم کی کاشت کے لیے پیداوار کے لحاظ سے سب سے بہترین نتائج کپاس کی ردی یا کاٹن ویسٹ پر حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر کاٹن ویسٹ میسر نہ ہو تو گندم کے بھوسے کو بھی آئنسٹر مشروم کی کاشت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گندم کے بھوسے پر کاشت کرنا ہو تو اسے پہلے پانی میں اچھی طرح بھگو لیں پھر فرش پر ڈھیر لگا دیں۔ کم از کم 2 من گندم کے بھوسے کے ڈھیر میں ساڑھے 3 کلو چونا ملا نا چاہیے۔ پھر اس ڈھیر کو 5 سے 6 روز تک پلاسٹک سے ڈھانپ دیں بعد ازاں گندم کے بھوسے کو شیشہ پلاسٹک کے لفافوں (12×16) میں بھر لیں اور اوپر سے دھاگے یا ربڑ بینڈ سے باندھ دیں۔

حرارت یا تپش سے جراثیم کشی کا عمل

اس عمل کا مقصد ایسے جراثیم اور نقصان دہ کیڑوں کو مارنا ہے جو میڈیا میں موجود رہتے ہوئے مشروم کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر کاشت کے لیے پاسچرائزیشن کے عمل کے لیے ڈرم استعمال کئے جاتے ہیں۔ میڈیا کو تپش کے ذریعے نقصان دہ جراثیم سے پاک کرنے کے لئے 45 گیلن سائز کا ڈرم جس کے پینڈے میں 6 انچ اونچائی پر جالی لگائی جاتی ہے۔ جس کے نیچے پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ اس جالی کے اوپر لفافوں کو میڈیا سے بھر کر رکھ دیا جاتا ہے ڈرم کو اوپر سے ڈھکنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈرم کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے جس سے ڈرم کے اندر بھاپ پیدا ہوتی ہے جس کے اندر لفافوں کو تقریباً اڑھائی سے تین گھنٹے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفافوں کو 24 گھنٹے کے لئے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ مشروم کے بیج یا سپان کی مقدار لفافوں میں موجود میڈیا پر منحصر ہوتی ہے۔ میڈیا کے گیلے وزن کا 1 تا 1.5 فیصد مشروم کا بیج یا سپان ڈالا جاتا ہے یعنی 1000 گرام والے لفافے میں تقریباً 15 گرام مشروم کا بیج یا سپان ڈالا جاتا ہے۔ بیج ڈالنے کے بعد لفافوں کے منہ اس طرح سے بند کریں کہ ان میں سے ہوا کا گزر ہو سکے۔

بیج کا پھیلاؤ اور فصل کی تیاری

بیج ملانے سے دو تین روز بعد بیج کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ بیج سفید ریشوں کی صورت میں پھیلتا ہے اور اس کے لیے 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوتا



ہے۔ زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے والی اقسام 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک آسانی سے اگائی جاسکتی ہیں۔ بیج پھیلنے کا عمل 3 سے 4 ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جب لفافوں میں موجود میڈیا مکمل طور پر سفید ہو جائے تو اوپر سے لفافوں کے منہ کھول دیں یا سوئی کی مدد سے لفافوں میں 10 سے 15 سوراخ کر دیں۔ تازہ ہوا کے لیے کھڑکیاں یا روشن دان کھول دیں اگر ایگزاسٹ فیٹن موجود ہے تو اسے دن میں دو تین مرتبہ ایک گھنٹے کے لیے چلا دیں۔ مشروم کے لفافوں پر گھریلو فوارہ کی مدد سے دن میں دو سے تین مرتبہ پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ مشروم بننے کے لیے نسبتاً کم درجہ حرارت یعنی 16 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ درکار ہوتا ہے۔ چند روز بعد مشروم چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں بننا شروع ہو جائے گی۔ اگلے 10 سے 12 روز میں مشروم کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسے ہاتھ سے یا چاقو کی مدد سے کاٹ لیں۔ مشروم کو سردیوں میں عام درجہ حرارت پھر بھی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ ایک دفعہ مشروم توڑنے کے بعد 8 سے 10 دن بعد مشروم دوبار نکلیں گی۔ اس طرح لفافوں میں سے 2 سے 3 مرتبہ مشروم حاصل کی جاسکتی ہے۔ مشروم کی پیداوار میڈیا کے خشک وزن کے حساب سے 50 فیصد سے لے کر 100 فیصد تک ہے۔

احتیاطیں

کمرے کے اندر مشروم حاصل کرنے کے لئے لفافوں کا منہ کھولنے کے بعد کمروں میں نمی کی مقدار زیادہ رکھنے کے لیے فرش پر دو تین مرتبہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ لفافے خشک نہ ہونے پائیں۔ اگر خشک نظر آئیں تو باریک فوارہ سے ہلکا سا چھڑکاؤ کریں۔ فصل برداشت کرنے کے بعد مشروم کا کوئی حصہ اندر نہ رہنے دیں کیونکہ اس سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہوتا ہے۔

آنسٹر مشروم کی کاشت کے لیے ضروریات

- 1- مشروم کی کاشت کے لیے کمرے جن کا سائز آپ کے پیداواری منصوبے پر منحصر ہے۔
- 2- ایک ایسا نظام جو کہ کمروں کے درجہ حرارت کو 16 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان برقرار رکھے۔
- 3- ایک ایسا آلہ جو کہ مشروم ہاؤس کی نمی کو 80 تا 95 فیصد کے درمیان برقرار رکھ سکے۔ اسکے لیے بازار سے مختلف سائز اور گنجائش کے بھی نمی برقرار رکھنے والے آلات دستیاب ہیں۔
- 4- تازہ ہوا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا ایگزاسٹ فیٹن جس کے ساتھ ایک ایسی جالی لگی ہو جس کے سوراخ سے ہوا کے علاوہ دیگر کیڑوں وغیرہ کا گزر نہ ہو سکے۔
- 5- کمروں کا فرش کا پکا ہونا چاہیے تاکہ فالتو پانی کی نکاسی ہو سکے۔

- 6- آئسٹرشوم کی تمام تر اقسام کا بیج مشروم لیبارٹری انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز زری یونیورسٹی فیصل آباد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- 7- کپاس کی ردی یا کاٹن ویسٹ جو کہ بطور میڈیا استعمال ہوگی بہت زیادہ مقدار میں سپنگ اور جنگ ملز سے دستیاب ہے۔ اگر کاٹن ویسٹ دستیاب نہ ہو تو گندم کا بھوسہ یا چاولوں کی پرالی کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- 8- ایک خاص قسم کے شیشہ پلاسٹک لفافے استعمال کیے جاسکتے ہیں جن کا سائز 12x16 یا 12x8 انچ ہوگا۔ 9- میڈیا کو پیش کے ذریعے نقصان دہ جراثیم سے پاک کرنے کے لیے 45 گیلن سائز کا ڈرم۔

بیماریاں

گرین مولڈ کو سب سے زیادہ نقصان دو پھپھوندی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جڑی بوٹی پھپھوندی جو کہ (Ink caps) بھی کہلاتی ہیں مشروم اگانے کے آمیزے کو اچھی طرح تیار نہ کرنے اور پائپسٹرائزیشن کے عمل کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان پھپھوندیوں کو ابتدائی مرحلے میں کنٹرول کرنے کے لیے آمیزے کو زیادہ گیلانہ کیا جائے اور پرانے، گلے سڑے حصوں کو آمیزے سے اکٹھا کر کے ختم کر دینا چاہیے۔

کیڑے مکوڑے

کھیاں خصوصاً زیادہ درجہ حرارت پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے تو کمروں میں پانی سپرے کریں تا کہ درجہ حرارت میں کمی اور فصل کی تیاری میں تیزی آ سکے۔ خصوصاً رات کو کھڑکیاں اور دروازے بھی اچھی طرح کھول دیں تاکہ رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آ سکے۔ اگر مشروم کے تنے اور چھتیاں چھوٹی ہونے لگیں تو یہ اس بات کی علامات ہے کہ کمروں میں تازہ ہوا کی کمی ہے اور ممکن ہے کہ روشنی کی مقدار میں کمی ہو۔



حرف آخر

مشروم کی صنعت میں قدم رکھنے کے لئے گھریلو باغبانی میں آئسٹرشوم کا انتخاب اس لحاظ سے بہترین ہے کہ اس مشروم کو اگانا انتہائی آسان اور سستا ہے۔ کاٹن جن ویسٹ گندم کا بھوسہ اور چاول کی پرالی پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ لہذا اگر ہم پاکستان میں اس کے پیداواری طریقہ کار اور مارکیٹ کے مسائل پر قابو پالیں تو آئسٹرشوم نہ صرف ملک کے اندر خوراک کی کمی پورا کرنے میں مدد دے سکتی ہے بلکہ کافی مقدار میں زر مبادلہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موزوں موسم اور خام مال کی وافر مقدار میں دستیابی اس مشروم کی کاشت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔

جانوروں میں لمپی سکن کی بیماری

پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر عزیز الرحمن، ڈاکٹر عماد رشید..... فیکلٹی آف اینیمل ہسپنڈری، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پاکستان میں لمپی کی بیماری یعنی گٹھی دار جلدی بیماری پہلی دفعہ آئی جس سے فارم حضرات کو بہت زیادہ پریشانی اور معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بیماری میں صحت مند جانور بیمار جانوروں کے براہ راست رابطہ سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زیر نظر مضمون کا مقصد اس بیماری کے متعلق ضروری معلومات کی فراہمی ہے تاکہ ہمارے جانور پال حضرات اس بیماری سے بچاؤ کے لئے بروقت اقدامات کر سکیں۔

یہ جانوروں میں وائرس کی وجہ سے پائی جانے والی ایک بیماری ہے جو کہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہو سکتی اور جسم میں سوزش پیدا کرتی ہے۔ بیمار جانور کے جسم پر دانے یا پھوڑے بنتے ہیں جو کہ بعد میں پھٹ جاتے ہیں۔ یہ جانوروں میں موت کا سبب بھی بنتی ہے۔ مچھر، مکھی، چیچڑ اور دوسرے کاٹنے والے حشرات اس کو ایک سے دوسرے جانور میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیمار جانور کے ناک اور منہ سے بہنے والی رطوبت اگر دوسرے جانور کو لگ جائے تو اس سے بیماری منتقل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

لمپی سکن کی بیماری جنوبی اور مشرقی افریقہ میں پائی جاتی تھی۔ 70ء کی دہائی میں یہ افریقہ سے ہوتی ہوئی شمال مغرب تک پھیل گئی۔ 2000ء کے بعد سے اب تک اس بیماری کا پھیلاؤ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اور ترکی میں ہو چکا ہے۔ دورِ حاضر میں جن ممالک میں بیماری آئی ہے ان میں روس، چین، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں۔ پاکستان میں اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس بیماری کا سبب ایک وائرس ہے جو کہ لمپی سکن ڈیزیز وائرس کہلاتا ہے۔





علامات

ابتدائی دنوں میں اس بیماری کے سبب جلد پر گلٹیاں نمودار ہوتی ہیں۔ شروع میں ان کا حجم چھوٹا ہوتا ہے۔ جوں جوں بیماری بڑھتی ہے گلٹیوں کا حجم بڑا ہو جاتا ہے۔ جانور کو تیز بخار ($104-106^{\circ}\text{F}$) ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں جانور کے جھال اور سینہ کے درمیان ورم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ متاثرہ جانور کی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ جب بیماری 8 سے 10 دن ہو جاتے ہیں تو گلٹیاں ناک اور خوراک کی نالی میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جس سے جانور کو سانس لینے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹانگوں پر ورم آنے کی صورت میں جانور کو چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری کی وجہ سے بانچھ پن کے مسائل اور اسقاطِ حمل بھی ہو سکتا ہے۔ گلٹیاں جسم کے کسی بھی حصے پر نکلتی ہیں لیکن خاص طور پر گردن، حیوانہ، اگلی ٹانگوں اور پیٹ کے قریب والی جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ گلٹیاں بڑی اور سخت ہوتی ہیں۔ بڑی گلٹیاں جسم پر کافی عرصے تک رہتی ہیں جو بعد میں پھٹ کر زخم اور السر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔

علاج

وائزل ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے البتہ ہم جانور کو وائٹا منز اور طاقت کی دوائیاں دے سکتے ہیں تاکہ اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو سکے اور جانور وائرس کے خلاف اپنا دفاع کر سکے۔ اس سلسلے میں قوت مدافعت بڑھانے والی دوائیں دی جاتی ہیں۔ اینٹی الرجک، اینٹی پارٹیک (بخار والی) اور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پانچ سے سات دن تک ہوتی ہے۔ پینسیلین (Penicillin) گروپ کی دوائیاں بیماری کے خاتمے اور جراثیموں سے بچاؤ کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ پھوڑے کے پھٹنے کی صورت میں زنک ملی دوائی / کریم Zinc Ointment کا استعمال کریں۔

بیماری سے بچاؤ کے طریقہ کار

1- قرنطینہ کے ذریعے بچاؤ

جو جانور بیمار ہو جائے تو اسے باقی صحت مند جانوروں سے علیحدہ کر دیا جائے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے چارہ اور ملازم بھی الگ رکھیں۔ اگر کوئی نیا جانور خریدیں تو اس کو کچھ عرصے تک دوسرے جانوروں سے علیحدہ رکھیں۔ بیمار جانور کو ٹیکہ لگانے کے لیے ہمیشہ نئی سرنگ استعمال کریں۔

2- مچھروں، مکھیوں اور حشرات سے حفاظت

- ☆ مچھروں اور مکھیوں اور دوسرے حشرات سے جانوروں کو بچائیں۔ ☆ ان کو دور رکھنے کے لیے دھواں لگا دیں۔
- ☆ جانور کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف رکھیں اور دن میں کئی دفعہ گوبر صاف کر کے اس کو پانی سے دھوئیں اور اس کو سینی ٹائز کریں۔
- ☆ کیڑے اور مچھر مارا دویات سے جانوروں کے ارد گرد جگہوں پر سپرے کریں۔

مکھی، مچھر اور چیڑ کے لیے سپرے

مکھی کے خاتمے کے لیے باڈے میں Imidacloprid کا سپرے کریں یا پھر 4 لیٹر چینی کا شیرہ بنالیں اور اس شیرے میں Inidocloprid 100ml کا پانی ملا لیں۔ پھر اس کو پٹ سن کی بوری پر لگا کر فرش پر رکھ دیں۔ مکھی یہ شیرہ چوس کر مر جائے گی۔

چیڑ سے بچانے کے لیے باڈے میں Cypermethrin جو کہ Ectoflece کے نام سے دوائی ملتی ہے اس کا سپرے کریں۔ اسپرے کا طریقہ یہ ہے کہ 1ml دوائی کو 1 لیٹر پانی کے حساب سے حل کر لیں اور ان کورات کے وقت باڈے میں سپرے کریں دن کو اس کا سپرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مچھر سے بچنے کے لیے مچھر مار سپرے کر لیں۔ رات کو دھونی لگائیں اور اس میں ایک یا دو مچھر مار کوئل شامل کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈیری فارم پر مناسب جگہ ہے تو لیمن گراس کا پودا لگائیں کنیر کا پودا بھی لگایا جاسکتا ہے۔ جانوروں کو مکھی/مچھر سے بچانے کے لیے 100 ml نیم کے تیل میں 30ml تارپین کا تیل شامل کر کے کپڑے کی مدد سے جانور کے جسم پر ملیں۔ اس کے علاوہ جانور پر 1.5 گرام Negawan پاؤڈر کو 1 لیٹر پانی حل کر کے جانور پر سپرے کیا جاسکتا ہے۔ مردہ جانوروں کو مناسب جگہ پر گڑھا کھود کر دبائیں۔

ویکسین

بیماری کی روک تھام کے لیے موثر ویکسین استعمال کریں۔ بیماری کے بہت زیادہ پھیلاؤ کی صورت میں رینگ ویکسین (Ring Vaccine) کریں۔ جہاں پر بیماری ظاہر ہو اس کے 2.5 کلومیٹر ارد گرد کے علاقے میں ویکسین کی جانوروں میں فراہمی یقینی بنائیں۔ ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ (VRI) لاہور اس سلسلے میں اس بیماری کے خلاف ویکسین بنا رہا ہے۔

وائرس کی بیماری ہونے کے بناء پر اس کا واحد اور بہترین حل مناسب وقت پر حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال ہے۔ حفاظتی ٹیکہ کسی بھی عمر میں لگایا جاسکتا ہے۔ جن بچھڑوں کی ماں کو حفاظتی ٹیکہ لگ چکا ہو اس کو 4 ماہ کی عمر میں لگانا چاہیے۔ پاکستان میں درج ذیل حفاظتی ٹیکہ موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک استعمال کریں۔

Me Vacm, Lumpy Vac, Lumpy Vax, Lumpy Sheild

یاد رہے کہ یہ ٹیکہ منجمد حالت میں ملتا ہے۔ جب ٹیکہ کو بنالیں تو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر استعمال کر لینا چاہیے۔

متاثرہ جانور کی خوراک

جانور نے اگر کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے صبح کے وقت 2 کلو دہی آدھ پاؤشکر ملا کر دیں۔ دوپہر 2 لیٹر گنے کا جوس اور اس میں آدھ سے ایک پاؤ لیمن ملا کر پلائیں۔ شام کو گندم کا دلیہ دودھ میں پکائیں اور اس میں 100 گرام کوئی بھی منرل مکچر ملا کر کھلائیں۔



دیہی ترقی میں خواتین کا کردار

ڈاکٹر بینش اسرار، اریج فاطمہ..... انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پاکستان کی تقریباً دو تہائی آبادی کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے جس میں خواتین کا تناسب 48.8 فیصد ہے اور زراعت ان کا اہم معاشی ذریعہ ہے۔ 75 فیصد خواتین اور لڑکیاں مزدوری کی سرگرمی میں زراعت کے شعبے میں کام کرتی ہیں۔ زراعت میں خواتین اپنی باقی سرگرمیوں کے علاوہ تقریباً 34 گھنٹے فی ہفتہ کام کرتی ہیں۔ چھ سے آٹھ افراد پر مشتمل خاندان اور بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ بغیر آرام کے کھیتوں میں کام کرنے سے ان کی اپنی صحت بھی ناقص ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں معیشت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ پاکستان کی GDP کا تقریباً 40 فیصد حصہ زراعت تھی جبکہ اب 20 فیصد سے بھی کم رہ گئی ہے۔ جس میں 28 فیصد خواتین کی کارکردگی شامل ہے۔ دیہی علاقوں میں خواتین زرعی ترقی میں اہم شرکت دار ہیں وہ مختلف قسم کے اہم کام سرانجام دیتی ہیں جن میں زمین کو گھاس لگانا، کھیتی کرنا، بیج لگانا، کھیتی باڑی کی کھاد جمع کرنا اور کٹائی کرنا شامل ہیں۔ وہ اناج کی صفائی کرنے، خشک کرنا اور زرخیزہ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ زراعت میں خواتین کے کردار کے باوجود ان کے اس تعاون کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کاموں سے حاصل ہونے والی اجرت مردوں کے برابر کی شراکت داری ملتی ہے۔ ان خواتین پر کام کا بھاری بوجھ بھی ہوتا ہے۔ وہ زرعی فرائض کے علاوہ وسیع پیمانے پر غیر فارم کاموں کو بھی سرانجام دیتی ہیں۔ پاکستان کے بہت سے دیہی علاقوں کی خواتین زیادہ تر بلا معاوضہ اور غیر تسلیم شدہ سرگرمیوں میں مصروف رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی معاوضے یا پہچان کے سب سے زیادہ پسماندہ رہ جاتی ہیں۔ دیہی خواتین کو معاشی استحکام دینے اور دیہی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ان کے ہنر کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق دیہی علاقوں کی ایک عام عورت روزانہ وسطاً 15.5 گھنٹے کام کرتی ہیں جس میں ان کی بہت سی سرگرمیاں گھرتک محدود ہیں جس میں سلائی، کڑھائی، بیکری اور اس سے متعلق اشیاء اور فن و تخلیق کاری کے مختلف نمونے شامل ہیں۔



دیہی ترقی کیلئے وہاں کی مقیم خواتین کو چھوٹے پیمانے پر نئے کاروبار شروع کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے جن میں گھریلو صنعت کاری بہت اہم ہے۔ ”گھریلو صنعت وہ ایک چھوٹے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے جس کا مرکز دیہی فنر اپنا گھریلو گھر کا کوئی بھی ایک کمرہ ہوتا ہے۔ یہ کاروبار کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے جس میں زیادہ جدید مشینری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہنر کی بنیاد پر وہ اپنا کاروبار چلا سکتی ہیں۔“ ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین کثیر مقدار میں مختلف قسم کے ہنر سے آگاہی رکھتی ہیں ان کے اس ہنر کی صحیح طرح سے رہنمائی کر کے گھریلو اور ملکی سطح پر منافع بخش بنایا جاسکتا ہے۔ گھریلو صنعت کاری کے مختلف مواقع درج ذیل میں ہیں۔

چھوٹے پیمانے پر ملبوسات تیار کرنا

چھوٹے پیمانے پر ملبوسات تیار کرنا گھریلو صنعت کاری میں سرفہرست ہیں چونکہ دیہی خواتین سلائی، کڑھائی اور پونے میں بہت مہارت رکھتی ہیں ان کی تیار کردہ نفیس ملبوسات کی دنیا بھر میں بہت مقبولیت حاصل ہے وہ اپنے تیار شدہ ملبوسات اپنے گاؤں اور شہروں میں خوردہ فروشوں کو بیچ سکتی ہیں۔ اس میں خواتین کے کڑھائی والے مختلف ملبوسات، مردوں کی شلو اور قمیض اور بچوں کے سکول یونیفارم وغیرہ شامل ہیں اس سے نہ صرف دیہی خواتین خود کو معاشی استحکام دلوا سکتی ہیں بلکہ دیہی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

ہوم بیکری

دیہی علاقوں میں دودھ کی کثرت پائی جاتی ہے تو دودھ سے تیار ہونے والی اشیاء اور ان کو بیچنا ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ ہوم بیکری میں مختلف اقسام کے تازہ بسکٹ، کیک، رس، دیسی گھی، قلفہ، رس ملائی اور اس کے علاوہ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ دیہات کی خواتین چونکہ کھانے بنانے میں مہارت رکھتی ہیں وہ اس طرح سے چھوٹے پیمانے پر ہوم بیکری چلا کر ایک منافع بخش کاروبار کر سکتی ہے جس سے نہ صرف ان کو بلکہ دیہات کو بھی بہت ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔

فن و تخلیق کاری کے مختلف نمونے

1۔ اگر بتی بنانا

اگر بتی کی چھڑیاں بنانا ایک مقبول گھریلو شے ہے جس کی ایک بڑی ممکنہ مارکیٹ ہے جس کی سارا سال بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ اگر بتیوں کی پاکستان سے باہر 90 ممالک میں ممکنہ منڈیاں موجود ہیں۔ گھریلو صنعت کاری میں گھر بیٹھ کر اگر بتی بنانے کا کاروبار شروع کرنا بہت آسان اور منافع بخش ہے۔

2۔ موم بتیاں بنانا

دیہی خواتین کیلئے چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنے اور ایک کامیاب اور منافع بخش کاروبار میں موم بتیاں بنانا شامل ہے۔ بہت سے دیہی علاقوں میں اب بھی بجلی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بڑے شہروں میں مختلف وجوہات کی بناء پر موم بتیاں جلاتے ہیں جن میں مذہبی و آرائشی مقاصد شامل ہیں۔ روایتی لمبی سفید موم بتیوں کے علاوہ خوشبودار اور آرائشی موم بتیاں مارکیٹ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ گھریلو صنعت کاری میں موم بتیاں بنانا بہت ہی کارآمد کاروبار ہے۔

3۔ پاپڑ بنانا

پاپڑ بنانا گھریلو صنعت کاری میں خواتین کیلئے بہت ہی کامیاب ذریعہ ہے اس میں کسی بھی طرح کی مشینری کی ضرورت نہیں پیش آتی اور دیہی خواتین گھر بیٹھ کر با آسانی اس کو بنا سکتی ہیں۔ پاپڑ کا استعمال دیہات اور شہروں دونوں میں ہی بہت زیادہ ہیں اور بچے بہت شوق سے اس کو سنیک (Snack) کے طور پر کھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان اور منافع بخش کاروبار ہے۔

4۔ مصالحہ جات بنانا

مصالحہ جات بنانا اور ان کی پروسسنگ دونوں ہی بہت اہم جزو ہے۔ فوڈ پروسسنگ کے سب سے کامیاب اداروں میں سے ایک مصالحہ جات بنانا، ان کو پینا اور ان کی پیکنگ ہے۔ مرچ، زیرہ اور ہلدی جیسے انفرادی مصالحے کے پاؤڈر کے علاوہ اعلیٰ معیار کے ملاوٹ والے مصالحے کے پاؤڈر کی تیاری زیادہ منافع بخش ہے۔ گوشت کا مصالحہ، کرمی پاؤڈر اور چاٹ مصالحہ وغیرہ جیسے بہت سے مقبول مصالحہ جات تیار کیے جاتے ہیں۔

دیہی خواتین اپنے ہنر کو استعمال کر کے نہ صرف وہ خود کو معاشی استحکام دلوا سکتی ہیں بلکہ دیہات کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ دیہی خواتین کو معاشی آزادی کے مثبت اثرات سے واقف ہونا چاہیے۔

اس کے لیے حکومت پاکستان اور غیر سرکاری تنظیموں (NGO's) کو دیہی خواتین کے لیے ترقیاتی منصوبے بنانے چاہیے تاکہ ان کو دیہی ترقی اور معاشی استحکام کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ حکومت پاکستان کو گھریلو صنعت کو فروغ دینے کیلئے دیہی خواتین کو بلا سود چھوٹے قرضہ جات دینے چاہیے تاکہ وہ چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور دیہی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔

پاک کوریانیوٹریشن سنٹر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا انعقاد

تحریر: مریم جلال (پی ایچ ڈی سکالر، ایچ این ڈی)



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد غذائی استحکام اور غذائیت کے محاذ پر ایک صدی سے زائد عرصہ سے عملی طور پر سرگرم عمل ہے، اس جامعہ میں صرف تربیت یافتہ افرادی قوت ہی نہیں تیار کی جاتی ہے بلکہ کھیت سے کھانے کی میز تک لوگوں کو متناسب غذا کے لیے سہولیات فراہم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اعزاز علوم زراعت کی اس قدیم ترین جامعہ کو حاصل ہے کہ یہاں ملک کا واحد نیشنل انسٹیٹیوٹ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی قائم کیا گیا ہے جسے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے ایک فیکلٹی کا درجہ دے کر یہاں متعدد نئے ڈگری پروگراموں کا اجراء کیا ہے۔ اب فیکلٹی آف فوڈ نیوٹریشن اینڈ ہم سائنسز اور خانہ داری اور خوراک کے جملہ عوامل پر تمام جہتوں سے تعلیم و تحقیق کے مواقع باہم پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ فوڈ کے موضوع پر مختلف زاویوں پر تحقیقی پیش رفت جاری ہے۔ فیکلٹی میں جدید ترین عالمی معیار کی لیبارٹریز قائم کی گئی ہے۔ ملک کے بڑے بڑے فوڈ سے وابستہ اداروں کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کئے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کوریا کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے کوئیکا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے باہمی اشتراک سے پاک کوریانیوٹریشن سنٹر کا کثیر جہتی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں زچہ بچہ کی صحت مند زندگی کے لیے متوازن خوراک کے حوالے سے جدید خطوط پر ریسرچ کی جائے اس سلسلہ میں گزشتہ دنوں رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) کے زیر صدارت سنٹر آف ایڈوانسڈ سٹڈیز (CAS) میں پاک کوریانیوٹریشن سنٹر کی عمارت کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ مہمان خصوصی کوریا کے پاکستان میں متعین سفیر سوہ سنگ پیو، رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، کوئیکا کے کنٹرولنگ ڈائریکٹر پاکستان جی ہوئی اون، سیشنل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر سلیمی اور ڈین کلیہ خوراک، غذائیات و ہوم سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق بٹ نے عمارت کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کورئین سفیر سوہ سنگ پیو نے کہا کہ کوریا انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی (کوئیکا) کے تعاون سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاک کوریانیوٹریشن سنٹر کے قیام سے زچہ بچہ میں غذائی کمی کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان کی اہم ترین یونیورسٹی ہے جس میں ایگری ٹیک پارک بسلسلہ سیشنل ٹیکنالوجی زون ایک سنگ میل کی حیثیت کا حامل ہوگا، جمہوریہ کوریا اور پاکستان کے مابین دوستی کے گہرے رشتے موجود ہیں جنہیں مضبوط بنانے کیلئے کوئیکا بھرپور اقدامات بروئے کار لا رہا ہے۔ کوریا کے سفیر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو شدید ترین سیلاب کی صورت میں جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اسے دیکھ کر بے حد افسوس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کوریا کی حکومت اور عوام پاکستان کے مصیبت زدہ خاندانوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہیں۔

(باقی صفحہ 46 پر)

چنے کی کاشت

ڈاکٹر محمد فرخ سلیم، ڈاکٹر محمد سرور، ڈاکٹر محمد اشفاق واحد، ڈاکٹر ہارون زمان خان، محمد وقاص..... شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اہمیت

دالوں میں چنار بیج کی اہم غذائی فصل اور نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ چنار میں لحمیات (پروٹین) کی مقدار 18 تا 20 فیصد ہونے کی وجہ سے اسے اہم (منفرد) جنس اور گوشت کا نعم البدل تصور کیا جاتا ہے۔ چنے کو چاول اور گندم کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے انسانی جسم میں غذائیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مائٹو ایسڈ کی دستیابی بہتر اور متوازن ہو جاتی ہے۔ چنے کی کل پیداوار کا تقریباً 14 تا 15 فیصد لائیو سٹاک سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں چنار پھلی دار فصل ہونے کے باعث ہوا کی نائٹروجن کو بروئے کار لاتے ہوئے زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے چنے کے بعد کاشت کی جانے والی فصل بڑھوتری اور پیداوار بہتر ہوتی ہے۔ چنے کا استعمال بے شمار مصنوعات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے کچے (چھولیا) چنے گرم تر اور پختہ گرم خشک تاثیر کے حامل ہوتے ہیں۔ چنے انسانی جسم کو قوت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ فرد و خواتین کے پیچیدہ امراض میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چنے کی دہی اقسام کی پانی کی ضرورت کا بلی چنے کی نسبت کم ہونے کی وجہ سے انہیں بارانی یا کم بارش والے علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ کابلی چنے کی بڑھتی ہوئی کھپت کے پیش نظر اسکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چنار مختلف ممالک آسٹریلیا، ایران، میانمار اور ترکی وغیرہ سے درآمد کرنا پڑتی ہے لہذا کابلی اقسام (چنے) کی ملکی سطح پر پیداوار بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے کابلی چنے کی بہتر اقسام کی دریافت، زیر کاشت رقبہ میں اضافہ اور دھان کے بعد کاشت اور ستمبر کاشت کماد میں بطور مخلوط کاشت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں چنے کا کل زیر کاشت رقبہ تقریباً تیس لاکھ ایکڑ ہے۔ کل رقبہ کا تقریباً 80 فیصد پنجاب میں زیر کاشت ہے۔ پنجاب میں زیر کاشت رقبہ کا 92 فیصد رقبہ بارانی علاقوں کے اضلاع بھکر، میانوالی، لیہ، خوشاب، مظفر گڑھ اور جھنگ پر مشتمل ہے۔

پیداواری مسائل

چنے کی پیداوار بے شمار عوامل کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ جس میں ناسازگار موسمی حالات (پکنے کے دوران زیادہ درجہ حرارت اور بارش کی قلت)، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا نہ ہونا یا پھر کاشت نہ کرنا، کھادوں کا کم اور غیر متوازن استعمال اور سفارش کردہ پیداواری طریقہ کار کو نہ اپنانا سرفہرست ہیں۔ بارانی علاقوں میں فاسفورسی کھادوں کا کم استعمال چنے کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے۔

دہی چنے کی ترقی دادہ اقسام

چنے کی سفارش کردہ اقسام، علاقہ جات، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت اور پیداواری صلاحیت درج ذیل ہے۔

	سفارش کردہ اقسام	علاقہ جات	موسمی تغیرات بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت	پیداواری صلاحیت فی ایکڑ (من)
1-	فخر مکیرہ (2019)	بارانی اور آبپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، پیلا پن، (موٹے دانے)	26
2-	بٹل-2016	بارانی اور آبپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، پیلا پن، (موٹے دانے)	25
3-	نیاب سی ایچ-2016	بارانی اور آبپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، پیلا پن، (موٹے دانے)	25
4-	بھکر-2011	بارانی اور آبپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، پیلا پن اور گرمی کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہے اور پک کر جلدی تیار ہو جاتی ہے (موٹے دانے)	20-25
5-	پنجاب-2008	بارانی اور آبپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، پیلا پن (موٹے دانے)	20-25

6	بلکسر-2000	پوٹھوہار	جھلساؤ، مرجھاؤ، (موٹے دانے)	20-25
7	ونہار-2000	پوٹھوہار	جھلساؤ، مرجھاؤ	25
8	ہٹل-98	بارانی اور آپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، پیلا پن (موٹے دانے)	20-25
9	سی ایم-98	بارانی اور آپاش	جھلساؤ، مرجھاؤ، موٹے دانے	20-25

کابلی چنے کی ترقی دادہ اقسام

نمبر شمار	سفارش کردہ اقسام	علاقہ جات	موسمی تغیرات/ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت	پیداواری صلاحیت فی ایکڑ (من)
1	نور-2019	نہری اور زیادہ آپاش والے بارانی علاقے	مرجھاؤ اور جھلساؤ کے خلاف قوت مدافعت	28
2	نور-2018	نہری اور زیادہ آپاش والے بارانی علاقے	مرجھاؤ اور جھلساؤ کے خلاف قوت مدافعت	28
3	نور-2013	نہری اور زیادہ بارش والے علاقے	مرجھاؤ (موٹے دانے)	28
4	ٹمن-2013	پوٹھوہار	خشک سالی کے خلاف مدافعت درمیانہ سائز	27
5	نور-2009	نہری اور زیادہ بارش والے بارانی علاقے	مرجھاؤ اور جھلساؤ کے خلاف درمیانی مدافعت	27
6	سی ایم-2008	کم پانی والے بارانی اور پوٹھوہار کے علاقے	مرجھاؤ اور جھلساؤ کے خلاف درمیانی قوت مدافعت (دانے موٹے اور سفید)	27
7	نور-91	نہری اور زیادہ بارش والے بارانی علاقے		25

فصلی ترتیب

سبز چنے کی کٹائی آخر مارچ جبکہ کچے چنے کی کٹائی وسط اپریل میں زمین خالی کرتی ہے۔ چنے پنجاب کے مختلف اضلاع میں درج ذیل فصلی ترتیب سے کاشت کی جاسکتی ہے۔

- 1 چنے وسطی پنجاب (آغاز نومبر)۔ تل یا مونگ (جون)۔ گندم (نومبر)
- 2 چنے (اکتوبر)۔ خالی۔ چنے اکتوبر
- 3 چنے تھل ایریا آپاش (اکتوبر)۔ مونگ (اپریل) یا گوارا (اختتام جون)
- 4 چنے تھل ایریا آپاش (اکتوبر)۔ چارہ (اپریل)۔ گندم (نومبر)
- 5 چنے تھل ایریا آپاش (اکتوبر)۔ چارہ (اپریل) یا باجرہ (جولائی)۔ گندم (نومبر)
- 6 چنے تھل ایریا بارانی (اکتوبر)۔ چنے (اکتوبر اگلے سال) یا گندم (نومبر)
- 7 چنے تھل ایریا بارانی (اکتوبر)۔ مونگ پھلی (اپریل)۔ گندم (نومبر)

زمین کا انتخاب اور اس کی تیاری

چنے کی کاشت کے لیے اوسط درجے کی زرخیز، میرا، ریتیلی میرا اور اچھے نکاس والی ہموار زمین نہایت موزوں ہے۔ اس کی کاشت کھراٹھی اور سیم زدہ زمین میں بے شمار ہے۔ چنے کی فصل کے لیے زمین کی زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ آپاش والے علاقوں میں ایک یا دو ہل چلانے چاہیے۔ پہلے ہل سے پچھلی فصل کے مڈھ جڑی بوٹیاں اور خود روگھاس تلف کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہل اور سہاگہ چلا کر زمین کو ہموار کرنا چاہیے۔ تھل کی بارانی زمینوں میں مون سون کی بارشوں سے پہلے گہرا ہل چلا کر وتر کو (باقی صفحہ 29 پر)

Floods and food insecurity

Prof. Dr. Iqrar Ahmad Khan (S.I.)

Courtesy and acknowledgment: [International THE NEWS](#) - September 11, 2022

Pakistan is obligated to meet the UN Sustainable Development Goals for 2030 but the SDG 2 (zero hunger) has become a flashpoint due to the floods and climate related devastation across the country. The food insecurity in the country is reflected by a current \$10 billion import of essential commodities, including wheat. While we export rice, potato and corn, the food security remains defined by the access to aata (wheat flour), ghee (oil) and cheeni (sugar). Zero hunger can only be achieved once a balanced diet is available to the masses.

The world, now more than ever, is having to contend with the reality of climate change. There is an imbalance between emissions and impacts. The impacts of high global emissions are more pronounced in some of the countries with low levels of emissions – such as Pakistan. This has become evident in this year's super floods.

Attaining self-sufficiency in wheat production is a key objective for Pakistan. The erratic changes in weather (temperature spikes in early spring) have led to a persistent lag in our wheat production and consumption. For two consecutive years, Pakistan has had to import wheat to meet its needs. Demand for 2022-23 is projected at 30 million metric tonnes (MMT) and production around 26 MMT. Sindh accounts for roughly 13 percent of the wheat cultivation and the areas of the Punjab currently affected by the floods for roughly a fourth of the province's share in wheat production. Wheat is cultivated on 22 million acres and requires 1.14 million metric tonnes (MMT) of seed. With a third of the country under water, the home-saved wheat (for consumption and seed) is no longer available. The official supply of certified

seed is around 0.5 MMT. There is a fear that much of the land could remain too wet for sowing this season. Beyond wheat, swathes of land are submerged along with crops like rice, cotton, sugarcane, chillies, onion, fodders, dates and vegetables. The displaced livestock is highly vulnerable to disease and morbidity with consequences for milk and meat production.

The precarious situation is a precursor to an impending famine, putting Pakistan at risk of failing to attain SDG 2, zero hunger. Zero hunger necessitates that the entire population have affordable access to safe, healthy and nutritious food. We have already lost a huge volume of essential food

Fewer than 20 percent of Pakistani children meet minimum dietary diversity needs, leaving more than 45 percent of children under the age of 5 chronically malnourished.

crops. The areas affected by the floods may take several years to recover, meaning a lot of the land may not be cultivated for the coming Rabi season. This will have a significant impact on food supplies. A shortfall in wheat production could be met with the help of imports. Global prices have already soared as a consequence of the Russia-Ukraine conflict. Pakistan will also have lower vegetables and oilseed production next year, adding further pressure to the import bill. Import of essential food commodities will make those inaccessible to an inflation-ridden populace.

Pakistan is among the 55 countries most vulnerable to hunger and malnutrition listed by the Global Food Report of the World Food Programme. A staggering 51 percent of the people in the drought/ flood affected areas of



Sindh and Balochistan are considered food insecure. Fewer than 20 percent of Pakistani children meet minimum dietary diversity needs, leaving more than 45 percent of children under the age of five chronically malnourished. The problem is likely to be aggravated now, further jeopardising the realisation of SDG 2. Targets 2.4, 2.6, 2.7 and 2.8 are about resilient agriculture, rural infrastructure, agricultural research and technology, trade restrictions and stable markets, respectively. The floods have literally endangered the prospects of all these in the coming years.

To off-set the impending hunger crisis, immediate action must be taken to address the food vulnerabilities. Pressure on wheat supplies could be reduced by building buffer stocks of imported wheat, halting rice, potato and corn exports and mandating flour mills to blend maize with wheat. This could contribute to dietary diversity and help stabilise the prices of wheat and reduce uncertainty. The import of powder milk should be facilitated as should be the import of essential vegetables (onion, tomato, chillies) from within the region.

A Marshal Plan of sorts is needed to rehabilitate the damaged farmland. This will involve drainage of flood waters, removing debris and quicksands and rebuilding the lost agricultural infrastructure. The land tenure demarcations stand obliterated. The provincial revenue department (patwaar) should be out with proper records. Use of technology and satellite images could make the job of demarcation easier. Heavy earth moving machinery and ordinary farm implements are equally wanting. Better irrigation and drainage systems and markets can be designed. Subsidised farm input supplies, services and credit delivery will be required at the doorstep of the disadvantaged tillers. There is an opportunity to build back better, with more resilient and effective solutions for sustainable development.

Above all, a HOPE campaign for bringing life back to normal will be needed for the next several months, possibly years.

چنے کی کاشت

بقیہ:

محفوظ کرنا چاہیے۔ بارانی علاقوں کی نرم اور ریتیلی زمین میں محفوظ وتر میں ہل چلائے بغیر چنے کی کاشت کرنی چاہیے تاکہ وتر ضائع نہ ہو۔
آب و ہوا

چنے کی بہتر پیداوار کیلئے سرد اور خشک موسم نہایت موزوں ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80 فیصد سے زیادہ اور درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے کم ہونے کی وجہ سے جھلساؤ کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری کے جراثیم سردیوں کی بھرپور بارش اور اسکے بعد دھوپ والے دنوں کی وجہ سے خوب پھیلنے لگتے ہیں جس سے جھلساؤ کی بیماری یقینی ہوتی ہے۔ البتہ موسم کی خشکی اور ہلکی بوند باندی چنے کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی۔

وقت کاشت

چنے کی موزوں وقت پر کاشت کلیدی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پچھتی فصل کی نشوونما اور اگیتی فصل کی بڑھوتری زیادہ ہونے کے باعث پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ شمالی پنجاب کے اضلاع ٹک اور چکوال میں چنے کی کاشت کا موزوں وقت آخر ستمبر تا وسط اکتوبر جبکہ جہلم، گجرات، راولپنڈی اور نارووال کے اضلاع میں وسط اکتوبر تا 10 نومبر ہے۔ بارانی علاقوں (لیہ، خوشاب، بھکر، میانوالی اور جھنگ) میں اکتوبر کا پورا ماہ جبکہ نہری علاقوں آخر اکتوبر تا وسط نومبر کے دوران بوائی کی جائے۔ جنوبی اور وسطی پنجاب کے نہری علاقوں میں آخر اکتوبر سے وسط نومبر کے دوران بوائی کرنی چاہیے۔ ستمبر کاشتہ کماد میں چنے کی مخلوط کاشت وسط اکتوبر تا 10 نومبر تک کرنی چاہیے۔ نہری علاقوں کی زرخیز زمینوں میں اکتوبر کاشتہ فصل کا قد بڑا ہونے کی وجہ سے پیداوار کم ہوتی ہے لہذا دھان کی کاشت اور وسطی پنجاب میں چنے کی بوائی آخر اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں کرنی چاہیے۔

شرح بچ اور پودوں کی تعداد

موٹے دانوں والی اقسام کا 30 سے 35 کلوگرام جبکہ درمیانی جسامت کے دانوں والی اقسام کا 25 سے 30 کلوگرام فی ایکڑ صاف ستھرا، صحت مند اور اچھے اگاؤ والا بچ استعمال کرنا چاہیے۔ اچھی پیداوار کیلئے سفید چنے کے 75 سے 80 ہزار جبکہ کالے چنے کی 85 سے 90 ہزار پودے فی ایکڑ ہونے چاہیے۔

بچ کو زہر اور جراثیمی ٹیکہ لگانا

بچ کی کاشت سے پہلے تھیفائیٹ میتھائل اور امیڈاکلوپریڈ یا ناپسن۔ ایم یا کلوٹھیما ڈین بحساب 2 تا 3 گرام فی کلوگرام بچ پر لگانے سے فصل رس چوسنے والے کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔

☆ نائٹروجنی ٹیکہ پودے کی ہوا کی نائٹروجن حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔

☆ ایک نائٹروجنی ٹیکہ 5 تا 6 کلوگرام بچ پر استعمال کرنا چاہیے۔

☆ ایک نائٹروجنی ٹیکہ کے لیے 250 ملی لیٹر پانی میں 50 گرام گڑ ملا کر شربت کی صورت میں بچ پر چھڑکیں۔ جراثیم بچ کو اچھی طرح چپکانے کے لیے ٹیکہ کو بچ پر اچھی طرح لگائیں۔ بچ کو سائے میں خشک کریں، بچ آپس میں جڑنے نہ پائیں تاکہ جراثیم زندہ رہے۔ بچ کو سایہ دار جگہ پر خشک کر کے فوراً کاشت کر لینا چاہیے۔

طریقہ کاشت

اگر چنے کی بوائی چھٹے سے بھی کی جاسکتی ہے مگر بہتر نتائج کے لیے ڈرل یا پورا استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے جڑی بوٹیوں کی تلفی بذریعہ گوڈی آسان ہوتی ہے اور بچ مناسب گہرائی تک جانے کی وجہ سے اگاؤ بہتر ہوتا ہے۔ تھل کی بارانی کاشت کے لیے قطاروں کا درمیانی فاصلہ 30 سینٹی میٹر (1 فٹ) اور پودوں کا 15 سینٹی میٹر (6 انچ) ہونا چاہیے۔ تھل کے علاقوں میں بچ دوانچ کی گہرائی تک ڈرل کرنا چاہیے۔ آبپاش (نہری) علاقوں میں چنے کی نشوونما بہتر ہونے کی وجہ سے لائنوں کا درمیانی فاصلہ 45 سینٹی میٹر (1.5 فٹ) اور پودوں کا باہمی فاصلہ 8 سے 9 انچ ہونا چاہیے۔

چھدرائی

چھدرائی کا عمل چنے کی بہتر پیداوار کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اُگاؤ کے دو تین ہفتے بعد نزدیک اور کمزور پودے اکھاڑ کر پودوں کا درمیانی (باہمی) فاصلہ 6 سے 8 انچ برقرار رکھنا چاہیے۔ چھدرائی کے عمل کے باعث ہوا کا گزر آسان ہوتا ہے جس سے پودے صحت مند اور توانا ہونے کی وجہ سے پیداوار پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تھل کی زمین میں نمی ہونے کی وجہ سے چھدرائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کھادوں کا استعمال

چنے کی اچھی پیداوار کیلئے کھادوں کا بروقت اور مناسب استعمال ناگزیر ہے۔ پہلی دار فصل ہونے کی وجہ سے چنے کی نائٹروجنی کھاد کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ زرخیز زمینوں میں اُگاؤ کے بعد نائٹروجنی کھاد کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نہری علاقوں میں بیج کو جراثیمی ٹیکہ لگا کر کاشت کرنے سے ابتدائی بڑھوتری بہتر ہوتی ہے جس سے نائٹروجنی کھاد کی بچت ہو سکتی ہے۔ البتہ فاسفورس کھاد کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پوناش کھاد فصل کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے اس کے استعمال سے فصل کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی اور پیداوار بہتر ہوتی ہے۔ اچھی پیداوار کے لیے ہلکی زمین پر آدھی تا ایک بوری پوناش استعمال کرنی چاہیے۔ مختلف علاقوں میں کھاد استعمال کرنے کی تفصیل درج ذیل ہے۔

1) بارانی علاقے

ان علاقوں میں مناسب وتر پر بوائی کے وقت ایک بوری ڈی اے پی نی ایکڑ ڈالنی چاہیے۔ فصل بہت زیادہ کمزور ہونے کی صورت میں تھوڑی اضافی نائٹروجن (آدھی بوری یوریا) بارش ہونے کے بعد پہلے ماہ میں استعمال کرنی چاہیے۔

2) تھل ایریا / بارانی علاقے

تھل کے نہری علاقوں میں بوائی کے وقت کم از کم 9 کلو نائٹروجن اور 23 کلو فاسفورس (ایک بوری ڈی اے پی) بذریعہ ڈرل استعمال کرنی چاہیے۔

3) آبپاش علاقے وسطی پنجاب / تھل

ان علاقوں میں کاشت کے وقت مناسب وتر میں نائٹروجن 13 کلوگرام اور فاسفورس 34 کلوگرام (ڈیڑھ بوری ڈی اے پی یا ڈیڑھ بوری ٹریپل سپر فاسفیٹ + آدھی بوری یوریا) فی ایکڑ ڈالنی چاہیے۔

گوڈی یا علاقے

چنے کی فصل میں گوڈی / علاقے کا کام فصل کے اُگاؤ کے بعد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اُگاؤ کے ساتھ ہی جڑی بوٹیاں اُگتی ہیں اگر فصل کی کاشت کے بعد بارش ہو جائے تو گوڈی کرنی چاہیے۔ فصل کو دو گوڈیاں دینی چاہئیں کیونکہ گوڈی سے فصل کی جڑوں میں ہوا کی پہنچ بڑھتی ہے اور زمین میں نمی محفوظ رہتی ہے آبپاش علاقوں میں پہلا پانی دینے کے بعد گوڈی کرنے سے نمی دیر تک محفوظ رہنے سے فصل سوکے سے بچ جاتی ہے۔

اہم جڑی بوٹیاں

علاقہ جات	جڑی بوٹیوں کی اقسام
چنے کے مرکزی علاقے	باتھو، چھکنی بوٹی، پیازی، رت پھلائی، ریواڑی اور دمی سٹی
وسطی پنجاب اور آبپاش علاقے	شاہترہ، جنگلی جئی، باتھو

آبپاشی

چنے کی فصل میں خشک سالی / پانی کی کمی برداشت کرنے کی صلاحیت کافی ہوتی ہے۔ تھل (بارانی علاقے) میں چنے کی کامیابی کا انحصار بارشوں پر ہوتا ہے۔ موسم سرما

کی بلکی بارشیں فصل کی کامیابی کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آپاش علاقوں میں اگر بارش نہ ہو تو سوکا ہونے کی صورت میں پھول آنے پر فصل کو ہلکا سا پانی لگانا چاہیے۔ عموماً آپاش علاقوں میں چنے کو پہلا پانی بوائی / کاشت کے دو ماہ بعد جبکہ دوسرا پھول آنے پر لگانا چاہیے۔ موسم زیادہ گرم ہونے کی صورت میں دانے بننے کے عمل پر تیسرا پانی لگایا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں آپاشی کا فیصلہ موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ دھان کے بعد کاشتہ فصل کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے البتہ تمبر کاشتہ مکا دیں چنے کی مخلوط کاشتہ فصل کو مکا دی کی ضرورت کے مطابق آپاش کرنا چاہیے۔

چنے کا قد کنٹرول کرنا

اگر چنے کی فصل کثرت کھاد، اگیتی کاشت اور زیادہ بارش کی وجہ سے قد زیادہ نکالنے (کرنے) لگے تو مناسب وقت اور حد تک سوکا لگائیں یا دھان کے دو ماہ بعد شاخ تراشی کریں۔ تاہم فصل کی نشوونما روکنے والے محلول کا سپرے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔

برداشت

اس فصل کے وقت برداشت کا انحصار وقت کاشت اور اقسام پر ہوتا ہے۔ عموماً فصل 130 سے 150 دنوں میں پک جاتی ہے۔ فصل کو 80 سے 90 فیصد ٹاڈ پکنے پر برداشت کرنا چاہیے۔ وسطی پنجاب میں چنے کی کٹائی کا آغاز وسط اپریل سے ہوتا ہے اور تھل ایریا میں آخر مارچ سے شروع اپریل کے دوران فصل کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے جبکہ شمالی علاقوں میں کٹائی آخر اپریل میں کرنی چاہیے۔

چنے کی برداشت میں تاخیر سے پھلیاں جھڑنے سے پیداوار متاثر ہوتی ہے لہذا فصل کو صبح کے وقت کاشت کرنا چاہیے تاکہ شبنم کی وجہ سے پھلیاں نہ جھڑیں۔ برداشت کے بعد فصل کو دھوپ میں خشک کرنا چاہیے۔

چنے کی گہائی اور ذخیرہ کرنا

جب فصل اچھی طرح خشک ہو جائے تب اسکی گہائی کرنی چاہیے۔ گہائی کیلئے کم رفتار تھریشر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جنس کو صاف اور عموماً محفوظ کی گئی جنس کو ڈھور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ سنور کو نقصان دہ کیڑوں سے پاک کرنے کیلئے 7 کلوگرام خشک لکڑی فی ہزار مکعب فٹ جلا کر سنور میں سپرے کریں۔ استعمال شدہ اور پرانی بوریوں کو اسی محلول میں دھوئیں اور خشک کر کے ان میں جنس محفوظ کریں۔ اگر سنور میں سپرے نہ ہو سکے تو ایلومینیم فاسفائیڈ کی 40 سے 50 گولیاں فی ہزار مکعب فٹ استعمال کر کے سنور کو فوراً ہوا بند سیل کرنا چاہیے۔

ضرر رساں کیڑے

درج ذیل کیڑے چنے کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں

1- ٹاڈ کی سنڈی (Pod Borer)

2- چور کیڑا (Cut Worn)

3- دیمک (Tormite)

4- سُست تیلہ (Aphid)

5- لشکری سنڈی (Army Worm)

بیماریاں

2- چنے کی جڑ کا سٹرن (Root Rot)

1- چنے کا مرجھاؤ یا سوکا (Gram wilt)

3- چنے کا جھلساؤ (Gram Blight)

پاکستان میں سویا بین کی کاشت میں درپیش مسائل

محمد اویس ارشد، ڈاکٹر رانا ندیم عباس، ڈاکٹر محمد آصف اقبال، ڈاکٹر ظہیر احمد..... شعبہ اگروانومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

سویا بین (Glycine Max I) ایک اہم پھلی دار فصل ہے جو کہ Fabaceae خاندان کا رکن ہے۔ اس کی اعلیٰ اہمیت کی وجہ سے اسے اکیسویں صدی کا ”گولڈن بین“ کہا جاتا ہے۔ سویا بین اعلیٰ غذائیت کی حامل فصل ہے۔ اس میں تقریباً 22-18 فیصد تیل اور 42-40 فیصد پروٹین پائی جاتی ہے جو کہ ایک اچھی خاصی مقدار ہے۔ دوسری فصلوں کی نسبت اس میں وٹامنز اور کاربوہائیڈریٹس کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ سویا بین Vegetable Oil کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کا تقریباً 30 فیصد Vegetable Oil سویا بین سے تیار ہوتا ہے۔ اسے ہڈیوں کے بغیر گوشت یا کھیتوں کا گوشت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی سبزی یا اناج کی فصل کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے۔ سویا بین کی 172 گرام کے ایک کپ میں 298 کیلو ریز ہوتی ہیں۔ سویا بین میڈیسنل پودے (Medicinal Plant) کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بنی مصنوعات کئی بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جینیٹکس (سویا بین میں پائے جانے والا ایک آکسوفلیون نائٹروٹریٹ) کینسر کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سویا بین کی فصل سے بہت سی اہم مصنوعات بنائی جاتی ہیں جن میں سویا ملک، سویا ساس، ٹوفو اور اُبلے ہوئی سویا بین دنیا بھر میں تیار کی جاتی ہے۔ سویا بین سے صنعتی مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں جیسے کہ کاسمیٹکس، صابن، ڈسٹر جٹ، پینٹ، پرنٹنگ انکس، ربڑ اور پلاسٹک کی صنعت کی تیاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن آج کل اس کا سب سے بڑا حصہ خوراک کی مصنوعات میں خاص طور پر پولٹری فیڈ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پولٹری کے ریٹس سویا بین کی کمی ہونے سے بڑھ جاتے ہیں۔

عالمی سطح پر سویا بین کو تیل اور دالوں کی فصل کے طور پر اُگایا جاتا ہے۔ دنیا کا 30 فیصد تیل سویا بین سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سویا بین کی عالمی پیداوار 394.7 ملین ٹن ہے اور 2021 USDA کی رپورٹ کے مطابق 411 ملین ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے۔

COVID-19 کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے تمام اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سویا بین کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا پیدا کنندہ برازیل ہے اور اس کے بعد امریکہ، ارجنٹائن اور چین ہیں۔ دونوں سہ فرسٹ ممالک برازیل اور امریکہ نے عالمی سویا بین کی پیداوار کا دو تہائی حصہ پیدا کیا اور 80 فیصد برآمد کیا۔

پاکستان کی اگر بات کریں تو سویا بین پاکستان میں انتہائی محدود درجہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ جس کی اوسط پیداوار 1000-120 کلو گرام فی ہیکٹر ہوتی ہے جبکہ دعویٰ کیا گیا کہ صلاحیت 4000-6000 کلو گرام فی ہیکٹر ہے۔ پاکستان میں مقامی تیل کی پیداوار، مقامی طلب کا 25 فیصد ہے جو کہ بڑھتی ہوئی مقامی طلب کو پورا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے پاکستان کے قومی بجٹ کا ایک بڑا حصہ باہر سے تیل درآمد کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے اور درآمد کرنے کی وجہ سے قیمتی زرمبادلہ میں بھی کمی آتی ہے اور ملک میں خوردنی تیل کی قیمت عام آدمی کی دستر میں سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان ہر سال اپنے خوردنی تیل کا 75 فیصد مختلف ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ پاکستان اپنے خوردنی تیل کی درآمد تقریباً 316 ارب روپے کی بڑی رقم خرچ کرتا ہے جس میں سے 64 ارب صرف سویا بین پر خرچ کئے گئے جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ USDA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سال 2020-21ء میں 2.5 ملین میٹرک ٹن سویا بین درآمد کیا۔

1960ء کی دہائی میں سویا بین کو سورج کھسی کے ساتھ پاکستان میں تیل دار بیج کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا لیکن سویا بین صرف 1970ء کی دہائی تک محدود رہی۔ جب پودے پاکستان میں سویا بین کے ٹرائل لگائے گئے تو پیداواری نتائج امید سے بہتر ملے جو کہ تجارتی سطح پر کاشت کی طرف لے کر جاتے تھے لیکن اس پر بہت کم کام ہوا اور پھر یہ دھیرے دھیرے پاکستان کے کھیتوں سے غائب ہونے لگی جس کے پیچھے کئی عوامل تھے جن میں زرعی پیداواری ٹیکنالوجی کی کمی، ناقص دراہنی کی دستیابی، ماحولیاتی

حالات، مارکیٹنگ کی سہولیات اور سب سے بڑی وجہ ابتدائی نشوونما کے دوران جڑی بوٹیوں کی افزائش ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔

لیکن حالیہ کچھ سالوں سے پاکستان نے پولٹری ہیکٹر اور خوردنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سویا بین کی کاشت شروع کی کیونکہ درآمدات کے نتیجے میں بہت زیادہ درآمدی بل آتے ہیں۔

سویا بین کی پیداوار کی کمی کے پیچھے بہت سے ناپسندیدہ عوامل ہیں جو فصل کی نشوونما اور پیداوار کو متاثر کرتے ہیں ان عوامل میں سب سے بڑا مسئلہ سویا بین کی بوائی کے وقت زمین کا خالی نہ ہونا بھی ہے۔ سویا بین سال میں دو دفعہ لگائی جاتی ہے۔ دونوں وقت زمین خالی نہیں ہوتی۔ سویا بین کا مقابلہ سورج مکھی اور مکئی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں فصل سویا بین کی نسبت زیادہ منافع بخش ہیں کیونکہ پاکستان میں سویا بین کی نسبت سورج مکھی اور مکئی کی مارکیٹ زیادہ ہے۔ کسانوں کو سویا بین کو فروخت کرنے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے قدرتی عوامل ہیں جن میں پیداوار میں کمی کا سب سے زیادہ ذمہ دار فصل میں جڑی بوٹیوں کا حملہ ہے۔ جڑی بوٹیاں ایسے ناپسندیدہ پودے ہوتے ہیں جو کہ ایک رپورٹ کے مطابق 37 فیصد تک پیداوار میں کمی کرتے ہیں اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں سویا بین کی فصل کی پیداوار اور معیار میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسری رپورٹ کے مطابق جڑی بوٹیوں سے سویا بین کی پیداوار میں 55-8 فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے اگر جڑی بوٹیاں شروعات سے ہی کنٹرول نہ کی جائے۔ جڑی بوٹیاں سویا بین کے ساتھ پانی، جگہ، روشنی اور زمین میں موجود غذائی اجزاء کے لیے مقابلہ کرتی ہیں اور زمین کی زرخیزی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے نقصان دہ کیڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان کو رہنے کے لیے سکُن دیتی ہے جس سے فصل کو نقصان بھی ہوتا ہے اور اس سے فصل کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے سویا بین میں کی بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر کے ہم سویا بین کی پیداوار بھی بڑھا سکتے اور لاگت پر خرچ بھی کم کر سکتے ہیں۔ سویا بین میں جڑی بوٹیوں کو مخصوص مراحل میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایسے مراحل جس میں یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا کنٹرول کر کے پیداوار بڑھائی جاسکتی۔ اُگائی کے 27 دن کے اندر کنٹرول سب سے بہترین وقت سمجھا جاتا ہے۔ سویا بین کے اس نازک وقت (Critical Period) میں دستیاب طریقوں سے کسان جڑی بوٹیاں کنٹرول / تلف کر سکتا ہے۔

ایک اور رپورٹ کے مطابق سویا بین اور جڑی بوٹیوں میں مقابلے سے دنیا میں 80 فیصد پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ اسی لیے جڑی بوٹیوں پر قابو پانے کی ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جڑی بوٹیوں کی مداخلت کی وجہ سے پیداوار اور اس میں ہونے والے نقصان کو کم کیا جاسکے۔

درست ورائٹی کے انتخاب سے اور علاقے کے مطابق درست بوائی کے طریقے سے جڑی بوٹیوں کو دبایا جاسکتا ہے۔ ایک اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کاشتکاروں کے پاس زمین کے مطابق مناسب قسم کی ورائٹی کے بارے میں مناسب معلومات نہیں ہیں اور سویا بین کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ وقت پر بوائی کرنے سے بھی جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکا جاسکتا ہے۔

جڑی بوٹی مارز ہر دو اؤں کی مناسب مقدار بھی ایک اہم عنصر ہے۔ جڑی بوٹی مار دو کا زیادہ استعمال بہت سے خطرات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ زیر زمین پانی اور مٹی کی زہر آلودگی جیسے خطرات ہوتے ہیں اور سویا بین ایک حساس اور نازک فصل ہے۔ یہ سویا بین کی فصل کا جھلساؤ اور سویا بین میں جڑی بوٹیوں کے خلاف مزاحمت جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کسانوں کو جڑی بوٹی مار دو اؤں میں موجود زہر کے نقصان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ جڑی بوٹی مار دو کے زیادہ استعمال سے وہ تیزی سے اور مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ سویا بین ایک حساس فصل ہے اس میں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جڑی بوٹی مار دو اؤں کی مناسب مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جڑی بوٹی مار دو اؤں کی مقدار کو مناسب حد تک کم کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ مناسب مقدار صحیح طریقے سے کام کرتی ہے۔

لہذا سویا بین سمیت پیداواری نظام / زرعی نظام میں جڑی بوٹیاں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اگر ابتدائی مراحل میں جڑی بوٹیوں پر قابو نہ پایا جائے تو یہ سویا بین کی پیداوار میں خاطر خواہ حد تک کمی کر سکتے ہیں۔

(باقی صفحہ 36 پر)

گوار کی پیداواری ٹیکنالوجی

ڈاکٹر عمران خان، صفدر احمد، ڈاکٹر محمد عمر چٹھہ، ڈاکٹر ثکلیل انجم، ڈاکٹر محمد عمیر..... شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

گوار کی اہمیت

یہ موسم گرما کی ایک بہت اہم فصل ہے۔ یہ ایک پھلی دار فصل ہے جو کہ ہوا میں موجود نائٹروجن کو زمین میں منتقل کرتا ہے اور اس کی زرخیزی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے پودے کو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پودے میں پروٹین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جانوروں میں گوشت کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ پھلوں کی نوعیت کی وجہ سے یہ زمین کی زرخیزی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بیج میں ایک مخصوص گوند ہوتا ہے جو ٹیکسٹائل اور فوڈ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیل میں گوار کی پیداواری ٹیکنالوجی بیان کی گئی ہے۔

کاشت کے لیے موزوں زمین

گوار کی فصل کے لیے اچھی نکاسی والی ریتیلی میرا زمین زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ یہ 7.5 اور 8.0 کے درمیان پی ایچ کے ساتھ ساتھ معتدل کلر اٹھی زمین میں بھی کاشت کی جاسکتی ہے۔ اس فصل کی کاشت کے لیے چکنی زمین موزوں نہیں۔ اس کی کاشت کے لیے درمیانے سے ہلکے عناصر والی زمین جس میں ضرورت سے زیادہ وتر نہ ہو۔ یہاں تک کہ کم زرخیزی اور پودوں کے غذائی عناصر کی کمی والی زمین بھی سبز کھاد کی فصل کے طور پر گوار اگانے کے لیے موزوں ہے۔

زمین کی تیاری

گوار کے بیج کو اگانے کے لیے اچھی طرح سے تیار شدہ کھیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی کاشت کے لیے زمین میں مناسب وتر کا ہونا ضروری ہے۔ ابتدائی نشوونما کی مدت کے دوران مٹی میں موجود ہوا سے جڑوں کی نشوونما اور بیکٹیریا کی نشوونما کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے سب سے پہلے کھیت کو روئی کیا جائے اور وتر آنے پر اس میں دو یا تین گہرے ہل چلا کر سہاگہ چلانا چاہیے۔ کھیت کو جڑی بوٹیوں اور دیگر فصلوں کی باقیات سے پاک ہونا چاہیے اور کھاد کو آخری ہل چلاتے وقت سہاگہ سے پہلے چھڑے کر دے۔

بوائی کا وقت/وقت کاشت

سبزی کے طور پر سبز پھلیوں سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے اسے فروری سے مارچ تک اگایا جاتا ہے۔ سبز چارے اور سبز کھاد کے لیے فصل اپریل سے جولائی کے مہینوں میں اگائی جاتی ہے لیکن بیج کے مقصد کے لیے بوائی کا بہترین وقت مئی سے جولائی ہے۔ بارانی علاقوں میں بوائی مون سون کی بارشوں کے بعد کی جاتی ہے۔

بوائی کا طریقہ/کاشت کا طریقہ

گوار کی بوائی سے پہلے کھیت کو 2-1 ایکڑ انچ کے پہلے سے آبپاشی کرنی چاہیے، جسے ہم راؤنی کہتے ہیں۔ زمین وتر آنے پر زمین کی تیاری کے لیے دو سے تین مرتبہ ہل چلائیں اور سہاگہ دیں۔ اگر فصل کو چارے کے مقصد یا سبز کھاد کے لیے کاشت کرنا ہو تو بیج کا چھٹا آخری سہاگہ سے پہلے کریں۔ فصل کے اچھے اگاؤ کے لیے زمین میں مناسب وتر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فصل کو بیج کے مقصد کے لیے کاشت کرنا ہو تو ڈرل بہتر ہے اور اس کے نتیجے میں بیج کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے۔ ڈرل کاشت کی صورت میں زمین وتر آنے پر دو سے تین مرتبہ گہرا ہل چلائیں اور سہاگہ دینے کے بعد ڈرل کریں۔ اناج کی پیداوار کے لیے اگائی جانے والی فصل کے لیے قطاروں کے درمیان 30-45 سینٹی میٹر اور پودوں کے درمیان 15 سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھا جائے تاہم، دیر سے بوائی اور زمین کی زرخیزی کے خراب حالات میں پودوں اور قطاروں کے درمیان فاصلہ کم کیا جاسکتا ہے۔ چارے کی فصل کے لیے پودوں کے درمیان 12 سینٹی میٹر قطاروں کے درمیان 30 سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ سبزی کے طور پر پھلیوں کی پیداوار کے

لیے اگائی جانے والی فصل کے لیے پودوں کے درمیان 30 سینٹی میٹر اور قطاروں کے درمیان 60 سینٹی میٹر کا وسیع فاصلہ ضروری ہے۔ عام طور پر 1 سے ڈیڑھ انچ کی گہرائی میں بیج لگانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

بیج کی شرح

گوار کی فصل کے لیے بیج کی شرح 15 کلوگرام سے 45 کلوگرام فی ہیکٹر تک ہوتی ہے جو زمین میں موجود وتر اور فاصلہ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 20 کلوگرام بیج فی ہیکٹر بیج کی فصل کے لیے کافی ہے۔ چارے یا سبز کھاد کے لیے اگائی جانے والی فصلوں کے لیے بیج کی شرح تقریباً 40 کلوگرام فی ہیکٹر ہے۔ بیج کی شرح عام طور پر دیر سے بوائی جانے والی حالت، خشک حالت اور کھڑی زمین کی صورت میں بڑھائی جاسکتی ہے۔

بیج کو جراثیمی ٹیکہ لگانا

جراثیمی کلچر کے ساتھ بیج کو ٹیکہ لگانا

گوار کا پودا اپنی جڑوں پر نوڈل/گانٹھ بناتا ہے جس میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا رہتا ہے اور فضا کی مفت نائٹروجن کو کھاد کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے جو پودے کی جڑوں سے جذب ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا اور جڑ کے نوڈل/گانٹھ کا یہ علامتی تعلق نائٹروجن کھاد کی لاگت کو بچانے میں مفید ہے۔ اس لیے بوائی سے پہلے بیجوں کو ان بیکٹیریا سے ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تاکہ پودے کی نشوونما کے ساتھ ان کی آبادی زمین میں بڑھ جائے۔ (یہ اُلتے ہوئے پانی میں 10 فیصد چینی یا گڑ کا محلول تیار کر کے کیا جاتا ہے۔ چینی کے اس محلول کو ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر بیکٹیریا کی کلچر کے 3-4 پیکٹوں کو محلول میں ملا کر ایک پتلا پیسٹ بنا لیا جاتا ہے۔ اس پیسٹ کو بیج پر لپ کر دیا جاتا ہے۔ بیج کو بوائی سے پہلے 30-40 منٹ تک سایہ میں خشک کیا جاتا ہے)۔

اقسام

پاکستان میں گوار کی چار اقسام BR-90 اور BR-2021, BR-2017, BR99 چارے، سبزی اور اناج کے مقصد کے لیے تیار کی گئی ہیں۔

آپاشی

گوار ایک خشکی برداشت کرنے والی فصل ہے اس لیے اسے کم آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپاشی والے علاقوں سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے 350-450 ملی میٹر پانی کافی ہے۔ آپاشی کے لیے خشک موسم کی فصل کو موسم گرما کے شروع میں تقریباً پندرہ دن کے وقفوں سے اور بعد میں تقریباً دس دن کے وقفے سے آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر فصل کو 2-3 آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بارشیں مناسب اور اچھی ہوں تو برسات کے موسم میں اگائی جانے والی خریف سیزن کی فصل کو اصول ایک آپاشی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بارش بہت زیادہ ہو تو اضافی پانی کو فوری طور پر نکال دینا چاہیے۔

سیم زدہ علاقوں میں اسے بوسے فصل کے طور پر بھی اگایا جاتا ہے (بوائی کے بعد کوئی آپاشی نہیں کی جاتی ہے)۔ اگر پانی لگایا جائے تو فصل میں پھلیاں بنتی ہی نہیں اور اگر بنی بھی تو بہت ہی کم پھلیاں بنتی ہیں۔ صحرائی علاقوں میں کاشت گوار کی فصل میں آپاشی کا وقفہ مناسب رکھیں۔

کھاد

گوار کی فصل کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے 10 سے 12 ٹن سبز کھاد/روٹی کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جب ریتیلی زمینوں پر اسکی کاشت کی جائے۔ یہ کھاد بوائی سے ایک ماہ پہلے ڈالی جاتی ہے۔ نائٹروجن والی کھادیں صرف تھوڑی مقدار میں دے کیونکہ فصل کو زیادہ تر نائٹروجن بیکٹیریا کی مدد سے حاصل سے مل جاتی ہے۔ ڈی اے پی کھاد تقریباً 125 کلوگرام، ایس او پی 125 کلوگرام فی ہیکٹر بوائی کے وقت بنیادی خوراک کے طور پر ڈالی جاتی ہے۔

جڑی بوٹیوں کا کنٹرول

خریف کے موسم میں گوار کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوہری راؤنی کرنی چاہیے۔ پہلی راؤنی کے بعد جڑی بوٹیاں اگنے لگتی ہیں تو زمین وتر آنے پر

ہل چلا کر انہیں تلف کریں اور دوسری دفعہ راؤنی کریں اور زمین وتر آنے پر فصل کاشت کریں اور اگر دوسری راؤنی کے لیے پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں زمین وتر آنے پر ہل چلانے سے پہلے اگر جڑی بوٹی مار دو مثلاً پینڈی میتھلین بحساب ڈیڑھ لٹری ایکڑ 100 لٹری پانی میں ملا کر سپرے کر دیا جائے تو جڑی بوٹیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طور پر فصل میں گوڈی کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے حملے سے بچایا جاسکتا ہے۔

بیماریاں

گوار کا مرجھاؤ (حرد بینی حشرات جیسے کہ فیوسیریم سولانی اور ایف سیمپلیک)۔ یہ بیماری فصل کے ابتدائی مراحل میں ظاہر ہوتی ہے۔ متاثرہ پودے اچانک مرجھانے لگتے ہیں۔ بیمار پودوں کے پتے پہلے پہلے ہونے لگتے ہیں اور پھر جھڑ جاتے ہیں۔ بیمار پودوں کو کھیت سے اکھاڑ کر کھیت سے دور گڑھا کھود کر تلف کریں۔

کیرے

گوار کی فصل پر سنڈیوں کا حملہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس پر رس چوسنے والے کیڑوں مثلاً سفید مکھی، سبز تیلاد وغیرہ کا حملہ ہوتا ہے جس کے تدارک کے لیے محکمہ زراعت توسیع کے مقامی نمائندہ کے مشورے سے سفارش کردہ زہر کا سپرے کریں۔

برداشت اور پیداوار

سبزی کے لیے کاشت گوار کی پھلیاں بوائی کے تقریباً 40 دن بعد مختلف اقسام کے لحاظ سے توڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ تقریباً 12-10 دنوں کے وقفے سے کرنی چاہیے۔ جب فصل چارے کے لیے کاشت کی جائے تو کٹائی پھول آنے سے کچھ دن پہلے یا جب فصل پھول آنے کی حالت میں ہوتے ہیں یا جب پھلیاں نکلنے لگتی ہیں۔ یہ مرحلہ بوائی کے تقریباً 50 سے 80 دن بعد آتا ہے۔ ہری کھاد کے لیے، جیسے ہی پھول نکلنے شروع ہو تو فصل کو روٹا ویڑا ڈسک کی مدد سے زمین میں ملا دے اور آدھی بوری یوریا کا چھٹہ کرنے کے بعد کھیت کو پانی لگا دیں اس سے زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا اور گلنے سڑنے کا عمل بھی تیز ہوگا۔ سبز فصل کی پیداوار چارے کے لیے تقریباً 12 ٹن فی ہیکٹر ہے۔ جب فصل بیج کے لیے کاشت کی جائے تو اسے پھلی کے پختہ ہونے تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بیج والی فصل تقریباً 80 تا 90 فیصد پھلیوں کے پک جانے پر کاٹ لینی چاہیے۔ کٹائی کے لیے درانتی یا کمبائن ہارویٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فصل کو کچھ عرصہ کے لیے چھوٹی چھوٹی ڈھیر یوں کی شکل میں خشک کیا جاتا ہے اور پھر تھریش کیا جاتا ہے۔ نشوونما اور قسم کے لحاظ سے اس کی پیداوار 20-6 من فی ایکڑ حاصل کی جاسکتی ہے۔

پاکستان میں سویا بین کی کاشت میں درپیش مسائل

بقیہ:

سویا بین کی فصل میں جڑی بوٹیوں کے کامیاب کنٹرول کے لیے دوبارہ گوڈی یعنی تاتھ سے کدال لگانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس سے سویا بین کی پیداوار تو بڑھتی ہے پر ساتھ میں اجرت کے پیمانے میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن مزدوروں کی کمی اور بڑھتی اجرت کی وجہ سے گوڈی کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سے 40-60 فیصد تک پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور اس طریقے سے بڑے پیمانے پر کنٹرول کرنا بھی ناممکن ہے۔

لہذا اس صورت حال میں اخراجات کو کم کرنے اور سویا بین کی پیداوار بڑھانے کے لیے جڑی بوٹی مار دواؤں کا استعمال بہتر آپشن ہے۔ جڑی بوٹیوں پر قابو پانے کے لیے جڑی بوٹیوں کو مارنے یا ان کی نشوونما کو روکنے کے لیے اُن پر جڑی بوٹی مار دواؤں کو براہ راست ان پر چھڑکنا ضروری ہے۔ جس طرح زیادہ مقدار منفی اثر ڈالتی ہے اسی طرح جڑی بوٹی مار دوا کو درست وقت پر استعمال بھی ایک اہم پہلو ہے۔

احادیث: ☆ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (کچھ) قرآن پاک پڑھنے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! میں دوسرے آدمی سے سنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے سورۃ نساء پڑھی اور جب میں وجہنا بک علی ہولاء شہیداً پر پہنچا (فرماتے ہیں) تو میں نے آنحضرت ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے۔ ☆ حضرت مطرف اپنے والد ماجد عبداللہ بن شہیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ میں آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوا، آپ ﷺ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیاں کے جوش کی طرح رونے کی آواز آرہی تھی۔

پیاز کی کاشت اور اس کے ارغوانی جھلساؤ کا تذراک

محمد طلحہ اشرف، عبدالرحمن، نماد احسان، ڈاکٹر امجد عباس..... شعبہ پلانٹ پتھالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پیاز کا شمار قدیم ترین سبزیوں میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں پیاز کو وسیع رقبے پر کاشت کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی کاشت ہونے والی اہم ترین سبزیوں میں سے ایک ہے۔ پیاز تقریباً ہر سالن کا ایک اہم اور لازمی جزو ہے۔ اقتصادی اور طبی لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پیاز خون کی شریانوں میں جمع ہونے والی چربی کو ختم کرتا ہے اور خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسانوں کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پیاز کو مصالحہ جات کے طور پر بھی اور سالن کو ذائقہ دار اور خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید اس میں معدنی اجزاء، کیلشیم اور فاسفورس کے علاوہ وٹامن اور پروٹین پائی جاتی ہیں۔ پیاز میں معدنی نمکیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں اس کا استعمال انسان کو گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے۔

آب و ہوا

پیاز کی کاشت کے لیے معتدل اور خشک آب و ہوا موزوں ہے۔ ہوا میں زیادہ نمی پیاز کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ بوائی کے وقت سرد اور مرطوب آب و ہوا ضروری ہے۔ جب کہ فصل کے پک جانے کے لیے قدرے گرم آب و ہوا موزوں رہتی ہے۔ کچھ اقسام میں فصل کے پکنے کے لیے دن کا دورانیہ 12 سے 16 گھنٹے ہونا ضروری ہوتا ہے۔

وقت کاشت

نرسری وسط اکتوبر سے وسط نومبر میں کاشت کی جاتی ہے۔ پیاز کی نرسری پر کورے کا اثر قدرے کم ہوتا ہے لہذا پودوں کی کھیت میں منتقلی کر دی جاتی ہے۔ خزاں کی فصل یعنی اگتی فصل کے لیے نرسری جولائی کے آخر میں لگائی جاتی ہے اور ستمبر تک اس کی کھیت میں منتقلی ممکن ہو جاتی ہے۔

شرح بیج

پیاز کی فی ایکڑ کاشت کے لئے 4-3 کلوگرام بیج جب کہ اس کی نرسری کے لیے 5-4 مرلہ زمین درکار ہوتی ہے۔ باہر ڈبیچ کی صرف 1 کلوگرام مقدار کافی ہوگی کیونکہ اس پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ قدرے مہنگا ہوتا ہے۔

پیاز کی مختلف اقسام

پاکستان بھر میں پیاز کی بہت سی اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ جن میں پھلکارا پنجاب اور پھلکارا اقسام دیسی سفید، دیسی سرخ، گیزا نمبر 6، گیزا نمبر 5، ٹیکساس ارلی گرینو، وائیٹ گرینو، ہیلو گرینو، ریڈ جمبا اور سواٹ وں اچھی اقسام ہیں۔

پنجاب میں چھوٹے دنوں میں کاشت کے لیے جو اقسام با آسانی دستیاب ہیں اور جن کی پیداوار خاص حد تک زیادہ ہوتی ہے ان میں پھلکارا، پرل وائیٹ، سلطان اور نصر پوری شامل ہیں۔

ایک تجربے کے مطابق ان چاروں اقسام روئیدگی کی شرح مختلف تھی اور ان کے بیج اگاؤ کا وقت بھی مختلف تھا۔ خزاں کے موسم میں کاشت کے لیے جن اقسام کی روئیدگی اور ان کے بیج کے اگاؤ کی شرح زیادہ ثابت ہوئی ان میں نصر پوری اور سلطان سب سے اچھی کارکردگی دکھائی۔

پھلکارا کے اگاؤ کی شرح ان سے کم جبکہ پرل وائیٹ کے اگاؤ کی شرح اور اگاؤ کا وقت سب سے کم ہے۔ یعنی پرل وائیٹ کی کارکردگی سب سے کم ہے۔

پیاز کا ارغوانی جھلساؤ

پیاز کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان اس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایک پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیماری پتوں سے پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ جس

میں سب سے پہلے پتوں پر ہلکے سفید دھبے بنتے ہیں جو آہستہ آہستہ بھورے رنگ میں بدل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہلکے جامنی رنگ کے لمبوترے دھبوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ بیماری نہ صرف پتوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ پیاز کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور پیاز پر سیاہ دھبے بن جاتے ہیں۔

وجوہات

موسم میں نمی کا زیادہ ہونا بیماری کے پھیلاؤ کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فروری مارچ میں زیادہ بارشوں سے بھی اس کے پھیلاؤ کو فروغ ملتا ہے اور یہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ پھپھوندی پتوں میں مختلف اقسام کے زہر بناتی ہے جس کی وجہ سے 62 سے 90 فیصد پتے گر جاتے ہیں۔

غیر کیمیائی انسداد

- ☆ بوائی سے قبل بیج کو پھپھوند کش زہر لگا کر کاشت کریں
- ☆ نرسری کو کھیت میں منتقل کرتے وقت پودوں کی جڑوں کو پھپھوند کش محلول میں ڈبو کر لگانا چاہیے۔
- ☆ کھیت میں منتقلی کے بعد صرف دن ۷ وقت پانی دینا چاہیے تاکہ مناسب مقدار میں جذب ہو سکے اور کھیت میں زیادہ نمی نہ ہو۔
- ☆ کھیت میں موجود جڑی بوٹیاں زمین کو ڈھانپ کر رکھیں یا ان کو بروقت اکھاڑ دیں تاکہ ان کی وجہ سے کھیت میں نمی میں اضافہ نہ ہو جو کہ بیماری کے پھیلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

☆ نرسری سے صرف صحت مند پودے ہی کھیت میں منتقل کرنے چاہیے تاکہ ان میں بیماری کے خلاف مدافعت زیادہ ہو بہ نسبت کمزور پودوں کے۔

کیمیائی انسداد

شدید بارشوں میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ 5 دن کے وقفے سے درج ذیل پھپھوندی کش زہر کا ادل بدل کے حصول سے سپرے کریں۔

- ☆ آزو کسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کو نازول بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ
- ☆ آزو کسی سٹروبن پلس کلوروتھیلوبل بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ
- ☆ مینکوزب پلس سائی موکسائل بحساب 600 گرام فی ایکڑ
- ☆ میٹالاکس پلس مینکوزب بحساب 250 گرام فی ایکڑ
- ☆ میٹرام پلس پائریٹھو سٹروبن بحساب 350 گرام فی ایکڑ
- ☆ فلو مارف پلس فوسیلٹائل ایلومینیم بحساب 300 گرام فی ایکڑ
- ☆ ڈائی فینو کو نازول پلس ٹیپو کو نازول بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ

احادیث: ☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی اور کئی دن کی باسی پرانی چکنائی کی دعوت دی جاتی تو (بھی) قبول فرما لیتے۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی لیکن آپ نے وصال فرمانے تک اس کو چھوڑانے کے لئے کچھ نہ پایا (یہ فقر اختیاری کی شان تھی) ☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا (حضرت انس فرماتے ہیں پھر بھی) جب صحابہ کرام آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے۔ ☆ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں روات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ چمک دار تاروں سے زیادہ چمکیلے اور حسین ہوں گے۔ ان کے دل ایک ہوں گے۔ آپس میں بغض و حسد کا نشان نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی زوجیت میں دو حور عین ہوں گی۔ ان کی پنڈلیوں کا مغز بڑی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔

چقندر کی غذائی اہمیت اور محفوظ کاشت

ڈاکٹر فہر رسول، ڈاکٹر محمد شہباز، ڈاکٹر حسن منیر، اقراء یاسمین..... شعبہ باٹنی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

چقندر کی پیداوار اور فوائد

چقندر ایک جڑ والی سبزی ہے جسے سرخ چقندر، ٹیبل بیٹ، گارڈن بیٹ یا صرف چقندر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ضروری غذائی اجزاء فائبر، فولیٹ، (وٹامن بی 9) مینگانیز، پوٹاشیم، آئرن اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مختلف فوائد رکھتے ہیں۔

2020ء میں روس، امریکہ، جرمنی، فرانس اور ترکی دنیا کے پانچ سب سے بڑے چقندر پیدا کرنے والے ممالک تھے۔

2020ء میں عالمی سطح پر چقندر کی اوسط پیداوار 58.2 ٹن فی ایکڑ تھی۔ پاکستان میں تجارتی سطح پر چقندر صرف خیبر پختونخوا میں کاشت کیا جاتا ہے۔ 2020ء میں

چقندر کی پیداوار پاکستان میں 17383 ٹن ریکارڈ کی گئی تھی۔

چقندر کی اقسام

چقندر کی درج ذیل اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں:

1- سٹرائپ چقندر

اس قسم میں سبزی کے اندر سفید اور سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی سرخ چقندر کی ایک قسم ہے۔



2- گولڈن چقندر

اس کا رنگ سنہری یا پیلا ہوتا ہے۔ یہ سبزی کے طور پر پکانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا اور ترش ہوتا ہے۔



3- ریڈ چقندر

اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور زیادہ تر سبزی میں سلاد کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ اسے گھروں میں عام طور پر باغیچوں میں اگایا جاتا ہے۔



4- وائٹ چقندر

یہ کافی حد تک نظر آنے میں شلجم کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کا رنگ اور ساخت شلجم جیسی ہوتی ہے۔ اسے زیادہ تر چینی حاصل کرنے کے لیے کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے اور اس میں کافی مقدار میں گلوکوز اور سکروز پائی جاتی ہے۔ اسے صرف کھیتوں میں اگایا جاتا ہے۔

چقندر کی کاشت

چقندر ایک سالانہ فصل ہے۔ جو پوناشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے نشوونما کے لیے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15-18 ڈگری سینٹی گریڈ درکار ہے۔ اگرچہ چقندر ایک ٹھنڈے موسم کی فصل ہے لیکن یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کافی حد تک برداشت کر سکتی ہے۔ پودا معتدل ٹھنڈا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ اگر فصل کو سردیوں کے مہینوں میں کم درجہ حرارت کا سامنا لمبے عرصے تک کرنا پڑے تو موسم بہار میں بیج کی بولنگ (یہ اس وقت کی جاتی ہے جب ایک فصل پر وقت سے پہلے پھولوں کی ڈنٹھل آگتی ہیں اور بیج پیدا کرتی ہیں جو پودے کو بھرپور فصل برداشت کرنے سے روکتی ہے) کی جاسکتی ہے۔

چقندر کے انسانی صحت کے لیے فوائد

چقندر خاص طور پر فولیٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ فولیٹ ایک وٹامن ہے جو نشوونما اور دل کی صحت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ان میں مینگانیز کی اچھی مقدار بھی ہوتی ہے جو ہڈیوں کی تشکیل، دماغی افعال اور بہت سے صحت افزاء کاموں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں کاپر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ اعصابی افعال کے لیے ایک اہم معدنیات ہے۔

- 1- چقندر کے استعمال سے ذیابیطس اور کینسر کے خلاف مدافعتی قوت بڑھتی ہے۔
- 2- چقندر کے روزانہ استعمال سے نہ صرف گردے اور مثانے کی پتھری نکل جاتی بلکہ یہ گردے اور مثانے کے ورم دور کرنے میں بھی مؤثر ہے۔
- 3- ان میں درج ذیل وٹامنز پائے جاتے ہیں۔

وٹامنز	مقدار 100 گرام	وٹامنز	مقدار 100 گرام
کیلوریز	44 فیصد	فائبر	2 گرام
پروٹین	1-7 گرام	فولیٹ	14 فیصد
فیٹ	0-2 گرام	مینگانیز	8 فیصد

چقندر کی فصل کو لاحق ہونے والی بیماریاں

کالی جڑ کی بیماری

یہ ایک دائمی جڑ کے سڑنے کا مرحلہ ہے جو موسم کے دوران کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔

علامت

کالی جڑ کی علامات مٹی کی سطح کے قریب تنے پر سرسبی رنگ کی، پانی میں بھیگے ہوئے زخم کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ زخم وقت کے ساتھ سیاہ ہو جاتے ہیں اور انفیکشن تنوں تک پھیل سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیاہ اور دھاگے کی طرح ہو جاتے ہیں۔

وجوہات

بیماری اس وقت شروع ہوتی ہے جب مٹی گرم اور گیلی ہو جاتی ہے یہ بیماری فنجائی کا لگ جانا (ڈیمپنگ آف) کے نتیجے میں نہیں ہوتی لیکن ابھرنے کے کئی ہفتوں بعد فصل کو متاثر کر سکتی ہے۔

پتوں پر دھبے بن جانا

یہ پتوں کو لگنے والی بیماری ہے جو کناروں سے شروع ہوتی ہے اور پتوں کے ختم ہونے کا باعث بنتی ہے۔

علامت

زخم کی تشکیل ابتدائی طور پر پرانے پتوں پر نئے پتوں تک پہنچنے سے پہلے ہوتی ہے بیماری والے پتے بھورے سے جامنی رنگ کے کناروں کے ساتھ ہلکے بھورے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں شدید متاثر پتے مرجھا جاتے ہیں اور اکٹھے ہونے والے زخموں سے مر جاتے ہیں۔

وجوہات

یہ بیماری پتوں پر زیادہ نمی ہونے اور درجہ حرارت کے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے لگتی ہے۔

فولیتزرگ بند کرنا

یہ پتوں اور جڑوں کو لگنے والی بیماری ہے جس میں پتے سپرنگ کی طرح مڑ جاتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔

علامت

سب سے عام علامت ہلکی سبز یا پیلے رنگ کی پٹی ہے جو عام طور پر پرانے پتوں پر زیادہ واضح ہوتی ہے اور جڑیں علامات ظاہر کیے بغیر متاثرہ ہو سکتی ہیں یا ان میں (ریزومیٹا) کی علامات جیسی کوئی علامت ہو سکتی ہے (چھوٹے پن، تنگ جڑوں اور پھیلی ہوئی ثانوی جڑیں) یہ بیماری ریزومیٹا کے مقابلے میں متاثرہ چقندر میں زیادہ پائی جاتی ہے۔

وجوہات

یہ بیماری بہت زیادہ گرم پانی کے چھڑکاؤ اور پتوں میں زیادہ دن تک نمی رہنے، درجہ حرارت کا فصل کی برداشت سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے لگتی ہے۔

فصل میں استعمال ہونے والی کھادوں کی مفید مقدار

90 گرام نائٹروجن فی ہیکٹر، فاسفورس 100 کلوگرام فی ہیکٹر، 5 تھیلے یوریا، 4 تھیلے ڈی اے پی، 3 تھیلے ایس او پی فی ہیکٹر نائٹروجن کی صحیح مقدار کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں۔

چقندر کی کٹائی

چقندر کی کٹائی اس وقت کی جاتی ہے جب فصل مکمل طور پر تیار ہو جائے یا بازار میں بکنے کے قابل سائز تک پہنچ جائے۔ پتے پھل سے الگ کر دیئے جاتے ہیں تاکہ پھل کو کوئی نقصان نہ ہو۔ چقندر کی فصل کی کٹائی عام طور پر مئی میں کی جاتی ہے۔

احادیث: ☆ حضرت مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بیشک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ (بخاری) ☆ پھر ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے رب، اے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اسے حرام غذا کھائی جاتی ہے۔ بھلا اس کی التجا کیسے قبول کی جائے۔ (مسلم) ☆ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع فرمایا اور کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے نیز لعنت فرمائی ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، گودنے والی، گدوانے والی اور تصویر بنانے والے پر۔ (بخاری) ☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم) ☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہے اور وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہے اس کے لئے جہنم کی زیادہ مناسب ہے۔ (احمد، دارمی، بیہقی، شعب الایمان) ☆ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بنانے والے، بنوانے والے، پینے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے، پلانے والے، فروخت کرنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، خریدنے والے اور جن کیلئے خریدی جائے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

پھلوں اور سبزیوں کو سٹورج کے دوران خراب کرنے والے اہم عناصر اور ان کا تدارک

ڈاکٹر محمد انعام الرحیم، ڈاکٹر رانا محمد عادل، ڈاکٹر معظم رفیق خاں، محمد حمدان..... شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف: پھلوں کی غذائی افادیت

☆ پھل ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہیں۔ ان میں دوٹامنز (Vitamins) اور منرلز (Minerals) کی موجودگی ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ پھلوں میں زیادہ تر پائے جانے والے دوٹامنز، وٹامن - اے، ای، کے، بی گروپ اور وٹامن - سی ہوتے ہیں جبکہ کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن وغیرہ اہم منرلز ہیں لہذا پھلوں کے روزانہ استعمال کرنے والا شخص ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔

☆ پھلوں میں نمک شوگر اور چکنائی بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ کوئی سٹروئل اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔

☆ پھلوں میں بہت سے فائٹیو کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر پھلوں اور سبزیوں کو روزانہ کھایا جائے تو وہ شوگر، دل کی بیماریوں، کینسر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں۔

1- خامرے (Enzymes)

زندہ چیز میں کسی بھی عمل کو تیز کرنے والے اجزاء کو خامرے کہتے ہیں مثلاً آلو یا بیٹنگن یا سیب کو چھیلنے ہوئے بھورا رنگ ہونا خامرے کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔

تدارک (Control): کٹے ہوئے آلو، بیٹنگن یا سیب کو پانی میں رکھا جائے تو ان کا رنگ کچھ دیر تک نہیں بدلتا لیکن اگر کسی پھل یا سبزی کو سٹور کرنا ہو تو درج ذیل طریقے اپنائے جاسکتے ہیں۔

۱۔ نمکیات کا استعمال: اسکا ربک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، کیلشیم کلورائیڈ، پوٹاشیم میٹابائی سلفائیٹ۔

۲۔ بلائنچنگ (Blanching): کٹے ہوئے پھل اور سبزیوں کو اُلٹتے ہوئے پانی یا بھاپ میں 80-100 ڈگری سینٹی گریڈ تک وقت مقررہ کے لیے گرم کرنے سے خامرے ختم ہو سکتے ہیں۔

2- جراثیم (Microorganism)

الف) پھپھوندی (Mold)

یہ کئی خلیوں سے مل کر بنتی ہے۔ اس لیے نظر آ جاتی ہے۔ اس کی اکائی یعنی ایک خلیہ کو ہائپی (Hyphae) اور مجموعے کو مائسلیم (Mycelium) کہتے ہیں۔ یہ خوراک کی سطح پر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے کئی رنگوں یعنی کئی قسموں میں بدل جاتی ہے۔ اس کی پہچان اس کے رنگ یا پیدا ہونے والے پھل سے کی جاسکتی ہے۔ پھپھوندی عام طور پر ترش یا تیزابی خاصیت رکھنے والے پھل، سبزی، میٹھی چیزوں اور حیاتیات والی غذاؤں پر حملہ کرتی ہے۔

تدارک (Control)

۱۔ نمکیات کا استعمال: پوٹاشیم میٹابائی سلفائیٹ۔

۲۔ بلائنچنگ (Blanching): کٹے ہوئے پھلوں کو اُلٹتے ہوئے پانی یا بھاپ میں 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک وقت مقررہ کے لیے گرم کرنے سے پھپھوندی ختم ہو سکتی ہے۔

۳۔ پاسترائزیشن (Pasteurization): کٹے ہوئے پھلوں کے رس کو 65-88 ڈگری سینٹی گریڈ تک وقت مقررہ (ہر پھل یا سبزی کا مختلف ہوتا ہے) لیے گرم کرنے سے پھپھوندی یا زندہ بیکٹیریا ختم ہو سکتا ہے۔

ب) خمیر (Yeast)

خمیر یک خلیہ جسامت کے جاندار ہیں۔ یہ میٹھی اور ترش خوراک پر حملہ کر کے مٹھاس کو الکوحل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔

تدارک (Control): اس کے خاتمے کے لیے پاسترائزیشن (Pasteurization) کا عمل کافی ہے۔

آم کی پیداوار، بیماریاں اور ان کا تدارک

میمونہ بشیر، منعم اسحاق، ڈاکٹر امجد عباس، ڈاکٹر محمد امجد علی..... شعبہ پلانٹ پتھالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پاکستان میں پائے جانے والے آم دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آم کی ہر قسم یکساں پسند کی جاتی ہے جن میں لنگڑا، رسولی، بیگن پھلی، چونسا، سندھڑی اور انور ٹول شامل ہیں۔ کچھ قسمیں پیلے اور سرخ رنگوں کے ساتھ واضح ہوتی ہیں۔

آم کی پیداوار کے لئے خاص طور پر گرم اور خشک علاقوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے خشک یعنی بارانی علاقوں میں پودے لگانے کا کام جولائی اگست کے مہینے میں شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ آبپاشی والے علاقے جہاں بارشیں ہوں ان علاقوں میں پودے لگانے کا عمل بارشوں کے اختتام یعنی فروری مارچ میں کیا جاتا ہے۔ درخت کو پھولوں اور پھلوں کی نشوونما کے دوران اسی فیصد تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے آم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے آم کے درختوں کی کاشت سے تقریباً دس سے پندرہ دن پہلے پانی دینا بند کر دیں ورنہ درخت زیادہ آبپاشی کی وجہ سے پودے نئی شاخیں متحرک کرنے لگے گا جسکی وجہ سے پھل کا معیار خراب ہوگا۔

آم کی بیماریاں اور ان کا علاج

آم میں پیدا ہونے والی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں عام طور پر پائے جانے والی اور آم کے پودوں کو خراب کرنے والی یہ بیماریاں ہیں۔

☆ پاور ڈرپھونڈی	☆ ایتھرا کنوز	☆ واپس مرجھاؤ	☆ سرخ زنگ
☆ بیکٹیریل کینر	☆ آم کی خرابی	☆ فومبلا سٹ	

1- پاور ڈرپھونڈی

آم میں بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری پاور ڈرپھونڈی ہے جو کہ آموں کی ہر قسم کو نقصان پہنچاتی ہے اس بیماری کی علامت درج ذیل ہیں۔ پتوں پر سفید پاور ڈر نظر آتا ہے، سطحی پھپھونڈی کی نشوونما پھلوں پتوں اور ڈنڈھلوں پر نظر آتی ہے، اگر بیماری زیادہ پھیل جائے تو پھلوں کی موت کی وجہ بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں پھول بننے سے پہلے ہی گرنے لگتے ہیں۔ پھل بننے سے پہلے ہی گرنے کی وجہ سے درخت پر پھلوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے موسمیاتی تبدیلی یا بارشوں یا دھند پڑنے کی وجہ سے بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور اسکی وجہ سے پیداوار میں سنگین نوعیت تک کمی آسکتی ہے

اس بیماری سے پودوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے

فنجیسیڈ کے استعمال سے پودوں کو بچایا جاسکتا ہے لیکن کسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے اس بیماری کو روکنے کے لیے پرانے یا ثقافتی طریقوں کو اپنایا جاتا ہے۔ پودوں کی نگرانی کریں جو حصہ پودوں کا بیماری سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے اس کو کاٹ کر جلا دیں یا زمین میں دفن کر دیں۔ کیونکہ اس سے بیماری میں کمی آتی ہے شاخوں کی کٹائی ہوا کے داخلے کو بڑھاتی ہے اور نمی کو کم کرتی ہے جس سے فنگس کے زندہ رہنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے زیادہ نائٹروجن کھاد کے استعمال سے پودوں کو بچائیں تاکہ رسیلی بافتوں کی پیداوار کو بچایا جاسکے۔

2- ایتھرا کنوز

یہ آموں کے پھلوں میں پائے جانے والی سب سے زیادہ بیماری ہے جس کی وجہ سے پتوں پر دھبے آ جاتے ہیں اور پھول جھڑنے لگتے ہیں اور پودے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ آم کی سب سے زیادہ بڑی اور زیادہ پائے جانے والی بیماری ہے۔ یہ بیماری نوجوان پھلوں پر حملہ کرتی ہے جسکی وجہ سے پھل بننے سے پہلے گر جاتے ہیں اور بازار میں کم قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان پھلوں پر داغ ہوتے ہیں۔ پودوں پر ہر جگہ اس بیماری کی علامت مختلف ہوتی ہے یہ بیماری جب پھلوں اور پتوں پر حملہ آور ہوتی ہے تو ان پر دھبے نظر آتے ہیں جبکہ ٹہنیوں پر حملے کی صورت میں سیاہ نیکروٹک دھبے بن جاتے ہیں بارش کے موسم میں یہ بیماری بہت خطرناک حد تک پھیلتی ہے۔ ٹہنیوں اور

پھلوں پر حملے کی وجہ سے پھول سیاہ اور خشک ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بکھر نے لگتا ہے داغ کے نچلے حصے پر گودا سخت ہو جاتا ہے جو متاثرہ حصے ہوتے ہیں ان کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور یہ حصہ پکنے کے وقت گل سڑ جاتا ہے اور وقت سے پہلے گر جاتا ہے۔

اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ

موسم گرمائی کھاد اور پانی درخت کو بڑھنے اور صحت مندر کھنے کیلئے مفید ہے۔ متاثرہ ٹہنیوں کی کٹائی کے بعد موثر قسم کی فنگسائیڈ جیسے کہ بورڈیکس مکسچر کا چھڑکاؤ ضروری ہوتا ہے۔ اس بیماری کے آخری حد تک کنٹرول کے لئے جنوری سے جولائی کے درمیان سپرے کریں۔ کیپٹن اور زینب کا مرکب بہت موثر ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ شاخوں کی کٹائی کر دیں اور ان کو زمین میں دفن کر دیں یا جلادیں جس سے بہت حد تک بیماری کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ بعد ازاں پھلوں کے سڑنے پر پندرہ منٹ کیلئے 51 ڈگری سینٹی گریڈ گرم پانی میں پھل کا علاج بھی بہت موثر ثابت ہوتا ہے۔

3- واپس مرجھاؤ

عام طور پر یہ بیماری تنوں اور پتوں پر حملہ کرتی ہے جسکے نتیجے میں ٹہنیاں اوپر سے نیچے کی طرف خشک ہونے لگتی ہیں اور ساتھ ہی پتوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اس بیماری کے پہلے مرحلے میں درخت کی چھال کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور تنے کا رنگ گہرا ہونے لگتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں باہر کی طرف پھیلی ہوئی بڑی ٹہنیاں جڑ کی جانب سے مرجھانے لگتی ہیں حتیٰ کہ جب تک پتے متاثر نہ ہو جائیں۔ آخری مرحلے میں شاخوں پر گم آ جاتی ہے۔ شروع میں یہ چھوٹی بوندوں کی مانند ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے یہ پوری شاخوں اور تنوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ درخت کے پتے سوکھ جاتے ہیں اور گرنے لگ جاتے ہیں۔

اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے

عام طور پر متاثرہ حصوں کو سات سے دس سینٹی میٹر کاٹ کر جلادیا جاتا ہے درختوں کے زخموں کے گریز سے بیماری کے واقعات کو کسی خاص حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ آموں کے باغات میں داخلے سے پہلے جوتے، سامان اور گاڑیوں سے کیچڑ ہٹا دیں تاکہ کوئی بیماری اندر نہ جاسکے۔ بیماری کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کریں اور فنجیسیائیڈ اور بیکٹیریل سپرے استعمال کریں۔

4- سرخ زنگ

آم کے اگنے والے علاقوں میں ایک اور بیماری جس کا نام سرخ زنگ دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ بیماری بنیادی طور پر چھوٹی ٹہنیوں اور بعض اوقات پتوں پر حملہ کرتی ہے۔ جسکی وجہ سے درخت کی چھال پر سرخ رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں جن کو آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے یہ دھبے سبزی مائل بھورے رنگ کے اور ساخت میں مخملی ہوتے ہیں۔

اس بیماری سے بچنے کے لیے

آم کی پتھری کا علاج تھیرم یا کیپٹ @0.3 سے کیا جاسکتا ہے آم کے درختوں کو سرخ زنگ سے بچانے کے لیے عام طور پر کا پر آکسائیڈ 0.3 فیصد کے ساتھ 15-20 کے وقفے میں سپرے کریں۔ بیج کی بیماریوں کو بچانے کے لیے 0.3 فیصد کیپٹن کے ساتھ کھیت میں مٹی کا علاج کریں۔

5- بیکٹیریل کینکر

یہ بیماری پتوں، ٹہنیوں شاخوں اور پھلوں پر آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے زخم ناسور میں بدل جاتا ہے۔ بھیگے ہوئے پتوں کے ابھرے ہوئے گھاروں تک ہوتی ہے جس کا قطر تقریباً ایک سے چار سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے

بیکٹیریل کینکر کا خاتمہ شاخوں کو جراثیم سے پاک ہتھیار سے کٹائی کریں یا پھر سردیوں کے اختتام کا انتظار کریں اور بیکٹیریل کینکر کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کٹے ہوئے حصے کو پروٹین ٹارچ سے داغ دیں۔ اس کے علاوہ آم کی بیماری کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے سپرے کریں جس میں سٹرپٹومائکس وغیرہ شامل ہیں۔

6- آم کی بیماری

پھولوں کی اور ٹہنیوں کے اوپر اس کی آمد عام علامت ہے آم کے پھولوں کی نشوونما اور یہ بیماری دونوں ایک ساتھ دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے چھوٹی شکلوں کی ٹہنیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اس بیماری سے بچاؤ کے لیے: اس بیماری کے روک تھام کے لیے جوان کو کم اس بیماری کے پھیلاؤ کو باعث بنتا ہے اس کو روکا جائے جو کہ آم کی خرابی کی حد کو کم کرتا ہے۔ ساتھ ہی پرانے ثقافتی طریقے جیسا کہ ٹہنیوں کی کٹائی اور ان کو جلانا وغیرہ شامل ہیں۔

7- فوم بلاسٹ

یہ بیماری زیادہ تر پرانے پتوں پر پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے پتوں کا رنگ بدل جاتا ہے پتے بے قاعدہ پیلے رنگ سے بھورے میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پتے بے ترتیب ہو جاتے ہیں اور سوکھ کر گر جاتے ہیں۔

اس بیماری کے روک تھام کے لیے: اس بیماری کی وجہ سے گرنے والے پتوں کو باغ سے اکٹھا کر کے جلادیں یا اس کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ بیماری زیادہ نہ پھیل سکے اور ہر تیس دن کے وقفے کے بعد فنجیسائیڈ سپرے کریں اور اس کو کنٹرول کریں۔

پاک کوریو نیوٹریشن سنٹر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب

بقیہ:

مسٹر سوہ سنگ پیو نے کہا کہ زچہ و بچہ کی غذائی کمی بہتر بنانے کیلئے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کیلئے تندرست و توانا نوجوان نسل معاشرے کو دی جاسکے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) نے کہا کہ پاک کوریو نیوٹریشن سنٹر مجموعی طور پر 9.659 ملین ڈالرز کی خطیر لاگت سے قائم کیا جائے گا جس میں کوئی 7 ملین ڈالرز جبکہ پلاننگ کمیشن کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2.659 ملین ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرکز کے تحت خیبر پختونخواہ زرعی یونیورسٹی پشاور، بلوچستان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کوئٹہ، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، چلڈرن ہسپتال فیصل آباد، سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان بھی اس کی پارٹنر یونیورسٹیاں ہوں گی۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ ہماری آبادی کے پچاس فیصد زچہ و بچہ نیوٹریشن کی کمی شکار ہیں اور آئے دن اس میں مزید اضافے کے امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اہم ترین مسئلے کے حل کیلئے کوریو یا حکومت اور کوئٹہ کے حکام کے تعاون کے ہم شکر گزار ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح محمد نے کہا کہ غذائیت کی کمی پر قابو پانے کیلئے مشترکہ کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں تاکہ صحت کو یقینی بناتے ہوئے ترقی کا سفر طے کیا جاسکے۔ ڈین کلیہ خوراک، غذائیات و ہوم سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیکلٹی آف فوڈ نیوٹریشن اینڈ ہوم سائنسز نے موجودہ وائس چانسلر کی زیر پرستی ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹیکس کی ڈگری کا اجراء کیا جسے ملک کی متعدد جامعات میں اس کی تقلید میں رائج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں نیوٹریشن کے گریجویٹس کیلئے روزگار کے بھرپور مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں جس سے نیوٹریشن کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے ملک کو سالانہ بنیادوں پر تین فیصد جی ڈی پی میں نقصان کا سامنا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مال نیوٹریشن کے مسائل حل کرنے کیلئے پاک کوریو سنٹر کے اندر متعدد چیئرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ اس مسئلے کو سائنسی بنیادوں پر حل کیا جاسکے۔ عامر سلیمی نے کہا کہ ملک میں پشیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے زیر اہتمام 6 زونز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے پاکستان کی سب سے بڑی زرعی یونیورسٹی میں ایگری ٹیک پارک ملکی زراعت کی ترقی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ عرفان عباس نے اپنے خطاب کے دوران بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاک کوریو نیوٹریشن سنٹر کی تین منزلہ عمارت جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انرجی ایفی شنسی کے علاوہ جدید ترین لیبارٹریوں، لائبریری، وسیع کلاس رومز اور دیگر اہم ترین تہذیبی ضروریات سے مرصع ہوگی۔ ڈاکٹر بنیش سرور خاں نے نقابت کے فرائض سرانجام دیئے۔

پاکستان کے علاقائی پھل اور ان کی افادیت

آمنہ کوثر، محمد بلال شوکت، ڈاکٹر عرفان اشرف، یاسر مجید، افیفہ ایمن..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

مالٹا

یہ پھل ہمارے ہاں کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے اور اسی تناسب سے استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس کا تعلق نارنگی، سنگتڑ اور جاپانی پھل کے خاندان سے ہے۔ یہ خاندان ترشاوہ کہلاتا ہے۔ ترشاوہ پھلوں کا شمار غذائی لحاظ سے اہم پھلوں میں ہوتا ہے تاہم ہر ایک کی رنگت، خوشبو، ذائقہ اور تاثیر الگ الگ ہوتی ہے۔ تمام ترشاوہ پھلوں میں سے مالٹا رنگت، خوشبو، ذائقہ اور تاثیر کے لحاظ سے اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ مالٹے میں سٹرک ایسڈ اور وٹامن سی کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں معدنی نمکیات مثلاً کیشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور فاسفورس وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔

طبی لحاظ سے اسکے درج ذیل فوائد ہیں۔

- * بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔
- * السر سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- * گردے کی پتھری اور زہریلے مادوں کے اخراج میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔
- * کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔
- * مالٹے کا باقاعدہ استعمال صحت و توانائی کا بہترین ذریعہ ہے نیز زکام، انفلوئنزا اور خون رسنے کے رجحانات کو روکتا ہے۔
- * ریقان اور جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال سے جلد تروتازہ رہتی ہے۔

انار

انار موسم سرما کا خاص پھل ہے جو تقریباً ہر ایک کا پسندیدہ پھل ہوتا ہے۔ یہ فائبرز، پوٹاشیم، وٹامن سی اور بی-6 سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کا بلاناغہ استعمال چھاتی کے سرطان، امراض قلب، ذیابیطس، موٹاپے، جوڑوں کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ اسے صحت کا ضامن، سپر فوڈ اور جنتی پھل کہا جاتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈینٹس کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ بڑھاپے کو بھی روکتا ہے اور آپ کو زیادہ دیر تک جوان رکھتا ہے۔

ایک ریسرچ کے مطابق انار کے دانوں کا جو استعمال کرنے سے سرطانی خلیات ختم ہو جاتے ہیں جس سے چھاتی کا سرطان بڑھنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ انار دل کے لیے بہت مفید ہے کولیسٹرول کو اعتدال میں رکھتا ہے اور خون میں شامل ہونے والے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے۔ خون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور چہرے کو شاداب رکھتا ہے۔

کیلا

ذائقے اور لذت کے اعتبار سے کیلا ایشیا اور پاک و ہند کا ایک من پسند پھل ہے۔ کیلے میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور وٹامن بی-6 کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس میں فائبر اور تین اقسام کی شکر (سکروز، فrukٹوز اور گلوکوز) ہوتی ہے جو کہ فوری توانائی کا ذریعہ ہے۔ تازہ تحقیق کے مطابق دو کیلے کھانے سے 90 منٹ کی توانائی ملتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا بھر کے کھلاڑیوں کی خوراک کا اہم حصہ ہے۔

ایک تازہ تحقیق کے مطابق کیلے میں ایک پروٹین ہوتی ہے جو کہ ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے اور انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلے میں موجود وٹامن بی-6 خون میں ہیپوگلوبن کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ لندن کی جدید ریسرچ کے مطابق اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے تو روزانہ کیلا کھانے سے اس کا بلڈ پریشر اعتدال میں رہے گا۔

کیونکہ ایک کیلے میں 400 ملی گرام پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھتا ہے۔

امروہ

امروہ وٹامن اے، سی، اور کیلشیم سے بھرپور فرحت بخش اور لذت سے بھرپور پھل ہے جو کہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے والے وٹامنز اور فائبرز سے بھرپور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امروہ میں موجود اجزا خون کی روانی کو کم کرنے اور بہاؤ کو متوازن کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جس سے ہائی بلڈ پریشر سے نجات ملتی ہے۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق امروہ کھانے سے پیش، قبض اور کھانسی میں افاتے، وزن میں کمی لانے اور ہارمونز کی افراط جیسے ان گنت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

سیب

سیب ہمارے ملک کے شمالی علاقوں کا تحفہ ہے جس میں موجود پوٹاشیم اور وٹامن سی کی زائد مقدار پائی جاتی ہے جو کہ جلد کو قدرتی چمک اور نکھار دیتی ہے اور جسم پر نکلنے والے داغ دھبوں کے نشان ختم کرنے میں جادوئی اثر رکھتی ہے۔ سیب میں پائے جانے والے فائبرز معدے کی انتڑیوں میں موجود چکنائی کو ختم کے کولیسٹرول لیول کم کرتے ہے۔ امریکہ کی کینسر ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق فلیونول سے بھرپور اس پھل استعمال کرنے سے کینسر کا خطرہ تقریباً 23 فیصد کم ہوتا جاتا ہے۔ سیب کے چھلکے میں جگر اور چھاتی کے سرطان کے خلاف مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔

ناشپاتی

ناشپاتی کا تعلق سیب کے خاندان سے ہے۔ سیب کے بعد یہ سب سے معروف پھل ہے۔ مغرب میں اسے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کا یہ پھل سبز، زرد اور سرخ رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے غذائی اجزاء میں پروٹین 0-38 گرام اور کولیسٹرول کی مقدار صفر ہوتی ہے۔ یہ وٹامن اے، وٹامن سی اور وٹامن ای سے بھرپور ہے۔ اس میں کیلشیم، آئرن، منیٹشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن کے کی کثیر مقدار خون جننے سے روکتی ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔

انگور

ہمارے ہاں انگور شخ، زرد اور سرخ رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ زرعی تحقیقاتی اداروں کی محنتوں سے انگور کی ایسی اقسام تیار کی جا چکی ہیں جو کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کاشت کی جاسکتی ہیں۔ ایروما تھراپی کے لیے انگور کا تیل صدیوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وٹامن اے کا بھرپور خزانہ ہے جبکہ دیگر وٹامنز بی-6، بی-12، سی، ڈی، وٹامن ای اور کے بھی پائے جاتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق انگور کھانے والے لوگ امراض قلب اور ذیابیطس سے دور رہتے ہیں۔

احادیث: ☆ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان ہے کہ مجھ سے نبی کریمؐ نے فرمایا: مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ، میں عرض گزار ہوا کہ حضور! میں پڑھوں جبکہ قرآن مجید تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک مجھے یہ پسند ہے کہ دوسرے کی زبانی اسے سنوں۔ ☆ حضرت ابو مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جس نے دو آیتیں پڑھیں، حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھیں تو وہ اس کو کفایت کریں گی۔ ☆ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آدمیوں کے سوا اور کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور اس کے ساتھ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ ☆ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ جب بیمار ہو جاتے تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں انہیں آپ پر پڑھتی اور ان کی برکت کی امید رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ پھیرا کرتی۔ ☆ ابو بکرؓ روایت کرتے ہیں ہم لوگ رسول اللہؐ کے ہمراہ تھے تو سورج کو گرہن لگ گیا، رسول اللہؐ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا اور آپ نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں گہنائے جاتے جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گہن دور ہو جائے۔ اے لوگو! اللہ پاک ہے اور پاک کماٹی ہی قبول کرتا ہے، اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپؐ نے سورۃ مومنوں کی دو آیات تلاوت کیں۔ پھر ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے اور غبار آلود کپڑوں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آتا ہے اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یارب، یارب کہہ کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام کا، پہناوا حرام کا اور سارا جسم ہی حرام سے پلا ہوا ہے تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو۔

مشروم (کھمبی) کی غذا

ڈاکٹر ناصر احمد خاں، ڈاکٹر عمران الحق، عبداللطیف..... شعبہ پلانٹ پتھالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

مشروم کے فائدے

مشروم کی ساخت مسام دار اور گوشت کی طرح ہوتی ہے۔ مشروم ایک قدرتی فنگس ہے جو کہ ہمارے کھانوں میں الگ پہچان رکھتی ہے۔ مشروم کی زیادہ تر اقسام میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں۔ ان میں وافر مقدار میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے اور بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ مشروم کے بلاناغہ استعمال سے وزن کم اور قوت مدافعت میں مدد ملتی ہے۔ یہ گلوکوز کی سطح کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

مشروم کے کباب

اجزائے ترکیبی

پیار (کٹی ہوئی)	ایک عدد	مشروم	دو کپ
قیمہ	کلو	بریڈ کا چورا	ایک کپ
گرم مصالحہ (پسا ہوا)	ایک چائے کا چمچ	کالی مرچ	ایک چائے کا چمچ
نمک	حسب ذائقہ	ٹماٹو پیسٹ	ایک چائے کا چمچ
لہسن پیسٹ	ایک چائے کا چمچ	آئل	فرائی کے لئے

طریقہ پکوان

پیار اور مشروم کو چوپر میں گرائنڈ (پیس) کر لیں۔ پھر اس میں قیمہ، بریڈ کا چورا، گرم مصالحہ، کالی مرچ، نمک، ٹماٹو اور لہسن پیسٹ ڈال کر مکس کریں۔ آخر میں کباب بنا کر فرائی کر لیں۔ مزید ار مشروم کباب تیار ہیں۔

اجزائے ترکیبی

نوڈلز ایک پیکٹ، مشروم ایک کپ، نمک حسب ذائقہ، کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ، کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچ، لہسن دو عدد، ہری پیاز دو عدد، مکھن چار کھانے کے چمچ، 9، میدہ دو کھانے کے چمچ، دودھ دو کپ

مشروم کے نوڈلز (سویا)

طریقہ پکوان

- ☆ نوڈلز کو ابال لیں
- ☆ پتیلی میں مکھن گرم کریں
- ☆ باریک چوپ (پسا ہوا) لہسن، ہری پیاز، مشروم باریک پسی ہوئی، نمک، کالی مرچ، میدہ ڈال کر بھونیں
- ☆ سب سے پہلے اس میں دودھ ڈالیں
- ☆ دودھ گرم ہونے پر نوڈلز ڈال کر مکس کریں 6 اور گرم گرم پیش کریں

(باقی صفحہ 51 پر)

انٹرائیئم کٹ فلاور کی پیداواری ٹیکنالوجی

ڈاکٹر احسن اکرم، ڈاکٹر عدنان یونس، محمد عدیل اصغر..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پھول قدرت کا حسین و جمیل اور غیر معمولی تحفہ ہیں جو نہ صرف انسانی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ دور حاضر میں پھولوں کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ ایسے پھولوں کو فہرست بہت بڑی ہے، اور اس فہرست میں ہر روز نئے سے نئے ناموں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انہی پھولوں میں سے ایک نام انٹرائیئم ہے۔ اس کا سائنسی نام انٹرائیئم ماجس (Antirrhinum majus) ہے جبکہ اس کو انگریزی زبان میں Snapdragon بھی کہا جاتا ہے اور یہ Scrophulariaceae خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بحیرہ روم سے منسلک ممالک سے ہوتا ہوا اب دنیا کے مختلف علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ اس کے مختلف رنگوں کی ترتیب قوس قزح کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ انٹرائیئم اپنے پھول کے مختلف رنگوں، ترتیب اور اشکال کی وجہ سے بھی مشہور اور ہر دل عزیز ہے۔ یورپ، امریکہ اور شمالی افریقہ میں اس کی کئی انواع و اقسام پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر اس کے پودے کی اونچائی چند انچ سے چار فٹ تک بھی ہو سکتی ہے جو کہ اس کے استعمال اور بیج کی وراثت پر منحصر ہوتی ہے تاہم تجارتی پیمانے پر بطور تراشیدہ پھول کاشت ہونے والی تمام اقسام کا قد دو فٹ سے لمبا ہوتا ہے۔ اسکے پھولوں میں سبز رنگ کے تقریباً تمام رنگ پائے جاتے ہیں۔

انٹرائیئم کی پیداوار کھلے کھیت اور گرین ہاؤس دونوں میں کی جاتی ہے۔ گرین ہاؤس کی پیداوار زیادہ موثر ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں کیڑوں اور بیماریوں سے نقصانات کے امکانات کم ہوتے ہیں اور موسمی سختیوں سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ انٹرائیئم کے لیے زرخیز، نرم اور اچھے نکاس والی زمین جس کا زمینی تعامل چھ سے چھ اعشاریہ پانچ تک ہو۔ تیزابی یا نمکیاتی اساس والی زمین سے پرہیز کی جائے جبکہ میرا زمین سب سے بہتر تصور کی جاتی ہے۔ دن میں کم از کم چھ سے آٹھ گھنٹے دھوپ ہونی چاہیے۔ اگر گوبر کی کھاد میسر ہو تو کاشت سے چھ مہینے قبل ڈالی جائے۔

انٹرائیئم کا بیج پنجاب میں اکتوبر اور نومبر کے دوران لگایا جاتا ہے۔ گملوں میں پیری لگانے کی بجائے خلیوں والی پلاسٹک ٹرے میں زرخیز کاشت کرنی چاہیے۔ جس سے اگاؤ کی شرح فیصد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ پودے کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح زمین میں منتقل کرتے وقت بھی آسانی سے ہر پودا الگ الگ جڑوں کو نقصان پہنچائے بغیر لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے ایک حصہ بھل، ایک حصہ گنے کی پرلینڈ اور ایک حصہ ناریل کا برادہ ڈالیں۔ پھر اس میں پھپھوندی کش زہر کا سپرے کریں۔ کورا پڑنے سے 8 تا 10 ہفتے قبل بیج لازمی لگا دینا چاہیے۔ جس جگہ ٹرے رکھی جائیں اس جگہ کا درجہ حرارت 20 تا 25 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جائے۔ جبکہ ہوا میں نمی کا تنا سب 60 سے 70 فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ ٹرے کو ہوا دار جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جڑ کی اچھی نمو کے لئے استعمال کیے گئے میڈیا کو نرم رکھیں جبکہ زیادہ گھلا اور زیادہ خشک ہونے سے بچائیں۔ اس کی اقسام پوٹومیک (Potomac)، مناکو (Monaco)، شانٹیلی (Chantilly) اور میری لینڈ (Marryland) تراشیدہ پھول کے لیے بہتر اقسام ہیں۔ ان میں مختلف رنگوں کے پھول دستیاب ہیں۔ جن میں سفید، پیلا، گلابی، سرخ اور دھو رنگے پھول ہر دل عزیز ہیں۔

انٹرائیئم کو ہموار کیاریوں پہ لگایا جاتا ہے۔ پلاسٹک کی ٹرے میں لگے ہر پودے کو احتیاط سے نکال کر زمین میں لگائیں۔ زرعی یونیورسٹی میں کی گئی جدید تحقیق کے مطابق 1 فٹ فاصلے پر پودا لگانے سے تنے کا قطر، لمبائی جبکہ پھول کا سائز اور معیار بہترین ہوتا ہے۔ ہر پودے کو لگاتے وقت سیدھا رکھا جائے، مناسب گہرائی میں لگایا جائے اور کسی بھی صورت میں جڑوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

زمین کی تیاری کے دوران پتوں یا گوبر کی کھاد بحساب دو ٹرائی فی ایکڑ ڈالیں جبکہ زمین میں پودوں کی منتقلی سے پہلے 100 کلوگرام فی ایکڑ کے حساب سے ڈی اے پی یا این پی کے کھاد ڈالیں۔ بہتر نتائج کے لیے آدھی کھاد منتقلی سے قبل زمین کی تیاری کے وقت جبکہ بقیہ آدھی کھاد ایک ماہ بعد دیں۔ پھولدارتنا بننا شروع ہو جائیں تو اجزائے صغیرہ کا سپرے کریں۔ پھول بننے کے بعد کھاد پودے کے لیے مناسب نہیں۔

زرخیز کی زمین میں منتقلی کرنے کے فوراً بعد پانی لگایا جائے اور شروع کے دنوں میں ایک ہفتہ اور پھر کورے کے دنوں میں موسمی حالات کے مطابق پانی لگایا جائے۔ یہ

کافی حد تک کورے کو برداشت کر سکتا ہے۔ پودے کو اچھی نشوونما کے لیے دن میں 8 گھنٹے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پھول کو مکمل طور پر کھلنے کے لیے 10 تا 12 گھنٹے تک روشنی چاہیے۔

پودوں کی بہتر اور پھول کے سیدھا نشوونما کرنے کے لیے اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے لئے پلاسٹک کی جالی کے ذریعے تنوں کو سہارا مہیا کرنا چاہیے تاکہ پھول کھلنے کے دوران پھولوں کے وزن کی وجہ سے یا کسی آندھی وغیرہ کی وجہ سے تنے گرنے اور ٹوٹنے سے بھی محفوظ رہیں۔

جب پھول تیار ہو جائیں تو ان کے استعمال کے مطابق ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر مقامی منڈی میں بھیجنا مقصود ہو تو پھولدار تنے کے نچلے دو تاجار پھول کھلتے ہی کاٹ لیں اور اگر دور دراز منڈیوں میں ترسیل درکار ہو تو نچلے دو پھولوں کا رنگ نظر آتے ہی کاٹ لیں۔ پھولوں کو صبح یا شام کے وقت کاٹیں۔ کٹائی کے فوراً بعد شاخوں کو تازہ صاف پانی کی بالٹیوں میں رکھیں یا پھر سرد خانہ میں رکھیں۔ پھولوں کو جلد از جلد کھیت سے سایہ دار جگہ یا ٹھنڈے کمرے میں پہنچا دیں اور ان کے نچلے پتے اتار کر ڈنڈی کا نچلا ایک انچ حصہ تر چھا کاٹیں۔ تنوں کی لمبائی کے حساب سے درجہ بندی کر کے 10 یا 12 پھولوں کے گچھے بنا کر منڈیوں میں بھیجا جائے۔

تراشیدہ پھولوں کی قیمت اور اہمیت پھول کی بعد از برداشت تروتازگی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لئے اس کو ایسے محلول میں رکھنا چاہیے جس میں دو تاجار فیصد چینی اور 200 ملی گرام سرٹک ایسڈ یا سیلی سلک ایسڈ پر لیٹر کے حساب سے موجود ہو۔ زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے، کہ سیلی سلک ایسڈ کے محلول کا مناسب وقفوں کے ساتھ برداشت سے پہلے دو سے تین سپرے کرنے پر پودے کی نشوونما میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی اور بعد از برداشت تروتازگی بھی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے اور پھول 7 سے 10 دن تک تازہ اور دلکش رہ سکتا ہے۔

مشروم کی غذا

بقیہ:

مشروم پکوڑا

اجزائے ترکیبی: مشروم 150 گرام، لہسن 150 گرام، دہی، تین سے چار کپ، پیسی ہوئی کالی مرچ ایک سے دو چائے کے چمچے پیسی ہوئی سرخ مرچ ایک چائے کا چمچ، باریک کٹی ہوئی پیاز دو عدد، تیل تلنے کے لئے، لیموں ایک سے دو عدد، پسا ہوا لہسن تین جو نمک حسب ذائقہ۔

طریقہ پکوان

لہسن میں دہی نمک کالی مرچ اور سرخ مرچ ملائیں پیاز کو پیس لیں یہاں تک کہ اس کا پیسٹ بن جائے۔ دہی کے آمیزے میں لیموں کا رس پیاز کر پیسٹ پسا ہوا لہسن ملائیں اور انہیں اچھی طرح یکجان کر لیں۔ آمیزہ اس طرح کا ہو کے آسانی سے اس کی تہہ جمائی جاسکے۔ اگر زیادہ سخت ہو تو اس نے پانی شامل کر لیں۔ آمیزے کو ایک یا دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں۔ مشروم کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ فرائی پن میں تیل گرم کریں۔ ہر مشروم کے ٹکڑے پر آمیزے کی تہہ جمائیں اور اچھی طرح تل لیں۔ یہاں تک کہ سنہری ہو جائیں۔ تلنے کے بعد پکوڑوں پر لگے زائد تیل کو ٹشو پیپر سے صاف کریں۔ آپ کے مشروم پکوڑے تیار ہیں۔

مشروم کا آلیٹ

اجزائے ترکیبی: انڈے 2 عدد، پیاز ایک عدد، درمیانہ سائز، ہری مرچ دو عدد، سرخ مرچ پاؤڈر حسب ذائقہ، دھنیا پسا ہوا آدھا کھانے کا چمچ، مشروم 50 گرام

طریقہ پکوان

مشروم کو اچھی طرح دھو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ پیاز اور ہری مرچ کو بھی کاٹ لیں اور پھینٹے ہوئے انڈوں میں پیاز ہری مرچ اور مشروم شامل کر لیں اور باقی تمام مصالحہ جات شامل کر دیں اور اچھی طرح پھینٹ لیں۔ گرم کیے ہوئے تیل پر اچھی طرح پھیلا کر ڈال دیں، ایک طرف سے اچھی طرح سرخ ہونے پر دوسری طرف پلٹ دی اور صرف ہونے پر اتار لیں اور صبح کے ناشتے میں استعمال کریں۔

صوبہ پنجاب میں مویشی پال کسانوں کے بگڑتے حالات کا تحقیقی جائزہ

* ڈاکٹر محمد افتخار، ** حافظ امجد علی رانا..... * انسٹیٹیوٹ آف ایگری ایجوکیشن، ایکسٹینشن اینڈ رورل ڈویلپمنٹ، ** وزٹنگ فیکلٹی دیپالپور کیمپس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

لائسٹاک کا شعبہ پوری دنیا میں انسانی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور بہت سے وسائل محروم خاندانوں کے لیے باعزت آمدنی کا ذریعہ ہے۔ یہ شعبہ دنیا میں غذائی تحفظ کے حصول میں اپنے کردار کو برقرار رکھنے کے لیے پیداوار میں کئی گنا اضافہ چاہتا ہے۔ تاہم، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں اس کی گرتی ہوئی پیداوار کے حوالے سے بے چینی پائی جاتی ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد اپنی روزی روٹی کے لیے لائسٹاک کے شعبے پر انحصار کرتی ہے۔ لائسٹاک کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس شعبے کی پیداوار مختلف مسائل کی وجہ سے بتدریج کم ہو رہی ہے، جن پر توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مویشیوں کے خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقہ کار پر توجہ نہیں دی جاتی۔ باہمی طور پر، ایک موثر رسک مینجمنٹ حکمت عملی وضع کرنے کے لیے، خطرات کی شناخت لازمی ہے۔ جو کسانوں کو ممکنہ پیداوار تک پہنچنے میں مدد فراہم کرے۔ یہ تحقیق مویشیوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان ایک اہم ترین صوبہ پنجاب میں کی گئی تھی۔ مجموعی طور پر 400 مویشی پال کسانوں سے معلومات لی گئی تھیں۔

تحقیقاتی نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ کسان مویشیوں کی دیکھ بھال ابھی تک روایتی انداز میں کر رہے تھے۔ مویشی پالنے کے مختلف طریقوں جیسے چارہ کاٹنا، چارہ کھلانا، چارہ محفوظ کرنا، بیمار جانور کا علاج کرنا یا نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا سب کے سب گزرے وقتوں کی کہانیوں جیسا تھا، جس کی موجودہ دور میں کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ جانوروں کا علاج کرنا ہو یا ویکسین لگوانا کچھ بھی سفارشات کے مطابق نہیں اپنایا جاتا۔ ایک گائے یا بھینس کے لیے بلوغت کا اوسط وقت ممکنہ وقت سے بہت زیادہ تھا، جس کا صاف صاف مطلب جانور کا پیدائشی وقت شروع ہونے میں تاخیر اور جانور کو پالنے کے اخراجات میں اضافہ ہے۔

چیدہ چیدہ خطرات کی بات کی جائے تو، ناکافی ویٹرنری خدمات، ناقص افزائش، چارے کی کمی، قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، پیداوار کی کم قیمت، بھاری ٹیکس قانونی مسائل، خاندان میں معذوری، کام کرنے والے افراد میں تعلیم کی کمی، خریداری کی ادائیگی کرنے میں دشواری، دودھ جمع کرنے کے مراکز کی کمی اور مویشی منڈیوں کی بڑھتی ہوئی فیس ایسے خطرات تھے جن کی شناخت کلیدی طور پر اس تحقیق میں کی گئی تھی۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے، جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے باڈہ کو صاف رکھنا، کسی بھی بیماری سے نبرد آزما ہونے کے لیے ذاتی بچت کرنا، جانوروں کی اچھی دیکھ بھال کرنے کے لیے فارم پر جانوروں کی تعداد کو مختصر کرنا اور منڈیوں کے مسائل سے بچنے کے لیے فارم پر ہی جانوروں کی فروخت کا شتکاروں کی طرف سے اختیار کی جانے والی اہم حکمت عملیاں تھیں۔

ادارہ جاتی کردار کے لحاظ سے پنجاب میں محکمہ لائسٹاک کی کارکردگی مایوس کن نظر آتی ہے۔ محکمہ لائسٹاک کی طرف سے فراہم کی جانے والی مختلف فیلڈ سروسز جیسے کہ سہولت سنٹر، ہیلپ لائن اور روبو کالز کے بارے میں کسانوں کی آگاہی بہت کم تھی۔ مزید برآں، کسان جن خدمات سے آگاہ تھے وہ ان سے مطمئن بالکل نہیں تھے۔ مویشی پال کسانوں کی تعلیم میں اضافہ جانوروں کے مختلف مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتی ہے۔

اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مختلف خطرات اور ناقص ادارہ جاتی کرداروں کی وجہ سے، لائسٹاک کے شعبے سے کسانوں کی معاشی حالت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، جس کو بہتر کرنے کے لیے اس شعبے کی بحالی اور اس شعبے کی ہمہ گیر ترقی وقت حاضر کی سب سے بری ضرورت ہے۔ مویشی پالنے کو ایک منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان ہم آہنگی جس کے بعد ادارہ جاتی عمل درآمد اور تعاون کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت کو تعلیم پر توجہ دینی چاہیے لیکن ساتھ ہی کسان کی بالغ تعلیم پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کسانوں کو مویشیوں کی جدید تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ جدید خوراک، افزائش نسل اور پرورش کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی روک تھام کی حکمت عملیوں کا ازسرنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

جنگلی حیات کو درپیش خطرات

شمرہ ناز، خالد عباس، حنا امجد، تقویٰ صفدر، محمد سر فراز احمد..... شعبہ حیوانیات، جنگلی حیات و ماہی پروری، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

وطن عزیز پاکستان، ہم پر اللہ کا احسان، ایک نعمت ہے، جس کا ذرہ ذرہ سونا ہے۔ خوش گوار، معتدل موسم، بے مثال پہاڑی سلسلے، طویل بل کھاتے دریا، آبی ذخائر، جھیلیں، نہریں، آبشاریں، گھنے سایہ دار جنگلات، وسیع و عریض چراگاہیں، تھر، چولستان، خاران جیسے صحرا اور سرسبز و شاداب کھیت جس کے کُسن کو چار چاند لگاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ سرزمین ”جنگلی حیات“ جیسی قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ جنگلی حیات کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتی ہے اور اس کے تحفظ کیلئے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں جنگلی حیات کم ہوتی جا رہی ہے جسے بچانے کا کام کرنے والی این جی اوز بھی سرگرم عمل ہیں پاکستان میں جہاں معاشرتی تبدیلیاں بڑی تعداد میں انسانوں کی نقل مکانی اور ہجرت کا سبب بن رہی ہیں، وہیں قدرتی ماحول میں تغیر اور قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی دور دراز کے علاقوں سے نقل مکانی کر کے آنے والے مختلف نسلوں کے پرندوں کی آمد میں کمی کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ اس عمل میں ان پرندوں کی اپنے ماحول کے حوالے سے عمومی طور پر بہت حساس فطرت بھی اہم کردار کرتی تھی اور پاکستان، بالخصوص اسلام آباد اور راول جھیل کے علاقے میں پائے جانے والے وہ قدرتی حیاتیاتی نظام یا بائیوسسٹمز بھی جواب یا توانا پیدا ہوتے جا رہے ہیں یا اپنی پہلے جیسی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ ہم انسان کس قدر خود غرض اور سفاک ہیں کہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے والی اس بے زبان مخلوق، جنگلی جانوروں، پرندوں، اور خزندوں سے اُن گنت غذائی، ادویاتی، تفریحی اور تحقیقی ثمرات حاصل کرنے کے باوجود انہی کی جان کے درپے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری آبادی اور ضروریات بڑھ رہی ہیں، ہم جنگلی حیات کے لیے کم سے کم جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ روزی روٹی، کھیل تماشوں کی آڑ میں جنگلی حیات کی نایاب اور نادر انواع کو معدوم کرتے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں بے دریغ شکار، جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت، اسمگلنگ، شہری و صنعتی آبادیوں کی بے ہنگم وسعت پذیری، جنگلات کی بے دریغ کٹائی، زراعت میں ضرر رساں کیمیائی ادویہ کے بے جا چھڑکاؤ اور جانوروں اور پرندوں کے مساکن کی تباہی نے تباہ گُن کردار ادا کیا ہے۔ رہائش گاہ کو براہ راست تباہ کرنے سے لے کر حملہ آور انواع اور بیماری پھیلانے تک۔ زیادہ تر ماحولیاتی نظام کو متعدد خطرات کا سامنا ہے اور ہر نیا خطرہ پہلے سے کمزور ماحولیاتی نظام اور ان کی جنگلی حیات پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے۔

رہائش گاہ کا انحطاط

رہائش گاہ کا انحطاط جنگلی حیات کی بقا کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ جب ایک ماحولیاتی نظام کو انسانی سرگرمیوں جیسے کہ زراعت، تیل اور گیس کی تلاش، تجارتی ترقی، یا پانی کا رخ موڑ کر تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو ایسا نظام جنگلی حیات کو خوراک، پانی، تحفظ اور پرورش کے لیے جگہیں فراہم کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ زندہ رہنے کے لئے ہر روز ایسی جگہوں میں کمی ہو رہی ہے جنہیں جنگلی حیات اپنا گھر کہہ سکیں۔ رہائش گاہوں کو براہ راست تباہ کیا جا رہا ہے جن میں گیلی زمینوں کو بھرنا، کھیتوں کی کٹائی اور درختوں کو کاٹنا شامل ہیں۔ باقی ماندہ زمینی جنگلی حیات کا زیادہ تر مسکن سڑکوں اور تعمیرات کے ذریعے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آبی اقسام کی رہائش گاہوں کو ڈیموں اور پانی کے موڑ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ رہائش گاہ کے یہ ٹکڑے اتنے بڑے یا جڑے ہوئے نہیں ہوتے کہ وہ ساتھی اور خوراک تلاش کرنے میں جانوروں کی مدد کر سکیں۔ رہائش گاہوں کے نقصان اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے نقل مکانی کرنے والی نسلوں کے لیے اپنے ہجرت کے راستوں کے ساتھ آرام کرنے اور کھانا کھلانے کے لیے جگہیں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ علاوہ آؤں آلودگی، حملہ آور انواع اور ماحولیاتی نظام کے عمل میں خلل (جیسے ماحولیاتی نظام میں آگ کی شدت کو تبدیل کرنا) کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے رہائش گاہیں اتنی تنزلی کا شکار ہو رہی ہیں کہ وہ اب مقامی جنگلی حیات کو تحفظ فراہم نہیں کرتیں۔

موسمیاتی تبدیلی

موسمیاتی تبدیلی تیزی سے جنگلی حیات کی طویل مدتی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ اب موسمیاتی تبدیلی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سامنا صرف آنے والی نسلوں کو ہو رہا ہے۔ ہماری آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلیوں کو آج پورے سیارے میں دستاویز کیا جا رہا ہے، اور لوگ، جانور اور پودے پہلے ہی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ گرمی کا یہ سنگنل سمندر کے درجہ حرارت، مٹی کے درجہ حرارت، پکھلتے گلشیرز اور قطبی برف کے پکھلنے میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ موسمیاتی تبدیلی انسانوں کی وجہ سے ہو رہی

ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مشاہدہ کے مطابق زیادہ تر گرمی کوئلہ، تیل اور گیس کے جلنے کی وجہ سے ہے۔ یہ نتیجہ ماحولیاتی گرین ہاؤس اثر کی تفصیلی تفہیم پر مبنی ہے اور یہ کہ انسانی سرگرمیاں اسے کیسے تبدیل کر رہی ہیں۔

جنگلی حیات کی بیماری

بیماری قدرتی دنیا کا ایک عام حصہ ہے۔ زیادہ تر ماحولیاتی نظام میں وائرس، بیکٹیریا، فنگس اور طفیلی شامل ہیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ صحت مند جنگلی حیات اور ماحولیاتی نظام نے تباہ کن اثرات مرتب کرنے سے پہلے زیادہ تر بیماریوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام تیار کیا ہے۔ بہت سے تغیرات (جینیاتی تنوع اور اقسام کے تنوع) کے ساتھ ایک ماحولیاتی نظام بیماری کے اثرات کے لیے زیادہ پکدار ہوتا ہے کیونکہ اس بات کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ کچھ اقسام میں مزاحمت پیدا ہوگئی ہو، یا اگر کوئی نوع ختم ہو جائے، تو امکان ہے کہ معدوم ہونے والی نوع کی جگہ کوئی اور انواع ہو جائیں گی۔ جہاں ماحولیاتی نظام صحت مند نہیں ہیں، وہاں حیاتیاتی تنوع میں کمی اور رہائش کے نقصانات، موسمیاتی تبدیلی، آلودگی، یا حملہ آور انواع جیسے خطرات کی وجہ سے، جنگلی حیات اور ماحولیاتی نظام کو ابھرتی ہوئی بیماریوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ حملہ آور انواع کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں خاص طور پر خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ مقامی جنگلی حیات کے پاس ان کے لیے قدرتی مدافعت نہیں ہوتی۔

ویٹ لینڈز (wetlands) کا انحطاط

ویٹ لینڈز (اقتصادی طور پر دنیا کے قیمتی ماحولیاتی نظام اور عالمی آب و ہوا کے ضروری ریگولیٹرز) جنگلات کے مقابلے میں تین گنا زیادہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ویٹ لینڈز میں ہمارے سیارے کے کچھ انتہائی کاربن سے گھنے ماحولیاتی نظام شامل ہیں، جیسے نمک کی دلدل، سمندری گھاس کے علاقے اور مینگر ووز۔ ویٹ لینڈز آفات کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں، کیونکہ یہ سیلاب کو کم کرتی ہیں اور ساحلی پٹیوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ زیادہ تر نقصانات موسمیاتی تبدیلی، آبادی میں اضافہ، شہری کاری، خاص طور پر ساحلی علاقوں اور دریا کے ڈیلٹا کی وجہ سے ہوئے ہیں جنہوں نے زمین اور پانی کے استعمال اور زراعت میں تمام تبدیلیوں کو ہوا دی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت خشک حالات کا باعث بنتا ہے جو کے آبی پرندوں کی افزائش کے لیے نقصان دہ ہے۔ سطح سمندر میں اضافہ ساحلوں اور دلدل کے ڈوب جانے اور ساحلوں پر کٹاؤ کا سبب بنتا ہے جس سے پرندوں، غیر فقاری جانوروں، مچھلیوں اور دیگر ساحلی جنگلی حیات کے لیے رہائش میں کمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ اوسط درجہ حرارت اور بارش اور برف کے نمونوں میں تبدیلی کچھ حملہ آور انواع کو نئے علاقوں میں جانے میں مدد کرتی ہے جس سے جرثومے اور ان کے میزبان جو زیادہ درجہ حرارت میں پروان چڑھتے ہیں نئے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔

آلودگی

ہر روز ہماری روزمرہ کی زندگی کی ضمنی مصنوعات جیسے سیوریج، اخراج، ردی کی ٹوکری، زرعی اور پلاٹ کا اخراج، اور بہت کچھ ہوا اور پانی کے ذریعے قدرتی ماحول میں اپنا راستہ بناتے ہیں اور آلودگی بن جاتے ہیں۔ آلودگی کے بہت سے ماخذ جو کسی مخصوص ذریعہ، جیسے کہ سیوریج ٹریٹمنٹ یا صنعتی پلانٹ سے خارج ہوتے ہیں ان تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ تاہم بہت سے نان پوائنٹ ماخذ ایسے ہیں جو کہ بہت سے پھیلے ہوئے ذرائع سے آتے ہیں جو اب بھی ماحول میں باقاعدگی سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز اور غذائی اجزاء جنگلی حیات اور ماحولیاتی نظام پر تباہی چا رہے ہیں۔ سائنس ماحول میں جاری ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی کی آلودگی کی مقدار اور دنیا بھر میں سطح کے درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان براہ راست تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔

حملہ آور نسلیں

حملہ آور نسلیں مقامی جنگلی حیات کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ہیں تقریباً 42 فیصد خطرے سے دوچار اقسام کو حملہ آور انواع کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے اور یہ انواع کئی طریقوں سے جنگلی حیات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جب ایک نئی اور جارحانہ انواع کو ماحولیاتی نظام میں متعارف کرایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی قدرتی شکاری یا کنٹرول نہ ہو اور وہ تیزی سے افزائش کر کے پورے علاقے پر پھیل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مقامی جنگلی حیات نے حملہ آور نوع کے خلاف دفاع کو تیار نہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی انواع کا مقابلہ نہ کر سکیں جس کا کوئی شکاری نہ ہو۔ حملہ آور نسلوں کے براہ راست خطرات میں مقامی انواع کا شکار کرنا، خوراک یا دیگر وسائل کے لیے مقامی

نسلوں کا مقابلہ کرنا، بیماری کا باعث بننا اور مقامی نسل کے بچوں کو پیدا ہونے سے روکنا یا مارنا شامل ہیں۔

غیر قانونی شکار

ماہر حیاتیات جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کئی دہائیوں سے جنگلی حیات کے تحفظ سے حاصل کردہ فوائد کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت کی کچھ مثالیں مشہور ہیں، جیسے ہاتھی دانت کے لیے ہاتھیوں کا اور شیروں کا ان کی کھالوں اور ہڈیوں کے لیے غیر قانونی شکار۔ تاہم، سمندری کچھوؤں سے لے کر درختوں تک، بے شمار دیگر انواع کا اسی طرح استحصال کیا جاتا ہے۔ جنگلی حیات کی تمام تجارت غیر قانونی نہیں ہے۔ ہزاروں انواع کے جنگلی پودے اور جانور جنگل سے پکڑے یا کاٹے جاتے ہیں اور پھر انہیں کھانے، پالتو جانور، سجاوٹی پودوں، چمڑے، سیاحوں کے زیورات اور ادویات کے طور پر جائز طریقے سے فروخت کیا جاتا ہے۔ جنگلی حیات کی تجارت اس وقت ایک بحران کی طرف بڑھ جاتی ہے جب بڑھتا ہوا تناسب غیر قانونی اور غیر پائیدار ہوتا ہے جس سے جنگل میں بہت سی انواع کی بقا کو براہ راست خطرہ ہوتا ہے۔ جنگلی حیات کے جرائم کو ختم کرنا WWF کے لیے ایک ترجیح ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرے سے دوچار انواع کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا براہ راست خطرہ ہے۔ یہ انواع کی بقا کے خلاف مجموعی خطرات میں رہائش گاہ کی تباہی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔

جنگلات کی کٹائی

جنگلات کی کٹائی، کلیئرس، یا صاف کرنا ایک جنگل یا درختوں کے اسٹینڈ کو ہٹانا ہے جہاں اس کے بعد زمین کو غیر جنگلاتی استعمال میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی کی مثالوں میں جنگل کی زمین کو کھیتوں یا شہری استعمال میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ جنگلات کی کٹائی متعدد وجوہات کی بناء پر ہوتی ہے درختوں کو عمارت میں استعمال کرنے یا ایندھن کے طور پر فروخت کرنے کے لیے کاٹا جاتا ہے (کبھی کبھی چارکول یا لکڑی کی شکل میں)، جب کہ صاف شدہ زمین کو میویشیوں اور شجر کاری کے لیے چراگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوبارہ اگائے بغیر درختوں کو ہٹانے کے نتیجے میں رہائش گاہ کو نقصان، حیاتیاتی تنوع کا نقصان اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ جس سے ماحولیاتی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تناسب پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات کی رہائش کے براہ راست نقصان کے ساتھ ساتھ ان کے مسکن کی عمومی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ درختوں اور پودوں کی دیگر اقسام کو ہٹانے سے دستیاب خوراک، پناہ گاہ اور افزائش کی جگہ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات جنگلی حیات کی رہائش گاہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور رہائش گاہ کے یہ ٹکڑے جانوروں کی قابل عمل آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک آبادی میں رہنے والا جانور دوسری آبادی کے افراد کے ساتھ آزادانہ طور پر افزائش نسل کے قابل نہیں رہتا۔ جانوروں کو باقی رہائش گاہوں میں زندہ رہنے کے لیے مناسب پناہ گاہ، پانی اور خوراک نہیں ملتی۔ جانوروں کو اس وقت بھی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ رہائش گاہ کے ٹکڑوں کے درمیان ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ انسانی اور جنگلی حیات کے تنازعات میں اضافہ اور گاڑیوں کی زد میں آ جانا۔ رہائش گاہوں کے کم ہوتے خطرات کے ساتھ ساتھ، جنگلی حیات کا غیر قانونی شکار، ہوا، سورج کی روشنی، غیر ملکی پودوں اور جانوروں کی نسلوں کے جنگل کے باقی رہنے والے مقامات پر حملے، اور دیگر عوامل جیسے قدرتی آفات کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ اس سے پہلے اتنا خطرہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں جنگلات کی کٹائی، جنگل کی آگ جیسے خطرات کے لیے بقیہ جنگلاتی علاقے کی پک کوم کر سکتی ہے۔ مقامی پانی کے بہاؤ کا رخ (ہائیڈرولوجیکل سائیکل) تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جنگلات میں درخت اور دیگر نباتات بخارات اور بخارات کی منتقلی کے عمل کے ذریعے ماحول کی نمی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی کے بعد درختوں کی چھتری موجود نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے چکر میں اس طرح کی تبدیلیاں بہت زیادہ خشک اور گرم حالات کا باعث بن سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں جنگلی حیات کی رہائش گاہوں پر مزید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جنگلی حیات کا تحفظ صرف حکومت یا متعلقہ اداروں کی نہیں بلکہ ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے، عوام کی شمولیت اور مدد کے بغیر جنگلی حیات کے تحفظ کا کام نہیں کیا جاسکتا۔ مستقبل میں کسی بھی معاشرے میں دیرپا ترقی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہاں ماحولیات کا تحفظ کس حد تک کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ اپنے ہاں حیاتیاتی تنوع کو درپیش خطرات کا مقابلہ کتنی سنجیدگی سے کر رہا ہے۔ اس حقیقت کا اطلاق ظاہر ہے کہ پاکستان پر بھی ہوتا ہے، جہاں ابھی تک اس بارے میں اجتماعی شعور کی کمی ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>>>

فینسی مرغیوں کی انوائزمنٹ کو کنٹرول کرنے کا جدید طریقہ کار

ڈاکٹر فواد احمد، ڈاکٹر محمد شریف، ڈاکٹر محمد اشرف، ڈاکٹر احسان الحق..... انسٹیٹیوٹ آف انیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

فینسی مرغیوں کیلئے روشنی کا نظام کار



پاکستان میں فینسی مرغیاں عموماً اوپن سائڈز شیڈز میں کی جاتی ہیں۔ روشنی مرغیوں کیلئے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تولیدی نظام کی بڑھوتری اور انڈوں کی پیداوار کا انحصار روشنی کی طاقت اور مدت پر ہوتا ہے۔ پرندوں کو روزانہ تقریباً 16 سے 17 گھنٹے روشنی درکار ہوتی ہے۔ جبکہ دن کی روشنی تقریباً 10 سے 11 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ اور باقی روشنی کا دورانیہ مصنوعی روشنی سے مہیا کیا جاتا ہے۔ روزانہ قدرتی روشنی کے دورانیہ کا اندازہ لگانے اور روشنی کی کمی کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جس میں غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب روشنی کا سسٹم تیار کیا گیا جو نہ صرف یہ کہ قدرتی روشنی کے دورانیہ کا حساب رکھتا ہے بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد خود کار نظام کے تحت مصنوعی روشنی مہیا کر کے روشنی کے کل دورانیہ کو پورا کر دیتا ہے۔ جس سے پرندوں کی انڈوں میں پیداوار کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ روشنی کے اس آٹومیٹک سسٹم کو استعمال کر کے ایک ریسرچ بھی کی گئی جس میں روشنی کی اضافی سپلائی (Supplementation) کیلئے روشنی کے مختلف ذرائع کا استعمال کیا

گیا جن میں ٹیوب لائٹ، بلب اور انرجی سیور بلب شامل تھے۔ ریسرچ کے نتائج کے مطابق انرجی سیور بلب بھی لائٹ سپلمنٹیشن کیلئے استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کا خرچ بھی دوسرے ذرائع سے کم ہوتا ہے۔

درجہ حرارت ناپنے اور کنٹرول کرنے کا نظام



درجہ حرارت کا کنٹرول کسی بھی پولٹری شیڈز میں اہمیت کا حامل ہے اس سلسلہ میں شعبہ پولٹری سائنس میں ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو کہ شیڈز میں درجہ حرارت کو نہ صرف ناپتا ہے بلکہ کسی بھی ذریعہ سے مہیا کئے جانے والے درجہ حرارت میں کمی بیشی کی صورت میں الارم کے ذریعہ فارمر کو مطلع کر سکتا ہے اور درجہ حرارت چاہے گیس، بھٹی یا بجلی سے مہیا کیا جائے اسکی ریڈنگ اور کمی بیشی کی بروقت درستی میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اسکے علاوہ اس سسٹم کے ذریعہ بجلی اور گیس کے ذریعہ مہیا کی جانے والی حرارت کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ درجہ حرارت کی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا یہ سسٹم نہ صرف درجہ حرارت کی کمی کو پورا کرنے کیلئے مختلف آلات کو چلا سکتا ہے بلکہ اسکے ذریعہ سے درجہ حرارت کی زیادتی

کی صورت میں اسکے ساتھ ٹھنڈک پیدا کرنے والے آلات (Cooling devices) لگا کر شیڈ کے اندر درجہ حرارت کی زیادتی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں مثلاً اگر اس سسٹم کو ہیٹر کے ساتھ لگا دیں تو درجہ حرارت کی کمی کی صورت میں ہیٹر کو چلا کر اسے پورا کر دے گا اور اگر اس کو کولر کے ساتھ لگا دیں تو دن کے وقت جب درجہ حرارت زیادہ ہو یہ کولر کو چلا دے گا اور اگر رات کو درجہ حرارت کم ہو جائے تو یہ کولر کو بند کر دے گا۔ درجہ حرارت کی ایک خاص حد سے کمی یا زیادتی اور کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں یہ سسٹم الارم کی مدد سے فارمر کو مطلع کر دیتا ہے تاکہ مناسب کارروائی کی جاسکے۔

نمی کنٹرولر



درجہ حرارت کی طرح نمی کا بڑھ جانا بھی شیڈ میں خطرہ کا باعث ہوتا ہے ہوا کی آمد و رفت بڑھا کر کسی حد تک نمی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے اس لئے زرعی یونیورسٹی کے شعبہ پولٹری نے ایسا سسٹم تیار کیا ہے جو کہ اضافی Exhaust fan کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے اور شیڈ میں نمی بڑھ جانے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ کوئلہ سسٹم کو پانی مہیا کر نیوالی موٹر کو بند کروا دیتا ہے بلکہ شیڈ میں اضافی Exhaust fan کو چلا کر نمی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

فینسی برڈز کے انڈوں سے چوزے نکالنے والی مشین


شعبہ پولٹری میں چھوٹے پیمانے پر انکو بیٹر بھی بنالیا گیا جس میں درجہ حرارت، آب و ہوا اور ٹرننگ کا خود کار نظام لگایا گیا ہے۔ اس انکو بیٹر میں مرغی، مور، بلخ اور بیٹر کے انڈوں کو بیچ کر وایا جاسکتا ہے۔ اس انکو بیٹر کو بنانے کا مقصد خوبصورت پرندے (Fancy birds) پالنے والے حضرات کو اچھا اور سستا انکو بیٹر مہیا کرنا ہے۔ تاہم ماڈل ویج کی ڈیولپمنٹ کے دوران جب فارم حضرات کو LSB کے انڈے دیئے گئے تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ گاؤں میں کڑک مرغی کی دستیابی ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے اب چھوٹے پیمانے پر ایسے انکو بیٹر تیار کئے جارہے ہیں جو کہ اتھائی کم قیمت اور کم خرچ ہو اور گاؤں میں لوگ گھر میں انڈوں کو بیچ کر واسکیں۔ ایسے انکو بیٹر کی تیاری میں 1000 سے 3000 روپے تک کے خرچے سے 15 سے 20 انڈوں کیلئے انکو بیٹر بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم مکمل طور پر



آٹومیک انکو بیٹر جس کی گنجائش 20 انڈے ہو 3000 روپے تک بن سکتا ہے اور 100 انڈے کی گنجائش کا انکو بیٹر تقریباً 25000 روپے میں بن سکتا ہے۔ تاہم اگر اس کو کمرشل پیمانے پر بنالیا جائے تو اس قیمت میں بہت حد تک کمی کی جاسکتی ہے۔

فینسی برڈز کے چوزوں کی بروڈنگ کے لیے مشین (گیس بروڈر)

فارم حضرات باہر کے ممالک سے آٹومیک گیس بروڈر منگوا کر اپنے فارم پر لگوا رہے ہیں۔ لیکن ان کو چلانے اور خرابی کی صورت میں پرزہ جات کی فراہمی میں اکثر فارم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے کچھ فارم حضرات ان بروڈر کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تاہم زرعی یونیورسٹی میں بجلی، گیس اور لکڑی کی بروڈنگ پر ریسرچ کی گئی جس کے نتائج کے مطابق لکڑی کی




بروڈنگ میں اخراجات گیس سے کم ہیں لیکن لکڑی یا برادہ کی بروڈنگ سے چوزے کی صحت متاثر ہوتی ہے اور چوزے عام طور پر سانس کی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔

جبکہ اثر پیداوار میں کمی یا پرندوں میں ماحولیاتی دباؤ (Stress) اور قوت مدافعت (Immunity) میں کمی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ پولٹری سائنس میں گیس بروڈر بنایا گیا ہے جو کہ نہ صرف چلانے میں آسان ہے بلکہ اسکو استعمال کرنے سے پیداواری لاگت میں بھی کمی کی جاسکتی ہے۔ شعبہ پولٹری سائنس میں خود کار گیس بروڈر بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ اس گیس بروڈر کو جدید الیکٹرانک نظام سے منسلک کر کے اس کو چلانا آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب فارم حضرات صرف ایک بٹن سے بروڈر کو چلا سکتے ہیں۔ اس بروڈر میں لگائے گئے تمام آلات بھی ملک میں آسانی سے دستیاب ہیں۔

فینسی برڈز کی چوری کورونے کے لیے سیکورٹی سسٹم

پولٹری فارمر پرانڈوں اور مرغیوں کی چوری کورونے اور سیکورٹی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے جدید سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم شیڈ کے تمام حالات کی ریکارڈنگ کرتا ہے اور فارمر کیلئے 15 دن سے لیکر 3 ماہ تک اس کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ اسکے علاوہ غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی صورت اور فارمر کی جالیوں کو کاٹنے پر آ لارم بجا کر اور یا فارمر کے موبائل فون پر آڈائلنگ کر کے مطلع بھی کرتا ہے۔

ریموٹ فارم مینجمنٹ سسٹم



یہ سسٹم فینسی برڈز، لائیو شاک اور زراعت کے کسانوں اور فارم مینجرز کے لئے مفید ہے۔ اس سسٹم کی مدد سے ہم فارم کی نگرانی اور کنٹرول گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اس سسٹم کو اگر ویب اور اینڈرائیڈ فون ایپلی کیشنز کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ایک وقت میں بہت سے فارموں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

ریموٹ فارم مینجمنٹ سسٹم کی مدد سے ہم گھر بیٹھے کر فارم کے درج ذیل نظاموں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے فینسی برڈز پالنے والے ملک میں کسی بھی جگہ سے اپنے پرندوں کے مناسب درجہ حرارت، نمی، روشنی، پانی اور خوراک کا کنٹرول کر سکتے ہیں۔

- 0 درجہ حرارت
- 0 نمی
- 0 وینٹیلیشن
- 0 روشنی
- 0 خوراک کا نظام
- 0 اور پانی کا نظام

یہ سسٹم کسی بھی نظام میں تبدیلی کو ایس ایم ایس، ویب اور اینڈرائیڈ فون ایپلی کیشنز کی درخواست کے ذریعے انتخاب اور یاد دہانی کروانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ فارموں کو بھی براہ راست نشریات کے ذریعے منایا جا رہا ہے۔

احادیث: ☆ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا اور ستایا گیا جتنا کسی دوسرے کو نہیں ڈرایا اور ستایا گیا اور بے شک مجھ پر (ایک دفعہ) تیس دن اور رات ایسے بھی گزرے کہ میرے اور حضرت بلالؓ کے پاس کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھائے، صرف اتنی چیز جو حضرت بلالؓ کی بغل میں آجائے (یعنی تھوڑی سی چیز) ☆ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے کھانے میں صبح یا شام کبھی بھی روٹی اور گوشت جمع نہیں ہوتے۔ ☆ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہؓ، امیر المومنین حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر والے اور میری اولاد (اس پر) خاتون جنت نے فرمایا (تو پھر) میں اپنے والد ماجد کی وارث کیوں نہیں ہوں؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہو سکتا (یعنی نبی کا وارث نہیں ہوتا) پھر حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا میں اس کی خبر گیری کرتا رہوں گا جس کی خبر گیری آنحضرت ﷺ کرتے رہے اور جس پر آنحضرت ﷺ خرچ فرماتے رہے میں بھی خرچ کرتا رہوں گا۔

زمینی کلر کی پہچان بذریعہ ریموٹ سینسنگ

محمد یضال، ڈاکٹر حماد رضا احمد، ڈاکٹر محمد عامر مقصود..... شعبہ انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ریموٹ سینسنگ کی اصطلاح دو لاطینی الفاظ سے ماخوذ ہے۔ REMOTUS جس کا مطلب ہے دور (وقت یا جگہ میں دور) اور SENSUS کا مطلب ہے پانچ حواس کے استعمال سے محرکات کا پتہ لگانا۔ ریموٹ سینسنگ (REMOTE SENSING) سے مراد مشاہدے کے ساتھ کسی چیز / خصوصیت / رجحان کا پتہ لگانا ہے بغیر اس کو جسمانی طور پر چھوئے۔ ابتدائی مراحل میں اصطلاح ریموٹ سینسنگ فوٹو گرافی کے مختلف اجزاء یعنی کیمرہ، مختلف قسم کی فلمیں، فلم پروسیسنگ، فوٹو گرامیٹری اور پرنٹنگ سسٹم کی ترقی تک محدود تھی۔ 1960ء کی دہائی کے اوائل میں بہت سے نئی اقسام کے ریموٹ سینسنگ کے آلات متعارف کروائے جا رہے تھے۔ جو انسانی وژن (VISIBLE SPECTRUM) اور فوٹو گرافی کی رینج سے کہیں زیادہ برقی تابکاری کا پتہ لگا سکتے تھے۔ اسی عرصے کے دوران کئی قدرتی وسائل کے سائنسدان معمول کی بنیاد پر زمین کے گرد چکر لگانے والے سیٹلائٹس کو استعمال کر کے زمین کے مشاہدات کر رہے تھے۔ سیٹلائٹس پر مختلف قسم کے سنسر لگے ہوتے ہیں، زمین سے منعکس ہونے والی برقی مقناطیسی تابکاری کو پکڑتے ہیں۔ دنیا کے آبپاشی والے علاقوں میں خاص طور پر خشک اور نیم خشک علاقوں میں زمینی کلر کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ زمینی کلر نہ صرف پودوں کی نشوونما، زمین کی صحت بلکہ پانی کے معیار کو بھی خراب کرتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال ایک سے دو فیصد زمینیں کلر کی وجہ سے بخر ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آبادی کے مسلسل اضافے کی وجہ سے مستقبل میں قابل کاشت رقبہ بڑھانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ کلرز زہینوں کی روایتی نقشہ سازی کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے، خاص طور پر اُن بڑے بڑے علاقوں میں جہاں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کام کے لیے کافی مقدار میں زمین کے نمونے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے تجزیوں پر بہت لاگت آتی ہے۔

ریموٹ سینسنگ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں زمین کی سطح سے منعکس ہونے والی سورج کی شعاعوں کا تجزیہ کر کے زمین پر موجود مختلف اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ امریکہ نے خلا میں کافی سارے سیٹلائٹ بھیجے ہیں جو کہ زمین سے منعکس ہونے والی سورج کی شعاعوں کو پکڑتے ہیں، اور اس کی مدد سے ایک تصویر بناتے ہیں۔ اُس تصویر کو زمین پر موجود کنٹرول اسٹیشن کو بھیجا جاتا ہے۔ انہی سیٹلائٹس میں سے ایک کا نام LANDSAT 9 ہے۔ جس کا ڈیٹا <https://earthexplorer.usgs.gov/> لنک سے کوئی بھی حاصل کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ اس تصویر سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرام کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ جس کا نام ArcGIS ہے۔ یہ پروگرام ایک امریکی کمپنی کی طرف سے بنایا گیا ہے، جس کا نام ESRI ہے۔

سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصویر کو ArcGIS پروگرام میں کھولا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں موجود ایک تجزیہ، جس کا نام راسٹر کیلکولیٹر ہے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ سے جو تصویر حاصل کی جاتی ہے وہ گیارہ حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر حصہ ایک مخصوص معلومات رکھتا ہے اور ضرورت کے مطابق ان حصوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ سیٹلائٹ کی تصویر اُسی دن کی حاصل کی جائے جس دن زمین کے نمونے لیے جائیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کلرز زہینوں کے نمونے دسمبر کے مہینے میں حاصل کیے جائیں۔ اس مہینے میں نمکیات زمین کی سطح پر نظر آتے ہیں۔ زمین کی اوپر والی سطح پر موجود نمکیات کی زیادتی کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف اعشاریہ جات استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں: SAVI, MSR, MSI, SI 1, SI 2, SI 3, SI 4، جبکہ پودوں کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے NDVI کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام تجزیوں کو کرنے کے لیے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر کے تمام حصوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پودوں کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے NDVI کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں تصویر کا چوتھا اور پانچواں حصہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ہمیں تجزیے کے آخر میں ایک تصویر بنا کر دیتا ہے اور ساتھ کچھ نمبری معلومات فراہم کرتا ہے۔ زمین سے لیے گئے نمونوں کے تجزیے کیے جاتے ہیں اور پروگرام کے دیئے گئے نتیجوں کا زمینی نمونوں کے تجزیوں کے نتیجوں کے ساتھ باہمی تعلق نکالا جاتا ہے۔ یہ تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پروگرام کا دیا گیا نتیجہ اتنا ہی زیادہ درست ہوتا ہے۔

شہد کی کھیاں، ان کی اقسام اور دشمن کیڑے

ڈاکٹر بلال سعید خان، پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد، محمد تو صف سعید..... شعبہ ایگری انٹومالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

پاکستان کو رب کائنات نے جہاں اور بہت سی قدرتی وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے وہاں اس نے یہ خصوصیات بھی رکھی ہے کہ یہاں شہد کی کھیاں جیسی انمول مخلوق کی پرورش اور افزائش کے لیے بیشتر علاقوں میں ماحول اور آب و ہوا کو سازگار بنایا ہے۔ خانہ قدیم سے لوگ شہد کی کھیاں اور ان کی سخت شاقہ کے شر سے واقف ہیں۔ قرآن پاک میں شہد کی مکھی کو ”نحل“ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ شہد کے فوائد کا تذکرہ الہامی اور طبی کتب میں بکثرت موجود ہے۔ اسی وجہ سے شہد کو قرآن مجید میں انسانوں کے لیے شفاء قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نحل میں آیات کی صورت میں شہد کی کھیاں کے بارے میں فرمایا ہے کہ

ترجمہ

”اور تمہارے پروردگار نے شہد کی کھیاں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں a میں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلے جا، اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی ایک نکلتی ہے، شہد۔ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے (کئی امراض کی) لیے شفاء ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں“

برسوں سے انسان مفید کیڑے کی مشقت بخش صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ شہد کی کھیاں پالنے کے فن کو گس بانی کہتے ہیں۔ اس کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ہم اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ قومی آمدنی میں اضافہ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ شہد کی کھیاں پالنے کی روایت بہت پرانی ہے۔ ہمارے کسان جہاں فصلوں اور باغات کی کاشت کے حوالے سے ایسا جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں وہاں گس بانی جیسی مفید اور اہم صنعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ پرانے طریقوں سے ہٹ کر اسے جدید طریقوں پر استوار کیا جائے۔ اس سے نہ صرف کھیاں کی پرورش میں سہولت ہوتی ہے بلکہ شہد کی مجموعی پیداوار میں کہیں گنا اضافہ بھی ممکن ہے۔

شہد کی افادیت

شہد کی کھیاں بنی نوا انسان کی طرح سے خدمت کرتی ہیں۔ مغربی ممالک میں گزشتہ 70 سال سے شہد کی حیاتیاتی خصوصیات کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا ہے کہ شہد میں چند نظام اینٹی بائیوٹک سرگرمیوں کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن حکیم میں اس مرکب کو واضح طور پر شفاء الناس کہا گیا ہے۔ شہد میں موجود چند نظام جن میں انجائین، تیزابیت اور ولوجی دباؤ بہت اہم ہے، یہ تینوں نظام حملہ آور جراثیم کے وجود اور افزائش کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسانی جسم کی ساخت میں جتنے بھی کیمیائی مرکبات استعمال ہوتے ہیں یا انسانی ضرورت میں شامل ہیں ان میں سے ہر عنصر شہد میں موجود پایا گیا ہے۔ دنیا میں شہرت وہ واحد مرکب ہے جس میں ہر قسم کے وٹامنز موجود ہیں۔ یاد رہے کہ شہد میں موجود عناصر فعل، موسم، علاقہ کے مطابق تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں جو علاقائی اور موسمی صورتوں کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ شہد کی عام پی ایچ دو، تین سے چار، پانچ تک ہے۔ اتنے اونچے درجے کی تیزابیت اکیلے ہی بہت سے ضرر رساں اور متعدی جراثیم کی افزائش کو روک دیتی ہے۔ حکماء کے مطابق ذیابیطس کے مریضوں کو مٹھاس کی ممانعت ہوتی ہے۔ شہد میٹھا ہے مگر اس کے باوجود بعض حکماء کے مطابق شوگر کی بیماری میں مضرت نہیں۔ شہد کو بہت سے مشروبات میں میٹھے کے متبادل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد جسم سے غلیظ مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرنے اور دماغ کے خلیوں کی افزائش کے لیے بھی بہت مفید ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا اصول علاج یہ تھا کہ آپ اکثر ادویات کو کسی ملاوٹ کے بغیر نہ مانہ دینا پسند فرماتے تھے جبکہ وہ خود بھی نماز فجر یا عصر کے بعد شہد نوش فرماتے تھے۔ جگر اور پتہ کی خرابیاں اور وائرس کی وجہ سے سوزش ریقان کا باعث ہوتے ہیں مگر شہد کا استعمال بیماریوں کے خلاف بہت کارآمد ثابت ہوا ہے مزید برآں شہد کا استعمال گردوں کی بیماری، پیٹ خراب، غذا میں پائے جانے والے نمکیات کی شدت کے برے اثرات یا پانی کی کمی کے مضر صحت اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔

جسم میں وٹامن کی مسلسل کمی پیشاب کی نالی میں پیدا ہونے والی بیماریوں اور پتھری کی وجہ ہوتی ہے جبکہ گردوں میں سوزش کا بھی باعث بنتی ہیں۔ ان کے خامرہ پھیل جاتا ہے۔ یہ پھیلاؤ گردوں سے پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ پتھری یا سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق مختلف صورتوں میں شہد دیگر اشیاء کے ساتھ ملا کر دینے سے گردوں کی اکثر و بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب کہ بڑھاپے میں تین اہم مسائل جسمانی کمزوری، بلغم اور جوڑوں کا درد اتفاق سے شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اگر زیتون کے تیل میں شہد ملایا جائے اور پھر اس میں لیموں کا عرق ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے گردے کی پتھری کا زائل کیا جاسکتا ہے۔ شہد گرم پانی میں ملا کر اس میں لیموں کاٹ کے نیچڑ کر پی لیں تو زکام کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔

طب نبوی ﷺ اور جدید تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں شہد کا کوئی نعم البدل اور افادیت میں ثانی نہیں لہذا شہد نہ صرف خوبیوں میں بے مثل ہے بلکہ افادیت میں بھی بے مثال ہے۔ شہد کے علاوہ یہ کھیاں خالص موم پیدا کرتی ہیں جو آرائش و زیبائش کی مصنوعات، بجلی کے اوزاروں اور ان گنت دوسرے کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کا دودھ جو دایا کارکن مکھیوں کے حال کی غددوں سے نکلتا ہے۔ ان بچوں کو پلایا جاتا ہے جو بڑے ہو کر ملک بنیں گے۔ یہی شہد کی مکھی کا دودھ انسانوں میں عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر سکتا ہے اور بڑھاپے کے خلاف ایک بہترین ٹانک ہے۔ شہد کی مکھی کا جمع کردہ زرگل معدنیاتی اثرات کا حامل ہے۔ ہماری معیشت میں شہد کی مکھی کا کردار اور بھی نمایاں ہے اس لیے کہ یہ رس گل اور زرگل حاصل کرتے وقت پودوں کی زرگل ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچا دیتی ہے۔ اس عمل سے یہ پھولوں کے زراور مادہ حصوں کے درمیان ملاپ کا ذریعہ بنتی ہیں جس کی وجہ سے پیداوار میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کا جمع کردہ شریف جراثیم کش کا ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ڈنگ انسان کے ریح کے درد اور جوڑوں کی سوجن کا موثر ترین علاج ہے۔ سب سے بڑھ کر شہد کی کھیاں عمل زیرگی کے ذریعے ہمارے پھل دار درختوں، مختلف فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان سے بنی نوع انسان کو پہنچنے والا یہ فائدہ ان سے حاصل کردہ شہد کی پیداوار سے 14 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ شہد شاید دنیا کی وہ واحد کی غذا ہے جسے اگر کئی سال بھی پڑا رہنے دیا جائے تو یہ خراب نہیں ہوتا۔

شہد کی مکھیوں کی اقسام

1- ڈومنا مکھی 2- چھوٹی مکھی 3- پہاڑی مکھی 4- یورپی مکھی

درج بالا اقسام میں ماسوائے پہاڑی اور یورپی مکھی اول الذکر دونوں اقسام غیر پالتویں۔

1- ڈومنا مکھی (Apis dorsata)

شہد کی مکھیوں کی یہ قسم پانی کے ٹینکوں، درختوں کے اونچے تنوں وغیرہ پر کھرا اور لمبوتر اچھتہ بناتی ہے۔ یہ مکھی نہایت تند مزاج اور خانہ بدوش ہے۔ گھلی فضا میں چھتہ بناتی ہے اور بند جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اگرچہ اس سے شہد کی پیداوار بہت زیادہ ہے لیکن جدید طرز کے مصنوعی گھروں میں اس کی پرورش ناممکن ہے۔

2- چھوٹی مکھی (Apis floreal)

شہد کی مکھی کی دوسری قسم یعنی چھوٹی مکھی اپنا چھتہ جھاڑیوں، باڑوں، انگور کی بیلوں اور کپاس کی چھڑیوں وغیرہ میں اکہرا چھتہ بناتی ہے۔ اس سے زیادہ دو تا اڑھائی کلوگرام شہد حاصل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ مکھیوں کی قسم نہایت شریف ہے لیکن فضا میں رہنے، اکثر نقل مکانی کرتے رہنے کی وجہ سے مصنوعی گھروں میں نہیں پالی جاسکتی۔

3- پہاڑی مکھی (Apis ceranal)

شہد کی مکھیوں کی یہ قسم ہمارے ملک کے پہاڑی علاقوں میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقے کے لوگ انہیں اپنے گھروں کی دیواروں میں بنائے گئے مخصوص رخنوں میں پالتے ہیں۔ مکھیوں کی یہ قسم عجباً شریف، محنتی اور جگہ کے مطابق متوازن چھتہ بناتی ہے۔ یہ مکھی اپنے مخصوص عادات کے سبب لکڑی کے بنائے مخصوص گھروں میں پالنے کے لیے موزوں ہے اور اسے ہم پالتو مکھی کہہ سکتے ہیں۔ قدرتی طور پر اس کی اوسط پیداوار چار سے پانچ کلوگرام سالانہ ہے لیکن جدید طریقوں کے مطابق پرورش کرنے سے اس کی اوسط پیداوار 15 کلوگرام تک ہو سکتی ہے۔

4- یورپی مکھی (Apis mellifera)

زمانہ قدیم سے یہ قسم یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں وسیع تجارتی بنیادوں پر پالی جاتی ہے اور اس کی نسلیں ترقی یافتہ علاقوں میں جدید سائنسی طریقوں کے مطابق زیر پرورش ہیں۔ یہ مکھی رہن سہن اور عادات میں پہاڑی مکھی سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں مکھیوں کی یہ قسم گزشتہ کئی سالوں کی مسلسل کاوشوں اور تحقیق کے سبب ہمارے ہاں کے موسمی حالات سے بخوبی ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ پنجاب کے میدانی اور دامن کوہ کے علاقوں میں اس کی افزائش کے نتائج نہایت حوصلہ افزا ہیں لیکن پہاڑی علاقوں میں سخت سردی اور خوراک کی کمی اس کی بہتر افزائش کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جدید سائنسی طریقوں کے مطابق ہمارے موسمی حالات میں اس کی پیداوار اوسطاً 20 سے 25 کلوگرام یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔

شہد کی مکھیوں کا خاندان

شہد کی مکھی کو ایک سماجی کیڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکھیاں ایک گھرانے کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے خاندان میں تین قسم کے اراکین موجود ہوتے ہیں۔ جن کے جسم کی ظاہری شکل و شبابہت اور ساخت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس فرق سے ان کی شناخت عین ممکن ہے۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں سب سے اہم ملکہ ہوتی ہے اور اس کی تعداد عموماً ایک ہوتی ہے۔ یہ ملکہ مکھی دوسری مکھیوں کی نسبت لمبائی میں کچھ زیادہ لمبی اور چمک دار ہوتی ہے۔ اس ملکہ مکھی کے پیٹ کے آخر میں ایک ڈنگ موجود ہوتا ہے۔ جس سے وہ دوسری مکھیوں کو ملکہ بننے سے روکتی ہے۔ اوسطاً ملکہ مکھی کی عمر تین سال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد صرف انڈے دینا ہے۔ بہترین موسمی حالات اور خوراک کی وافر مقدار کی موجودگی میں ملکہ مکھی ایک دن میں بارہ سو سے چودہ سو تک انڈے دے سکتی ہے لیکن شدید سردی اور گرمی کے موسم میں ملکہ مکھی انڈے نہیں دیتی۔ عموماً ملکہ مکھی دو طرح کے انڈے دیتی ہے جن سے مادہ کارکن مکھیاں اور نکھٹو پیدا ہوتے ہیں۔ نکھٹو جنر کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی تعداد ایک چھتے میں بیس ہزار سے 55 سو تک ہو سکتی ہے۔ یہ مکھیاں دوسری مکھیوں کی نسبت موٹی اور سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کے پیٹ کے سرے پر بالوں کی جھالر ہوتی ہے۔ نکھٹو مکھیوں کو مادہ کارکن مکھیاں خوراک مہیا کرتی ہیں۔ ان نکھیوں کا مقصد صرف ملکہ سے ملاپ کرنا ہے۔ جہاں تک مادہ مکھیوں کا تعلق ہے جنہیں عموماً کارکن کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد ایک چھتے میں پندرہ ہزار سے 22 ہزار تک ہوتی ہے۔ ان کے فرائض میں چھتے کی صفائی، حفاظت اور شہد بنانے کا عمل شامل ہے۔ یہ مکھیاں دور دراز کے علاقوں سے پولن اور نیکٹر اکٹھا کرتی ہیں۔

شہد کی مکھیوں کے دشمن کیڑے: درج ذیل کیڑے شہد کی مکھیوں کے بدترین دشمن ہیں۔

ڈیموں (Hornets): ڈیموں کی درج ذیل دو اقسام چھتوں اور پھولوں پر کام کرتی ہوئی مکھیوں پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ان کو کھا جاتی ہیں۔ یہ ایک گوشت خور کیڑا ہے۔

میدانی ڈیموں (Vespa orientalis): ڈیموں کی یہ قسم میدانی علاقوں میں عام پائی جاتی ہے۔ اس کے پیٹ پر زرد دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کا چھتہ ویران مکانوں کی دیواروں وغیرہ پر ملتا ہے۔

پہاڑی یا کالی ڈیموں (Vespa velutinal): یہ قسم پہاڑی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ ان کے مضبوط قلعہ نما گھونسلے درختوں کے تنوں اور مکانوں کی چھتوں کے ساتھ گھاس بھوس اور مٹی وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ بھورا ہوتا ہے اور یہ بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔

تدارک

ان کے چھتے ختم کرنے کے لیے زہریلی ادویات کا سپرے اور آگ جلانا مفید رہتا ہے۔ ان کے چھتوں کو (جود یواروں میں ہوں) ڈیشیا یا فاسٹاکسن کی دھونی دے کر سوراخ بند کر دیں۔ مکھیوں کے بکس پر حملہ آور ڈیموں کو لکڑی کی چھٹی یا بیڈمنٹن کی ریکٹ سے مارنا چاہیے۔

چیونٹیاں (Ants): چیونٹیاں شہد کی مکھیوں کے بچے اور پولن کھاتی ہیں۔ یہ مکھیوں کو کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں مکھیاں تنگ آ کر بھاگ جاتی ہیں۔

تدارک

مکھیوں کے بکس کے پاؤں کے نیچے پانی والے پیالے رکھنے اور روزانہ ان میں پانی بھرنے سے ان کے حملہ کو روکا جاسکتا ہے۔

موم خور کیڑا (Wax moth): اس کیڑے کی سنڈیاں مومی چھتے میں ریشمی سرنگیں بنا کر اسے ضائع کر دیتی ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں موم کا چھتہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور کھیاں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔

تدارک

اس کے تدارک کے لیے سنڈیوں کے بنے ہوئے جالے اور سنڈیاں تلف کر دینی چاہیے۔ بکس کے پینڈے کو گاہے بگاہے صاف کرتے رہنا چاہیے۔ مکھیوں کے داخلی راستے کو تنگ کر دیں اور بکس کے دیگر سوراخ فلم اندرون حرم سوراخ بند کر دیں۔ سنور میں جمع شدہ دیکھتے رہنا چاہیے اور انہیں ڈیشیا فاسٹاکسن کی دھونی ہر پندرہ دن بعد دینی چاہیے۔ مکھیوں کی مائٹس: شہد کی مکھیوں پر تین قسم کی مائٹس حملہ آور ہوتی ہیں۔

اکیرا مین مائٹس (Acarine mites)

یہ مائٹ شہد کی مکھیوں میں ”اکیر پوسس“ کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ یہ مائٹ سانس کی نالیوں کے راستے داخل ہو کر اسے چھید دیتی ہیں۔ مادہ مائٹ سانس کی نالیوں کی دیواروں کو چیر کر اس سے خون چوستی ہے۔ ملکہ کا رکن اور کھٹو کھیاں یکساں طور پر اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اس بیماری کی دو علامات ہیں ایک تو کھیاں زیادہ تعداد میں بکس کے ارد گرد پھرتی ہیں، دوسری علامت یہ ہے کہ مکھیوں کے پر خلاف معمول ہموار حالت میں نہیں رہتے بلکہ ایک ہک سی بناتے ہیں۔

تدارک

میتھائل سیلی سیلیٹ میں بگھویا ہوا روئی کا ٹکڑا متاثرہ مکھیوں کے گھر میں ڈبیہ میں رکھ دیں اور ڈھکنے میں باریک سوراخ کر دیں تاکہ مہک مائٹس تک پہنچ کر ان کو ہلاک کر دے ست پودینہ کی چند قلمیں ملل کے کپڑے میں باندھ کر بکس میں فریموں کے درمیان رکھنے رکھ دیں۔ جب ان قلموں سے خوشبو بند ہو جائے تو مزید قلمیں بکس میں پوٹلی بنا کر رکھ دیں۔

وروو آمائٹس (Varroa mites)

وروو آمائٹ شہد کی مکھیوں میں ”وروو آسس“ کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ یہ مائٹ شہد کی یورپی مکھی اور پہاڑی مکھی دونوں اقسام پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ یہ بالغ مکھیوں کو یوں اور سنڈیوں کا خون چوستی ہے۔ شدید حملہ کی صورت میں مکھیوں کی سنڈیاں اور کوئے مرجاتے ہیں جبکہ بالغ کھیاں بہت کم عمر پاتی ہیں جس کی وجہ سے مکھیوں کے گھر میں کارکن مکھیوں کی تعداد کافی کم ہو جاتی ہے اور گھر کمزور ہو جاتا ہے۔ بالغ مائٹ کارنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور یہ بہت سست رفتار سے چلتی ہے اور آسانی سے پکڑی جاسکتی ہے۔

تدارک

اس کے تدارک کے لیے فارمک ایسڈ کے محلول سے دھواں دیں۔ مائٹس، پینڈے کے تختے پر گر پڑیں گی۔ بیمار مکھیوں کو بکس سے باہر نکال دیں اور مکمل صحت یاب ہونے تک واپس نہ لادیں۔ بکس کو صاف رکھیں۔ فلووالینٹ ایک پٹی فی کالونی شہد کی مکھیوں میں مائٹس کے خلاف انتہائی موثر ہے۔ اس مائٹ کے تدارک کے لیے فینوتھانیزین کا 90 فیصد محلول تیار کر لیں اور ایک کارڈ بورڈ پر مکمل طور پر مل کر اسے بکس پر چپکا دیں اور بیمار گھر کے پینڈے سے تبدیل کر دیں۔ یہ خیال رہے کہ کارڈ بورڈ سے محلول خشک ہو گیا ہو ورنہ مائٹ کے ساتھ کھیاں بھی مرجائیں گی۔ سموکر میں ایندھن کے ساتھ تھوڑی سی فینوتھانیزین ڈال کر بکس میں دھواں دیں۔ جس کے زہر سے مائٹس نیچے گر کر مرجائیں گی۔ نچلے پینڈے پر سے گرے ہوئے مردہ مائٹس کو باہر نکال کر کسی جگہ دبا دیں۔

ٹروپولیپس مائٹس (Tropilealaps mites)

یہ مائٹ شہد کی یورپی مکھی پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس شدید حملہ کی صورت میں سنڈیاں اور کوئے مرجاتے ہیں جو ان مکھی کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بالغ مائٹ کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ یہ مائٹ بہت تیزی سے حرکت کرتی ہے اور چھتے میں آسانی سے دکھائی نہیں دیتی۔ نظروں سے جلدی غائب ہو جانے کی وجہ سے بعض اوقات نظر کے دھوکے کا گمان ہوتا ہے۔ اس مائٹ کے انسداد کے لیے گندھک پاؤڈر مکھیوں کے بکس کے پینڈے اور فریموں کے اوپر چھڑکیں اور یہ عمل وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں۔

حشرات کی بڑھوتری کو کنٹرول کرنے والے نباتاتی مرکبات اور ذخیرہ شدہ اجناس کا تحفظ

پی ایچ ڈی سکالر: شیریں رضا حیدری نگران: ڈاکٹر محمد فاروق شعبہ: انژنلوجی

گزشتہ بہت سے سالوں سے ذخیرہ شدہ اجناس میں کیڑوں کا حملہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ جس سے ذخیرہ شدہ اجناس کو خاطر خواہ نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ فصلوں کی برداشت کے بعد ان اجناس کو بہتر طریقے سے ذخیرہ کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت ہی اجناس کٹائی کے بعد کسانوں سے صارفین تک پہنچتی ہے۔ ان حیاتیاتی عوامل میں سے حشرات ذخیرہ شدہ اجناس کو خاطر خواہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان میں چند پھوندیاں اور حشرات شامل ہیں۔ حشرات میں چنے کا ڈھورا، لیسر گرین بورر، دانوں کا کھیرا، لمبی تھوٹی والی پیٹل، آٹے کی سُسری (Red Flour Beetle) اور مونگ میں پایا جانے والا ڈھورا معاشی اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ بہت سی اقسام کی اجناس اور ان کے مرکبات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ذخیرہ شدہ اجناس کا تحفظ خاص طور پر اجناس کی مقدار اور معیار کو بچایا جانا نہایت ضروری ہے۔

چنے کا ڈھورا (Ghram dhora)

یہ ذخیرہ شدہ چنے اور چند دوسری اناج کو زیادہ نقصان پہنچانے والے حشرات میں سے ایک ہے۔ اس کی سنڈیاں اور بالغ کیڑے دونوں ذخیرہ شدہ اجناس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالغ کیڑا اتنا چست بھی نہیں ہوتا۔ تاہم اس پیٹل کی سنڈی بہت چست ہوتی ہے اور کافی دانوں کو جاتی ہے۔ حملہ شدہ دانوں پر گول سوراخ نظر آتے ہیں۔ جو اس بات کا مظہر ہے کہ کھیرا پیٹل کا حملہ ہو گیا ہے۔ یہ پیٹل پاکستان میں ایک سال سے ساڑھے دس ماہ میں 0.3 تا 2.5 فیصد تک نقصان پہنچاتی ہے۔ حقیقت میں ذخیرہ شدہ اجناس اس کیڑے بہت زیادہ تعداد کی موجودگی سے غذائی اناج میں خاطر خواہ نقصان دیکھا گیا ہے۔ اس کیڑے کے حملہ شدہ آٹے کے استعمال سے انسانی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس لیے ان ذخیرہ شدہ اجناس کا تدارک نہایت ضروری ہے تاکہ ذخیرہ شدہ غذائی اناج کو محفوظ بھی کیا جاسکے اور ہر صارف تک ان کیڑوں کے حملے سے پاک اور اچھی اجناس کی رسائی کو یقینی بنایا جاسکے۔

ذخیرہ شدہ اجناس کو محفوظ کرنے کے طریقے

روایتی طور پر ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کو کنٹرول کے لیے عصبی نظام پر عمل کرنے والی زرعی ادوات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان سے ذخیرہ شدہ اناج کے کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملی ہے لیکن ان کے استعمال کو اب چند وجوہات کی بنا پر ترک کیا جا رہا ہے۔ ان ادویات کے زیادہ اور بے دریغ استعمال سے ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں نے اپنے اندر ان روایتی زرعی ادوات کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی ہے۔ ان زرعی ادوات کے باقیات اجناس میں پائے گئے ہیں۔ ایسی خوراک کے استعمال سے انسانوں میں ان زرعی زہروں کے باقیات اور ان کے اثرات نوٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول پر ان زرعی ادویات کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عوام میں ان روایتی زرعی ادویات کے نقصانات نے سائنسدانوں کو اس بات پر اکسایا ہے کہ وہ ان ذخیرہ شدہ اجناس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے متبادل کیمیائی مرکبات تیار کریں جو ان روایتی زرعی ادویات کی نسبت موثر ہوں اور ذخیرہ شدہ اناج کے لیے زہریلے بھی نہ ہوں۔ اس تحقیق میں جن کیمیائی مرکبات کو کیڑوں کے کنٹرول میں استعمال کیا گیا ان میں پودوں کے مرکبات جیسا کہ نیم، ملٹھی اور مروا کے عرقیات شامل ہیں۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ان عرقیات کو ذخیرہ شدہ اجناس کے حشرات کے کنٹرول میں موثر ہیں۔ اسکے علاوہ میری تحقیق کے نتائج درج ذیل ہیں:

- ۱۔ نیم کے عرق کو باقی پودوں کی نسبت ڈھورا کے خلاف زیادہ کارآمد پایا گیا ہے۔
- ۲۔ ان عرقیات کی مقدار بڑھا کر استعمال کرنے سے اس کیڑے کی زیادہ شرح اموات نوٹ کی گئی ہے۔
- ۳۔ ان نباتات سے حشرات کی افزائش نسل اور بڑھوتری کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- ۴۔ ان عرقیات سے اس کیڑے کے خامرے (Enzymes) کی کارکردگی بھی کافی متاثر ہوئی۔
- ۵۔ ان عرقیات کے اسپرے کے تین دن بعد اس کیڑے کی تعداد میں واضح کمی پائی گئی۔

۶۔ کیڑے بھگاؤ تجربات میں بھی ان عریقات کو موثر پایا گیا۔

اس تحقیق سے ذخیرہ شدہ اجناس کو حشرات کے حملے سے بچاؤ میں مدد ملے گی اور ان اجناس میں زہریلے مرکبات کی باقیات سے بھی نجات ملے گی اور ان اجناس کو محفوظ کرنے پر خرچ میں بھی کمی آئے گی۔

ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ماحول دوست زرعی ادویات کی افادیت

پی ایچ ڈی سکالر: محمد یاسر نگران: منصور الحسن شعبہ: انٹوماالوجی

ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑے نہ صرف ذخیرہ شدہ اناج بلکہ بہت سی قیمتی اشیائے خورد و نوش جو کہ فیکٹریوں اور پیکریوں اور خوراک تیار کرنے والی جگہوں پر پائی جاتی ہیں انکو بھی نقصان پہنچانے میں۔ یہ کیڑے اپنے جسم کے حصوں اور دیگر آلودہ گیوں کے ذریعے کھانے والی مصنوعات کے معیار کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ذخیرہ شدہ زرعی اجناس کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیمیائی زرعی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ ذخیرہ شدہ اجناس، کیڑا، ان ماحول دوست کیڑوں اور ماحول زہروں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر چکے ہیں۔ لہذا ان کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ماحول دوست زرعی ادویات کی افادیت اور ان کے دیرپا اثرات معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ماحول دوست زرعی ادویات (پائیری پروکسی فن، میتھا کسی فینوزائیڈ، نوالیوران سپائٹوسائیڈ اور سپنٹورم) کو مختلف زری اجناس گندم، مکئی، چاول اور جو پر مخصوص مقدار میں لگایا گیا اور ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کو زہر آلود اجناس پر چھوڑ دیا گیا اور ان کیڑوں پر ماحول دوست زرعی ادویات معلوم کرنے کے لیے مخصوص دورانیہ تک مشاہدہ کیا گیا۔ پائیری پروکسی فن گندم کے دانوں میں آٹے کی سسری اور کچھرا کے خلاف سب سے موثر نتائج دیئے جبکہ اس زہر نے آرادار بھونڈی کے خلاف جو کے دانوں میں سب سے بہتر نتائج دیئے۔ میتھا کسی فینوزائیڈ نے آرادار بھونڈی اور آٹے کی سسری کے خلاف جو کے دانوں میں سب سے بہتر نتائج دیئے جبکہ کچھرا کے خلاف گندم کے دانوں میں اچھے نتائج مہیا کیے اسی طرح نوالیوران کو سب سے زیادہ جو کے دانوں میں موثر پایا گیا۔ اس طرح سپائٹوسائیڈ اور سپنٹورم کو جو کے دانوں میں مذکورہ کیڑوں کے خلاف سے زیادہ موثر پایا گیا۔ ایک اور تجربے میں پائیری پروکسی فن، میتھا کسی فینوزائیڈ اور نوالیوران کو مختلف سطحوں (دھات، لکڑی اور کنکریٹ) پر لگا کے انکے ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں (آٹے کی سسری، کچھرا اور آرادار بھونڈی) پر اثرات کو معلوم کیا گیا۔ ان ماحول دوست زہروں نے 12 مہینوں تک کیڑوں کا اچھا کنٹرول دیا ان زہروں کے سب سے زیادہ دیرپا اثرات دھات والی سطح پر پائے گئے۔ مزید سپائٹوسائیڈ اور سپنٹورم کو مختلف سطحوں (دھات، لکڑی اور کنکریٹ) پر لگا کر ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں (آٹے کی سسری، کچھرا اور آرادار بھونڈی) کے خلاف افادیت معلوم کرنے کے سے استعمال کیا گیا ان دونوں زہروں نے 6 مہینے تک تمام سطحوں پر ذخیرہ شدہ کیڑوں کے خلاف اچھے نتائج دیئے۔ لیکن سب سے زیادہ دھاتی سطح پر دیرپا اثرات پائے گئے۔ لہذا درج بالا نتائج کی روشنی میں یہ ماحول دوست زہریں ذخیرہ شدہ اجناس کے خلاف موثر اور دیرپا اثرات رکھنی والی ثابت ہوئی ہیں اور انکو کیمیائی اور نقصان دہ زرعی ادویات کے متبادل کے طور پر ذخیرہ شدہ اجناس کے گوداموں اور خوراک تیار کرنے والی فیکٹریوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں میں مدافعت کا نظام

پی ایچ ڈی سکالر: فیضان امجد نگران: منصور الحسن شعبہ: انٹوماالوجی

زرعی اجناس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی تقریباً ستر فیصد آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ گندم، چاول اور مکئی کی فصلیں اناج کی اہم فصلوں میں شامل ہیں جو کہ روزمرہ کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں۔ پیداوار میں کمی اور پروسیسنگ کے دوران فصل ضائع ہونے کی وجہ بہت سارے بائیوٹک اور اے بائیوٹک عوامل ہیں لیکن سب سے اہم وجہ کیڑوں کا حملہ ہے۔ کیڑوں کا حملہ ہوائی سے شروع ہو کر کٹائی کے بعد ذخیرہ کرنے کے دوران بھی جاری رہتا ہے۔ گندم، چاول اور دیگر اجناس کٹائی کے بعد استعمال تک طویل مدت کے لیے ذخیرہ کیے جاتے ہیں جسکی وجہ سے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ذخیرہ کے دوران بہت سے

نقصان دہ کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں جن میں سے اقتصادی طور پر سب سے اہم کھیرا (*Trogoderma granarium*) اور گندم کی سری (*Rhyzopertha dominica*) ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ یورپی یونین فار پلانٹ پروٹیکشن (EPPO) نے کھیرا کی درجہ بندی A2 قرنطینہ کیڑوں میں کی ہے جسکی وجہ سے بہت سے ملکوں پر جہاں یہ کیڑا موجود ہے سے زرعی اجناس کی درآمد پر پابندی عائد کی گئی ہے لہذا ان کو کنٹرول کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اجناس پر کیڑوں کے حملے کو روکنے کے لیے کیڑے مار ادویات کی سپرے کی جاتی ہے یا پھر فیمگیشن (Fumigation) کی جاتی ہے۔ ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کے کنٹرول کے لیے عام طور پر پیرتھرائڈز (Pyrethroids) اور آرگنیو فاسفیٹ (Organophosphate) زہروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیرتھرائڈز (Phyrethroids) لمسی طور پر اور کھالینے پر کیڑوں کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیرتھرائڈز (Phyrethroids) سوڈیم چینلو سے ہو کر گزرنے والے میسجر کے نارمل ٹرانسمیشن میں مداخلت کرتی ہے۔ دوسری طرف کیڑے کھڑے کھڑوں میں کیڑے مار ادویات کے مضر اثرات کو ذائل کرنے کے لیے انٹرم سسٹم موجود ہے۔ کیڑے مار دواؤں کے غیر منصفانہ اور بار بار استعمال نے کیڑوں میں مدافعت (Insecticide resistance) کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور پیسٹ مینجمنٹ پروگرامز کے فیل ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ بہت سے عوامل کیڑوں میں مدافعت پیدا ہونے کی وجہ ہیں جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں: کیڑوں میں انزائمز کا نقصان دہ مادوں کو زیادہ تیزی سے تحلیل کرنا، کیڑوں کے جسموں سے زہریلے مادوں کا اخراج تیز ہونا، کیوٹیکل کے ذریعے کیڑے مار ادویات کا دخول کم ہو جانا وغیرہ۔ لہذا اس امر کا مطالعہ کرنے کے لیے کھیرا اور گندم کی سری پر سلسلہ وار تجربات کیے گئے۔ تجربات کا آغاز کیڑوں کی مختلف جغرافیائی سٹریٹیز (strains) کے نمونے حاصل کر کے کیا گیا، کھیرا کے نمونے پنجاب کے بڑے اجناس ذخیرہ کرنے والے اضلاع سے لیے گئے جن میں لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، بہاولپور، بھکر اور فیصل آباد شامل ہیں۔ پیرتھرائڈز میں سے چار نمائندہ زہروں کا انتخاب کیا گیا جن میں ڈیلٹامیتھرین، سائپر میتھرین، بائٹھنٹھرین اور الفاسامپیر میتھرین شامل ہیں۔ ان تجربات کا انعقاد گرین ریسرچ ٹریٹنگ اینڈ سٹوریج مینجمنٹ سیل، شعبہ انٹومالوجی، کلیہ زراعت، جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں کیا گیا۔ تجربات سے یہ واضح ہوا کہ تمام اکٹھے کیے گئے نمونوں میں سے بہاولپور سے اکٹھے کیے ہوئے کھیرا میں نسبتاً سب سے زیادہ مدافعت موجود ہے اور لاہور سٹریٹیز میں نسبتاً سب سے کم مدافعت موجود ہے۔ لیبارٹری میں ڈیلٹامیتھرین کا سلیکشن پریشدرے کرکھیرا کو سات نسلوں تک اور پھر دوبارہ پانچ نسلوں تک سلیکشن پریشدرے کے بغیر پالا گیا جس سے یہ امر واضح ہوا کہ سلیکشن پریشدرے سے مدافعت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس طرح مدافعت کا اندازہ لگانے کے لیے گندم کی سری پر بھی تجربات کیے گئے۔ تجربات کے لیے گندم کی سری کی مختلف جغرافیائی سٹریٹیز (strains) کے نمونے لاہور، نارووال، ملتان، بھکر اور فیصل آباد سے حاصل کیے گئے جن میں سے ملتان کی سٹریٹیز میں نسبتاً سب سے زیادہ مدافعت پائی گئی اور فیصل آباد سٹریٹیز میں نسبتاً سب سے کم مدافعت موجود ہے۔ لیبارٹری میں ڈیلٹامیتھرین کا سلیکشن پریشدرے کر گندم کی سری کو پانچ نسلوں تک اور پھر دوبارہ چار نسلوں تک سلیکشن پریشدرے کے بغیر پالا گیا جس سے انکشاف ہوا کہ سلیکشن پریشدرے سے مدافعت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بعد ازاں کیڑے مار زہروں کا اثر بڑھانے والے کیمیکلز (Insecticide synergists: Piperonyl butoxide and DFF) پر تجربات سے ثابت ہوا کہ تمام سائنز جسٹ کیڑوں میں مدافعت کم کرنے میں معاون ہیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیئریل دوا زہر (Spinosad) سپانوسید کے ساتھ بھی تجربات کئے گئے اور یہ امر واضح ہوا کہ پیرتھرائڈز کے خلاف مدافعت رکھنے والے کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپانوسید کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مدافعت کے امر کا وسیع مطالعہ کرنے کے لیے مزید گندم کی سری اور کھیرا کے انزائمز پر بھی تجربات کیے گئے۔ انزائمز ایکٹیوٹیز کے مطالعہ کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف انٹومالوجی اینڈ نیماٹولوجی، یونیورسٹی آف فلوریڈا، امریکہ سے معاونت لی گئی۔ انزائمز کے مطالعہ سے اس بات کی انکشاف ہوا کہ انزائمز کی بڑھی ہوئی (activities) ایکٹیوٹیز ہی مدافعت پیدا ہونے کا بڑا سبب ہیں۔ Cytochrome P450, Glutathione S-transferases اور Esterases مدافعت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختصر آئیہ کہ کھیرا اور گندم کی سری کی تمام اکٹھی کی گئی سٹریٹیز میں پیرتھرائڈز کے خلاف کم سے درمیانے درجے کی مدافعت موجود ہے جو کہ ذخیرہ شدہ اجناس میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ سپانوسید اور سائنز جسٹ مدافعت رکھنے والے کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں insect resistance management programs میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

کم دورانیے میں تیار ہونے والی کپاس کی نائٹروجن کی مختلف سطحوں کے تحت جینیات

پی ایچ ڈی سکالر: سدرہ عاشق رانا نگران: پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد خاں شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

کپاس پاکستان کی معیشت کی سب سے اہم فصل ہے یہ ملک کی ایک اہم نقد آور فصل ہے اور اس میں فائبر (روئی) اور تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کے ذریعہ زرمبادلہ کی کل آمدنی کا 60 فیصد حاصل ہوتا ہے۔ اس میں زراعت میں شامل مالیت کا 4.1 فیصد اور جی ڈی پی کا 0.8 فیصد حصہ ہے اس کی کاشت اپریل کے وسط سے مئی تک وسطی پنجاب میں ایک وسیع و عریض رقبے پر ہوتی ہے اور نومبر اور دسمبر کے مہینوں تک کھیت میں رہتا ہے۔ اس طرح یہ گندم کی مناسب ہوائی کے وقت سے متجاوز کرتی ہے جو پاکستان کی سب سے اہم غذائی فصل ہے بتایا جاتا ہے کہ 20 نومبر کے بعد گندم کی ہوائی کے نتیجے میں اناج کی پیداوار میں 42 کلوگرام فی ہیکٹر نقصان ہوتا ہے گندم پر کپاس کی فصل کے اس منفی اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد تیار ہونے والی کپاس کی مختلف اقسام کی فصلیں تیار کی جائیں جو گندم کی بروقت ہوائی کے لیے کھیتوں کو خالی کر دیں۔ لہذا کم دورانیے میں تیار ہونے والی اقسام کی ترقی ان دنوں کپاس کے بریڈر کے لیے اہم مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد بن گیا ہے۔ کیونکہ جلد تیار ہونے والی کپاس کی اقسام گندم، کپاس گندم کی گردش کا نظام زیادہ موثر بنائیں گی تاکہ گندم کی اعلیٰ پیداوار حاصل ہو سکے۔ گندم کی فصل کی پیداوار کو فروغ دینے کے علاوہ مختصر مدت کی کپاس کی اقسام میں کچھ اچھی خصوصیات کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مٹی کی نمی کے تناؤ کا اچھی طرح سے انتظام کرتے ہیں۔ آخر موسم میں کیڑوں کے حملوں سے ہونے والے نقصانات سے بچ جاتے ہیں اور کٹائی اور جنگ آپریشنوں کے لیے موسم کی توسیع مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جسمانی زرعی اور انتظامی عوامل پودوں کے رد عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن فصلوں کے پودوں کی میٹابولک سرگرمی اور غذائیت کی صورت حال کو بہتر بنانے کے ذریعے فصلوں کی پیداوار میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ ان میں کیمیائی کھادیں، خاص طور پر نائٹروجن جنس کھادیں پیداوار کی سب سے بڑی لاگت میں سے ایک ہیں۔ نائٹروجن پودوں کو خشک مادہ بنانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری توانائی سے بھرپور مرکبات فراہم کرتا جو فوٹو سنتھیس اور پودوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ نائٹروجن ایک ضروری غذائیت ہے پودوں کے جینیاتی کردار اور ماحول کے ساتھ ان کا تعامل کپاس میں فصل کی پکنے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ پودوں کی پختگی نائٹروجن کھاد، فاسفورس اور پوٹاشیم کھاد کی مقدار اور تبدیلی سے متاثر ہوتی ہے۔ مختصر مدت کی کپاس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مختلف خصوصیات اور جینیاتی کنٹرول کے لیے مختلف غذائیت کی سطح کے تحت اور جینیاتی تغیرات کا اندازہ کرنے کے لیے ایک تحقیقی منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ ابتدائی مرحلے کے طور پر 45 جینیو ٹائپس پر مشتمل کپاس جرمپلاسم کو پختگی میں کمی اور فیلڈ میں پیداوار سے متعلق خصوصیات کے لیے اسکرین کیا گیا تھا۔ جینیو ٹائپس نے پہلے اسکوئر کی ظاہری شکل کے دنوں، پھولوں کے آغاز کے دن مرکزی تنوں پر پہلی شاخ کے لیے نوڈ کی تعداد، بیج کاٹن کی کل پیداوار اور ایلنکس انڈیکس میں نمایاں جینیاتی تنوع ظاہر کیا۔ پختگی کی بنیاد پر جرمپلاسم کو تین گروہوں میں ممتاز کیا گیا تھا۔ گروپ 1 میں دیر سے پختگی اور زیادہ پیداوار حاصل ہوئی تھی جبکہ گروپ 3 نے ابتدائی پختگی والے جینیو ٹائپس کو ظاہر کیا تھا اور گروپ 2 میں دونوں قسم کے جینیو ٹائپس تھے۔ ان گروہوں سے جینیو ٹائپس یعنی ایف ایچ-682، ایف ایچ-2015، ملل، ایم این ایچ-147، پی بی-900، دی ایچ-300 کو ابتدائی پختگی اور زیادہ پیداوار دینے والا جینیو ٹائپس یعنی بی-557، بی ایچ-121، ایف ایچ-941، ایم این ایچ-93، ایم ایس-40 دیر سے پختہ ہونے کی حیثیت کے حامل قرار دیا گیا۔ ان جینیو ٹائپس کو لائن x ٹسٹرفیشن میں کراس کیا گیا تھا اور ان کو F1 جینیو ٹائپس کے ساتھ فیلڈ میں تین نائٹروجن کے درجوں میں لگایا۔ اس تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جینیو ٹائپ ایم این ایچ-147 تینوں نائٹروجن درجوں کے تحت جلد تیار ہونے کے لیے متعلقہ بیشتر خصلتوں کے لیے بہترین کمبا ئیز ثابت ہوا لائن ایف ایچ-682 ایلنکس انڈیکس، پیداوار اور فائبر سے متعلق خصلت کے لیے بہترین عمومی کمبا ئیز تھی، جبکہ پی بی-900 پیداوار اور اس کی اکثریت کے تینوں نائٹروجن کی سطح کے تحت اور فائبر کے معیار کی خاصیت کے لیے اچھا کمبا ئیز تھا۔ جانچ کرنے والی جینیو ٹائپس میں ایم این ایچ-93 زیادہ تر ویر سے تیار ہونے والا اور پیداوار سے متعلق خصوصیات کے لیے بہترین کمبا ئیز تھا۔ کپاس (روئی) کی ہائبرڈ ملل x ایم ایس-40 پلانٹ کی لمبائی کے لیے بہترین کمبا ئیز پہلی فرونگ براؤنچ کے لیے نوڈ نمبر تینوں نائٹروجن لیول کے تحت پہلی فرونگ براؤنچ کے لیے نوڈ کی اونچائی ثابت ہوئی۔ لائن ایف ایچ-682 نے بی-557، ایم این ایچ-93، اور ایم ایس-40 کے ساتھ جلد تیار ہونے سے متعلق بیشتر خصلتوں کے لیے بہترین مجموعہ کیا۔ کراسز ایم این

ایچ-147x ایم ایس-40 ایکس اور ایف ایچ-682x ایم این ایچ-93 بھی پیداوار سے متعلق خصائل کے لیے مفید امتزاج تھے۔ کراس وی ایچ-300x ایف ایچ-941، 147-ایم این ایچ-147x ایم ایس-40، اور پی بی-900x ایم ایس-40 فابریک کی طاقت، خوبصورتی اور لمبائی کے لیے بہترین تھے۔ اس نے تجویز کیا کہ ابتدائی چٹنگی اعلیٰ پیداوار اور ثانوی پیرامیٹرز کے لیے مطالعے کی حدود میں مطلوبہ پیرامیٹرز ڈھانچے سے تجاوز کرنے کے لیے تمام سلیب کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ بھی ہوا کہ کراس میں چٹنگی میں کم سنجیدگی سے ہوتی ہے جیسا کہ ان کے والدین کے مقابلے میں زیادہ ہے ہیٹروٹک مظہر نے انکشاف کیا کہ ایف ون ہائبرڈ جو ابتدائی چٹنگی کی جینیو ٹائپس کے لیے ابتدائی چٹنگی والے جینیو ٹائپس کے لیے منفی ہیٹروسیس کی نمائش کرتے ہیں جبکہ مثبت ہیٹروس کو ظاہر کرنے والے پیداوار اور دیگر فابریک کو اعلیٰ خصوصیات کے لیے اہم تھے۔ کچھ مجموعے ایف ایچ-2015x ایف ایچ-941، ایم این ایچ-147x ایم ایس-40، وی ایچ-300x ایف ایچ-941 اور وی ایچ-300x ایم ایس-40 جس میں پیداوار اور فابریک کی خصوصیات کے ساتھ کام آہنگ امتزاج ہے تین نائٹروجن لیول کے تحت پہچانا گیا ہے اس سے مزید استحصال کیا جاسکتا ہے۔ محققین کے نقطہ نظر سے موجود تحقیق میں استعمال شدہ پودوں کا مواد کپاس کی کاشت کرنے والوں کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اسے فائدہ اٹھانے اور پودوں کے دیگر کرداروں کے لیے مزید بہتری کے پروگراموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نتائج نے اشارہ کیا کہ بالواسطہ انتخاب کے معیار کے بطور واحد پیرامیٹر کا استعمال بہتر نہیں پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا ترجیحی طور پر زیادہ تر اری اور پیداوار سے متعلق خصلتوں کا متناسب امتزاج ایک جو ٹائپ میں اعلیٰ پیداوار اور ابتدائی چٹنگی قابلیت فراہم کرے گا۔ غیر اضافی جین کے عمل کی اہمیت جیسا کہ بیشتر خصلتوں میں ایس سی اے اثرات کی اہمیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انتخاب کے آسان طریقہ کار پودوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتا ہے۔ تاہم اس طرح کے کروس کو ہیٹروس کے لیے مزید تحقیق میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور اسے ان خصلتوں کے لیے ہائبرڈ ترقی اور کپاس کی فصل کی جلد چٹنگی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دھان، گندم کے فصلی نظام میں کم زرعی مداخل اور زیرو ٹیلنج ٹیکنالوجی کے ذریعے دھان کے مڈھوں کا زمینی زرخیزی

کے لیے استعمال اور گندم کی پیداوار میں اضافہ

پی ایچ ڈی سکالر: غلام مصطفیٰ گلران: ڈاکٹر محمد طاہر شعبہ: ایگرونامی

دھان، گندم کی فصلوں کے ہیر پھیر کا نظام پاکستان کے کالر کے علاقے میں عرصہ دراز سے گندم اور چاول کی بہترین فصلیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمین کے بے دریغ استعمال، زمین کی پیداواری صلاحیت میں کمی، گندم کی دیر سے کاشت، پانی کی کمی، کھاد، بیج اور زرعی زہروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور کم منافع کی وجہ سے اس سسٹم کی پیداواری صلاحیت میں پہلے والا دم خم نہیں رہا۔ ان مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ زمین میں نامیادتی مادہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ آبپاشی کی تعداد اور کھادوں کے استعمال میں کمی لاتے ہوئے پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ کم زرعی مداخل، زیرو ٹیلنج جیسے جدید طریقہ کاشت اور فصل کی باقیات کو زمینی زرخیزی بڑھانے جیسے عوامل کو گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے تجربات پر مشتمل موجودہ تحقیق ایڈیٹور ریسرچ فارم گوجرانوالہ، پاکستان پر 13-2012ء اور 14-2013ء میں کی گئی۔ تجربات میں گندم کی قسم ملت-2011 استعمال کی گئی۔ زیرہ ٹیلنج ڈرل، کنزرویشن زیرو ٹیلنج ڈرل، ٹربوسیڈر زیرو ٹیلنج، پی سیڈر زیرو ٹیلنج، زیرو ٹیلنج چاول کے مڈھ کھیت سے نکالنے کے بعد، زیرو ٹیلنج چاول کے مڈھ جلانے کے بعد اور روایتی طریقہ کاشت گندم کو شامل تحقیق کیا گیا۔ اس کے علاوہ نائٹروجن کے استعمال کے تین مختلف طریقے بھی تے میں شامل کیے گئے۔ تجربے کے لیے سپلٹ پلاٹ ڈیزائن استعمال کیا گیا، جس میں چھوٹے پلاٹوں کا سائز 8.1x15 میٹر تھا۔ گندم کی کاشت کے لیے 125 کلوگرام بیج فی ہیکٹر 22.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر لگایا گیا۔ گندم کو 120 کلوگرام نائٹروجن، 100 کلوگرام فاسفورس اور 60 کلوگرام پوٹاش کھاد فی ہیکٹر ڈالی گئی۔ مسلسل دو سال کے تجربات کے بعد جھاڑ بننے، شگوفوں کی تعداد، سٹوں کی لمبائی، دانوں کی پیداوار، اور توڑی کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کا شماریاتی تجزیہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے طریقہ کاشت کے استعمال پر متوقع منافع کا تخمینہ لگانے کے لیے خرچے اور آمدن کا معاشی تجزیہ بھی تجربات میں شامل کیا گیا۔ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ گندم کے

پودوں کی بڑھوتری کی بات کی جائے تو جہاں ٹریبونڈریٹ سے کاشت کردہ گندم کو جب نائٹروجن کی آدھی مقدار بوائی کے وقت اور بقیہ آدھی مقدار پہلے پانی کے ساتھ استعمال کی گئی وہاں فصل کی بوائی کے 120 دن بعد، لیف ایریا انڈیکس، کراپ گروتھ ریٹ، لایف ایریا ڈیوریشن، نیٹ اسٹیلیشن ریٹ اور ٹوٹل بائیوماس سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ٹریبونڈریٹ سے کاشت کردہ گندم کو جب نائٹروجن کی آدھی مقدار بوائی کے وقت اور بقیہ آدھی مقدار پہلے پانی کے ساتھ استعمال کی گئی تو دوسرے طریقہ ہائے کاشت اور کھاد کے استعمال کے مقابلے میں فصل کے سٹوں کی لمبائی، جھاڑ اور پیداوار سب سے بہتر رہی۔ اس طریقہ کاشت اور کھاد کے استعمال میں گندم کی بہتر پیداوار کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھاری مشینری اور ٹریکٹر کے کم چکر لگنے کی وجہ سے اس زمین میں ہوا کا گزر بہتر ہوا جس کی وجہ سے پودوں کی جڑوں نے نائٹروجن کو موثر طور پر استعمال کیا جس سے لیف ایریا، ٹوٹل ڈرائی بائیوماس، سٹوں کی لمبائی اور پیداوار میں اضافہ ہوا۔ البتہ گندم کے روایتی طریقہ کاشت میں مشاہدہ کیا گیا کہ پودوں کی جڑیں سب سے لمبی تھیں۔ پانی سے بھرے ہوئے زمینی مسام (فیصد)، سب سے زیادہ اس وقت نوٹ کیے گئے جب ٹریبونڈریٹ سے کاشت کردہ گندم کو جب نائٹروجن کی ساری مقدار بوائی کے وقت ڈالی گئی۔ معاشی تجزیے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹریبونڈریٹ سے کاشت کردہ گندم میں نائٹروجن کی آدھی مقدار بوائی کے وقت اور بقیہ آدھی مقدار پہلے پانی کیساتھ استعمال کرنے کی صورت میں، خرچے اور آمدن کے حساب کتاب کے بعد، سب سے زیادہ بچت ہوئی۔ اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے کسان اپنی گندم کی بہتر پیداوار اور زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔

پیداواری ٹیکنالوجی برائے سورج مکھی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات

پی ایچ ڈی سکالر: محمد اویس نگران: ڈاکٹر محمد انوار الحق شعبہ: سوانل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

خوردنی تیل انسانی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم اپنی ملکی ضروریات کا صرف 17 فیصد خوردنی تیل پیدا کر رہے ہیں اور باقی درآمد کرنا پڑتا ہے۔ جس پر کثیر زرمبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے خوردنی تیل کی درآمد میں ہر سال بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ تیل دار فصلوں کی کاشت کو فروغ دیا جائے تاکہ درآمد پر انحصار کم ہو۔ سورج مکھی ایک اہم خوردنی تیل فصل ہے۔ یہ خوردنی تیل ملکی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بیج میں اعلیٰ قسم کا تقریباً 40 سے 45 فیصد تیل ہوتا ہے مزید برآں اس کے تیل میں انسانی صحت کے لئے ضروری وٹامن اے، اور کے پائے جاتے ہیں۔ اس فصل کا دورانیہ تقریباً 100 سے 125 دن ہوتا ہے۔ اور کم مدت کے فصل ہونے کی وجہ سے اسے بڑی فصلوں کے درمیانی عرصہ میں باآسانی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ سورج مکھی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے صحیح وقت پر اس کے کاشت اور کھادوں کا استعمال نہایت ضروری ہے تاخیر سے کاشت کرنے اور کھادوں کا غیر متوازن استعمال کرنے کی صورت میں نا صرف اس کے پیداوار میں کمی آجاتی ہے بلکہ اس کا تیل بھی کم حاصل ہوتا ہے۔ موسمی حالات کے بدلنے کی وجہ سے سورج مکھی کی پیداواری صلاحیت سخت متاثر ہے اسی لیے ان بدلنے موسمی حالات میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشت کی مناسب تاریخ اور نائٹروجن کھاد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا ان کا سورج مکھی کی فٹالوجی اور پیداوار پر اثرات کا اندازہ لگانے کے لئے فیصل آباد اور وہاڑی میں 2018ء اور 2019ء کے موسم بہار میں ایک فیلڈ تجربہ کیا گیا۔ اس دو سالہ تجربہ میں سورج مکھی (یکم جنوری، 16 جنوری، 31 جنوری اور 15 فروری) کو بہاریہ کاشت کی گئی۔ اور 160، 200 اور 240 کلوگرام پریکٹریٹ نائٹروجن کھاد کا استعمال کیا گیا۔ سورج مکھی کی زیادہ پیداوار 2019 میں دیکھنے میں آئی۔ اوسط درجہ حرارت کے اثرات اور فصل کی نشوونما کے درمیان تعلقات کو فصل کی کٹائی تک کے مختلف مراحل میں دیکھا گیا۔ نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ درجہ حرارت اور فٹالوجیکل مراحل کے مابین (negative coefficient of determination R2) ریکارڈ کیا گیا۔ جو پودے یکم جنوری کو لگائے گئے ان پر 70 دنوں میں پھول لگے اور 100 دنوں میں فصل تیار ہوئی۔ سب سے زیادہ پیداوار فیصل آباد میں 16 جنوری کو جبکہ وہاڑی میں یکم جنوری کو 240 کلوگرام نائٹروجن استعمال کر کے حاصل کی گئی۔ نتائج سے اخذ ہوتا ہے کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھنے سے فصل کا دورانیہ 7 سے 9 دن کم ہو سکتا ہے اور Cropgro Model سے پیش گوئی کی گئی کہ 2039-2069 کے درمیان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فیصل آباد اور وہاڑی میں سورج مکھی کی پیداوار میں 35 فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہماری ریسرچ سے یہ ماخذ یہ کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کی پیش خیمہ سورج مکھی کی پیداواری ٹیکنالوجی اپنے زمیندار کو دینی چاہیے۔

بائیولوجیکل فلوئڈز میں پنسلین اور سلفوناماڈز کے باقیات کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے سٹرپ ٹیسٹ

پی ایچ ڈی سکالر: ندانورین نگران: ڈاکٹر فقیر محمد شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف فزیالوجی اینڈ فارماکالوجی

ویٹرنری پریکٹس میں اینٹی بائیوٹک کے وسیع پیمانے پر استعمال نے عام لوگوں میں سنگین تشویش پیدا کر دی ہے۔ خاص طور پر جب پولٹری اور ڈیری کے جانوروں میں یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اور پھر ان جانوروں سے خوردنی اشیاء مثلاً دودھ، گوشت یا انڈے کو میڈیسن کے مکمل انخلاء کے دورانے کو مد نظر رکھے بغیر مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ انٹی بائیوٹکس کے باقیات ان اشیاء میں پائے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صحت میں سنگین مسائل جیسے الرجی اور صارفین میں اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مصنوعات میں میڈیسن کے باقیات کی چیکنگ کی جدید ترین تکنیک مہنگی اور وقت طلب ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جو کم وقت میں کام کرے۔ موجودہ دور میں میڈیسن اور خوردنی اشیاء کے تجربے میں پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹنگ نے کافی اہمیت حاصل کر لی ہے روایتی پیچیدہ اور وقت طلب طریقوں کے مقابلے میں Poct کم وقت میں فوری نتائج فراہم کرتی ہے۔ لیٹرل فلو ایسے (LFO) پر مبنی یہ سٹرپس Qualitative and Quantitative دونوں طرح کے تجربات کے لیے تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ LFA میں کرومیٹوگرافی اور بائیوریلگیٹیشن تحقیقات کی انوکھی خصوصیات اور فوائد کو ملا یا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر LFA حیاتیاتی سیال کی جانچ کے لیے استعمال کیا جانا شروع ہو چکا ہے جیسے دودھ، پیشاب یا خون میں یہ طریقہ فوری اور قابل اعتماد نتائج دیتا ہے۔ ایسی کٹس مقامی طور پر دستیاب نہیں ہے اور ان کی درآمد مہنگی ہے لہذا موجودہ ریسرچ میں LFA کے اصول کے مطابق اینٹی بائیوٹک Residue کی موجودگی کا پتہ لگانے کی کٹ کی تیاری کا طریقہ وضع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس پلان کے مختلف سٹپس میں سب سے پہلا تھا ہپٹن کا بنانا ہپٹن کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ پنسلین اور سلفوناماڈز بہت چھوٹے مالیکیولز ہیں اور یہ بذات خود دفاعی نظام کو شروع کرنے میں اتنے کارآمد نہیں رہتے جتنا کہ جب کسی بڑے کیرئیر مالیکیول (پروٹین) کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں اس ریسرچ میں ہپٹن کی تیاری کے لیے پنسلین اور سلفوناماڈز کے نمائندہ ممران امپیسلین اور سلفوناماڈ استعمال کئے گئے تھے۔ ان کو کانجوگیٹ کیا گیا تھا۔ بورین سپرم ایلیومین کے ساتھ ان ہپٹن کے خلاف پرائمری اینٹی باڈیز تجرباتی جانوروں میں پیدا کروائی گئیں اور ان اینٹی باڈیز کو ملاٹ سے پاک کیا گیا امونیم سلفیٹ اور آکٹانائک ایسڈ کے ساتھ ان کا سیکوئنشل ٹریمنٹ کروائے۔ اس کے بعد ٹوٹل پورٹین کانٹینٹ کا پتہ لگانے کے لیے نیو ڈراپ سپیکٹروفومیٹر استعمال کیا گیا اور ان اینٹی باڈیز کی کوالٹی کا پتہ لگانے کے لیے ELISA ٹیسٹ کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں گولڈ نیو پارٹیکلز کی تیاری سٹریٹ ریڈکشن کے ذریعے کی گئی اور ان کی کوالٹی کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے سائز اور ڈیٹا پوائنٹل کو چیک کیا گیا جو کہ ضرورت کے عین مطابق تھا۔ اس کے بعد گولڈ نیو پارٹیکلز کی اینٹی باڈیز کے ساتھ کانجوکشن کے لیے بوریت بغیر استعمال کیا گیا۔ آخری مرحلے میں LFA ٹیسٹ کو سٹرپ کے اوپر پر فارم کیا گیا اس سٹرپ کے مختلف حصوں کو پولی و نائل کلورائیڈ کے بنے ہوئے بیکنگ کارڈ کے اوپر چسپاں کیا گیا۔ اس کے ٹوٹل چار حصے تھے۔ اس میں سیمپل پیڈ، کانجوگیٹ پیڈ، نائٹروسیلولوز ممبرین اور ایئر اریٹ پیڈ شامل تھے۔ پھر ٹیسٹ میں استعمال کرنے کے لیے 15 اور 8 ملی میٹر سائز کی سٹرپس کاٹ لی گئیں۔ اس ریسرچ میں LFA کا کمپلیٹو فارمیٹ استعمال کیا گیا تھا نائٹروسیلولوز ممبرین کو ٹیسٹ اور کنٹرول لائن میں تقسیم کیا گیا اور ٹیسٹ لائن پر Hapten اور کنٹرول لائن پر سینڈری اینٹی باڈیز ڈالی گئی تھیں جبکہ کانجوگیٹ پیڈ پر گولڈ نیو پارٹیکلز اور اینی باڈیز کانجوگیٹ ڈالا گیا۔ اس کے بعد ان سٹرپس کو کمرے کے درجہ حرارت پر خشک کر لیا گیا۔ ٹیسٹ پر فارم کرنے کے لیے جب سیمپل پیڈ پر لیکوئیڈ سیمپل ڈالا گیا تو اس کے بننے سے پہلے سے متحرک ری ایجنٹس فعال ہونا شروع ہو گئے۔ کنٹرول اور ٹیسٹ لائن پر دررڈ لائنز کا بننا سیمپل میں اینٹی بائیوٹک کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے جبکہ کنٹرول لائن پر سنگل ریڈ لائن اینٹی بائیوٹک کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے پس ثابت ہوا کہ یہ سٹرپس پنسلین اور سلفوناماڈز دونوں کی میکسیم ریزٹوٹس کا پتہ لگانے میں کامیاب ہیں۔ یہ ٹیسٹ دیگر حیاتیاتی سیال جیسے کہ پیشاب اور سیرم کے ساتھ بھی پر فارم کیا گیا۔ ان کے لیے سیمپل کی خصوصی تیاری ضروری تھی پھر کے ساتھ ان کا تجربہ کرنے سے پہلے 100 micro liter بوریت بھران میں شامل کرنا ضروری تھا۔ ٹیسٹ کی تکمیل کے لیے مکمل وقت 8 سے 15 منٹ ہے بفر کے ساتھ یہ ٹیسٹ رزلٹ دینے میں صرف 4 سے 5 منٹ لیتا ہے لہذا دودھ میں سلفوناماڈز اور پنسلین کے باقیات کو چیک کرنے کے لیے پولی کلونل اینٹی باڈیز اور گولڈ نیو پارٹیکلز کا استعمال کرنے والا LFA پر مبنی ٹیسٹ تیار کر لیا گیا۔ ان سٹرپس کی Physibility انہیں دودھ میں پنسلین اور سلفوناماڈز کے

باقیات کو چیک کرنے کے لیے مثالی امیدوار بناتی ہے نئی تحقیق میں تیار شدہ LFA ٹیسٹ سٹرپس ایک ماہ کی مدت تک روم ٹمپرچر پر بالکل سٹیبل تھیں اور انہوں نے کوئی فالس پورٹو نتائج نہیں دیئے۔ اس ریسرچ میں تیار کردہ سٹرپس کا اطلاق دودھ جمع کرنے سے لے کر صارفین تک پہنچنے کے دوران ہر قدم پر ہوتا ہے۔ مزید برآں دودھ یا دیگر حیاتیاتی سیالوں میں اسکریننگ کے مقصد کے لیے ان ٹیسٹ، سٹرپس کو استعمال کرتے وقت کوئی پیچیدہ آلات، لمبے عرصے اور نفیس لیبارٹری آلات کی ضرورت نہیں ہوتی آپٹیکل رزلٹ گولڈنڈینو یا ٹیکلز کے سرخ رنگ کی وجہ سے مل جاتا ہے اس لیے کوئی سٹرپ ریڈز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پس اس طرح اسکریننگ کا طریقہ یقینی طور پر دودھ کے معیار کو خاص طور پر اینٹی بائیوٹک باقیات کی موجودگی اور تجارتی سہولت کے ساتھ ساتھ صارفین کی صحت کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے حوالے سے بہتر بنا سکتا ہے۔

کما دیں حیاتیاتی مسائل کو کم کرنے اور فحاشی کے حملوں کے خلاف دفاعی نظام مضبوط کرنے کیلئے اس کے جینز کا مطالعہ

پی ایچ ڈی سکالر: قصی پرویز نگران: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شعبہ: سنٹر آف ایگریکلچرل بائیوٹیکنالوجی (کیب)

دنیا بھر میں کماد اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان گنا کاشت کرنے والے ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے مگر اوسط پیداوار باقی ممالک سے کم ہے۔ مختلف اقسام کے جرثومے اور حشرات کماد کی فصل پر حملہ کرتے ہیں۔ کماد کی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں بڑی حد تک کمی کا باعث بنتے ہیں۔ مزید برآں یہ بیماریاں گنے میں چینی کی مقدار کو بھی کم کرتی ہیں۔ ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کماد کا پودا اپنے خداداد دفاعی نظام کو بروئے کار لاتا ہے۔ واضح رہے کہ پودوں کا یہ دفاعی نظام مختلف قسم کے جینز کی مرہون منت ہوتا ہے۔ تحقیق کے ذریعے پودوں میں موجود ان جینز کی صلاحیت کو بہتر کر کے کماد کی پیداوار میں بڑی حد تک اضافہ ممکن ہے۔ کماد کے پودوں میں SUGARWIN-I اور SUGARWIN-II دو ایسے نہایت اہم جینز ہیں جو پودے کی دفاعی طاقت کو بڑھانے میں حشرات اور بیماریوں کے خلاف اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیر نظر تحقیق میں کماد کے پودوں میں موجود مذکورہ بالا جینز میں مصنوعی تبدیلیاں کی گئیں تاکہ پودوں کی بیماریوں خصوصاً رتاروگ کے خلاف دفاعی طاقت کو بڑھایا جاسکے۔ اس تجربے کے بعد حاصل ہونے والے پودوں کی مذکورہ دفاعی طاقت کا جائزہ لیا گیا جس میں سے یہ بات سامنے آئی کہ جینیاتی جوڑ توڑ سے پودوں کی دفاعی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ مزید تسلی کے لیے پودوں کو کاشت کر کے ان پر مصنوعی طریقے سے رتاروگ کا حملہ کروایا گیا۔ جس سے یہ بات سامنے آئی کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ کماد کے پودوں پر عام پودوں کی نسبت رتاروگ بیماری کا حملہ بہت کم ہوا ہے۔ پودوں کے دفاعی نظام کی مضبوطی میں جینز کے زیر اثر بننے والی پروٹین کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک دوسرے تجربے میں یہ بات دریافت ہوئی کہ مذکورہ جینز SUGARWIN-I اور SUGARWIN-II سے بننے والی پروٹین کا بھی پودوں کی دفاعی صلاحیت میں کردار ہوتا ہے۔ زیر نظر تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذکورہ بالا دونوں پروٹین پودے کے خلیے میں موجود کچھ دیگر پروٹین سے تال میل کر کے پودے کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

نیم بارانی علاقوں میں سیم زدہ زمینوں کی حالت زار اور درختوں کی مختلف اقسام کی بڑھوتری پر سیم زدہ زمین کے اثرات اور ان کا تدارک

پی ایچ ڈی سکالر: حافظ محمد رفیق شاپین نگران: ڈاکٹر عرفان احمد شعبہ: فارم سٹری ایڈریج مینجمنٹ

زمین میں لگاتار بنیادوں پر پانی کی موجودگی نہ صرف زمین کی ساخت کو تبدیل کرتی ہے بلکہ اس میں موجود بہت سے عناصر جیسے آکسیجن، کاربن، نامیاتی مادے اور دوسرے بہت سے مرکبات پر منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سیم زدہ زمینوں پر پودے آکسیجن کی مقدار میں کمی اور جڑوں پر دباؤ کی وجہ سے صحت مند نہیں ہو پاتے۔ پودوں کی نشوونما کے لیے بہت سے عوامل یا اجزاء درکار ہوتے ہیں اور ان اجزاء کا مناسب مقدار میں ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیم زدہ زمینوں پر زیادہ تر اجزاء معمول کی حد میں نہیں پائے جاتے جسکی وجہ سے ایسی زمینوں پر پودوں کی پرورش بُری طرح متاثر ہوتی ہے مٹی میں پانی اور نمک کی زیادتی ایک ایسی چیز ہے جس سے فصل کی بڑھوتری اور پیداوار میں نمایاں کمی دیکھی جاسکتی ہے۔ پاکستان میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی زمینوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت سے پودے اپنے اندر قدرتی طور پر ایسی صلاحیتیں رکھتے ہیں جو انہیں ایسی زمینوں پر بہتر پرورش میں مدد کرتی ہیں۔ موجودہ مطالعہ میں ضلع فیصل آباد کے دو علاقوں ستیانہ، چک جھمرہ اور ضلع ننکانہ صاحب میں

سانگلہ بل کے سیم زدہ زمینوں پر درختوں کی پرورش اور وہاں کے لوگوں کا اپنی سیم زدہ زمینوں پر درخت لگانے کے رجحان کو دیکھا گیا۔ مطالعہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مطالعہ کے پہلے حصے میں لوگوں سے درختوں کی افادیت اور سیم زدہ زمینوں پر درختوں کو لگانے کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ دوسرے حصے میں استعمال ہونے والے پانچ مختلف درختوں کی اقسام کو شعبہ جنگلات امور چراگاہ میں اُگایا گیا۔ جب پودے سپلنگ کے مرحلے پر پہنچے تو ان کو 24 سے 96 گھنٹوں تک لگا تار پانی دیا گیا پھر ان کی بڑھوتری اور فزیالوجی کا مطالعہ کیا گیا۔ تیسرے حصے میں انہی پانچ درختوں کو منتخب کیا گیا تینوں علاقوں کی سیم زدہ زمینوں پر لگایا گیا اور ان کی بڑھوتری اور فزیالوجی کا مطالعہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے پہلے حصے میں ضلع کے تینوں علاقوں سے تقریباً 450 افراد کا انٹرویو کیا گیا تقریباً 66 فیصد اس بات پر متفق تھے کہ سیم زدہ زمینوں کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے درخت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 78 فیصد کسان اپنے سیم زدہ زمینوں پر درخت لگانے کے لیے رضا مند ہیں اور تقریباً تینوں علاقوں سے 56 فیصد لوگ اپنی ایندھن کی ضرورت درختوں کی لکڑی سے پوری کرتے ہیں۔ جواب دہندگان میں تقریباً 80 فیصد سیم زدہ زمینوں کو دوبارہ سے قابل کاشت بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کی گئی کوششوں اور منصوبوں سے مطمئن نہیں تھے۔ دوسرے حصے میں جب پانچ درختوں کو 24-96 گھنٹوں کے دورانیے کے لیے پانی دیا گیا تو دیکھنے میں آیا کہ سفیدہ کے درخت کی پرورش اور فیزیالوجیکل عمل تمام پودوں سے بہتر تھا جبکہ تیسرے حصے میں جب انہیں پودوں کو قدرتی سیم زدہ زمینوں پر لگایا گیا تو ان کی پرورش اور بڑھوتری کا رجحان کچھ اس طرح رہا۔ سفیدہ، ویلو، پاپلر، جامن اور شیشم اس پوری تحقیق سے یہ بات سامنے آئی اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کسان درختوں کی افادیت سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ انہیں درختوں کے کلر زدہ زمینوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کردار کا بھی اچھی طرح علم ہے جن پانچ درختوں کو مختلف دورانیے کے لیے پانی دیا گیا ان میں سے سفیدہ کے درخت میں سب سے اچھی بڑھوتری دیکھنے میں آئی جبکہ ویلو اور پاپلر بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ تجربے کے لیے مختص کئے گئے علاقوں میں سب سے زیادہ سیم زدہ زمینیں چک جھمرہ میں تھیں۔ یہ تحقیق سیم زدہ زمینوں پر درخت لگائے اور درختوں کے انتخاب اور خاص طور پر ایگرو فارسٹری سسٹم کے ذریعے ایسی زمینوں کی اصلاح میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی اور مستقبل میں اس طرح کے مزید تجربے کسانوں کو اپنی خراب زمینوں پر مدافعت والے درخت لگانے اور معاشرتی و معاشی حالات بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

نینو میٹرلز کا حیاتیاتی و طبی اطلاق

پی ایچ ڈی سکالر: کنول اختر نگران: ڈاکٹر محمد یاسر جاوید شعبہ: فزکس

آج کل کی تحقیق کا مرکزی سوال نینو میٹرلز کا بنانے سے ان کے اطلاق کرنے لٹک کے چکر کو سمجھنا اور پھر دوبارہ استعمال ہے۔ محققین نینو میٹرلز بنانے کے مختلف طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ جب نینو میٹرلز کا حیاتیاتی و طبی اطلاق کرنا ہو تو یہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ نینو میٹرلز کا جسم میں داخل کرنا تو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے مگر اخراج جانداروں کے حیاتیاتی عوامل پر منحصر ہوتا ہے یہ مقالہ دراصل نینو میٹرلز کے مکمل افعال کو سمجھنے کیلئے لکھا گیا ہے جو کہ مختلف نامیاتی تہوں کے بننے سے شروع ہوتا ہے مزید اس مقالہ میں آئرن آکسائیڈ، کوبالٹ اور میکینز ڈوپڈ آئرن آکسائیڈ کے نینو پارٹیکلز بنانے، جانچنے اور ان کے زہریلے پن کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اسکے علاوہ ماڈل حیاتیاتی میڈیم میں نینو پارٹیکلز کے اثر کی جانچ پڑتال اور ایپوفریٹین میں ان کے دوبارہ بننے کا بھی مطالعہ کیا گیا ہے۔ دراصل آئرن اور اس کے مختلف اقسام کے بنیادی نینو میٹرلز کی بہت سی حیاتیاتی و طبی اطلاقیات ہوتی ہیں۔ مثلاً حرارتی ثالث (جو کہ مقناطیسی کثیر الاحرارتی، خلیات کی علیحدہ گی، تقسیم ادویات اور مقناطیسی گونج مخالف ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے) کے کم زہریلے پن، منفرد مقناطیسی خصوصیات اور حیاتیاتی تنزلی کی وجہ سے نینو میٹرلز کا محفوظ اور موثر استعمال جانچنے کیلئے ان کی بناوٹ اور افعال میں تعلق جاندار اجسام میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس مقالہ میں تحقیقاتی کام چار مراحل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ آئرن آکسائیڈ اور ٹیٹل والے آئرن کی بنیاد کے نینو میٹرلز بنانے اور ان کی خصوصیات جاننے پر مشتمل ہے۔ دراصل نمونوں کے تین سلسے تیار کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر سلسلہ بیڑ پیگ اور سڑک تہوں والے نینو پارٹیکلز پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر سلسلہ بیڑ پیگ اور سڑک تہوں والے نینو پارٹیکلز پر مشتمل ہے۔ ہیماٹائٹ کی بنیاد والا آئرن، میکینز ڈوپڈ آئرن آکسائیڈ اور کوبالٹ فیرومائیٹ کے نینو پارٹیکلز کی کمیائی کو پرسیسٹن کے ذریعے تیار کیے گئے تاکہ نینو پارٹیکلز کی مختلف اشکال حاصل کی جاسکیں۔ مزید برآں ان بنائے گئے نینو پارٹیکلز کی خصوصیات کی جانچ

پڑتال کی لئے ایکس رے ڈفریکشن (XRD)، سکننگ الیکٹران مائیکروسکوپ (SEM)، ٹرانسمیشن الیکٹران مائیکروسکوپ (TEM)، وائبرینگ سپیٹل میگنیٹو میٹر (VSM)، ڈائنامک لائیٹ سکیٹرنگ (DLS)، انرجی ڈسپرسو سیکر و سکوپ (EDX)، فاریر تارنمین الیکٹران مائیکروسکوپ (FITR)، اور یودی وز سپیکٹرو سکوپ (UV-Vis)، کا استعمال کیا گیا ہے۔ جن کی مدد سے نیو پارٹیکلز کی مختلف صورتیں اعلیٰ میندانی مقناطیسیت اور قوت ماسک کی گرتی ہوئی مقداروں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ہمارے مطالعہ کا دوسرا مرحلہ ان تینوں گروہوں کے صحیح زہریلے پن کو بیز اور تہہ والے نیو پارٹیکلز کے ساتھ جانچنے کی بنیاد پر مشتمل ہے۔ جگر، گردے اور خون کے خلیوں کی گنتی میں تبدیلی کو جانچنے کیلئے ان نیو پارٹیکلز کو جسم میں داخل کیا گیا۔ اور ان کا اثر جسم کے مختلف افعال پر جانچنے کیلئے چوبیس گھنٹے اور آٹھویں دن کے نمونے اکٹھے کئے گئے۔ نتیجتاً چوبیس گھنٹے ایک سرسری اضافہ دیکھا گیا لیکن آٹھویں دن کے مشاہدے میں کوئی واضح تبدیلیاں اور خلیاتی نقصانات نہیں ہوئے۔ بیز پیگ اور سڑک تہوں والے نیو پارٹیکلز میں سے پیگ والوں نے زیادہ حیاتیاتی صلاحیت دکھائی جو کہ اس کی دیرینہ تنزلی والے فعل سے ہوا۔ تیسرے مرحلے میں ان تمام نیو پارٹیکلز کو محلولوں میں داخل کر کے مطالعہ کیا گیا۔ تنزلی کے عمل کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے درجہ بدرجہ طریقہ کار پر نیو پارٹیکلز کے کیمیائی مرکبات کے لیے تجربات کئے گئے تاکہ نیو پارٹیکلز کے ڈرامی طور پر حل ہو جانے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانے نے انکی تیکنیکی خصوصیات کو کافی حد تک متاثر کیا۔ چھوٹے مرحلے میں لیبارٹری میں تیار شدہ محلولوں میں ایپوفرٹین کو داخل کر دیا گیا۔ نیو پارٹیکلز سے مختلف قسم کی آنز کی منتقلی کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار شدہ بیز نیو پارٹیکلز اس محلول میں شامل کر کے مختلف اوقات پر نمونے اکٹھے کر کے آنز جمع رکھنے کی صلاحیت کو جانچا گیا۔ ایپوفرٹین سے جاز بیت کے اشارے ملے جنہوں نے دھاتی آنز کے ساتھ اضافی پھرتی دکھائی جو کہ نیو پارٹیکلز سے منتقل ہوئی تھی۔ یہ مطالعہ نیو پارٹیکلز کے بناوٹ سے لیکر دوبارہ بننے تک کے عمل پر مکمل نظر رکھتا ہے۔ اور دوسرے نیو میٹریلز کے مکمل حیاتیاتی چکر کے مطالعہ کے لیے بھی مدلیں ثابت ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں مزید ایسے اور مقالات کی بھی ضرورت ہے۔ جس میں جانوروں میں نیو پارٹیکلز داخل کرنے کے بعد ان کے جسم کے کچھ حصے جیسا کہ جگر اور گردے کی بھی مختلف خصوصیات کو جانچا گیا ہو۔

گندم میں خشک سالی کے خلاف مدافعت کے لیے این ایف وائے (NF-Y) جینز کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: عمر افتخار خاں نگران: ڈاکٹر محمد تحسین اظہر شعبہ: افزائش نسل نباتات و جینیات

خشک سالی اور فصلات کی صحیح نشوونما کے لئے پانی کی مطلوبہ مقدار کا میسر نہ ہونا ایک عالمی مسئلہ ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے ہر سال بیشتر فصلات کی طرح گندم اور دیگر اجناس کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ گندم کو پاکستان کی زراعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ یہ کروڑوں لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر غذائی ضروریات پوری کرتی ہے۔ یہ قومی طور پر زراعت کی قدر میں 8.7 فیصد اضافہ کے ساتھ ملکی مجموعی داخلی پیداوار کا 1.7 فیصد بنتی ہے۔ خشک سالی اور پانی کی کمی کے پیش نظر اشد ضرورت ہے کہ گندم کی ایسی اقسام پیدا کی جائیں جن کو نشوونما کے لیے کم سے کم پانی درکار ہو جبکہ وہ کم پانی استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکیں۔ گندم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے حوالے سے این ایف وائے (NF-Y) جینز خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس تحقیق میں ان ہی جینز کے کردار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گندم کی ایک سو ایک (101) مختلف اقسام کا خشک سالی کے خلاف قوت مدافعت کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ جس کے مطابق کچھ اقسام کو زیادہ قوت مدافعت کی حامل پایا گیا۔ ان اقسام میں 29SAWSN11-12(1014) اور Chakwal-50 سر فہرست ہیں۔ بعد ازاں منتخب کردہ اقسام کو Line X Tester کے طریقہ کے تحت اختلاط کروا کر حاصل ہونے والی 28 دوغلی اقسام (ہائبرڈز) کا خشک سالی اور عام حالت، نیز دونوں حالات میں جائزہ لیا گیا۔ اس جائزہ کے مطابق تین دوغلی اقسام 29SAWSN11-12(1014) X Nax-2(5924)، Chakwal-50 X Nax-2(5924) اور 29SAWSN11-12(1014) X K-65 قوت مدافعت کے اعتبار سے سر فہرست ہیں۔ مذکورہ تجزیہ کے ساتھ ساتھ آبائی اقسام اور دوغلی اقسام دونوں NF-Y جینز کی موجودگی کے حوالے سے جینیاتی تجزیہ بھی کیا گیا۔ نیز یہ پتہ چلا گیا کہ کس منتخب قسم میں کون سا NF-Y جین موجود ہے اور کیا اس NF-Y جین کا خشک سالی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں کوئی کردار ہے یا نہیں۔ چھ عدد (6) ایسے NF-Y جینز جو کہ گندم کو قوت مدافعت دیتے ہیں، پہلے ہی دریافت ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس تحقیق کے پیش نظر ساتواں NF-Y جین جس کا نام Traes-2BS-F23D9EA93.1 ہے، دریافت کیا گیا۔ اس کے علاوہ Line X Tester تجزیہ کے تحت منتخب کردہ اقسام کی خاص و عام کمباؤنگ ایبلٹی کا بھی حساب

لگایا گیا۔ پلانٹ بریڈرز اس تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات کو گندم کی ایسی اقسام پیدا کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جو خشک سالی کے خلاف قوتِ مدافعت رکھتی ہوں اور پانی کی مطلوبہ مقدار کی عدم دستیابی کے باوجود اچھی پیداوار دے سکیں۔

کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی غذائی بار

پی ایچ ڈی سکالر: سدرہ جبین نگران: ڈاکٹر نزہت ہما شعبہ: بیٹھل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

وقت کے ساتھ ساتھ بیماری زندگی کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے طریقوں میں تبدیلی آرہی ہے جو کام ہاتھوں اور گھٹنوں میں ہوتا تھا اب مشینوں کے ذریعے منٹوں میں ہو رہا ہے۔ کھانے میں غذائیت سے بھرپور بارکارواج مقبول ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو مختلف اقسام کی بارمیں گی جو کہ جسم کی غذائی ضرورت کو کسی حد تک پورا کرتی ہیں۔ یہ بار مختلف گروہ کے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جس میں سرفہرست خلا بار کوہ پیا کو سر کرنے والے، کھلاڑی مسافر اور غذائیت کے متعلقہ بیماریوں کو ختم کرنے کیلئے بھی ہیں۔ وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے موجودہ تحقیق میں غذائیت سے بھرپور ایک بار تیار کی گئی ہے جو کھلاڑیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی اور ان کے پٹھوں کو مضبوط کرے گی۔ اس بار کو بنانے سے پہلے، کھلاڑی کی روزانہ ضرورت، مختلف پھلوں اور اجناس کی اجزائے ترکیبی کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ موجودہ بار کے لیے کھجور اور خوبانی کو پھلوں میں سے نشاستہ کو ذریعہ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنیر اور دودھ سے حاصل ہونے والی لحمیات کو، لحمیات فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چنے اور چاول کے آٹے کو تمام اجزاء کو مختلف تناسب سے ملا کر بہت ساری بار بنائی گئیں۔ ان مار کو سب سے پہلے کھا کر تشخیص کیا گیا جس میں سے ایک بار جو سب کو بہت زیادہ پسند آئی اس کا انتخاب کیا گیا۔ اس بار کے غذائی تجزیہ سے یہ بات ایسا ہوئی کہ اسکے استعمال سے ہمیں کافی مقدار میں نشاستہ، حیاتین، لحمیات اور نمکیات موجودہ ہیں۔ بار کی افادیت معلوم کرنے کے لیے کچھ رضا کار کھلاڑیوں نے حصہ لیا ان کھلاڑیوں کو یہ باتیں دن تک صبح شام کھلائی گئی۔ افادیت معلوم کرنے کے لیے تحقیق میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کا خون پہلے دن درمیان میں اور آخر میں لیا گیا۔ خون کی تشخیص سے یہ معلوم ہوا کہ بار کھانے والے کھلاڑیوں کے خون میں بہتری آئی۔ ان کھلاڑیوں کی نسبت جن کو نہیں کھلائی گئی تھیں۔ کھلاڑیوں کی بھاگنے کی کارکردگی میں بہتری اور پٹھوں میں طاقت آئی۔ اس ساری تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی کہ غذائی بار کھلاڑیوں کی کارکردگی کے لیے بہت اہم ہے مزید یہ کہ اس کی پیکنگ کو بہتر کرنے کے بعد اسکو مارکیٹ کیا جاسکتا ہے جس سے جم اور کلب کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔

خواتین کا زراعت میں کردار اور درپیش مسائل

پی ایچ ڈی سکالر: درشہوار نگران: ڈاکٹر اظہار احمد خاں شعبہ: رورل سوشیالوجی

پاکستان میں مروجہ معاشرتی اور ثقافتی رہن سہن کی وجہ سے خواتین منفی امتیاز کا شکار ہیں۔ خواتین کی صورتحال کا مقابلہ مردوں کے مقابلے میں عام محکوم ہے کلاسوں، علاقوں اور دیہی اور شہری تقسیم کے لحاظ خواتین کو با اختیار بنانا ایک اہم مسئلہ ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانے میں مختلف عوامل ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں جن میں خود مختاری، آمدنی پر کنٹرول، مسائل پر قابو اور قیادت کی کمی شامل ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اسکی معیشت زراعت پر مبنی ہے 70 فیصد آبادی زراعت سے منسلک ہے خواتین پاکستانی آبادی کا نصف حصہ بناتی ہیں۔ بہتر معیشت کے حصول کے لیے ان کو با اختیار بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے پنجاب کے دیہی علاقوں میں خواتین کی صورتحال کی جانچ کے لیے ایک Index استعمال کیا گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یو ایس۔ ایڈن باہم تیار کیا ہے۔ اس تحقیق کے لیے مخلوط طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی مقداری اور معیاری بنیادی اعداد شمار پنجاب کے تین علاقوں وسطی، شمالی، جنوبی سے اکٹھے کئے گئے تھے۔ ہر خطے سے ایک ضلع کو منتخب کیا گیا تھا۔ مزید ہر ضلع سے ایک تحصیل اور اسکے بعد منتخب تحصیل سے چار گاؤں کو تصادفی طور پر منتخب کیا گیا۔ اس تحقیق کے لیے 300 گھرانوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا۔ زراعت کے شعبے میں کام کرنے والے مرد اور خواتین سے مواد اکٹھا کیا گیا۔ اس طرح کل کل کر 588 جواب دہندگان کا نمونہ بنا 12 گھرانے میں سربراہ صرف کو تین

18 فوکس گروپ ذاتی شاہدہ کے ذریعے سے کئے گئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پنجاب کے تینوں صوبوں میں خواتین زراعت میں جو با اختیار نہیں ہیں۔ وسطی پنجاب جس میں سے جنگ کا تصاریف طور پر انتخاب کیا گیا تھا کے نتائج 0.034 ہیں۔ پانچ ڈوین آف اینیما منٹ کی ویلیو 0.689 اور جہنڈ رپیریٹی انڈیکس ویلیو 0.686 ہے جنوبی پنجاب جس میں ڈیرہ غازی خان کا تعاریف طور پر انتخاب کیا گیا تھا۔ کے نتائج 0.518 ہیں۔ پانچ ڈوین آف اینیما منٹ ویلیو 0.498 اور جہنڈ رپیریٹی ویلیو 0.782 ہے۔ شمالی پنجاب میں سے چکوال کا انتخاب کیا گیا تھا۔ جس کے نتائج 0.745 اور 0.5DE ویلیو 0.745 اور GPI ویلیو 0.598 ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں اپنے گھر میں مردوں اور وسطی اور جنوبی پنجاب میں اپنے گھر میں مردوں اور خواتین کے درمیان کو با اختیار بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ آمدنی اور وسائل پر اختیار نہ ہونا ہے۔ خواتین کو تحقیقی شعبوں میں آمدنی پیدا کرنے کی مزید مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں۔ تعلیم میں بھی صنعتی تعاون کو ختم کیا جائے۔ مزید برآں تجویز کیا جاتا ہے کہ مردوں اور خواتین میں ان کے حقوق کے بارے میں شعور اجاگر ہو۔

پاکستان میں زرعی پانی کی قلت کی وجوہات اور اس کے اثرات

پی ایچ ڈی سکالر: محمد اویس علی خان نگران: ڈاکٹر خالد محمود چوہدری شعبہ زرعی ادارہ توسیع، تعلیم اور دیہی ترقی

پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر منحصر ہے لیکن اسے پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے حالیہ پی ایچ ڈی مطالعہ میں کاشتکار برادری کے معاشی و اقتصادی حالات اور زراعت کے استحکام پر پانی کی کمی کے اثرات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس مطالعے میں پانی کی قلت کے تفصیلی اثرات کے جائزے کے لیے ضروری اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے 370 جواب دہنگ شامل تھے۔ وضاحتی اور غیر معقول اعداد و شمار کے تجزیے کے ذریعے یہ پایا گیا۔ کہ بہتر معاشرتی اور معاشی حالت رکھنے والے کسانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر کمزور افراد کے مقابلہ میں بہتر انداز میں پانی کی قلت کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید مطالعہ کے دوران کھیت کی سطح پر نہری پانی کی کمی کی وجہ بننے والے مختلف عوامل مرتب کیے گئے۔ نتائج سے واضح ہے کہ ان مختلف عوامل میں، درجہ حرارت میں اضافہ، کسان کی خراب معاشی و اقتصادی صورتحال، غیر یقینی بارش، ورا بندی (نہری پانی کی تقسیم کا نظام)، فصلوں میں پانی کا غیر مساوی استعمال، نہروں میں پانی کی کم دستیابی اور آبپاشی نظام میں اداروں کی ناقص کارکردگی آبپاشی کے پانی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ نہر کے پانی کی قلت اس خطے میں کاشتکاروں برادری کے معاشی حالات کو متاثر کر رہی ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اگر کہ اگر ان کو ضرورت کے مطابق نہر پانی مل رہا ہوتا تو وہ 300,000 پاکستانی روپے تک کا قاعدہ حاصل کر سکتے تھے۔ نہر پانی اس کی اصل کی وجہ سے سب سے زیادہ زرخیز سمجھا جاتا ہے نہر کے پانی میں کافی غذائی اجزاء ہیں جو مصنوعی کھاد کی مزید یہ نہری پانی کے استعمال سے مصنوعی کھاد کی ضرورت کم پڑتی ہے جو نہ صرف لاگت کو کم کرتی ہے بلکہ مٹی کی زرخیزی اور صحت کے استحکام کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ زیر زمین پانی اور گندے پانی کا استعمال نہری پانی کی دستیابی کی کمی کی صورت میں دیکھا گیا جو مٹی کی زرخیزی کی سطح میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ کسان جن کو نہری پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ان فصلوں کی پیداوار میں واضح کمی دیکھی گئی۔ اس طرح خالص منافع میں بھی کمی دیکھی گئی۔ جو کاشتکار برادی کے سماجی و معاشی حیثیت میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہے نہر کے پانی کی بدانتظامی، زیادہ استعمال، غیر مساوی تقسیم، کسانوں کی ناخوانگی، غیر تعمیر شدہ کھالہ اور نا پختہ نہروں، سیاسی اثر و رسوخ پانی کی قلت کے عوامل تھے۔ فصلوں کے پانی کی ضرورت کا اندازہ کرنے کے لیے کاشتکاروں کو تعلیم دینے اور اس کے مطابق آبپاشی کے پانی کے استعمال کو بہتر طریقے سے یقینی بنانے کے لیے پالیسیوں کی ضرورت ہے اس میں سرکاری اور نجی زراعت توسیع کا عملہ اور واٹر مینجمنٹ اداروں کا مشترکہ کام شامل ہو سکتا ہے۔ پانی کی چوری کی نگرانی، کسانوں اور واٹر مینجمنٹ ادارہ کے مابین باہمی اشتراک کے ساتھ مضبوط پالیسیوں سے اس مستقل مسئلے کا فوری حل نکل سکتا ہے آخر میں اضافی پالیسیاں پانی کی فراہمی، حفاظت اور طلب و رسد میں استحکام کو بہتر بننے پر روز دے رہے ہیں جو مستقبل کی زراعت کی ترقی کی کوششوں میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ فصلوں کو خشک سالی سے بچنے والی اقسام کی ترقی اور پانی کے ہمیشہ کے تحفظ کے لیے ایک اور سودمند طریقہ ہو سکتا ہے ان علاقوں میں جہاں زمینی پانی کا معیار بہتر نہیں ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے زمینی پانی کی آلودگی کی وجوہات کی اور فصلوں کے متبادل نظام کی تشکیل کی جانی چاہیے اور تحقیقی اداروں کی ذریعہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے موثر پھیلاؤ کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسانوں کو بہتر آمدنی حاصل کرنے کے قابل بنایا جاسکے۔

دفتر کتب رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت

تعلیمی و تحقیقی مفید مطبوعات کسان بھائیوں اور تحقیق کاروں کے لیے دستیاب ہیں جو حسب ضرورت بذریعہ مئی آرڈر منگوائی جاسکتی ہیں۔

نمبر شمار	عنوان (مفلس)	قیمت (علاقہ ڈاک خرچ)
45-	رہنما کتا پچ: آم کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کا مناسب استعمال	20/-
46-	ترشادہ پھلوں کی تصدیق شدہ نرسری کی داغ بیل اور گلوں میں بیماری کا رجحان	25/-
47-	ترشادہ پھلوں کے باغات کی دیکھ بھال کے چند رہنما اصول	30/-
48-	گاڑی کی کاشت اور بیج کی پیداوار	25/-
49-	آپاشی کے ساتھ کھادوں کا استعمال فریکیشن	20/-
50-	ترشادہ پھلوں اور مردہ کی صحت مند نرسری لگانے کے لیے ماڈل نرسری کا قیام	15/-
51-	زرعی مقاصد کے لیے کھارے پانی کے استعمال کی ترکیبات	25/-
52-	منہ پرے کا پوڈو دودھ کی پیداوار بڑھاؤ	10/-
53-	چارے کی مسلسل فراہمی کیوں اور کیسے؟	25/-
54-	بائس کی کاشت	15/-
55-	ترشادہ پھلوں پودوں میں بذریعہ ٹاپ درنگل اقسام کی تبدیلی	15/-
56-	قدرتی طریقے سے تیار شدہ خشک مچھور	20/-
57-	جانور کے لیے پیروس	20/-
58-	سالانہ کیلنڈر: آم کے باغات کی دیکھ بھال	20/-
59-	سالانہ کیلنڈر: ترشادہ باغات کی دیکھ بھال	20/-
60-	گائیڈ ولس کی کاشت: منافع بخش کاروبار	20/-
61-	آلو کی کاشت	40/-
62-	گل داؤبی کی نگہداشت سالانہ کیلنڈر	20/-
63-	گلاب کی نگہداشت سالانہ کیلنڈر	20/-
64-	دودھ کی پیداوار بڑھانے کا عملی پروگرام	20/-
65-	دیکھ کا تدارک	20/-
66-	پاکستان میں پنجاب کے مختلف علاقوں کے کارآمد درخت	20/-
67-	کچن گارڈننگ	20/-
68-	سڑا ہیری کی کاشت، نگہداشت اور برداشت	30/-
69-	دفتر 2030ء (زرعی ترجیحات، نصب العین اور لائحہ عمل)	50/-

نمبر شمار	عنوان (خصوصی شمارہ جات)	قیمت (علاقہ ڈاک خرچ)
1-	ڈیری پروڈکشن (ڈیری گائیڈ)	350/-
2-	کبیری مصنوعات، پھلوں اور سبز یوں کو محفوظ کرنا	150/-
3-	پریکٹیکل ڈیری فارمنگ	150/-
4-	ماڈرن پلٹری پروڈکشن (پلٹری گائیڈ)	180/-
5-	بھینٹ بکریاں پالنا	150/-
6-	کپاس کی کاشت	50/-
7-	گندم کی کاشت	70/-
8-	دھان کی پیداواری ٹیکنالوجی	40/-
9-	شجر کاری بدلتے ہوئے ماحولیاتی تناظر میں	60/-
10-	سبز یوں کی کاشت	160/-
11-	کماؤ کی کاشت	60/-
12-	پھلوں کی کاشت	140/-

علاقہ ازیں شعبہ تصنیف و تالیف (OUBM) کے زیر اہتمام سہ ماہی زرعی ڈائجسٹ شائع کیا جاتا ہے جس کے ریکورڈر کے قیمت 60/- روپے، سنوڈنٹس سالانہ ممبرشپ -200 روپے، بشمول ڈاک خرچ، سالانہ عام ممبرشپ -300 روپے بشمول ڈاک خرچ جبکہ لائف ٹائم ممبرشپ -5,000 روپے بشمول ڈاک خرچ ہے۔ ممبرشپ کے لیے مئی آرڈر نام انچارج شعبہ تصنیف و تالیف (OUBM)، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ارسال کر دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود ہمارے ممبر بنیں گے بلکہ دیگر کاشتکار حضرات کو بھی اس کی ممبرشپ حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پاکستان بھر میں مطبوعات منگوانے کے لیے دی گئی قیمتوں کے ساتھ ڈاک خرچ بھی ارسال کریں۔

فون نمبر 3405 Ext. 041-9200161-70، ای میل ایڈریس oubmuaf@gmail.com

نمبر شمار	عنوان (مفلس)	قیمت (علاقہ ڈاک خرچ)
1-	زراعت۔ وسائل، مسائل اور مستقبل (ایک جائزہ)	30/-
2-	بکریوں میں مصنوعی نسل کشی	25/-
3-	بکری کی اقسام اور ان کی کاشت	20/-
4-	راہنمائے کاشتکاران مچھور	30/-
5-	گاڑی کی کاشت: سمجھت مند اور منافع بخش	15/-
6-	پیاز کی پیداواری ٹیکنالوجی	20/-
7-	سارٹ فاسفوری کھادیں	20/-
8-	یو ایف 11	10/-
9-	تھوڑا بڑھ زمین کے لیے اصلاحی طریقے دیکھنا لو جی (نفع بخش کاشت)	25/-
10-	کھارے پانی کے استعمال سے تھوڑا بڑھ زمین میں کاشت دھان اور گندم کی پیداوار	10/-
11-	آم۔ پھلوں کا بادشاہ	50/-
12-	امروہ کی بیماریاں سے پاک نرسری لگانے کے جدید طریقے	15/-
13-	کھارے پانی کے لیے غذائی غذائیں اور فصل (قیما)	15/-
14-	سونا بچنا: فصلوں میں قوت مدافعت اور پیداوار بڑھانے کا قدرتی آسان اور سستا طریقہ	15/-
15-	سلی میرین: امراض جگر میں امید کی کرن	10/-
16-	گل اشرفی	10/-
17-	یو بی مائیکرو اور (زیادہ پیداوار، بہتر کوئی اور صحت مند خوش ذائقہ پیداوار کے لیے صاف پانی)	15/-
18-	قریبانی کے جانور: خرید و نگہداشت اور ذبح کرنا	15/-
19-	کھجور کی اقسام	25/-
20-	ماٹ کر اس بے مثال چار	15/-
21-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں نمائندگی کاشت	15/-
22-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں موسم گرما کی سبزیوں کی کاشت	10/-
23-	کھڑوہ زمینوں میں سبزیوں کی کاشت کے لیے سفارشات	20/-
24-	فٹل میں کھیرے کی کاشت	15/-
25-	ترشادہ باغات میں جڑی بوٹیوں کا تدارک اور فریکیشن	25/-
26-	ترشادہ باغات میں آپاشی بذریعہ ڈرپ آرکلیشن	20/-
27-	پاکستان میں ترشادہ پھلوں کے امراض اور ان کا انسداد	10/-
28-	بھینڈی کے بیج کی فصل	20/-
29-	سی اے ٹیکنالوجی	15/-
30-	مڑ کے بیج کی فصل	20/-
31-	آبیٹر مشروم کی کاشت	60/-
32-	بٹن مشروم کی کاشت	20/-
33-	موسم میں سوزش جیوانی کی تشخیص علاج اور درجہ تمام کا ایک عملی پروگرام	15/-
34-	جانوروں کی صحت اور افزائش سے متعلق اہم سفارشات	15/-
35-	دو جیل جانوروں کی خوراک سے متعلق مفید مشورے	15/-
36-	جانوروں کی خوراک میں یوریا کھاد کا استعمال (شیرہ یوریا پاک)	15/-
37-	پاکستان میں نہری پانی کی کمی، اثرات اور احتیاطی تدابیر	15/-
38-	شہروں سے خارج ہونے والے فائو پانی کا آپاشی کے لیے استعمال اور اس کے نقصانات	15/-
39-	خیرہ چار	15/-
40-	پاکستان میں لگائی جانے والی خوبانی کی اقسام	20/-
41-	تعمیراتی موسمی حالات میں بھینڈی توری کی کاشت	15/-
42-	فٹل میں مچھور کی کاشت	20/-
43-	نمائندگی میں کاشت	15/-
44-	کھارے پانی سے فصلات کی کاشت اور تھوڑا بڑھ زمین کی اصلاح	10/-