

زنگ شاخسار

ترجمان زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اپریل تا جون 2023ء



- جامعہ زرعہ کی جانب سے پاکستان میں کوریا کے سفیر ڈاکٹر سونگ جون ہیون کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا کرنے کے لیے پیشکش کا نوٹیشن کا انعقاد
- زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں D-8 ممالک کے بین الاقوامی ریسرچ سنٹر کا قیام
- جامعہ زرعہ فیصل آباد میں جشن بہاراں کی رنگارنگ تقریبات
- جامعہ زرعہ کا 26 واں کانووکیشن
- جامعہ زرعہ کے سائنسدانوں نے گنے، بھنڈی توری اور چپاکی ترقی دادہ اقسام متعارف کروادیں



شعبہ تصنیف و تالیف ، جامعہ زرعہ فیصل آباد



جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، امریکی سائنسدان ٹونی بلیٹک، ڈاکٹر شکیل خاں، ڈاکٹر انجم علی، ڈاکٹر عرفان افضل و دیگر زرعی یونیورسٹی میں منعقدہ مقامی ریڈ انڈسٹری کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں




رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈین انٹیل ہیمنڈری ڈاکٹر قمر بلال، ڈاکٹر ریاض احمد و رک، مفتوح الرحمن و دیگر فیکلٹی آف انٹیل ہیمنڈری کے زراعت تمام کاروباری مہارتوں پر سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



کینیڈا کے پارلیمنٹریئر کرس ہولٹن، آصف محمود، بیکری زرعت پنجاب و اصحت خورشید، رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، امریکی سائنسدان ٹینیسی ایبلن، سید فخر امام و دیگر زرعی یونیورسٹی میں مرکز برائے اعلیٰ تعلیم کے سائنسدانوں سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) کانٹینٹل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد کے 36 ویں منڈیبریر مینجمنٹ کورس کے وفد کے ساتھ گروپ فوٹو



رجسٹرڈ ایل نمبر 7793 جلد نمبر 58 شمارہ نمبر 2

زمین و آسمان

ISSN 2521-0416

اپریل تا جون 2023ء

سرپرست اعلیٰ

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)
وائس چانسلر

ڈاکٹر شوکت علی ایسٹ پروفیسر

مدیر / انچارج شعبہ تصنیف و تالیف

ممبران

پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال
پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ سعدیہ
ڈاکٹر بلقیس فاطمہ
ڈاکٹر محمد اقبال
ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان
ڈاکٹر عرفان فضل
ڈاکٹر محمد دلدار خاں گوگی
ڈاکٹر محمد سہیل ساجد
ڈاکٹر محمد عتیق
ڈاکٹر بنیش اسرار

ترتیب و تدوین

مظفر حسین سالک ریسرچ آفیسر
محمد آصف یونیورسٹی آرٹس/گرافک ڈیزائنر
عظمت علی آرٹسٹ
محمد اسماعیل آفیس اسٹنٹ
محمد امین، آصف محمود اردو ٹائپسٹ
قیصر محمود معاون
پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف پرنسپل آفیسر، پی آر پی
ممتاز علی اسٹنٹ رجسٹرار، انچارج یونیورسٹی پریس
احمد شہریار پبلک ریلیشنز آفیسر، پی آر پی
ڈاکٹر شازیہ رمضان انتخاب آیات و احادیث
سیف اللہ زاہد عکاسی

شائع کردہ:



شعبہ تصنیف و تالیف
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

لائسنس نامبر 5000 روپے
سالانہ نمبر 300 روپے
سٹوڈنٹ نمبر 200 روپے

Contact: 041-9200161-69 Ext. 3405
email: oubmuaf@gmail.com www.uaf.edu.pk

فہرست

اداریہ	03	اپنی بات	ڈاکٹر شوکت علی
رپورٹ	04	گورنر ہاؤس لاہور میں جامعہ زرعیہ کے زیر اہتمام پاکستان میں کوریائے سفید ڈاکٹر سونگ جون ہیون کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کے حوالے سے خصوصی کانفرنس کا انعقاد.....	ادارہ
	06	بین الاقوامی کانفرنس بعنوان ”ڈی ایٹ ممالک میں غذائی استحکام کے چیلنجز اور مواقع“.....	ادارہ
	08	زرعی یونیورسٹی کے 26 ویں کانفرنس کا انعقاد.....	ادارہ
	09	زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جشن بہاراں کی تقریبات.....	ادارہ
	10	بھینوں کے دودھ اور خوبصورتی کا مقابلہ.....	ڈاکٹر محمد قمر بلال
	12	پھولوں کی نمائش.....	ڈاکٹر عدنان یونس
	14	تین روزہ نیزہ بازی چیمپئن شپ.....	عامر سعید رانا
	16	خوبصورت پرندوں کی نمائش اور اس کے اغراض و مقاصد.....	ڈاکٹر فواد احمد
	19	آل بریڈ چیمپئن شپ ڈاگ شو کا انعقاد.....	ڈاکٹر بلال اسلم
	20	سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام پانچ روزہ لائپور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول.....	ادارہ
	22	انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے زیر اہتمام گھریلو کھانے کی مصنوعات کے مقابلہ جات.....	ادارہ
	22	جامعہ زرعیہ کے سائنسدانوں کی متعارف کردہ گنے کی زیادہ پیداواری استعداد کی حامل دو اقسام.....	ادارہ
	23	زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں کی متعارف کردہ بھنڈی اور چپائی کی زیادہ پیداواریت کی حامل نئی ورائیٹرز.....	ادارہ
	23	پیچت ہال وارڈن آفس اور ڈیزائننگ آفس کے زیر اہتمام انٹر ہاٹل سپورٹس گالا کا انعقاد.....	ادارہ
	25	سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام گز مینٹل کا انعقاد.....	ادارہ
	27	سیلاب اور زرعی اراضی کی بحالی.....	پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)
ٹیکنالوجی برائے فصلات	29	جوار کی پیداواری ٹیکنالوجی.....	ڈاکٹر عمران خان
	30	بھوری پشت والا تیل (براؤن پلانٹ ہاپر)، دھان کلاشمن کیڈ اور تدارک.....	ڈاکٹر زین العابدین
	32	پاکستان میں دوائی اقسام کے چاروں کی کاشت - سال بھر سبز چارے کی فراہمی کا ذریعہ.....	آصف اقبال
ہارٹیکلچر	33	پھول گوہی کی اگیتی کاشت.....	ڈاکٹر محمد عرفان اشرف
	35	پاکستان میں خشک میوہ جات کی کاشت اور افادیت.....	ڈاکٹر بلال سعید خاں
لائو سٹاک	39	بھینس، بہترین بلیک گولڈ: پاکستان کا دودھیل جانور.....	ڈاکٹر محمد قمر بلال
	40	فیشی پرندوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اہم معلومات.....	ڈاکٹر فواد احمد
	42	لہسی سکن کی بیماری اور حفاظتی اقدامات.....	ڈاکٹر فرزانہ رضوی
	43	لٹح بانی.....	ڈاکٹر ناصر مختار
	46	پولٹری میں پچھوندی اور انگارہ کے قوت مدافعت پر مشتمل اثرات.....	ڈاکٹر ماریہ جمیل
متفرقات	47	مچھروں کی افزائش پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ.....	محمد عبداللہ ملک
	49	پانی سے ہے عبارت بقائے حیات.....	محمد عبداللہ خاں
	50	کھیتوں میں تجربات کے دوران جامعہ زرعیہ کی طالبات کے لیے موزوں لباس کی اہمیت.....	عائشہ مشتاق
پنی ایچ ڈی ریسرچ کارز	52	اسٹرابری کی کوالٹی اور سٹوریج کو بہتر بنانے کے لیے ہاپو بیک ٹریٹمنٹ کا استعمال.....	عائشہ مریم
	53	نمٹ کے اگیتا جھلساؤ کا تدارک بذریعہ قدرتی عرقیات.....	راشد اقبال خاں
	53	بیر کی اقسام اور درجہ بندی.....	نسیم شریف
	56	سور کی فصل میں زنگ کی بائیوفورٹیفیکیشن کے ذریعے انسانی غذائیت میں بہتری.....	ناصر رشید
	57	کرومیم سے متاثرہ زمینوں کے لیے میری گولڈ کا استعمال.....	حنا احمد ملک
	57	مفید بیکٹیریا اور ہارمونز کا آلہ کی پیداواری صلاحیت اور اس میں آئرن کی مقدار بڑھانے میں کردار.....	زین مشتاق
	58	مکئی کی فصل پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات.....	صائمہ مصدق
	59	کپاس میں پچھوندی اور نیماٹوڈ کے اشتراک سے ہونے والا مہلک.....	مہوش ناز
	60	پنجاب میں مختلف وقت کاشت اور کپاس کی اقسام کا سفید مگھی اور پتہ مروڑ وائرس کے پھیلاؤ پر اثرات.....	محمد اقبال
	61	تعمیراتی عناصر سے نمکیت نکالنا.....	مبشرہ اسحاق
	62	غذائی اجناس میں زہریلے مادوں کی پیداوار روکنے کے لیے نباتاتی باقیات کے اجزاء کا استعمال.....	تہمینہ شریف
	62	دھان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے کسانوں کی تربیت.....	عمران ریاض
	63	پنجاب میں موسمیاتی تغیرات کے اثرات اور زرعی حکمت عملی.....	ضیاء محمود
	64	فضائی آلودگی کو کم کرنے میں زیائشی پودوں کا کردار.....	شمیم عمر

پبلشر ڈاکٹر شوکت علی نے زرعی یونیورسٹی پریس فیصل آباد سے چھپوا کر شعبہ تصنیف و تالیف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے شائع کیا

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گندم کی نئی ورائٹیوں کے لیے تحقیق

رواں سال گندم کی پیداوار 27.5 ملین ٹن رہی ہے۔ سیلابی صورت حال کی وجہ سے گندم کی بوائی میں مشکلات، زرعی مداخلات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، تیز ہواؤں سے گندم کا گرنا اور ژالہ باری جیسے قرائین تو حوصلہ افزاء نہیں تھے لیکن آخری مرحلے میں درجہ حرارت کی موافق صورت حال نے پانسہ پلٹ دیا اور پاکستان میں گندم کی مجموعی پیداوار 27.5 ملین ٹن تک جا پہنچی۔ گزشتہ برس پیداوار میں 30 ملین ٹن کی توقع کی جا رہی تھی لیکن آخری ہفتوں کے بلند درجہ حرارت کی وجہ سے پیداوار محض 26 ملین ٹن رہی تھی اور ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہمیں گندم درآمد کرنا پڑی جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوا۔ بدلتے ہوئے موسمی حالات کے پیش نظر ہمیں ایسی نئی ورائٹیوں کی ضرورت ہے جو زیادہ درجہ حرارت میں بھی اچھی پیداوار دے سکیں۔ ہمارے ہاں سائنس دان کئی برس سے ایسی ورائٹیاں متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو فوری، مارچ کی گرمی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں لیکن ابھی تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بریڈنگ پروگرام میں جو اقسام شامل ہیں وہ گندم کے بین الاقوامی ادارے "سمٹ" سے حاصل کی گئی ہیں۔ سمٹ سے حاصل کی گئی اقسام میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی ورائٹی تیار کی جاسکے جو زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کر سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا بریڈنگ پروگرام شروع کیا جائے جس میں شامل ہونے والی اقسام، 60 کی دہائی میں سمٹ سے حاصل کی گئی اقسام سے مختلف ہوں۔ اس حوالے سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے اور واشنگٹن سٹیٹ یونیورسٹی امریکہ سے گندم کی 40 اقسام حاصل کی ہیں جن پر تحقیق جاری ہے۔ ابتدائی تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان امریکی ورائٹیوں میں ہمارے ہاں مقامی ورائٹیوں کی نسبت درجہ حرارت برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ یعنی گزشتہ برس جب مقامی ورائٹیوں کے دانے گرمی کی شدت کے باعث سکڑ گئے تھے، ان امریکی ورائٹیوں میں دانوں کی نشوونما نارمل رہی تھی۔ ابتدائی حوصلہ افزاء نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے مزید تجربات جاری ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان تجربات سے سامنے آنے والی ورائٹیاں پاکستان میں گندم کی پیداوار بڑھانے میں سنگ میل ثابت ہوں گی۔ مزید برآں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں آسٹریلیا کے تعاون سے ایک ہائبرڈ گندم کا پروگرام بھی جاری ہے جس میں مکئی کی طرح گندم کے بھی ہائبرڈ بیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر بھی ہائبرڈ گندم کے تجربات ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی ورائٹی سامنے نہیں آسکی جس میں ہائبرڈ مکئی جیسی خصوصیات ہوں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بھی ان عالمی کاوشوں کا حصہ ہے اور ہمارے ہاں ہائبرڈ گندم پر تحقیق کے ابتدائی نتائج خاصے امید افزاء ہیں۔

امید کی جاسکتی ہے کہ آنے والے سالوں میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے بطن سے گندم کی کچھ ایسی ورائٹیاں جنم لیں گی جو پاکستان میں ایک نئے سبز انقلاب کی بنیاد رکھیں گی انشاء اللہ۔

گورنر ہاؤس لاہور میں جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے زیر اہتمام پاکستان میں کوریا کے سفیر ڈاکٹر سونگ جون ہیون کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کے حوالے سے خصوصی کانوکیشن کا انعقاد



فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کے ہمراہ اعزازی
ڈگری دی۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیمغ الرحمان نے
سابق کورین سفیر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کرنے پر مبارکباد
دی اور پاکستان میں زراعت، دیہی ترقی اور غربت کے خاتمے کے حوالے
سے سابق کوریائی سفیر کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان اور کوریا کے

گورنر ہاؤس لاہور میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے زیر
اہتمام پاکستان میں کوریا کے سابق سفیر ڈاکٹر سونگ جونگ ہیون کو
ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کے لیے خصوصی کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا
جس کی صدارت گورنر پنجاب محمد بلیمغ الرحمان نے کی۔

خصوصی کانوکیشن میں گورنر پنجاب محمد بلیمغ الرحمان نے نگران صوبائی
وزیر تعلیم منصور قادر، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن مختار احمد اور زرعی یونیورسٹی



درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں کوریا کے سفیر کے کلیدی کردار کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ معیاری تعلیم حکومت کی اولین ترجیح ہے، اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ یہ علم پر مبنی معیشت کا دور ہے۔ انہوں نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور نئی تحقیق پر زور دیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اساتذہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دیں۔

گورنر پنجاب محمد بلخس الرحمن نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آئے جس سے بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا بین الاقوامی یونیورسٹیوں اور اداروں کے ساتھ اشتراک ایک اہم پیشرفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف علم اور تحقیق کے لیے موثر روابط قائم ہوں گے بلکہ زراعت کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ یونیورسٹی فی ایگریکلچر پیداوار بڑھانے اور خوراک کی حفاظت کو

یقینی بنانے میں پیش رفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا زرعی ادارہ ہونے کے ناطے اس نے ملک کی زراعت کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سونگ جونگ ہوان نے پاکستان میں دیہی غربت سے نجات کے لیے سیول ان ڈنگ اور اس کے نتائج پر لیکچرز کی سیریز دی۔

ڈاکٹر سونگ جونگ ہوان نے کہا کہ جنوبی کوریا نیوولج مومنٹ ماڈل غربت کے خاتمے کا عالمی ماڈل بن گیا ہے۔ جنوبی کوریا گلوبل نیوولج مومنٹ پروجیکٹس کے نام پر 20 ترقی پذیر ممالک کے 92 گاؤں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نیوولج مومنٹ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ KOICA اور KOPIA پاکستان میں قائم ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہیں۔ اسنامک ڈیولپمنٹ کو آپریشن فنڈ کے تحت کچھ منصوبوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس میں پاک کوریائیو ایڈیشن سینٹر اور یو اے ایف میں ٹیکنالوجی کا حصہ شامل ہیں۔

خصوصی کانووکیشن میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈین سائنسز ڈاکٹر اصغر باجوہ، کنٹرولر امتحانات انعام قادر، رجسٹرار طارق محمود گل، پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشنز اینڈ پبلیکیشنز ڈاکٹر جلال عارف اور دیگر معززین نے شرکت کی۔



بین الاقوامی کانفرنس بمعنوان ڈی ایٹ ممالک میں غذائی استحکام کے چیلنجز اور مواقع



دینے کیلئے تمام اقدامات کئے جا رہے ہیں تاکہ مستحکم ترقی کے حصول سے خوشحالی کی نئی راہیں کھولی جاسکیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایٹ ممالک کا مجموعی طور پر جی ڈی پی میں چارٹرڈ بلین ڈالر اور برآمدات میں 1.6 ٹریلین ڈالر حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایٹ ممالک میں 1.1 ارب افراد بستے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر ساتویں فرد کا تعلق اس خطے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ زراعت، تجارت، ٹرانسپورٹیشن، انڈسٹری، توانائی، ٹورازم، صحت، ہیومن ڈیولپمنٹ اور آئی سی ٹی میں تعاون کی فضا کو پروان چڑھانے کیلئے پرعزم ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ رکن ممالک کے مابین اشتراکیت سے زراعت کو نئی جدتوں سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ غربت میں کمی بھی لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی گندم، سویا بین اور دیگر اجناس کی نئی اقسام پر پوری توانائیوں سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انسانوں، جانوروں اور ماحول کے مابین توازن کو برقرار رکھنے اور صحت کے جملہ مسائل کے حل کیلئے ون ہیلتھ کو اپنانا ہوگا

06 مارچ 2023ء کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے مرکز برائے اعلیٰ تعلیم کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس بمعنوان ڈی ایٹ ممالک میں ”غذائی استحکام کے چیلنجز اور مواقع“ کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی ڈی ایٹ تنظیم برائے اقتصادی تعاون کے سیکرٹری جنرل / سفیر اسحاق عبدالقادر امام نے کہا ہے کہ ڈی ایٹ ممالک کے مابین تعاون کو فروغ دے کر فوڈ سکیورٹی کیلئے سائنسی بنیادوں پر مزید کاوشیں عمل میں لانی ہونگی تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں زراعت کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہوا جاسکے۔ انہوں نے زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے خوراک و زراعت کی نمائندہ فلورنس رولی، پاکستان اکیڈمی آف سائنس کے صدر ڈاکٹر خالد محمود خاں، ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر محمد سرور خاں، مرکز برائے اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر لیکٹر ڈاکٹر سلطان حبیب اللہ، فارن آفس کے نمائندے بلال احمد و دیگر کے ہمراہ زرعی یونیورسٹی کے مرکز برائے اعلیٰ ڈی ایٹ تحقیقی سفر کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ رکن ممالک کے مابین اقتصادی تعاون کو فروغ



بین الاقوامی ادارہ برائے خوراک و زراعت کی نمائندہ فلورنس رولی نے کہا کہ مضبوط تحقیقی نظام، فارم کو پریٹو اور بہتر زرعی قرضوں کے ذریعے ڈی ایٹ ممالک کو درپیش زرعی مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز نے ون ہیلتھ پروگرام کا اجرا کیا ہے جس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ماہرین بھی حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بھی ان کے ون ہیلتھ پروگرام میں بھرپور شراکت کرے۔ ڈاکٹر سلطان حبیب اللہ نے کہا کہ ڈی ایٹ سنٹر کا زرعی یونیورسٹی میں قیام قابل تحسین عمل ہے۔ سیکرٹری جنرل نے وفد کے ہمراہ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچر سائنسز کے زیر اہتمام سجائی گئی پھولوں کی نمائش کا افتتاح بھی کیا اس موقع پر ڈین زراعت ڈاکٹر محمد سرور، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ڈاکٹر احمد ستار، ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر جعفر جھکانی، ڈاکٹر امجد اولکھ، ڈاکٹر محمد اسلم، ڈاکٹر افتخار احمد، ڈاکٹر عدنان یونس و دیگر بھی موجود تھے۔



زرعی یونیورسٹی کے 26 ویں کانووکیشن کا انعقاد



خاطر خواہ کمی لانے کیلئے سویا بین، گندم اور یو اے ایف 11 جیسی جدید اقسام کے بیجوں پر اپنی توجہ مرکوز کئے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی دشواریوں کے باوجود یونیورسٹی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے طلبہ کو بھرپور تعلیمی و تحقیقی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ کانووکیشن میں بین الاقوامی ڈی ایٹ تنظیم برائے اقتصادی تعاون کے سیکرٹری جنرل/سفیر اسحاقہ عبدالقادر امام، پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے صدر نشین ڈاکٹر خالد محمود خاں، جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق، وائس چانسلر چولستان ویٹرنری یونیورسٹی ڈاکٹر محمد سجاد خاں، ایچ ای سی کے مشیر ڈاکٹر انوار گیلانی، یونیورسٹی سینئر ترین ایلو منائی حافظہ عبدالقیوم و دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ کنٹرولر امتحانات انعام قادر خاں نے نقابت کے فرائض سر انجام دیئے۔



جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں 7 مارچ کو 26 ویں کانووکیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں 226 طلبہ نے پی ایچ ڈی، 12299 طلبہ نے پوسٹ گریجویٹ، 5053 طلبہ نے انڈر گریجویٹ کی ڈگریاں حاصل کیں جبکہ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے 38 طلبہ کو گولڈ میڈلز، 118 کو سلور اور 28 طلبہ کو براؤنز میڈلز عطا کئے گئے۔ کانووکیشن کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے بطور گورنر کے نمائندہ کی حیثیت سے کی۔ تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی کے ڈی گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسہ تقسیم اسناد میں طلبہ کی ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا جبکہ 2019 اور 2020 میں فارغ التحصیل 17578 طلبہ کو ڈگری سے نوازا گیا جو کہ اب تک منعقد ہونے والے جلسہ ہائے تقسیم اسناد کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ واضح رہے کہ 26 ویں جلسہ تقسیم اسناد میں 226 سکالرز کو پی ایچ ڈی کی اعلیٰ تعلیم ڈگری سے نوازا گیا جو کہ تعداد کے لحاظ سے کسی بھی کانووکیشن میں سب سے زیادہ ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ یونیورسٹی میں تیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں جن کے لئے یونیورسٹی وفاقی و صوبائی حکومت کے تعاون سے تمدنی سہولیات کا اہتمام کر رہی ہے بالخصوص ایک ہزار طالبات کیلئے نیا پائل تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کیلئے پانچ سہولت مراکز تعمیر کئے جا رہے ہیں جن میں ڈس سکالرز طالبات اپنا وقت گزار سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ملک کی زرعی درآمدات میں



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جشن بہاراں کی تقریبات

تعلق رکھنے والی زرعی سائنسدان ڈاکٹر نینسی ایلن، سابق وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکورٹی و فخر امام نیسلے کے سی ای او یاو ر علی، زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف علی، ترقی پسند کاشتکار آفاق ٹوانہ، ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر محمد سرور خاں و دیگر نے شرکت کی۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ بہار ہمیں امن اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی چارے، احترام کی خوشبو کو عام کرتے ہوئے مایوسیوں کے بادلوں کو روشنیوں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میلہ کسانوں، زرعی اور خوراک کے ماہرین، اور صنعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے تاکہ وہ غذائیت اور فوڈ سیکورٹی کے اہداف کو حاصل کرنے کیلئے لائحہ عمل تیار کر سکیں۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جشن بہاراں کی تقریبات یکم تا 8 مارچ تک جاری رہیں جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے موسم بہار کی رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یونیورسٹی کارخ کیا۔ جشن بہاراں میں کھیلوں، نیوٹریشن میلہ، کتاب میلہ، زرعی نمائش، گڑ میلہ، بھینوں کے دودھ کے مقابلہ جات، گرے ہاؤنڈ ریس، نیزہ بازی، لائل پور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول، فینی برڈز شو اور پھولوں اور زمین کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جاری آٹھ روزہ رنگا رنگ جشن بہاراں میں کیلیفورنیا کے پارلیمنٹینیز جس کی قیادت کرس ہولٹن اور آصف محمود، سیکرٹری پنجاب زراعت و اصمت خورشید، یو ایس کونسلٹنٹ سے کیٹھن گیلکسکو، زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کیلیفورنیا سے





بھینسوں کے دودھ اور خوبصورتی کا مقابلہ

ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر سیف الرحمن، ڈاکٹر محمد ریاض، ڈاکٹر عزیز الرحمن

تک زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایکو سٹین اسٹڈیم میں منعقد ہوا۔ اس شو کا انعقاد انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن اور بلیو بریڈرز ایسوسی ایشن پنجاب، پاکستان کے اشتراک سے کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد کسانوں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ شو میں دو اہم ایونٹس تھے، دودھ کا مقابلہ، اور خوبصورتی کا مقابلہ، جس میں تقریباً 100 جانوروں نے مقابلے کی مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیا۔

مقابلے میں حصہ لینے والے جانوروں دو ہفتے کے لیے ابتدائی دو ہفتہ یکم مارچ 2023 کی صبح ہوا، جس کے بعد اسی دن دوپہر کو دودھ دینے کا دوسرا سیشن ہوا۔ اگرچہ ان ابتدائی مرحلوں کے دوران پیدا ہونے والے دودھ کا وزن کیا گیا تھا، لیکن مقابلہ کے مجموعی نتائج میں اس پر غور نہیں کیا گیا۔ مقابلہ باضابطہ طور پر 2 مارچ 2023 کو شروع ہوا، صبح اور شام کے دودھ دینے کے مرحلوں میں ان جانوروں کا تعین کیا گیا جنہوں نے سب سے زیادہ دودھ پیدا کیا۔ دودھ کے مقابلے کا باقاعدہ افتتاح محترم وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کیا۔ تقریب

پاکستان میں پیدا ہونے والے کل دودھ میں بھینس کے دودھ کی پیداوار کا حصہ 60 فیصد سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بھینسوں کی مشکل ماحولیاتی حالات کا مقابلہ کرنے اور مویشیوں کے مقابلے بہتر غذائیت والے پروفاٹل کے ساتھ زیادہ مقدار میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ نسل پاکستان کے ثقافتی اور معاشی تانے بانے کا ایک لازمی حصہ ہے، اور ملک کے زرعی شعبے کے لیے ان کی اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھا جاسکا۔ نیلی راوی دریائی پنجاب کی بنیادی بھینس کی نسل ہے جس کی بڑی تعداد فیصل آباد، جھنگ اور شیخوپورہ کے اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ بھینسوں کی کھیتی کے حوالے سے بنیادی اضلاع میں واقع یونیورسٹی آف ایگریکلچر، فیصل آباد بھینسوں کی نشوونما کے لیے کام کرنے والے بڑے تحقیقی اداروں میں سے ایک ہے۔ بھینسوں کے کاشتکاروں کو سہا بنے اور ان جانوروں کی حقیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر اور فیکلٹی آف اینیمل ہیبنڈری کی بھینسوں کے دودھ اور خوبصورتی کے مقابلے منعقد کرنے کی ایک طویل روایت ہے۔

سال 2023ء کا پہلا دودھ اور خوبصورتی کا مقابلہ یکم سے 2 مارچ



کی خوبصورتی کے لیے مخصوص کمیٹیگری پیش کی گئی جس میں حاجی محمد کے بیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس کے بعد عمران بلوچ کے بیل نے دوسری اور چوہدری بشارت جہاں کے بیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بھینوں کے حسن کے زمرے میں عامر مشتاق کی بھینس نے کامیابی حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ رضوان عبدالستار کی بھینس نے دوسری اور شاہ فیصل کی بھینس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ مقابلہ ان شاندار جانوروں کے بہترین نمونوں کی نمائش کا ایک پلیٹ فارم ثابت ہوا اور شرکاء کی لگن اور جذبے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔

اختتامی تقریب میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل جانوروں کو باوقار طور پر تسلیم کیا گیا اور انہیں پرکشش نقد انعامات، سرٹیفکیٹس اور ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ دودھ دینے کے مقابلے میں سرفہرست تین جانوروں کو بالترتیب 3 لاکھ، 1.5 لاکھ اور 50 ہزار روپے کے نقد انعامات سے نوازا گیا۔ اسی طرح پہلی کیلورز کمیٹیگری میں جیتنے والوں کو بالترتیب 1.5 لاکھ، 75 ہزار اور 35 ہزار روپے سے نوازا گیا۔ مقابلہ حسن میں سرفہرست تین بیلوں اور بھینسوں کو بھی سراہا گیا اور انہیں 50 ہزار روپے کے نقد انعامات سے نوازا گیا۔ 1.5 لاکھ، 75 ہزار، اور 35 ہزار، ہر ایک۔ یہ انعامات جانوروں کی اعلیٰ کارکردگی کے اعتراف کے طور پر اور پالنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے مویشی پالنے کے طریقوں میں بہترین کارکردگی کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ مجموعی طور پر تقریب ایک شاندار کامیابی تھی، اور حاضرین اپنی شرکت میں کامیابی اور فخر کے احساس کے ساتھ واپس گئے۔ اس تقریب نے منتظمین، شرکاء اور سپانسرز کی لگن اور محنت کو سراہا اور زرعی شعبے کے ایک اہم جزو کے طور پر جانوروں کی پرورش کی اہمیت پر زور دیا۔

میں ڈین فیکلٹی آف انٹیمیل ہسپتالری پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال کے علاوہ انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن اور بلیو بریڈرز ایسوسی ایشن آف پنجاب، پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افتتاح کے دوران پروفیسر ڈاکٹر اقرار نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور بھینسوں کی صنعت کی ترقی میں انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل ایسوسی ایشن اور بلیو فارمرز ایسوسی ایشن آف پنجاب پاکستان کی جانب سے ادا کیے جانے والے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ دریں اثنا، پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال نے پاکستان میں بھینسوں کی اہمیت پر زور دیا اور فیکلٹی آف انٹیمیل ہسپتالری کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کسانوں کو جدید تحقیق اور اختراعی طریقوں کے ذریعے ملک کے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ دودھ کے مقابلے میں سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، جس میں دودھ کا ہر گرام حتمی نتائج کے تعین میں اہم ثابت ہوا۔ پہلے پچھڑے کی کمیٹیگری میں بھینس نڈیر گجر نے 19.600 کلو گرام دودھ پیدا کر کے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اس کے بعد ماہی مزمل جٹ کی بھینس نے 18.855 کلو گرام دودھ پیدا کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ محمد رفیق گجر کی پہلی پچھڑی بھینس نے 17.805 کلو دودھ پیدا کیا اور اس کمیٹیگری میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بالغ جانوروں کی کمیٹیگری میں محمد عمران کی بھینس 30.550 کلو گرام دودھ پیدا کر کے دودھ کے مقابلے کی چیمپئن بن کر ابھری۔ حاجی اقام کی دو بھینسوں نے بالترتیب 30.065 کلو گرام اور 28.310 کلو گرام دودھ پیدا کر کے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔

بھینسوں کے حسن کے مقابلے کا افتتاح بھی 2 مارچ 2023 کو نیسلے پاکستان کے معزز چیئرمین سید یاور علی نے کیا۔ اس تقریب میں بیلوں



پھولوں کی نمائش

ڈاکٹر عدنان یونس

میں گیندا، چنبیلی، رتن جوت، گل کلنی، گیندا پھول، گلاب اور بھی بہت سارے پھولوں کی نمائش کی گئی اس کا مقصد صرف سجاوٹ نہیں بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو صنعتی خیالات سے نکال کر مثبت خیال فراہم کرنا تھا۔

صحرائی پودوں کا استعمال

صحرائی پودوں کا استعمال اس نمائش کی خوبصورتی میں ایک الگ ہی دلکشی بکھیر رہا تھا کانٹے دار اور خوبصورت پودے جو صحرائیں آگ سکتے ہیں اور پانی کی کمی ہوتے ہوئے بھی اپنی بناوٹ کو برقرار رکھتے ہیں ان پودوں کے ساتھ نمائش میں بہت مختلف طرح کے چھوٹے گارڈن بنائے گئے جو بہت دلکش تھے اور اس سے اس بات کو بھی ظاہر کیا گیا کہ ضروری نہیں پھولوں سے ہی آرائش و زیبائش کی جاسکتی ہے صحرائی پودے بھی اس میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

لینڈ سکیپ

زمین کی تزئین ایک انتہائی اہم شعبہ ہے اس نمائش میں شاندار قسم کی تزئین کی گئی جس میں مختلف طرح کے پانی کے سسٹم تک کو ظاہر کیا گیا یعنی پہلے وقتوں میں شاہروالی کین یا پھر پانی کے تیز بہاؤ کی مدد سے تمام پھولوں اور پودوں کو پانی دیا جاتا تھا جس کا ایک سبب یہ تھا کہ لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا اور پھول اور پودے زیادہ پانی دینے کی وجہ سے مر جھا جاتے تھے اور بعض دفعہ ان کی پیداوار میں بہت کمی آجاتی تھی اس لیے اس

پھولوں کی نمائش، زرعی یونیورسٹی میں جاری موسم بہار کی تقریبات کا بہت اہم حصہ تھی۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان کی ہدایت پر اس نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ڈین کلیہ زراعت، ڈاکٹر محمد سرور خان اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچرل پروفیسر احمد تارخان، ڈاکٹر عدنان یونس، ڈاکٹر افتخار احمد اور ڈاکٹر محسن بشیر نے اس نمائش کو کامیاب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔

نمائش کا آغاز بہت ہی شاندار طریقے سے ہوا اور اس آغاز کی تیاریاں ہمارے انتہائی قابل طالب علموں نے نمائش شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے شروع کر دی کہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھائیں۔ نمائش کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ان کے ساتھ کچھ ملکوں کے سفیر تشریف لے کر آئے انہوں نے زمین کاٹ کہ باقاعدہ افتتاح کیا۔ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے تمام قابل اساتذہ کرام بھی ان کے ہمراہ تھے۔

اس نمائش میں موسم بہار کے تمام پھولوں کی نمائش کی گئی داخلی راستے سے لے کر نمائش کے آخری حصے تک تمام مناظر اتنے دل فریب تھے کہ روح میں سکون اُتر رہا تھا اور خوش قسمتی سے ہمارے پاکستان کی زمین ایسی ہے کہ یہاں تقریباً سب اقسام کے پھول آگائے جاسکتے ہیں کیونکہ اب پاکستان میں بھی چمن آرائی کا ذوق اور شوق عام ہوتا جا رہا ہے اس نمائش



نمائش میں اب جدید طریقوں کے آلات متعارف کروائے گئے تھے۔

لکڑی کے مختلف اقسام کے مجسموں کی نمائش

اب آتی ہے مجسمہ کی بات تو ان کی ایک الگ ہی خاصیت ہے۔ جو کہ ایک فنکار کے فن کا مظاہرہ ہے اور یہ لکڑی کے فن پارے پھولوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے اور ان کو دیکھنے والا ہر انسان لطف اندوز ہو رہا تھا اور کچھ لوگ ان کے ساتھ اپنی تصاویر بناتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ نمائش بہت خوبصورت ہے یہاں کہ قابل طلبہ، تمام ٹیم اور آنے والوں نے پھولوں کی اقسام اور ان کو دیکھ کر بھرپور لطف اٹھایا۔

پلاسٹک اور مٹی کے گلوں کی نمائش

ان کی ایک الگ ہی اہمیت ہے جس کے بغیر خوبصورتی ناممکن سی

لگتی ہے۔ سادہ گملے بھی پیارے لگتے ہیں مگر جب ان پر مختلف قسم کے رنگ استعمال کر کے انہیں خوبصورت بنایا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کچھ گملے تو ایسے تھے کہ ان کو مختلف اشکال دی گئی تھیں رنگ میں ڈھالنے کے بعد اور یہی چیز آنے والے سیاحوں کو بے حد پسند آئی۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے گملے بنا کر پھر ان میں اپنی پسند کے پھول اور پودے لگانا بہت خوش گن احساس پیدا کرنا ہے۔

پھولوں اور صحرائی پودوں کا گھر کی آب و ہوا میں اہم کردار

آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھول اور گملے بس گھر کے صحن میں رکھ لینے لیکن یہی پودے اگر اپنے کمروں، کچن اور گھر کی چھت پر سجائے جائیں تو اس کا سجاوٹ کے علاوہ گھر کی فضا میں سے آلودگی کو ختم کرنے میں بھی بہت اہم کردار ہے۔

نمائش کا اختتام 7 مارچ کی شام میں ہوا اور یہاں آنے والے ہر انسان نے اس کو سراہا اور خوب لطف اٹھایا۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یہ تفریح بخش تھا اور ان سب میں ہمارے تمام اساتذہ اکرام کی محنت بھی شامل تھی۔ آہستہ آہستہ گہما گہمی کا سماں کم ہوتے ہوئے شام کا سورج ڈھل گیا اور یہ نمائش اختتام پذیر ہو گئی اس کے بعد تمام طلبہ کو ان کی محنت کے مطابق تحائف سے نوازا گیا جس کی قیادت ڈاکٹر محمد عدنان یونس اور ڈاکٹر احمد ستار نے کی اور تمام بچے اس پر بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سب اپنے گھر اور اپنی منزل کی طرف لوٹ گے۔





تین روزہ نیزہ بازی چیمپئن شپ

عامر سعید رانا، نہال احمد خاں

کے منتظمین میں نہال احمد خاں، رانا عامر سعید، ضیافت اللہ اور خادم حسین شامل تھے۔ دریں اثناء قدیم یونانی جنگی مہارتوں کے علامتی مظاہرے کے دوران گھمسان کارن دیکھنے کو ملا۔ گھڑ سواروں کی قطاریں لگارتی ہوئی جب جنگی انداز سے نشانہ بازی کی چابک دستی دیکھا تیں تو خائفین ان کے حوصلے بڑھاتے رہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی رانا ثناء اللہ خاں نے کہا ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا زرعی ترقی اور دیہی ثقافت کے فروغ کیلئے کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ زرعی

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جشن بہاراں میں 3 روزہ نیزہ بازی چیمپئن شپ کا آغاز 5 مارچ 2023ء کو ہوا۔ چیمپئن شپ کا افتتاح وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خاں، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں اور ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر محمد سرور خاں کے ہمراہ کیا۔ ان مقابلہ جات کے طور پر سامنے آنے والے اس عظیم الشان ہارس شو میں ملک بھر سے آئے ہوئے 100 سے زائد گلوبوں سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں گھوڑوں اور شہسواروں نے شرکت کی۔ جس میں سنگل سیکشن، بیکش آف فور اور سیکشن آف ایٹ کے مقابلہ جات منعقد کیے گئے۔ نیزہ بازی کے مقابلہ جات





ساند انوں کو فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لئے تمام کاوشیں بروئے کار لانی ہوئیں تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو احسن انداز میں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تحفیت غربت کو بھی ممکن بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لئے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مقابلہ جات نہ صرف دیہی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل کو دیہی قدیم روایات سے بھی جوڑے رکھتے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ جشن بہاراں تقریبات کا مقصد زرعی سائنس دانوں، کاشتکاروں اور انڈسٹری کے مابین مربوط روابط استوار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو اس قسم کی محنتدانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیزہ بازی جہاں ہمیں قدیم حربی ثقافت سے منسلک کرتی ہے وہاں اس کھیل میں حصہ لینے والے پر جوش جوانوں میں توازن اور مقصدیت کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ نیزہ بازی میں جیتنے والے سواروں کو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے انعامات تقسیم کئے۔



خوبصورت پرندوں کی نمائش اور اس کے اغراض و مقاصد

ڈاکٹر فواد احمد، ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر محمد ریاض، ڈاکٹر محمد شریف، ڈاکٹر محمد اشرف



جاتی ہیں۔ قدیم یونانی تہذیب میں اُلو، چمگادڑ اور دیگر پرندوں کو کالے جادو اور دیگر امور کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہما کو خوش بختی کی علامت تصور کیا گیا ہے اور کہا جاتا رہا ہے کہ جس کے سر پر ہما بیٹھ جائے اسے حکمرانی نصیب ہوتی ہے۔ ایک عرصہ تک کو اگر کسی کی منڈیر پر کائیں کائیں کرتا تھا تو یہ تصور کر لیا جاتا تھا کہ اس گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ کچھ پرندوں کی عادتوں کو ضرب المثل میں خوب استعمال کیا جاتا رہا ہے جیسا کہ اُلو کا پٹھا، طوطا چشم، کوئے کی طرح سیانا اور خوبصورت آواز کو بلبل کی آواز سے تشبیہ دینا وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے شائین کو مسلم نوجوانوں کیلئے رول ماڈل قرار دیتے ہوئے بلند پروازی اور مسلسل جدوجہد کا جو درس دیا ہے وہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک منفرد مثال کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو ایسے عقاب کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے لیے خود رزق کا اہتمام کر سکے جبکہ وہ دوسروں کے رزق پر نظریں مرکوز کرنے سے گریز کرے۔ الغرض پرندوں کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی گئی

پرندے قدرت کی حسین تخلیق کے طور پر فضاؤں کو اپنی پرواز اور سریلی آوازوں کی وجہ سے رنگوں اور فطرت کے مناظر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کا تذکرہ جنت کے باغات میں موجود گی کی صورت میں قرآن پاک میں کیا ہے اور یقینی طور پر فطرت کی خوبصورتی میں ان کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ پرندوں کو مختلف شاعروں نے استعارہ کے طور پر استعمال کیا اور شاعری کو فطرت سے جوڑنے میں انہی کا اہم ترین کردار ہے۔ ایک زمانے میں کبوتر کو پیغام رسانی کا سب سے موثر ذریعہ تسلیم کیا جاتا تھا اور کبوتروں پر متعدد گیت، غزلیں اور نظمیں بھی تخلیق کی گئی ہیں۔ مختلف دانشوروں نے اپنی حکایات میں طيور کو اپنا موضوع بنایا ہے بالخصوص حکایات رومی میں طوطوں کی نفسیات کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ طب یونانی میں مختلف پرندوں کے گوشت سے علاج معالجہ کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے بالخصوص لتویٰ میں یہی پرندے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا سوپ بنا کر مریضوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی متعدد روایات مختلف جانوروں کے حوالے سے پائی



بلکہ دیہی مرغبانی میں اس شعبہ سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔

مرغبانی کی اصل تعریف یہ ہے کہ ہر وہ پرندہ جو انسان کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند ہو اور جس کی بریڈنگ انسانوں کے زیر سایہ کروائی جاسکے اس کو پولٹری برڈ کہتے ہیں اس تعریف کی رو سے مرغی، تیتیر، بیٹر، بلخ، ٹکی، مور، بکوتر، طوطے، شتر مرغ، سرخاب، چکرو وغیرہ بھی پولٹری کا حصہ ہیں۔

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور رئیس جامعہ راقم نے فینسی برڈ شو منعقد کرانے کا سلسلہ آج سے دس سال پہلے شروع کیا تھا جس کے مقاصد درج ذیل تھے۔

- 1۔ کمرشل مرغبانی کے ساتھ ساتھ دیہی مرغبانی کو فروغ دیا جائے۔
- 2۔ پاکستان میں پائے جانے والے فائدہ مند پرندوں کو لوگوں میں متعارف کروایا جائے۔
- 3۔ سال میں دو بار فینسی برڈ شو لگوا کر پرندوں کی مائیکنگ کو بہتر بنایا جائے۔
- 4۔ پرندے پالنے والے حضرات کی زرعی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے تربیت اور حوصلہ افزائی کی جائے۔
- 5۔ پرندے پالنے کے شوقین حضرات کو اس کاروبار کو بڑھانے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔

میں اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اس حوالے سے خوش قسمت دانش گاہ ہے جہاں پرندوں کو نہ صرف خصوصی طور پر تعلیم و تحقیق کے حوالے سے اہم درجہ دیا جاتا ہے بلکہ زوالوجی ڈیپارٹمنٹ نے یہاں پرندوں کی مختلف اقسام حنوط کر کے نوجوان طلباء اور طالبات کیلئے ایک میوزیم میں آراستہ کر رکھی ہیں جسے دیکھنے کیلئے مختلف شہروں سے سکولوں اور کالجوں کے طلباء اور طالبات بڑی تعداد سال بھر جوق در جوق آتی رہتی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فینسی برڈ شو گذشتہ ایک دہائی سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس شو کو شروع کروانے اور اس کو جاری رکھنے میں راقم الحروف پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے بطور رئیس جامعہ خصوصی کردار ادا کیا اور اسے ایک بھرپور ثقافتی میلے کے طور پر سال 2008 میں متعارف کرانے کے بعد اس روایت کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک جاری رکھا۔ جس میں دنیا بھر کے قیمتی پرندوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ ان کو پالنے اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے نت نئی ٹیکنالوجی کے امور پر بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ فینسی برڈ شو کا بنیادی مقصد شعبہ مرغبانی کے فروغ اور ان پرندوں سے متعلقہ اس شعبہ کے ذریعہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ عموماً لوگوں کا کا خیال ہوتا ہے کہ پولٹری یا مرغبانی صرف مرغیوں کو پالنے تک ہی محدود ہے اور اس شعبہ کا کام صرف براٹر لیٹر اور بریڈر فارم جیسے امور ہی زیر غور لائے جاتے ہیں جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ کمرشل پولٹری (براٹر، لیٹر فارمنگ) میں پاکستان سے نہ صرف 1.5 کروڑ لوگوں کا روزگار منسلک ہے



ڈاکٹر فواد احمد، نیاز حسین نیازی، ڈاکٹر محمد شریف، ڈاکٹر محمد اشرف، ڈاکٹر سلطان اور ڈاکٹر عزیز الرحمن شامل تھے۔ زرعی یونیورسٹی کی اس ٹیم نے نہ صرف نمائش کو آگناؤ کیا بلکہ عوام کی خدمت میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے اور آج کل کے بیروزگاری کے دور میں لوگوں کو ایک اچھے روزگاری طرف متعارف کروایا ہے جس کی مثال نمائش میں حصہ بننے والا 15 سال کا بچہ ہے جو روزانہ پرندے بیچ کر 4 سے 5 ہزار روپے کمالیتا ہے۔ انشاء اللہ یہ ٹیم عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ میں رہے گی اور لوگوں کو وہ تمام جدید ٹیکنالوجی مہیا کرے گی جس میں بروڈنگ، انکو بیٹر، خوراک کا بنانا اور پرندوں کے شیڈز میں موسمی حالات کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پرندوں کو پالیں اور اس صنعت کو فروغ دیں۔

فیصل آباد کے علاوہ اس شو میں اسلام آباد، گلگت، سرگودھا، جھنگ، لاہور اور کراچی سے بھی فینسی برڈ بریڈرز نے بھرپور حصہ لیا۔ اس شو کی افتتاحی تقریب رئیس جامعہ کے ہاتھوں انجام پائی۔ کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی نہ صرف اس شو میں شرکت کی اور اس شو کو بھرپور انداز میں سراہا۔

6۔ لوگوں کو اس شعبہ سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
7۔ الحمد للہ اس سلسلہ میں 6 تا 7 مارچ 2023ء تک فینسی برڈ شو کا انعقاد کیا گیا اور زرعی یونیورسٹی نے اپنے بہت سارے اہداف حاصل کر لئے۔

موجودہ شو میں 200 سے زیادہ پرندے پالنے والے حضرات نے حصہ لیا اس میں تقریباً 400 سے زائد پرندوں کی نسلوں اور اقسام کو متعارف کروایا گیا۔ پرندوں کے علاوہ اس شو میں انکو بیٹر، بروڈر اور کچ بنانے والے حضرات نے بھی حصہ لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج فیصل آباد میں پرندوں کی بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے جس میں لوگ پرندوں کی خرید و فروخت کے علاوہ پرندوں کے انکو بیٹر بھی سیل کرتے ہیں۔ پرندوں



کے خوبصورت کچ اور بروڈر بھی بناتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اور مختلف پرندوں کی خوراک بنانے اور بیچنے کا کام بھی سرانجام دیتے ہیں۔ نہ صرف فیصل آباد بلکہ لاہور اور کراچی میں بھی اسی طرح سے پرندوں کی مارکیٹ بن گئی ہیں جہاں پر کروڑوں روپے کے پرندوں کی خرید و فروخت کا کام ہو رہا ہے۔ موجودہ نمائش میں لائے گئے پرندوں کی قیمت بھی کم و بیش ڈیڑھ کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کی زیر سرپرستی اسے آگناؤ کرنے والے ممبران میں پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال،

آل بریڈ چیمنسپن شپ ڈاگ شو کا انعقاد

ڈاکٹر بلال اسلم، ڈاکٹر مصباح اعجاز، ڈاکٹر اشعر محفوظ

کارکردگی کی بنیاد پر جانچا اور ہر زمرے کے لیے فاتحین کا انتخاب کیا۔ جیتنے والوں کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا، اور ان کے مالکان کو کامیابی پر مبارکباد دی۔

ڈاگ شو کے علاوہ شرکاء اور حاضرین کے لیے مختلف اسٹالز اور سرگرمیاں بھی تھیں۔ شرکاء اور سامعین نے تقریب میں بہت اچھا وقت گزارا، اور پرکشش سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوئے۔ مجموعی طور پر اس ڈاگ شو میں شرکت کرنے والے ہر شخص نے لطف اٹھایا۔ اس تقریب نے کتوں کے مالکان اور شوقین افراد کو اپنے کتوں کی نمائش کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، اور سامعین کو کتوں کی مختلف نسلوں کے بارے میں مزید جاننے اور ان کی تعریف کرنے کا موقع فراہم کیا۔

مہمانوں نے کامیاب شو کے انعقاد پر آرٹ اینڈ لٹری سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہا اور اس چانس پر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا شکریہ ادا کیا جو اس طرح کی مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کے لئے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔

جشن بہاراں کے سلسلے میں 5 مارچ 2023 کو آل بریڈ ڈاگ چیمنسپن شپ ڈاگ شو اور کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب پاکستان کینیل کلب کے اشتراک سے منعقد ہوئی جس کا افتتاح معزز مہمانوں کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ افتتاحی تقریب میں رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈائریکٹر جنرل، محکمہ لائیو سٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ، ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنس پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید نے شرکت کی۔ کنوینر ڈاکٹر سید اشعر محفوظ و دیگر فیکلٹی ممبران بھی موقع پر موجود تھے۔ یہ تقریب بہت کامیاب رہی اور اس میں پورے علاقے سے سینکڑوں کتوں اور ان کے مالکان نے شرکت کی۔

تقریب کا آغاز کتوں اور ان کے مالکان کی رجسٹریشن کے ساتھ ہوا، جنہیں بعد ازاں نمبر وٹیک فراہم کیے گئے۔ اس کے بعد کتوں کو ان کے متعلقہ پنچروں میں لے جایا گیا، جہاں انہیں شو کے لیے تیار کیا گیا۔ شو کونسل، سائز اور عمر سمیت مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہمارے قابل جج جناب فیضان طاہر نے کتوں کو ان کی شکل و صورت، رویے اور



سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام 5 روزہ لائیکپور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول



اہم ترین کاوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعات تخلیقی صلاحیتوں کے حامل نوجوانوں کو بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے سازگار ماحول کے ساتھ ساتھ مقابلہ جاتی پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں۔ جامعہ زرعیہ اس سلسلہ میں سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام مختلف کلبوں کے ذریعے فن تقریر، حسن تحریر، نقاشی و مصوری، موسیقی، اداکاری، کونز مقابلہ جات، قرات اور نعت، کے علاوہ کردار سازی پر خصوصی وسائل بروئے کار لا رہی ہے جس میں پاکستان بھر سے مختلف جامعات کے نوجوان بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فنکار معاشرے میں اظہار کے نئے زاویوں اور سلیقوں کو

سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام 08 مارچ کو 5 روزہ آٹھویں لائیکپور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ اس فیسٹیول میں 30 سے زائد جامعات سے طلباء و طالبات حصہ لیا۔ فیسٹیول کا افتتاح ریس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں و دیگر مہمانان خصوصی گرامی کیا۔ بطور مہمان خصوصی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں نکھارنے اور ان میں اظہار کی جرات پیدا کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی خصوصی اقدامات بروئے کار لا رہی ہے اور آٹھواں سالانہ لائیکپور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول اس سلسلے کی





متعارف کراتے ہوئے بڑے سے بڑے مسائل پر مختصر شاعری تخلیق کرتے ہیں اور یہی وہ طبقہ ہے جو معاشرے میں خوبصورتی اور اعلیٰ سوچ کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام چار روزہ تقریبات میں قرات اور نعت کے مقابلہ جات، بین الاجماعی تقریری مقابلہ جات، شاعری کے مقابلے، آڈیو ڈرامہ اور آڈیو گرافی کے ساتھ ساتھ پنجابی ٹاکر اور قوالی کے علاوہ بزنس آئیڈیاز، ورثہ میوزک، فیسٹیول اور ڈراموں کا مقابلہ بھی منعقد کیا گیا جبکہ ایگری میڈیا فیسٹیول اور وار آف مائنڈز کا مظاہرہ بھی اس میں شامل تھا۔ قصہ کے عنوان سے مختلف یونیورسٹیوں کے نوجوانوں نے ڈرامہ مقابلے میں حصہ لیا۔ آل پاکستان مشاعرے میں سید سلمان گیلانی، انجم سلیمی، اکرام عارفی، علی زریون، تہذیب حافی، ماہ نو، عمیر نجمی، فیصل علی، حنین جاوید، عرفان وارث، اختر منیر، عثمان ضیاء، خرم آفاق و دیگر نے اپنا کلام پیش کیا۔ سینئر ٹیوٹر ڈاکٹر شوکت علی نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے مقابلہ جات کی تفصیلات سے حاضرین کو آگاہ کیا جبکہ سوسائٹی آف ایگریکلچرل رائٹرز کے سرپرست ڈاکٹر ثمر عباس نقوی نے مہمان شعراء کا شکریہ ادا کیا۔



انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے زیر اہتمام گھریلو کھانے کی مصنوعات کے مقابلہ جات



جامعہ زریعہ فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے زیر اہتمام گھریلو کھانے کی مصنوعات کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلہ جات کے افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں تھے جبکہ ڈین فوڈ سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، انچارج ہوم سائنسز ڈاکٹر عائشہ ریاض، ثناء، حرافخار و دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ بد قسمتی سے پاکستان کی چالیس فیصد سے زائد آبادی غذائی کمی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی سطح پر غذائیت سے بھرپور خوراک کے فروغ اور طرز زندگی کو بہتر بنانے والے اصولوں پر کاربند ہونے کیلئے شعور بیدار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان مقابلہ جات سے نہ صرف بہتر غذائی عادات کو پروان چڑھانے میں مدد ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ میں کاروباری مہارتیں پیدا کرنے کی بھی راہیں ہموار ہوں گی۔ ڈاکٹر مسعود صادق بٹ نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی شعور بیدار کرنے کیلئے تسلسل سے تقریبات کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ ریاض نے کہا کہ طلبہ میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کیلئے تمام کوششیں جاری ہیں۔

جامعہ زریعہ کے سائنسدانوں کی متعارف کردہ گنے زیادہ پیداواری استعداد کی حامل دو اقسام



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں نے گنے کی دو زیادہ پیداواری استعداد کی حامل اقسام متعارف کرا دیں۔ تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی کے ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خاں کی سربراہی میں مرکز برائے ایگری کلچر بائیو کیمسٹری و بائیو ٹیکنالوجی کی ٹیم نے پاکستان کی شوگر انڈسٹری کے لیے یہ جدید اقسام تیار کی ہیں۔ ان اقسام کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ نہ صرف زیادہ پیداواری دیتی ہیں بلکہ حشرات سے قوت مدافعت کی بھی حامل ہیں۔ ان میں سے ایک ورائٹی CABB-IRS جبکہ دوسری ورائٹی CABB-HTS جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کی استعداد کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینک ورائٹی ہے جس کی نیشنل بائیو سیفٹی کمیٹی وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے فیلڈ ٹرائل کیلئے منظوری دے دی ہے۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں کی متعارف کردہ بھنڈی اور چیا کی زیادہ پیداواریت کی حامل نئی ورائیٹرز



کی خصوصیات میں بھرپور پروٹین، اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہونا شامل ہے۔ چیا کی پیداوار 800 سے 1200 کلوگرام فی ہیکٹر جبکہ چیا کو برآمد کر کے خطیر زرمبادلہ کمانے کے امکانات موجود ہیں۔ چیا کو پاکستان سے چائینہ اور دیگر ممالک میں برآمد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چیا کو 4000 سے 6000 روپے فی کلوگرام فروخت کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خاں کی سربراہی میں مرکز برائے ایگری کلچر بائیو کیمسٹری و بائیو ٹیکنالوجی کی ٹیم نے پاکستان کی شوگر انڈسٹری کے لیے یہ جدید اقسام تیار کی ہیں۔ ان اقسام کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ نہ صرف زیادہ پیداوار دیتی ہیں بلکہ حشرات سے قوت مدافعت کی بھی حامل ہیں۔ ان میں سے ایک ورائٹی CABB-IRS جبکہ دوسری ورائٹی CABB-HTS جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کی استعداد کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینک ورائٹی ہے جس کی نیشل بائیو سیفٹی کمیٹی وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے فیلڈ ٹرائل کیلئے منظوری دے دی ہے۔

زرعی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بھنڈی اور چیا کی زیادہ پیداواریت کی حامل ورائیٹرز متعارف کرا دی ہیں۔ ورائیٹرز کی منظوری پنجاب سیڈ کونسل کے اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے سائنسدانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نہ صرف ان اقسام سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جاسکے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خطیر زرمبادلہ بھی کمایا جاسکے گا۔ بھنڈی کی نئی قسم کو ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے سائنسدانوں ڈاکٹر عظیم اقبال خاں، ڈاکٹر آصف سعید، ڈاکٹر عامر شکیل، ڈاکٹر طارق منظور خاں، ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر خرم ضیاف نے متعارف کرایا ہے جبکہ چیا بیج کی نئی قسم کو ڈیپارٹمنٹ آف ایگری انومی جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے ڈاکٹر عرفان افضل، ڈاکٹر شہزاد بسرا اور ایوب ریسرچ کے عامل لطیف نے تیار کیا ہے۔ واضح رہے کہ بھنڈی کی نئی قسم تیلو وین موزیل وائرس کے خلاف قوت مدافعت رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پیداوار اور جلد فصل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف چیا

چیف ہال وارڈن آفس اور ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سپورٹس گالا کا انعقاد

راغب کرنا ہو گا تاکہ انہیں یکسویت کے ساتھ ساتھ مضبوط جسمانی اور ذہنی خصوصیات کی حامل شخصیت بنایا جاسکے۔ اس موقع پر چیف ہال وارڈن ڈاکٹر ہارون زمان، چیئر مین سپورٹس بورڈ چیئر مین احمد ستار، ڈین ڈاکٹر طارق جاوید، ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر جعفر جکائی، ڈاکٹر امجد اولک، ٹریشر عمر سعید قادری، ڈاکٹر بشری سعید، ڈاکٹر ریاض ورک، ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی، ڈاکٹر ندیم عباس، ڈاکٹر انجم ضیاء، ڈاکٹر افتخار ودیگر بھی موجود تھے۔ سپورٹس گالا 17 مارچ تک جاری رہا جس میں فٹ بال، والی بال، ایتھلیٹک، رسہ

جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے زیر اہتمام گھریلو کھانے چیف ہال وارڈن آفس اور ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس کے اشتراک سے انٹرنیشنل (بوائے اینڈ گرلز) سپورٹس گالا کا انعقاد ہوا افتتاحی تقریب سے بطور مہمان خصوصی کرتے ہوئے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ دور حاضر میں طلباء کھیلوں میں عدم دلچسپی کا رشتہ کار ہیں جس کی وجہ سے کھیلوں کے میدان ویرانی کا سماں پیش کر رہے ہیں۔ طلباء میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کیلئے انہیں کھیلوں کی طرف



والے اصولوں پر کاربند ہونے کیلئے شعور پیدا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان مقابلہ جات سے نہ صرف بہتر غذائی عادات کو پروان چڑھانے میں مدد ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ میں کاروباری مہارتیں پیدا کرنے کی بھی راہیں ہموار ہوں گی۔ ڈاکٹر مسعود صادق بٹ نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی شعور پیدا کرنے کیلئے تسلسل سے تقریبات کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ ریاض نے کہا کہ طلبہ میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کیلئے تمام کاوشیں کی جا رہی ہیں۔

کشی، کبڈی و دیگر کھیلوں کے مقابلہ جات منعقد کروائے گئے۔ کی مصنوعات کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلہ جات کے افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خاں تھے جبکہ ڈین فوڈ سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، انچارج ہوم سائنسز ڈاکٹر عائشہ ریاض، ختاء، حرا افتخار و دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ بد قسمتی سے پاکستان کی پالیسی فیصد سے زائد آبادی غذائی کمی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی سطح پر غذائیت سے بھرپور خوراک کے فروغ اور طرز زندگی کو بہتر بنانے




سینٹر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام گڑ میلے کا انعقاد



تقریبات اور تہوار کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی روایات میں میلوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو کہ لوگوں کے درمیان روابط بڑھانے کے ساتھ چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینے کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ اپنی گزشتہ اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گڑ میلے کا اہتمام کیا گیا جس میں خصوصی طور پر گھریلو دستکار یوں کو فروغ دینے کے لیے سٹالز لگائے گئے۔ اس میلہ میں گڑ اور شکری کی تیاری کے علاوہ گڑ سے تیار کردہ اشیا کو نمائش کے لیے رکھا گیا۔ میلے میں موجود سٹال دیکھنے والوں کی





مرکز بنے رہے۔ دیسی مشروب گنے کا رس سے لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ میوے والا گڑ، مسالے والا گڑ، تلوں والا گڑ خاص طور پر پسند کیا گیا اور ارزاں نرخوں پر فروخت کے لیے دستیاب رہا۔ اس کے علاوہ میلے میں گڑ والی چائے، گڑ والے چاول، گڑ والی لسی، گڑ والی مٹھائیاں، گڑ کی ٹکیاں اور گڑ کی دیگر اشیاء سے بھی حاضرین خوب لطف اٹھاتے رہے۔

گڑ میلے کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہاں پنجابی لکچرل شو کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف صوبوں کے ثقافتی رنگوں کو نمایاں کیا گیا تھا۔ طلباء و طالبات نے میلے میں پنجاب، بلوچستان، سرحد، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کرا جا کر کرنے کے لئے سٹالز لگائے۔ اس کے علاوہ طلبہ نے پنجابی لوک گیتوں کے ساتھ، بھنگڑا، بلوچی جھومر، سراینکی جھومر اور پشتو جھومر میں پرفارمنس دی۔



توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس میلے کا اہتمام سینئر ٹیوٹر آفس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایگری ٹورازم کلب نے کیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف فارمز، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد و دیگر انتظامی شعبہ جات بھی اس میلے کی کامیابی کے لئے پیش پیش رہے۔

میلے کا افتتاح زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کیا جن کے ساتھ حیدرآباد مدھیہ انٹرنیشنل پروگرام ایسٹنٹ برائے USDA، عصمت رضا ایگریکلچر سائنسٹ، USDA، USAID کی سینئر ایڈوائزر ڈاکٹر مبشرہ مقاداس، پروگرام مینیجر MRL CABI سبیاں فارس، ڈاکٹر عین سڈانگ، ڈاکٹر عین سڈانگ اور دیگر بھی موجود تھے۔

میلے میں گڑ کی تیاری کے مختلف مراحل سے شائقین کے لیے توجہ کا

سیلاب اور زرعی اراضی کی بحالی

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)

وائس چانسلر، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

دان جنوبی پنجاب کے سیاست دانوں سے زیادہ حساس تھے۔ ہم نے 700 گھرانوں کی خدمت بذریعہ گندم کا آٹا، چاول، چینی، گھی، دالیں، مچھر دانی، پانی کے ڈبے، کپڑے، لحاف، کراکری، مویشیوں کا چارہ، میڈیکل کیمپ وغیرہ اور 2300 بیج کے تھیلے فراہم کیے جو ایک ایکو گندم، چارہ، سرسوں اور سبزیوں وغیرہ کے بیجوں پر مشتمل تھے۔ اگرچہ یہ وسائل انتہائی کم تھے لیکن فالو اپ وزٹ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ کام خاندانوں کی مسکراہٹیں واپس لا رہا ہے۔

ہم نیماہین ڈی ایم اے کے ساتھ تعاون کیا اور حاملہ ماؤں کے لیے 1,500 فوڈ پیک فراہم کیے۔ ہم نے جانوروں کے لئے خوراک اور ادویات تقسیم کیں۔ فوری ریلیف اور بحالی کے کاموں میں دوسرے لوگوں اور اداروں نے بھی حصہ ڈالا لیکن اس کے باوجود، بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس نہ خوراک تھی اور نہ سرچھپانے کے لئے چھت۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ گرم کپڑوں اور جوتوں کے بغیر بھی دیکھے گئے۔ لوگوں نے روزگار کی تلاش میں بڑے پیمانے پر ہجرت کی۔ اس ہجرت نے منقسم خاندانوں (خواتین اور بچوں) کو مزید کمزور بنا دیا۔ پینے کا صاف پانی اور بیت الخلا کی سہولت ان علاقہ جات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم پینے کے صاف پانی کے لیے سولر پمپس کی تنصیب اور انتہائی محروم طبقات کے لیے عوامی بیت الخلاء کی تعمیر پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اصل حل زراعت کی بحالی میں مضمر ہے۔

سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کی اکثریت نے مویشی بیچ دیے ہیں، جو کہ کاشت کاروں کا نقد آور اثاثہ تھا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زرعی کھیت یا تو زیر آب آگئے تھے یا پھر زیر آب آنے کے ساتھ ساتھ کٹاؤ کے مسائل سے بھی دوچار ہو گئے تھے۔ گندم کی بوائی صرف وہاں ہی ممکن ہوئی تھی جہاں پانی نکالا جاسکا تھا اور کھیت وقت پر سوکھ گئے تھے۔ کٹاؤ کے عمل میں مٹی ایک جگہ سے بہہ کر دوسری جگہ پر جمع ہو جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں زمین کو قابل کاشت بنانے کے لئے میکینیکل کام کی ضرورت تھی۔ آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی عام کسانوں کے وسائل

پاکستان میں رواں سال سیلاب کے بعد، بحالی کا عمل زیادہ تر لوگوں کے لیے مایوس کن ہے۔ چیلنجز بہت بڑے اور کثیر الجہتی ہیں، یعنی بنیادی ڈھانچے کا نقصان، معاش کا نقصان، پینے کے پانی کی کمی، خوراک کی کمی، منہدم پناہ گاہیں، بوسیدہ کپڑے اور جوتے، فصلوں اور مویشیوں کی بحالی میں مشکلات، ماں اور بچے کی صحت کی خرابی، اسکولوں کی کمی۔ یہ سب ایک خوفناک سماجیات کے اشاریے ہیں۔

اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ڈونرز کانفرنس کا انعقاد ہو چکا۔ ورلڈ بینک کے قرض کا تذکرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ معاشی دباؤ کا شکار حکومتوں نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ غیر سرکاری تنظیمیں بھی مصروف عمل ہیں۔ امید کی جاسکتی ہے کہ وسائل کا موزوں استعمال کیا جائے گا۔ زرعی اور دیہی گھرانوں کے ساتھ کام کرنے کا ہمارا تجربہ امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔

ہماری مصروفیت، سیٹلائٹ امیجز، پیدل سروے، ذاتی انٹرویوز، اسکول جانے والے بچوں سے ملاقاتیں، اسکاؤٹ کیمپس اور کمیونٹی میٹنگز کے حوالے سے رہی ہے۔ یہ کام تحصیل جام پور کے مخصوص علاقوں، ضلع راجن پور کی یونین کونسل چک شکاری، سلیمان رینج میں فاضل پور شہر سے 56 کلومیٹر دور تھل وزیر اور تھل سعید کے قبائلی علاقوں اور سکھر ضلع کے صالح پیٹ میں کیے گئے۔ اس مہم کے تحت آنے والے سلیمان رینج کے علاقے کی آبادی 5000 سے زیادہ ہے لیکن مکین، کچے کے چھوٹے گھروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اوسط زمین دو ایکڑ ہے۔ یہ سب لوگ پہاڑی طوفان کے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لیکن اس حد تک نہیں جتنا 2022 میں دیکھا گیا تھا۔

زرعی یونیورسٹی نے سیلاب متاثرین کے لئے وسائل متحرک کرنے کی مہم چلائی اور سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے مناسب نقدی اور سامان سے لدے ہوئے ٹرک روانہ کئے ہیں۔ بحالی کا کام آج بھی جاری ہے۔ ہم نے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور سیاسی قیادت کو آگاہ رکھا ہے۔ ہمارا تاثر یہ ہے کہ بالائی سندھ کے سیاست



باقی فصل کو کیڑوں اور موسم سے شدید نقصان پہنچا۔ کپاس کی فصل کے مناسب بیج کی عدم دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امکان ہے کہ بیج کی فراہمی کے لئے عام جزیروں سے مال خریدا جائے گا جس کے معیار کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی کاٹن پالیسی اور جی ایم سیڈ امپورٹ فریم ورک پر نظر ثانی کریں۔ اس حوالے سے عالمی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ممالک و اداروں کے ساتھ تعاون ناگزیر ہے۔ کپاس کی بوائی کو فروغ دینے کے لیے بروقت کپاس کی مہم چلائی جانی چاہیے۔

ایف اے او کی رپورٹ میں سیٹلائٹ امیج کے تجزیے کے علاوہ، سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لئے منصوبہ بندی کے عمل میں ڈیٹا سائنس کو استعمال کرنے کی شاید ہی کوئی کوشش کی گئی ہو۔ کوشش کی جائے تو تمام سیلاب زدہ رقبے کو بہتر ایگرو کالوجیکل زون میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ تحقیقی و تعلیمی اداروں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اس کے لیے کسی نئے انفراسٹرکچر یا پارڈویر میں سرمایہ کاری کی نہیں بلکہ محض مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔

سیلاب نے ہمدردی کی ایک لہر پیدا کی تھی جو کہ ایک منقسم قوم کو متحد کر سکتی تھی۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا کے نیوز شوز اور اخباری کالم بدقسمتی سے بعد از سیلاب مناسب رپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں۔ سیلابی معاملات کی بجائے ملک کا سیاسی اور معاشی منظر نامہ شہ سرخیوں کی زینت بن رہا ہے۔ رونا تو اسی بات کا ہے کہ، سیلاب سے متاثرہ افراد کی حالت زار اس ملک کی اشرافیہ کے لیے ایک معمول کی بات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

سے باہر ہے۔ ڈی اے پی کھاد کا استعمال بھی تشویشناک حد تک کم رہا۔ یعنی عام سال کے مقابلے میں ڈی اے پی تقریباً نصف سے بھی کم استعمال ہوئی۔ طلب میں کمی کی وجہ سے ڈی اے پی کی قیمتیں بھی گر گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے یہ بینک کریڈٹ کی کمی اور آڑھتیوں کے قرض دینے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے ہوا ہو۔ گندم کی فصل کو 20 فیصد تک کے نقصان سے بچانے کے لیے پہلی آبپاشی کے بعد جڑی بوٹی کش ادویات سپرے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالیہ سیزن میں کسانوں کی مالی مشکلات کے پیش نظر جڑی بوٹی کش ادویات کے کم استعمال کا بھی خدشہ موجود تھا۔

کھیتوں پر پانی کھڑا ہونے، زرعی مشینری کی عدم دستیابی دیگر لاگت کی وجہ سے رواں سیزن میں زرعی اراضی کے بڑے حصے پر کاشت نہیں ہو سکی۔ زرعی اراضی کو نارمل سطح پر لانے کے لئے لینڈ لیونگ کے ساتھ ساتھ آبپاشی و نکاسی آب کے چینلز کی تعمیر نو اور واٹر پمپس کی دستیابی ضروری ہے۔ انفراسٹرکچر اور مشینری میں سرکاری سرمایہ کاری کا یہ سب سے موزوں اور ضروری موقع ہے۔

گندم اور کینولا کا سیزن ختم ہونے کے بعد چارہ، سبزیاں، تیلدار اجناس اور دالوں (سورج مکھی، سویا بین، مونگ) جیسے آپشنز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی زد پہ آیا ہوا رقبہ، بحالی کے بعد کپاس کی فصل کے لیے بہت موزوں ہے۔ کسانوں کی دہلیز پر بیج اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹوں کی بحالی ایک اور اہم مسئلہ ہے جس پر توجہ نہیں دی گئی۔ مارکیٹیں زراعت کے لیے کریڈٹ، خدمات اور زرعی جدت کامر کریں۔

اگلی فصل کے لیے کپاس کے معیاری بیج کی دستیابی کو یقینی بنانا ایک سنگین چیلنج ہوگا۔ سیلاب سے تقریباً پچاس فیصد کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور

جوار کی پیداواری ٹیکنالوجی

ڈاکٹر عمران خان، احمد گیلانی، ڈاکٹر محمد عمر چٹھہ، ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، محمد طلحہ اسلم، فریحہ اطہر..... شعبہ ایگرونیومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جوار کی اہمیت

جبکہ آبپاشی والے علاقوں میں شرح بیج 30 تا 35 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کیا جائے۔ بیج حاصل کرنے والی فصل کے لیے 7 تا 10 کلو گرام فی ایکڑ بیج کافی ہوتا ہے۔ بوائی سے پہلے بیج کو سفارش کردہ زہر ضرور لگائیں۔

آبپاشی

جوار کی فصل گرمی اور خشکی کو برداشت کر سکتی ہے اس لیے اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بارش کی مقدار کے لحاظ سے مارچ تا جون کی فصل کو تقریباً تین یا چار پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں پہلا پانی بوائی کے تین ہفتے بعد اور بعد میں حسب ضرورت آبپاشی کریں۔ بیج والی فصل کو دانہ بنتے وقت پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں ورنہ پیداوار میں کمی متوقع ہو سکتی ہے۔

کھادوں کا استعمال

جوار کی فصل کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات پر عمل کریں۔ چارے والی فصل کے لیے ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری ایس او پی استعمال کریں جبکہ بیج والی فصل کے لیے ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایس او پی کا استعمال کریں۔

اقام

جے ایس۔ 263، جے ایس۔ 88، جے ایس۔ 2002، پاک ایس ایس 11، ہیگاری اور چکوال جوار منظور شدہ اقسام ہیں۔

جڑی بوٹیوں کا تدارک

چارے کی فصل کو جڑی بوٹی مارز ہر کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ بیج والی فصل میں عام طور پر تانلہ، سوانکی، اٹ سٹ اور مدھانہ گھاس بہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان کے تدارک کے لیے محکمہ زراعت کی سفارش کردہ جڑی بوٹی مارز ہر استعمال کریں۔

نقصان دہ کیڑے اور بیماریاں

جوار کی فصل پر کوئیل کی مکھی، گھوڑا مکھی اور تنے کی سڈی وغیرہ کا حملہ ہوتا ہے جو فصل کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ (باقی صفحہ 31 پر)

جوار ایک اہم فصل اور جانوروں کا پسندیدہ چارہ ہے اس میں تقریباً 6 تا 9 فیصد پروٹین موجود ہوتی ہے۔ بعض ممالک جوار کی منجھی اقسام کو چینی بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جوار کے بیج مرغیوں کے لیے بہترین غذائیں۔

آب و ہوا

جوار چونکہ موسم گرما کی فصل ہے اس لیے پنجاب کی آب و ہوا اس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ مکنی کی نسبت جوار گرمی اور خشکی کو بہتر طور پر برداشت کر سکتی ہے لہذا اس فصل کو پنجاب کے آبپاش اور بارانی دونوں علاقوں میں کاشت کیا جاسکتا ہے۔

کاشت کے لیے موزوں زمین/ زمین کی تیاری

بھاری میرا زمین جوار کی کاشت کے لیے نہایت موزوں تصور کی جاتی ہے چونکہ ایسی زمین میں پانی کا ناکس بہتر ہوتا ہے اس وجہ سے اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے دو تا تین مرتبہ ہل چلا کر زمین کو نرم اور بھر بھرا کر لیں اور سہاگہ پھیر کر ہموار کر لیں کیونکہ زمین کا ہموار ہونا اچھی پیداوار کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر سابقہ فصل کے مڈھ زمین میں موجود ہول تو ایک دفعہ روٹاویٹر بھی چلائیں۔

وقت کاشت/ طریقہ کاشت

چارہ حاصل کرنے کے لیے فصل مارچ سے ستمبر تک کاشت کی جاسکتی ہے جبکہ بیج کے حصول کے لیے فصل کی کاشت جولائی کے مہینے میں مکمل کر لینی چاہیے۔ چارے کی فصل کو عام طور پر چھٹہ لگا کر کاشت کیا جاتا ہے لیکن چارے کی اچھی پیداوار کے لیے فصل ایک فٹ کے باہمی فاصلے پر لائنوں میں لگائیں۔ اگر فصل کاشت کرنے کا مقصد بیج حاصل کرنا ہو تو لائنوں کا باہمی فاصلہ دو فٹ تک رکھیں۔ بیج کی گہرائی تین انچ سے زیادہ نہ رکھیں۔

شرح بیج

بارانی علاقوں میں جوار کی کاشت کے لیے 35 تا 40 کلو گرام بیج

بھوری پشت والا تیلہ (براؤن پلانٹ ہاپر)، دھان کا دشمن کیڑا اور تدارک

ڈاکٹر زین العابدین، ڈاکٹر محمد طیب، ڈاکٹر سہیل احمد، ڈاکٹر محمد دلدار خاں گوگی، شازمہ امین، اقران ناصر، آمنہ ظفر، سدرہ احمد، عماد الفت، اسامہ عارف، محمد سفیان..... شعبہ حشرات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



چاول دنیا میں لاکھوں افراد کی ایک پسندیدہ خوراک ہے۔ دنیا کے پچاس فیصد لوگ اپنی روزمرہ کی غذائی ضروریات کو چاول اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے پورا کرتے ہیں۔ دھان کی فصل ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ معاش ہے۔ پاکستان بڑے پیمانے پر چاول کی کاشت کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔



کرتے ہیں اور مادہ اگلے ہی دن انڈے دیتی ہے۔ مادہ 300-350 تک انڈے دیتی ہے انڈے کو عام طور پر پتے کے درمیان میں ایک سیڑھی لکیر کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ انڈے سے تقریباً چھ سے نو دن میں بچے نکلتے ہیں۔ نئے نکلنے والے بچے سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر وہ جامنی بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔

فصل پر تیلے کا حملہ اور اس کی پہچان

یہ بالغ اور بچہ دونوں حالتوں میں نقصان پہنچاتا ہے۔ جولائی سے اکتوبر اس کے حملے کے لیے موزوں مہینے مانے جاتے ہیں۔ یہ پودوں کے نچلے حصے یعنی تنے سے رس چوستے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے پانچ مراحل سے گزرتے ہیں۔ جب پودے کا پتلا حصہ سوکھ جائے تب یہ اوپری پتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں

دھان کے کاشتکاروں کو دھان کی بوائی سے سٹائی تک مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں فصل کی مختلف بیماریاں اور اس پر حملہ ہونے والے مختلف کیڑے شامل ہیں۔ دھان کا تیلہ جسے براؤن ہاپر بھی کہا جاتا ہے آج کل دھان کی فصل کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ یہ فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کی عام طور پر دو اقسام ہیں۔



جس وجہ سے پودا کمزور پڑ جاتا ہے اور تیزی سے خشک ہو جاتا ہے۔ کھیت میں اس کا حملہ بگڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ابتدائی حملہ کے دوران گول پیلے دھبے فصل میں ظاہر ہوتے ہیں شدید حملے کی صورت میں پتے سوکھ کر سیاہ رنگ

1۔ بھوری پشت والا تیلہ 2۔ سفید پشت والا تیلہ

تیلے کی پہچان

عام طور پر تیلہ جراثیم میں چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ بالغ ہوتے ساتھ ہی ملاپ

میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جھلسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس حالت کو ہا پر برن یا تیلے کا جھلساؤ کہا جاتا ہے۔

فصل میں پانی مسلسل کھڑا نہ ہونے دیں اور حملہ ہونے کی صورت میں تین سے چار دن کے لیے فوری طور پر سوکھا لگائیں۔ سایہ دار جگہوں پر دھان کی کاشت کرنے سے گریز کریں۔

درجہ حرارت بھی اس کے پھیلاؤ میں ایک اہم جزو ہے۔ جب درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو اس کیڑے کی تیزی سے افزائش ہوتی ہے۔

پروانے کی تفتی کے لیے روشنی کے پھندے لگائیں۔ نائٹروجن کھا دوں کا مناسب استعمال کریں اور کیڑے مارا دو ایات کا غیر مناسب وقت پر سپرے

جملے سے بچاؤ اور اس کا تدارک

بہترین پیداوار اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے تیلے کا بروقت تدارک ضروری ہے۔

کرنے سے گریز کریں اس سے کیڑوں میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جب آپ کو فصل پر حملے کا شک ہو تو اس کا وقفہ وقفہ سے معائنہ کرتے رہیں اور جب ایک سے زیادہ کیڑے تنوں پر نظر آئیں تو فوراً اس کا کیمیائی کنٹرول شروع

یہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر پرورش پاتا ہے لہذا فصل کے اندر اور اس کے اطراف میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں۔

کریں کیمیائی کنٹرول میں امیڈا کلوپرڈ، نائٹن پائرم اور پائی میٹروزین ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

جوار کی کاشت

بقیہ:

ان کیڑوں کے تدارک کے لیے محکمہ زراعت توسیع کے مقامی نمائندے کے مشورے کے مطابق سفارش کردہ زہر کا سپرے کریں۔ جوار کی فصل پر سرخ پتوں کا دھبہ سب سے سنگین بیماری ہے جبکہ بیج والی فصل پر کانگیاری کا حملہ ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے صحت مند بیج سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔

یعنی دیسیال نکل آئیں، کاٹ لینا چاہیے۔ اس وقت زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے اور چارے کا ذائقہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ چارہ زہریلے مادوں سے پاک بھی ہوتا ہے۔ بیج والی فصل پک کر تیار ہو جائے تو اس کے سٹے کاٹ کر خشک جگہ پر اکٹھے کر لیے جائیں۔ خشک ہونے کے بعد تھریشر سے دانے الگ کر لیں اور کڑب کے گٹھے باندھ کر رکھ لیں جو سردیوں میں جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

وقت برداشت

چارے کی فصل کو کاشت کے اڑھائی ماہ بعد جب 50 فیصد پھول

<<<<<<>>>>>>

پاکستان میں دوائی اقسام کے چاروں کی کاشت۔ سال بھر سبز چارے کی فراہمی کا ذریعہ

بقیہ:

اور اس وقت یہ نہایت عمدہ قسم کا چارہ فراہم کرتا ہے۔ اس کا اگر خشک چارہ بنانا ہو تو اس کی کٹائی اس وقت کریں جب پتے زیادہ ہوں اور پھول نہ ہوں۔ رائی گھاس کی سال کے اندر دو کٹائیاں لی جاسکتی ہیں۔

احتیاط کریں کہ چارہ اندر سے گرم نہ ہو بعد میں اس کے تخم اکٹھے کر لیں۔

پیداوار

پہلی کٹائی چارے کے لیے رکھیں اور دوسری کٹائی بیج کے لیے چھوڑ دیں
اس کے پودوں پر تخم کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور پکنے پر بہت جلد تخم زمین
چہر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وقت پر کٹائی نہ کی جائے تو کثیر مقدار میں تخم
زمین پر گر جاتے ہیں اور دوبارہ رائی گھاس کے پودے پیدا ہو جاتے ہیں لہذا
کٹائی کے بعد گھاس کا ڈھیر لگایا جاسکتا ہے اور سکھایا جاتا ہے سکھانے میں

عام طور پر اس فصل سے تقریباً 500 من فی ایکڑ جب کو برسیم کے ساتھ مخلوط کاشت کی صورت میں تقریباً 900 من فی ایکڑ سبز چارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اقسام
پاکستان میں اس وقت اس کی منظور شدہ قسم صرف ایک ہی ہے جس کا نام آر۔ جی۔ 1 ہے۔

الحمدیث: سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں ام حبیبہؓ اور ام سلمہؓ نے حبش میں ایک گرجا دیکھا۔ اس میں مورتیاں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہؐ سے کیا تو آپؐ نے فرمایا: اگر ان میں کوئی نیک شخص ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنالیتے اور اس میں مورتیاں سجا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن خدا کے نزدیک بدترین مخلوق شمار کئے جائیں گے۔

پاکستان میں دوامی اقسام کے چاروں کی کاشت۔ سال بھر سبز چارے کی فراہمی کا ذریعہ

آصف اقبال، محمد عامر اقبال، رانا ندیم عباس، ہارون زمان خان، اینگریٹومی ڈیپارٹمنٹ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، یونیورسٹی آف پونچھ، راولا کوٹ، آزاد جموں کشمیر

ڈالیں۔

اس کی بوائی کا طریقہ یہ ہے کہ تیاری کی ہوئی زمین جس میں نمی کی مقدار کافی ہو بذریعہ جھٹھ بجھیر دیں اور پھر بارہیرو چلا کر بیج کو مٹی میں ملا دیں۔ اس کے بعد سہاگہ ماریں۔ بیج کو زیادہ گہرائی تک نہیں جانا چاہیے اس کے بیج کو 1/2 11 انچ گہرائی سے زیادہ نہ جانے دیں۔ مخلوط کاشت کی صورت میں کھڑے پانی میں پہلے برسیم کا اور پھر رائی گھاس کا دو ہر اچھٹہ دیں۔

بوائی کا وقت

پاکستان میں اس کی کاشت کا بہترین وقت آخر ستمبر یا اول نومبر کی جاسکتی ہے۔ اگر رائی گھاس کو برسیم کے ساتھ ملا کر کاشت کرنا ہو تو ستمبر کے آخری ہفتے سے اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کاشت کریں لیکن اگر اکیلا کاشت کرنا ہو تو بوائی اکتوبر نومبر میں کریں۔ نیز جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ساری دنیا میں رونما ہو رہی ہیں اور پاکستان ان تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار ہو رہا ہے اور گزشتہ دو سالوں سے 15 اکتوبر تک کافی گرمی پڑی جس کی وجہ سے باقی فصلوں کی طرح برسیم، لون کو بھی دیر سے کاشت کرنا پڑا لہذا اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو اکتوبر کے آخری ہفتے میں کاشت شروع کرنی چاہیے۔

آب پاشی

زیادہ خشک سالی اس فصل کے لیے نقصان دہ ہے زیادہ بارشوں والے علاقوں میں اس کی بڑھوتری کافی اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر رائی گھاس کو تین سے چار دفعہ آب پاشی کی ضرورت ہے۔ پہلا پانی بوائی کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد دیں۔

گھبھاشت یا گوڈی

چونکہ رائی گھاس کے پودے بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں اس لیے اسے نلانی کی ضرورت نہیں ہوتی نیز سخت جان ہونے کی وجہ سے فصل پر کیڑوں کا حملہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ چارے والی فصل پر زہریلی ادویات کا استعمال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔

سٹائی

رائی گھاس کو چرائی بھی کروایا جاسکتا ہے اور اس کو کاٹا بھی جاسکتا ہے۔ سبز چارے کے لیے اسے پھول آنے پر کاٹنا چاہیے۔ (باقی صفحہ 31 پر)

رائی گھاس سردیوں کے چاروں کا ایک اہم چارہ ہے۔ یہ چارہ برطانیہ میں تقریباً سولہویں صدی سے کاشت ہو رہا ہے۔ اس کی نشوونما شدید سردی میں بھی جاری رہتی ہے زیادہ گرمی اس چارے کے لیے موافق نہیں۔ اس چارے کو سرسبز اور خشک دونوں حالتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جانور اس چارے کو بڑی رغبت اور شوق سے کھاتے ہیں۔ اس چارہ میں لحمیات اور خشک مادہ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ رائی گھاس کو تقریباً تمام قسم کی زمینوں میں کاشت کیا جاسکتا ہے لیکن ایسی زمین جن میں پانی کا نکاس اچھا ہو وہ اس کی پیداوار کے لیے اچھی خیال کی جاتی ہے۔

رائی گھاس ایک سخت جان چارہ ہے۔ ہلکی سے درمیانی میرا زمین میں اسے کاشت کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کلر کو برداشت کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ رائی گھاس کا پودا عام طور پر ایک سالہ ہوتا ہے لیکن موافق حالات میں یہ دو سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک بھی زندہ رہ سکتا ہے۔

زمین کی تیاری

بھاری میرا زمین اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس کی زمین کی تیاری کے لیے دو سے تین دفعہ ہل چلائیں اور ساتھ سہاگہ دیں۔ اس کے علاوہ زمین کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے جڑی بوٹیاں اگر زمین پر ہیں تو ان کو صاف کر دیں۔

کھاد

اگر گوبر یا دیسی کھاد پڑی ہو تو بوائی سے پہلے دس سے پندرہ گڈے کھاد کے فی ایکڑ ڈال دیں۔ بصورت دیگر 2.5 بوری ڈی اے پی فی ہیکٹر استعمال کریں۔ بعد میں ہر کٹائی پر 2.5 بوری یوریا فی ہیکٹر استعمال کریں۔

شرح بیج اور بوائی کا طریقہ

کمزور زمینوں پر کاشت کی صورت میں بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کسی پھل دار فصل کے بیج کو شامل کر کے لگائیں مثلاً برسیم اور رائی گھاس کی کاشت بہت کامیاب ہے اس کے علاوہ رائی گھاس اور جینی کو مخلوط کاشت فائدہ مند ہے۔ رائی گھاس کا شرح بیج 30 تا 35 کلو گرام فی ہیکٹر ہے لیکن اگر اس کی مخلوط کاشت مطلوب ہو تو شرح بیج 1/2 یا 3/1 بھی رکھا جاسکتا ہے۔ اگر برسیم کے ساتھ کاشت کرنا ہو تو 15 کلو گرام برسیم اور 15 کلو گرام رائی گھاس فی ہیکٹر

پھول گوبھی کی اگیتی کاشت

ڈاکٹر محمد عرفان اشرف، صدام حسین، ڈاکٹر بلال سعید خاں، ڈاکٹر نذر حسین..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

لگاتے ہیں۔ بیڈ تیار کر کے اسے لائنوں میں بویا دیا جاتا ہے اور فارے کے ساتھ صبح اور شام پانی لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ زمین کی وٹیں بنا لیتے ہیں اور پھر کسی کے ساتھ اس کو پریس کر لیتے ہیں اور پھر زسری لگاتے ہیں۔ پھر پانی لگا کر جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی زہر کا سپرے کر لیا جاتا ہے۔ اگر موسم معتدل اور خوشگوار ہو تو پینری ایک ماہ میں تیار ہو جاتی ہے۔ پنجاب میں اگیتی پھول گوبھی کی کاشت سرگودھا اور خوشاب کے پہاڑی علاقوں میں سکسیر کے دیہاتوں میں کی جاتی ہے وہاں پر پینری کی کاشت فروری، مارچ میں شروع ہو جاتی ہے اور پھول گوبھی پنجاب کی مختلف منڈیوں میں مئی سے دسمبر تک دستیاب ہوتی ہے۔

وقت کاشت

15 جون سے 15 جولائی تک یہ پینری کھیت میں منتقل کی جاتی ہے اور 20 ستمبر سے پھول گوبھی منڈیوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔

زمین

گوبھی کی کاشت کے لیے میرا زمین اور کڑھی زمین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہلکی زمینوں میں فصل جلدی تیار ہو جاتی ہے لیکن پیداوار کے حوالے سے بھاری زمین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگیتی گوبھی زیادہ تر ٹھنڈی زمین میں اگائی جاتی ہے۔

کھادیں

معتدل میرا زمین سے فصل کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش بالترتیب 50-56-69 کلو گرام ایک ایکڑ میں ڈالی جاتی ہے۔ 3 بوری یوریا 2 DAP اور 2 بوری ایس او پی ڈال کر یہ مقدار پوری کی جاتی ہے۔ ان کے متبادل کھادیں بھی ڈالی جاسکتی ہیں۔ گوبھی کو کیشیم کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے باقی کھادوں کی نسبت کیشیم، امونیم نائٹریٹ کی صورت میں دیا جائے تو یہ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ گوبر کی کھاد بھی اس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے موزوں ہے۔

پھول گوبھی کو بیج سے اگایا جاتا ہے۔ آج کل پھول گوبھی کی زسری بھی تیار کی جا رہی ہے۔ اسے 1822ء میں انگریزوں نے ہندوستان میں متعارف کرایا تھا۔ ذیل میں اس کی پیداواری ٹیکنالوجی کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔

کاشت

گوبھی کو بنیادی طور پر دو طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے گوبھی کو بیج اور زسری کے ذریعے کاشت کیا جاتا ہے۔ اگیتی فصل صرف زسری کے ذریعے اگائی جاتی ہے۔

پینری کی کاشت

اگیتی نسل کی پینری اگانے کے لیے زرخیز اور نامیاتی مادوں سے بھرپور اور جڑی بوٹیوں سے پاک زمین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پنجاب میں اگیتی پھول گوبھی کی کاشت سرگودھا اور خوشاب کے پہاڑی علاقوں میں سکسیر کے دیہاتوں میں کی جاتی ہے۔ وہاں پر پینری کی کاشت فروری، مارچ میں شروع ہو جاتی ہے اور پھول گوبھی پنجاب کی مختلف منڈیوں میں مئی سے ستمبر تک دستیاب ہوتی ہے۔ کوئٹہ کا علاقہ لورالائی موسم کے لحاظ سے اگیتی پھول گوبھی کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ وہاں پر جو گوبھی کاشت کی جاتی ہے وہ جولائی سے لے کر نومبر تک پنجاب کی منڈیوں میں لائی جاتی ہے۔ پھول گوبھی لورالائی سے پنجاب کی مختلف منڈیوں مثلاً ڈیرہ غازی خاں، لاہور، ملتان اور فیصل آباد وغیرہ کی منڈیوں میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہے۔ پینری کے حوالے سے سب سے اگیتی کاشت یکم مئی سے فیصل آباد کے کچھ علاقوں کی جاتی ہے اور اس کی زسری ایک ماہ تک تیار ہو جاتی ہے پھر اس کو یہاں سے پورے پنجاب کے لوگ خریدتے ہیں۔ مقامی علاقوں کے لوگ بھی اس کو کاشت کرتے ہیں۔

پینری کاشت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کچھ لوگ بیج

طریقہ کاشت

مارکیٹنگ

بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، زوب وغیرہ، صوبہ خیبر پختونخواہ اور سون سکیم کے علاقوں کی گوبھی اگست، ستمبر تک مارکیٹ میں آجاتی ہے اور اچھی قیمت میں فروخت ہوتی ہے۔ اگیتی نمبر 1 تقریباً اکتوبر تک مارکیٹ میں آجاتی ہے اور اچھے داموں بکتی ہے۔ اگیتی نمبر 2 وسط اکتوبر، نومبر میں کافی اچھے داموں بکتی ہے۔ گوبھی سے نفع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے بھرپور پیداوار حاصل کی جائے۔

بیماریاں

گوبھی کو زیادہ بیماریاں نہیں لگتیں۔ اس کی زمری کو تنے کا گلاؤ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ گرمی کی وجہ سے اگیتی گوبھی کی زمری زیادہ بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ٹاپن ایم یا ریڈ وٹل گولڈ کا سپرے پندرہ دن کی زمری پر ایک ہفتے کے وقفے سے کیا جائے۔ کم از کم دو سپرے کیے جاتے ہیں۔ گوبھی کے پھول کارنگ ہکا گلابی ہونے کی وجہ ڈوال گولڈ کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس صورت حال میں مزید سپرے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کاٹ کر فروخت کر دیا جانا چاہیے۔

پھول گوبھی کے کیڑے مکوڑے

سُست تیلہ، امریکن سنڈی، لشکری سنڈی اور ڈائمنڈ بیک ماتھ وغیرہ گوبھی پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کیڑے مکوڑوں کے انداد کے لیے مختلف قسم کی زہریں وادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گوبھی میں سب سے زیادہ لشکری سنڈی کا حملہ ہوتا ہے اس کے کنٹرول کے لیے ایما میکٹن اور سوپوران کو ملا کر سپرے کیا جاتا ہے۔ اگیتی پھول گوبھی کے ایک ایکڑ سے 250 سے 300 من پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ریٹ اچھا مل جائے تو ایک ایکڑ سے 3 سے 4 لاکھ روپے آمدن حاصل ہو جاتی ہے۔

کاشت کرنے کے طریقہ کے حوالے سے گوبھی کو وٹیں بنا کر یا پھر 2.5 فٹ کی پٹریاں بنا کر کاشت کیا جاسکتا ہے۔ پٹریوں اور وٹوں کے دونوں اطراف میں کاشت کی جاسکتی ہے۔ اگیتی فصل کو لگانے کے لیے زیادہ تر مقامی زمری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وسط جون سے اس پیری کو کھیت میں منتقل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ درمیانی اور لیٹ فصل کو اگر بیج کے ذریعے لگایا جائے تو یہ جلد تیار ہو جاتی ہے۔

آپاشی

زمری کو زیادہ تر فارے کے ذریعے یا چھڑکاؤ کے ذریعے روزانہ پانی دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا گاؤ مکمل نہ ہو جائے۔ منتقل کردہ گوبھی کو 4 سے 8 مرتبہ آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کو کھیت میں منتقل کر لیا جاتا ہے تو پہلی دو آپاشیاں پانچ دن کے وقفے سے دی جاتی ہیں۔ چونکہ جون اور جولائی میں موسم گرم ہوتا ہے تو اس میں پانی 3 تا 5 دن کے وقفے سے لگائے جاتے ہیں اور بعد میں 10 دن کے وقفے سے پانی لگایا جاتا ہے۔ جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پُر ڈرپ اریگیشن کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے اور اس سے قدرے پیداوار بھی بہتر ملتی ہے۔

گوبھی کی برداشت

جو پھول تیار ہو جاتے ہیں ان کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اقسام کے لحاظ سے ہر دوسرے تیسرے دن چٹائی کر لینی چاہیے۔ گوبھی کٹائی کے بعد زیادہ دیر تک کھیت میں نہ رکھی جائے کیونکہ اس سے پھول کی رنگت بدل جاتی ہے اور مارکیٹ میں بھاؤ کم ہو جاتا ہے۔ کاٹنے کے بعد پتوں میں پیننگ کرنے سے سنڈی تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکتی ہے۔ اگر دروازے کے علاقوں میں بھیجی ہو تو اس کو سنڈی میں پتوں سمیت پہنچا دیا جاتا ہے وہاں اس کے پتے اتارے جائیں تو زیادہ محفوظ رہتا ہے۔

مسجد میں تھوک کو ہاتھ سے صاف کرنا: ☆ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلغم قبلہ کی طرف دیکھی تو یہ بات آپ کو ناگوار گزری۔ حتیٰ کہ (آثار غضب) پھرے پر نمودار ہوئے چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا پھر فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے یا اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے لہذا اسے سامنے تھوک سے گریز کرنا چاہئے۔ اسے یا تو بائیں جانب یا پھر پاؤں کے نیچے تھوک دینا چاہئے پھر آپ نے اپنی چادر کا پلو لیا اور اس میں تھوک کر اسے الٹ پلٹ کیا اور فرمایا: اس طرح کرے۔

☆ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی دیوار پر تھوک (لگا) دیکھا تو آپ اسے (بذات خود) صاف کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے منہ کے سامنے تھوک کے اس لئے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔

پاکستان میں خشک میوہ جات کی کاشت اور افادیت

ڈاکٹر بلال سعید خان، علی جبران..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

خشک میوہ جات کی تاریخ

نمکین، بغیر نمکین، پکایا بھنے ہوئے شکل میں مل سکتا ہے۔ کچے بادام سوڈیم سے پاک ہوتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ تاہم، بادام کیلوری سے بھرپور غذا ہے لہذا، آپ کو انہیں اعتدال میں کھانا چاہیے۔ 100 گرام بادام میں 744 کلو کیلوری، فیٹ 59.9 گرام، کاربوہائیڈریٹس 26.9 گرام، فائبر 15 گرام اور پروٹین 25.4 گرام ہوتے ہیں۔

۲- پستہ

پستہ درخت سے پیدا ہونے والا ایک بیج ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا درخت ہے جو افغانستان، وسطی ایشیا اور ایران میں پایا جاتا ہے اور پستہ فائبر، پروٹین، اینٹی آکسیڈنٹس اور مختلف غذائی اجزاء کا بہترین ذریعہ ہے۔ پستے مائیکرو اور میکرو نیوٹریئنٹس جیسے پوٹاشیم، میگنیشیم اور وٹامن بی-6 سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وٹامن بی-6 جسم کے لیے ایک ضروری غذائیت ہے کیونکہ یہ خون میں ہیموگلوبن بنانے میں مدد کرتا ہے۔ 100 گرام پستہ کی غذائیت میں 626 کلو کیلوری، کاربوہائیڈریٹس 16.2 گرام، پروٹین 19.8 گرام، فائبر 10.3 گرام اور فیٹ 53.5 گرام شامل ہیں۔

۳- کھجور

اصل میں کھجور درخت کا پھل ہے۔ اس میں بیج بھی ہوتا ہے تاہم، آپ بازار میں بغیر بیج کے بھی کھجور کی مختلف اقسام تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مروجہ خشک میوہ ہے، اور لوگ انہیں سردیوں میں عموماً کھاتے ہیں۔ کھجور حفاظتی اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے۔ کھجور میں آنتوں کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ پھل قدرتی پیدائش کو آسان بنا سکتا ہے۔ اگرچہ کھجور میں کیلوریز اور چینی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان میں صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ 100 گرام کھجور کی غذائیت میں 317 کلو کیلوری، کاربوہائیڈریٹس 75.8 گرام، پروٹین 2.5 گرام، فائبر 8.3 گرام اور فیٹ 0.4 گرام شامل ہے۔

پچوتھی صدی قبل مسیح میں میسو پوٹیمیا میں خشک میوہ جات کو استعمال کرنے کی ایک طویل روایت ہے، اور اس کے ٹیٹھے ڈالتے، غذائیت کی قیمت اور طویل شیفٹ لائف کی وجہ سے اسے قیمتی قرار دیا جاتا تھا۔ کھجور پہلے کاشت کیے جانے والے درختوں میں سے ایک تھی۔ اسے میسو پوٹیمیا میں 5,000 سال پہلے کاشت کیا گیا تھا۔ میسو پوٹیمیا کے دیہاتی انہیں خشک کر کے مٹھائی کے طور پر کھاتے تھے۔ انجیر روم میں بھی بہت مقبول تھے۔ خشک انجیر کو روٹی میں شامل کر کے لوگ سردیوں میں استعمال کرتے تھے۔ بیر، خوبانی اور آڑو کی ابتدا ایشیا میں ہوئی تھی۔ وہ تیسری صدی قبل مسیح میں چین میں کاشت کئے گئے تھے۔ وہ بہت عرصہ بعد یونان اور اٹلی پہنچے اور بہت مہنگے تھے۔ یہ خشک میوہ جات شہد اور مسالوں کے ساتھ پکنے والے نفیس پکوانوں کی تیاری میں قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ خشک میوہ جات کی شیفٹ لائف تازہ پھلوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک تازہ انجیر صرف ایک ہفتہ تک کھانے کے قابل رہتی ہے، جبکہ ایک خشک انجیر ایک سال تک چل سکتی ہے اور پھر بھی کھانے کے قابل ہے۔ آج کے اس دور میں خشک میوہ جات کا استعمال عام ہے۔ فروخت ہونے والے خشک میوہ جات میں کشمش، کھجور، انجیر، خوبانی، آڑو، سیب اور ناشپاتی وغیرہ شامل ہیں۔ آج، خشک میوہ دنیا کے زیادہ تر خطوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا استعمال تمام ثقافتوں میں ہوتا ہے۔ خشک میوہ جات پروٹین، وٹامنز، معدنیات، غذائی ریشہ اور زیادہ کیلوری والی غذاؤں کا ایک بہترین متبادل ہیں۔ ماہرین صحت تندرست رہنے کے لیے خشک میوہ جات جیسے خوبانی، اخروٹ اور پستہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔

پاکستان کے خشک میوہ جات اور ان کے فوائد

۱- بادام

بادام درختوں کی ایک قسم ہے جو کہ ایران اور آس پاس کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ بادام ایک نشاستہ رکھنے والا گرمی دار میوہ ہے جو آپ کو

۴- کاجو

2.9 گرام اور فیٹ 0.3 گرام شامل ہیں۔

پاکستان میں خشک میوہ جات کی پیداوار کے علاقے

ملک میں مختلف قسم کے خشک میوہ جات اور گری دار میوے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ خشک خوبانی، ناشپاتی، بیر، بادام، اور اخروٹ وغیرہ۔ پاکستان میں خشک میوہ جات اور گری دار میوے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں اُگائے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں کونٹہ، پٹیشن، ژوب، قلات، اور لورالہ؛ خیبر پختونخوا میں پشاور، سوات، مردان، بونیر اور چترال، ہنزہ، سکردو، شگر، راونڈو، خیلو، اور گلگت بلتستان میں بلتستان، ملک کے اہم خشک میوہ جات اور گری دار میوے پیدا کرنے والے اضلاع ہیں۔ خشک میوہ جات بڑے پیمانے پر کنفیکشنری، بینک، اور مٹھائی کی صنعتوں میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

خشک میوہ جات کے کیڑے مکوڑے اور ان کا کنٹرول

خشک میوہ جات عام طور پر اعلیٰ قیمت والی مصنوعات ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر سینک فوڈز یا کنفیکشنری اجزاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان مصنوعات کی مارکیٹنگ اور کوالٹی کنٹرول پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے کیڑے ہیں جو خشک میوہ جات کو کھیت میں یا ذخیرہ کرنے کے دوران متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے مصنوعات پر اخراج کر کے براہ راست نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ظاہری شکل اور معیار کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ مارکیٹ کی قیمت کو کم یا مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ کیڑوں کے حملہ سے نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات افلاؤکسن نامی فنگس بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ مصنوعات میں زندہ کیڑوں کی موجودگی تجارت پر خاص طور پر غیر ملکی منڈیوں پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔

خشک میوہ جات کے کیڑے مکوڑے

کیڑے، مانتھ اور مکھیوں کی ایک بڑی تعداد خشک میوہ جات کے اہم کیڑوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان میں سے چند کیڑوں مکوڑوں کا ذکر ذیل میں ہے۔

۱- ساہو تھ گرین پٹل

یہ ایک عام کیڑا ہے۔ اس کا لاروا اور بالغ دونوں اناج پر حملہ کرتے ہیں۔ مصنوعات، گری دار میوے، کھوپڑا، خشک میوہ جات، نباتاتی ادویات، تمباکو، کینڈی، خشک گوشت، دیگر اجناس، اور شکر پر حملہ کرتا ہے۔

کاجو بھی درخت کے بیج ہیں۔ کاجو کا ایک ناقابل یقین فائدہ یہ ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے خلاف ان کے اثرات سائنسی طور پر ثابت ہیں۔ کاجو خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے اور خون میں انسولین کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، وہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ 100 گرام کاجو کی غذائیت میں 596 کلو کیلوری، کاربوہائیڈریٹس 22.3 گرام، پروٹین 21.2 گرام، فائبر 3.3 گرام اور فیٹ 46.9 گرام شامل ہیں۔

۵- اخروٹ

اخروٹ بھی پودوں پر مبنی اومیگا 3s کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، جو ایک ضروری غذائیت ہے۔ اومیگا تھری دماغی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کی ایک منفرد ساخت اور شکل ہے جو انسانی دماغ سے مشابہت رکھتی ہے۔ اومیگا تھری کی دماغ کو تیز کرنے والی خصوصیات اور اخروٹ کی منفرد شکل انہیں دماغی خوراک کے طور پر مقبول بناتی ہے۔ 100 گرام اخروٹ کی غذائی قدر میں 687 کلو کیلوری، کاربوہائیڈریٹس 11 گرام، پروٹین 15.6 گرام، فائبر 6.7 گرام اور فیٹ 64.5 گرام شامل ہیں۔

۶- کشمش

کشمش خشک انگور ہیں اور ان کی ساخت جھریوں والی ہوتی ہے۔ انگور کو یا تو سورج کے ذریعے یا پھر مائیکروویو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کشمش میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا، یہ آئرن کی کمی کو پورا کرنے اور خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے 100 گرام کشمش میں 308 کلو کیلوری، کاربوہائیڈریٹس 74.6 گرام، پروٹین 1.8 گرام، فائبر 6.8 گرام اور فیٹ 0.3 گرام شامل ہیں۔

۷- خشک انجیر

انجیر درخت کا خوردنی پھل ہیں۔ انجیر میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انجیر کا استعمال معدے کے بہت سے امراض، قبض اور یہاں تک کہ چڑچڑاہٹ، آنتوں کے سڈروم میں بھی فائدہ مند ہے، جس سے آنتوں کی صحت کو فروغ ملتا ہے۔ 100 گرام انجیر کی غذائی قیمت میں 74 کلو کیلوری، کاربوہائیڈریٹس 19.2 گرام، پروٹین 8.0 گرام، فائبر

۲- ڈرائیڈ فروٹ بیٹل

انتظام ہے، دوسرا احتیاط سے کٹائی اور کھیت میں مارکیٹ کے لیے تیاری، اور تیسرا نقصان زدہ یا بوسیدہ پیداوار کو چھانٹنا ہے۔ اس سے باقی صحت مند پیداوار کو انفیکشن سے بچایا جاسکتا ہے۔ اس ساری دیکھ بھال کے بعد بھی بعض اوقات کیڑوں یا نقصان پہنچانے والے جانداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیداوار کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔

عام طور پر کم مقدار میں میوہ جات خریدنے کی کوشش کریں، اور پرانی مصنوعات کو نئے ڈبوں کو کھولنے سے پہلے استعمال کریں۔ خریدنے سے پہلے، ڈبوں میں موجود خریدی جانے والی مصنوعات کا معائنہ کریں، کیڑے مکوڑوں کے ثبوت تلاش کریں، بشمول پیکیجنگ میں سوراخ، اور پیکیجنگ کی تاریخ بھی چیک کریں۔ کیڑے مکوڑوں سے متاثر ہونے والی اشیاء کو فوری طور پر ضائع کر دینا چاہیے یا کیڑوں کو مارنے کے لیے ہیٹ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ کلورین والے پانی سے پیداوار کو دھونے سے پیداوار کی سطح پر بیکٹیریا، مولڈ اور خمیر کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کو روکا جاسکتا ہے۔ خشک میوہ جات اور سبزیوں میں ذخیرہ کرنے والے کیڑوں کو عام طور پر کولڈ سٹوریج، ہیٹ ٹریٹمنٹ، یا نائٹروجن کا استعمال کرتے ہوئے یا آکسیجن کا اخراج کر کے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیڑے پروف کنٹینرز میں پیکنگ، کیڑوں کے انفیکشن کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر، کیڑے مار دوا کے سپرے کی تجویز نہیں دی جاتی ہے۔ تاہم ذخیرہ شدہ خوراک میں کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عام طور پر 2 فیصد کلورڈین، 2 فیصد میلاتھینون، 1 فیصد ڈائیزنون، یا 0.5 فیصد لنڈین سپرے استعمال کی جاتی ہے۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو یہ تمام دراڑوں اور کونوں میں موجود کیڑوں کو کنٹرول کر لیتی ہے۔

ذخیرہ کرنے کے لیے مخصوص ماحول

خشک خوراک کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام کا ٹھنڈا، سیاہ اور خشک ہونا لازمی ہے۔ اسٹوریج ایریا جتنا ٹھنڈا ہوگا، اتنی شیلٹ لائف لمبی ہوگی۔ گودام کا تاریک ہونا مثالی ہے کیونکہ تیز روشنی کی وجہ سے پھل اپنا رنگ اور تازیت کھودیتا ہے اور سبزیاں اور ان میں وٹامن اے اور سی کے مواد بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سرد موسم خشک میوہ جات کے کیڑوں کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے موسم بہار اور موسم گرما میں کیڑوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن ہوسٹ کے منجمد ہونے سے کیڑوں

عام طور پر بالغ کیڑے پر بھورے، سیاہ یا کچھ پر پیلے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ یہ بالغ کیڑے عام فیڈر ہیں اور خشک میوہ جات کو ان کے بالغ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ کیڑے ذخیرہ کرنے والی عمارتوں میں اڑ کر، رینگ کر یا خشک میوہ جات کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں اور ذخیرہ شدہ اشیاء پر حملہ کرتے ہیں۔

۳- انڈین میل ماتھ

یہ ذخیرہ شدہ اناج کے کیڑوں میں سے سب سے عام کیڑا ہے۔ نئے لاروے عام طور پر مدہم سفید ہوتے ہیں لیکن یہ پیلے، گلابی، یا سبز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اناج، گری دار میوے، چاکلیٹ، کارن میل، آنا اور پھلیوں پر حملہ کرتا ہے۔

۴- کشمش کا کیڑا

یہ چھوٹے سرمئی کیڑے ہیں۔ مکمل بالغ لاروا سفید ہوتا ہے اور ان کے پیٹھ پر جامنی رنگ کے دھبوں کی 4 قطاریں ہوتی ہیں۔ یہ کیڑے تمام اقسام کے خشک میوہ جات پر حملہ آور ہوتے ہیں جن میں پھل، گرے ہوئے انجیر، کشمش اور کاجو شامل ہیں۔

۵- بادام کا کیڑا

یہ نسل کشمش کے کیڑے سے ملتی ہے لیکن بہت زیادہ تعداد میں یہ کیڑا حملہ نہیں کرتا۔ یہ کیڑا اناج، پھلیاں، خشک میوہ جات، آنا اور گری دار میوے پر حملہ آور ہوتا ہے۔

۶- ذخیرہ شدہ مٹ کا کیڑا

یہ کیڑا بنیادی طور پر مونگ پھلی اور آلو بخارہ میں پایا جاتا ہے۔ لاروا، گری دار میوہ جات، اخروٹ اور خشک میوہ جات میں پایا جاتا ہے۔

۷- خشک آلو بخارہ کا کیڑا

اس کا لاروا شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد جال بناتا ہے اور بہت زیادہ اخراج پیدا کرتا ہے۔ آلو بخارہ کے علاوہ اس کا لاروا مونگ پھلی اور شہد کے چھتے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اخروٹ کے کیڑے کے طور پر یہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔

ذخیرہ شدہ اشیاء کے کیڑوں کا کنٹرول

کیڑے مکوڑوں کے خلاف پہلا قدم پیداوار کے دوران اچھا

کم کر دی ہے۔ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے وسط میں واقع بازاروں نے ویران شکل اختیار کر لی ہے۔

پاکستان کی برآمد پالیسی اور فارن انکم

پاکستانی خشک میوہ جات کی چین میں ایک بڑی منڈی ہے۔ چین پاکستان سے چلغوزے کے سب سے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں پیدا ہونے والا چلغوزہ اپنے ذائقے اور مقامی و بین الاقوامی مارکیٹ میں زیادہ مانگ کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان ٹوڈے کے مطابق گلگت بلتستان حکومت اچھی بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پروسیسنگ، پیکیجنگ اور ویڈیو ایڈیشن کا ایک منصوبہ شروع کرے گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات فتح اللہ خان کے مطابق، اس منصوبے سے کاروبار سے وابستہ سیکٹروں مقامی افراد کو اپنا چلغوزہ برآمد کرنے اور بہتر معاش کرنے میں مدد ملے گی۔ چلاس، دیامر میں پہلی بار چلغوزہ فیسیول کا انعقاد کیا گیا جہاں خشک میوہ جات کی مختلف اقسام کی نمائش کی گئی۔ علاقائی حکومت نے اعلیٰ قیمت والے چلغوزہ کی پیداوار اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اس تقریب کو کیلنڈر سال کے طور پر منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں دیامر کے لوگ اس پراڈکٹ سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان کے تعاون سے پراڈکٹ کی بڑے پیمانے پر پیداوار میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک پراجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی منڈی تک چلغوزہ کی رسائی کو ممکن بنانے سے دیامر جیسے دور افتادہ علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

کی بقا پر اثر پڑتا ہے۔ خشک میوہ جات کی بیٹل پکے اور زیادہ پکے پھلوں کو ترجیح دیتی ہے، لیکن جب پھل خشک ہو جاتا ہے تو یہ بیٹل ان کو غیر موزوں پاتا ہے۔ لیکن کچھ کیڑے خشک پھلوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ کشمش کیڑا، یہ جزوی طور پر خشک مصنوعات کو ترجیح دیتا ہے۔ عام طور پر خشک میوہ جات میں نمی ہوتی ہے۔ نمی اگر 10 فیصد کی سطح سے اوپر ہو تو کیڑے خشک میوہ جات کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ پھلوں کو اس حد تک خشک کیا جائے کہ کیڑے ان پھلوں پر زندہ نہ رہ سکیں۔

متوسط طبقے کے لیے خشک میوہ جات کی دستیابی

زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایک باقاعدہ روایت ہے کہ وہ سردیوں کے موسم میں مختلف خشک میوہ جات کھاتے ہیں جس کی وجہ ان کی غذائیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ تر خاندان خاندانی اجتماعات اور تعاملات کے دوران خشک میوہ جات کھانے کو ایک ضروری روایت سمجھتے ہیں جبکہ ملک کے کچھ علاقوں میں مہمان نوازی اور پروٹوکول کے اشارے کے طور پر انہیں چائے یا قہوہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم بین الاقوامی سطح پر پھیلی ہوئی مہنگائی نے پاکستان میں مختلف اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے۔

پاکستان میں مونگ پھلی، بادام، پائنٹ، اخروٹ، پستہ، خوبانی، کاجو، خشک انجیر اور کشمش سمیت خشک میوہ جات کی قیمتوں میں گزشتہ چند سالوں سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ پائنٹ نے قیمتوں میں اضافے کے معاملے میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، آمدنی کے کم ہوتے ذرائع، زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور قوت خرید میں کمی نے گزشتہ سال کے مقابلے میں خریداروں کی تعداد 50 فیصد تک

بلخ بانی

بقیہ:

خوراک کا استعمال: بلخ چھوٹے سائز کی خوراک کو زیادہ آسانی سے استعمال کر سکتی ہے اس لیے اس کو میش خوراک دی جائے۔ دانے دار خوراک زیادہ تر ضائع ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی چوچ کی ساخت کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ نسل بڑھانے کا عمل: 6 مادہ کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ انڈے دینے سے ایک ہفتہ پہلے نر کو مادہ کے ساتھ جمع کر دیا جائے تاکہ وہ ملاپ کر سکے اور انڈوں کی زیادہ سے زیادہ بارآوری ہو سکے۔ انڈوں سے بچے نکالنا: بلخ کے انڈوں سے بچے نکلنے کا دورانیہ 28 دن ہے۔ بلخ

کے انڈوں کو مرغیوں کی ہچری میں بھی رکھا جاسکتا ہے۔ ہچری کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے تاکہ بیماریاں کم سے کم آئیں۔ گزراشات: بلخ کی پیداوار میں بہت کمی آرہی ہے۔ پچھلے سال بلخوں کی آبادی 52 لاکھ تھی جبکہ اس سال 50 لاکھ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کی سرکاری سطح پر سرپرستی کی جائے اور اس کو حکومتی پالیسی میں شامل کیا جائے۔ اس کے گوشت کے فروغ کے لیے مرغیوں کے گوشت کی طرح نانہ برائے بلخ گوشت نافذ العمل کیا جائے۔

بھینس، بہترین بلیک گولڈ: پاکستان کا دودھیل جانور

ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر محمد سیف الرحمن، ڈاکٹر عزیز الرحمن..... فیکلٹی آف انیمل ہیڈنڈری، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہے جو غیر ملکی گائیوں کے وسائل اور استطاعت نہیں رکھتے۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے مقامی دودھیل نسلوں خصوصاً بھینسوں کے بارے میں غلط تشہیر کو بند کیا جائے۔ بھینس کو بلیک گولڈ آف پاکستان کہا جاسکتا ہے۔ اس وقت ملکی سطح پر جتنا دودھ سالانہ پیدا ہو رہا ہے اس میں 60 فیصد سے زیادہ بھینسوں کا دودھ ہے حالانکہ بھینسوں کی تعداد گائیوں سے کم ہے۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھینسوں کی دودھ کی پیداوار کم ہے وہ دراصل ان کی پرورش و نگہداشت سے ناواقف ہیں۔ حال ہی میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھینسوں کے دودھ کا مقابلہ ہوا جس میں پہلن جھوٹی (4 دانت) نے 24 گھنٹے میں 28.3 لیٹر دودھ دیا جو اس بات کی عکاسی ہے کہ اگر ان کی پرورش، نگہداشت سفارش کردہ طریقوں سے کی جائے اور ان کی موروثی صلاحیت کو مکمل طور پر بروئے کار لایا جائے تو پیداوار میں واضح اضافہ ممکن ہے۔

بھینسوں کے متعلقہ اہم باتیں درج ذیل ہیں۔

- 1۔ بھینس تہرے اوصاف کا حامل جانور ہے یعنی اسے دودھ، گوشت اور بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2۔ ملکی سطح پر سالانہ دودھ اور گوشت کی پیداوار کا تقریباً 60 فیصد دودھ اور 50 فیصد گوشت بھینسوں سے حاصل ہوتا ہے۔
- 3۔ ایک وقت تھا جب نیلی اور راوی دوا لگ الگ نسلیں تھیں۔ اس کا آبائی وطن دریائے ستلج کی وادی تھا۔ ستلج کے نیلے پانی کی وجہ سے نسل کا نام نیلی مشہور ہوا۔

- 4۔ راوی نسل کی بھینس کا علاقہ دریائے راوی کی وادی ساندل بار تھا۔
- 5۔ اس وقت نیلی اور راوی نسل کی بھینس کا ملنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ دونوں نسلوں کے ملاپ سے اب نیلی راوی نسل کی بھینس مقبول عام ہے۔ نیلی راوی بھینس دنیا میں اپنی پیداواری اوصاف کی وجہ سے نمبر 1 پر ہے۔ (باقی صفحہ 48 پر)

بلاشبہ اس وقت فوڈ سیکورٹی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی ضروریات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں اور ذرائع دیئے ہیں ان سے مکمل طور پر استفادہ کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی سطح پر دودھ اور گوشت کی پیداوار میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری آبادی کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پارہی۔ اللہ نے ہمیں بہترین بھینسوں اور گائیوں کی نسلوں سے نوازا ہے جو اس ماحول میں موسمی شدت کو برداشت کرنے کے علاوہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند لوگ اپنی ان نسلوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے غیر ملکی گائیوں کی تشہیر کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ بلاشبہ ان گائیوں کی فی کس پیداوار زیادہ ہے لیکن درج ذیل حقائق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔

- 1۔ مقامی دودھیل جانوروں کے مقابلے میں غیر ملکی گائیاں اپنی زندگی میں کم بچے پیدا کرتی ہیں۔
- 2۔ ان گائیوں پر اٹھنے والے اخراجات یعنی ان کی دیکھ بھال، خوراک اور بیماریوں سے بچاؤ پر خرچہ زیادہ آتا ہے۔
- 3۔ ان گائیوں میں مختلف بیماریوں خصوصاً منہ کھر، ساڑا اور چیچریوں کا بخار وغیرہ کی شرح وقوع پذیری زیادہ ہے۔
- 4۔ ہماری عوام گائیوں کے مقابلے میں بھینسوں کے دودھ کو زیادہ پسند کرتی ہے۔
- 5۔ بھینسوں کے دودھ کا ریٹ گائیوں کے دودھ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس وقت فیصل آباد میں بھینسوں کا دودھ 160 روپے فی لیٹر ہے اور گائیوں کا دودھ 100 روپے فی لیٹر سے بھی کم میں فروخت ہو رہا ہے۔
- 6۔ ہمارے ملک میں چھوٹے فارمرز کی تعداد نوے فیصد سے زیادہ

فینسی پرندوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اہم معلومات

ڈاکٹر فواد احمد، ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر محمد شریف، ڈاکٹر محمد اشرف..... انسٹیٹیوٹ آف انیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

فینسی پرندے جن میں مرغی، بڑی، بکوتر، بیٹر، طوطا، بکوتر، مور اور

سرخاب وغیرہ شامل ہیں کو پال کر اچھا منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان پرندوں کو پالنے کے لیے دوران کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے فینسی برڈز پالنے والے حضرات سے انٹرویو کیا گیا اور چند اہم پریکٹیکل معلومات کو اس مضمون کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کاروبار سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔

1- انکوبیشن کے مسائل اور ان کا حل

انکوبیشن کے دوران انڈوں سے چوزے نکلنے کی شرح بہت کم ہوتی ہے اس مسئلہ کے لیے ضروری ہے کہ انکوبیٹر کو ایسے کمرہ میں رکھا جائے جس کا درجہ حرارت تقریباً 85 ڈگری فارن ہائیٹ اور نمی 50 سے 60 فیصد ہو۔ اس طریقہ کار میں مشین کے اندر درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے اور انڈوں کی چیکنگ کے دوران ان کے خراب ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نیز انکوبیشن کے آخری تین دن انکوبیٹر میں نمی کو چیک کریں اور مشین کے اندر پانی والے برتن کو خشک نہ ہونے دیں۔

2- چوزوں کی نگہداشت

انڈے سے چوزہ نکلنے کے فوراً بعد اس کو خوراک نہ دیں بلکہ 48 گھنٹے کے بعد اس کو تین فیصد شکر کے پانی سے فلشنگ کروائیں اور سات دن تک مکئی کا دلیہ استعمال کریں۔ یہ طریقہ کار مرغی، بطخ، مور، پیر اور تیزی کے بچوں کے لیے ہے۔ ٹیم سکھانے والے کرنے والے طوطے اور بکوتر کے بچوں کو ہاتھ سے فیڈ کروائیں اور سری لیک کا استعمال کریں۔ نیز بچوں کو زیادہ خوراک نہ دیں بلکہ وقفہ وقفہ سے خوراک دیں۔

3- چھوٹے چوزوں کو انکوبیٹر سے نکالنے کے بعد کم از کم 4 ہفتے کے لیے لکڑی کے بروڈر میں رکھیں جس میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور آب و ہوا کا نظام موجود ہو۔ انکوبیٹر کا درجہ حرارت دوران سینگ 90.5 ڈگری فارن ہائیٹ اور نمی 55 سے 65 فیصد رکھیں جبکہ دوران ہچنگ اس کو 97 ڈگری فارن ہائیٹ درجہ حرارت اور نمی 65 سے 75 فیصد

4- بروڈنگ کے دوران لکڑی کے بروڈر کا درجہ حرارت 80 سے 90 ڈگری فارن ہائیٹ کے درمیان رکھیں اور نمی 45 سے 55 فیصد ہونی چاہیے۔ بروڈر کو ہفتہ میں دو دفعہ صاف کریں۔ معیاری انکوبیٹر و بروڈر بنوانے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ پولٹری سے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

5- بڑے پرندوں کی نگہداشت

بڑے پرندوں کو خریدنے کے بعد ان کے بیرونی کیمڑوں کے خاتمے کے لیے کوٹیکس پاؤڈر کو راکھ میں ملا کر پروں کے اندر ڈسٹنگ کریں جبکہ اندرونی کیمڑوں کے خاتمے کے لیے کوپین ایک گرام فی کلو گرام فیڈ یا دو چمچ فی گیلن پانی میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پیپرا زین پاؤڈر ایک گرام فی کلو گرام فیڈ میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ چپٹے کیمڑوں کے لیے ورمول کا 20 گرام فی کلو گرام فیڈ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

6- مور، مرغی اور بکوتر میں رانی کھیت کو ویکسین کروانی چاہیے تاہم بیماری کی صورت میں کچھ فارم حضرات کا تجربہ ہے کہ بیمار جانور کو دودھ میں گڑ ملا کر دیں۔ گڑ کی مقدار اتنی ہو کہ دودھ میٹھا ہو جائے۔ پرندوں کی خوراک مکمل بند کر دیں۔ اگر 12 گھنٹے کے بعد پرندے خوراک کھانے لگیں تو خوراک کی بجائے دودھ میں رس بھگو کر دیں اور دوبارہ گڑ والا دودھ دیں۔ پرندوں کو خوراک پانچ سے چھ دن کے بعد شروع کروائیں۔ اگر اس طریقہ سے پرندے کا پوٹ نہ کھلے تو پوٹ کو لٹائیں اور اسے خالی کریں اور پرندے کو گڑ والے دودھ دو دن دیں اور تین دن دودھ کے ساتھ رس کا استعمال کرنے کے بعد فیڈ (استعمال) کریں۔ اس طریقہ کار سے بہت سے فارم اپنے پرندوں کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تاہم جس بکوتر کو جھولے کی بیماری (ND) کا مکمل اٹیک ہو جائے اس کو روزانہ 8 سے 10 چنے صبح و شام ہاتھ سے فیڈ کروائیں اس



روشنی کے دورانیہ کو کنٹرول کرنے والا نظام

کمرشل پولٹری میں کی جانے والی ٹریٹمنٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ امید ہے معلومات فیسی برڈ پالنے والے حضرات کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ مزید برآں فیسی برڈ ز پالنے والے حضرات خصوصاً طوطے اور کبوتر کے بریڈر حضرات کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ انیمل ہسبنڈری



ہواسے مٹی کے ذرات اور جراثیم کو ختم کرنے والی مشین

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں شیڈ میں روشنی کو کنٹرول کرنے کا نظام بھی بنایا گیا ہے جس سے پرندوں کے تولیدی نظام پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان میں انڈوں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ انیمل ہسبنڈری زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پرندوں کو فارم پر ہوا کو صاف کرنے اور ہوا میں جراثیم اور نقصان دہ مٹی کے ذرات کو کم کرنے کے لیے ایئر فلٹریشن سسٹم بھی بنایا گیا ہے جس کو پرندے پالنے والے حضرات پرندوں کے شیڈ میں لگوا کر سانس کی بیماریوں سے پرندوں کو بچا سکتے ہیں۔

کے ساتھ وٹامن بی کمپلیکس کی ایک گولی اور Evion کا ایک کپسول صبح و شام سات دن کے لیے دیں۔ اس طریقہ کار سے آپ کبوتر سے مزید بریڈ لے سکتے ہیں۔

7- نزلہ زکام کی صورت میں فارم حضرات نے Vibromycine یا Doxycycline اور ڈائی برن سے اچھے نتائج حاصل کئے ہیں جبکہ بخار، نزلہ، زکام، آنکھوں کی سوزش اور لمبے سانس لینے کی صورت میں سیرپ پیناڈول 3CC صبح و شام کے ساتھ اتر ورن، 150 گرام فی 50 کلو فیڈ سٹریپٹو مائی سین انجکشن فی گرام برائے 5 پرندے اور Procaine Penicillin 40، لاکھ انجکشن برائے 250 برڈ سے بھی اچھے نتائج حاصل کئے گئے ہیں (دوائی کی خوراک کو ڈاکٹر کے مشورہ یا پیکیٹ پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں) نیز گرمیوں میں دوائی پانی میں اور سردیوں میں خوراک میں مکس کر کے دیں۔

8- انتڑیوں و پیٹ کی بیماری کے لیے پیناڈول، اتر ورسین، فلیکس سیرپ اور وینٹال سول پر سے بھی اچھے نتائج حاصل کئے گئے ہیں تاہم خونی پیچش و انتڑیوں کی سوزش کے لیے 0.2 Tetracycline، گرام فی کلو یا TM-200، 1.5 گرام فی کلو گرام فیڈ میں دی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ کلو روٹا سائیکلین ایک گرام فی کلو گرام فیڈ میں بھی دی جاسکتی ہے۔

9- دیسی طریقہ کار میں پرندوں کو بند گوبھی اور پالک وزن بڑھانے کے لیے دی گئی جس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔

10- کمرشل فیڈ ڈالنے والے حضرات پرندوں میں فیڈ پوائزن کا مسئلہ بھی دیکھا ہے جس کو حل کرنے کے لیے کمرشل فیڈ صبح اور دانے دار فیڈ شام کو دینے سے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لہسن اور ہلدی کے استعمال سے پرندوں میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔

اس مضمون میں دی گئی معلومات فارم حضرات سے انٹرویو کر کے حاصل کی گئی ہیں اور فارم سے حاصل کی جانے والی معلومات کے ساتھ

الحمدیہ: مسجد میں داخل ہوتے اور دیگر کاموں کے وقت دائیں جانب سے ابتداء کرنا، ابن عمر جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھتے اور جب نکلتے تو بائیں پاؤں پہلے نکالتے۔ سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہؐ جہاں تک ہو سکتا اپنا ہر کام دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے، طہارت کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں۔

لمبی سکن کی بیماری اور حفاظتی اقدامات

ڈاکٹر فرزانہ رضوی، ڈاکٹر محمد وسیم عثمانی..... ڈیپارٹمنٹ آف پیتھالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

لمبی سکن کی بیماری

گلٹی دار جلدی بیماری ایک وائرس سے پھیلنے والی مہلک بیماری ہے جو گائیوں اور کچھ جنگلی جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری نے حال ہی میں پاکستان کے ان علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جہاں ملک کے اکثریت جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے علاوہ افریقہ، ایران، بھارت، چائنا، بنگلہ دیش اور ترکی میں بھی اس بیماری کے پھیلنے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان میں مویشیوں میں گلٹی دار جلدی بیماری کے حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے تھے اور مقامی ڈیری اور گوشت کی صنعت کو نقصان پہنچا۔ خاص کر جانوروں میں دودھ کی پیداوار میں کمی ہوئی اور کھال کا معیار بھی متاثر ہوا۔ کراچی میں جانوروں کی حالیہ درآمدات کی وجہ سے ملک میں بیماری پھیلنے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری مچھر، مکھیاں اور چچھر کی کچھ اقسام سے پھیلتی ہے جس وجہ سے یہ بیماری پاکستان کے مختلف علاقوں خاص کر صوبہ سندھ اور پنجاب میں تیزی سے پھیلی۔ اس بیماری کا دورانیہ دو سے چار ہفتے ہے جس دوران جانور کمزور ہو جاتا ہے اور جلد پر گلٹیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وائرس جانوروں کے لمفٹ نوڈز میں داخل ہوتا ہے جس سے اس کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور یہ گلٹیاں پورے جسم خاص طور پر سر، گردن، ٹانگوں، جیوانہ اور پیٹ والی جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ جانوروں میں تیز بخار اور ٹانگوں پر سوزش اس کی علامات میں شامل ہیں۔ یہ گلٹیاں کافی بڑی، سخت اور ابھری ہوئی ہوتی ہیں جن کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے اور جسم پر کافی عرصہ تک رہتی ہیں جو بعد میں زخم کی شکل اختیار کر کے جانوروں میں بھوک کی کمی اور سستی کا باعث بھی بنتی ہیں اور حاملہ جانوروں میں بچہ گرانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ وائرس متاثرہ جانوروں کی قوت مدافعت کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے جس سے بیکٹیریا اور دوسرے جراثیم بھی جانوروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ گلٹیاں زخم میں تبدیل ہو کر اس بیماری کے وائرس کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں (بیمار جانور سے صحت مند جانور میں بیماری

منتقلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں) اور ماحول میں بھی وائرس کی موجودگی بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وائرس گرمی والے ماحول (مرطوب موسم) میں کئی ماہ تک رہ سکتا ہے۔ یہ وائرس انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے اور نہ ہی متاثرہ جانوروں کے دودھ اور گوشت کے استعمال سے اور نہ ہی متاثرہ جانور سے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔

حفاظتی اقدامات

گلٹی دار جلدی بیماری کے روک تھام میں حفاظتی ٹیکہ جات بنیادی اہمیت کے حامل ہیں یہ بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جانوروں کی نقل و حرکت کو سختی سے روکنے اور حفاظتی ٹیکہ جات کے ذریعے اس بیماری پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ علاج معالجہ اور حفاظتی ٹیکہ لگواتے وقت ہر بار اور ہر جانور کے لیے نئی سرخ استعمال کریں۔ اس بیماری کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات کو سالانہ بنیاد پر جانوروں میں لگانا چاہیے۔ ویکسین حاملہ جانوروں اور بچھروں میں بھی کی جاسکتی ہے جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔

گلٹی دار جلدی بیماری سے متاثرہ جانور کے مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے سیٹرائیڈ اور INS AIDs استعمال کیے جائیں۔ پرو بائیونک اور وٹامنز کو ان کی خوراک میں شامل کیا جائے اور بہتر معیاری اینٹی بائیونک کا استعمال کیا جائے۔ ایئور میکسن کا استعمال بھی اس بیماری سے متاثرہ جانوروں میں کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ متاثرہ جانوروں کو کم از کم چودہ سے بیس دن کے لیے صحت مند جانوروں سے الگ رکھنا چاہیے کیونکہ اس بیماری سے متاثرہ جانور صحت مند جانوروں میں بیماری منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جانوروں کو مچھر اور مکھیوں سے بچاؤ کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور چچھر مار ادویات کا استعمال کیا جائے۔ مردہ جانوروں کو مناسب طریقہ سے زیر زمین دفن کریں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

بلخ بانی

ڈاکٹر ناصر مختار، محمد صفدر انجم..... شعبہ پولٹری سائنس، پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی

بلخ ایک چھوٹی ٹانگوں، پیچھے دار پاؤں اور ہموار چونچ والا پرندہ ہے۔ ایشیاء میں اسے باقاعدہ طور پر 2000 سال قبل کھانے کے لیے اپنایا گیا۔ دنیا کی کل پولٹری میں اس کا حصہ 7.5 فیصد ہے اور یہ 70 فیصد چین میں ہوتی ہے۔ 5 فیصد بلخ بانی فرانس میں اور باقی دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتی ہے پاکستان میں بلخ کی کل تعداد 52 لاکھ ہے۔

ہاؤسنگ

بلخ بانی کئی طرح کی عمارت میں کی جاسکتی ہے۔ روایتی نظام میں لمبا تنگ گھر جس میں ہر طرف راہداری ہوتی ہے بہتر سمجھا جاتا ہے۔

اقلام

i۔ کھلے علاقے ii۔ چراگاہیں

کھلے علاقے

یہ سب سے مستطابقہ ہے کیونکہ اس طرح چھوٹے کاشتکار بلخ بانی کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔

بروڈنگ

بلخ بانی کی بروڈنگ عموماً 3 سے 4 ہفتے تک کی جاتی ہے۔ بلخ کی بروڈنگ مرغی کی نسبت زیادہ آسان ہوتی ہے۔ بلخ میں اس کو دو طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔

i۔ فرش پر بروڈنگ ii۔ بیٹری سسٹم

فرش پر بروڈنگ

ایسا فرش جس پر 2 انچ لٹر (برادہ) ہو اس کام کے لیے لکڑی کا برادہ اور چاولوں کا برادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلخ میں پانی پینے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تار والا بیرونی ڈبہ اور تار والا فرش استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا فرش پہلے چار ہفتوں کے لیے 12.5 ملی میٹر اور 8 گج پر مشتمل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو 24 گھنٹوں کے بعد بروڈر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پہلے ہفتے کا درجہ حرارت 85.90 ڈگری فارن ہائیٹ ہونا چاہیے اور اگلے ہفتے درجہ حرارت 5 درجہ کم کر دیتے ہیں لیکن 70 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 100 تا 150 چھوٹے بلخوں کے لیے 6x12 فٹ جگہ درکار ہوتی ہے جب کہ چک گارڈ کا استعمال 4-3 دنوں کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ چوزے بروڈر کے ساتھ لگ کر جل نہ جائے۔ تین ہفتوں میں چھوٹے بچوں کے لیے ایک مربع فٹ فی بلخ جگہ مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نمی کی مقدار زیادہ رکھی جاتی ہے اور ہوا کا نظام بھی مناسب ہونا چاہیے۔

بلخ بانی کے فوائد

۱۔ بلخ کے گوشت میں پروٹین کی مقدار 14.5 فیصد جبکہ مرغی کے گوشت میں 12.2 فیصد ہوتی ہے۔

۲۔ بلخ کے انڈے کا وزن مرغی کے انڈے سے 20 گرام زیادہ جبکہ غذائی اہمیت مرغی سے 41 فیصد زیادہ ہوتی ہے۔ بلخ مرغی سے چالیس انڈے زیادہ دیتی ہے۔

۳۔ بلخ کو آبی ذخائر جیسے دریا اور پانی سے متصل علاقوں میں پالا جاتا ہے۔

۴۔ اس کی ابتدائی لاگت کم ہوتی ہے۔

۵۔ بلخ بانی اور مچھلی بانی کی مخلوط پرورش ہو سکتی ہے۔

۶۔ اس کو چاولوں کے کھیت کے ساتھ بھی پالا جاسکتا ہے۔

گوشت والی نسلیں

(امریکن معیار کے مطابق)

نسل	ابتداء	ورائٹی	اوسط وزن
پکن	چین	سفید	4 کلو گرام
ایسیلے	انگلستان	سفید	4 کلو گرام
رون	فرانس	گرے بلیک	4 کلو گرام
موسکوئے	جنوبی امریکہ	سفید	4 کلو گرام
چوکیوا	نیویارک	کالا	4 کلو گرام

ان اقسام میں پکن اور موسکوئے کو ان کے گوشت کے غذائی ذائقے کی وجہ سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔

بیٹری سسٹم

بروڈ نمونیا

ٹھنڈ کی وجہ سے یہ بیماری جنم لیتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں آنکھوں سے پانی بہنا، سانس لینے میں دشواری اور سر کا دونوں جانب سوجھنا ہے۔ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے پرندوں کو مناسب درجہ حرارت مہیا کریں اور ہوا کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔

پیرا تھانی رائٹ

یہ بیماری سالمونیلا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے پھیلنے کی وجہ متاثرہ خوراک ہے۔ اس بیماری کی علامات میں وزن میں نمایاں کمی ہونا اور بلخ کا روشنی کے ارد گرد اکٹھا ہونا شامل ہے۔

ڈک کالرا

یہ ایک بیکٹیریل بیماری ہے جو پرندوں کو چوتھے ہفتے میں متاثر کرتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں ڈائیریا کا سبز رنگ شامل ہے۔ بلخ کے منہ سے پانی بہتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور بلخوں کی ویکسی نیشن ہونی چاہیے۔

ڈک وائرل انٹرائٹس

یہ بہت خطرناک وائرل بیماری ہے۔ اس بیماری کی علامات میں بھوک نہ لگنا اور پیاس کی شدت شامل ہے۔ اس میں ڈائیریا سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے متاثرہ پرندوں کو علیحدہ کریں اور ویکسی نیشن کریں۔

لیٹر بلخ بانی

انڈے دینے والی درج ذیل نسلیں بہت مشہور ہے۔

i۔ رن

یہ سب سے زیادہ انڈے دینے والی نسل ہے۔ کچھ اقسام 322 انڈے ایک سال میں دیتی ہیں۔

ii۔ بلیٹ

یہ انگلستان کی انڈے دینے والی نسل ہے۔

iii۔ خالی کیمبیل

یہ متحدہ ریاست ہائے امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے لیکن انگلستان میں بہت مشہور ہے۔ اوسطاً 200 انڈے ایک سال میں دیتی ہے۔

اس سسٹم میں 25 بلخوں کو 600 ملی لیٹر 1200x ملی لیٹر 250x ملی میٹر کی بیٹری میں تین ہفتوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔

ریٹرنگ (4 ہفتے سے لے کر انڈے دینے سے پہلے تک)

چار ہفتے کی عمر میں ان کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ان کو بیرونی دشمنوں مثلاً چوہے، لومڑیاں، بکڑے اور دوسرے دشمن پرندوں سے محفوظ رکھا جائے۔ پانی کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔

فیڈنگ

پہلے دو ہفتوں کے لیے غذا کراپ کی صورت میں ہونی چاہیے۔ بلخ 22 گرام خوراک ایک کلو گرام وزن کے لیے جبکہ استعمال کرتا ہے۔ بلخ مادہ 3.22 گرام خوراک ایک کلو گرام زندہ وزن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آٹھویں ہفتے کے دوران بلخ کی غذا درج ذیل ہونی چاہیے۔

10	10	10	چونے کا پتھر (ملی گرام فی کلو فیڈ)
-	7	-	ڈائی کیلشیم فاسفیٹ (ملی گرام فی کلو فیڈ)
13	13	13	وٹامنز/منرلز پری مکس (ملی گرام فی کلو فیڈ)

بلخ کو غذا میں وٹامنز مثلاً وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن کے، فولک ایسڈ دینا چاہیے تاکہ ان کو ٹانگوں کی کمزوری اور مفلوج ہونے سے بچایا جاسکے۔

بلخ کو مرغیوں کی نسبت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے لہذا صاف اور تازہ پانی بروقت دستیاب ہونا چاہیے۔ پانی کی گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں سر ڈوبا جاسکے ورنہ آنکھیں خشک اور ماندہ ہو جائیں گی جو کہ اندھا پن کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اگر غذا پانی میں اکٹھی ہو جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو روزانہ دھونا چاہیے۔

بیماری سے بچاؤ

بلخ ہمیشہ سالمونیلا کا کیئر یز رہا ہے۔ یہ پولٹری کے دوسرے پرندوں کے لیے بھی ایک مستقل خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے بلخ بانی کے لیے ضروری ہے کہ اس بیماری کے سدباب کے لیے احتیاطی تدابیر کی جائے۔ عموماً بلخ میں بہت کم بیماریاں آتی ہیں۔ کچھ بیماریاں جیسے بخار، فول کالرا اور پیرا تھانی رائٹ ہو سکتی ہیں جن پر قابو پانے کے لیے کوئی باقاعدہ طریقہ اپنایا جائے۔

نسل	ابتداء	ورائیٹی	اوسط وزن	جائے گی۔
رنز	ایسٹ انڈیا	سفید	5.2 کلوگرام	فرش کی پیمائش (بلحاظ عمر)
خانگی کیت بیل	انگلستان	خانگی	25.2 کلوگرام	عمر

لیئر بلخ بانی کا انتظام

بلخوں کو دو طرح کے ماحول میں پالا جاسکتا ہے۔ ان کی خوراک میں الفا الفا، دالیں اور گھاس وغیرہ شامل ہیں۔

یاد رہے: اس قسم کا گھر شدید موسم اور زیادہ درجہ حرارت سے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ 250 بلخوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ پرندوں کو دوسرے خطرناک جانوروں سے بھی بچاتا ہے۔

جنس کا تعین

جنس کا تعین دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

i۔ پروں کے ذریعے: نر کی دم کی سطح پر بال ہوتے ہیں جبکہ فی میل میں ایسا نہیں ہوتا۔

ii۔ آواز سے: نر کی آواز بلند ہوتی ہے جبکہ مادہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مرد عموماً سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔

بروڈنگ: بلخ کے لیے یہ عرصہ 3 ہفتے تک ہوتا ہے یہ وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں چھوٹی بلخوں کو مصنوعی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوان پرندوں کے لیے فرش یا بیڈری کا انتظام ہونا چاہیے۔

وٹامنز اور منرلز (معدنیات)

وٹامن اے، وٹامن ڈی نیاسین، فولک ایسڈ اور دوسرے وٹامن خوراک میں شامل ہونے چاہئیں۔ مشہور معدنیات بھی شامل ہیں۔ اس کی خوراک میں 17 فیصد پروٹین اور 2700 حرارے اور کمیشنم 1 سے 3 فیصد ہونا چاہیے۔

نیاسین: یہ ٹانگوں کو کمزوری سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

فیڈنگ اور پانی کے لیے جگہ: صاف اور تازہ پانی بروقت دستیاب ہونا چاہیے۔ خوراک

ابتدائی دنوں میں مخصوص پروگرام استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی غذا کا انتخاب اس طرح ہونا چاہیے کہ خوراک کی کوالٹی اور مقدار پیمانہ جات کے مطابق ہو۔ اگر مقررہ مقدار سے زیادہ دیں گے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا اور انڈے دینے کی شرح بھی کم ہو جائے گی اور غذا کی لاگت بھی بڑھ

جگہ فی بلخ
0.85 مربع فٹ
3 ہفتے تک
8 ہفتے تک
20 ہفتے تک
بڑے پرندوں کے لیے
3 سے 4 مربع فٹ

تالاب

نہانے والا تالاب اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہر بلخ کے لیے چھ مربع فٹ کا رقبہ ہو۔

معیاری وزن

24 ہفتوں میں نر کا وزن 2.5 کلوگرام جبکہ مادہ کا وزن 2 کلوگرام ہونا چاہیے۔ چھوٹے بلخوں کو 6 ہفتے تک تیرنے نہ دیں اور بارش سے بچائیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ دار جگہ مہیا کریں۔

روشنی کا انتظام

بلخ مرغیوں کی طرح روشنی سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ابتدائی دنوں میں روشنی کی شدت زیادہ ہوگی تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔

اوسط انڈے دینے کی شرح

200 انڈے فی بلخ سالانہ کی پیداوار والی بلخیں اچھی نسل شمار ہوتی


ہے۔

جزاء	سٹارٹ فیڈ	گرور فیڈ
پہلی ممکنہ	50 فیصد	45 فیصد
پسی ہوئی گندم	15 فیصد	20 فیصد
پسے ہوئے جوار	15 فیصد	15 فیصد
سویا بین میل	5 فیصد	5 فیصد
الفا الفا میل	7-8 فیصد	8 فیصد
خشک دودھ	5 فیصد	5 فیصد
پری کلس	2	2
	100	100

(باقی صفحہ 38 پر)

پولٹری میں پھپھوندی اور انگارہ کے قوت مدافعت پر مشترکہ اثرات

ڈاکٹر ماریہ جمیل، ڈاکٹر احرا خاں، ڈاکٹر محمد کاشف سلیمی..... شعبہ پتھالوجی، فیکلٹی آف ویٹرنری سائنس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



میں افلاٹاکسن اور اڈینو وائرس انفیکشن ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ وزن میں کمی اور کمزور مدافعتی نظام کی وجہ سے بہت زیادہ معاشی نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ انگارہ بیماری کی موجودگی میں اگر زہریلی خوراک مرغیوں کو دی جائے تو اس سے نقصان کی شدت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔

یہ تحقیق زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، پتھالوجی ڈیپارٹمنٹ میں کی گئی۔ موجودہ تجربے کے لیے کل 120 براٹرل چوزے جنہیں چھ برابر گروپوں (A-F) میں تقسیم کیا گیا تھا۔ گروپ A کنٹرول کے طور پر کام کرتا تھا، گروپ B اور C کو 100 ppb اور 200 ppb افلاٹاکسن B1 سے آلودہ فیڈ دی گئی تھی۔ گروپ D انگارہ سے متاثر تھا۔ گروپ E اور F کو 100 ppb اور 200 ppb افلاٹاکسن B1 کے ساتھ انگارہ کا انفیکشن دیا گیا تھا۔ تجربے کی مدت چھ ہفتے تھی۔

لہذا اس تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مائیکوٹاکسنز مدافعتی قوت پیدا کرنے کے لیے معروف ہیں۔ جو پرندوں کو مختلف انفیکشنز سے دوچار کرنے کا باعث بن سکتا ہے مثال کے طور پر انگارہ جو کہ مائیکوٹاکسنز کے ملاوٹ والے فلاک میں ہو سکتی ہے۔ افلاٹاکسن اور انگارہ کا مشترکہ انفیکشن پرندوں میں شدید مدافعتی دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ 60 فیصد شرح اموات اور مرغیوں کے وزن میں کمی ہو جاتی ہے جو کہ معاشی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لہذا پولٹری فارمز کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ مرغیوں کو باوقت حفاظتی ٹیکے لگوائے اور معیاری خوراک فراہم کریں تاکہ نقصان سے بچا جاسکے۔

مرغیوں میں پھپھوندی کی وجہ سے بہت سے امراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اس حد تک مضر ہوتے ہیں کہ فارمز کو معاشی طور پر کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مائیکوٹاکسنز مرغیوں کی وہ بیماری ہے جو خوراک کے ذریعے زہریلی پھپھوندی کے کھانے سے پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے 42 گھنٹے کے اندر موت، جگر کی جسامت میں اضافہ، نشوونما میں کمی اور مدافعتی نظام کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ مائیکوٹاکسنز کی کئی اقسام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نقصان دہ افلاٹاکسنز ہے۔ افلاٹاکسن کی چھ اقسام ہیں۔ جیسے کہ افلاٹاکسن B1، افلاٹاکسن B2، افلاٹاکسن G1، افلاٹاکسن G2، افلاٹاکسن M1 اور افلاٹاکسن M2۔ ان سب میں سے افلاٹاکسن B1 زیادہ نقصان دہ ہے اس کے نقصان دہ اثرات ہلکی بدھنمی سے لے کر شدید سرطانی اثر تک ہوتے ہیں۔ افلاٹاکسیکو سرسرمطانی اثرات کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری میں ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں پولٹری فیڈ اور فیڈ کے اجزاء میں افلاٹاکسن کی ملاوٹ کو پہلے ہی رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ پولٹری فیڈ اور فیڈ کے اجزاء میں افلاٹاکسن B1 کی موجودگی پرندوں میں قوت مدافعت کی کمی اور بڑھوتری میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ افلاٹاکسنز نامی زہریلے مادے اگر فیڈ میں موجود ہو تو اس کے پرندوں کی نشوونما پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگارہ نامی ایک بیماری بھی ہمارے ہاں عام ہے۔ بنیادی طور پر 2-3 ہفتے کی عمر کے تیزی سے بڑھنے والے پرندے انگارہ سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ پرندوں کے مدافعتی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ پاکستان میں پرندوں میں اڈینو وائرس کے عمودی پھیلاؤ کو بھی رپورٹ کیا گیا ہے۔ پولٹری انڈسٹری

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اپنی زبانوں سے۔

مچھروں کی افزائش پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ

محمد عبداللہ ملک، محمد سہیل ساجد، تلفر اقبال، محمد ثاقب..... فیکلٹی آف ویٹرنری سائنس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

مچھر کیا ہیں؟

تھیلے اور شیٹیاں، ڈرم، گاڑیوں کے پہیوں اور درختوں میں پائے جانے والے سوراخوں میں پائے جاتے ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی قبل از وقت تشخیص مختلف پیمانوں کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ مچھروں یا مچھر کے لاروں کی ان پیمانوں کے لحاظ سے ایک خاص مقدار میں موجودگی کسی خاص علاقے میں موجود انسانوں اور جانوروں کے مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کے زد میں ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرتی ہے اور مچھروں کی روک تھام میں سرگرم عمل اداروں کو مچھروں کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے تعین میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مچھروں کے لاروں کی موجودگی ماپنے کے پیمانوں کی تسلی بخش کارکردگی کے لیے مچھروں کے لاروں کی افزائش کرنے والی جگہوں کی نشاندہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔

بیسویں صدی میں امریکہ کے کچھ حصوں اور برازیل میں مچھروں کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش اور تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی۔ اسی طرح براعظم افریقہ میں مچھروں کی روک تھام کے لیے ایسی مچھر داناں استعمال کی گئیں جن پر مچھر کش ادویات لگائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں مچھر کش ادویات کے چھڑکاؤ سے بھی مچھروں کی آبادی میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی تاہم مچھر کش ادویات کا ضرورت سے زیادہ استعمال مچھروں میں ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جس سے ایک خاص عرصہ کے بعد مچھر کش ادویات بے سود ہو جاتی ہیں۔ مچھروں اور ان سے پھیلنے والی بیماریوں اور ان میں موجود مچھر کش ادویات کے خلاف قوت مدافعت کی وجوہات جانچنے کے لیے موجودہ تحقیق عمل میں لائی گئی ہے۔

تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق تحقیقی ضلع چکوال مچھروں کی افزائش اور مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثر پایا گیا جس میں ہاؤس انڈیکس 46.61 فیصد اور بریشیو

ڈائی پیٹرا (Diptera) قبیلہ سے تعلق رکھنے والے 3500 انواع و اقسام کے حشرات الارض میں سے خاندان (Culicidae) سے تعلق رکھنے والے حشرات مچھر کہلاتے ہیں۔ مچھر پر تگلی اور لالٹنی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی، چھوٹی مکھی کے ہیں۔ مچھر کی زندگی چار مراحل پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ انڈا، لاروا، پیوپا (Pupa) اور بالغ مچھر پر مشتمل ہوتی ہے۔ چار مراحل میں سے تین مراحل پانی میں پرورش پاتے ہیں جبکہ بالغ مادہ مچھر انڈے دینے کے لیے انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے۔ بالغ مچھر مچھر پھولوں اور پھولوں کے رس پر گزارہ کرتا ہے۔ بالغ مادہ مچھر 42-56 دن تک جبکہ بالغ مچھر 10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔

صحت عامہ کے حوالے سے مچھروں کی اہمیت

صحت عامہ کے حوالے سے مچھر خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مادہ مچھر انڈے دینے کے لیے ناصرف انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے بلکہ کالٹنے کے دوران اپنے تھوک کے ذریعے مختلف بیماریاں پھیلانے والے جراثیم بھی میزبان کے خون میں داخل کر دیتی ہے۔ ان جراثیموں میں مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے خوردبینی جراثیم شامل ہیں۔ ان جراثیموں میں ڈینگی وائرس سرفہرست ہے۔

مچھروں کی افزائش و پیداوار میں اضافے میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جن میں ماحول، انسانی سماجی سرگرمیاں اور مچھروں کی روک تھام میں انسانوں کا کردار شامل ہیں۔ ملیریا اور ڈینگی وائرس جیسی جان لیوہ بیماریوں کے پھیلانے کے باعث مچھروں نے دنیا بھر میں چلائے جانے والی کیڑے مکوڑوں کے سد باب کے مہمات کی خاصی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ تاہم ڈینگی مچھر کے مکمل اور موثر سد باب کے لیے اس کے حالات زندگی کے بارے میں وافر علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈینگی مچھر شہر اور دیہات دونوں جگہوں پر پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر پانی ذخیرہ کرنے کی جگہوں جیسے فریزر رٹے، پھولوں کی کیماری، پلاسٹک کے

<<<<<<>>>>>>

جس کے مطابق بارش کے دوران مچھروں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی۔ چنے گئے اضلاع اپنے محل وقوع کے اعتبار سے مختلف موسمی حالات کے حامل ہیں جو کہ منفرد طریقوں سے مچھروں کی افزائش و پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسا کہ چکوال میں 52.5 فیصدنی کے تناسب پر مچھروں کی زیادہ تعداد کا مشاہدہ کیا گیا جبکہ ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد میں بالترتیب 65 فیصد اور 46 فیصدنی کے تناسب پر مچھروں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسی طرح درجہ حرارت کے حوالے سے چکوال میں مچھروں کی زیادہ تعداد 18.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد میں بالترتیب 16.6، 27.45 ڈگری سینٹی گریڈ پر مچھروں کی زیادہ تعداد

بقیہ:

الحديث: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہو دوسری وہ آنکھ جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں بہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ (بخاری)

پانی سے ہے عبارت بقائے حیات

محمد عبداللہ خاں، ڈاکٹر رانا عمار اسلم..... شعبہ سٹرکچرل اینڈ انوائرنمنٹل انجینئرنگ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

"پانی کے استعمال سے ہم ہر چیز کو زندگی دیتے ہیں" (قرآن 21:30)

زمین پر موجود ہر جاندار کے لیے پانی سب سے قیمتی چیز ہے۔ زمین سبز ہے اور صرف پانی کی وجہ سے خوبصورت نظر آتی ہے۔ ہم پانی پینے، کھانا پکانے، دھونے اور بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو دل بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرے عضلات کو بھی مناسب طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہمارے جسم کا تقریباً 60 فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہم ہاضمہ، سانس لینے اور پسینہ کے ذریعے پانی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر، پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پانی کے بغیر سب کچھ ناممکن ہے۔ پانی کا عالمی دن ہر سال 22 مارچ کو منایا جاتا ہے تاکہ زمین پر پانی کی کمی کے بارے میں شعور اجاگر کیا جاسکے۔ پانی کا معیار اور مقدار دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیلیویج او کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو صاف پانی تک رسائی نہیں ہے۔ پینے کا پانی آپ کو فعال بنائے گا اور آپ کی طلب کو پورا کرے گا۔ یہ ہارمونز اور غذائی اجزاء کو رواں حالت میں رکھتا ہے۔ پانی جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔ یہ جسم کے حساس حصوں جیسے آنکھ، ناک، خون، ہڈیوں اور دماغ میں نمی کو برقرار رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود فضلہ مواد یا ذرات پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ قبض کے علاج کے علاوہ، پانی کے زیادہ استعمال سے گردے کی پتھری بھی دور ہوتی ہے۔ پس پانی ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اس کا جسم پر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 1.8 بلین لوگ پانی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک، ایشیا اور کچھ شمالی افریقی ممالک اس بحران سے نمٹ رہے ہیں۔ قطر، اسرائیل، لبنان، ایران، اردن، سرفہرست ہیں۔

پانی کی کمی کا سب سے کم خطرہ پاکستان، بھارت، اور عمان کو ہے۔ 2020ء میں، کویت میں پینے کے پانی کی خالص کھپت تقریباً 149.8 بلین گیلن تھی لیکن 2011ء میں یہ کھپت 128 بلین گیلن تھی۔ پانی کی طلب روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہمیں پانی کو اگلی نسل کے لیے بچانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی

موسمیاتی تبدیلی کی رپورٹ کے مطابق 20 سے 25 سال بعد تقریباً 5 ارب افراد پانی کی قلت سے متاثر ہوں گے۔

ہمیں پانی کو بچانا چاہیے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ وہ پانی کو ٹریٹ کریں اور اسے دوبارہ استعمال کریں۔ کچھ تنظیمیں صرف پانی کے تحفظ کے لیے منظم ہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی پانی کی اہمیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ کچھ ممالک کو پانی کے مسئلے کا سامنا ہے، وہ لوگ ایسی کچی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں پانی صاف نہیں ہے یا دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان میں کراچی پانی کی قلت سے دوچار ہے اور زمینی وسائل کم ہو رہے ہیں۔ گند پانی براہ راست دریاؤں اور جھیلوں میں خارج ہوتا ہے۔ پانی کی قلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو کچھ سخت قوانین نافذ کرنے چاہئیں۔ نہ مانسنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ مختلف کیمیکلز پانی کی خصوصیات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صنعتوں سے نکلنے والی گرمی پانی کی ماحولیات کو تبدیل کر سکتی ہے، خاص طور پر جھیلوں اور ندیوں میں۔ میونسپل کا گند پانی بھی آبی آلودگی کا ایک حصہ ہے۔ تیل کا اخراج سمندری پانی کی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اکتوبر 2021 میں، جنوبی کیلیفورنیا میں پانی کے اندر پائپ کے رساو کی وجہ سے تیل کا اخراج ہوا اور اس کے اخراج کی مقدار 24,696 گیلن تھی۔

کیڑے مارا دیات، پلنچ اور پیٹنٹ پانی کے لیے سنجیدہ مسائل ہیں۔ ہماری کمیونٹی کو ایک ری سائیکل سنٹر بنانے کی ضرورت ہے جہاں ان تمام کیمیکلز، موٹر آئل اور دیگر خطرناک مائع کو صاف کیا جائے۔ کچھ کمپنیاں غیر زہریلا کیمیکل فروخت کرتی ہیں۔ گٹر کے پانیوں میں چکنائی، کھانا پکانے کا تیل یا چکنائی نہ ڈالیں۔ طبی فضلہ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ یہ کچھ عام طریقے ہیں جنہیں ہر کسی کو اپنانا چاہیے اور ہم بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اپنا پانی بچا سکتے ہیں۔

وائرڈ ٹریٹمنٹ پلانٹس صنعتوں سے خارج ہونے والے پانی کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں ہر صنعت کو ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانا اور ٹریٹمنٹ کے بعد پانی خارج کرنا ضروری ہے۔

کھیتوں میں تجربات کے دوران جامعہ زرعیہ کی طالبات کے لیے موزوں لباس کی اہمیت

عائشہ مشتاق **، نعم شفق *، صفاء ختر *، ہوش رضا *، حور یزید *، نبیلہ شریف، پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف *، ڈاکٹر عابد علی *
** شعبہ کلاتھنگ اور ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسز، * شعبہ انٹوما لوجی، * شعبہ زووالوجی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



موبائل بھی ڈالا جاسکتا ہے (تصویر (ب، ج)۔



سر اور چہرے کو دھوپ اور بڑی فصل سے بچانے کے لیے ہیٹ پہننا چاہیے۔ ہیٹ کا استعمال دوپٹے کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اس کے لیے دوپٹا زیادہ بڑا نہ ہو تو بہتر ہے تاکہ کام کے دوران آسانی ہو۔ حجاب اس معاملے میں بہترین انتخاب ہے جسے ہیٹ کے ساتھ اور ہیٹ کے بغیر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جوتے کا انتخاب

تحقیقاتی اور تجرباتی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مناسب جوتے کا بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ ہم نے سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے کے جوگز کی بجائے ایسے جوتے کا انتخاب کیا جو کپڑے سے بنا ہے۔ تجرباتی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جوتا ایسا ہو جو روزانہ سادہ کپڑے سے صاف ہو سکے اور پیروں کو کھیت کی گندگی اور جڑی بوٹیوں اور کانٹوں کے نقصان سے بھی بچائے اور جوتا روزانہ دھونے کی ضرورت بھی نہ پڑے (تصویر (و)۔

(ج) کھیتوں میں کام کے لیے غیر محفوظ جوتے

فیلڈ میں کام کرنے کے لیے لباس کا رنگ موسم کی شدت کے مطابق ہونا چاہیے جو نہ زیادہ گہرا ہو کہ گرمی کے موسم میں مشکل ہو اور نہ اتنا ہلکا رنگ ہو جو بہت زیادہ گندا ہو۔ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ہم نے لباس ہلکا نیلا بنوایا جو کہ

دنیا بھر میں زراعت میں کام کرنے والے کسانوں کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے افراد کے لیے ایک مخصوص وردی مختص ہوتی ہے جو کہ اس کے شعبے کی نمائندگی کرتی ہے جیسے ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں پولیس والے خاکی وردی میں ملبوس ہوتے ہیں نرسیں سکرپ پہنتی ہیں، فائر مین اپنی آگ بجھانے والی جیکٹس اور وکلاء اپنا مخصوص لباس پہنتے ہیں۔ فائر مین کوئی عام لباس پہن کر آگ نہیں بجھا سکتا کیونکہ یہ لباس اسے آگ سے محفوظ نہیں رکھ سکتا اسی طرح ایک نرس آگ بجھانے والا یونیفارم پہن کر اپنا کام نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح زراعت کے شعبے میں کام کرنے والے جامعہ زرعیہ کی طالبات کے لیے بھی ایک خاص یونیفارم کی ضرورت ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے الگ لباس کا خیال ہمیں اس وقت آیا جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ طالبات پردے کے باعث برقع یا گاؤں تو پہنتی ہیں مگر تجرباتی کھیتوں میں کھیلوں پر موجود پودوں کا ڈیٹا لینا خاص طور پر جب فصل کو پانی لگا ہو گئی مٹی اور پانی میں گاؤں کے ساتھ چلنا نہایت مشکل ہے جس کی وجہ سے نہ صرف حلیہ خراب ہوتا ہے بلکہ گاؤں بھی قابل استعمال نہیں رہتا اس حالت میں کھیتوں سے سیدھا کلاس روم میں جانا یا ہاسٹل تک پہنچنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ گندے گاؤں کو روزانہ دھونا نہ صرف معاشی طور پر مہنگا ہے بلکہ گاؤں کی کوالٹی کو خراب کرنے کے ساتھ پانی اور وقت کا بھی ضیاع ہے۔

کھیتوں میں کام کرنے کے لیے لباس کی بناوٹ

تجرباتی کھیتوں میں کام کے لیے استعمال ہونے والا لباس ہلکا ڈھیلا ڈھالا ہوتا کہ ڈیٹا لینے کے لیے اٹھتے بیٹھتے کپڑے نہ بچھٹیں اور یہ لباس زیادہ لمبا نہ ہوتا کہ سنبھالنے میں آسانی ہو اور بازو لاسٹک شدہ ہوں (تصویر (ا) تاکہ بازو پر حرشات وغیرہ نہ کاٹ سکیں اور نہ لباس کے اندر داخل ہو سکیں اور لارجی وغیرہ سے بچاؤ کے ساتھ جلد کو درجہ حرارت سے بھی محفوظ کیا جاسکے۔ تجرباتی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے ہم نے مثال کے طور پر ہلکا نیلا لباس بنوایا جو کہ بٹنوں والی اوپن شرٹ پر مشتمل ہے جس کا ٹاور نہ زیادہ تنگ ہے اور نہ ہی زیادہ کھلا۔ یہ لباس دو جیبوں پر مشتمل ہے جس میں تصویریں بناتے وقت



تقریباً ہر موسم کے لیے مناسب رنگ ہے۔

مخصوص لباس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے احترام، رشک اور سزاہیت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں ایک الگ ہی مضبوطی اور فخر کا احساس ہوتا ہے۔

پاکستان میں کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے لباس کی اہمیت



عام لباس اور فیلڈ کے لباس کا موازنہ

اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی زراعت کے شعبے میں مرد و عورت دونوں اہم کردار ادا کر رہے ہیں لیکن دیہی علاقوں میں زراعت میں خواتین کا کردار زیادہ ہے اور زیادہ تر سرگرمیاں عورتوں کے گرد گھومتی ہیں جدید ریسرچ کے مطابق یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں زراعت کے شعبے میں خواتین 37 فیصد تھیں جبکہ پسماندہ ممالک میں 44 فی صد لیبر فورس کے طور پر کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار کا 50 فی صد سے زائد حصہ خواتین پر منحصر ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقامی طور پر فصل کی کاشت و برداشت کے ساتھ ساتھ فصل کا تحفظ عورتوں سے وابستہ ہے۔ دیہاتی خواتین 5-8 گھنٹے کھیتوں میں مختلف اہم کام سرانجام دیتی ہیں۔ جن میں فصل کی بوائی، کھیتوں کی صفائی کرنا، فصل کی کٹائی، پھل چننا، پھلوں کو خشک کرنا۔ بڈل بنانا اور ذخیرہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کی طالبات کے لیے کھیتوں میں تجربات کے دوران ایک مناسب لباس کے لیے یہ تحریر شعبہ کلاتھنگ اور ٹیکسٹائل انسٹی ٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے لیے مستقبل کی تحقیق کا بہترین عنوان ہے جس میں شعبہ کلاتھنگ اور ٹیکسٹائل کے طلباء و طالبات اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر نہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اہم کردار ادا کر سکتے بلکہ اس تحقیق میں بین الاقوامی معیار کے مطابق جدت لا کر پاکستان کی برآمدات میں اضافہ کرتے ہوئے کثیر زر مبادلہ کماسکتے ہیں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

عورتوں کے لیے عام لباس خوبصورتی اور فیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف انداز میں بنائے جاتے ہیں جو تجرباتی کھیتوں کے لیے پرسکون نہیں ہیں اگر ہم گھروں میں پہننے والے لباس تجرباتی کھیتوں میں پہن کر جائیں تو بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں اور گھر میں پہننے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کیونکہ فیلڈ کا لباس عام لباس کے انداز سے ذرا مختلف ہے اور فیلڈ یا کھیتوں میں پیش آنے والے مسائل کے مطابق بنایا جاتا ہے مثلاً لائٹ شدہ بازو، ڈھیلا ڈھالا اور مناسب لمبائی اور آسانی سے پہننے کے قابل ہو۔ اس کے علاوہ دن بدن بڑھتی گرمی اور جلد کی بیماریوں سے حفاظت، زہریلے اور الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں سے حفاظت، فصلوں میں پودوں کا نقصان کیے بغیر چلنے اور کام کرنے میں آسانی کو برقرار رکھنا، عام کپڑوں کو ضیاع سے بچانا اور ان کی کوالٹی کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لباس کا یہ فائدہ بھی محسوس کیا کہ اگر فیلڈ میں کام کرنے جاتے یا آتے ہوئے کسی کی بھی نظر پڑے تو دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام لباس نہیں ہے بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے پہنے جانے والے یونیفارم کی طرح ہے اگر یہ لباس گندا بھی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں دیکھتے ہی ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر جیسا لباس اور ہیٹ پہنے یہ لوگ کسی اہم کام کو مہارت اور دل جوئی سے سرانجام دے کر آ رہے ہیں جس سے ہماری الگ پہچان بنتی ہے اور اپنے کام پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ کھیتوں میں

اسٹرابیری کی کوالٹی اور سٹوریج کو بہتر بنانے کے لیے ہائپو بیرک ٹریٹمنٹ کا استعمال پی ایچ ڈی سکالر: عائشہ مریم نگران: ڈاکٹر راجیل انوار شعبہ: انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

کو جلدی پکنے سے روکتا ہے اور شلٹ لائف میں اضافہ کرتا ہے۔ اس تجربے میں ہم نے اسٹرابیری کو مختلف ہائپو بیرک کے پریشر کے تحت مختلف دورانیے کے لیے ٹیسٹ کیا۔ بعد ازاں پھل کو کم درجہ حرارت (2 ڈگری) پر 12 دنوں کے لیے سٹور کیا۔ اس میں چار دن کے وقفے پر اسٹرابیری کی کوالٹی کو ٹیسٹ کیا گیا۔

نتیجہ یہ واضح کرتا ہے کہ اسٹرابیری کو ہائپو بیرک ٹریٹمنٹ کے ساتھ 40 کے پی اے پر چار گھنٹے یا 20 کے پی اے پر دو گھنٹے سے کم سے کم پھپھوندی نمودار ہوئی اور کوالٹی کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوئی۔ 20 کے پی اے پر دو گھنٹے ٹریٹ کی جانے والی اسٹرابیری میں بیکٹیریائی نشوونما 48 گنا اور پھپھوندی کی نشوونما کو 26 گنا کم کیا۔ علاوہ ازیں، سٹوریج میں 12 دن کے بعد ٹریٹمنٹ شدہ پھل میں 14.3 فیصد اینٹی آکسیڈینٹ، 13.9 فیصد فی مینالک اور 17.7 فیصد وٹامن سی زیادہ دیکھا گیا۔ اس طرح 20 کے پی اے پر دو گھنٹے کے لیے اسٹرابیری کی زندگی میں چھ دن کا اضافہ ہوا۔ ہائپو بیرک پریشر ٹریٹمنٹ اسٹرابیری میں بیکٹیریائی و پھپھوندی کی نشوونما کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے ہائپو بیرک ٹریٹمنٹ 20 کے پی اے تک دو گھنٹے اور 40 کے پی اے پر 4 گھنٹے کے لیے بغیر کسی پوسٹ ہارویسٹ تاخیر مارکیٹ لائف کو بڑھانے اور اسٹرابیری کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ غذائی خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنایا جاسکتا ہے تاہم ٹریٹمنٹ کے کم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 20 کے پی اے دو گھنٹے ٹریٹمنٹ کو 40 کے پی اے ٹریٹمنٹ پر ترجیح دی جاسکتی ہے اس طرح غیر کیمیائی اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے طور پر ہائپو بیرک ٹریٹمنٹ کو اسٹرابیری کی کوالٹی کو محفوظ رکھنے اور سٹوریج لائف کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اسٹرابیری کا پھل ایک خوش ذائقہ اور پرکشش رنگ کا ہوتا ہے۔ اسٹرابیری پوری دنیا میں اگائی جاتی ہے اور اسی طرح پاکستان کے تمام صوبوں میں اگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر اسٹرابیری کی چانڈلر قسم بڑے پیمانے پر اسلام آباد اور پوٹھوہار کے علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ اسٹرابیری دنیا کے بیشتر علاقوں میں کاشتکاروں کا پسندیدہ پھل بن رہا ہے۔ کیونکہ یہ زیادہ منافع بخش فصل ہے لیکن پاکستان میں اسٹرابیری کی پیداوار محدود ہے۔ یہ تازہ اور محفوظ شکل میں استعمال ہوتی ہے۔ اسٹرابیری کا پھل نرم و نازک ہوتا ہے اسٹرابیری کا پھل کچی طرح کے بعد از برداشت مسائل کا شکار ہے جس کی وجہ سے اسکی فصل میں 20 سے 40 فیصد تک ضیاع ہو جاتا ہے۔ بڑے مسائل میں پھپھوندی کا مسئلہ، خراب دیکھ بھال، نامناسب پیکنگ، کولڈ چین سسٹم کی عدم موجودگی اور ٹرانسپورٹ کی ناقص سہولیات شامل ہیں۔ سال بھر میں اچھی پیداوار کے باوجود کسانوں کو اچھا منافع نہیں مل رہا ہے۔ جس کی بڑی وجہ اسٹرابیری کا جلدی خراب ہونا ہے۔ جس کی وجہ سے ہر سال اسٹرابیری کا زیادہ تر پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ نرم پھل مختصر شلٹ لائف اور اس کا گنا سٹور اور اس کی نقل و حمل، مارکیٹنگ میں مسائل کی وجہ بنتا ہے۔ پھپھوندی سے پھیلنے والی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عمومی طور پر پھپھوندی کش سپرے کیا جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے مضر ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں لوگ اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کے لیے فکر مند ہیں اور وہ غیر کیمیائی حل تلاش کر رہے ہیں اور اوپر دیئے گئے منظر نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹرابیری کی سٹوریج اور مارکیٹ لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہائپو بیرک ٹریٹمنٹ کو تجربہ کا حصہ بنایا گیا۔ ہائپو بیرک ٹریٹمنٹ پھپھوندی سے لگنے والی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے اور پھل کے ذائقے کو برقرار رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریٹمنٹ پھلوں

اعمران بن حصین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ایک شخص کو کوئے میں بیٹھا ہوا دیکھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی تو آپؐ نے فرمایا: اے فلاں تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھے جنابت لاحق ہوگئی اور پانی نہیں مل رہا، فرمایا: تمہارے لئے مٹی (سے تیمم کر لینا) کافی ہے۔

الحديث:

ٹماڑ کے اگیتا جھلساؤ کا تدارک بذریعہ قدرتی عرقیات

پنی ایچ ڈی سکالر: راشد اقبال خان نگران: ڈاکٹر انامظہر عباس شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

کنٹرول کرنے کے لیے آزمایا۔ پودوں کے عرقیات کے اگیتا جھلساؤ پر اثرات دیکھنے کے لیے تمام تجربات لیبارٹری، گرین ہاؤس اور کھیت میں کئے گئے۔ تجربات سے اخذ کئے گئے نتائج سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ادراک سے حاصل شدہ عرق اگیتا جھلساؤ کی افزائش روکنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوا جبکہ باقی ماندہ عرقیات میں سے تلسی اور ہلدی کے نتائج بھی مؤثر رہے۔ لیبارٹری کی تحقیق کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پودوں کے عرقیات کی مختلف مقدار کو گرین ہاؤس اور کھیت میں آزمایا گیا۔ الٹرنیٹو سولنائی سے سب سے متاثر شدہ قسم ”ریوگرینڈی“ کے پودے گرین ہاؤس اور کھیت میں لگائے گئے۔ ٹماڑ کے ان پودوں پر عرقیات کو اسپرے کیا گیا۔ عرقیات اسپرے ہونے کے دو دن بعد ٹماڑ کے پودوں پر الٹرنیٹو سولنائی کو پانی میں مکس کر کے اپلائی کر دیا گیا۔ تجربات کے مشاہدے سے ظاہر ہوا کہ ادراک کا عرق سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ ادراک کے عرق نے نہ صرف بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد فراہم کی جبکہ پودوں کی نشوونما اور بڑھوتری میں بھی اضافہ کیا۔ پس اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدرتی پودوں کے عرقیات پھپھوندی کش ادویات کے متبادل استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کسانوں کو پھپھوندی اور اس سے پھیلنے والی دیگر بیماریوں کے تدارک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی جبکہ اس تحقیق پر عمل پیرا ہو کر ملک کا قیمتی زرمبادلہ بھی بچایا جاسکتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

ٹماڑ میں پائے جانے والی مختلف بیماریوں میں اگیتا جھلساؤ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ٹماڑ کا اگیتا جھلساؤ الٹرنیٹو سولنائی نامی پھپھوندی کے سبب ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس بیماری کا حملہ تقریباً ٹماڑ اگانے والے تمام اضلاع میں پایا جاتا ہے۔ اس بیماری کا حملہ ٹماڑ کی فصل کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور شدید حالات میں نصف یا تین چوتھائی پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان میں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے پھپھوندی کش ادویات (فینچی سائیڈ) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زہریلی ادویات کا بے دریغ استعمال نہ صرف ماحولیاتی نظام کو آلودہ کر رہا ہے بلکہ انسانوں اور جانوروں کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مزید برآں روز بروز ان ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کسان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ حالیہ اندازے کے مطابق ان ادویات کی فروخت سے دنیا بھر میں پچاس بلین کی آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ جبکہ صرف پاکستان سالانہ تین سو اکرہٹر ملین روپے ان پھپھوندی کش ادویات کی درآمد پر صرف کرتا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ باغبانی (انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز) میں تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق میں چھ مختلف قسم کے پودوں (ادراک، لہسن، پیٹھی، انار، کڑی پتہ، تلسی) کے عرقیات ایتھانول اور میتھانول میں تیار کئے گئے۔ ان پودوں کے عرقیات کے ساتھ پھپھوندی کش (فینچی سائیڈ) کو بھی الٹرنیٹو سولنائی کو

بیر کی اقام اور درجہ بندی

پنی ایچ ڈی سکالر: نسیم شریف نگران: ڈاکٹر محمد جعفر جھکائی شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

کرنے والے ممالک میں چین، بھارت، انڈونیشیا، آسٹریلیا اور پاکستان شامل ہیں۔ پاکستان میں بیر ملتان، بہاولپور، سرگودھا، لاہور، فیصل آباد، حیدر آباد، ٹنڈو جام، خیرپور، کراچی اور ملیر کے علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں بیر کے باغات لگانے کی طرف توجہ نہیں دی گئی

بیر برصغیر پاک و ہند کا قدیم پھل ہے۔ قرآن پاک میں اسے سدر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بیر کو بارانی پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر طرح کی زمین میں با آسانی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ غذائی اعتبار سے بیر میں حیاتین الف، ب اور ج کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بیر پیدا

اوسط وزن 28 گرام ہوتا ہے۔ پھل کا سائز 12 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا سائز 1.75cm ہوتا ہے اور گٹھلی کا وزن 1.5 گرام ہوتا ہے۔ اس کی پیداوار 240 کلو گرام فی پودا ہے۔ پھل میں وٹامن سی کی مقدار 134 ملی گرام فی سو گرام ہے جبکہ تحلیل شدہ اجزاء (TSS) کی مقدار 21 فیصد تک موجود ہوتی ہے۔

صوفی

اس کے پھل کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ پھل کا وزن 16 گرام ہوتا ہے۔ پھل کا سائز 7 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا سائز 0.9 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے اور گٹھلی کا وزن 0.8 گرام ہوتا ہے۔ پھل میں وٹامن سی کی مقدار 132 ملی گرام فی سو گرام ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار 118 کلو گرام فی پودا ہے جبکہ اس میں مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء 170 تک ہیں۔

خوبانی

اس کے پھل کا اوسط وزن 16 گرام ہوتا ہے۔ پھل کا سائز 7 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ گٹھلی کا سائز 1 مربع سینٹی میٹر اور گٹھلی کا وزن 1.1 گرام ہوتا ہے۔ پھل میں وٹامن سی کی مقدار 132.25 ملی گرام فی سو گرام ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار 117.75 کلو گرام فی پودا ہے جبکہ اس میں مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء 18 فیصد ہیں۔

آلو بخارہ

آلو بخارہ اس کا ذائقہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ پھل کا اوسط وزن 23 گرام پھل کا سائز 10 مربع سینٹی میٹر ہے۔ گٹھلی کا سائز اور وزن بالترتیب 0.6 مربع سینٹی میٹر اور 1 گرام ہے۔ پھل میں وٹامن سی کی مقدار 132 ملی گرام فی سو گرام ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 212 کلو گرام فی پودا ہے اور اس میں مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء 17 فیصد ہے۔

دلہار

یہ بیر کی اگیتی قسم ہے اس کا پھل بہت پدکشن اور بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ پھل کا وزن 25 گرام اور پھل کا سائز 11 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ مشکل کا وزن 1 گرام اور مکملی کا سائز 1 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ پھل میں وٹامن سی کی مقدار 112 ملی گرام فی سو گرام ہوتی ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 161 کلو گرام فی پودا ہے۔ جبکہ اس میں مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء 15 فیصد ہیں۔

لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحقیق سے اچھی پیداوار اور بہترین ذائقے والی اقسام دریافت کی گئی ہیں جن کی کاشت سے باغبان حضرات اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ پیر کا درخت ہر قسم کی آب و ہوا میں کامیابی سے کاشت کیا جاسکتا ہے۔ اسے میدانی علاقوں سے لے کر 1500 فٹ کی بلندی تک کامیابی سے کاشت کیا جاسکتا ہے۔ بیر کی جڑ چونکہ گہری ہوتی ہے۔ لہذا یہ خشک سالی کا بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے۔ کلراٹھی اور نمکیات زدہ زمینوں میں بھی اس کی کامیاب کاشت ممکن ہے۔ بیر کم سے کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم پھل کی اچھی پیداوار کے لیے 35 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بہترین ہے۔ بیر کو محدود آبپاشی والے علاقوں میں بھی کاشت کیا جاسکتا ہے تاہم منطقہ بارہ کے وہ علاقے جہاں سالانہ بارش 400 ملی میٹر تک ہوتی ہے اس کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ بیر کی باآسانی کاشت کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ بیر کی جڑ لمبی اور گہری ہوتی ہے جو سخت اور پتھریلی زمینوں میں بھی آسانی سے نشوونما پالیتی ہے اور نمکیات اور پانی جذب کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے۔ بیر کے درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں یہ خوابیدہ حالت میں چلا جاتا ہے۔ پتے گر دیتا ہے اور ہر قسم کی نشوونما رک جاتی ہے۔ موسم گرما میں چشموں پر سرخ رنگ کے سکیز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے چشموں سے پانی کے اخراج کا عمل رک جاتا ہے اور اگست ستمبر میں پھول نکلنے تک چشمے محفوظ رہتے ہیں۔ بیر کے باغ مربع طریقے سے لگائے جاتے ہیں۔ قطار سے قطار اور پودے سے پودے کا فاصلہ 20 تا 25 فٹ رکھنا چاہیے۔ اس طرح پودوں کی دیکھ بھال آسان اور صحت بہتر ہوتی ہے۔ پھل میں اچھی خصوصیات برقرار رکھنے کے لیے دوسرے پھلدار درختوں کی مانند بیر کے درخت کی افزائش بھی نباتاتی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس تحقیق کے دوران بیر کی 60 مختلف اقسام کا طبعی، کیمیائی اور جینیاتی تجزیہ کیا گیا جو کہ پاکستان کے چھ مختلف علاقوں یعنی فیصل آباد، بہاولپور، لیہ، بھکر، ٹنڈو جام اور ڈیرہ اسماعیل خان سے اکٹھی کی گئی تھیں ذیل میں بیر کی کچھ اہم اقسام کا طبعی اور کیمیائی تجزیہ دیا گیا ہے جو کہ صوبہ پنجاب میں کاشت کی جا رہی ہیں۔

دلی سفید

یہ بیر کی بہترین قسم ہے۔ پھل کی جسامت گول ہوتی ہے۔ پھل کا

تحلیل شدہ اجزاء 19 فیصد ہیں۔

یزمان لوکل

یہ ذائقے کے اعتبار سے بیر کی اچھی قسم ہے اس کے پھل کا سائز تقریباً 13 مربع سینٹی میٹر اور پھل کا وزن 34 گرام ہوتا ہے۔ گٹھلی کا سائز 0.7 مربع سینٹی میٹر اور گٹھلی کا وزن تقریباً 1.3 گرام ہوتا ہے۔ اس کے پھل میں موجود وٹامن کی مقدار 82 ملی گرام فی سو گرام ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 147 کلو گرام فی پودا ہے اور اس میں مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء تقریباً 18 فیصد پائے جاتے ہیں۔

فلادی

پک جانے پر بیر کی اس قسم کے پھل کی سطح پر فولادی رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے پھل کا سائز 13 مربع سینٹی میٹر اور پھل کا وزن 37 گرام ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا سائز 2 مربع سینٹی میٹر اور ہے۔ گٹھلی کا وزن 2.0 گرام ہوتا ہے۔ اس کے پھل میں وٹامن سی کی مقدار 113 ملی گرام فی سو گرام ہوتی ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 181 کلو گرام فی پودا ہے جبکہ اس میں موجود مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء کی مقدار 19 فیصد ہیں۔

کریلا

اس کے پھل کا اوسط وزن 14 گرام ہے اور پھل کا سائز 10 مربع سینٹی میٹر ہے۔ اس کی گٹھلی کا سائز 0.7 مربع سینٹی میٹر ہے اور گٹھلی کا وزن 1.1 گرام ہے۔ اس کے پھل میں موجود وٹامن سی کی مقدار 110 ملی گرام فی سو گرام ہے۔ اس میں موجود مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء کی مقدار 11 فیصد ہے۔ اس کی پیداوار 180 کلو گرام فی پودا ہے۔

بیر کے جینیاتی تجزیے کے لیے بارہ اقسام کے اشاریے استعمال کئے گئے۔ جن کے انتہائی مؤثر نتائج سامنے آئے۔ بیر کی اقسام کو جینیاتی تبدیلیوں کی بنیاد پر مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ جنگلی بیر کی اقسام کا الگ گروپ دریافت کیا گیا جبکہ مقامی اقسام کا الگ گروپ دریافت ہوا۔ بیر کی اقسام پر کی گئی یہ تحقیق وطن عزیز میں بیر کے جینیاتی وسائل کو محفوظ کرنے نئی اقسام کو متعارف کروانے، بیر کی بریڈنگ کو بہتر بنانے اور وراثتی رجسٹریشن کے لیے انتہائی معاون و مددگار ثابت ہوگی۔

دوسری اقسام کے مقابلے میں اس کا پھل چھوٹا ہوتا ہے جس کا اوسط وزن 4 گرام ہوتا ہے۔ پھل کا سائز 3 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا سائز 0.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور گٹھلی کا وزن 0.5 گرام ہوتا ہے۔ پھل میں وٹامن سی کی مقدار 177 ملی گرام فی سو گرام ہوتی ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 137 کلو گرام فی پودا ہے۔ جبکہ اس میں تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء کی مقدار 24 فیصد ہے۔

انوکھی

اس کا ذائقہ لذیذ ہوتا ہے۔ پکنے پر رنگت سرخی مائل سبز ہو جاتی ہے۔ اس کے پھل کا اوسط وزن 16 گرام ہوتا ہے۔ اس کے پھل کا سائز 7 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ گٹھلی کا سائز 2 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے جبکہ گٹھلی کا وزن تقریباً 1 گرام ہوتا ہے۔ اس کے پھل میں وٹامن سی کی مقدار تقریباً 101 ملی گرام فی سو گرام ہوتی ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار 114 کلو گرام فی پودا ہے۔ جبکہ تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء کی مقدار 26 فیصد ہیں۔

محمود والی

اس کا پھل بارش سے بھٹتا نہیں ہے۔ یہ بہترین ذائقے والی قسم ہے اور باقی اقسام کی نسبت زیادہ دیر تک ذخیرہ کی جاسکتی ہے۔ اس کے پھل کا سائز 6 مربع سینٹی میٹر جبکہ پھل کا وزن تقریباً 14 گرام ہوتا ہے۔ گٹھلی کا وزن 1 گرام جبکہ گٹھلی کا سائز تقریباً 3 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار تقریباً 160 کلو گرام فی پودا ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن سی کی مقدار 103 ملی گرام فی سو گرام ہے جبکہ مکمل تحلیل شدہ ٹھوس اجزاء 16 فیصد ہیں۔

پاک وائٹ

یہ بیر کی اچھی قسم ہے اس میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے یہ دور دراز منڈیوں میں آسانی سے پہنچائی جاسکتی ہے۔ اس کے پھل کا وزن 31 گرام اور پھل کا سائز 13 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا سائز اور وزن بالترتیب 0.5 مربع سینٹی میٹر اور 1.5 گرام ہوتا ہے۔ اس کے پھل میں وٹامن سی کی مقدار 122 ملی گرام فی سو گرام ہے۔ اس کی سالانہ پیداوار تقریباً 201 کلو گرام فی پودا ہے۔ اس میں مکمل

الحمدیہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کسی نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ سب سے افضل صدقہ کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد کے لئے کوئی مجاہد دے دینا یا مجاہدین پر سایہ کرنے کے لئے کوئی خیمہ یا جہاد کے دوران مجاہدوں کے کام آنے والا کوئی سامان فراہم کر دینا۔ (ترمذی)

مسور کی فصل میں زنک کی بائیو فزٹیفیکیشن کے ذریعے انسانی غذائیت میں بہتری

پنی ایچ ڈی سکارل: ناسر رشید نگران: ڈاکٹر محمد عامر مقصود شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

- جنوبی ایشیا میں موجودہ شرح نمو کو مد نظر رکھتے ہوئے اکیسویں صدی کے وسط تک عالمی آبادی 10 ارب سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 میں دنیا کی آبادی کو کھانے کے لیے ہمیں خوراک کی موجودہ پیداوار میں تقریباً 60-80 فیصد اضافے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خوراک کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر غیر ترقی یافتہ ممالک میں ایک اور غذائی انقلاب ضروری ہے۔ غیر ترقی یافتہ ممالک میں خوراک کی فراہمی اور اس کی تنوع میں کمی کے ساتھ ساتھ غذائی اجزاء کی کمی، جیسا کہ ناکافی غذائیت اور نامناسب غذائیت کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھا گیا ہے۔ غیر ترقی یافتہ ممالک میں یہ صورتحال زیادہ تشویش ناک ہے کیونکہ ان میں بسنے والے لوگوں کی روزانہ کی کیلوریز کی مقدار کا بڑا انحصار اُن اناج اور دالوں پر ہے، جن میں ضروری غذائی عناصر کی کمی پائی جاتی ہے۔ ان عناصر میں سے زنک بہت اہمیت کا حامل عنصر ہے اور اسکی کمی کو فصلوں کی پیداوار اور انسانی غذائیت کے لیے دنیا بھر میں سنگین مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ زنک کی زمین میں دستیابی سے پودوں میں پیدا ہونے والے مثبت اثرات اور خوراک میں زنک عنصر کی بڑھوتری خوش آئند ہے۔ زنک کی کارکردگی پودوں کی مختلف اقسام میں مختلف ہوتی ہے جس کا انحصار پودوں کی نشوونما کا وقت اور ماحول سمیت متعدد عوامل پر ہوتا ہے۔ غذائی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، بنیادی طور پر دالوں کو عالمی سطح پر بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن مسور کے اناج میں زنک کی بڑھوتری کا تحقیقی کام ابھی تک تسلی بخش نہیں ہے۔ اجزاء صغیرہ، خاص طور پر زنک کی صحیح جگہ، صحیح طریقہ، صحیح ماخذ اور صحیح وقت پر استعمال سے نا صرف زمین میں زنک کی مقدار کو بڑھانے بلکہ پودوں میں اسکی دستیابی کو بہتر کرنے اور فصلوں کے اناج میں اسکی مقدار کو بڑھانے والی بہترین حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔
- موجودہ تحقیقی منصوبہ پانچ انفرادی تجربات پر مشتمل تھا جس میں درج ذیل مقاصد پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔
- 1۔ دیسی مسور کے دانوں میں زنک کی دستیابی کا اندازہ لگانا
- 2۔ زنک کی دستیابی کو بہتر کرنے کے ساتھ زیادہ پیداوار دینے والی مسور کی اقسام کی درجہ بندی کرنا
- 3۔ مسور میں بائیو فزٹیفیکیشن کے لیے زنک کی بہترین شرح اور استعمال کے طریقہ کا تعین کرنا
- درج بالا مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، گرین ہاؤس اور کھیت میں تجربات کیے گئے۔ ان تجربات میں زنک کی کھاد کو زمین میں ڈال کر اور زنک محلول کو پودوں پر پیرے کر کے مسور کی اقسام کی پیداواری صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تجربے کے نتائج سے مسور کی قسم- 10502، مانسہرہ-89، لائن-11504 اور مرکز-09 کی درجہ بندی کی گئی۔ مانسہرہ-89 کو زیادہ اناج کی پیداوار اور زنک کی حیاتیاتی دستیابی میں اضافے کے ساتھ زیادہ مؤثر پایا گیا۔ دوسری تحقیق کے دوران پودوں میں زنک کی مقدار اور اناج کی پیداوار میں اضافے کے لیے، زنک کی کھاد کو زمین میں ڈالنے کے طریقے کو سیڈ پرائمنگ اور بذریعہ پیرے کے طریقے سے زیادہ مؤثر پایا گیا۔ مسور کے اناج میں زنک کی دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے، زنک کی کھادوں میں سے زنک سلیفٹ کے نتائج، زنک آکسائیڈ اور چیلینڈر زنک کے مقابلے میں سب سے موزوں اور بہتر ثابت ہوئے۔ تیسرے تجربے کے نتائج سے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ زنک 12 ملی گرام فی کلو گرام زمین میں اطلاق، زنک کی دستیابی اور اناج کی پیداوار کو بہتر بنانے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ زنک کے لیے مسور کی مؤثر اقسام میں پودوں کے مختلف حصوں میں زنک کی مقدار زیادہ دیکھی گئی اور ان کے اناج میں زنک زیادہ جمع کرنے کی صلاحیت پائی گئی۔ اسی طرح کھیت کے دونوں تجربات کے نتائج سے واضح ہوا ہے کہ بالآخر زنک کے زمین میں اطلاق سے مسور کی اقسام کی پیداواری صلاحیت میں بڑھوتری اور حیاتیاتی دستیابی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لہذا مستقبل میں یہ تحقیقی تجربہ زنک کے لیے مسور کی مؤثر اقسام کی افزائش نسل میں مددگار ثابت ہوگا۔ جس سے زنک کی مقدار سے بھرپور مسور کی اقسام کو کسانوں میں مقبول کیا جاسکے گا اور ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں میں زنک کی کمی کا تدارک کیا جاسکے گا۔

کرومیم سے متاثرہ زمینوں کے لیے میری گولڈ کا استعمال

پی ایچ ڈی سکالر: حنا احمد ملک نگران: ڈاکٹر جاوید اختر شعبہ: سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

آلودہ پانی جمع کیا گیا تھا اور نتائج سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پانی میں کرومیم کی بڑی مقدار موجود ہے۔ اس کے بعد ہانڈرو پونک اور گملوں میں تجربات کیے گئے۔ سب سے پہلے ہانڈرو پونک تجربے میں چھ مختلف میری گولڈ نسلوں پر کرومیم کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے 0, 2, 4, 6, 8 ملی گرام فی لیٹر سلوشن میں ان کی نشوونما کی گئی۔ نتائج سے ظاہر ہوا کہ دو اقسام نے دیگر اقسام کے مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تیسرے تجربے میں دو منتخب نسلوں کو گملوں میں لگا کر ان کا مورفولوجیکل ردعمل اور جڑوں، ٹہنیوں اور پھولوں میں کرومیم کی موجودگی کو دیکھا گیا۔ چوتھے تجربے میں کرومیم (8 ملی میٹر فی کلو گرام) آلودہ مٹی میں پودوں کو لگایا گیا اور ان پر 0, 2, 4, 6, 8 ملی گرام فی لیٹر کے حساب سے فلووک ایڈ کا سپرے کیا گیا اور نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمونگت کے پیرامیٹر اور اینٹی آکسیڈنٹیو انزائم کی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری آئی ہے جبکہ جڑوں، ٹہنیوں اور پھولوں میں فلووک ایڈ کے سپرے کی وجہ سے کرومیم کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ان تجربوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کرومیم کی وجہ سے میری گولڈ کی افزائش میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جبکہ فلووک ایڈ کے سپرے کی وجہ سے میری گولڈ کی مورفولوجیکل نمونیاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ میری گولڈ نسلوں نے دوسری اقسام کے مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

صنعتی کوڑا کرکٹ کا ناقص انتظام ترقی پذیر ممالک میں بھاری دھاتوں کی آلودگی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تیزی سے ترقی کرتی صنعتیں اور ان سے آلودہ پانی کا اخراج ہمارے زرعی ماحولیاتی نظام کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں عام طور پر صنعتی آلودہ پانی کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے ماحولیات کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ عالمی سطح پر بھاری دھاتوں کی آلودگی ایک ابھرتا ہوا مسئلہ ہے۔ کرومیم دوسری دھاتوں کے مقابلے میں ایک انتہائی زہریلی اور کینسر پیدا کرنے والی دھات ہے۔ اس کا استعمال پیینٹ، الیکٹروپلائنگ اور چمڑے کی صنعت میں ہوتا ہے۔ دوسری صنعتوں کے مقابلے میں چمڑے کی صنعت کرومیم کی آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں سب کے لیے جان لیوا دھات ہے۔ دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کرومیم کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ صنعتی آلودہ پانی کا زراعت میں آبپاشی کے طور پر استعمال ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور یہ مٹی میں ایک طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے جو اس کو فوڈ چین میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ میری گولڈ ایک اہم سجاوٹی پودا ہے۔ یہ آلودہ زمینوں اور قریباً ہر طرح کے ماحول اور آب و ہوا میں لگایا جاسکتا ہے۔ لہذا مختلف تجربات ماحول میں کرومیم کی آلودگی اور میری گولڈ کی فائٹومیڈیشن صلاحیت کی تشخیص کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے قصور سے بیس (20 مختلف چمڑے کی صنعتوں سے

مفید بیکٹیریا اور ہارمونز کا آلو کی پیداواری صلاحیت اور اس میں آئرن کی مقدار بڑھانے میں کردار

پی ایچ ڈی سکالر: زین مشاق نگران: ڈاکٹر حافظ نعیم اصغر شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آئرن کی کمی کا سب سے زیادہ اثر بچوں اور حاملہ عورتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دوست بیکٹیریا، پودوں کے لیے ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں تجربات ایسے دوست بیکٹیریا اور ہارمونز کو بنیاد بنا کر کیے گئے ہیں جو زمین میں موجود آئرن کو حل پذیر کرنے

ترقی پذیر ممالک میں اجزائے صغیرہ کی خوراک میں کمی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اجزائے صغیرہ کی زمین میں کمی سے نہ صرف فصلوں کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ اجناس میں انکی کمی انسانی صحت پر برے اثرات کی حامل ہے۔ 44 ارب سے زائد افراد اجزائے صغیرہ کی کمی کا شکار ہیں۔ ان اجزائے صغیرہ میں سے آئرن ایک اہم غذائی اجزاء

نہ صرف فصل کی پیداوار بڑھ گئی بلکہ آلوؤں آئرن کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ بیکٹیریا، ہارمونز کے ساتھ مل کر پودے کی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ بیکٹیریا ایسے نامیاتی مادے پیدا کرتے ہیں جو زمین کی پی ایچ کو کم کر کے اسے ہلکا تیزابی خصوصیت کا حامل بناتے ہیں جس سے زمین میں اجزائے صغیرہ کی پودوں کے لیے دستیابی بڑھ جاتی ہے اور متوازن غذائی اجزاء کی زمین میں موجودگی کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں ترقی یافتہ ممالک میں اجزائے صغیرہ کی انسانوں میں کمی کا تدارک ناگزیر ہے۔ پودے دوست بیکٹیریا اور فائدہ مند ہارمونز کا اکٹھا استعمال فصلوں میں آئرن کی مقدار میں اضافہ اور لوگوں میں آئرن کی کمی دور کرنے میں اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان بیکٹیریا کی بہت ساری اقسام کو لیبارٹری میں زمین سے الگ کر کے خاص ماحول میں پروان چڑھایا گیا۔ بعد ازاں، ان میں سے ان بیکٹیریا کو الگ کیا گیا جو آئرن کو زیادہ مل پذیر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایسے بیکٹیریا اور ہارمونز کو ابتدائی مراحل میں لیبارٹری میں آلو کے پودوں پر تجربات کئے گئے اور انکے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ان مفید بیکٹیریا اور ہارمونز میں سے آلو کی پیداواری صلاحیت اور اس میں آئرن کی مقدار بڑھانے والے سب سے زیادہ موثر بیکٹیریا اور ہارمونز کو چنا گیا۔ لیبارٹری کے تجربات کے بعد ان دوست بیکٹیریا اور ہارمونز کو گملوں میں آئرن کی حل پذیری اور آلو کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا جن سے متاثر کن نتائج حاصل ہوئے۔ گملوں کے بعد یہ تجربات کھیتوں میں بھی کیے گئے اور ان کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئرن کو حل پذیر کرنے والے بیکٹیریا اور ہارمونز کے استعمال سے

مکئی کی فصل پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات

پی ایچ ڈی سکالر: صائمہ مصدق نگران: ڈاکٹر عبدالخالق شعبہ: ایگراؤمی

ہے۔ زراعت کا شعبہ کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہے ان مسائل کا اندازہ اس تجزیہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1947ء میں جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ 53 فیصد تھا جو کہ حالیہ تجزیے (2019-2020) کے مطابق 19.3 فیصد رہ گیا ہے اسکی وجہ پسماندہ معاشی صورتحال، جدید ٹیکنالوجی کا فقدان، لینڈ ریفارمرز کا نہ ہونا، گورنمنٹ پالیسیاں، کرپشن، آبپاشی، اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل ہیں۔ ان سب مسائل میں موسمیاتی تبدیلی وقت کا ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ فصلوں پر کمیزے، مکوڑوں کا بڑھتا ہوا حملہ، خشک سالی اور پیداوار میں کمی جیسے مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جیسا کہ درجہ حرارت میں اضافہ، قدرتی ماحول میں عدم توازن اور غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ خشک سالی جیسے مسائل جنم دے رہا ہے۔ جس کی وجہ سے مکئی کی نشوونما، بڑھوتری اور پیداوار میں کمی جیسے مسائل شامل ہیں۔ ایف اے او کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر مختلف وجوہات کی بنا پر سالانہ 1.3 بلین ٹن اناج ضائع ہو رہا ہے جس میں مکئی میں 20 سے 41 فیصد تک کا نقصان دیکھا گیا ہے۔ خشک سالی فصل کی بڑھوتری اور نشوونما میں کمی کا سبب بنتی ہے پانی کی کمی مکئی کے پودے کے

ملکی معیشت میں مکئی کی فصل کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے پاکستان میں گندم اور چاول کے بعد یہ اہم غذائی فصل ہے جو کہ اسنامک سروے آف پاکستان کے مطابق گذشتہ سال 1413 ہزار ہیکٹر پر کاشت کی گئی جبکہ جی ڈی پی میں مکئی کا تناسب 0.6 فیصد رہا مکئی انسانی خوراک کا اہم جزو ہے۔ اس میں فاسفورس مینگیگنیز، زنک، کاپر اور آئرن جیسے معدنیات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن بی 1، نشاستہ اور اینٹی آکسیڈینٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کی نشوونما اور بیماریوں سے بچانے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ پاکستان کو مکئی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کئی مسائل کا سامنا رہا ہے جس میں موسمیاتی تبدیلی ایک اہم مسئلہ ہے۔ چیئرمین، پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل ڈاکٹر محمد عظیم خاں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی موجودہ دور کا اہم مسئلہ بن چکا ہے اقوام متحدہ کے ادارے آئی پی سی سی کے مطابق 1970 سے صنعتی دور کے آغاز کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ (1.5 ڈگری سینٹی گریڈ) گلوبل وارمنگ کا سبب بنا ہے اس موسمیاتی تبدیلی کے زراعت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جسکی معیشت کا بیشتر حصہ زراعت پر منحصر

سالی کے اثرات کو کم کرنے میں کارگر ثابت ہوا ہے۔ مختلف اجزاء وغیرہ کے سپرے سے پودے کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے نشوونما پر بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پانی کی کمی کے اثرات کو کم کر کے فصل کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مختلف یونیورسٹیاں، تحقیقاتی ادارے اور سائنس دان اپنے تجربات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کر کے فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کیے گئے تجربے کے مطابق مفید فنجائی اور کیمیائی سپرے (گلوٹا تھائیون، اسکوربک ایسڈ) سے پانی کی کمی کے اثرات کو کم کر کے 69 فیصد، 53 فیصد اور 31 فیصد تک پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی تحقیقاتی ادارے، زرعی یونیورسٹیاں، پرائیویٹ کمپنیاں اور زرعی ماہرین زراعت کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں موسمی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیداواری ٹیکنالوجی میں بہتری، بیج کی نئی اور جدید اقسام، گورنمنٹ پالیسیاں اور تحقیق کے میدان میں ترقی وہ اقدام ہیں جن کے ذریعے بدلتے ہوئے موسمی حالات کے اثرات کو کم کر کے زراعت کی ترقی اور پیداوار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

غلیوں کی تعداد اور سائز، پتے کا سائز، پتے کی نشوونما، جڑوں کا پھیلاؤ، سٹومیٹا کی کارکردگی اور نمکیات اور پانی کے تناسب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زمین میں موجود نمی کی مقدار مکئی کی فصل کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ مکئی میں پانی کی کمی کا سب سے زیادہ اثر پولی نیشن کے دوران ہوتا ہے کیونکہ اس دوران فصل کی کل پیداوار کا تعین ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط طریقہ کار کی ضرورت ہے کوئی بھی ایک طریقہ کار گراں ثابت نہیں ہوتا۔ پیداواری ٹیکنالوجی، مختلف کیمیائی سپرے اور مفید فنجائی کے استعمال سے مکئی کی فصل کو موسمیاتی تبدیلی اور پانی کی کمی کے مضر اثرات سے بچایا جاسکتا ہے ٹرائیکو ڈرما جو کہ ایک مفید فنجائی ہے اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ پودے کی جڑوں میں کالونی بنا کر رہتی ہے اور ایسے اجزاء خارج کرتی ہے جو کہ پانی کی کمی کے دوران پودے کے دفاعی نظام کو مضبوط کر کے قوت مدافعت پیدا کرتی ہے یہ مفید فنجائی پانی اور نمکیات کی زیادہ سے زیادہ مقدار زمین سے جذب کر کے پودے کو مہیا کر کے فصل کو پانی کی کمی کے مضر اثرات سے بچاتی ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ مفید فنجائی کے استعمال سے پانی کی کمی کے اثرات کم ہوتے ہیں اور فصل کی پیداوار میں 48 فیصد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کیمیائی طریقہ کار بھی موسمیاتی تبدیلی اور خشک

کپاس میں پھپھوندی اور نیماٹوڈ کے اشتراک سے ہونیوالا مرجھاؤ

پنی ایچ ڈی سکالر: مہوش ناز نگران: ڈاکٹر ساجد علیم خان شعبہ: پلانٹ پتھالوجی

اہمیت

بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں جن میں کچھ پودوں، پتوں اور توتوں پر حملہ کرتی ہیں جبکہ کچھ زیر زمین جڑوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ جڑوں پر حملہ آور ہونیوالے جڑوں میں پھپھوندی اور نیماٹوڈ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پھپھوندی کپاس کے مرجھاؤ کا سبب بنتی ہے اور نیماٹوڈ جڑوں پر حملہ آور ہو کر ان کو کمزور کرتے ہیں اور پھپھوندی و نیماٹوڈ کے نتیجہ میں زخمی ہونے والی جڑوں میں داخل ہو کر ان کے مرجھاؤ کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں یہ مرجھاؤ کئی اقسام کا ہوتا ہے۔

1۔ پانی کی کمی سے ہونیوالا مرجھاؤ

اگر پودے کو پانی نہ دیا جائے تو اس کے نتیجہ میں پودا مرجھا جاتا ہے اور اس کو عارضی مرجھاؤ بھی کہتے ہیں کیونکہ جیسے ہی پودے کو پانی لگایا جائے وہ دوبارہ سے اصل حالت میں آجاتا ہے۔

کپاس ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا ریشہ دھاگہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور کپڑے سازی کی صنعت میں اس کی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جاسکتا ہے دنیا میں 250 ارب لوگوں کا روزگار بالواسطہ یا براہ راست کپاس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا بیج خورد دنی تیل کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے اور برآمدات کے لحاظ سے دسویں نمبر پر ہے۔ 2019-2020ء پاکستان میں 2527 ہزار ایکڑ پر کپاس کی کاشت کی گئی۔ بدقسمتی سے گزشتہ کچھ سالوں سے کپاس کی فصل زوال پذیر ہے اور پیداوار کم ہو رہی ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں ان وجوہات میں موسمیاتی تبدیلیاں، حشرات جیسا کہ سفید مکھی اور گلابی سنڈی کا حملہ اور بیماریوں کا ہونا شامل ہے۔ کپاس پر بہت سی

2۔ پچھوندی سے ہونیوالا مرجھاؤ

کپاس کا ریحہ جو زیادہ تھا وہاں نیما ٹوڈ بھی زیادہ مقدار میں تھے یا ان کا حملہ بھی تھا۔ یہ بات تجربہ گاہ میں مطالعہ سے بھی ثابت ہوئی کہ نیما ٹوڈ پھپھوندی کے حملہ کو فروغ دیتے ہیں جس کے نتیجہ میں فصل کا نقصان ہوتا ہے۔

یہ مرجھاؤ کئی طرح کی پھپھوندی سے ہوتا ہے جن میں جڑوں پر حملہ آور ہونے والی پھپھوندی سمیت دیگر کئی پھپھوندیاں شامل ہیں اس کے علاوہ گدھیرٹی کے چھوڑے ہوئے رس پر کبھی پھپھوندی حملہ آور ہو کر پتوں کے مرجھاؤ کا باعث بنتی ہے۔

علامات

- 1۔ پتوں اور ٹہنیوں کا مرجھانا
- 2۔ جڑوں پر گانٹھوں کا بن جانا
- 3۔ حملہ ککڑیوں کی شکل میں نظر آتا ہے
- 4۔ جڑ کا گلاؤ ہو جانا

جڑوں پر حملہ آور ہو کر مرجھاؤ کا باعث بننے والی پھپھوندیوں میں فیوزیم بہت ہی اہم پھپھوندی ہے یہ پودوں کی نالیوں کو بند کر دیتی ہے جس سے خوراک کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

نیمانوڈ کمپاس کے پودوں کی جڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جڑوں پر گانٹھیں بناتے ہیں اور مادہ نیمانوڈ وہاں انڈے دیتی ہے جن سے بچے نکلتے ہیں اور نکلنے ہی پودوں کی جڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جڑوں میں اپنا طفیلی کردار ادا کرتے ہوئے پودے کے غذائی اجزاء کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ نیمانوڈ کے حملہ کی صورت میں جڑیں زخمی ہو جاتی ہیں اور پھپھوندی حملہ آور ہو کر پودے کے مر جھاؤ کا باعث بنتی ہے۔

سروے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ جہاں جہاں

تدارک: نیماٹوڈ کش ادویات کا استعمال کریں۔
 پھپھوندی کش ادویات کا محلول نیٹو و بحاب⁵⁵
 میں ڈالیں۔

مزاحمت رکھنے والی اقسام کاشت کریں۔
 حیاتیاتی طریقہ انسداد اپنائیں جن میں ٹرائی کوڈرما استعمال کریں۔

<<<<<<<>>>>>>

پنجاب میں مختلف وقت کاشت اور کپاس کی اقسام کا سفید مکھی اور پتہ مروڑ وائرس کے پھیلاؤ پر اثرات

بی بی ایچ ڈی سکالر: محمد اقبال نگران: ڈاکٹر محمد جلال عارف شعبہ: حشرات (انٹومالوجی)

تیزی سے پھیلی۔ جس کی وجہ موافق موسمیاتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں دیر سے کاشتہ چکھیتی فصل سفید مکھی کے حملہ سے زیادہ متاثر ہوئی۔ مجموعی طور پر، سفید مکھی کی تعداد کابی ٹی اور نان بی ٹی اقسام پر کوئی خاص فرق نہ تھا۔ موجودہ تجربات کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیر سے لگائی گئی چکھیتی فصل پتہ مروڑ وائرس سے زیادہ متاثر ہوئی۔ سال 2018 کے دوران لیہ کے مقابلے میں ملتان اور رحیم یار خان میں فصل بیماری سے زیادہ متاثر ہوئی۔ پتہ مروڑ وائرس کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ شروع ہوا اور ستمبر میں زیادہ حملہ نوٹ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے سال (2019) کے دوران زیادہ بارشیں ہوئیں اسی وجہ سے سفید مکھی اور پتہ مروڑ وائرس کا زیادہ حملہ دیکھا گیا۔ مختلف موسمی عوامل (درجہ حرارت، ہوا میں نمی اور بارش) نے سفید مکھی کو مختلف طریقے سے متاثر کیا۔ ہوا میں نمی کا سفید مکھی کی تعداد میں اضافے پر مثبت اثر ہوا۔ ایک اور اہم

کپاس کی سفید مکھی کپاس سمیت کئی فصلات کو شدید معاشی نقصان پہنچاتی ہے۔ پاکستان میں کپاس کی پیداوار و رقبہ میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پیداوار میں کمی کی مختلف وجوہات میں سے ایک حالیہ سفید مکھی کی شدت ہے۔ وقت کاشت اور فصل کی اقسام نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کی شدت، فصل کی برداشت اور پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ موجودہ تحقیقی کام کا مقصد سفید مکھی اور پتہ مروڑ و آئرس کے حملے کا مطالعہ تین مختلف مقامات (ملتان، رحیم یار خان اور لیہ) پر دو بی ٹی اقسام کے تین مختلف وقت کاشت (اپریل، مئی اور جون کا پہلا ہفتہ) پر 2018 اور 2019 میں کیا گیا۔ تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سفید مکھی آہستہ آہستہ تینوں وقت کاشت کپاس پر پھیلتی ہے۔ تاہم یہ اگیتی کاشتہ فصل (اپریل) کے مقابلے میں موسمی (مئی) اور پچھلی فصل (جون) پر تیزی سے پھیلتی ہے۔ مزید مشاہدہ کیا گیا کہ سفید مکھی جولائی کے آخر سے ستمبر تک فصل پر

طریقے سے پودوں کی قوت مدافعت کو بہتر بنایا جاسکے۔ موجودہ تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ سفید مکھی کے حملے سے بچاؤ کے لیے اگیتی کپاس کی فصل لگانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیونکہ فصل سفید مکھی اور کاٹن لیف کرل وائرس کی بیماری کے ابتدائی حملے سے بچ جاتی ہے اور پودے موسم کے مطابق بہتر نشوونما کر پاتے ہیں۔ اپریل کی کاشت شدہ فصل، موسمی اور پچھلی کپاس کے مقابلے میں سفید مکھی کے حملہ کو بہتر طریقے سے برداشت کر سکتی ہے۔

مشاہدہ اگست کے وسط سے ستمبر کے آخر تک تمام وقت کاشتہ فصل پر سفید مکھی کی شدت ہے۔ زرعی زہروں کے مسلسل استعمال اور سازگار ماحول نے سفید مکھی کو بڑا خطرہ بنا دیا ہے۔ مزید براں ٹینڈوں کی نشوونما کا مرحلہ سب سے زیادہ نازک تصور ہوتا ہے جب فصل پر سفید مکھی کا حملہ شدت اختیار کرتا ہے جس سے کپاس کی پیداوار اور منافع متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا بدلتے موسمی حالات، کاشتی طریقوں میں حقیقی تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کے ساتھ نقصان دہ کیڑوں کے خلاف موثر

تعمیراتی عناصر سے نمکیات نکالنا

پی ایچ ڈی سکالر: مبشر اسحاق نگران: ڈاکٹر کاشف کامران شعبہ: فزکس

طریقہ جس میں ڈھانچے کے ارد گرد جو لیپ کیا جاتا ہے۔ اس کو تیزی کے ساتھ خشک کرنا ہے اور پھر نمکیات ڈھانچے سے خشک لیپ کی طرف تیزی سے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی زیادہ افادیت کا حامل نہیں کیونکہ اس عمل میں تعمیراتی ڈھانچے اور لیپ کے درمیان خالی جگہ رہ جانے کی وجہ سے نمکیات ڈھانچے سے لیپ میں آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تعمیراتی ڈھانچے سے نمکیات ختم کرنے کا ایک اور طریقہ جس کو زیادہ پذیرائی ملی وہ الیکٹروکائیٹک طریقہ ہے۔ جس میں تعمیراتی ڈھانچے سے نمکیات ختم کرنے کے لیے برقی روگزاری جاتی ہے۔ اگرچہ اس طریقے کو استعمال کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں۔ تاہم ان نقصانات سے بچنے کیلئے کچھ خاص قسم کے کیمیکل لیپ میں شامل کینے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بیان کئے ہوئے طریقوں کے مقابلے میں برقی روکی مدد سے مختلف نمکیات مثلاً کلورائیڈ، نائٹریٹ اور سلفیٹ کو کم وقت میں نقصان دہ مقدار سے نیچے لایا جاسکتا ہے۔ ہماری مجوزہ تحقیق میں ان مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اینٹ پتھر اور سیمنٹ کے جامع نظام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جس میں الیکٹروکائیٹک طریقہ کا موازنہ لیپ کے طریقہ کار سے کیا گیا ہے۔ سوڈیم کلورائیڈ اور دوسرے نمکیات کی مقدار کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی عناصر پر برقی رو کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیپ کے اندر پہنچ گیلے رکھنے سے برقی روزیادہ دیر تک اثر کرتی ہے۔ لیکن کیمیائی ردعمل کی وجہ سے تیزابیت اور اساس کے پیدا ہونے سے برقی رو کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ اس کیمیائی ردعمل کو کم کرنے کے لیے لیپ کے اندر

جب ہمارے تاریخی ڈھانچے کو محفوظ کرنے اور ہماری رہائشی عمارتوں کو دیر پارکھنے کا مقصد ہو تو ان ڈھانچوں میں نمکیات کے ذرائع کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نمکیات تعمیراتی ڈھانچے میں پہلے سے موجود ہو سکتے ہیں۔ نمکیات کا تعمیراتی ڈھانچے میں داخل ہونا اس ڈھانچے کو وقت کے ساتھ خراب کر سکتا ہے۔ تعمیراتی عناصر کے سام میں جمع ہونے والے نمکیات عام طور پر تعمیراتی ورثے جیسی یادگاروں، مجسموں اور نئی عمارتوں کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ ماحولیاتی حالات کی تبدیلی کے ساتھ، نمک کے ذرے تعمیراتی عناصر کی مسام کے اندر دباؤ پیدا کرتے ہیں جو ان تعمیراتی عناصر کے اندرونی توڑ پھوڑ کا سبب بن سکتے ہیں۔ کلورائیڈ، نائٹریٹ اور سلفیٹ آئنوں پر مشتمل نمکیات تعمیراتی عناصر کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمک سے پیدا ہونے والی تباہی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تعمیراتی عناصر میں نقصان دہ نمکیات کی مقدار کو کم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے عام استعمال ہونے والا طریقہ تعمیراتی ڈھانچے کی سطح پر کوئی لیپ لگانا ہے لیکن یہ ایک سست رفتار عمل ہے۔ جس کی مدد سے تعمیراتی ڈھانچے سے آئن کی مقدار کم ختم ہوتی ہے اور اس میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ اس عمل سے بہت کم مقدار میں کلورائیڈ اور دیگر آئن ختم کئے جاسکتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں ایک مکمل تعمیراتی ڈھانچے کو پانی کے بہاؤ میں رکھا جاتا ہے تاکہ پانی کے ساتھ تعمیراتی ڈھانچے سے نمکیات بھی بہہ سکیں لیکن یہ عمل آس ڈھانچے کو پانی میں رہنے کی وجہ سے زیادہ خراب کر سکتا ہے۔ ایک اور

کے دوران ایٹنوں کے نمونوں سے برقی روگزر کرنے کے طریقے میں زیادہ سے زیادہ 68.86 اور 42 فیصد کلورائیڈ، نائٹریٹ اور سلفیٹ بالترتیب کم ہوا۔ برقی رو کا عمل ریت کے پتھر سے نمکیات بالخصوص کلورائیڈ ختم کرنے میں بھی مؤثر پایا گیا۔ جس کے نتیجے میں ریت کے پتھر سے کلورائیڈ کو 70 فیصد تک کم کیا گیا۔

<<<<<<<>>>>>>>>

کچھ ٹیکنیکل ڈال کر تیزابیت اور اساس کو تعمیراتی ڈھانچے میں داخل ہونے سے روکا گیا جس کے نتیجے میں برقی رو کا بہاؤ زیادہ دیر تک قائم رہا۔ تجربات کے بعد اینٹوں اور ریت کے پتھر کے نمونوں کے مختلف حصوں میں نمک کے آئٹوں کی مقدار کو مناسب ٹیکنیکوں کے ذریعے مایا گیا۔ لیپ کا عمل اینٹوں اور ریت کے پتھروں کے نمونوں سے صرف 18 تا 20 فیصد گوارنٹیڈ اور دیگر نمک کے آئٹوں کو ختم کر سکا۔ جبکہ ان تجربات

غذائی اجناس میں زہریلے مادوں کی پیداوار روکنے کے لیے نباتاتی باقیات کے اجزاء کا استعمال

پنی ایچ ڈی سکالر: تہمینہ شریف نگران: ڈاکٹر بشریٰ سلطانہ شعبہ کیمیا

حصہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف برٹل میں بھی کیا گیا۔ ماٹھے، کھٹی، گریپ فروٹ کے چھلکے، سفیدے اور گورکھ (لیمن گراس) کے تازہ پتوں سے روغنیات کو کشید کیا گیا اور ان روغنیات کی کیمیائی ساخت اور مقدار کی جانچ پڑتال کے لیے گیس کرومیٹوگرافی اور ماس سپیکٹرومیٹری کا استعمال کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں ان روغنیات کے پھپھوندی کو تلف کرنے کی صلاحیت کی جانچ پڑتال کی گئی۔ گندم، مکئی اور چاول کو مصنوعی طریقہ کار سے پھپھوندی لگا کر ان نباتاتی روغنیات کی مخصوص مقدار کے زیر اثر کچھ وقت کے لیے ذخیرہ کیا گیا۔ کھٹی، سفیدے اور گورکھ کے روغنیات کے زیر اثر محفوظ کیے گئے اناج کے نمونے پھپھوندی کی افزائش سے محفوظ رہے اور اس کے نتیجے میں زہریلے مادوں کی روک تھام کا سبب بھی بنے۔ موجودہ سائنسی تحقیق سے حاصل شدہ نتائج کو تجربہ کاروں نے ایک مقامی سائنسی جریڈے میں شائع کیا۔ یہ سائنسی تحقیق مستقبل کے تجربہ کاروں کے لیے مددگار ثابت ہوگی تاکہ نباتاتی جراثیم کش مرکبات کو مصنوعی جراثیم کش ادویات کے متبادل کے طور پر متعارف کرایا جاسکے۔

پھپھوندی زدہ خوراک کا استعمال بے شمار بیماریوں کا موجب ہو سکتا ہے ایسی بیماریاں شعبہ صحت کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ غذا میں پیدا ہونے والے زہریلے مادے ذخیرہ اندوزی کے دوران غذائی اجناس کے ضیاع کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ پھپھوندی کی مختلف اقسام سے پیدا ہونے والے یہ مادے کئی طرح کے سرطان، جینیاتی بگاڑ، اعصابی اور مدافعتی بیماریوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ غذائی اجناس کو لگنے والی پھپھوندی کی افزائش کے سدباب کے لیے مصنوعی جراثیم کش ادویات کے مختلف نقصانات سامنے آتے ہیں جن میں خوراک پر ان مادوں کے باقیات کا رہ جانا، قدرتی طور پر ان کا ماحول میں تلف نہ ہونا، زمینی اور ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنا سرفہرست ہیں۔ روغنیات قدرتی طور پر ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں کہ انہیں مصنوعی جراثیم کش ادویات کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ سائنسی تجربہ انہی عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے سرانجام دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے تجربہ کاروں نے زرعی یونیورسٹی کے شعبہ کیمیا اور شعبہ مرضیات میں مشترکہ طور پر تجرباتی مطالعہ کیا۔ تحقیق کا محدد

دھان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے کسانوں کی تربیت

بی ایچ ڈی سکالر عمران ریاض نگران ڈاکٹر اعجاز اشرف شعبہ توسیع زراعت، تعلیم و دیہی ترقی

ایک زری رقبہ ہے جو کہ کل رقبہ کا 28 فیصد بنتا ہے اس میں سے بھی 8 ملین ایکڑ رقبہ زیر کاشت نہ ہونے کے باعث بے کار پڑا ہے۔ حالانکہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ماحول اور موسم بھی زراعت کے لیے بہترین ہیں۔ اس طرح پاکستان میں ہمہ قسم کی

پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے جس کی پچاس فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے اور اس آبادی کا تمام مزدور آمد زرعت پر ہے۔ گویا زرعت پاکستان کی پچاس فیصد آبادی کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 19.6 ملین ایکڑ ہے جس میں سے 23.77 ملین

(86.1 فیصد) نے اشیاء کی قیمتوں کو ایک اعلیٰ سطح کی رکاوٹ کے طور پر بیان کیا ہے۔ آزاد اور انحصار کرنے والے متغیرات کے درمیان تعلقات نے واضح کیا کہ زیادہ عمر کے جواب دہندگان چاول کے کاشتکاروں کو چاول کی تجویز کردہ پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے جو کہ کم عمر چاول کے کاشتکاروں کے مقابلے میں کم ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ (میٹرک کے اوپر) چاول کے کاشتکاروں کی تربیت کی ضرورت، ناخواندہ اور پرائمری پاس چاول کے کاشتکاروں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس تحقیق کے نتائج کے مطابق جو تجاویز مرتب کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ صرف 16 فیصد کسان چاول کو بیچنے کے لیے کاشت کرتے ہیں۔ کسانوں کی تربیت اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ چاولوں کو تجارتی مقاصد کے لیے کاشت کریں۔ صرف 29.5 فیصد کسان موٹی اقسام کے بارے میں جانتے تھے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چاول کی موٹی اقسام متعارف کروائے تاکہ برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ وہ تمام کسان جس کا تجربہ زیادہ ہے وہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس لیے دوسرے کسانوں کو چاہیے کہ وہ ان کسانوں سے فیصد مشورہ حاصل کریں۔ جڑی بوٹیاں فصل کی پیداوار کو بہت حد تک کم کر دیتی ہیں اس لیے کسانوں کو جڑی بوٹیوں سے نمٹنے کے لیے تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ محکمہ زراعت کے کارکنان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ کسانوں کو جدید علم جدید طریقوں سے پہنچا سکیں۔ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تلاش کریں جن کو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پورا کرنا بہت ضروری ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

غذائی اشیاء کی پیداواری صلاحیت موجود ہے۔ کسانوں کی بہتر تربیت کے لیے ان کی ضروریات کا علم ہونا بہت ضروری ہے کسانوں کا جدید علم سے آراستہ ہونا اچھی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ چاول، مکئی کے بعد دنیا میں دوسری بڑی پیداواری فصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں چاول کی پیداوار دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کی لیے کسانوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں چاول چار مختلف علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ ہیں لیکن پنجاب میں چاول کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پنجاب کا ضلع گوجرانوالہ پیداوار اور رقبہ کے حساب سے دوسرے اضلاع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس تحقیق کے لیے محکمہ زراعت اسٹیشن ڈیپارٹمنٹ سے کسانوں کی لسٹیں حاصل کی گئیں جو کہ چاول کی فصل کے ساتھ منسلک تھے۔ جو معلومات اکٹھی کی گئی اس کے مطابق آدھے سے زیادہ (53 فیصد) زمینداروں کی عمر 6 سے 50 سال کے درمیان ہے۔ اگر تعلیمی قابلیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو 47.9 فیصد لوگ جن سے معلومات لی گئی رسمی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے اور آدھے سے زیادہ زمیندار چھوٹے کسان تھے جو کہ کل لی گئی آبادی 53.6 فیصد تھے۔ کسانوں نے چاول کی عمدہ اقسام کی کاشتکاری کی 55.7 فیصد جواب دہندگان زمین کے مالک تھے جبکہ 65.1 فیصد جواب دہندگان نے تجارتی مقاصد کے لیے چاول کاشت کیے۔ کھڑے مکوڑوں کے انتظام کے حوالے سے 65.1 فیصد چاول کا کاشتکار نا بلدت تھا۔ کھاد کے استعمال کے بارے میں چاول کے کاشتکاروں میں آگاہی کی نمایاں کمی تھی۔ صرف 8.7 فیصد جواب دہندگان گورنمنٹ کی طرف سے کی جانے والی تربیت سے انتہائی مطمئن تھے۔ جواب دہندگان کی ایک بڑی اکثریت

پنجاب میں موسمی تغیرات کے اثرات اور زرعی حکمت عملی

پنی ایچ ڈی سکالر: ضیاء محمود نگران: ڈاکٹر اشفاق احمد مان شعبہ: دیہی عمرانیات

شدت کی بڑی وجہ انسانی عنصر ہے جس میں آبادی میں بے تحاشہ اضافہ صنعتوں کا پھیلاؤ، جنگلات کی اندھا دھند کٹائی، گاڑیوں میں اضافہ دھان کی کٹائی کے بعد فصلوں کو جلانے جیسے عوامل شامل ہیں۔ مزید برآں موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے سماجی و اقتصادی اور ماحولیاتی نظام پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کیونکہ اقتصادی سروے 2020-21 کے مطابق زراعت پاکستان کی مجموعی پیداوار میں 19.2 فیصد حصہ رکھتی ہے اور 70-65 فیصد تک آبادی بلا واسطہ اور

تیزی سے رونما ہونیوالی موسمیاتی تبدیلیوں کے ہولناک اثرات پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونیوالے شعبہ جات میں زراعت سرفہرست ہے۔ اگر بروقت مناسب اقدامات بروئے کار نہ لائے گئے تو مستقبل میں پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کا شمار بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں ساتویں نمبر پر ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں کے اثرات میں

کے معیار میں کمی جیسے عوامل سامنے آئیں ہیں جبکہ کسان اس تناظر میں اپنی زرعی حکمت میں مسلسل نئی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں۔ جس میں نئی وراثتی کی کاشت، کم پانی والی فصلیں، کھاد اور کیڑے مار ادویات کا استعمال اور گھریلو آمدنی کے لیے متفرق اقدامات جیسے عوامل شامل ہیں۔ کسانوں کی اچھی تعلیم، آمدنی اور معلومات تک رسائی جیسے عوامل کو بہت اہم پایا گیا ہے جن کی موجودگی سے موسمیاتی تبدیلی کے منفی نتائج اور اثرات میں کمی لائی جاسکتی ہے۔ تحقیق میں کسانوں کو پیش آنیوالی مشکلات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان مشکلات میں غیر موثر موسمیاتی پیش گوئی، ٹیکنالوجی اور مشینی آلات کا کم استعمال، پانی کی کمی، موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کم معلومات جیسے عوامل شامل ہیں۔ اگر حکومت اور متعلقہ ادارے منظم منصوبہ بندی سے ان حالات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم زرعیت کے شعبہ میں خود انحصاری اور ترقی کو یقینی بنا سکیں گے۔

بالواسطہ زراعت سے منسلک سرگرمیوں سے وابستہ ہے۔ بارشوں کی غیر یقینی صورتحال، حرارت میں اضافہ، گرم ہواؤں، خشک سالی، سیلاب کی شدت میں اضافہ اور موسم سرما کے مختصر ہونا، یہ وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جن کو ماضی میں مشاہدہ کیا گیا اور یہ مستقبل میں بھی متوقع ہیں۔ اگر پاکستان میں ان تبدیلیوں کے مطابق زراعت کے شعبہ میں حکمت عملی اختیار نہ کی گئی تو اس کے سنگین نتائج متوقع ہیں۔ موجودہ تحقیق صوبہ پنجاب میں کی گئی ہے جس میں تین اضلاع بہاولنگر، چکوال اور فیصل آباد کو شامل کیا گیا۔ اس میں سائنسی طریقہ کار کے ذریعے جواب دہندگان سے معلومات اکٹھی کی گئی ہے اور حاصل ہونیوالی معلومات کو شماریاتی اعداد و شمار کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اس سے حاصل ہونیوالے نتائج کی تفصیل یوں ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات صوبہ پنجاب کے طول و عرض میں محسوس کئے جا رہے ہیں اور زراعت پر اس کے اثرات نہایت واضح ہیں۔ اس کے اثرات میں پیداوار میں کمی، کھاد اور کیڑے مار ادویات کے استعمال میں اضافہ، فصلوں

فضائی آلودگی کو کم کرنے میں زیبا نشی پودوں کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: شمیم عمر نگران: ڈاکٹر ممتاز حمین شعبہ نباتات

جاتا ہے جو کہ جناح ٹاؤن، لائل پور ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور مدینہ ٹاؤن کہلاتے ہیں۔ ان تمام علاقوں سے سڑکوں کے کنارے لگائے گئے پودوں کے پتے اور مٹی کے نمونے سال کے ہر موسم میں جمع کئے گئے۔ زیبا نشی پودوں کی آٹھ اقسام اس تجربہ میں شامل کی گئیں جن میں بوگن ویلیا، السٹونیا، نیم، شیشم، بسما رکیا، واشنگٹنیا، کروٹو پس اور فائیکس شامل ہیں۔ ان نمونوں کو زرعی یونیورسٹی کی لیبارٹری میں لاکر دھاتوں کی مقدار کا تجزیہ کیا گیا۔ جس کے لیے اٹامک سپیکٹرو فوٹومیٹر کا استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ فیصل آباد کے چاروں ٹاؤنوں میں یہ سب دھاتیں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں اور تمام موسموں کی نسبت گرمیوں میں ان کی مقدار میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمام زیبا نشی پودے انکو جذب کر کے نمایاں مقدار میں اپنے مختلف حصوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ جن پودوں نے ان دھاتوں کو زیادہ مقدار میں جذب کر کے جمع کیا ان میں بسما رکیا، نیم، شیشم، کروٹو پس، اور بوگن ویلیا نمایاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پودوں کو زیادہ مقدار میں لگائیں تاکہ فضائی آلودگی کم ہو سکے اور اس سے پھیلنے والی مہلک بیماریوں سے انسانوں اور جانوروں کو بچائیں اور فصلوں کی پیداوار کو بھی بڑھائیں۔

فضائی آلودگی آج کل دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ جو کم کرنے کے لیے تمام ممالک میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ معاملہ زیادہ گہمیر ہے کیونکہ ان ممالک میں فضائی آلودگی کے قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ فضا میں بہت سے آلودہ کرنے والے عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم قسم بھاری دھاتوں کی ہے جن میں تانبا، لوہا، کیڈیم، لیڈ، مینگینز، نکل اور زنک نمایاں ہیں۔ عام طور پر سڑک پر چلنے والی گاڑیاں اور صنعتیں انکو پھیلائیے اہم ذرائع ہیں۔ یہ خوراک، تنفس وغیرہ کے راستے جانوروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً انسانوں میں دماغی اور پھیپھڑوں کی خطرناک بیماریاں دھاتوں کی زیادہ مقدار کا نتیجہ ہیں۔ فصلوں کی پیداوار بھی ان کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے لہذا ان کا تدارک بہت ضروری ہے۔ جس کے لیے بہت سے طبعی کیمیائی اور میکینیکل طریقے استعمال کئے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی طریقہ تسلی بخش نتائج فراہم نہیں کرتا۔ پودوں کے ذریعے ان دھاتوں کو فضا میں کم کرنے کا طریقہ بہت اہم اور بے ضرر ہے۔ جس کو آج کل بہت آزمایا جا رہا ہے۔ یہ تجربہ فیصل آباد (پاکستان) میں 2018-19ء کے دوران کیا گیا۔ اس شہر کو چار حصوں میں تقسیم کیا

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



ڈپٹی کمشنر عثمان قر، ڈین انجیل سپورٹس ڈاکٹر قمر بادل، صداقت گروپ پیپر مین مختار احمد، ڈاکٹر احمد ستار، ڈاکٹر ریاض ورک، ڈاکٹر یونس ودیگر انجیل سپورٹس فیکلٹی ذری یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام دو روزہ چپورٹس گالا کا افتتاح کر رہے ہیں



پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے صدر ڈاکٹر خالد محمود خاں، ڈاکٹر محمد اصغر، ڈاکٹر عامر جمیل، ڈاکٹر انجم ضیاء، ڈاکٹر فیصل الرحمان و دیگر شعبہ بائیو ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام بین الاقوامی سیمینار کے برائے لائف سائنسز میں عالمی ترقی سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، رجسٹرار طارق محمود گل، بڑی عمر سعید قادری سینٹ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، نیشنل ہینڈ بال اکیڈمی اور ریورس سنٹر کانسٹکٹ بنیاد رکھ رہے ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، CABI کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرحمن، پیپیرین انٹومالوجی ڈاکٹر جلال عارف، سویڈر لینڈ کے زرعی ماہر فلٹ، ڈاکٹر بابر شہباز، ڈاکٹر اعجاز اشرف، ڈاکٹر ثاقب حیاتیاتی کنٹرول سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، یونیورسٹی کے محکمہ جنگلات کے تحقیقی منصوبہ جات کا افتتاح اور دورہ کر رہے ہیں



چیف انفارمیشن کنسٹرکشن پنجاب محبوب قادر شاہ، پیپیرین انٹومالوجی پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف، محمد اقبال بابر میاں ارشد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال نیازی، ڈاکٹر مرزا بھنگیر، ڈاکٹر محمد عتیق و دیگر ماسٹرس کی پیروا احوال اور مستقبل کے تناظر میں کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



جامعہ زرعیہ کے ڈاکٹر آصف کامران، امریکی سائنسدان ڈاکٹر احمد خاں، ڈی جی ایوب ریسرچ مچھو نواز، ریکوٹ سینٹرک سائنسدان محمد عظیم خان، ڈاکٹر خالد حسین زرعی یونیورسٹی میں منعقدہ بین الاقوامی ٹریننگ برائے ریکوٹ سینٹرک سے خطاب کر رہے ہیں

شعبہ تصنیف و تالیف زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

فون نمبر 041-9200161-69 ای میل اڈریس oubmuaf@gmail.com