

ترجمان زرعى

ترجمان زرعى يونيورسٲى فيصل آباد

جنورى تا مارچ 2018ء



دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ
زرعى يونيورسٲى فيصل آباد

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر مظہیر احمد ظہیر، ڈاکٹر مبشر مہدی، ڈاکٹر حماد بدر، ماریہ عمر، حانیہ مدثر، فخر عالم، عباس رضوی و دیگر خواتین انٹرنیشنل ریشپ پر منعقدہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کر رہے ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، ڈین کلیدی زراعت ڈاکٹر محمد امجد اوچیر، مین شعبہ انٹوماجی ڈاکٹر محمد جلال عارف بی ایس سی اور ایم ایس سی کے طلبہ کی استقبالیہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا کے ڈاکٹر مقدم بوت صدیق، ڈین کلیدی زراعت ڈاکٹر محمد امجد، ڈاکٹر ایال بیوسٹ، ڈاکٹر ریاض احمد مسٹر سرفراز و دیگر پاکستان اور چین کی زراعت پر منعقدہ کنفرس سے خطاب کر رہے ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، ڈین کالیفرنیا یونیورسٹی ہوم سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق بٹ اور عمر سعید قادری کے ہمراہ پنک رہن (چھاتی کے کینسر) کے حوالے سے آگاہی واک کی قیادت کر رہے ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، ڈین کلیفونیوریشن ویٹرنری سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق، بٹ محمد نسیم اعجاز، ڈاکٹر زہت ہما، ڈاکٹر عتیٰ خاں ودیگر کالیفرنیا یونیورسٹی ویٹرنری سائنسز کے زیر اہتمام ورلڈ فوڈ ڈے پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، ڈین کلیفونیورسٹی سائنس ڈاکٹر احمر احمد خاں، ڈین کلیف زراعت ڈاکٹر محمد امجد، ڈاکٹر بینش اسد اور ڈاکٹر مصباح اعجاز ورلڈ ایگ ڈے پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



ڈین کلیف زراعت ڈاکٹر محمد امجد کی قیادت میں انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکچرل سائنسز کے زیر اہتمام ہارٹیکچرل کمیشن کے 15 سال مکمل ہونے پر نکالی گئی واک کے شرکا ایڈمن بلاک کے باہر واک میں شریک ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر فیکلٹی آف سائنسز کے ڈین ڈاکٹر محمد اعجاز باجوہ اور ڈاکٹر خلیل الرحمن کے ہمراہ سپورٹس گاہ میں ٹیموں سے متعارف ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف طالبات رسد کشی میں زور آزمائی میں مصروف ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، ڈین کلید زراعت ڈاکٹر محمد امجد، ڈاکٹر جاوید اختر، ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر، ڈاکٹر غلام قسری، ڈاکٹر انوار الحسن و دیگر بائز انجکشن کمیشن کے 15 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر سگا پور میں باوربٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں چار گولڈ میڈل جیتنے والے جامعہ کے انسٹیٹیوٹ آف ایگریکولچرل سائنس کے طالب علم محمد احمد خان لودھی کو پھولوں کا گلہ ستہ پیش کر رہے ہیں



وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر، چیئر مین ڈاکٹر خورشید قریشی، ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر، ڈاکٹر ندیم طارق، ڈاکٹر طاہر شاہ، ڈاکٹر فرح حسن، ڈاکٹر مقبول اختر اور ڈاکٹر نعیم اختر یا نیو فریڈائزر پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



کینیڈا کے زرعی ماہرین پر مشتمل تین رکنی وفد کے اراکین کا جامعہ کے دورہ کے دوران وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر اور تمام کالجیات کے ڈیپٹی چیئر مین انٹرمیڈیٹ ڈاکٹر جمال عارف، ڈاکٹر یاسر بیرون و فی راولپنڈی ڈاکٹر رشید احمد اور ڈاکٹر اشفاق چھٹہ کیساتھ ملاقات کے بعد گروپ فوٹو

دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ - زرعی یونیورسٹی فیصل آباد


<http://www.uaf.edu.pk>

رجسٹرڈ ایل نمبر 7793 جلد نمبر 53 شمارہ نمبر 1



جنوری تا مارچ 2018ء

ISSN 2521-0416



سرپرست اعلیٰ: پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر وائس چانسلر

مجلس منتظمین: پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسراء (کنوینر)

ڈاکٹر محمد قمر بلال سیکریٹری/ایڈیٹر

ممبران: پروفیسر ڈاکٹر محمد یسین انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

ڈاکٹر شوکت علی بھٹی انسٹیٹیوٹ آف اینیمل سائنسز

ڈاکٹر مظہر حسین رانجھا شعبہ انٹومالوجی

ڈاکٹر محمد اشفاق واحد شعبہ ایگرونومی

ڈاکٹر محمد دلدار گوگی شعبہ انٹومالوجی

ڈاکٹر چوہدری محمد ایوب انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

مسٹر عمر دراز واٹر مینجمنٹ اینڈ ریسرچ سنٹر

مسٹر محمد عون یو اے ایف سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ

حافظ مسعود احمد شعبہ فارسٹری اینڈ ریجنل مینجمنٹ



محمد آصف

یونیورسٹی آرٹسٹ/ڈپارٹمنٹ

عظمت علی

آرٹسٹ

محمد اسماعیل

آفس اسسٹنٹ

محمد امین، آصف محمود

اردو ٹائپسٹ

ڈاکٹر شازیہ رمضان

انتخاب حواشی

oubmuaf@gmail.com

www.oubm.org

پرچشنگ:

پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف (پرنسپل آفیسر، پی آر پی)

ممتاز علی (اسسٹنٹ رجسٹرار، یونیورسٹی پریس)

شائع کردہ: دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

Phone: 041-2619675, 041-9200161-69

Ext. 3405, 2949

لائف ٹائم ممبرشپ 5000 روپے
سالانہ ممبرشپ 300 روپے
سٹوڈنٹ ممبرشپ 200 روپے

مندرجات

پولٹری	40	بشر کے انڈوں اور گوشت کی غذائی اہمیت.....	حق نواز
	42	خوراک اور پانی میں آرسینک مرکبات کی آمیزش اور اس کے انسانی صحت پر مضر اثرات.....	سجاد الرحمن
متفرقات	43	پاکستان کی زرعی برآمدات کو درپیش مسائل کا سدباب.....	عبدالغفور
	44	پاکستان میں مٹن مشروم کی پیداوار.....	ناصر احمد خاں
	45	نئیوٹیکنالوجی اور ہماری خوراک.....	محمد کاشف
	46	فصلوں میں ادویات کا استعمال اور ذخیرہ کرنے کا جدید نقطہ نظر.....	احمد علی
	47	کھادوں کے درست طریقہ استعمال کے حوالے سے کسانوں کی رہنمائی.....	محمد زوہیب الیاس

زرعی ریسرچ کارنر (بی ایچ ڈی کارلر کی تحقیق کے اہم نتائج و سفارشات)

انگریزی	49	باغیچہ ٹیلانڈرز کا سورج کھجی کی پیداوار میں کردار.....	محمد عقیل سرور
	49	گندم کی ایلوپیتھک خصوصیات کے جزی بوٹیوں اور رائزوسفیر پر اثرات.....	فرحیہ اسلم
	49	ایلپویتیٹی فصلوں کی بڑھوتری میں کردار: ایلپویتیٹی کی حامل فصلوں کے محلول کا کم مقدار میں چھڑکاؤ.....	محمد کامران
	50	گندم کی چھتی کاشت اور ٹیلانڈرز جن پر آکسائیڈ.....	انظہر غفاری
	50	لوسرن کے چارے اور بیج بڑھانے کے ضروری عوامل.....	جہشید احمد
	51	مکئی کی کاشت پر پانی کی کمی اور فاسفورس کے اثرات.....	غالبور احمد
سوال سائنس	51	باقاعدہ کم آکسائیڈ گندم کی نشوونما کے مختلف مراحل پر پونا شیم کی موجودگی میں گندم کی پیداوار اور پانی استعمال کرنے کی کارکردگی پر اثرات.....	محمد عمران
	52	ٹائلر و جن کے نامیاتی اور غیر نامیاتی ذرائع کے چاول اور گندم کے فصلی نظام میں ٹائلر بیٹ کی زیر زمین حرکت، پانی کے استعمال کی کارکردگی، فصل کی نشوونما اور کاربن مضبوطی پر مقداری اثرات.....	نکلیل احمد انور
	52	ایسی بکھری زمینوں کے لیے کثیر القاصد متبادل فصل.....	محمد عبدالقیوم
	52	پروٹیم آلودگی کا حیاتیاتی کنٹرول.....	حافظ محمد رفیق
	53	مکئی میں بلیک لیون کی غذائیت سے نمکیت کے مضر اثرات کا تدارک.....	وقاص الدین خان
پلاٹ پتھالوجی	53	دوست خلیے اور ان کی افادیت.....	محمد رحیل
امراضیات	54	براہنہ چوزوں کی خوراک میں موجود افلا ٹاکسن اور اوکرا ٹاکسن کا تدارک.....	شیراز احمد بھٹی
کیمسٹری و بائیو کیمسٹری	54	روایتی طبی پودوں کا کینسر کے خلاف صلاحیت معلوم کرنے کے لیے کیمیائی اور حیاتیاتی تجزیہ.....	عائشہ اشرف
	54	لیکیر خامرے کی افادیت بڑھانے کے لیے مختلف تجرباتی عوامل کا باہمی موازنہ.....	سعدیہ نورین
	55	خشک سبزیوں اور خشک میوہ جات کا کیمیدی اور گائیکیشن کے عوامل کی روک تھام میں کردار.....	آسیہ عطا
	55	کم پانی میں زیادہ پیداوار دینے والی گندم کی ایک قسم.....	عائشہ بٹ
	55	سپازولینا بھت بخش اور غذائیت سے بھرپور غیر روایتی ماخذ لحمیات.....	شاہد بشیر
ٹیفیٹ	56	چھڑ چھڑ: غذائیت اور اہمیت.....	صائمہ رفیق
	56	Propolis - شہد کی کھجیوں کی مصنوعات اور اس کے فائدے.....	محمد شہباز
باغبانی	57	جنگلی آگنے والی وغیرہ کی آکسٹ مشروم کی کاشت اور حیاتیاتی و کیمیائی مطالعہ.....	حسن سردار
انٹو مالوجی	57	دیگ سے لکڑی کی حفاظت بذریعہ مرکبات.....	رشدہ فاطمہ
زرعی مسائل	58	کسانوں کے سوالات اور زرعی ماہرین کے جوابات.....	ادارہ

اداریہ	3	اپنی بات.....	مدیر
جامعہ نامہ	4	شعبہ بائیو کیمسٹری کے زیر اہتمام مائیکرو لکریٹر لیب کے توسط سے اقبال آڈیٹوریم میں بین الاقوامی سپوزیم برائے صحت و نیوٹریشن.....	ادارتی بورڈ
	4	ساؤتھ سنٹرل یونیورسٹی فار ٹیکنالوجیز چائنہ کے ثقافتی طائفہ کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں چائنیز کچنل پرفارمنس کا مظاہرہ.....	ادارتی بورڈ
	5	جامعہ میں سپارکو پاکستان کے اشتراک سے ورلڈ پیس ویک کی تقریبات.....	ادارتی بورڈ
	5	جامعہ کے نیویسٹ ہال میں ملک بھر کی جامعات کے زیر تعلیم طلباء و طالبات میں نئے برنس آئیڈیاز پر بی بی ڈاٹس ایگریکلچر و فوڈ کانفرنس ایونٹ کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	6	ایگری ٹورازم کلب کے زیر اہتمام پاک امریکہ مرکز اعلیٰ تعلیم (CAS) کے آڈیٹوریم میں پہلی ایگری ٹورازم کانفرنس.....	ادارتی بورڈ
	7	سینئر یوٹرفس کے زیر اہتمام میں غشیات کی روک تھام پر سیمینار کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	8	ادارہ ایشیائی اینڈ منٹ فنڈ سیکرٹریٹ کے تعاون سے کسان ڈے کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	8	پاکستان سوسائٹی فار ٹیکنالوجیز چائنہ کے زیر اہتمام گل داؤدی اور موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش.....	ادارتی بورڈ
انٹرویوز	9	ڈاکٹر نکلیل احمد نجم (اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد.....	ادارتی بورڈ
	11	ڈاکٹر عامر شکیل (اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ بی بی ڈاٹس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد.....	ادارتی بورڈ
ٹیکنالوجی برائے فصلات	13	گنے کی منافع بخش کاشت.....	مذہب حسین
	15	مکئی کی فصل کی جزی بوٹیاں اور ان کا مربوط انسداد.....	ساجد اسحاق
	16	بہاریہ مونگ کی کاشت.....	شہزاد اسلم
	17	مکئی کی پیداوار میں زنک لائی سین کا کردار.....	زیر اسلم
	18	دھان کی بھرپور پیداوار.....	سنبیل رشید
	20	چاول کی فصل میں بھروسے جھلساؤ کی بیماری کا جائزہ اور طریقہ انسداد.....	محمد جبران
ہائپر ٹیکر	22	اتار کی پیداواری ٹیکنالوجی.....	محمد اعظم
	23	پیتھیا کی پیداواری ٹیکنالوجی.....	محمد رضوان
	25	نمائش پودوں پر طفیلی خلیوں کے اثرات اور ان کا موثر تدارک.....	محمد جبران
	26	پت چھڑ پھلوں کے باغات کے انتظامی امور.....	اللہ بخش
	27	ترشادہ پھلوں کی دیکھ بھال، غذائی ضروریات، بیماریاں اور ان کا تدارک.....	عائشہ انور سلاہری
	28	تربوکی کاشت.....	چوہدری محمد ایوب
	29	نسل کے مسائل اور ان کا تدارک.....	محمد عرفان اشرف
	30	گلاب میں مفید معاشی تغیرات کے لیے تاجکاری شعاعوں کا استعمال.....	مونس حسین شاہ
	31	ایٹھیل (خوردنی لینڈ سکیپنگ).....	عقیدہ صغیر
حیوانیات	32	گلوٹر سے لاحق خطرات اور ان کا سد باب.....	صبا مہناز
	33	ریکسٹی اوس کی حیوان آلودہ مرض کی اہمیت.....	عادل اعجاز
	34	بھینٹ بکریوں کا انتخاب اور خرید.....	محمد قمر ہلال
	35	بلیوں کے بارے میں معلومات.....	شامکد رحمان
	36	اٹھنی کا جدید ڈیری فارمنگ اور انسانی بیماریوں کی روک تھام میں موثر کردار.....	فیصل شہزاد
	38	کھل بھول: نہ کھانے کی وجوہات.....	شوکت علی بھٹی
پولٹری	39	پولٹری ہاؤس کے لیے گرم موسم کے انتظامات.....	فواد احمد

پبلشر پروفسر ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسراء نے زرعی یونیورسٹی پریس فیصل آباد سے چھپوا کر دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے شائع کیا

اپنی بات

غریب کسان جس کا تعلق فصلوں سے ہو یا جانوروں سے ابھی تک موسم کی مار، جاگیردار کے استحصال، پست شرح خواندگی، بڑھتی ہوئی آبادی اور سکڑتی زرعی اراضی، غیر مشینی کاشتکاری، آڑھتیوں کے ناروا سلوک اور غیر منظم مارکیٹنگ سسٹم کے شکنجوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور کاشتکاری کے عمل میں حتیٰ الوسع تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم سرمایہ کاری اور تعلیم کی کمی کے باعث زیادہ تر کسانوں کے لیے یہ ایک مشکل امر ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے دولت مند کسان جو زیادہ زمین کے مالک ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہیں وہ تیزی سے کاشتکاری کے نئے طریقے اپنا رہے ہیں تاہم ایک اندازے کے مطابق بہت سارے چھوٹے کسان ایسے ہیں جو حکومتی عدم سرپرستی اور غیر یقینی موسمیاتی قوتوں کے باعث زراعت کا شعبہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ غریب کسانوں کو تکنیکی، مالی اور اداری مدد فراہم کرنا ہی مسئلہ کا حل ہے۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے ان کسانوں کو بروقت تکنیکی و دیگر سہولیات فراہم نہ کی گئیں تو ملک میں خوراک کی کمی دور کرنے اور غربت میں کمی لانے کے اہداف حاصل کرنا ممکن نہ ہو پائیں گے۔ ضروری ہے کہ ایسی فصلوں کی کاشت کی جائے جن میں کم مشقت اور لاگت درکار ہو کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہی کسان کو بیک وقت تنہا کئی امور سرانجام دینے پڑتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ، غیر روایتی کاشتکاری اور سبز یوں کی کاشت کو فروغ دے تاکہ وہ کم وسائل سے زیادہ آمدنی حاصل کر سکے، ڈرپ اریگیشن کی تکنیک کو استعمال کیا جائے، زمین کی تیاری میں لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی جائے تاکہ پانی کی بچت ہو سکے۔ زرعی اصلاحات اور قوانین کی از سر نو تجدید کی جائے اور ان قوانین کا نفاذ بھی یقینی بنایا جائے۔ جب تک تمام زراعتی ادارے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے غریب کسان کی خوشحالی کے کام نہیں کرتے تب تک پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور اس کے باقی کیمپسز بھی کسان بھائیوں کو تکنیکی معاونت پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس بورے والا کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اقدام بھی قابل تحسین ہے اور وہ وقت دور نہیں جب باقی کیمپسز بھی یونیورسٹیوں کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ زیر نظر شمارہ میں کسانوں کی دلچسپی کے لیے یونیورسٹی فیکلٹی ممبران کے انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر عامر شکیل (اسسٹنٹ پروفیسر، پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹیکس) اور ڈاکٹر شکیل احمد انجم (اسسٹنٹ پروفیسر، ایگری انومی) کے انٹرویوز پیش خدمت ہیں۔ اُمید ہے قارئین حضرات کو زرعی ڈائجسٹ پبلیکیشنز کا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور اپنی قیمتی آراء اور مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔

ڈاکٹر محمد قمر بلال

ایڈیٹر، زرعی ڈائجسٹ

شعبہ بائیو کیمسٹری کے زیر اہتمام مالیکیولر کیمزلیب کے توسط سے اقبال آڈیٹوریم میں بین الاقوامی سمپوزیم برائے صحت و نیوٹریشن



شعبہ بائیو کیمسٹری کے زیر اہتمام مالیکیولر کیمزلیب کے توسط سے اقبال آڈیٹوریم میں بین الاقوامی سمپوزیم برائے صحت و نیوٹریشن کا انعقاد ہوا۔ سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ غذائی قلت اور خون کی کمی سمیت ماؤں کی صحت کو درپیش جملہ مسائل کی وجہ سے پانچ سال سے کم عمر 1200 بچے روزانہ موت کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ زندگی کے دوران ایک لاکھ میں سے 276 خواتین زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پاکستان کے بیشتر شہروں کی آبادی بہت سے ممالک کی مجموعی آبادی سے زائد نفوس پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے شہروں میں دستیاب تعلیم و صحت کی سہولیات سخت دباؤ کا شکار ہیں۔ سمپوزیم کے ابتدائی سیشن سے مہمان خصوصی کے طو پر شرکاء سے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے کہا کہ مسلم ممالک خصوصی پاکستان اور ملائیشیا میں تبدیل ہوتی ہوئی غذائی ترجیحات اور عادات کی وجہ سے نوجوان موٹاپے کا شکار ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ اگر وہ ناشتے سے کم سے کم تین گھنٹے قبل بیدار ہونے کے بعد نماز اور سیر کو اپنا معمول بنالیں تو جسمانی صحت کے حوالے سے ان کے بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں صحت و تعلیم کی صورتحال پر انہماک تشویش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر دیہی سطح پر صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تو خواتین اور بچوں میں شرح اموات کو قابو میں لایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2.1 فیصد شرح پیدائش ہمارے وسائل کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے جسے موثر حکمت عملی کے ذریعے نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو نسل فائرسنس و ٹیکنالوجی کے جیڑمین پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گیلانی نے کہا کہ پاکستان میں بیمار یوں 50 فیصد دباؤ ہماری نامناسب عادات، غیر متحرک طرز زندگی، انڈسٹریلایزیشن، ماحولیاتی آلودگی اور ٹریفک کے اثر دھام کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں جسم کو درکار کیکلوریز کے مقابلہ میں زیادہ کیکلوریز کا لینا، غیر متوازن خوراک، نامناسب طرز زندگی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے جسم کا ہر عضو بری طرح متاثر ہو رہا ہے جو موٹاپے اور دل کے امراض کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ذیابیطس کے دو تہائی مریضوں کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے جبکہ موٹاپے کا شکار لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ترقی پذیر ممالک میں امراض قلب 80 فیصد اموات کے ذمہ دار ہیں لہذا دل کے امراض کا باعث بننے والے عوامل کو زندگی سے نکال باہر کرنے کیلئے طبی سطح پر شعور جا کر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی خوراک کو سادہ اور معمولات کو نیچے کر کے قریب کرنے سے بہت سے امراض سے بچا جاسکتا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی تحقیقی مقالوں کا حوالہ دیتے ہوئے شرکاء پر زور دیا کہ کلونجی اورک، لہسن، ہلدی، میتھی، بادام کو اپنی خوراک کا جز و لازم بنائیں تو بیماریوں کے دباؤ کو بہت حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ ڈین کلیہ سائنسز ڈاکٹر اصغر باجوہ نے کہا کہ دنیا میں 1.1 ارب لوگ موٹاپے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے حملہ کا آسان ہدف بننے جا رہے ہیں لہذا ہمیں اپنے معمولات اور خوراک میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں توانائی کے بحران کی وجہ سے ملک کی شرح نمو 2 فیصد کم ہوئی ہے جبکہ موٹاپے غذائی کمی اور بیماریوں کے دباؤ نے شرح نمو کو 3 فیصد متاثر کیا ہے۔ مالیکیولر کیمزلیب کے انچارج پروفیسر ڈاکٹر عامر جمیل نے کہا کہ انہیں بائیو انفرمیٹکس کی متحرک اور باصلاحیت ٹیم دستیاب ہے جن کی مدد سے لیب کی خدمات کمیونٹی کی سطح پر پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 7 کروڑ آبادی غذائی قلت کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں ایک تہائی بچے وزن کی جبکہ 44 فیصد بچوں کی بڑھوتری ہے جو دکھارہے ہیں لہذا ان کیلئے متوازن اور صحت افزا غذائی کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمپوزیم میں 13 جامعات اور کالج کی ماہرین اور طلبہ شرکت کر رہے ہیں اور موضوع کی مناسبت سے 23 پوسٹر نمائش کیلئے رکھے گئے ہیں۔ پروگرام میں یونیٹ ورلڈ فوڈ پروگرام، پلاننگ کمیشن آف پاکستان ایف اے اوسمیت دوسرے عالمی اداروں کے ماہرین اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔

ساؤتھ سنٹرل یونیورسٹی فاریٹنلئیز چائنہ کے ثقافتی طائفہ کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں چائنیز کلچرل پرفارمنس کا مظاہرہ

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اقبال آڈیٹوریم میں ساؤتھ سنٹرل یونیورسٹی فاریٹنلئیز چائنہ کے ثقافتی طائفہ نے چائنیز کلچرل پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ کیفوش انسٹی ٹیوٹ کے توسط سے منعقد ہونے والے پروگرام میں کلرل چائنہ کے سلوگن سے چائنیز فوک ڈانس، ہارس ہیڈ فیڈل سولو فی میل گروپ ڈانس، جیتھمین فلاؤ، ڈریگن بوٹ میلوڈی پرینی سولو ڈانس، سٹون سٹچو وسوان گروپ ڈانس، پیپا سولو میوزک پرفارمنس، دانی فی میل گروپ ڈانس، مارشل آرٹس پرفارمنس، فیس چیچنگ اوپرا، تھین گروپ ڈانس اور پاکستان کے تمام صوبوں کی نمائندگی پرینی پرفارمنس پیش کی گئی۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے اپنے استقبالیہ خطاب میں چینی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ کیفوش انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ساڑھے پانچ ہزار سے زائد نوجوان طلبہ سٹاف اور شہری چینی زبان کے مختلف مراحل طے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیفوش انسٹی ٹیوٹ کی زیر نگرانی مارشل آرٹس چائنیز آرٹ چائنیز کوکنگ اور دوسرے پروگراموں کو دونوں ممالک کے عوام کی سطح پر



تعلقات کو مزید گہرائی کا باعث قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے مین روڈ پر کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کی نئی عمارت جلد تعمیر کر لی جائے گی جس سے یونیورسٹی میں طلبہ اساتذہ اور شہریوں کو چینی زبان، ثقافت اور کھانوں کے بارے جاننے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کا کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں چینی زبان کے فروغ کیلئے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پاک چین اقتصادی راہ داری اور دوسرے منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کے عوام کے معیار زندگی میں بہتری کی نئی راہیں کھلیں گی۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سپارکو پاکستان کے اشتراک سے ورلڈ سپیس ویک کی تقریبات



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سپارکو پاکستان کے اشتراک سے ورلڈ سپیس ویک کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ تقریب کے پہلے روز واٹر راکٹ اور سائیکلنگ کے مقابلے منعقد ہوئے جن میں شہر بھر سے 21 سکولوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ فارن فیکلٹی سے سٹیٹ کیرڈ پیارٹمنٹ تک ہونے والے سائیکلنگ مقابلوں میں لیبارٹری گرلز ہائی سکول کی طالبات نے حصہ لیا جن میں جنت نے پہلی جبکہ ماریہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈی گراؤنڈ میں واٹر راکٹ اور سائیکلنگ مقابلوں کے مہمان خصوصی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر تھے جنہوں نے سائیکلنگ میں شامل کھلاڑیوں کے ہمراہ سائیکل بھی چلائی۔ سپیس ویک کی مرکزی تقریب اقبال آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی جس میں لیبارٹری سکولز سسٹم کے طلباء و طالبات خلا سے متعلق مختلف ٹیبلوں پر پیش کئے اور واک میں بھی شرکت کی۔ سپیس ویک میں کوارڈینیٹر ڈاکٹر خلیل الرحمن، ڈاکٹر عبدالرشید، ڈاکٹر عبدالنور، سپارکو منیجر عامر علی اور سیف اللہ سپیس ویک کی تقریبات میں اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے خصوصی طور پر شرکت کی۔

جامعہ کے نیویسٹ ہال میں ملک بھر کی جامعات کے زیر تعلیم طلباء و طالبات میں نئے بزنس آئیڈیاز پر مبنی ڈائس ایگریکلچر فوڈ کانفرنس ایونٹ کا انعقاد

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ملک بھر کی جامعات کے زیر تعلیم طلباء و طالبات میں نئے بزنس آئیڈیاز پر مبنی ڈائس ایگریکلچر فوڈ کانفرنس ایونٹ کا انعقاد ہوا۔ ڈائس نمائش میں ملک بھر سے 30 سے زائد جامعات کے طلبہ ڈیڑھ سو بزنس آئیڈیاز کے ساتھ شرکت کی۔ پاکستان میں بیلیجیم کے سفیر مسٹر فریڈریک ورہیڈن نے ایکسپو سینٹر میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر اور ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر کے ہمراہ ڈائس نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں بیلیجیم سفیر نے کہا کہ پاکستان میں ان کا سفارتخانہ آؤٹ ریچ سرگرمیوں کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں میں بیلیجیم کی جامعات کو متعارف کروا رہا ہے اور اس وقت 100 سے زائد پاکستانی طلبہ بیلیجیم کی جامعات میں مختلف ڈگری پروگرامز میں زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بیلیجیم جامعات سے فارغ التحصیل ہونے والے سرکارز کا نیٹ ورک مضبوط

بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے دونوں ممالک کے ادارے مستفید ہو سکیں۔ نیو سینٹ ہال میں ریسرچ کمرشلائزیشن کے حوالے سے بھی خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے کہا کہ ملک کی ایک تہائی



آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے جسے معاشی و کاروباری سرگرمیوں میں شامل کر کے غربت کے خاتمہ کیلئے یونیورسٹی طلبہ کے اچھوتے بزنس آئیڈیاز بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں معاشرتی تبدیلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھوتا آئیڈیاز پورے معاشرے کی تبدیلی کو رواج دے سکتا ہے اور پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ملک ہے جس کی نصف آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہیں تعمیری سرگرمیوں کا حصہ بنا کر پائیدار ترقی کی راہ ہموار کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چند یونیورسٹی ہر سال اوسطاً ایک سو پانچ ڈی سی کالرز پیدا کر رہی ہے جن کی تحقیقات اور آئیڈیاز سے رہنمائی لیتے ہوئے معاشرتی و کاروباری مسائل کو کم کرنے میں مدد ملی جانی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ہمیں اپنے کراپنگ پیٹرن کو از سر نو ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ دیہاتی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو دیہی ترقی کیلئے استعمال میں لانا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورنس کیلئے ضروری ہے کہ تحقیقاتی نتائج اور دلیل کے ساتھ اپنا آئیڈیاز آگے بڑھایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں سائنس دان اور طلبہ معاشرے کے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اپنے علم اور تجربہ کے ساتھ معاشرے کی خدمت کرتے ہوئے اس کا قرض اُتارنا ہے۔ ڈاکٹر حبیب اسلم گابا نے کہا کہ تحقیق اسی صورت میں معاشرے کیلئے مفید ثابت ہو سکتی ہے جب اس کے نتائج اور تجاویز کو قابل عمل صورت میں استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کہ اکیڈمیسا اور انڈسٹری کو قریب کرنے میں وہ خاص کامیاب رہے ہیں اور ڈاکٹر ایونٹ میں ایوان صنعت و تجارت کے ذمہ داران کی شرکت اس بات کا یقین ثبوت ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ اپنے آئیڈیاز کو معاشرے میں موثر انداز میں متعارف کروائیں تبھی اس کے نتائج اور فوائد کھل کر سامنے آئیں گے۔ ڈاکٹر یکٹر اور ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی نے آٹھ سال قبل انٹر پرائیور شپ پر ورکشاپ کا انعقاد کر کے پورے ملک میں اس



نوعیت کا پہلا پروگرام منعقد کر کے اس اہم ترین اقدام کی بنیاد رکھ دی تھی اور آج منعقد ہونے والا ڈاکٹر ایونٹ اپنی نوعیت کا چوتھا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں نوجوانوں کی صورت میں ایک بڑا ذہنی و فکری سرمایہ حاصل ہے جن کے اذہان و قلوب کے آنیوالے نئے آئیڈیاز کو کاروباری سطح تک لیجانا انتہائی اہم پیش رفت ہوگی۔ سپر یونیورسٹی لاہور میں چیئر ٹیلیکوپر یونیورسٹی اینڈ انویشن ڈاکٹر احمد رضا بلال نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ تعلیم کی بنیاد پر معیشت کے خدو خال ترتیب دینے اور پائیدار ترقی کیلئے ضروری ہے کہ اکیڈمیسا انڈسٹری اور حکومت

کی ٹکون موثر انداز میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خوش قسمت ملک ہے جس کی معیشت ایگرو بیسڈ انڈسٹری پر مشتمل ہے تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ اکیڈمیسا اور انڈسٹری کے مابین نفسیاتی ہم آہنگی پیدا کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جائے۔ انہوں نے صداقت گروپ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے طلبہ کیلئے انٹرن شپ کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں جس کے بعد ان میں باصلاحیت نوجوانوں کو پرکشش ملازمت کے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ زریعہ کوریج کمرشلائزیشن کیلئے ایسا ایکوسٹم متعارف کروانا چاہئے جس کے ذریعے نوجوانوں کے بزنس آئیڈیاز کو کاروباری پارٹنرز کی تلاش میں مدد مل سکے۔ تقریب سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر خورشید قریشی ایوان صنعت و تجارت کے صدر شیر حسین چاولہ ڈاکٹر وسیم احمد مسٹر فاروق حسن ڈاکٹر عبدالنور ڈاکٹر عبدالرشید اور ڈاکٹر خرم ضیاء نے بھی خطاب کیا۔

ایگری ٹورازم کلب کے زیر اہتمام پاک امریکہ مرکز اعلیٰ تعلیم (CAS) کے آڈیٹوریم میں پہلی ایگری ٹورازم کانفرنس

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سنیریٹیور آفس میں ایگری ٹورازم کلب کے زیر اہتمام پہلی ایگری ٹورازم کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے کہا کہ شہری عوام کی اکثریت فاسٹ فوڈ، غیر متوازن خوراک اور غیر متحرک طرز زندگی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے لہذا ضروری ہے کہ انہیں شہر کے مضافاتی علاقوں میں موجود کھیت سے سبزیاں، پھل اور دوسری زرعی اجناس کی خریداری کی راہ دکھائی جائے تاکہ ان کے بچوں کو بھی مختلف فصلوں و سبزیوں کی کاشت کے حوالے سے کھیت میں انجام دیئے جانے والے امور سے خاطر خواہ آگاہی



ہو۔ انہوں نے کہا کہ آج کا شکار اپنے کم ہوتے منافع جبکہ صارفین مہنگائی کی شکایت کر رہے ہیں ایسے حالات میں کسان اور صارف کو ایگری ٹورازم کے ذریعے قریب کرنا انتہائی اہم انقلابی قدم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جدید طرز زراعت، برداشت، بینڈ لنگ، سٹوریج و ٹرانسپورٹیشن جیسے شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے لاتعداد مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے بے پناہ امکانات کو بروئے کار

لا کر پھیلوں، سبزیوں اور دوسری زرعی اجناس کی کھیت سے صارف تک پہنچنے کے دوران ضائع ہونے والے 40 فیصد سے زائد شرح کو قابو میں لایا جاسکتا ہے۔ کلیہ ویٹرنری سائنس کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال رندھاوانے کہا کہ یونیورسٹی نے خیالات و آئیڈیاز کے حامل نوجوانوں کو زرعی ٹورازم کا حصہ بنا کر ایک نئی انڈسٹری کی راہ ہموار کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام ایگری ٹورازم کلب کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کے ذریعے زیر تعلیم نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسراء نے نیپال کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں سکول کی سطح پر طلبہ کو پودے لگانے کی عملی تربیت فراہم کی جاتی ہے وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی سکول کے بچوں کو پھل دار اور دوسرے پودے لگانے کا پابند کیا جائے۔ کانفرنس سے ایگری ٹورازم ڈیپلمنٹ کارپوریشن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو مسٹر طارق توہیر اللہ داد خان نے بھی خطاب کیا۔

سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام میں منشیات کی روک تھام پر سیمینار کا انعقاد

سینئر ٹیوٹر آفس، جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے زیر اہتمام منشیات کی روک تھام پر ایک سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے کہا کہ نفسیاتی اُلجھنوں اور خاندانی و معاشرتی دباؤ کو مثبت سوچ، ہمدردی اور بہتر طرز عمل کے ذریعے کم کر کے ہم سینکڑوں افراد کو منشیات کا عادی بنانے سے روک سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے کہا کہ پاکستان میں منشیات کے 75 لاکھ سے زائد عادی افراد موجود ہیں جن میں



وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں نوجوان لڑکپن میں دوسروں کو دیکھ کر منشیات کے عادی بن جاتے ہیں لہذا گھر پر ابتدائی تربیت کے دوران بچوں کو منشیات کے مضرات سے آگاہ کیا جانا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مثبت رویوں سے معاشرے میں خوبصورتیاں پیدا کرتے ہوئے لوگوں کی نفسیاتی اُلجھنوں کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ خاندانی اور معاشرتی دباؤ میں بھی کمی لانا ہے تاکہ ایک شہری پوری توانائی کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مثبت رویے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو برداشت کرنے اور اسکے خیالات و آراء کا بھی احترام کرنا چاہئے تاکہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جن سے مایوسی میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ قدرت نے ہمارے ارد گرد بہت سی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں جنہیں ہم اپنی بے پناہ مصروفیات اور ذہنی و پیشہ وارانہ دباؤ کی وجہ سے نوٹ نہیں کر پاتے۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کیمپس میں سگریٹ نوشی اور فروخت پر عائد پابندی پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث کسی بھی فرد سے کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی۔ نامور معالج ڈاکٹر محمد آصف باجوہ نے کہا کہ ہر چند ملک میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد فیصل آباد کی مجموعی آبادی سے زائد ہے لہذا مناسب ہوگا کہ ان کیلئے علیحدہ شہر آباد کر دیا جائے جہاں ان کے علاج معالجہ، کونسلنگ اور نگرانی کا عمل نسبتاً آسانی سے سرانجام دیا جاسکے گا۔ انہوں نے منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کو دہشت گردوں سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث مکر وہ لوگ کسی طرح بھی دہشت گردوں سے کم نہیں جو معاشرے کو مفلوج کرنے کی اندھی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منشیات کا عادی ایک عام شخص وقت گزرنے کے ساتھ منشیات کا استعمال بتدریج بڑھا کر ہر اپنی رگوں میں اتار رہا ہے جس سے وقت سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کے نوجوانوں میں شیشہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے جس میں ہیروئن کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے لہذا اپنے پیاروں خصوصاً نوجوانوں کی تنہائی کی سرگرمیوں پر خاص طور پر نہ صرف نظر رکھیں بلکہ انہیں مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھتے ہوئے اچھا اور مفید شہری بنائیں۔ سینئر ٹیوٹر ڈاکٹر اطہر جاوید نے کہا کہ یونیورسٹی میں ہر سطح پر منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور کیمپس نیوز سمیت جامعہ کے تمام نمایاں مقامات پر منشیات سے پرہیز کے پیغام آویزاں کئے گئے ہیں۔

تقریب سے ڈاکٹر عاصم عقیل و دیگر نے بھی خطاب کیا۔

ادارہ انٹار میں اینڈومنٹ فنڈ سیکرٹریٹ کے تعاون سے کسان ڈے کا انعقاد



فیصل آباد 28 اکتوبر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ادارہ انٹار میں اینڈومنٹ فنڈ سیکرٹریٹ کے تحت پروجیکٹ (Multiplication of Fig Plantation and Establishment of Fig Orchards in Saline Soil at Proka II) سے زائد انجیر کے پودے مفت تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سعید احمد نے کسانوں اور طلبہ کو انجیر کے بارے آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ انجیر کا پودا پاکستان میں مختلف قسم کی زمین میں کامیابی سے کاشت کیا جاسکتا ہے۔ انجیر کو تازہ پھل اور خشک دونوں طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ پھل غذائی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ادارہ انٹار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے اینڈومنٹ فنڈ سیکرٹریٹ کی مالی معاونت سے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس سے زمیندار حضرات اس پودے کی افادیت، آبپاشی، کھادوں کا استعمال، پیداوار بڑھانے جیسے مسائل سے ہمکنار ہو سکیں گے اور باغبان حضرات اس پودے کو ترویج دے کر اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے۔ مزید برآں انہوں نے پودوں کی تقسیم کے وقت کسانوں اور طلبہ کو انجیر کے طبی فوائد، کاشت، موزوں آب و ہوا، افزائش نسل قلموں کی تیاری، وقت برداشت اور انجیر کو خشک کرنے کے طریقوں سے بھی آگاہ کیا۔

پاکستان سوسائٹی فار ہارٹیکچرل سائنسز کے زیر اہتمام گل داؤدی اور موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاکستان سوسائٹی فار ہارٹیکچرل سائنسز کے زیر اہتمام گل داؤدی اور موسم خزاں کے پھولوں کی تین روزہ نمائش منعقد ہوئی۔ کلیہ زراعت کے وسیع لان میں انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکچرل سائنسز کے نوجوان طلبہ و طالبات اور شہر کے تعلیمی اور صنعتی اداروں کی طرف سے خزاں کے پھولوں کے سائزر لگائے۔ تین روزہ نمائش کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد اولکھ ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکچرل سائنسز ڈاکٹر امان اللہ ملک ڈین امور حیوانات ڈاکٹر سجاد خان ڈین کلیہ فوڈ نیوٹریشن و ہوم سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق بٹ اور آرگنائزر ڈاکٹر افتخار احمد اور انچارج گارڈننگ ڈاکٹر رائے محمد آصف کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر انہما رخیاں کرتے ہوئے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ظفر نے پھولوں کی نمائش کو شہریوں کیلئے تفریح طبع کے خوبصورت موقع سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے صحت مند اور خوبصورت مقابلوں کے ذریعے نوجوانوں میں مسابقت کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی ناہمواریوں کے باوجود مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ میسر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھول اپنے خوبصورت رنگوں اور حسن ترتیب سے دیکھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اپنے غم بھلا کر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھول ہمیشہ اپنے اندر امن، پیار، محبت اور تازگی کا احساس لئے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خزاں میں بھی بہار کا احساس ہوتا ہے۔ نمائش میں گل داؤدی کے ساتھ ساتھ کٹ فلاؤر ہاؤس پلانٹس، لان کی سجاوٹ، پینٹنگ، فوٹو گرافی، فلاؤر اینڈ منٹ، فروٹ و بیج ٹیبل آرٹ کو خوبصورت ترتیب کے ساتھ سجایا گیا تھا۔



انٹرویو:

ڈاکٹر شکیل احمد انجم (اسسٹنٹ پروفیسر)

شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ڈاکٹر شکیل احمد انجم بطور اسسٹنٹ پروفیسر، ڈیپارٹمنٹ آف ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گزشتہ چھ سال سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی، چین سے پی ایچ ڈی کی ڈگری 2011 میں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کے دوران آپ کے غیر ملکی جراند میں 30 سے زائد مقالہ جات شائع ہوئے۔ چین میں آپ نے پانی کی کمی کی صورت میں پیداوار بڑھانے کے مختلف طریقوں پر تحقیق کی۔ وطن واپسی پر زرعی یونیورسٹی میں خدمات سرانجام دینا شروع کیں۔ اب تک 100 سے زائد مقالہ جات شائع کر چکے ہیں۔ مزید برآں آپ کی زیر سرپرستی 25 سے زائد طلبہ ایم ایس سی اور ایک طالب علم پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے جبکہ 10 سے زائد طلبہ آپ کی زیر نگرانی تحقیق میں مصروف ہیں۔ آپ آج کل سٹرپس ایگرونی، فارمنگ سسٹم ریسرچ اور گندم پر تحقیق میں مصروف عمل ہیں۔



سوال: ڈاکٹر صاحب گندم پاکستان کی اہم غذائی جنس ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری اور موزوں وقت کونسا ہوتا ہے؟

جواب: گندم کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری اکتوبر کے وسط سے لے کر نومبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کر لینی چاہیے۔

سوال: آج کل گندم کو کم رقبے میں کاشت کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟

جواب: گندم کو کم رقبے میں کاشت کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں کماد کی برداشت میں تاخیر، چاول کے کاشت والے علاقوں میں زمین کی نمی میں اضافہ اور بارانی علاقے جہاں آبپاشی کم ہوتی ہے ان میں گندم کی بجائے اور فصلوں کو کاشت کیا جاتا ہے۔

سوال: گندم کے بیج کا انتخاب کرتے وقت کوئی خصوصیات کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟

جواب: فصل کا قد، پتے کی ساخت، پتے کا پھیلاؤ، فصل کی کاشت کے وقت اُس کے سٹے کا رنگ، گندم کی فصل کے دانے کا رنگ، سٹے میں دانوں کی اوسط تعداد، ہزار دانوں میں اوسط وزن اور فصل کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کے بیج کا انتخاب کرنا چاہیے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! گندم کی آبپاشی کن کن طریقوں سے کی جاسکتی ہے؟

جواب: گندم کی آبپاشی نہری پانی، ٹیوب ویل کے پانی یا سیلابی پانی سے کی جاسکتی ہے۔ اگر گندم کو پٹریوں پر کاشت کیا جائے تو پچاس فیصد پانی کی بچت کی جاسکتی ہے۔

سوال: پاکستان کے بارانی علاقوں میں گندم کی کاشت کے لیے تجویز کردہ بیج کی اقسام کونسی ہیں؟

جواب: بارانی علاقوں میں گندم کی کاشت کے لیے ہم مختلف اقسام کے بیج استعمال کر سکتے ہیں۔ جن میں چکوال 50، این آر سی (NARC) 2009، بارس 2009، دھرابی 2011، پاکستان 2013، فتح جنگ 2016 اور احسان 2016 شامل ہیں۔

سوال: ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فی ایکڑ گندم کے کھیت میں اوسطاً بیج کتنا استعمال کیا جاسکتا ہے؟

جواب: گندم میں فی ایکڑ اوسطاً بیج 20 نومبر تک بوائی کے لیے 40-50 کلوگرام آبپاش و بارانی علاقوں کے لیے استعمال کیا جائے جبکہ 21 نومبر تا 15 دسمبر تک کاشت کی صورت میں اوسطاً بیج کی مقدار 50-60 کلوگرام تک استعمال کی جاسکتی ہے۔

سوال: یہ بتائیں کہ گندم کا خالص بیج کہاں کہاں سے دستیاب ہے؟

جواب: حکومت پنجاب کا تجویز کردہ بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن کے تمام دفاتر سے حاصل کیا جاسکتا ہے

جو کہ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ منظور شدہ ڈیلروں اور

پرائیویٹ سیلینیٹرز سے بھی بیج حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال: براہ کرم گندم کے بیج کو زہر لگانے کا طریقہ بتائیں؟

جواب: فی کلوگرام گندم کے بیج کے لیے زہری مقدار دو گرام رکھی جائے۔ بیج کو زہر لگانے کا سب سے بہتر طریقہ گھونٹنے والے ڈرم کا استعمال ہے۔ اگر زہر لگانے کے لیے گھونٹنے والا ڈرم دستیاب نہیں تو پلاسٹک کی ایک بوری میں وزن کیا ہوا بیج ڈال کر اس کے مطابق زہر ڈالیں۔ خیال رکھیں کہ بوری آدھی بھری ہوئی ہوتا کہ بوری کو اچھی طرح ہلایا جاسکے تاکہ اس سے بیج کے ہر دانے کو زہر لگ سکے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب جزی بوٹیوں کے کچل کنٹرول سے کیا مراد ہے؟

جواب: جزی بوٹیوں کے کچل کنٹرول سے مراد ہے کہ جزی بوٹیوں کو مخصوص طریقہ کار بذریعہ گوڈی، بارہیر و اور داب سے ختم کیا جائے تاکہ فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

سوال: ہمارے ہاں گندم کو کن کن طریقوں سے کاشت کیا جاسکتا ہے؟

جواب: گندم کو ہم تین طریقوں سے کاشت کر سکتے ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم و تر طریقہ اور اس کے بعد خشک طریقہ کاشت اور گپ چھٹ طریقہ کاشت شامل ہیں۔

سوال: دھان کی کٹائی کے بعد دالے لکھتے ہیں گندم کی کاشت کا طریقہ بتائیں؟

جواب: دھان کی فصل کو برداشت سے 15 روز پہلے پانی لگانا بند کر دینا تاکہ زمین وتر کی اصل حالت میں آجائے اور پھر اس میں گندم کی کاشت کر دیں۔ گندم کی کاشت کے بعد ایک مرتبہ پروٹیناویٹر استعمال کریں یا دو دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں اور اس کے بعد زمین میں ہل کو سہاگہ کی مدد سے چلائیں اور گندم کو ڈرل سے کاشت کر دیں۔ اس کے علاوہ پی سیڈر (Happy Seeder) اور ٹربو سیڈر (Turbo Seeder) زیرو ٹیچ ڈرل کے ذریعے بھی دھان کی کھیت میں گندم کی کاشت کی جاسکتی ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب پٹر پوں گندم کی کاشت کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟

جواب: پٹر پوں پر کاشت کا سب سے بڑا فائدہ توانائی کی بچت ہے، اس سے فصل بھی نہیں گرتی، بہتر پیداوار کے ساتھ ساتھ پچاس فیصد سے زیادہ پانی کی بھی بچت کی جاسکتی ہے۔

سوال: یہ بتائیں کھڑی کپاس میں گندم کی فصل کیسے کاشت کی جاتی ہے؟

جواب: کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت سے پہلے کپاس کی مکمل چٹائی کروالیں اور پھر کھیت کو پانی سے اچھی طرح بھر لیں۔ اگر کھیت میں کھلیاں وغیرہ موجود ہوں تو ان کو بھی اچھی طرح سے پانی سے تر کر لیں۔ اگر زمین میرا ہو تو پانی کھڑا کرنے کے فوراً بعد گندم کے بھگے ہوئے بیج کا چھٹ کر دیں اور اگر زمین سخت ہو تو پانی کو زیادہ دیر تک کھڑا کیے بغیر خشک بیج کا چھٹا کر دیں۔ گندم کا چھٹا دینے کے بعد 30 سے 40 دن بعد کپاس کی چھڑیوں کو کاٹ دینا چاہیے۔

سوال: سر یہ بتائیں کہ کمزور، اوسط اور زرخیز زمین کے لیے کھادوں کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟

جواب: کمزور زمین میں پہلے پانی کے ساتھ دو بوری ڈی اے پی، آدھی بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی ڈالیں۔ دوسرے پانی کے ساتھ صرف ایک بوری یوریا ڈالیں۔ اوسط زمینوں میں پہلے پانی کے ساتھ ڈیڑھ بوری ڈی اے پی، آدھی بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی جبکہ دوسرے پانی کے ساتھ ایک بوری یوریا ڈالیں۔ زرخیز زمینوں میں پہلے پانی کے ساتھ ایک بوری ڈی اے پی، آدھی بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی کی ڈالیں جبکہ دوسرے پانی کے ساتھ صرف آدھی بوری یوریا ڈالیں۔

سوال: یہ بھی بتائیں کہ ترقی پسند کاشتکار حضرات کے لیے فی ایکڑ زمین کے لیے کھادوں کی مقدار کیا رکھیں؟

جواب: ترقی پسند کاشتکار حضرات نانٹروجن 64، فاسفورس 46 اور پوٹاش 25 کلوگرام فی ایکڑ یعنی دو بوری ڈی اے پی، ایک بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی کا استعمال کریں۔

سوال: ڈاکٹر صاحب کھادوں کے انتخاب و استعمال بارے میں بنیادی ہدایات وضاحت کر دیں؟

جواب: کھادوں کے استعمال سے پہلے زمین کا تجزیہ کروایا جانا چاہیے، کھاد خریدنے سے قبل اس کا کوٹنگ ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اسے زمین کی نوعیت کے مطابق استعمال کیا جائے۔

سوال: گندم کی فصل کو پانی کب اور کون سے طریقے سے لگانا چاہیے؟

جواب: گندم میں پانی تین دفعہ لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا پانی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد جبکہ دوسرے پانی کو بوائی کے 80 تا 90 دن بعد (گو بھ کی صورت میں) اور تیسرا پانی دانہ بننے کی ابتدا یعنی 125 تا 130 دن بعد دو دھیا حالت میں لگائیں۔ ہم گندم کو پانی سیلابی آبپاشی کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔

سوال: یہ بتائیں گندم میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے کون سے طریقے ہیں؟

جواب: گندم میں سب سے پہلا اور مفید طریقہ جڑی بوٹیوں کی تلفی کا بارہیرو ہے اس کے بعد ہم جڑی بوٹیوں کو بذریعہ گوڈی بھی ختم کر سکتے ہیں اگر جڑی بوٹیاں ان دونوں طریقوں سے کنٹرول نہ

ہوں تو ہم جڑی بوٹی مارزہریں استعمال کر سکتے ہیں۔

سوال: سر! گندم کے کیڑوں کا انسداد کیسے ممکن ہے؟

جواب: گندم کے کیڑوں کے انسداد کے لیے مناسب زہر کا استعمال کریں۔ کھیتوں میں مفید کیڑوں کی پرورش کے لیے سروسوں کی لائنیں لگائیں۔ اگیتی کاشت کار حجان بڑھائیں نیز پانی کا تیز سپرے والی نالی سے پریشروالی سپرے کریں۔

سوال: گندم میں سست تیلے کا تدارک کیسے کیا جاسکتا ہے؟

جواب: سست تیلے پر کیمیائی سپرے تجویز نہیں کیا جاتا لہذا کسانوں کو چاہیے کہ وہ گندم کی فصل میں سروسوں کی فصل کی تین چار لائنیں لگادیں کیونکہ سروس کے تیلے کا حملہ سروسوں پر گندم کے تیلے سے پہلے ہوتا ہے۔ سروس کے تیلے پر اس کے شکاری کیڑے مثلاً لیڈی برڈ ٹیل، ایور سرفٹ فلائی پرورش پانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی گندم کا سست تیلہ کھیت میں گندم کے پتوں یا سٹوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ فائدہ مند کیڑے تیلے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح گندم کا تیلہ کھیت میں مزید پرورش نہیں پاتا۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! گندم کی بیماریوں کا انسداد کیسے ممکن ہے یہ بتائیں کنگی اور کانگاری کا انسداد کیسے کیا جائے؟

جواب: گندم کی بیماریوں کا انسداد کرنے کے لیے گندم کی فصل کے لیے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سفارش کردہ اقسام استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک کی بجائے مختلف اقسام کے بیج کی کاشت کریں۔ اگیتی کاشت کا انتخاب کیا جائے۔ کنگی کی بیماری کے انسداد کے لیے کنگی کی تمام اقسام کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سفارش کردہ اقسام کی کاشت کریں اور زیادہ رقبہ پر ایک قسم کی بجائے تین چار اقسام کاشت کریں جبکہ فصل کی پختگی کاشت کی بجائے اگیتی کاشت کریں۔ اسی طرح کانگاری کے انسداد کے لیے گندم کی فصل کا بیج تندرسند فصل سے رکھیں اور قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا استعمال کریں۔ کانگاری سے بچنے کے لیے بیج کے ذریعے موزوں بھچھوندی کش زہریں استعمال کریں۔

سوال: گندم کی برداشت کے لیے کوئی موثر طریقہ بتائیں اور یہ بھی وضاحت کریں کہ گندم کی گہائی کیسے کی جائے؟

جواب: گندم کی کٹائی فصل پوری طرح پکنے پر کریں اور فصل کی بروقت سنبھال کے لیے کٹائی کے لیے موزوں اقسام کا کرلین کٹائی کے لیے موسم کا خیال رکھیں بارش کے وقت کٹائی بند کر دیں۔ گندم کی کٹائی کے بعد بھریاں چھوٹی باندھیں اور گندم کے سٹوں کا رخ ایک طرف رکھیں۔ کھلوڑے اونچے کھیتوں میں لگائیں اور ارد گرد پانی کے کٹاس کے لیے نالی بنائی جائے۔ گندم کی گہائی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گندم کے دانے ٹوٹنے نہ پائیں کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانوں پر کیڑوں کا حملہ بہت جلد اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! گندم کے بیج کو ذخیرہ کرنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟

جواب: گندم کے بیج کو ذخیرہ کرنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ سب سے پہلے گندم کی گہائی کرتے وقت خیال کیا جائے کہ دانے ٹوٹنے نہ پائیں اس کے بعد گندم کو گوداموں میں رکھتے وقت نمی کا تناسب 10 فیصد سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ غلہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے نئی بوریوں استعمال کریں بصورت دیگر پرانی بوریوں کو محکمہ زراعت کے عملے سے مشورہ کر کے سفارش کردہ زہر کے محلول سے اچھی طرح سپرے کر کے خشک کر دیں اور گندم سے بھر دیں اور گوداموں میں بوریوں کو ذخیرہ کر لیں۔



انٹرویو: ڈاکٹر عامر شکیل (اسٹنٹ پروفیسر)

شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ڈاکٹر عامر شکیل 14 اپریل 1975ء کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے 1998ء میں بی ایس سی (آنرز) اور 2000ء میں ایم ایس سی (آنرز) کی ڈگریاں اعزاز کے ساتھ حاصل کیں۔ ایم ایس سی (آنرز) میں اول آنے پر یونیورسٹی سلور میڈل کے حقدار ٹھہرے۔ دوران تعلیم یونیورسٹی میرٹ سکالرشپ حاصل کیا۔ 2008ء میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 2001ء میں زرعی کالج ڈیرہ غازی خان سے کیا۔ 2003ء میں شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور لیکچرار تعینات ہوئے اور 2008ء میں ترقی پا کر اسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے ان کے اب تک 48 تحقیقی مقالہ جات قومی و بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اب تک 43 ایم ایس سی (آنرز) اور 2 پی ایچ ڈی سکالرز کی ڈگریوں کی تکمیل اپنی سرپرستی و راہنمائی میں کروا چکے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف کپاس کی کم دورانیے اور کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کی تیاری پر اپنا تحقیقی کام کر رہے ہیں وہ کپاس کی 20 سے زائد خورد و درجگی انواع (Wild Species) کو یونیورسٹی میں لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو کہ مستقبل میں کپاس کی اچھی پیداوار والی اقسام کی تیاری میں استعمال کی جاسکتی ہیں۔



سوال: ڈاکٹر صاحب! پاکستان میں کپاس کی فصل کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟
جواب: پاکستان کپاس پیدا کرنے والے تقریباً 80 ممالک میں سے چوتھے نمبر پر آتا ہے پاکستان کو یہ مقام اس کی اعلیٰ کوالٹی کی کپاس کی وجہ سے بھی حاصل ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ کے بیشتر کسان کپاس کی فصل سے منسلک ہیں کپاس سے نہ صرف لباس اور کپڑے کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں بلکہ اس سے بنا پتی گھی اور موشیوں کے لیے کھل بولہ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی چھڑیاں بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔

سوال: سر! بارانی اور آبپاش علاقوں میں کپاس کی کون کونسی اقسام کاشت کرنی چاہئیں؟
جواب: بارانی علاقوں میں کپاس کی کم پانی والی اقسام کاشت کرنی چاہئیں مثلاً ایف ایچ-326، وی ایچ-327، ایف ایچ-942 وغیرہ جبکہ آبپاش علاقوں میں ایف ایچ-142، ایف ایچ لالہ زار، ایف ایچ-114 وغیرہ۔

سوال: کپاس کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری اور خاصیت کے بارے میں آگاہ فرمائیں؟
جواب: کپاس کے لیے زرخیز مزارع زمین بہتر ہے جس میں نامیاتی مادہ کی خاصی مقدار ہو اور پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔ نیچے تخت تہ نہ ہوتا کہ فالتو پانی نیچے چلا جائے۔ زمین کی تیاری کے لیے پہلے گہرا ہل چلائیں اور اس کی ہمواری کے لیے لیور لیول کریں۔ پچھلی فصل کے باقیات کو روٹا دیٹ یا ڈسک ہیرو سے زمین میں ملا دیا جائے تاکہ نامیاتی مادہ بڑھے اور سنڈیاں بھی تلف ہو جائیں۔ اس کے بعد 3-4 ہل سہاگہ دے کر سیڈ بیڈ تیار کر لیا جائے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! کپاس کا وقت کاشت کیا ہے اور کاشت سے قبل کون سے اقدامات کرنے چاہئیں؟
جواب: اگیتی کاشت یکم اپریل سے 15 اپریل تک اور نارل کاشت یکم مئی تا 15 مئی تک مکمل کر لینی چاہیے۔ کاشت سے پہلے معیاری بیج کا انتظام کریں، بیج کا گاؤ چیک کریں، بیج کو دوائی لگائیں، پچھلی فصل کے باقیات تلف کریں، زمین کا تجزیہ کرائیں اور کھیت کو لیور لیول کر لیں۔

سوال: آج کل کپاس کی کون کونسی بیٹی اور نان بیٹی اقسام کاشت کی جارہی ہیں؟
جواب: کپاس کی اچھی اقسام میں بیٹی اور نان بیٹی دونوں اقسام ہی شامل ہیں۔ بیٹی اقسام میں ایم این ایچ-886، ایف ایچ-لالہ زار، ایف ایچ-142، سی آئی ایم-602، ایف ایچ-326، سی ای ایم بی-33، اے جی سی-999، ایف ایچ-114، آئی یو بی-13، بی ایس-15، بی ایچ-184، ایف ایچ-327 وغیرہ جبکہ نان بیٹی اقسام نیاب-846، نیاب کرن، نیاب-2008، سی آئی ایم-620، سائو-124، ایف ایچ-942 وغیرہ شامل ہیں۔

سوال: کپاس کے لیے تجویز کردہ کھاد اور ان کی مقدار بارے میں آگاہ فرمائیں؟
جواب: عام طور پر بیٹی اقسام کو زیادہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے لہذا 80 کلوگرام نائٹروجن، 40 کلوگرام فاسفورس، 35 کلوگرام پوٹاش فی ایکڑ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ زمین کے تجزیہ سے کھادوں میں کمی بیشی بھی کی جاسکتی ہے۔

سوال: سر! پیسٹ و کاؤٹنگ کیا ہے؟ اور کپاس کے نقصان دہ کیڑے کون سے ہیں؟
جواب: کسی بھی فصل کے کیڑوں یا بیماریوں کی معاشی حد کا تعین کرنے کے لیے فصل کے کھیت کا مختلف حصوں سے معائنہ کو پیسٹ و کاؤٹنگ کہا جاتا ہے۔ کپاس کو دو طرح کے کیڑے نقصان پہنچاتے ہیں۔ رس چوس کیڑے مثلاً سفید مکھی، سبز تیلہ، تقریوس، ڈسکی بگ اور ریڈ کائٹ بگ وغیرہ جبکہ دوسرا گروپ میں ٹینڈے کی سنڈیاں مثلاً امریکن سنڈی، چتکبری سنڈی، گلابی سنڈی اور لشکری سنڈی شامل ہیں۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! کپاس کی بیماریوں کے متعلق بتائیں؟
جواب: پاکستان میں کپاس کی سب سے بڑی بیماری پتہ مروڑ وائرس ہے جس سے پتے کی رگیں موٹی ہو جاتی ہیں، پتے پیالہ نما ہو جاتے ہیں، متاثرہ پتے کے نیچے بھی ایک پتہ نکل آتا ہے جسے اینٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بیماری ٹینڈوں کا گلٹائز نا بھی ہے۔

سوال: جناب یہ بتائیں کہ آپ کپاس کی کاشت کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے کس حد تک مطمئن ہیں اور کیا توقعات رکھتے ہیں؟

جواب: حکومت کو چاہیے کہ کپاس کا سبز شروع ہوتے ہی تمام مداخلتیں کھاد، پانی اور معیاری بیج کی فراہمی کو یقینی بنائے اور سبسڈی دی جائے۔ فصل کی برداشت سے پہلے ہی بنیادی قیمت کا تعین بھی کیا جائے۔

سوال: سر کپاس کی وہ قسم بتائیں جس کی کاشت کے لیے کم سے کم پانی درکار ہوتا ہے؟

جواب: کپاس کی کم پانی لینے والی اقسام میں ایف ایچ-326، وی ایچ-327، آر ایچ-647، ایف ایچ-942 شامل ہیں۔

سوال: کپاس کی کوئی قسم مارچ کے مہینے میں کاشت کرنی چاہیے؟

جواب: پنجاب حکومت نے نیم اپریل سے پہلے کپاس کاشت کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، اس لیے کپاس مارچ میں کاشت نہ کریں۔ کپاس کی اگیتی اقسام کے لیے اگیتی اقسام ہیں جن میں عام طور پر ایف ایچ-نور، ایف ایچ-114، ایف ایچ-لالہ زار، ایف ایچ-142، بی ایس-13 شامل ہیں، ان کو اپریل میں کاشت کریں۔

سوال: کیا بات درست ہے کہ بی ٹی کاٹن انسانی اور زمینی صحت کے لیے خطرناک ہے؟ اگر ہے تو کس طرح؟

جواب: یہ تاثر انتہائی غلط ہے کہ بی ٹی کاٹن انسانی اور زمینی صحت کے لیے خطرہ ہے بی ٹی کاٹن کے علاوہ اور بھی بی ٹی فصلیں مثلاً سویا بین اور مکئی وغیرہ باہر کے ممالک امریکہ میں بھی کاشت ہوتی ہیں جو ہم سے زیادہ صحت کے معاملہ میں فکر مند رہتے ہیں تو اگر کوئی خطرے والی بات ہوتی تو دنیا کیوں اس کے استعمال کی اجازت دیتی۔ کیونکہ یہ سوال بی ٹی بیکٹیریا کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ بی ٹی جین کا Substrate صرف سنڈی کی گٹ میں ہی ہوتا ہے اور صرف سنڈی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا اثیل کھاد اور روئی میں نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال: کپاس کی فصل پر گزشتہ سالوں میں بگ کا بڑا حملہ دیکھا گیا ہے۔ اس کا کوئی موثر طریقہ کار بتائیں جس سے اس مرض سے فصلوں کو بچایا جاسکے؟

جواب: بی بگ کا حملہ عام طور پر مکئیوں میں ہوتا ہے۔ ابتدائی حملہ میں متاثرہ پودوں کو اکھاڑ کر جلا دیں یا دور کہیں بادی جائے۔ میزبان پودوں اور جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جائے۔ کیمیائی کنٹرول خاصا مشکل ہے تاہم صابن / صرف یا تیل کا محلول سپرے کرنے سے مزید پھیلاؤ کو روکا جاسکتا ہے۔

سوال: بی ٹی کاٹن کے اوپر ابھی تک وائٹ فلائی کنٹرول کیوں نہیں کیا جاسکا؟

جواب: وائٹ فلائی کے کنٹرول کو بی ٹی کاٹن سے مشروط کرنا غلط ہے۔ اصل میں جب نان بی ٹی اقسام پر ٹینڈوں کی سنڈیوں کا سپرے کیا جاتا تھا تو اس سے بھی کافی حد تک وائٹ فلائی کنٹرول ہو جاتی تھی جس سے وائٹ فلائی کے علیحدہ سے سپرے کی تعداد کم تھی۔ جبکہ بی ٹی اقسام کے اوپر سنڈیوں کے سپرے نہ ہونے کے برابر ہیں تو وائٹ فلائی کو علیحدہ سے مزید سپرے کر کے کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! کپاس کی فصل کو وائٹس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی بتائیں کہ کپاس کی وائٹس سے پاک وراثی کون کوئی ہیں؟

جواب: وائٹس سے بچاؤ کے لیے

(1) اگیتی کاشت کریں کیونکہ وائٹس کا حملہ چھتیتی کاشت پر زیادہ ہوتا ہے۔

(2) وائٹ فلائی جو وائٹس کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے اس کے کنٹرول کیا جائے

(3) پانی اور کھادوں کا مناسب استعمال کیا جائے تاکہ پودوں کی بڑھوتری جاری رہے

(4) اگیتی اور وائٹس کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام مثلاً ایف ایچ-114، ایف ایچ-نور، ایف ایچ-142، ایم این ایچ-886، ایف ایچ-لالہ زار، بی ایس-13، بی ایس-15 وغیرہ کاشت کریں۔

سوال: سر! کپاس کی بیماری CLCV کا ابھی تک کوئی حل کیوں نہیں نکالا جاسکا؟

جواب: کپاس کی پیدمروڑ (CLCV) بیماری کے بارے میں درست ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی کیمیائی حل نہیں نکلا سکا تاہم جینیاتی سائنس اور شعبہ نسل کشی نباتات کی تحقیق سے اور امور کاشتکاری کے علم سے اس بیماری پر کافی حد تک کنٹرول کیا جا چکا ہے کپاس کی موجودہ پاس ہونے والی اقسام میں وائٹس کے خلاف قوت مدافعت موجود ہے اسی وجہ سے اب فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔

سوال: کپاس پر وائٹس کے حملے کے بعد کیا اقدامات کرنے چاہئیں؟

جواب: وائٹس کے حملہ آور ہونے کے بعد وائٹ فلائی کے کنٹرول پر خصوصی توجہ دیں۔ کھاد اور پانی کا مناسب استعمال کریں تاکہ فصل کی بڑھوتری جاری رہے۔ کھلے ہوئے ٹینڈوں کی چٹائی کی جائے۔ جڑی بوٹیوں کا تدارک کیا جائے۔

سوال: کپاس کی کھیلیوں پر کاشت بہتر ہے یا نہیں؟

جواب: کپاس کی کھیلیوں پر کاشت بہتر ہے اس سے (1) بیج کم استعمال ہوتا ہے (2) پانی کم استعمال ہوتا ہے (3) کلراٹھی زمین میں کھیلیاں انتہائی مفید ہیں، اس پر اگاؤ بہتر ہوتا ہے (4) دیگر امور کاشتکاری میں بھی آسانی رہتی ہے۔

سوال: کپاس پر پہلا سپرے اور پانی کے بارے میں رہنمائی فرمائیں؟

جواب: کھیلیوں پر کاشت کو پہلا پانی 4 سے 7 دن بعد تاہم فلائی ڈرل کاشت کو 30 سے 40 دن بعد پانی دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی زمین اور موسمی حالات کے پیش نظر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ پہلا سپرے عام طور پر سپرے چوس کیڑوں کا ہی ہوتا ہے جو کہ کیڑے کی قسم اور معاشی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔

سوال: کپاس کے معیاری بیج کا انتخاب کیسے کیا جائے اور یہ کیسے دستیاب ہو سکتا ہے اور کپاس کا معیاری بیج کون سا ہے جس کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہو؟

جواب: کپاس کے معیاری بیج کا تعین کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ بیج کی قسم حکومت سے منظور شدہ ہو، بیج محفوظ پیکنگ میں ہو جس پر اگاؤ کی معلومات درج ہوں، بیج کو سیڈ ٹریٹمنٹ دیا گیا ہو اور یہ ضروری ہے کہ یہ بیج کسی مستند ادارے سے خریدا جائے جیسا کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے دفاتر وغیرہ۔

سوال: بی ٹی کپاس پر بھی کیڑے کھڑوں کا حملہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے جس کے متعلق یہ افواہ ہے کہ یہ بی ٹی ہے ہی نہیں۔ جس سے کسانوں اور ملک کا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: بی ٹی کاٹن چونکہ ٹینڈے کی سنڈیوں کے خلاف تیار کی گئی ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس پر سنڈیوں کا حملہ سب سے ہوتا ہی ہیں۔ بی ٹی زہر کا اثر جو ہماری اقسام میں موجود ہے وہ سنڈی کے لاوے / پہلی یا دوسری دور حیات میں تبدیلی کی عمر تک ہی حملہ کی صورت میں با آسانی مار سکتا ہے۔ اگر سنڈی میزبان پودوں یا جڑی بوٹیوں پر پرورش پا کر صحت مند ہونے کے بعد کپاس پر حملہ آور ہوگی تو یقیناً دیر سے مرے گی اور نقصان میں اضافہ کرے گی۔ اس کے علاوہ پودے کی عمر بڑھنے اور درجہ حرارت کے بڑھنے سے بھی بی ٹی زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ لہذا بی ٹی کی کاشت کے بعد سنڈیوں کے معاملہ میں لا پرواہی نہ برتی جائے بلکہ دیگر مور کاشتکاری کو مزید بہتر بنا کر ہی بی ٹی کا اصل پوٹینشل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (باقی صفحہ 12 پر)

گنے کی منافع بخش کاشت

نذر حسین، اطہر جاوید خاں، عمران خان، محمد اعظم، عبدالرحمن شہزاد..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

چینی کی ریکوری زیادہ ہو۔ بیج کا انتخاب ہمیشہ ایک سالہ فصل سے کریں اور کوشش کریں کہ موڈھی فصل سے بیج نہ لیں۔ بیج والی فصل کی عمر 6 سے 8 ماہ کے درمیان ہونی چاہیے۔ گری ہوئی فصل سے بھی بیج نہ لیں بیج والی فصل کیڑوں بیماریوں اور کورے کے مضر اثرات سے محفوظ ہو۔ بہتر اگاؤ کے لیے گنے کا اوپر والا حصہ بیج کے لیے استعمال کیا جائے اس حصے سے دو یا تین آنکھوں والے تقریباً ایک سے ڈیڑھ فٹ لمبے سے بنائیں۔ گنے کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بیج کو کسی زرعی ماہر سے تجویز کردہ پھپھوندی کش زہر کے محلول میں تین سے پانچ منٹ تک بھگو کر کاشت کریں۔

ترقی دادہ اقسام

سی پی 400-77، سی پی 2086-72، سی پی 33-43، سی پی ایف 237، ایچ ایس ایف 240، ایس ی ایف 213، ایس پی ایس جی 26، ایس پی ایف 245، ایس پی ایف 240، ایس پی ایف 245، (ایس پی ایف 234 صرف جنوبی پنجاب کے لیے)

شرح بیج

پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد کے لیے دو آنکھوں والے 28 تا 30 ہزار سے یا تین آنکھوں والے 18 تا 20 ہزار سے فی ایکڑ ڈالنے چاہئیں۔ کاشت میں تاخیر ہونے کی صورت میں بیج کی مقدار میں 20 تا 22 فیصد اضافہ کر لینا چاہیے۔

وقت کاشت

موسم بہار	وسط فروری تا وسط مارچ
موسم خزاں	ستمبر

طریقہ کاشت

i۔ خشک کاشت

یہ طریقہ کاشت زیادہ نمکیات والی یا سخت زمین کے لیے بہتر ہے۔ اس طریقہ میں کاشت کے فوراً بعد پانی لگا دیں اور جیسے ہی کھیت وتر میں آئے سیاڑوں کی دٹوں پر ہل چلا کر سہاگہ پھیر دیں۔ اگر بوائی کے وقت تاخیر ہو جائے یا درجہ حرارت زیادہ ہو تو سہاگہ لگانے سے پہلے ایک ہلکا پانی لگایا جاسکتا ہے اس کے بعد اگاؤ مکمل ہونے پر پانی لگائیں۔

ii۔ وتر کاشت

اس طریقہ کاشت میں کھیت تیار ہونے پر پانی لگائیں اور مناسب وتر آنے پر ہل اور سہاگہ دیں پھر سیاڑوں کا ل کر فوراً بوائی کر دیں سیاڑ بس اتنے گہرے ہوں کہ بیج پردہ سے تین انچ مٹی کی تہہ آجائے سہاگہ لگا کر کھیت کا اگاؤ مکمل ہونے تک کھلا چھوڑ دیں۔

iii۔ گہری کھیلوں پر کاشت

زمین کی تیاری گہرے ہل سے کریں پھر عام ہل چلا کر سہاگہ دیں پھر جر کے ذریعے 8 تا 10 انچ گہری کھیلیاں چار فٹ کے فاصلے پر بنائیں۔ کھیلوں میں پہلے کھاد ڈالیں اور ہلکی مٹی چڑھادیں پھر بیج ڈال کر مٹی کی ہلکی سے تہہ سے ڈھانپ دیں۔ مٹی ڈالنے کے بعد پانی دیں جب کھیلیاں خشک ہونے لگیں تو پانی لگا دیں اس طرح کماد کے اگنے تک حسب ضرورت پانی دیتے رہیں۔ یہ طریقہ کاشت وہاں

پاکستان کی زرعی معیشت اور شکر سازی میں گنے کو اہم مقام حاصل ہے گنا ایک نقد آور فصل ہے۔ کاشتکار کی معاشی بہبود کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے ملک میں گنے کا شمار قہر کے لحاظ سے گندم، کپاس اور چاول کے بعد ہوتا ہے۔ پچھلے چند سالوں کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ملک کی اوسط پیداوار 571 من فی ایکڑ ہے جبکہ پیداواری صلاحیت تقریباً 1400 من فی ایکڑ ہے۔ اس وقت پاکستان میں موجود 84 سے زائد شوگر ملیں کام کر رہی ہیں جن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گنے کی پیداوار میں اضافہ کی اشد ضرورت ہے۔

ہماری گنے کی اقسام آب و ہوا اور زمین بہترین پیداواری صلاحیت رکھتی ہیں۔ گنے کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اہم پیداواری عوامل درج ذیل ہیں۔

i۔ زمین کا صحیح انتخاب اور تیاری

ii۔ ترقی دادہ اقسام

iii۔ شرح بیج، وقت اور طریقہ کاشت

iv۔ کیمیائی کھادوں کا مناسب استعمال

v۔ جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی

vi۔ بروقت آبپاشی

vii۔ گوڈی و تلاء کی کرنا اور مٹی چڑھانا

viii۔ نقصان دہ کیڑے اور ان کا انسداد

ix۔ بروقت برداشت

زمین کا انتخاب اور تیاری

گنے کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے میرا اور بھاری میرا زمین موزوں ہے جس میں پانی کا بہتر نکاس ہو اور نامیاتی مادہ بھی کافی مقدار میں موجود ہو اس کے علاوہ گنا ہلکی اور کمزور زمین میں بھی کامیابی سے کاشت کیا جاسکتا ہے۔ فصل کی غذائی ضروریات کیمیائی کھادوں سے پوری کی جائیں اور نامیاتی مادہ کی کمی کو برکی کھاد یا سبز کھاد سے پوری کی جائے تو بہتر پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔ البتہ سیم و تھور والی زمینوں میں گنا زیادہ عرصہ کامیابی سے کاشت نہیں کیا جاسکتا۔ گنے کی جڑیں زمین کے اندر کافی گہرائی تک جاتی ہیں۔ گنے کی فصل ایک سال تک رہتی ہے لہذا سیم و تھور والی زمین میں کاشت کامیاب نہیں رہتی۔ کاشت سے پہلے اور پچھلی فصل کی برداشت کے بعد روٹا وینر یا ڈسک ہیرو چلا کر فصل کی باقیات کو زمین میں ملا دیں اور پھر 10 تا 12 انچ گہری کھیلوں کے لیے دو مرتبہ کراس چیزل ہل یا ایک مرتبہ مٹی پلٹنے والا ہل ضرور چلائیں۔ زمین کی بہتر تیاری کے لیے ہر تین سال بعد سب سائیکلر بل کا استعمال کریں تاکہ زمین کو زیادہ گہرائی تک تیار کیا جاسکے۔ زمین ہموار کرنے کے بعد کھیلیاں چار فٹ کے فاصلے پر بنانی چاہئیں کیونکہ 4 فٹ کھلے سیاڑوں میں پودوں کو روشنی، ہوا اور غذائیت وافر ملتی ہے۔ ہل تر پھلی یا کلٹیو میٹر سے گوڈی اور مٹی آسانی سے چڑھائی جاسکتی ہے۔

ترقی دادہ اقسام کا معیاری بیج

زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایسی اقسام کا انتخاب کریں جن کی پیداواری صلاحیت اور

اپنائیں جہاں پانی وافر مقدار میں میسر ہو۔

کیمیائی کھادوں کا مناسب استعمال

کھادوں کے منافع بخش اور موثر استعمال کے لیے تجزیہ اراضی کی بنیاد پر کھادوں کا استعمال کریں۔ آپ نے اگر تجزیہ اراضی نہیں کروایا تو درج ذیل سفارشات کے مطابق کیمیائی کھادیں استعمال میں لائیں۔

یوریا کی ایکڑ

زمین	یوریا	ڈی اے پی	ایس او پی
کمزور	4	3	1-1/2
درمیانی	3-1/4	2	1-1/2
زرخیزی	2-1/2	1	1

جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی

جڑی بوٹیاں گنے کی پیداوار میں 10 تا 35 فیصد تک کمی کا باعث بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں گنے کی فصل میں زیادہ آگتی اور پھلتی ہیں اس طرح یہ اصل فصل کے ساتھ زمین سے پانی و اجزائے خوراک اور فضا سے روشنی کے حصول کے لیے مقابلہ کرتی ہیں۔ اس سے نہ صرف پیداوار کم بلکہ گنے کے معیار پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ان کا بروقت تدارک بذریعہ گوڈی یا کیمیائی زہروں سے ان کا خاتمہ بہت موثر طریقہ سے ہوتا ہے۔ پہلی گوڈی کا ویکمل ہونے پر جبکہ دوسری گوڈی ایک ماہ بعد کریں۔ جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے گیزاپیکس کو می 80 ڈیلیو پی ایک سے آدھ کلوگرام فی ایکڑ پہلے یا دوسرے پانی کے بعد وتر حالت میں سپرے کریں یا کرسٹ 75 ڈیلیو جی 400 گرام یا اٹھارٹی 600 فی میٹر 100 سے 120 میٹر فی ایکڑ سپرے کریں کیمیائی سپرے کے بعد 8-10 ہفتے تک گوڈی ہرگز نہ کریں۔

آپاشی

گنے کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے 16 تا 18 مرتبہ آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کم دستیاب ہونے کی صورت میں کماد کی ایک کھیلی چھوڑ کر آپاشی کریں اور آگلی آپاشی صرف چھوٹی ہوئی کھیلیوں کو دیں اس طرح پانی کم استعمال ہوگا اور پیداوار بھی متاثر نہیں ہوگی۔

گوڈی و تلائی

اگاؤ مکمل ہونے پر پہلے یا دوسرے پانی کے بعد ہل، ترپھالی یا کلٹیو میٹر سے گوڈی کریں جبکہ پودوں کے درمیان کسولہ یا کھر پدا استعمال کریں۔ شگو فمکل ہونے تک گوڈی و تلائی کی ضرورت رہتی

ہے جب پودے پھیل کر سیاڑوں کو ڈھانپ لیں تو پھر جڑی بوٹیوں کا اتنا مسئلہ نہیں رہتا۔

نقصان دہ کیڑے

گنے کے نقصان دہ کیڑوں کے موثر انسداد کے لیے کاربوفیوران یا کارشپ زہروں میں سے کوئی ایک دانے دارز ہر کوئیوں میں ایک تا دو مرتبہ مارچ اپریل میں ڈالیں۔

گڑوویں کے حیاتیاتی انسداد کے لیے طفیلی کیڑے ٹرانیکلوگرما کا استعمال کریں اس کے لیے قریبی شوگر ملز کے متعلقہ زرعی ماہرین سے رابطہ کریں جب کیڑے سڈی یا پروانے کی حالت میں ہوں تو کلو رو پائرفاس زہر کا سپرے بحساب 800 ملی لیٹر فی ایکڑ ہوتا ہے۔ گھوڑا کھسی اگست یا نومبر میں زیادہ نقصان کرتی ہے۔ اس کے انسداد کے لیے طفیلی کیڑوں مثلاً اپبی پانی روئیں اور اپبی رائی کہنا کو گنے کے کھیت میں چھوڑ دیں۔

روشنی کے پھندے

گڑوویں کے موثر انسداد کے لیے روشنی کے پھندے بڑے مفید ہیں۔

اہم بیماریاں

گنے کی فصل پر کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں جو اس کی پیداوار میں 15 سے 30 فیصد تک کمی کا سبب بنتی ہیں۔ ان بیماریوں میں رتاروگ، کنگیاری، چوٹی کا سڑن، موزیک اور پوکا پوک پنگ اہم بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے انسداد کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا شت کی جائیں۔

برداشت

کماد کی فصل کاٹنے سے 25 تا 30 دن پہلے آپاشی بند کر دیں تاکہ بڑھوتری کا عمل سست پڑ جائے اور چینی پک کر تیار ہو جائے۔ کماد کی کٹائی گنے کی اقسام اور فصل کے پکنے کو مد نظر رکھ کر کریں۔ گنا سطح زمین سے آدھا تا ایک گہرا کاٹا جائے۔ اس سے زیر زمین پتری آنکھیں زیادہ صحت مند ماحول میں پھوٹی ہیں۔ نیچے کاٹنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مڈھوں میں موجود گڑوویں کی سڈیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ کٹائی کے بعد گنا جلد از جلد مل کو سپائی کر دیا جائے تاکہ فصل کا وزن کم نہ ہو۔

ڈاکٹر نذر حسین خاں شعبہ کاشتکاری نیونگ ایجوکیشن میں بطور لیکچرار تقریباً 11 سال سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے شعبہ پی ایچ ڈی کی ڈگری پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے حاصل کی۔ آپ کی تحقیق کا محور کئی کم پانی میں کاشت ہے۔ آپ کے بے شمار مقالہ جات قومی و بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ 0323-6072744 ، nazapbg@gmail.com

پت جھڑ پھلوں کے باغات کے انتظامی امور

پھل کی برداشت اور بعد از برداشت امور

منڈی میں پھلوں کی مانگ کا انحصار پھل کے سائز، شکل اور رنگت پر ہوتا ہے۔ پھل جب مناسب سائز اور رنگت اختیار کر لے اور ابھی سخت حالت میں ہو تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ برداشت ہمیشہ صبح یا شام کے وقت کریں لیکن برداشت کے دوران پھل پر کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے۔ جیسے ہی پھل برداشت کر لیا جائے تو اس کو سایہ دار جگہ میں رکھیں اور جلد از قریبی فروٹ منڈی میں فروخت کے لیے بھیج دیں۔ پت جھڑ پھلوں کی برداشت اور ان کی زندگی کا انحصار ان کی پختگی پر ہوتا ہے۔ اگر پھلوں کو سنور کرنا مقصود ہو تو انہیں قریب کو لڈ سنور میں مناسب نمی اور درجہ حرارت پر رکھیں۔

بقیہ:

تحفظ نباتات

پت جھڑ پھلدار پودوں کی بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف ایک جامع پروگرام ترتیب دینا چاہیے۔ نقصان دہ کیڑوں میں پھل کی کھسی، تیلہ، دیبک اور مامیٹ زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح اہم بیماریوں میں پتوں کا جھلساؤ اور جڑوں کا گنا شامل ہیں۔ ان بیماریوں کا حملہ اس وقت شدید ہوتا ہے جب درجہ حرارت اور نمی کا تناسب زیادہ ہو۔ ان بیماریوں اور کیڑوں کے تدارک کے لیے ممکنہ زراعت کے مقامی عمل سے مشورہ کر کے موثر دوائی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

مکئی کی فصل کی جڑی بوٹیاں اور ان کا مربوط انسداد

ساجد اسحاق، عمران خان، عمر چٹھہ، شکیل احمد، نجم محمود اقبال..... شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہے۔ گہراہل چلانے سے جڑی بوٹیوں کے بیج گہرے دب جاتے ہیں جس کی بدولت انہیں مناسب ہوا اور روشنی نہ ملنے سے اُگنے کا موقع نہیں ملتا اور اس طرح کافی جڑی بوٹیوں کو انسداد کیا جاسکتا ہے۔

2- فصلوں کا ہیر پھیر

فصلوں کا ادل بدل یا ہیر پھیر جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کھیت میں زیادہ جڑی بوٹیوں کے اُگنے کا اندیشہ ہو وہاں پر کوئی چارہ مثلاً برسم وغیرہ کو کاشت کر کے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ممکن ہے۔

3- کھادوں کا متوازن استعمال

جن کھیتوں میں زیادہ جڑی بوٹیوں کے اُگنے کا اندیشہ ہو وہاں فصل کی بوائی کے وقت ہی کھاد ڈال دی جائے تو فصل جڑی بوٹیوں کو دبا دیتی ہے۔ اگر فصل کا گاؤں زیادہ اچھا ہو تو پہلے 42 سے 46 دنوں کے اندر اندر زیادہ کھادوں کا استعمال کر کے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

4- بروقت کاشت

اگر مکئی کی فصل کو بروقت کاشت کیا جائے تو جڑی بوٹیاں زیادہ حملہ نہیں کرتی اور زہروں کا استعمال کرنے کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے فصل کو لیٹ کاشت کرنے سے فصل کا گاؤں کم اور بڑھوتری ست ہوگی جس کی بدولت جڑی بوٹیاں فصل پر دباؤ ڈال لیتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے فصل کو بروقت کاشت کرنا ضروری ہے۔

کیمیائی طریقہ

کیمیائی طریقے میں دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔

1- اگاؤ سے قبل سپرے

جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے مکئی کی فصل کو کھیلپوں پر کاشت کرنے کے ایک دن بعد وتر حالت میں پرائیمیکسٹر اگولڈ بحساب 400 ملی لٹر یا کلک 600 ملی لٹر یا سپر کس 1000 ملی لٹر فی ایکڑ استعمال کی جائے۔

2- اگاؤ کے بعد سپرے

بھاریہ مکئی سے ڈیلا سمیت ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے فارماسلفیوران 800 ملی لٹر یا نائکو سلفیوران 30 گرام فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کیا جائے۔ سپرے کرتے وقت چند احتیاطیں درج ذیل ہیں:

- ☆ موسم خراب ہونے کی صورت میں سپرے کے عمل کو مؤخر کر دیا جائے۔
- ☆ سپرے دھوپ میں کی جائے جب اوس ختم ہو جائے۔
- ☆ نوکیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے لیے مخصوص زہروں کا استعمال کیا جائے۔
- ☆ ایک ہی جگہ پر دوبارہ سپرے نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی جگہ خالی چھوڑی جائے۔
- ☆ سپرے کے لیے مخصوص نوزل فینٹین پیتل کی نوزل استعمال کی جائے۔
- ☆ سپرے کے لیے پانی 100 تا 120 لیٹر فی ایکڑ استعمال کیا جائے۔

(باقی صفحہ 17 پر)

گندم اور چاول کی فصل کے بعد مکئی سب سے اہم غذائی فصل ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی پہاڑی علاقوں کے باشندوں کی خوراک کا اہم حصہ ہے یہ فصل سطح سمندر سے لے کر میدانی اور پہاڑی علاقوں تک اُگائی جاسکتی ہے۔ مکئی کی فصل وہ واحد فصل ہے جو انسانوں، جانوروں اور پولٹری کی خوراک و توانائی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مکئی کی فصل نے خوردنی تیل کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے اس کی اہم مصنوعات میں نشاستہ، تیل، گلوکوز، کسٹرڈ اور کاربن فلکس وغیرہ شامل ہیں اس وقت دو ہزار سے زائد قسم کی مصنوعات میں استعمال ہو رہی ہے۔

جڑی بوٹیاں مکئی کی فصل کی پیداوار کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جڑی بوٹیاں مکئی کی فصل کی 21 سے 30 فی صد پیداوار کم کر دیتی ہیں کچھ جڑی بوٹیاں مکئی کی فصل میں کیڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بھی بنتی ہیں یہ جڑی بوٹیاں مکئی کے حصے کی خوراک مثلاً روشنی، ہوا، پانی اور کھاد حاصل کر کے مکئی کی فصل کو کمزور کر دیتی ہیں جس کے نتیجے میں پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

بھاریہ مکئی کی فصل کی جڑی بوٹیاں

بھاریہ مکئی کی فصل جنوری اور فروری میں کاشت کی جاتی ہے جس میں بہت سی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔

1- چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں

چوڑے پتوں میں باتھو، کرینڈ، لمبلی، بلی بوٹی، جنگلی بالوں اور جنگلی پاک بھاریہ مکئی کی فصل میں پائی جاتی ہیں۔

2- نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں

نوکیلے پتوں میں ڈمی سٹی، سواکی اور ڈیلا بھاریہ کاشیہ فصل میں پایا جاتا ہے کیونکہ مکئی کی فصل خود نوکیلے پتوں والی فصل ہے اس لیے نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ جڑی بوٹیاں مکئی کی فصل میں زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔

مکئی کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے طریقے

مکئی کی فصل کی جڑی بوٹیوں کو عام طور پر دو طریقوں سے تلف کیا جاسکتا ہے۔

1- غیر کیمیائی یا کاشیہ طریقہ

2- کیمیائی طریقہ یعنی زہروں کا استعمال

غیر کیمیائی یا کاشیہ طریقہ

یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو فصل کی بوائی سے لے کر کٹائی تک جاری رکھا جاتا ہے۔ فصل کی کٹائی کے فوراً بعد جڑی بوٹیوں اور ان کے مٹھوں کو جلانے سے جڑی بوٹیوں کے بیج بھی جل کر ضائع ہو جاتے ہیں جس سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول رکھا جاسکتا ہے۔ کپے ہوئے بیجوں کی جڑی بوٹیاں جانوروں کو بطور چارہ نہ کھلائی جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جانوروں کے گوبر کے ذریعے لاکھوں بیج کھیتوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس میں درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔

1- زمین کی تیاری

بوائی کے وقت زمین کی مناسب تیاری بھی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی

بہاریہ مونگ کی کاشت

شہزاد اسلم، عمران خان، عبدالحجیر، عمر چٹھہ..... شعبہ انگریزی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

آپاشی

آپاشی ہمیشہ سفارش کے مطابق کرنی چاہیے تاکہ فصل میں ایک ہی وقت پر پھول آئیں اور فصل ایک ہی وقت پر پک کر تیار ہو۔ فصل کو پہلا پانی گاؤ کے تین ہفتہ بعد، دوسرا پانی پھول آنے پر اور پھر ایک یا دو پانی حسب ضرورت 2 سے 3 ہفتوں کے بعد پھلیاں بننے وقت دیں۔ بارش ہونے کی صورت میں آپاشی دھیان سے کریں زیادہ بارش کی صورت میں زائد پانی کی نکاسی کا مناسب بندوبست کریں۔

کھادوں کا استعمال

مونگ کو نانٹروجن کھاد کی کم ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوا سے نانٹروجن حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو ٹیکہ لگانے سے مزید بڑھ جاتی ہے البتہ فاسفورس والی کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مونگ کی فصل کو ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی ایکڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں زمین کی اساسیت زیادہ ہو وہاں اڑھائی بوری سنگل سپر فاسفیٹ، ایک بوری امونیوم سلفیٹ اور آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی ایکڑ استعمال کرنی چاہیے۔

بیج کی اقسام

آپاش علاقوں میں نیاب مونگ 2011، نیاب مونگ 2006، ازری مونگ 2006 اور نیاب مونگ 2016 جبکہ بارانی علاقوں میں چکوال ایم۔6 کاشت کی جاتی ہیں۔

جڑی بوٹیوں کی روک تھام

جڑی بوٹیوں کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ کھیت کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے مناسب وقفوں سے ہل چلانا چاہیے تاکہ جڑی بوٹیاں اگنے کے فوراً بعد تلف ہو جائیں۔ وقت پر ہل چلانے سے 50 سے 80 فی صد تک جڑی بوٹیوں کی تلفی ہو جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے بوئی کے فوراً بعد پیڑی میٹھالین بحساب ایک لٹری فی ایکڑ سپرے کریں۔ عموماً 100 سے 150 لٹر پانی فی ایکڑ درکار ہوتا ہے مونگ کی فصل کو نقصان پہنچانے والی جڑی بوٹیاں، مدانہ کھیل، سواکی، چلائی اور ہزار دانہ وغیرہ ہیں۔

برداشت

جب 80 سے 90 فی صد پھلیاں پک جائیں تو فصل کی صبح کے وقت کٹائی کریں اور چھوٹے چھوٹے ڈھیروں میں چند دن کے لیے خشک کرنے کے بعد گہائی کریں۔ کمبائن ہارویسٹر استعمال کرنے سے پہلے فصل کو خشک کرنے اور پتے گرانے کے لیے مناسب کیمیائی زہر کا سپرے محکمہ زراعت ویسٹ وارنگنگ کے عملہ کے مشورہ سے کریں۔ سپرے کے 5-6 دن کے بعد کمبائن ہارویسٹر استعمال کریں۔

غلہ کو محفوظ کرنا

بیج کو محفوظ کرنے سے پہلے اچھی طرح خشک اور صاف کر لیں۔ گرمی کا تناسب 12 فیصد ہواؤں کو گودام میں محفوظ کر لیں اور اگر اس سے زیادہ ہو تو ہواؤں کو زراعت خشک کریں جب تک کہ تناسب 12 فیصد ہو جائے تو اس کو محفوظ کر لیں۔

رہا ہے شعبہ کئی تیار کردہ قسم 896-6 P منظوری کے آخری مراحل میں ہے۔ اس قسم پر رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے یہ قسم مختلف قومی اور علاقائی جانچ کے مراحل مکمل کر چکی ہے اور اس کی پیداوار پنجاب اور سندھ میں پہلے سے کاشت ہونے والی اقسام سے بہت بہتر ہے اس کے علاوہ ہم گرمی برداشت والی اقسام، پانی کی کمی برداشت کرنے والی اقسام، کیڑوں کے خلاف مدافعت رکھنے والی اقسام کی تیاری پر بھی کام کر رہے ہیں۔

دالوں میں مونگ ایک اہم پھلی دار فصل ہے۔ مونگ میں پروٹین کی اوسط مقدار 22 سے 24 فیصد ہوتی ہے جو کہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ مونگ موسم بہار اور خریف میں صوبہ پنجاب اور سندھ میں کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب مونگ پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے اور مونگ کی پیداوار کا 85 فیصد دیتا ہے۔ پنجاب میں مونگ کی کاشت لیہ، بھکر، میانوالی اور راولپنڈی میں ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مونگ کی فی ایکڑ پیداوار جدید زرعی عوامل کو بروئے کار لا کر بڑھائی جائے۔ پاکستان میں مونگ کو پچیس کر آٹا بنایا جاتا ہے اور اس کو سوپ، روٹی اور میٹھی ڈش بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چھلکا الگ کر کے دال کے طور پر پکایا جاتا ہے۔

زمین کا انتخاب اور تیاری

مونگ کی کاشت کے لیے زرخیز میرا زمین جس میں پانی کھڑا نہ ہو زیادہ موزوں ہے لیکن ہلکی ریتیلی اور بھاری میرا زمین میں بھی اس کی کاشت کی جاسکتی ہے البتہ کھراچی زمین کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا ہل اور دو سے تین دفعہ ہل بمعہ ساگہ چلا کر زمین ہموار کریں تاکہ فصل کو یکساں پانی لگ سکے۔

وقت کاشت

بہاریہ مونگ کی کاشت مارچ کے شروع سے لے کر آخر تک کی جاسکتی ہے البتہ مارچ کا دوسرا ہفتہ اس کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔

شرح بیج

8 سے 10 کلوگرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ بیج صاف ستھرا، صحت مند اور بہتر اگاؤ کا حامل ہونا چاہیے تاکہ پودوں کی مطلوبہ تعداد حاصل ہو سکے۔

بیج کو جراثیمی ٹیکہ لگانا

بیج کو جراثیمی ٹیکہ لگا کر کاشت کرنے سے پودے کی ہوا سے نانٹروجن حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ پیداوار میں نہ صرف خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے بلکہ بعد میں کاشت کی جانے والی فصل کو نانٹروجن بھی مہیا ہوتی ہے۔ بیج کو ٹیکہ لگانے کے لیے ایک گلاس (250 ملی لیٹر) پانی میں 50 گرام گڑیا چینی ملا کر شربت کی صورت میں 10 کلوگرام بیج پر چھڑکیں اس میں ٹیکہ کے پیٹ پر درج مطلوبہ مقدار ملا کر ہاتھ سے بیج اور ٹیکہ کو اچھی طرح ملائیں تاکہ ٹیکہ یکساں طور پر بیج کو لگ جائے۔ بیج کو سایہ دار جگہ پر خشک کریں اور پھر جلد کاشت کریں۔ ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکے کی افادیت تدریجاً کم ہو جاتی ہے۔

کاشت کا طریقہ

مونگ کی کاشت ڈرل سے کی جاتی ہے۔ ڈرل کی مدد سے بیج کو 2 سینٹی میٹر گہرائی میں بویا جاتا ہے۔ پودے سے پودے کا فاصلہ 8 تا 10 سینٹی میٹر رکھیں۔ قطار کا دوسری قطار سے فاصلہ 30 سینٹی میٹر رکھیں۔

انٹرویو: ڈاکٹر عامر شکیل، شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

سوال: زرعی یونیورسٹی کی کپاس کے حوالے سے کیا تحقیق ہے اور کسانوں کے لیے نئے بیجوں کی فراہمی یا کپاس کی جدید ضروریات کے لیے کیا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔

جواب: زرعی یونیورسٹی کا شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کپاس کی نئی اقسام کی تیاری پر کام کر

مکئی کی پیداوار میں زنک لائی سین کا کردار

زیراسلم، محمد سعید احمد..... شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تمام مسائل کے حل کے لیے ایگری انومک ریسرچ فارم، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں مختلف قسم کے تجربات کیے گئے ہیں۔ ان تجربات میں مکئی کے پودوں کو مختلف طریقوں سے زنک دیا گیا اور پھر ان کے پودوں پر اثرات دیکھے گئے۔ ایک تجربے میں زنک لائی سین چلیٹ کی مختلف مقدار 0.1 فیصد، 0.5 فیصد، 1.0 فیصد اور 1.5 فیصد کے محلول بنا کر مکلوں میں اگائے گئے دو ہفتوں کے پودوں پر سپرے کیا گیا، دوسرے تجربے میں یہ محلول بنا کر بیج کی پرائمنگ (خاص وقت کے لیے بیج کو زنک لائی سین چلیٹ کے محلول میں کنٹرول حالت میں رکھنا) کی گئی اور تیسرے تجربے میں زمین کے اندر موجود زنک جو عام حالات میں پودوں کو میسر نہیں ہوتی یعنی فکسڈ زنک کو پودوں کے استعمال کے قابل بنانے کے لیے مفید جراثیموں (زنک سیلیولائزنگ بیکٹیریا) کا ٹیکہ تیار کیا گیا اور ان جراثیموں کی کارکردگی کو لیبارٹری میں چیک کیا گیا اور سب سے اچھے نتائج کے حامل جراثیموں کو ٹیکہ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان تمام تجربات کے پیش نظر ہائپر ڈمک کی مجموعی کارکردگی اور بیج میں زنک کے اجزائے جمع ہونے کی شرح کے تجربے کے لیے کھیت میں ایک الگ تجربے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ جس میں بیج کو بوائی سے پہلے زنک لائی سین چلیٹ کی مختلف مقداروں 0.1 فیصد، 0.5 فیصد، 1.0 فیصد اور 1.5 فیصد کے محلول بنا کر بیج کی پرائمنگ کی گئی اور دوسری طرف بیج کے اوپر جراثیمی ٹیکہ لگا دیا گیا۔ اس سے ناصرف مکئی کے بیج کی نمو بہتر ہوئی بلکہ اس سے بیج کا اگاؤ جلدی ہوا اور صحت مند پودے نکلے۔ اس محلول میں موجود لائی سین چونکہ نائٹروجن کا ذریعہ ہوتا ہے اس طرح یہ کیمیکل پودوں کو ضروری اجزاء کی بروقت فراہمی کرتا ہے جس سے مکئی میں ابتدائی طور پر پودوں کو بیماریوں سے بچاؤ اور اے۔ بائیونک سٹریسز کے خلاف مزاحمت ملتی ہے اور فصل کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے تو پودے بیماریوں کے خلاف بہتر رد عمل سرانجام دیتے ہیں۔ یوں تو مکئی کی فصل پر زنک لائی سین چلیٹ کے نمایاں اثرات دیکھے گئے تاہم زنک لائی سین چلیٹ کے لیول 1.5 فیصد کے ساتھ بیج کی پرائمنگ اور جراثیمی ٹیکے کا مجموعی استعمال سب سے مفید ثابت ہوا۔ جس سے ناصرف فصل کی پیداوار بڑھی بلکہ بیج میں زنک کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پودوں کی صحت میں بھی بہتری دیکھی گئی۔ ان تمام تجربات سے پتہ چلا کہ زنک کی کمی سے مکئی کی پیداواری صلاحیت اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت بھی کم ہو جاتی ہے اور مکئی کے پودوں کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے جس سے مکئی کی پیداوار میں کمی اور بیج میں زنک کے ذخیرہ نا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ زنک لائی سین چلیٹ کے ساتھ پرائمنگ سے مکئی کے بیج میں زنک کا ذخیرہ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیج کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے جس سے مجموعی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ جراثیمی ٹیکہ زمین میں زنک کی مقدار کو بڑھا کر پودے کو زنک کی فراہمی آسان کر دیتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں مکئی کے کاشت کاروں کو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ مکئی کی بوائی سے پہلے بیج کی زنک لائی سین چلیٹ کے محلول سے پرائمنگ کے ساتھ جراثیمی ٹیکہ لگایا جائے۔ جس سے مکئی کی پیداوار میں اضافہ اور زنک سے بھرپور مکئی کی پیداوار حاصل ہوگی جو کہ پاکستان میں پائی جانے والی اجزائے صغیرہ بالخصوص زنک کی کمی سے انسانوں اور جانوروں میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو کم کرے گی۔

مکئی کا شمار دنیا کی اہم نقد آور فصلوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں مکئی کی پیداوار کا تقریباً 60 فیصد حصہ پولٹری کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے جبکہ کچھ حصہ دوسری صنعتوں میں بطور خام مال استعمال ہوتا ہے۔ مکئی میں البتہ تیل کم ہوتا ہے لیکن دور حاضر میں مکئی کا تیل نکالا جاتا ہے جو بہت ساری مفید چیزوں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے جبکہ پیداوار کا 5 فیصد حصہ انسانی کھانے کے کام آتا ہے لیکن دنیا کے مختلف ملکوں میں مکئی کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا مکئی کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ پاکستان میں ہائپر ڈمک کی کاشت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ کیونکہ ہائپر ڈمک کی پیداوار عام کاشت ہونے والی دوسری مکئی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ چونکہ دنیا کی آبادی میں روز بروز بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی تناسب سے تمام قدرتی وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں جو کہ آنے والے دور میں آبادی کی ضرورت کے مطابق معیاری اور وافر مقدار میں خوراک اگانا ایک اہم مسئلہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اناج دار (Cereal Crops) فصلوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ البتہ مکئی کی پیداوار باقی اناج والی (Cereal) فصلوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے اور تمام اناج دار فصلوں میں زنک کی کمی پائی جاتی ہے۔ ہماری خوراک کا زیادہ تر حصہ انہی اناج دار فصلوں پر مشتمل ہے جس میں مناسب اجزاء کی کمی پائی جاتی ہے جس سے انسانی زندگی کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ دنیا کے پسماندہ ممالک کی طرح پاکستان میں بھی مال نیوٹریشن (Malnutrition) کا اہم مسئلہ ہے۔ جسکی ایک بڑی وجہ ہماری خوراک میں زنک کی کمی ہے۔ انسانوں میں زنک کی کمی سے چھوٹے بچوں کی شرح اموات میں اضافہ، دماغ اور حاملہ خواتین کے حمل میں پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔ زنک کا شمار پودے کے اجزائے صغیرہ میں ہوتا ہے البتہ زنک پودے کو کم مقدار میں چاہیے لیکن اس کی موجودگی پودے کی نشوونما کے علاوہ مختلف عوامل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مکئی کی کاشت کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے بعد زنک کھاد کا ایک اہم جزو ہے۔ زنک کی کمی یا غیر موجودگی مکئی کی بڑھوتری اور پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ویسے تو زنک کا کردار پودوں میں نہایت اہم ہے لیکن اس کا بنیادی کردار پودے کے فزیالوجیکل پراسسز میں ہے کیونکہ انزائمز کے بناؤ اور فعال لحاظ سے زنک تین سو سے زیادہ انزائمز کا جزو ہے۔ زنک کی کمی سے مکئی کے پودوں کے پتوں پر واضح آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پودوں کے ضیائی تالیف کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ پاکستانی مٹی چوناصفت (Calcareous Soil) ہے اور مٹی کی pH عموماً زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کلر اور سیمتھور کا اہم مسئلہ ہے، نامیاتی مادے کی مقدار بے حد کم ہے، دھان کی کاشت کے لیے کھیت میں لمبے عرصے کے لیے پانی کا کھڑا رکھا جانا وغیرہ اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامل ہمارے ملک کی مٹی میں زنک کی کمی کے اسباب ہیں۔ پاکستانی زمینوں میں زنک کی کمی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ فصلوں کی کاشت کے لیے کاشت کاروں کا زمین میں زنک کا نہ ڈالنا بھی ہے۔ کیونکہ ایک اندازہ کے مطابق صرف 5 فیصد کاشت کار اپنی فصلوں کو زنک کی کھاد دیتے ہیں جبکہ 70 فیصد پاکستانی زمینوں میں زنک کی کمی ہے اور ایسی زمینوں میں مکئی کی کاشت کے لیے زنک کا استعمال اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ان

الحديث:

مسجد میں داخل ہوتے اور دیگر کاموں کے وقت دائیں جانب سے ابتداء کرنا، ابن عمر جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھتے اور جب نکلے تو بایاں پاؤں پہلے نکالتے۔ سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ہو سکتا اپنا ہر کام دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے، طہارت نکالنے اور جوتا پہننے میں۔

دھان کی بھرپور پیداوار

سمیل رشید، شہباز مصطفیٰ..... رائس ریسرچ سٹیشن بہاولنگر

دھان خریف کی ایک اہم نقد آور فصل ہے۔ گندم کے بعد خوردنی اجناس میں دھان کی فصل سب سے زیادہ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ بیرونی ممالک منڈیوں میں پاکستانی چاول کی وسیع مانگ ہے۔ چاول برآمد کرنے والے ممالک میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے۔

دور حاضر میں جس طرح دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور چاول بنیادی غذا کا جزو ہے۔ اس لیے چاول کی مانگ میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور ملکی ضروریات اور غیر ملکی مانگ کو پورا کرنے کے لیے دھان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہے۔

اگر درج ذیل امور پر توجہ دی جائے تو دھان کی فی ایکڑ بھرپور پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔

1- منظور شدہ اقسام

1- موٹی اقسام

اری-6، کے ایس کے 282، نیاب اری-9، کے ایس کے 133، کے ایس کے 434

2- باسقتی اقسام

باسقتی 385، سپر باسقتی، باسقتی 2000، شاہین باسقتی، باسقتی 515، پی ایس-2، پی کے 386،

چناب باسقتی، پنجاب باسقتی، کسان باسقتی

3- ہائبرڈ اقسام

وائی-26، شہنشاہ-2، پرائیڈ-1، انراز-1 سوفٹ

شرح بیج برائے پھیری فی مرلہ

موٹی اقسام $1-1/2$ کلونی مرلہ

باسقتی اقسام 1 کلونی مرلہ

وقت کاشت زمزمی

پھیری 20 مئی سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں۔ اگیتی کاشت کی گئی پھیری پر تنے کی سٹری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ بیماریوں (جراثیمی جھلساؤ، بکائی) کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔

موٹی اقسام پھیری وقت کاشت

20 مئی تا 7 جون

باسقتی اقسام پھیری وقت کاشت

یکم جون تا 20 جون

بیج کو بیماریوں کے خلاف زہر آلود کرنا

دھان کی فصل کو کئی بیماریاں مثلاً پتوں کا بھورا جھلساؤ بکائی وغیرہ زیادہ تر بیج سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پھیری کاشت کرتے وقت بیج کو زہر آلود کرنا بہت ضروری ہے۔ پھیری کاشت کرتے وقت بیج کو ٹائلسن ایم، ڈیرو سال بحساب 3 گرام فی کلون بیج لگائیں۔

زمین کی تیاری

زمین کی تیاری کرتے وقت کھیت کو لیزر لینڈ لیونگ سے ہموار کر لیں۔ پانی کی بھی بچت ہوگی اور فصل بھرپور ہوگی۔ صوبہ پنجاب میں زمین کی تیاری درج ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔

1- تریا کدو کا طریقہ، 2- جزوی ترکدو کا طریقہ، 3- خشک طریقہ

پھیری کی کھیت میں منتقلی

دھان کی اچھی پیداوار کے لیے 25 سے 30 دن کی پھیری منتقل کریں۔ پھیری کی منتقلی کے وقت کھیت بالکل ہموار ہونا چاہیے اور پانی کی گہرائی ایک سے ڈیڑھ انچ ہو۔

پودوں کی مناسب تعداد

دھان کی بھرپور پیداوار کے لیے کھیت میں پودوں کی تعداد پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا پودوں کی مناسب تعداد کے لیے پودوں کا درمیانی فاصلہ 9 انچ رکھیں اور فی سوراخ دو پودے لگائیں جائیں۔ اس طرح ایک ایکڑ میں 80 ہزار سوراخ اور ایک لاکھ 60 ہزار پودے ہو جائیں گے۔

کھادوں کا متناسب استعمال

اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کا متناسب استعمال، صحیح مقدار اور اچھے طریقے سے کھیت میں استعمال بہت ضروری ہے۔

قسم زمین	باسقتی اقسام	موٹی اقسام
درمیانی زمینوں کے لیے	ڈی اے پی= ڈیڑھ بوری	ڈی اے پی= پونے 2 بوری
کھاد (بوریوں میں)	یوریا= پونے 2 بوری	یوریا= سوا 2 بوری
	پوٹاش= ایک بوری	پوٹاش= 1 بوری

فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں زمین کی تیاری کے وقت اور یوریا کھاد ہمیشہ 3 قسطوں میں ڈالیں۔

جڑی بوٹیاں اور ان کی تلفی

دھان کی فصل میں جڑی بوٹیاں بہت زیادہ آگتی ہیں اور پیداوار میں بعض اوقات 50% تک نقصان کر جاتی ہیں۔ لاپ لگانے کے 3 تا 5 دن کے اندر کوئی سا منظور شدہ زہر مثلاً بوٹاکلور یا پریٹیلکلوئر وغیرہ کھڑے پانی میں ڈالیں۔

اگر کسی وجہ سے جڑی بوٹیاں آگ آئیں تو سپر بک سوڈیم تیس دن کے اندر سپرے کر کے کنٹرول کی جاسکتی ہیں۔

دھان کی فصل کے ضرر رساں کیڑے اور ان کا انسداد

دھان کی فصل پر بہت سے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں زیادہ نقصان دینے والے کیڑے درج ذیل ہیں۔

کنٹرول

کیڑے کا نام	نام زہر	تجارتی نام	مقدار فی ایکڑ
دھان کے تنے کی سنڈیاں	کارپس کلورائٹ، تھائیو سیکسوزم + کلورینز انیلی پرول	پاڈان، رام، اہوپو ورناکھ، فرٹیور	9 کلوگرام فی ایکڑ 4 کلوگرام فی ایکڑ
پتہ لپیٹ سنڈی	لمیڈ اسائی ہیلو تھرن	کرائے	160 ملی لیٹر فی ایکڑ
	گیما سائل ہیلو تھرن	پرو ایکسز	100 ملی لیٹر فی ایکڑ
	ڈیلٹا میٹھرن	ڈلیس	160 ملی لیٹر فی ایکڑ

پودے کا تیلہ	تھایا میڈ □ وکسم امیڈ کلکوپرڈ پانی نیٹری زین	ایکٹارا کونفیڈرار چلنیم	24 گرام فی ایکڑ 250 ملی لیٹر 80 گرام فی ایکڑ
--------------	--	-------------------------------	--

بیماریاں اور اُن کا کنٹرول

دھان کی فصل میں درج ذیل اہم بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔

1۔ دھان کا بھبکا (Paddy Blast)

2۔ پتوں کا جراثیمی جھلساؤ (Bacterial Leaf Blight)

3۔ پتوں کا بھورا جھلساؤ (Brown Leaf Spot)

دھان کا بھیکا

یہ بیماری ایک پھپھوندی (Pyricularia Oryzae) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کا حملہ پودے کے پتوں کاغٹوں، مونجہ کی گردن اور دانوں پر ہوتا ہے۔ متاثرہ پتوں پر آنکھ کی شکل کے لمبوترے نشان پڑ جاتے ہیں جو دونوں طرف سے نوکیلے ہوتے ہیں۔ کاغٹوں پر حملہ کی صورت میں ان کے ارد گرد سیاہ نشانات نمودار ہوتے ہیں جو کاغٹوں کو پوری طرح گھیر لیتے ہیں ٹکی گردن پر حملہ کی صورت میں سٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔

موثر کنٹرول کے لیے درج ذیل زہروں میں سے کوئی ایک سپرے کریں۔

نام زہر مقدار زہر (گرام) فی ایکڑ

1-ٹیسو 65 گرام فی ایکڑ

2۔ کاسومن 500 گرام فی ایکڑ

3۔ ڈائی فیفو کونازول 125 ملی لیٹر فی ایکڑ

3۔ ڈائی فیفو کونازول

دھان کے پتوں کا جراثیمی جھلساؤ

یہ بیماری ایک جراثیم (*Xanthomonas compestris* PV *oryzae*) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیماری کے علامات میں پتے کی نوک اور کنارے جھلنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ حملہ کی صورت میں پورا پودا سوکھ جاتا ہے۔

بیماری کے کثرتوں کے لیے کا پر آکسی کلورائیڈ 500 گرام، سلفر 800 گرام فی ایکڑ یا بورڈ وکسچر ((1:1:100 کا سپرے کریں۔

پتوں کا بھورا جھلساؤ

پتوں پر چھوٹے چھوٹے گول یا لمبوترے نشان ظاہر ہوتے ہیں شدید حملہ کی صورت میں دھبوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔

کنٹرول کے لیے نیچے 65 گرام فی ایکڑ، سفر 800 گرام فی ایکڑ سپرے کریں پھیری کاشت کرتے وقت بیج کو پھونڈی کش زہر ٹائپس ایم وغیرہ 30 گرام فی کلو بیج لگائیں۔

فصل کی برداشت

فصل کی کٹائی اُس وقت کریں جب سٹے کے اوپر والے دانے رنگ بدل چکے ہوں۔ فصل کے پکنے کے بعد زیادہ دن تک فصل کو کھڑی نہ رکھیں۔ فصل اُتتی ہی کاٹیں جس کی اچھی طرح پھینڈائی ہو سکے۔ رات کے وقت دانوں کو ترپال یا پراپرل سے ڈھانپ دیں۔ عمدہ کوٹائی کا چاول حاصل کرنے کے لیے پھینڈائی کے فوراً بعد موٹی کچھو طرح پیتے سے خشک کریں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

ترشاہ پھلوں کی دیکھ بھال، غذائی ضروریات، بیماریاں اور ان کا تدارک

لقیہ

انتہائی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اس کے باعث پھلوں کے پتوں کے پچھلی طرف چھوٹے پیلے نارنگی رنگ کے گول مگر ابھرے دھبے واضح نظر آتے ہیں اور جیسے جیسے یہ سائز بڑا ہوتا جاتا ہے یہ دھبے مزید واضح ہو جاتے ہیں۔

۳۔ جڑوں کا گلنا سڑنا

پودوں کا تنے سے گوند نکلنا اور جڑوں کا گلنا سڑنا ترشاوہ پھلوں کی عام بیماریاں ہیں جو کہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں ترشاوہ پھلوں کی یہ بیماریاں کافی حد تک پودوں کو متاثر کرتی ہیں اور ان بیماریاں ہر بروقت قابو نہ بنانے کی صورت میں پودے خراب ہونے لگتے ہیں۔

۴۔ سٹرس میلا نوز

ترشادہ پھلوں کی یہ بیماری پودوں کے پتوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اس بیماری کے باعث پتوں پر پھرورے اور پیلی رنگ کے اور کھردرے دھبے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس بیماری سے متاثرہ شاخیں سوکھ جاتی ہیں۔

بیماریوں کے خاتمے اور ان کا کیمیائی طریقہ تدارک

☆ ترشاوہ پھلوں کے بودے ہر لحاظ سے صحت مند، تندرست اور بیمار یوں سے محفوظ ہوں اور

رجسٹرڈ نرسیوں سے لیے جائیں۔

☆ پودوں کی کاٹ چھانٹ کے دوران صاف ستھرے اوزار استعمال کیے جائیں۔

☆ ترشاوہ باغات میں دوسری کسی بھی فصل کی کاشت نہ کی جائے۔

☆ پھل کی ڈنڈی کے گلنے اور کیڑوں مکوڑوں سے بچاؤ کے لیے ستمبر کے پہلے ہفتے میں تھائیو فینیسیٹ

میٹھائل 2 گرام فی لیٹر پانی کی شرح سے یودوں پر سپرے کیا جائے۔

☆ بیماری کی صورت میں پودوں پر بورڈیکس کچھر (1 فیصد) اور کارپہائیڈروآکسائیڈ 2 سے 5 گرام فی لیٹر پانی کی شرح سے پودوں پر سپرے کیا جائے۔ یہ حفاظتی سپرے پودوں کے لیے بہت موثر رہتا ہے۔

ڈاکٹر رانا محمد عامر تقریباً چار سال سے انسٹیٹیوٹ آف ایگمری ایکسٹینشن اینڈ رورل ڈویلپمنٹ میں بطور اسٹنٹ پروفیسر خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ کی تحقیق کا محور زراعت، تحفظ خوراک ہے۔ آپ کی زیر نگرانی اب تک 30 کے قریب طلبہ ماسٹر ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کے پیشتر اردو اور انگریزی کے مقالہ حیات مختلف جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ 0300-7933058

amiruaf116@gmail.com

الحديث:

عبداللہ خولانیؒ روایت کرتے ہیں حضرت عثمانؓ نے جب مسجد تعمیر کی تو لوگ اس ضمن میں باتیں کرنے لگے انہوں نے کہا تم میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی طرح کا ایک مکان جنت میں بنادیتا ہے۔

چاول کی فصل میں بھورے جھلساؤ کی بیماری کا جائزہ اور طریقہ انسداد

محمد جبران، غلام محی الدین، محمد امجد علی، امجد عباس..... شعبہ پلانٹ پتھالوجی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اہمیت

ص طور پر پوناش کی کمی ہو وہاں اس بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا حملہ پتوں اور دانوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ پتوں پر چھوٹے چھوٹے گول اور بیضی طرح کے دھبے اور نشان ظاہر ہوتے ہیں جن کے کناروں کا رنگ بھورا اور درمیانی حصہ خاکستری ہوتا ہے۔ اگر حملہ شدید ہو تو دھبوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سازگار حالات میں چھوٹے چھوٹے دھبے آپس میں مل جاتے ہیں جو پتے کے بہت سارے حصوں کو خشک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پتے کی خوراک بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ دانوں پر حملے کی صورت میں دھبے قدرے گول اور لمبوترے سیاہی مائل کی شکل کے ہوتے ہیں۔ زیادہ بیماری کے اثر انداز ہونے کے باعث فصل کی پیداوار بڑی طرح متاثر ہوتی ہے۔



چاول کی فصل میں پتوں پر بھورا جھلساؤ

پنجاب کے مختلف ضلعوں میں چاول کی فصل کا جائزہ

چاول کی فصل میں بھورے جھلساؤ کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کے مختلف ضلعوں کا معائنہ کیا گیا۔ جائزہ کے لیے پنجاب کے سب سے زیادہ چاول کاشت کرنے والے ضلعوں کا انتخاب کیا گیا جن میں سیالکوٹ، شیخوپورہ، لاہور، گوجرانوالہ، ڈسکہ، فیصل آباد اور حافظ آباد شامل تھے۔ جائزہ کے لیے ہر ضلع کی پندرہ سے تیس جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ ہر جگہ سے چاول کے بھورے جھلساؤ کے بہت سارے نمونے لیے گئے اور بیماری کے پھیلاؤ اور شدت کا معائنہ کیا گیا۔ پھر ان کو ایک کلیہ کے ذریعے چیک کیا گیا۔ سب سے زیادہ چاول کا بھورا جھلساؤ، بیماری کا پھیلاؤ اور شدت 80 فیصد ضلع شیخوپورہ میں نوٹ کیا گیا جبکہ ضلع لاہور میں 73 فیصد، ضلع فیصل آباد 60 فیصد اور سب سے کم ضلع حافظ آباد سے 57 فیصد نوٹ کیا گیا۔

وجوہات

- ☆ چاول کا بھورا جھلساؤ زیادہ تر کھیت میں پانی، نائٹروجن اور پوناش کی کمی کی وجہ سے آتا ہے۔
- ☆ کم زرخیزی والے کھیت بھی اس بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔

چاول دنیا کی کئی قوموں کا من بھاتا کھانا ہے۔ گندم کے بعد چاول سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل ہے۔ زرمبادلہ کم کرنے کے حوالے سے بھی دنیا کی ایک منافع بخش فصل ہے۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو چاول کی فصل تقریباً 5 ہزار سال پہلے جنوب مشرقی دریاؤں کی وادیوں میں کاشت کی گئی۔ چاول پوری دنیا کے لوگوں کو نا منز، منزلا اور انرجی مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چاول دنیا کے بہت سے ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے سب سے زیادہ چین، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، پاکستان اور آسٹریلیا کے ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے۔ دنیا کا تقریباً 80 سے 90 فیصد چاول ایشیا میں پیدا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 1999ء میں دنیا میں میانمار کے لوگ ایک سال میں سب سے زیادہ چاول کا استعمال کرتے تھے ان کا ایک شخص ایک سال میں 211 کلوگرام چاول کا استعمال کرتا تھا۔ دنیا کے بہت سارے یورپی اور امریکی ممالک میں بھی خوراک کی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کی وجہ سے چاول کا استعمال بڑھ رہا ہے۔

پاکستان میں چاول کی اہمیت

پاکستان میں غذائی ضروریات کے لحاظ سے چاول موسم خریف کی ایک اہم فصل ہے۔ گندم، کپاس اور مکئی کے بعد چاول پاکستان کی چوتھی بڑی فصل ہے۔ پاکستان میں چاول کی صنعت خاص طور پر کسانوں کی آمدنی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک سروے کے مطابق 2013ء میں پاکستان میں 2.31 ملین ہیکٹر رقبہ پر چاول کاشت کیے گئے جس سے 5.54 ملین ٹن پیداوار حاصل ہوئی۔

پاکستان میں چاول ایک اہم اور نقد آور فصل ہے۔ پاکستان خاص طور پر عرب امارات، ایران، سعودی عرب، کینیا، قطر، سری لنکا، افغانستان اور یورپی ممالک کو چاول برآمد کرتا ہے۔ چاول کی فصل پاکستان کے بہت سے علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے لیکن صوبہ پنجاب کے جو علاقے سرفہرست ہیں ان میں ضلع لاہور، قصور، شیخوپورہ، حافظ آباد، گوجرانوالہ، چنیوٹ، فیصل آباد، سرگودھا اور گجرات شامل ہیں۔

بیماریاں

چاول کی فصل بہت ساری حیاتیاتی اور ماحولیاتی کشیدگیوں سے دوچار ہے۔ چاول کی فصل پر بہت ساری بیماریاں حملہ کرتی ہیں ان میں پتوں کا جراثیمی جھلساؤ، چاول کا بھیکا، سنے کی سڑن اور بھورا جھلساؤ شامل ہیں۔ موجودہ دور میں چاول کی فصل کے لیے بھورا جھلساؤ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دنیا میں زیادہ چاول کاشت کرنے والے ملک بھی اس بیماری سے دوچار ہیں جن میں چائینہ، بنگلہ دیش، انڈیا، فلپائن اور پاکستان شامل ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 1942ء میں بنگال میں پڑنے والے قحط کی وجہ چاول کا بھورا جھلساؤ تھی جو 50 سے 90 فیصد نقصان کی وجہ بنی جس کی وجہ سے 20 لاکھ لوگوں کی بھوک کی وجہ سے اموات ہوئیں۔ یہ بیماری چاول کی بڑھتی ہوئی پیداوار کو کم کر رہی ہے۔

علامات

یہ بیماری ایک پھپھوندی کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ بیماری دونوں اقسام باسیتی اوراری پر حملہ آور ہوتی ہے۔ یہ بیماری بیج سے لے کر دانے بننے تک ہر مرحلہ میں آتی ہے۔ وہ زمینیں جہاں غذائیت اور خا

- ☆ چاول کی فصل کو تاخیر سے کاشت (Late sowing) کرنے سے یہ بیماری آتی ہے۔
 - ☆ یہ بیماری خاص طور سے متاثرہ بیج سے ہوتی ہے لیکن اس پھپھوندی کے سپور (Spore) ہوا کے ذریعے بھی پھیلے ہیں۔
 - ☆ جب متاثرہ بیج کو کم ٹمپریچر (18-22 C) پر رویا جاتا ہے تو بیج پر بیماری حملہ کرتی ہے۔
 - ☆ جہاں پر زیادہ بارشیں اور نمی ہوتی ہے وہاں پر چاول کے بھورے جھلساؤ کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔

بیج کا انتخاب

 - ☆ اچھی پیداوار کے لیے ہمیشہ صاف ستھرا اور معیاری بیج کا استعمال کرنا چاہیے۔ بیج پر گھاس پھوس اور بیج کو لٹایا یا پسا ہوا نہ بولہذا بیج حکومت کے رجسٹرڈ اداروں سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ ترقی یافتہ بیج ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ (AARI) فیصل آباد، نیاب (NIAB) فیصل آباد، قومی زرعی تحقیقاتی سنٹر (NARC) اسلام آباد اور پنجاب سیڈ کارپوریشن سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

انسداد

 - ☆ بیمار بیج ہرگز کاشت نہ کریں۔ بیماری سے پاک بیج استعمال کرنا اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا بہترین عمل ہے۔

مکتی کی فصل کی جڑی بوٹیاں اور ان کا مربوط انسداد

- 7- سپرے کرنے والے کی رفتار ایک جیسی ہونی چاہیے۔
- 8- زہرا استعمال کرنے والی بوتل پر لگے لیبل اور ہدایت پر عمل کیا جائے۔
- 9- سپرے کرنے والے کو منہ اور سر پلیٹھ کر سپرے کرنی چاہیے۔
- 10- خالی پیٹھ سپرے نہ کی جائے۔
- 11- چھوٹے بچوں کو سپرے والے رقبے میں نہ جانے دیا جائے۔
- 12- سپرے ہمیشہ مشین کی کیلی بریشن کر کے کریں۔
- <<<<<<<<<>>>>>>>>

گلاب میں مفید معاشی تغیرات کے لیے تابکاری شعاعوں کا استعمال

- رومنا ہوتی ہے جو بعد ازاں مفید تغیرات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تاہم اس طرح کے تغیرات تو ارثی مادہ میں خاص جگہوں پر رومنا ہوتے ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہوتا ہے کہ بعد ازاں پیدا ہونے والے تغیرات مفید یا دیر پا نہ ہوں۔ کیمیائی مادوں سے ہونے والے تغیرات کا پہلے سے اندازہ کرنا ناممکن نہیں ہے۔ جبکہ کیمیائی طریقہ میں پودے کے کیمیائی عناصر تغیرات لانے والے عناصر سے تعامل کر کے تبدیلی کے عمل کو مست کر دیتے ہیں دوم یہ تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتیں۔ جب تابکاری شعاعیں خلیات کے ایسے مجموعہ پر اثر انداز ہوتی ہیں جن میں بڑھوتری کی صلاحیت ہو۔ تابکاری شعاعیں خلیوں کی ایک وسیع مقدار کے علاوہ ایک محدود حصہ پر تبدیلی رومنا ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی جتنے زیادہ خلیوں پر رومنا ہوتی ہیں پودوں میں جسمانی طور پر اتنے ہی زیادہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ سابقہ کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تابکاری شعاعوں کے استعمال میں احتیاط کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تابکاری شعاعوں سے مثبت نتائج کے حصول کے لیے پودوں کی حیاتیاتی، کیمیائی اور طبیعی خصوصیات (پودوں کی بڑھوتری، عمر، تابکاری کا حجم، پودوں میں پانی کی مقدار وغیرہ) اہمیت کی حامل ہیں۔ انہی عناصر کو تابکاری پودوں میں مفید تغیرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودوں میں تابکاری حساسیت تو ارثی مادہ یا زائند تو ارثی عناصر پر منحصر ہے۔ یہ شعاعیں پودوں کی سطح خاص طور پر اگاؤ کے مقامات (شگوفے Buds) کو متاثر کرتی ہیں۔ جس سے کروموسوم کی سطح پر

انار کی پیداواری ٹیکنالوجی

محمد اعظم، محمد اویس، راشد وسم، شرعباس نقوی، نذر حسین، رحمن حیدر، عبدالہادی، عمران خان..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جون/جولائی

ان مہینوں میں گرمی کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپاشی 7 دنوں کے وقفوں سے کریں زیادہ بارشوں کی صورت میں اضافی پانی کھیت سے نکالیں تاکہ کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے حملے سے پودا محفوظ رہے۔ ان مہینوں میں انار کے پودے پر پھول بننے کا مکمل شروع ہوتا ہے۔ پھل بننے تک آپاشی روک دیں کیونکہ اس دوران آپاشی سے پھول گر جاتے ہیں اور پھل کم بنتا ہے۔

اگست

اس مہینے میں پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کے دوران مناسب وقفوں سے آبپاشی کریں۔ بارش کی صورت میں ان وقفوں میں کمی کریں اور اضافی پانی نکال دیں۔ پھل بننے کے بعد کیمیائی کھادوں کا استعمال کریں۔

ستمبر

اس مہینے میں پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ پھل بننے سے برداشت تک زمین کو وتر حالت میں رکھنا چاہیے۔ پھل کو پھنسنے سے بچانے کے لیے کھادوں کا مناسب استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے بوکر ایسڈ بحساب 3.0 فیصد اور پوٹاشیم نائٹریٹ تقریباً 1 فیصد ہرے کریں۔

اکتوبر / نومبر

پھل توڑنے کے بعد ان مہینوں میں بھی مناسب وقفوں سے آبپاشی جاری رکھنی چاہیے۔ غیر ضروری بیمار شاخوں کو کاٹ دیں۔ انار کے تنے کو 30 سے 40 سینٹی میٹر تک بڑھنے دیا جاتا ہے اس کے بعد تین یا چار شاخیں جو تنے پر ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر اور متوازی ہوں کو چھوڑ کر باقی کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ درخت گھٹانہ ہو۔ ٹیٹس ایک یا بورڈر کلچر کا سپرے کریں۔

دسمبر

آپاشی دو ہفتوں کے وقفے سے کریں گو برکی کھاد زمین تیار کر کے اس میں ڈالیں۔ پچھلے سال لگائی گئی قلمیں کھیت میں منتقل کریں۔

روزانہ کی بنیاد پر پودوں کی دیکھ بھال کی جائے اور کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کی صورت میں سفارش کردہ ادویات استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے کلورہ پائیز فاس 2.5 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر سپرے کریں۔

1۔ انار کا پیروانہ اور انار کی تتلی

انسداد: فالیڈال، ہائبریفاس

2۔ تنے کی سنڈیاں

انسداد: تھائیوڈائن 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔

3۔ پھل کی مکھی

انسداد: ڈیڑیکس 100 گرام 100 لٹریانی میں ملا کر سپرے کریں۔

4۔ ملی گ

ساہیہ میٹھرین گروپ کی کوئی ایک زہر 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

انار ایک پت جھڑ درمیانے قد کا جھاڑی نما پودا ہے۔ اس کا آبائی وطن ایران ہے۔ اس کی کاشت افغانستان، مراکش، سعودی عرب، بھارت، شام، فلسطین، شمالی افریقہ، چین، یونان، ٹلی اور امریکہ میں کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کا زیر کاشت رقبہ 11153 ہیکٹر ز اور سالانہ پیداوار 45318 ٹن ہے۔ انار کی کاشت زیادہ تر والائی، قلات، ملتان، بہاولپور، لیاقت پور، ڈیر اسماعیل خاں اور مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں کی جاتی ہے جبکہ کچھ، مری اور ایب آباد میں انار خودرو ہے جس سے انار دانہ بنایا جاتا ہے۔ انار کی کاشت کے لیے سرد آب و ہوا سے لیکر معتدل اور گرم آب و ہوا بھی مناسب ہے۔ مگر اعلیٰ کوالٹی کے لیے سرما میں سرد خشک جبکہ موسم گرما میں خشک موسم درکار ہوتا ہے۔ انار کے پودے کافی حد تک گرمی اور سردی برداشت کر سکتے ہیں۔ گردن اور رات کے درجہ حرارت میں تبدیلی اور بارش کے باعث پھل پھٹ جاتا ہے۔ اس کی کاشت مختلف زمینوں میں کی جاسکتی ہے لیکن اچھے نکاس والی زمین اس کی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ سیم وٹھور والی زمین پر اس کی کاشت نہیں ہو سکی۔ انار کی افزائش نسل، بیج، قلم اور داب سے کی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر بذریعہ قلم پودے تیار کیے جاتے ہیں۔ قلم ایک سال کی شاخ سے حاصل کی جاتی ہے قلم کی لمبائی 20-22 سینٹی میٹر اور موٹائی پنسل کے برابر ہونی چاہیے۔ انار کے بانغات سے اچھی پیداوار اور کوٹائی حاصل کرنے کے لیے بانغات کی کاشت اور اہم امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انار کے بانغات کے لیے سالانہ کیلنڈر ترتیب دیا گیا ہے۔

جنوری

زمین کی خوب تیاری کے بعد قلمیں اس طرح لگائیں کہ 2/3 حصہ زمین میں اور 1/4 حصہ زمین کے باہر رکھیں۔ اوپر والے حصے میں تقریباً 4-3 چشمے ہونے چاہئیں۔ قلمیں لگانے کے بعد زمین کی ضرورت کے مطابق آبپاشی کریں۔ میرا زمین انار کی کاشت کے لیے موزوں تصور کی جاتی ہے۔ آبپاشی 10-14 دنوں کے وقفے سے کریں۔

فروری

انار کی قلمیں لگانے کے لیے یہ مہینہ بھی موزوں ہے۔ انار کے پودے مربع نما طریقے میں لگائیں۔ لائن سے لائن کا فاصلہ 12 سے 14 فٹ رکھیں۔ اس طرح ایک ایکڑ میں 222 سے 302 پودے لگائے جاسکتے ہیں۔ سرد مقامات پر قلموں کی منتقلی اسی مہینے میں کی جاتی ہے۔ نوعمر پودوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے انتظام کریں اور 15 دن کے بعد موسوم کو نظر رکھتے ہوئے آبپاشی کریں۔

مارچ

مارچ میں سردی کی شدت میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ اپنی 15 دن کے وقفے سے جاری رکھیں۔ آب و ہوا اور زمین کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان وقفوں میں کمی پیش کریں۔ یوریا کا کھانا اور ڈی اے بی کا استعمال پودوں کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے۔

اپریل/مئی

پودوں کو گرمی سے بچانے کا انتظام کرنے کے ساتھ 1 ہفتے کے وقفے سے آبیاری کریں۔ پودے کی دیکھ بھال کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو ختم کریں اور پیار، مچھائی ہوئی اور غیر ضروری شاخوں کو کاٹیں۔ کھادوں کی دوسری مقدار 1/2 حصہ پودوں کو ڈالیں۔

پیتا کی پیداواری ٹیکنالوجی

محمد رضوان، صدقہ خالد، شمن میراں..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

☆ اکٹھا کرنے کے بعد دو چار دن کے اندر اندر کاشت کر دیا جائے۔ زیادہ دنوں تک پڑا رہے تو اس کا کاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔

☆ ایک سے دو میٹر لمبی اور ایک میٹر چوڑی کیاریوں میں چھ چھانچ کے فاصلے پر قطاروں میں کاشت کر کے اوپر گلاسز کو برڈال دیا جائے۔

☆ پودوں کا فاصلہ ایک ایک انچ ہونا چاہیے۔ بجائی کر کے پانی لگا دیا جائے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر پودے اگ آتے ہیں۔

☆ جب پودوں کا قد تقریباً ایک فٹ ہو جائے تو گاچی نکال کر ان کو باغ میں منتقل کر دیا جائے۔

☆ مارچ کے شروع میں منتقل شدہ پودے بہتر نشوونما کرتے ہیں۔ پیتے کا پودا شدید گرمی اور سردی سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے پودوں کو شدید سردی سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ باغ کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ منتقل کرتے وقت گڑھوں میں کاربو فیوران ڈالی جائے۔ اسے کیڑوں جڑی بوٹیوں اور جانوروں سے بچایا جائے۔

☆ پودوں کی تعداد ایک ایکڑ میں ایک ہزار پودے ہوں تو بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

☆ آٹھ آٹھ فٹ کے فاصلے پر کاشت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

☆ پیتے کے زراور مادہ پودے الگ الگ ہوتے ہیں۔ زسری میں زراور مادہ پودوں کی پہچان کافی مشکل ہوتی ہے اس لیے منتقل کرتے وقت ہر جگہ دو دو یا تین تین پودے لگا دیے جائیں۔

☆ پھول ظاہر ہونے پر ضرورت سے زیادہ زراور پودے کاٹ دیے جائیں۔ اس کی بارآوری کا عمل کیڑوں اور ہوا کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ باغ میں زراور مادہ پودوں کی تعداد نصف نصف ہو تو زیادہ پھل لگتا ہے لیکن حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ زراور پودوں کی تعداد مادہ پودوں سے نصف بھی ہو تو بہتر پیداوار دستیاب ہو جاتی ہے۔

☆ پودوں اور قطاروں کا فاصلہ پانچ پانچ فٹ رکھا جائے۔

☆ پیتا تیز بڑھوتری والا پودا ہے اسی وجہ سے تیزی سے خوراک جذب کرتا ہے۔ ہر جوان پودے کو سردیوں میں تین کلو گرام گوہر کی کھاد کے ساتھ ایک ایک پاؤ ڈی اے پی اور اتنی ہی ایس او پی ڈال کر زمین میں ملا دی جائے۔ پھل لگ جانے کے بعد یوریا کھاد دو سو گرام فی پودا ڈال کر آبپاشی کر دی جائے۔ مجموعی طور پر دو ڈی اے پی دو یوریا اور دو ایس او پی استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

برداشت

مارچ میں منتقل شدہ باغ کو پہلے سال ہی جولائی اگست میں پھل لگ جاتا ہے۔ یہ پھل دسمبر میں پک جاتا ہے۔ اگست میں زیادہ پھل لگتے ہیں جبکہ باقی مہینوں کے دوران بہت کم پھل لگتے ہیں۔ اپریل سے جون تک پھل پکتا رہتا ہے۔ جب پھل پر زرد رنگ کی دھاریاں ظاہر ہو جائیں اور ناخن چھونے پر دو دھیا مادہ نکلنے کی بجائے پانی جیسا مادہ نکلے تو مزید چار پانچ دن بعد چنائی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چنائی کے تین چار دن بعد پھل پوری طرح پک جاتا ہے۔ سارے پھل ایک ہی بار نہیں پکتے بلکہ پھل پکنے کا عمل تین مہینے تک جاری رہتا ہے۔ ایک سال بعد تھوڑا بہت پھل لگتا ہے لیکن دوسرے سے چوتھے سال تک زیادہ پھل پیدا کرتا ہے۔ پانچ سال بعد پیداوار کم ہو جاتی ہے اس لیے کم پیداوار دینے

اس کی تاثیر گرم تر ہے۔ یہ وٹامن اے کا ماخذ ہے۔ دائمی قبض مقوی مدافعت اور زخموں کو جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ خونی بواسیر کی بیماری میں اس کی جڑیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک ادویاتی پھل ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹنگ کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سبزی کی سبزی اور پھل کا پھل ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے B-carotene اور آئرن کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ پیتے میں سکروز 48.3 فیصد، 29.8 فیصد گلوکوز اور فکٹوز 21.9 فیصد پایا جاتا ہے۔

انٹی آکسیڈینٹ، اسکاربک ایسڈ اور معدنیات کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ پیتا کاسمیک انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیتا کا سفید گودا پمپل (Pimples) اور جھریوں (Wrinkles) کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیتا ایک اچھے پلیننگ ایجنٹ (Bleaching Agent) کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیتا گوشت ٹینڈر ز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

اقسام

پیتے کی اقسام میں ریڈ لیڈی، سولہنی ڈیوڈ انگلین بلیو سٹیم اور سی او-6 وغیرہ شامل ہیں۔ پنجاب کے لیے چھوٹے قد والی ریڈ لیڈی بہتر قسم ہے۔

آب و ہوا

بنیادی طور پر گرم مرطوب استوائی خطے کا پھل ہے۔ زیادہ تر امریکہ میں کاشت کیا جاتا ہے لیکن اسے پنجاب میں بھی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ کھر سے پاک ایسی گرم اور مرطوب آب و ہوا جہاں گرمی کا عرصہ زیادہ اور سردی کا عرصہ کم ہو وہاں پیتا بہتر پیداوار دیتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 39 درجے سے زیادہ اور سردیوں میں 6 سینٹی گریڈ سے کم نہ ہو تو پیتا کامیابی سے اگایا جاسکتا ہے۔ پھول آوری کے دوران بارش بادل اور تیز ہوا مضر ثابت ہوتے ہیں۔ شدید آندھی فصل کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔

موزوں زمین اور علاقے

درمیانی اور ہلکی میرا زمین جس کا تعامل آٹھ درجے سے کم ہو پیتا کا باغ لگانے کے لیے بہتر ہے۔ ایسی زمین میں کاشت کیا جائے جہاں سے بارش کا فالتو پانی جلدی سے نکالا جاسکے۔ نشیبی زمین میں کاشت نہ کیا جائے۔ سخت تہ (Hard pan) سے پاک ہوا دار اور اچھے نکاس والی زمین میں اس سے بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ کلراٹھی چکنی بھاری میرا زمینوں میں اسکی بڑھوتری کی رفتار کم ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے باغات وسطی پنجاب میں بھی موجود ہیں لیکن ان کی پیداواری صلاحیت مرکزی علاقے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

پیتا پیدا کرنے والے اہم ممالک میں امریکا، ملائیشیا، جزائر، ہوائی، بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائی لینڈ اور فلپائن وغیرہ شامل ہیں۔

پیتے کا باغ لگانا پیتے کی زسری خود بھی اگائی جاسکتی ہے۔ غیر تجربہ کار آدمی کو چاہیے کہ تیار زسری منتقل کر لے۔

پیتا کا باغ لگانے کے لیے درج ذیل تجاویز پر عمل کریں۔

☆ زسری پیتے کو بیج کے ذریعے کاشت کریں۔

☆ اپریل مئی یا اگست ستمبر کے دوران پکے ہوئے پھل سے بیج اکٹھا کر لیا جائے۔

ہیں۔ بیمار یوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ نرسری اور پیوند کاری کی عمر سے لے کر جوان ہونے تک مسلسل مربوط کوشش کی جائے۔ مربوط کوشش کے سلسلے میں زمین اور علاقے کی مناسبت سے موزوں نسل کی صحت مند نرسری تیار کی جائے۔

کیڑے اور ان کا انسداد

اگرچہ پیسٹے پر کیڑوں کا شدید حملہ نہیں ہوتا لیکن گرمیوں میں سفید مکھی اور لشکری سنڈی حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے پائری پروکسی فن اور پیر فیزین یا پائری پروکسی فن اور مونو مینو ملا کر سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

جڑی بوٹیاں

پیسٹے کے باغات میں کھیل، سواگی، لمب گھاس، چولائی، مکو، جنگلی ہالوں وغیرہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ باغات سے جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے لیے درج ذیل تدابیر اختیار کرنے کی سفارش کی جاتی ہے

i- غیر کیمیائی طریقہ

جڑی بوٹیوں کی تلی کے لیے گہرا بل چلانے سے گریز کیا جائے۔ روٹاویٹر بھی زیادہ گہرائی تک نہ چلایا جائے۔ سردیوں میں فاسفورس پوناش اور گو بر کی کھاد ملائے وقت بھی جڑوں کو کم سے کم زخمی کیا جائے۔

ii- راوند اپ یا گلابی فوسٹ

اگر نظر انداز ہونے کی وجہ سے باغ میں جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو جائیں تو راوند اپ یا گلابی فوسٹ زہریلی استعمال کی جائے۔ گلابی فوسٹ جڑی بوٹیوں اور موسمی حالات کی مناسبت سے 25 تا 30 ملی لٹر یا گرامکسون یا پیراکوٹ 10 تا 15 ملی لٹر فی پانی میں ملا کر سپرے کی جاسکتی ہے۔

والے پودے اکھاڑ کر نئے پودے لگانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جوان پیٹنا سالانہ 40 تا 50 پھل پیدا کرتا ہے۔ پہلے سال تیس چالیس کلو گرام دوسرے سال من تیسرے سال 3 تا 4 من فی پودا پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔

پیداواری اخراجات اور آمدن

پہلے سال تو اخراجات اور آمدن برابر رہتے ہیں لیکن دو سال کے باغ میں سے ایک ایکڑ پیٹنا پیدا کرنے کے لیے 40 ہزار روپے خرچ آتے ہیں۔ ایک ہزار من فی ایکڑ پیسٹے سے 8 تا 10 لاکھ روپے کمائے جاسکتے ہیں۔

باغ میں فصل کاری

پیسٹے کے باغات میں پہلے سال مختلف سبزیات (پھول گوہی، بند گوہی، آلو، بیٹنگن، کدو اور ٹینڈا وغیرہ) تیل دار جناس میں کیٹولا دالیں (موبگ، ماش) کاشت کی جاسکتی ہیں۔ اس کی بڑھوتری کافی تیز ہوتی ہے اس لیے ایک سال بعد اس میں فصل کاری نہ کی جائے۔

آپاشی

جوان پودوں کو آب و ہوا کی مناسبت سے سال میں 12 تا 16 مرتبہ آپاشی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر کھیت میں پانی کھڑا رہے تو تنے کی سڑاندگی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ پانی تنے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔

بیماریاں اور ان کا انسداد

اہم بیماریوں میں چارکول راث کوڑھ یا ہینٹر کینوز تنے وائرس اور پھل کی سڑاندگی وغیرہ شامل

بقیہ:

بھیر بکریوں کا انتخاب اور خرید

انہیں بھی ریوڑ سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ ایسے جانور جو ست اور لاغر ہوں اور جن کی بڑھوتری کی شرح کم ہو یا جو مادہ جانور بانجھ اور زیادہ عمر کی ہوں انہیں چھانٹی کر کے ریوڑ سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ ایسی مادہ جن کا حیوان خراب ہو، جو حمل گرا دیتی ہوں یا دیر سے جوان ہوں یا بچہ دینے کے بعد 6 ماہ تک حاملہ نہ ہو، جن میں جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح کم ہوں انہیں گلہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جانوروں میں چھانٹی کی شرح جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی فارم کے جانوروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔

ڈاکٹر محمد قمر بلال (ایسوی ایٹ پروفیسر) شعبہ اینمل وڈیری سائنسز میں تدریس و تحقیق کے ساتھ ساتھ آج کل ایڈیٹر زرعی ڈائجسٹ کے فرائض بھی سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے پی ایچ ڈی لائیو سٹاک مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے لاتعداد مضامین قومی و بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔

drqamarbilal@gmail.com، 0300-7677557

ناکارہ جانوروں کی چھانٹی

کسی بھی فارم کی کامیابی کا انحصار اس فارم پر موجود بہتر صلاحیتوں کی حامل بھیر بکریوں پر ہے۔ اگر بچوں کی پیداواری صلاحیت اپنی ماؤں سے کم ہے تو اس کا مطلب کہ زچس کی یہ اولاد ہیں اچھی خصوصیات کا حامل نہیں ایسے زکوریوڑ سے نکال دینا چاہیے۔ زچانور کا انتخاب اس بنا پر کریں کہ اس کی ماں کی پیداواری صلاحیت ریوڑ کی اوسط پیداوار سے بہتر ہو۔ اسی طرح وہ مادہ جن کی پیداوار گلہ کی اوسط پیداوار سے کم ہو

بقیہ:

پولٹری ہاؤس کے لیے گرم موسم کے انتظامات

پانی کے پائپ کو کبھی بھی چھت اور دیواروں کے ساتھ نہ لگائیں تاکہ وہ چھت اور دیواروں سے حرارت جذب نہ کریں اور اگر پائپ میں پانی گرم ہو تو اسکو صاف کر کے تازہ پانی فراہم کیا جائے۔ ہاؤس کی چھت کو پچکدار بنایا جائے تاکہ وہ سورج کی شعاعوں کو جذب نہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چھتوں کو متواتر صاف کیا جائے اور ممکن ہو تو اس پر رنگ کر دیا جائے۔

ہاؤس کے پنکھوں کو متواتر دیکھا جائے۔ ان پر موجود مٹی کو صاف کیا جائے، انکی پٹی اور پروں کو دیکھا جائے اور پنکھوں کے کام کرنے کی صلاحیت چیک کی جائے۔ اسی طرح اس پر موجود مٹی کو صاف کیا جائے۔ پرندوں کو 24 گھنٹے صاف اور ٹھنڈا پانی مہیا کیا جائے اور یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم پانی میں نمکیات ڈال کر پرندوں کو پلائیں۔ کیونکہ گرم موسم میں پرندے اپنے جسم سے بہت زیادہ نمکیات نکال دیتے ہیں۔

نمائشی پودوں پر طفیلی خسیوں کے اثرات اور ان کا موثر تدارک

محمد جبران، محمد امجد علی، امجد عباس..... شعبہ پلانٹ پتھالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اور یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ فصلیں جڑی بوٹیوں سے پاک ہوں۔ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا استعمال کرنے سے خسیوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے۔ پودوں کو لگاتار دو سے تین ہفتے زیادہ مقدار میں پانی دینے سے بھی طفیلی خسیوں میں خاطر خواہ کمی آتی ہے۔

قدرتی انسداد

مختلف قسم کے نامیاتی مرکبات اور گو بر کی کھاد استعمال کرنے سے طفیلی خسیوں کی افزائش کو روکا جاسکتا ہے۔ اگر گو بر کے مواد میں خاص قسم کے پھپھوندی اور بیکٹیریا موجود ہوں تو وہ خسیوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ پودوں کے بجائے لیے پودوں کے ارد گرد مخصوص فصلوں کو لگانے سے طفیلی خسیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سرسوں، تل اور مولیٰ کی فصلیں شامل ہیں ان فصلوں سے کچھ ایسے مرکبات خارج ہوتے ہیں جو خسیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔

کیمیائی تدارک

کیمیائی تدارک میں دھونی اور Carbamates کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ زمین میں طفیلی خسیوں کی بڑھوتری کے عمل کو روکتا ہے۔ طفیلی خسیوں کو ختم کرنے کے لیے زہریلی ادویات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔

حیاتیاتی تدارک

حیاتیاتی تدارک میں سب سے مفید جڑوں کی پھپھوندی ہے۔ جڑوں کی پھپھوندی ایسی پھپھوندی ہے جو کہ پودوں کی جڑوں کے ساتھ باہمی اشتراک بناتی ہے جس کی وجہ سے پودے اور پھپھوندی دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حیاتیاتی تدارک میں پودوں پر مخصوص قسم کے داخلی بیکٹیریا یا (Endophytic Bacteria) کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے طفیلی خسیوں کا جڑوں میں داخل ہونے میں کمی آئی۔ طفیلی خسیوں کی افزائش کے لیے مناسب درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ ہوتا ہے اگر زمین کا درجہ حرارت 40 سے 54 سینٹی گریڈ ہو جائے تو طفیلی خسیہ مر جاتے ہیں۔ امونیم سلفیٹ کی آدھی مقدار پھول آنے کے وقت جبکہ بقایا آدھی مقدار اس وقت ڈالیں جب پھل مڑنے والے دن کے برابر ہو جائے۔ کھاد کو ہمیشہ پودے کی چھتری کے نیچے ڈال کر گوڈی کریں اور پانی لگائیں۔

طفیلی خسیوں کا جینیاتی تدارک

مخصوص مدافعت جو کہ R نامی پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پودے کو کسی ایک طفیلیہ کے خلاف انتہائی درجے میں مدافعت مہیا کرتی ہے۔ ماہرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمائشی پودوں کی تنوع کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور ایسے تغیرات تلاش کریں جو ان خسیوں کے خلاف قدرتی مدافعت کا حامل ہوں۔

نمائشی پودے ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ انسانی صحت پر مفید اثرات مرتب کرتے ہیں۔ نمائشی پودے شوری اور فضائی آلودگی کی کا باعث بنتے ہیں۔ نمائشی پودے سچاؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور پر کھیل کے میدانوں میں، شاہراؤں کے ارد گرد اور گھروں کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمائشی پودوں کا زیادہ تر حصہ پھول دار پودوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ماحول کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ پودے قدرتی پھپھونے کھلاتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 18 پودے 1800 مربع فٹ کے گھر میں ہوا کو صاف رکھتے ہیں۔

نمائشی پودوں کی نشوونما بہت سی بیماریوں سے متاثر ہوتی ہے۔ طفیلی خسیہ تقریباً چار ملی میٹر لمبے، باریک اور دھاگہ نما شکل کے ہوتے ہیں جو کہ خوردبین کی مدد سے نظر آتے ہیں۔ طفیلی خسیہ صرف خاص قسم کے پودوں پر حملہ کرتے ہیں اس لیے ان کو (Obligate parasites) کہتے ہیں۔ پودوں کے طفیلی خسیے 4300 اقسام پر مشتمل ہیں۔

علامات

خسیے پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور پودوں کو بہت کمزور کر دیتے ہیں اور پودوں کی پیداوار، بڑھوتری، نشوونما، خوبصورتی اور ان کی افادیت بڑی طرح متاثر ہوتی ہے اور ان میں مشہور اور کثیر الانواع کاغذیں بنانے والے (Galls)، آبلہ اور نشان بنانے والے خسیے زیادہ اہم ہیں۔ یہ طفیلی خسیے جڑوں میں داخل ہو کر وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور جڑوں کے اوپر کاغذیں بنادیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کی نشوونما رک جاتی ہے متاثرہ جڑوں کو زمین سے پانی و نمکیات اور کھادوں کے انجذاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت ان خسیوں کی بڑھوتری کے لیے بہت ثابت ہوتا ہے۔ ایک سروے میں گلاب کے پودوں کی جڑوں پر طفیلی خسیوں کی 15 اقسام دیکھنے میں آئیں۔ برازیل میں ایک مشاہدے کے مطابق طفیلی خسیہ نمائشی پودوں میں بڑی تعداد میں پائے گئے۔ یہ خسیے کچھ جڑوں کے اندر اور کچھ باہر حملہ کرتے ہیں۔ باہر حملہ کرنے والوں کو بیرونی طفیلیہ کہتے ہیں اور جڑوں کے اندر حملہ کرنے والوں کو اندرونی طفیلیہ کہتے ہیں۔ سب سے خطرناک جڑوں کے اندر رہنے والے خسیے ہوتے ہیں۔ یہ طفیلی خسیے نمائشی پودوں کی جڑوں پر حملہ کر کے ابھار بنادیتے ہیں جس کی وجہ سے پودوں کا قہقہوٹا رہ جاتا ہے ان کے پتے ابتداء میں زرد ہونا اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پتوں کا مرجھاؤ، قہقہوٹا رہ جانا ان خسیوں کی، پودوں میں پائی جانے والی نمایاں علامات ہیں۔

تدارک

زمین سے تدارک

فصلوں کا ہیر پھیر اگر دو سے تین سال تک کیا جائے تو طفیلی خسیوں میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے

ڈاکٹر محمد امجد علی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری آسٹریا سے 2012ء میں حاصل کی۔ آپ بطور اسٹنٹ پروفیسر شعبہ پلانٹ پتھالوجی میں تعینات ہوئے۔ آپ کے 60 سے زائد ریسرچ پیپرز ملکی وغیرہ ملکی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مختلف انگلش اور اردو اخبارات اور مجلوں میں بھی کافی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ 0345-7886980, amjad.ali2001@gmail.com

جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں۔ ایک ماہ کی مسافت تک میری مدد رعب سے کی گئی، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ میری امت میں سے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، دوسرے نبی خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے میں تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی ہے۔

الحديث:

پت جھڑ پھلوں کے باغات کے انتظامی امور

اللہ بخش، عتیق اختر، فیاض حسین، حافظ واصف، جواد، سون ویلی، خوشاب

سکے۔ باغات لگانے سے پہلے گڑھوں کی کھدائی بہت ضروری ہے عام طور پر گڑھے 2 سے 3 مکعب فٹ کھودے جانے چاہیے۔ گڑھوں کی بالائی مٹی الگ کریں اور گڑھوں کو تین سے چار ہفتے کھلا رہنے دیں۔ بالائی حصے کی الگ کی گئی مٹی دو حصے اور ایک حصہ گوبر کی گلی سڑی کھاد ملا کر گڑھوں کو بھر دیں۔ نئے باغات لگانے کا بہترین وقت وسط جنوری سے وسط فروری ہے لیکن پودے لگاتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ پیوند کا جوڑ زمین سے باہر ہونا چاہیے اور پودے لگانے کے فوراً بعد پانی لگا دینا چاہیے۔

پودوں کی تربیت و شاخ تراشی

پت جھڑ پودے موسم سرما میں حالت خوابیدگی میں چلے جاتے ہیں اس لیے پودوں میں شاخ تراشی کا عمل دسمبر کے آخر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جولائی اگست میں بھی ہلکی شاخ تراشی کی سفارش کی جاتی ہے جس کے بنیادی مقاصد میں پودوں کی بیمار، خشک اور ایک دوسرے سے گر کر کھانے والی شاخیں کاٹنا، مناسب روشنی اور ہوا کا گزر شامل ہیں۔ چھوٹی عمر کے پودوں کو ابتداء سے اس طرح شکل دیں کہ دو فٹ اونچائی سے 3 یا 5 شاخیں تمام اطراف میں بڑھیں تاکہ پودا گلدستہ نما نظر آئے اور پھل کو برداشت کرنے میں آسانی ہو۔

آب پاشی اور کھادیں

آب پاشی کا انحصار پودے کی عمر، موسم اور زمین کی طبعی حالت پر ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر کے پودوں کو بڑی عمر کے پودوں کی نسبت اور پتلی زمین کی نسبت زرخیز زمین کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پت جھڑ پھلدار پودوں میں موسم سرما میں 10 سے 15 دنوں کے وقفے سے پانی لگایا جاتا ہے جبکہ گرمیوں میں یہ دورانیہ 3 سے 5 دن ہوتا ہے۔ باغات سے اچھی پیداوار کے حصول کے لیے مناسب کھادوں کا استعمال اشد ضروری ہے۔ کسی بھی غذائی عنصر کی کمی پھل کی کوالٹی پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ کھاد کا استعمال پودے کی عمر اور زمین کی طبعی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین اور پتوں کا تجزیہ کروالینا چاہیے۔ جوان پودوں کے لیے عام طور پر موسم سرما میں گوبر کی گلی سڑی کھاد بحساب 10 سے 15 کلو پیو ڈالیں۔ مختلف عمر کے پودوں کی غذائی ضروریات درج ذیل ہیں۔

غذائی جدول

غذائی اجزاء					
پودے کی عمر	قد	یوریا یا امونیم سلفیٹ	ایس ایس پی	پوناش	گوبر
3 سال	2-3 میٹر	300 گرام یا 500 گرام	200 گرام	100 گرام	5 کلو گرام
4 سال	3-4 میٹر	1 کلو گرام یا 2 کلو گرام	1.5 کلو گرام	0.5 کلو گرام	10 کلو گرام
5 سال یا زیادہ	4-5 میٹر	1.5 کلو گرام یا 3 کلو گرام	4 کلو گرام	1.5 کلو	30 کلو گرام

سنگل سپر فاسفیٹ اور پوناش کی تمام مقدار وسط دسمبر میں پودے کی چھتری کے نیچے بکھیر کر ہلکی گوڈی کر کے پانی لگائیں یوریا یا

(باقی صفحہ 10 پر)

پاکستان میں تقریباً تمام پت جھڑ پھل کامیابی سے کاشت کیے جاتے ہیں۔ ان پھلوں میں آڑو، سیب، خوبانی، ناشپاتی، آلو بخارا اور انورسہر فہرست ہیں۔ ان پھلوں کو عام طور پر پہاڑی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے لیکن پچھلے چند سالوں سے پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی ان پھلوں کی کچھ اقسام کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کے سمٹنے کے ساتھ تجارتی منڈیوں کے رابطے بھی انتہائی آسان ہو گئے ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک پھلوں کی درآمد سے کثیر زر مبادلہ کمانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ انہی حقائق کے پیش نظر ہمیں ان پت جھڑ پودوں کی اعلیٰ پیداوار کے فنی امور کو مد نظر رکھنا ہے۔

زمین اور آب و ہوا

پت جھڑ پھلوں کی کاشت کے لیے ریتیلی میرا زمین یا میرا زمین زیادہ موزوں ہے لیکن اس زمین میں نکاسی آب کا خاطر خواہ بندوبست ہونا چاہیے۔ اگر پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام موجود نہ ہو تو جڑوں کی بیماریوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جس سے پودے کی پیداواری عمر کم ہو جاتی ہے۔ زیر زمین چٹان، بکروالی اور سیم زدہ زمین بالکل ناموزوں ہے۔ پت جھڑ پھلوں کی کامیاب پیداوار حاصل کرنے کے لیے موسمی حالات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے تقریباً تمام پت جھڑ پودوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے تاہم پھول آنے اور پھل بننے کے دوران ژالہ باری اور بارش جیسے عوامل سے پھل کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

پودوں کی افزائش

باغات کی کامیابی کا انحصار صحت مند اور صحیح النسل پودوں پر ہوتا ہے پت جھڑ پھلوں کی افزائش نسل بنانا تاری طریقہ سے بذریعہ چشمہ کی جاتی ہے تاہم انکوری قلم کاری کا طریقہ رائج ہے۔ چشمہ انتخاب پودوں کی بڑھوتری پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ زیادہ پرانے اور کمزور پودوں سے چشمہ حاصل کرنے سے گریز کیا جائے۔ چشمہ کو ہمیشہ استھنول کے محلول میں بھگونے کے بعد لگائیں۔ چشمہ کاری عام طور پر موسم بہار اور برسات میں کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے مناسب روٹ شاک استعمال کیا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ چشمہ کاری کے لیے روٹ شاک کے تنے کی موٹائی ایک پنسل کے برابر ہونی چاہیے۔

باغ کی داغ بیل

باغات کی کامیاب کاشت کے لیے گڑھوں کی کھدائی بہت ضروری ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی

کے پیش نظر فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے گھنے باغات لگانے کا رجحان ہے۔ گھنے باغات کے لیے پودوں اور لائنوں کا درمیانی فاصلہ 15 فٹ ہونا چاہیے ان باغات میں کاٹ چھانٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ شاخیں آپس میں نہ الجھ سکیں اور مناسب ہوا اور روشنی کا گزر ہو

ترشاوہ پھلوں کی دیکھ بھال، غذائی ضروریات، بیماریاں اور اُن کا تدارک

عائشہ انور سلہری، رانا محمد عامر، ساجد علیم خان، حافظ علی رضا..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ترشاوہ پھل اپنی پیداوار اور رقبہ کے لحاظ سے دوسرے تمام پھلوں کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ پاکستان میں ترشاوہ پھلوں کی کاشت زیادہ تر صوبہ پنجاب میں 95 فیصد رقبہ میں ہوتی ہے اور ان پھلوں کا زیر کاشت رقبہ مختلف شہروں مثلاً ٹوبہ ٹیک سنگھ، بھکر، گجرات، سرگودھا، ساہیوال، لیہ اور بھلوال وغیرہ پر محیط ہے۔

ترشاوہ پھلوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ناکثر و جن کھاد وقت پر ڈالی جائے، ان پودوں کو پانی وقت پر دیا جائے اور زیر کاشت زمین کو نرم کیا جائے تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ سکے۔ پودوں کی دیکھ بھال اچھی طرح کی جائے تاکہ کیڑے مکوڑوں کے حملے سے اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اگر موسم گرما کے بعد یا اس موسم کے دوران بارشیں ہوں تو ان پودوں کے لیے انتہائی مفید ہیں بارش کے پانی سے پودے صاف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ضیائی تالیف کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ پودوں کی نشوونما کا عمل بہتری سے آگے بڑھنے لگتا ہے۔

ترشاوہ پھلوں کی مختلف اقسام

گریپ فروٹ

۱۔ میٹس سیڈ لیس (Mash Seedless)

۲۔ ڈنکن (Duncan)

۳۔ شیمبر (Shamber)

لیموں

۱۔ لیسن (Lisbon)

۲۔ روٹ لیمن (Rough Lemon)

سوٹ اورنج

۱۔ مسمی (Mausami)

۲۔ ریڈ بلڈ (Red Blood)

۳۔ روبی ریڈ (Ruby Red)

۴۔ ولنٹیا لیت (Valencia late)

لائم

۱۔ کاغذی لائم (Kaghazi Lime)

۲۔ سوٹ لائم (Sweet Lime)

میڈیرائن

۱۔ کیو (Kinnow)

۲۔ فیوٹریل اری (Feutrells Early)

ترشاوہ پھلوں کی غذائی ضروریات

ترشاوہ پھلوں کو نامیاتی اور غیر نامیاتی کھاد کی فراہمی ضروری ہے تاکہ ان کی نشوونما بہتر طریقے سے ہو سکے۔ ترشاوہ پھلوں کی غذائی ضروریات درج ذیل ہیں:

۱۔ کمیشیم

کمیشیم پھلوں کی پیداوار بڑھانے اور پودوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کمیشیم خامروں کو فعال بنانے اور خلیوں کی تقسیم میں بھی اہم ثابت ہوتا ہے۔

کمیشیم کی کمی کے باعث پتے کمزور اور پیلے رنگ کے ہو کر گر جاتے ہیں، پھلوں میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور جوس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

۲۔ فاسفورس

فاسفورس پودوں کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، پودوں کی جڑوں کی نشوونما بڑھاتا ہے، پھلوں کو صحت مند بنانے اور کیڑوں مکوڑوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔

فاسفورس کی کمی کے باعث پھلوں کے پھلنے سخت ہو جاتے ہیں اور پھلوں میں موجود جوس میں سڑک ایسڈ جو کہ مناسب مقدار میں پھلوں کو ذائقہ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے اُس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔

۳۔ نائٹروجن

نائٹروجن پودوں میں کلوروفل بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور پھلوں اور پھولوں کی نشوونما میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔

نائٹروجن کی کمی کے باعث پھلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اس کی کمی کی وجہ سے جوس میں وٹامن سی کی کمی واقع ہوتی ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔

۴۔ پوٹاشیم

پوٹاشیم پودوں میں پروٹین، چکنائی اور کلوروفل بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نائٹروجن اور فاسفورس کی کارکردگی کو بھی بڑھاتا ہے۔

پوٹاشیم کی کمی کے باعث پھلوں کی مٹھاس اور خوشبو وغیرہ کم ہو جاتی ہے اور پھلوں کے پھلنے سخت ہو جاتے ہیں۔

ترشاوہ پھلوں کی بیماریاں اور اُن کا تدارک

۱۔ سٹرس کینکر

سٹرس کینکر ترشاوہ پھلوں کی سب سے خطرناک بیماری ہے۔ یہ پودوں میں نہایت تیزی سے پھیلتی ہے اس بیماری کو پھیلانے کا باعث ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہے۔ یہ بیکٹیریا پودوں کے خلیوں میں قدرتی مساموں اور پودوں میں موجود زخموں کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے۔ سٹرس کینکر کسی بھی ملک کے لیے ترشاوہ پھلوں میں معاشی نقصانگاہ اور اُن کی برآمد کے حوالے سے خطرناک ہے۔ سٹرس کینکر سب سے پہلے پتوں پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر ٹہنیوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس بیماری کے حملہ سے پودوں کے تمام حصے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری پھلوں پر بھی نمودار ہوتی ہے۔ اس بیماری کے باعث تنوں پر چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے دھبے بھی بن جاتے ہیں اور زیادہ متاثر پھل اور پتے درختوں سے گر جاتے ہیں۔

۲۔ سٹرس سکیب

سٹرس سکیب پھوندی سے پھیلنے والی پھلوں کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری کے جراثیم (باقی صفحہ 15 پر)

تربوز کی کاشت

چوہدری محمد ایوب، کریم یار عباسی، حرافیش..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

دیکھ کر کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

چھدرائی و گوڈی

جب پودے دس بارہ سینٹی میٹر اونچے ہو جائیں تو ہر جگہ ایک صحت مند پودا چھوڑ کر فالتو پودے نکال دیں جبکہ جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے 2 بار گوڈی کریں اور مٹی بھی چڑھا دیں۔ مناسب دوائی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

کھادوں کا استعمال

بوائی سے پہلے تیار شدہ زمین میں تین بوری سینگل سپر فاسفیٹ، ایک بوری پوٹاش اور آدھی سے ایک بوری یوریا کی ایکڑ پڑیوں کے نشان کی دونوں طرف چھڑ کریں اور بعد میں پڑیاں بنادیں۔ بعد ازاں پھول آنے پر ایک ڈیڑھ بوری امونیئم سلفیٹ یا آدھی سے ایک بوری یوریا کی ایکڑ کے حساب سے ڈالیں۔ ایک بوری پندرہ دن کے بعد گوڈی کر کے دوبارہ ڈالیں اور مٹی چڑھا دیں۔

وقت برداشت

تربوز کی عام فصل جون جولائی میں تیار ہو جاتی ہے جبکہ اکتوبر میں کاشت شدہ فصل اپریل مئی میں تیار ہو جاتی ہے اور چھبیتی فصل کو اکتوبر میں برداشت کیا جاتا ہے۔ پھل اچھی طرح پکنے پر توڑیں۔ پہچان کے لیے تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھیں۔

- 1- جس جگہ پھل تنے سے لگا ہوتا ہے۔ وہاں دوبار ایک سے تار ہوتے ہیں۔ جب وہ اچھی طرح سوکھ جائیں تو پھل پک چکا ہوتا ہے۔
- 2- پھل کے زمین کے ساتھ لگے حصے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔

اقسام

شوگر بے بی، چارلسٹن گرے اور کرسمن اہم اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ انگستا اور جوبلی بھی اہم اقسام ہیں۔

بیاریاں، کیڑے اور تدارک

اکھیڑا، مرجھاؤ یا جڑوں کا گلاؤ ہر عمر کے پودوں پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی عمر میں پودے فوراً مرجھا جاتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں۔ زیادہ عمر میں بیماری پتوں کے مرجھاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے بیج بونے سے پہلے کپتان یا بینلیٹ دو گرام فی کلوڈا پالش کریں۔ تربوز کی اہم بیماریوں میں سفونی پھپھوندی اور روئیں دار پھپھوندی ہیں۔ بیاریوں کی آمد سے پہلے دس دس دن کے وقفے سے 3 سے 4 بار 900 گرام ڈائی تھین ایم۔45 یا انٹر کال 220-250 لیٹر پانی میں حل کر کے چھڑکیں۔ تربوز کے کیڑوں میں لال بھونڈی، پھل کی مکھی اور سرخ جوئیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کے بچاؤ کے لیے سنڈافاس کا سپرے کریں جبکہ مائٹس کے خاتمہ کے لیے سیون کا سپرے کریں۔

ڈاکٹر چوہدری محمد ایوب (ایوبی ایٹ پروفیسر) 1990ء سے شعبہ باغبانی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور نیچر خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 2006ء میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی تحقیق کا محور سبزیات ہیں۔ آپ کے بیشتر مقالہ جات ملکی و غیر ملکی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔
0333-8989779, 041-2646747,
cmayub91@yahoo.com, cmayub@uaf.edu.pk

تربوز پنجاب کے میدانی علاقوں کی ایک اہم فصل ہے۔ تربوز ایک سستا اور مقبول ترین پھل ہے۔ تربوز کے شیریں پھل کو چھوٹے بڑے سب یکساں پسند کرتے ہیں۔ سخت گرمی کے دنوں میں یہ سکون قلب کا باعث بنتا ہے۔ پکے ہوئے پھل کی مٹھاس 8 سے 9 فیصد ہوتی ہے اور اس کا نصف گلوکوز کی شکل میں ہوتا ہے۔ تربوز غذائیت کے اعتبار سے بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس میں انسانی غذا کے لیے حرارے، پروٹین، چونا، حیاتین الف، بی، ون، بی، ٹیو، اور سی وغیرہ جو انسانی جسم کی نشوونما کے لیے بہت اہم ہیں کافی مقدار میں موجود ہیں۔ آب و ہوا تربوز کے لیے خربوزے کی نسبت زیادہ طویل اور گرم موسم موزوں ہے۔ تربوز اپنے خاندان کی دیگر سبزیوں کی طرح کھر کے مہلک اثرات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تربوز کی بوائی کھر کا خطرہ طے جانے کے بعد کی جاتی ہے۔

زمین اور اس کی تیاری

بیج کے عمدہ گاؤ کے لیے 24-28 سینٹی گریڈ درجہ حرارت موزوں ہے جبکہ پودوں کی نشوونما 20 درجے سے کم پر ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی۔ تربوز کی زیادہ تر کاشت ریتلی زمینوں پر ہوتی ہے لیکن اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زرخیز ریتلی میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو بہتر رہتی ہے۔ چونکہ تربوز کی جڑیں زمین میں کافی گہرائی تک جاتی ہیں اس لیے یہ سیم زدہ زمینوں پر کامیاب نہیں رہتا۔ کاشت سے ایک ماہ پہلے کھیت میں 10-15 ٹن گوبر کی گلی سزی کھا ڈالیں اور ہل چلا کر زمین میں اچھی طرح ملا دیں اور کھیت کو پانی لگا دیں۔ جب زمین وتر میں آئے تو دوبارہ ہل اور سہاگہ چلائیں۔ کاشت کے وقت تک کھیت میں خود رو پودے اور جڑی بوٹیاں آگ آئیں گی۔ اس وقت کھیت میں دو تین بار ہل اور سہاگہ چلائیں۔

وقت کاشت

میدانی علاقوں میں اس کی تین فصلیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اگیتی فصل کے لیے برسات کا پانی اتر جانے کے بعد دریاؤں کے کنارے اکتوبر میں دس دس فٹ کے فاصلے پر دو فٹ (60 سم) (چوڑی اور دو فٹ گہری نالیاں کھود کر وتر زمین میں بیج بویا جاتا ہے۔ پودوں کو سردی سے بچانے کی خاطر شمال کی جانب سرکنڈے کی باڈ لگائی جاتی ہے۔ یہ فصل اپریل مئی میں پھل دیتی ہے۔ عام فصل 15 فروری سے آخر مارچ تک کاشت ہوتی ہے جبکہ چھبیتی فصل جولائی میں کاشت کی جاتی ہے۔

شرح بیج

بڑے بیج والی اقسام کا ڈیڑھ سے دو کلوگرام بیج فی ایکڑ جبکہ چھوٹے بیج والی اقسام کا صرف ایک کلوگرام بیج کافی ہوتا ہے۔

طریقہ کاشت

کاشت کے وقت دو تین بار ہل چلا کر اور سہاگہ دے کر کھیت کو ہموار کر دیں۔ اب کھیت میں دس دس فٹ (تین میٹر) کے فاصلے پر نشان لگائیں۔ نشانوں کے دونوں طرف ایک ایک فٹ (30 سم) کے فاصلے تک سفارش شدہ کھادیں بکھیر دیں اور نشانوں سے مٹی اٹھا کر پڑیاں بنائیں۔

آبیاری

بیج کو بوائی سے پہلے 8-10 گھنٹے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس کی روئیدگی جلد اور بہتر ہوتی ہے۔ بوائی کے فوراً بعد آبیاری کریں۔ اس کے بعد ہفتہ وار جبکہ بعد میں یہ وقفہ چودہ دن تک یا موسمی حالات

ٹنل کے مسائل اور ان کا تدارک

* محمد عرفان اشرف، محمد امیر اقبال گل، شوکت سجاد ** مندر حسین * انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، ** شعبہ کاشتکاری، یونیورسٹی فیصل آباد

خارج کرنے والا پنکھا (Exhaust Fan) لگا دیں تاکہ زائد نمی کو خارج کیا جاسکے اور درجہ حرارت مناسب رکھا جاسکے۔ کوشش کریں کہ ٹنل میں درجہ حرارت 15 اور 30 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے۔ ٹنل میں کسی بھی وقت نمی 80 فیصد سے زیادہ نہ ہونے دیں اس لیے ٹنل کو روزانہ صبح دونوں اطراف سے کھول دیں اور بعد از دوپہر کو دوبارہ بند کر دیں۔

سردی میں ٹنل بند رکھیں

ٹنل بند کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ٹنل مکمل طور پر ہوا بند ہوتا کہ دن کے وقت حاصل کردہ گرمائش رات کے وقت کام دے۔ کورے کے موسم میں ٹنل کا منمت کو ٹنل کا منہ زیادہ کھولنے کی صورت میں پودوں کی افزائش (Growth) پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔

8. اختلاط نسل

نبیوں والی سبزیوں میں نر اور مادہ پھول الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے ان میں اختلاط نسل خود بخود نہیں ہوتا۔ لہذا یہ کام ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ یہ عمل ٹنل کے پلاسٹک اتارنے تک جاری رکھیں۔ پلاسٹک اتارنے کے بعد یہ کام کھیاں سرانجام دیتی ہیں تاہم اگر بغیر تخم والی (Parthenocarpic) اقسام کا کاشت کی گئی ہیں تو زرا پاشی کی ضرورت نہیں رہتی۔

9. چوہے

کاشت بیج شروع کے دنوں میں چوہے بالخصوص چھوٹی چوہیا بہت نقصان دیتی ہے۔ چوہے زمین میں سے بیج نکال کر اس کا گودا کھا کر نقصان پہنچاتے ہیں اور خاص طور پر انگوری مارا بیج ان کی من پسند غذا ہے اس طرح چوہے بعض اوقات ساری فصل کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے چوہوں کی تلافی کا مناسب بندوبست کرنا چاہئے چوہوں کے تدارک کے لیے بازار سے سستے بیج لیکر زہر آلود کر کے کھیت کے ارد گرد پھینک دیئے جائیں تاکہ چوہے ان کو کھا کر تلف ہو جائیں یا پھر چوہوں کو مارنے کے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں۔ جیسے آلودوں کے ٹکڑے کر کے یا پھر کٹی کے دانوں کو بال کرز ہر لگائیں اور کھیت میں رکھ دیں۔

10. وائری امراض

جن علاقوں میں وائری امراض کا خطرہ ہو وہاں ٹماٹر کی پنیری اکتوبر سے پہلے کاشت نہ کریں اور پنیری جالی دار کپڑے کے نیچے کاشت کریں ورنہ وائری امراض کا امکان بڑھ سکتا ہے اسی طرح پنیری کو ٹنل میں 10 نومبر سے منتقل کرنا شروع کر دیں۔

11. پلاسٹک کا پھٹ جانا

ٹنل کا پلاسٹک اگر کسی وجہ (مثلاً باری وغیرہ) سے پھٹ جائے تو اسے اچھی طرح ٹیپ لگا کر بند کر دیں بصورت دیگر پلاسٹک زیادہ پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

روزانہ کی بنیاد پر معائنہ

ٹنل کے اندر درجہ حرارت اور نمی کی زیادتی مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان کے حملے کے لیے سازگار ماحول مہیا کرتی ہیں لہذا فصل کاروزانہ معائنہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایک یا دو دن کی لا پرواہی بڑے نقصان کا موجب ہو سکتی ہے چنانچہ ایسے کاشتکار ہی اس ٹیکنالوجی کو اپنائیں جن کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ ٹنل کے اندر باقاعدگی سے ماحول کا جائزہ لے سکیں۔

ٹنل فارمنگ سے منافع کمانے کے لیے چند اہم عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو درج ذیل ہیں۔

1. ٹنل ڈیزائن (Tunnel Design)

ٹنل بنواتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس کے ڈھانچے میں کوئی نوکدار چیز استعمال نہ کی گئی ہو تاکہ پلاسٹک کو نقصان نہ پہنچے۔ مزید برآں ٹنل کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہوا کے سامنے کم سے کم مزاحم ہو۔

2. جڑی بوٹیاں

جڑی بوٹیاں پودوں کی بہت ساری خوراک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی، ہوا اور روشنی کا استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے فصل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے درج ذیل انتظامات کرنے ضروری ہیں۔

☆ اچھی طرح گلی سڑی کھاد کا استعمال کیا جائے تاکہ دہی کھاد کے ذریعے آنے والی جڑی بوٹیوں کے بچ سے بچا جاسکے۔

☆ دہی کھاد کے استعمال کے بعد اور فصل کا کاشت کرنے سے پہلے ہفتہ، عشرہ کے وقفے سے بل چلانا چاہئے تاکہ جڑی بوٹیوں کے بچ اگتے رہیں اور تلف ہوتے رہیں۔

☆ کاشت سے پہلے ٹنل کے اندر پٹریوں کو کالی پلاسٹک سے ڈھانپ دیا جائے تاکہ جڑی بوٹیاں نہ اگ سکیں اور زمین کی نمی بھی زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے۔

نوٹ: سب زبانت میں جڑی بوٹیوں کی تلافی کے لیے کسی بوٹی مارز ہر کا ہرگز استعمال نہ کریں۔

3. بیج کا کم آگاہ

براہ راست کاشت میں ایک مسئلہ بیج کے کم آگاہ بھی ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ زمین اچھی طرح تیار ہو اور درجہ حرارت بھی مناسب ہو بہتر ہوگا کہ بیج اچھے آگاہ اور زہر آلود ہوتا کہ بیماری کا حملہ نہ ہو سکے۔ علاوہ ازیں بوٹی کے وقت بھی ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ بیج علیحدہ پلاسٹک کی تھیلوں میں کاشت کر دیں تاکہ بعد میں ٹنل کے اندر ناغوں کو پر کیا جاسکے۔

4. پودوں کا مر جھاؤ

یہ پھپھوندی سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جو آگاہ کے وقت حملہ کرتی ہے اور فصل کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس بیماری میں زمین کے اندر تار اور جڑیں گل جاتی ہیں اور پودے کا خوراک کی عمل رک جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت ختم ہو جاتا ہے لہذا اس مرحلہ پر روزانہ ٹنل کی چیکنگ کرنی چاہئے تاکہ حملہ ہوتے ہی فوراً تدارک کیا جاسکے۔ یہ بیماری زیادہ درجہ حرارت، نمی کی زیادتی، زیادہ زمینی تعامل اور زمینی پھپھوندی کی وجہ سے آتی ہے اس کا مناسب بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔

5. ٹنل کے اندر کھاد اور سہرے کا استعمال

سہرے کرنے اور کھاد ڈالنے کے بعد ٹنل کا منہ کھول دیں تاکہ پیدا ہونے والی گیس نقصان نہ پہنچائے۔ ٹنل میں یوریا کھاد کا استعمال نہ کریں کیونکہ یوریا کھاد ڈالنے سے امونیا گیس پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے سڑ جاتے ہیں۔

6. ٹنل کے اندر درجہ حرارت اور نمی کی مقدار

دن کے وقت تقریباً 10 بجے صبح سے 3 بجے شام تک ٹنل کے دروازوں کو دونوں طرف سے کھلا رکھا جائے تاکہ ٹنل کے اندر زیادہ نمی پیدا نہ ہو جو کہ بیماریوں کا موجب بنتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ٹنل میں ہوا

گلاب میں مفید معاشی تغیرات کے لیے تابکاری شعاعوں کا استعمال

مونس حسین شاہ، ریاض الرحمن، محمد عثمان، ساجدہ بی بی اور فرادہ بٹول..... ہارٹیکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار فلوئرکچر اینڈ لینڈ سکیپنگ مری روڈ راولپنڈی، جامعہ زرعیہ فیصل آباد، نیکرا انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بائیالوجی

لیے تحقیق کا آغاز 1990 میں ہوا۔ شروع میں اس ٹیکنیک کو بعد از برداشت پھلوں اور سبزیوں کو حشرات اور خوردبینی تو فیلیوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں تابکاری شعاعوں کو پودوں میں مفید اور مستقل وراثی تغیرات کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ آرائشی پودوں میں ہر سطح پر (بلب، ٹیو براور پھول) تابکاری شعاعوں کو تغیرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم تخم پر تابکاری شعاعوں کے اثرات پودوں کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں محدود ہیں۔ پودوں کے حصوں جن میں آنکھ، چشمہ اور دیگر غیر جنسی حصے شامل ہیں کو تابکاری کے ذریعے تبدیلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں باضابطہ طور پر تقریباً 3000 مختلف اقسام متعارف کروائی گئیں ہیں جو 170 مختلف انواع سے تعلق رکھتی ہیں۔ تابکاری شعاعوں کے ذریعے پیدا کیے گئے پودے اور جانوروں کی تمام اقسام کو عالمی ایجنسی برائے ایٹمی تابکاری کے مرکز وینا، آسٹریا میں جمع کیا جاتا ہے۔ عام طور پر پودوں میں توارثی تبدیلی کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں میں پودوں میں دوغلا پن اور ہم جنسی ملاپ شامل ہیں۔ اس امر کے پیش نظر گلاب میں تابکاری شعاعوں کا استعمال زیادہ مفید اور سودمند ہے۔ جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں گلاب کی دوغلی اقسام کی نسل کشی کو ممکن بنایا گیا۔ تاہم پاکستان کے وہ علاقے جہاں سردیوں کا دورانیہ طویل ہے مثلاً اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں گلاب میں تخم کا ٹھہراؤ ممکن نہیں جس کی وجہ سے دوغلی اقسام پر تحقیق ناممکن ہے۔ تابکاری شعاعوں کے ذریعے سے تقریباً پچھلے 50 سالوں سے پودوں میں مفید تغیرات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ گلاب میں مفید تغیرات لانے کے لیے تابکاری شعاعوں کا استعمال ایک بہتر ذریعہ ہے۔ اس طریقہ کے ذریعے گلاب میں تغیرات پیدا کرنا اس لیے سودمند ہے کہ تابکاری شعاعیں ایک سے زیادہ تغیرات پیدا کر سکتی ہیں۔ تاہم رواں طریقوں کے ذریعے ایک وقت میں ایک ہی پھلوں میں تبدیلی پر تحقیق کی جاسکتی ہے۔

گلاب کی موجودہ اقسام میں مفید خصوصیات قدرتی یا از خود پیدا کیے گئے تغیرات کی بناء پر ہیں۔ یورپ میں 1950-1960 تک کے عرصہ میں متعارف کرائی جانے والی اقسام قدرتی تغیرات کا نتیجہ تھیں۔ تاہم یورپ میں تابکاری کو 1937 میں گلاب کی فصل میں تغیرات لانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یورپ ہی میں 1937-1976 تک تقریباً 5819 اقسام متعارف کروائی گئیں جن میں خاصی تعداد ایسی اقسام کی تھی جو تابکاری اثرات کا نتیجہ تھیں۔ تابکاری شعاعیں توارثی مادہ میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ توارثی مادہ (DNA) پودوں میں بعد ازاں مفید ظاہری خصوصیات کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ تابکاری شعاعیں کیمیائی مرکبات کے نسبت زود اثر اور مستقل تغیرات پیدا کرتی ہیں تاہم تابکاری شعاعوں کو دیگر طریقوں پر نسبت چنداں کم وجوہات کی بناء پر ہے۔ جیسا کہ تابکاری شعاعیں سیدھی پودوں کے توارثی مادہ کو متاثر کرتی ہیں۔ پودے میں موجود مختلف کیمیائی اجزاء تابکاری شعاعوں کو کام کرنے سے نہیں روکتی۔ گلاب میں تغیرات کے لیے بہت سے کیمیائی مادے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ایسے کیمیائی مادے جن میں Akylating agents شامل ہوں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ Salpnate، Diethaly sulfat، Ethylaneimine شامل ہیں۔ کیمیائی مادوں کا خاص الکائل گروپ، توارثی مادہ (DNA) کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے توارثی مادہ میں تبدیلی اور ترتیب میں رد و بدل (باقی صفحہ 17 پر)

گلاب ایک نہایت خوبصورت اور خوشبودار پھول ہے۔ گلاب محبت اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں گلاب کو تمام خوشی اور نئی کے مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں گلاب کی 150 تا 200 انواع پائی جاتی ہیں جن کی 1400 سے 2000 کے قریب اقسام کو معاشی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں گلاب ہر طرح کے ماحول اور زمین میں اگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں گلاب آزاد کشمیر کی بلند و بالا وادیوں سے لیکر حیدرآباد اور کراچی کے ساحلی علاقوں میں خوب اگایا اور برداشت کیا جاتا ہے تاہم یہ تہذیب و تہذیب ہواؤں سے احساسیت رکھتا ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرم اور خشک ماحول پایا جاتا ہے جو گلاب کی خوشبو کو کمزور کرتا ہے۔ اس کے برعکس حیدرآباد سندھ میں گلاب کی غیر معمولی خوشبو کی گرم مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے ہے۔ چٹوکی ملک بھر میں آرائشی پودوں اور ترشیدہ پھولوں کی خرید و فروخت کا ایک منفرد مرکز ہے تاہم پاکستان میں گلاب 2000 میٹر مربع پر سالانہ کاشت کیا جاتا ہے۔ ملک میں جاری جدید معاشی سرگرمیوں کے باعث گلاب اور دوسرے ترشیدہ پھولوں کی مانگ اور کاشت میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ جس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں گلاب کی کاشت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ گلاب کا پھول ان گنت رنگوں اور حجم میں پایا جاتا ہے۔ اسی خوبی کی بدولت گلاب کو مختلف مواقع پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں موسمی تبدیلیاں بہت تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ ملکی زرعی اجناس اور آرائشی پودوں پر اس موسمی تغیر کا بڑا گہرا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اجناس مثلاً گندم، مکئی اور پھل دار پودے اس سے خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ موسمی تغیرات و تبدیلی کی وجہ سے پھلدار پودوں میں پھولوں کا دیر سے کھلنا، خوشبو، رنگ اور ذائقہ میں تبدیلی قابل ذکر مسائل ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر زرعی ماہرین کی ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں انہیں محدود وقت میں ایسی اجناس اور آرائشی پودوں کی اقسام متعارف کرائی ہیں جو ان موسمی تغیرات کے خلاف مدافعت رکھتی ہوں۔ گلاب بھی انہی موسمی تغیرات سے شدید متاثر ہوا ہے۔ پانی کی کمی نے بہت سے علاقوں میں پھول کے حجم اور ساخت کو متاثر کیا ہے۔ جبکہ مجموعی طور پر پودوں کی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جہاں پودوں کو پانی کی کمی نے متاثر کیا وہاں زیادہ بارشوں کی وجہ سے زمین کی نمی میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کے باعث پودے بیماریوں کے خلاف قدرتی مدافعتی نظام کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے اجناس اور پھلوں کی بہت سی اقسام میں پودوں کا سکھاؤ اور دوسرے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں۔ اگر موسمی تغیرات اسی طرح جاری رہے تو پانی کی کمی کی وجہ سے زمین میں نمکیات کی سطح بہت بلند ہو جائے گی۔ ایسی زمین جن میں نمکیات کی شرح زیادہ ہو اسے شوزدہ / کلرٹھی زمین کہا جاتا ہے۔ کلرٹھی اور شوزدہ زمینوں میں محدود اقسام کے پودے اگائے جاسکتے ہیں۔

درج بالا مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پودوں کی ایسی اقسام متعارف کروائی جائیں۔ جو ان موسمی تغیرات کے خلاف مدافعت رکھتی ہوں۔ پاکستان میں گلاب کی مصنوعی نسل کشی مشکل ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں درج حرارت کے قدرتی فرق کی وجہ سے گلاب میں تخم کا ٹھہراؤ محال ہے۔ تخم بننے کے اس عمل سے گلاب میں نسل کشی کے دوسرے طریقے جن میں تابکاری شعاعوں کا استعمال شامل ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں فصلوں پر تابکاری کے اثرات سے وراثی تبدیلی لانے کے

ایڈیٹیل (خوردنی) لینڈسکپنگ

عقلمند صغیر، محمد اسامہ سعید..... انسٹیٹیوٹ آف ایگری ایکسٹینشن اینڈ رورل ڈویلپمنٹ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

لینڈسکپنگ

بنائین کے خوردنی لینڈسکپنگ

اگر معیاری زمین میسر نہیں ہیں جیسا کہ یکے گھروں اور دفاتر میں ہوتا ہے تو بیج لگانے کے لیے گھلوں، کنٹینرز، پلاسٹک کی بوتلیں، نا استعمال ہونے والے برتن اور ٹوکریاں وغیرہ استعمال کی جاسکتی ہیں۔ جنہیں مزید خوبصورت بنانے کے لیے دیواروں پر لٹکا یا جاسکتا ہے۔ اگر برتن وغیرہ خوبصورت نہیں ہیں تو انہیں من پسند رنگ بھی کیا جاسکتا ہے جس سے وہ مزید خوبصورت لگیں گے۔

ڈیزائن کی اقسام

ڈیزائن کی دو اقسام ہو سکتی ہیں:

۱۔ عمودی ڈیزائن

عمودی ڈیزائن میں پودے زمین پر لگائے جاتے ہیں اور اگر گھلوں میں لگائے جائیں تو وہ پودے سادہ طریقے سے زمین پر ہی رکھیں جائیں گے۔ زمین کی سیدھ پر ہونے کی وجہ سے اسے عمودی ڈیزائن کہا جائے گا۔

۲۔ افقی ڈیزائن

افقی ڈیزائن میں پودے زمین کی مخالف سمت بڑھائے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے گیلے، ٹوکریاں اور کنٹینرز وغیرہ دیوار کے ساتھ لٹکائے جاتے ہیں۔ اگر نیلیں ہیں تو انہیں بانسوں اور ڈوریوں کی مدد سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ڈیزائن کو افقی ڈیزائن کہتے ہیں۔ ہر ڈیزائن خوبصورتی اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔

بنیادی ضروریات

جگہ کا تعین کرتے ہوئے درج ذیل چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے:

- ۱۔ پانی کی سہولت موجود ہونا
- ۲۔ دھوپ کی آمد میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا
- ۳۔ چھاؤں میں لگائے جانے والے پودے چھاؤں میں ہی لگائے جائیں
- ۴۔ ذمہ دار مالی یا خیال کرنے والے کا ہونا

پانی لگانا

بیج بونے کے بعد پانی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ پودے اچھے سے اگ سکیں اور اچھی پیداوار ملے۔ پانی نہ بہت زیادہ لگانا چاہیے نہ بہت کم۔ زیادہ اس لیے نہیں لگایا جاتا تاکہ پودے وافر پانی ہونے سے مرمت نہ جائیں اور کم اس لیے کہ پودوں کے سونکھنے اور دیر سے بڑھنے کا خطرہ ہے۔

گوڈی کرنا

باقی فصلوں اور پودوں کی طرح ان پودوں کے لیے بھی گوڈی اتنی ہی ضروری ہے تاکہ جڑی بوٹیاں ان کی نشوونما میں رکاوٹ نہ بنیں اور یہ پودے صحیح سے اپنی شکل میں آسکیں۔

کیمیائی ادویات کا استعمال نہ کرنا

جیسا کہ یہ پودے ذاتی استعمال کے لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں اس (باقی صفحہ 41 پر)

ایڈیٹیل یا خوردنی لینڈسکپنگ

لینڈسکپنگ سے مراد وہ عمل ہے جس میں زمین، گھر، دفاتر، لان وغیرہ کو نمائشی پودوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ سڑک کے درمیان فٹ پاتھ، اور کناروں پر لگے خوبصورت پودے لینڈسکپنگ کا ہی نتیجہ ہیں۔ اس میں انتہائی چھوٹے قد کے پودوں سے لے کر پالم جیسے بڑے درختوں کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ لاہور، فیصل آباد اور دیگر بڑے شہروں میں پارکس اور سیر کے میدانوں میں لینڈسکپنگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ آنے والے لوگ ہریالی اور قدرتی خوبصورتی کا نظارہ بڑے شہروں میں رہ کر بھی کر سکیں۔

وہ لینڈسکپنگ جس میں ایسے پودوں لگائیں جائیں جن سے خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کے قابل اشیاء بھی حاصل کی جاسکیں ایڈیٹیل یا خوردنی لینڈسکپنگ کہلاتی ہے۔ بعض اوقات اسے کچن گارڈننگ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اس سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ خوردنی لینڈسکپنگ میں لگائے جانے والے پودے کسی ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں تاکہ لینڈسکپنگ کا مقصد پورا ہو سکے۔

خوردنی لینڈسکپنگ کے لیے موزوں جگہیں

خوردنی لینڈسکپنگ ایسی جگہوں پر کرنی چاہیے جہاں پودوں کی دیکھ بھال روزانہ کے معمول پر ممکن بنائی جاسکتی ہو۔ اس لیے گھر، گھر کے اندر اور پچھلے لان اور دفاتر اس کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف زمین پر ہی جاسکتی ہو بلکہ کسی بھی گیلے، ٹوکری، پلاسٹک کی بوتلیں، ٹائز اور ایسا ہر برتن جس میں پودا لگ سکتا ہو کی جاسکتی ہے۔

پودوں کے نام

خوردنی لینڈسکپنگ میں استعمال ہونے والے پودوں کے نام درج ذیل ہیں:

سٹرابیری، سلاڈ، پالک، شلجم، گاجر، مولی، بھتی، کرلی، گوبھی، مٹر، ٹماٹر وغیرہ۔

موسم اور جگہ کے لحاظ سے پودوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ان پودوں کا لینڈسکپنگ سے تعلق خوبصورت ڈیزائن سے ہی پورا کیا جاسکتا ہے۔ ڈیزائن جتنا خوبصورت ہوگا خوردنی لینڈسکپنگ اتنی ہی خوبصورت اور واضح ہوگی۔

بیج کی خریداری

خوردنی لینڈسکپنگ کے لیے سب سے پہلا مرحلہ بیج کی خریداری ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بیج کسی معروف بیج کی کمپنی سے خریدا جائے جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتا اور زیادہ پیداوار دینے کی گارنٹی ہو۔

ڈیزائن

اگر یہ پودے زمین پر سیدھا بیج کے ذریعے بونے جارہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا ڈیزائن پہلے سے زمین پر بنالیا جائے اور پودوں کے پتوں کی شکل اور رنگ مد نظر رکھتے ہوئے بیج بونے جائیں تاکہ خوبصورت لینڈسکپنگ کی ضرورت کو پورا کیا جاسکے۔

گوتر سے لاحق خطرات اور ان کا سد باب

صابہ ہناز محمد سمیل ساجد، ایمن جتول..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

حشرات ایسے جاندار ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی۔ ان کے جسم قطعہ دار ہوتے ہیں دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1.1 ملین سے لیکر 10 ملین تک حشرات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ان حشرات کی بہت سی اقسام موجود ہیں جو کہ نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور بے شمار بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ کانٹے والی مکھی (میجز) جس کو عرف عام میں ”گوتر“ کہا جاتا ہے۔ میجز کی طرح ہی نظر آتا ہے مگر اس کی جسامت میجز سے بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور تقریباً 1 تا 3 ملی میٹر تک ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس کی 21 اقسام موجود ہیں۔ کانٹے والی میجز زیادہ تر نمی والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی چھوٹی جسامت کی وجہ سے اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی مخصوص خاصیت ہے کہ ان کے پروں پر کالے اور سفید رنگ کے دھبے موجود ہوتے ہیں۔ جس کی مدد سے ان کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے زیادہ تر یہ گروہوں کی شکل میں پائی جاتی ہے اور ان کی سب سے زیادہ تعداد جولائی سے لے کر نومبر کے دوران دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ 27 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک سب سے زیادہ حرکت میں ہوتی ہیں۔ مادہ جب انڈے دیتی ہے تو 2 سے 7 دن کے اندر انڈے سے لاروا بنتے ہیں۔ لاروا اپنی دوران زندگی 4 مراحل میں سے گزرتا ہے۔ لاروا سے پوپا بنتا ہے جو کہ 2 سے 3 دن تک زندہ رہتا ہے اور پھر بالغ جانور بن جاتا ہے۔ کانٹے والی میجز جب جانوروں کو کاٹتی ہے تو یہ جانور کے گھروں ناگوں اور پیٹ کی چلی طرف حملہ کرتی ہے۔ اس کے کانٹے کی وجہ سے جانور شدید درد محسوس کرتا ہے۔ حملے کے دوران یہ میملو، ریپنڈنلکز، پرنڈوں اور انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ جب یہ کاٹتی ہے تو مختلف اقسام کے جراثیم جانور کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے جن میں مختلف اقسام کے وائرس، پروٹوزوا (ایک خلوی جاندار)، ورم (نیا ٹوڈز) اور خارش کی مختلف اقسام شامل ہیں۔

حشرات ایسے جاندار ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی۔ ان کے جسم قطعہ دار ہوتے ہیں دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1.1 ملین سے لیکر 10 ملین تک حشرات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ان حشرات کی بہت سی اقسام موجود ہیں جو کہ نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور بے شمار بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ کانٹے والی مکھی (میجز) جس کو عرف عام میں ”گوتر“ کہا جاتا ہے۔ میجز کی طرح ہی نظر آتا ہے مگر اس کی جسامت میجز سے بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور تقریباً 1 تا 3 ملی میٹر تک ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس کی 21 اقسام موجود ہیں۔ کانٹے والی میجز زیادہ تر نمی والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی چھوٹی جسامت کی وجہ سے اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی مخصوص خاصیت ہے کہ ان کے پروں پر کالے اور سفید رنگ کے دھبے موجود ہوتے ہیں۔ جس کی مدد سے ان کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے زیادہ تر یہ گروہوں کی شکل میں پائی جاتی ہے اور ان کی سب سے زیادہ تعداد جولائی سے لے کر نومبر کے دوران دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ 27 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک سب سے زیادہ حرکت میں ہوتی ہیں۔ مادہ جب انڈے دیتی ہے تو 2 سے 7 دن کے اندر انڈے سے لاروا بنتے ہیں۔ لاروا اپنی دوران زندگی 4 مراحل میں سے گزرتا ہے۔ لاروا سے پوپا بنتا ہے جو کہ 2 سے 3 دن تک زندہ رہتا ہے اور پھر بالغ جانور بن جاتا ہے۔ کانٹے والی میجز جب جانوروں کو کاٹتی ہے تو یہ جانور کے گھروں ناگوں اور پیٹ کی چلی طرف حملہ کرتی ہے۔ اس کے کانٹے کی وجہ سے جانور شدید درد محسوس کرتا ہے۔ حملے کے دوران یہ میملو، ریپنڈنلکز، پرنڈوں اور انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ جب یہ کاٹتی ہے تو مختلف اقسام کے جراثیم جانور کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے جن میں مختلف اقسام کے وائرس، پروٹوزوا (ایک خلوی جاندار)، ورم (نیا ٹوڈز) اور خارش کی مختلف اقسام شامل ہیں۔

- ☆ مکھیوں کے لیے ٹریپ (Fly trap) کا استعمال کیا جائے۔
- ☆ ڈپ ٹینک کا استعمال کیا جائے اس طریقے میں جانور کو ایک ٹینک سے گزارا جاتا ہے جب جانور اس میں سے گزرتا ہے تو دوائی جانور کے جسم سے لگ جاتی ہے اور کھیاں جھڑ جاتی ہیں۔
- ☆ مکھیوں کو بھگانے کے لیے سپرے کا استعمال کیا جائے۔
- ☆ صبح اور شام کے وقت جب مکھیوں کے حملے کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو جانوروں کو باہر چرائی سے بچایا جائے۔
- ☆ مکھیوں کے لاروے کو مارنے کے لیے سپرے کا استعمال کیا جائے جس سے ان کے دور حیات کو روکا جاسکتا ہے اور ان مکھیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
- ☆ صفائی کا مناسب بندوبست کیا جائے تاکہ کھیاں جنم نہ لے سکیں۔
- ☆ کسی بھی علاقے میں وبا پھوٹ پڑنے کی صورت میں مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ بیماری پر فوری قابو پایا جاسکے۔

شعبہ طفیلیات، جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں حشرات کے متعلق تحقیقاتی ٹیم گوتر کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے جس کے نتائج مویشی پال حضرات کے لیے سودمند ثابت ہو سکتے ہیں۔

حشرات ایسے جاندار ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی۔ ان کے جسم قطعہ دار ہوتے ہیں دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1.1 ملین سے لیکر 10 ملین تک حشرات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ان حشرات کی بہت سی اقسام موجود ہیں جو کہ نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور بے شمار بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ کانٹے والی مکھی (میجز) جس کو عرف عام میں ”گوتر“ کہا جاتا ہے۔ میجز کی طرح ہی نظر آتا ہے مگر اس کی جسامت میجز سے بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور تقریباً 1 تا 3 ملی میٹر تک ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس کی 21 اقسام موجود ہیں۔ کانٹے والی میجز زیادہ تر نمی والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ انتہائی چھوٹی جسامت کی وجہ سے اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی مخصوص خاصیت ہے کہ ان کے پروں پر کالے اور سفید رنگ کے دھبے موجود ہوتے ہیں۔ جس کی مدد سے ان کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے زیادہ تر یہ گروہوں کی شکل میں پائی جاتی ہے اور ان کی سب سے زیادہ تعداد جولائی سے لے کر نومبر کے دوران دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ 27 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک سب سے زیادہ حرکت میں ہوتی ہیں۔ مادہ جب انڈے دیتی ہے تو 2 سے 7 دن کے اندر انڈے سے لاروا بنتے ہیں۔ لاروا اپنی دوران زندگی 4 مراحل میں سے گزرتا ہے۔ لاروا سے پوپا بنتا ہے جو کہ 2 سے 3 دن تک زندہ رہتا ہے اور پھر بالغ جانور بن جاتا ہے۔ کانٹے والی میجز جب جانوروں کو کاٹتی ہے تو یہ جانور کے گھروں ناگوں اور پیٹ کی چلی طرف حملہ کرتی ہے۔ اس کے کانٹے کی وجہ سے جانور شدید درد محسوس کرتا ہے۔ حملے کے دوران یہ میملو، ریپنڈنلکز، پرنڈوں اور انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ جب یہ کاٹتی ہے تو مختلف اقسام کے جراثیم جانور کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے جن میں مختلف اقسام کے وائرس، پروٹوزوا (ایک خلوی جاندار)، ورم (نیا ٹوڈز) اور خارش کی مختلف اقسام شامل ہیں۔

وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں میں بلیوننگ (Blue tongue) اور اپنی زونک ہیپورسٹیک بخار (Epizootic haemorrhagic fever) کی بیماری سے یہ دونوں بیماریاں آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں اور ان کی علامات کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ بخار چھونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ویکٹر کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے۔ وائرس مکھیوں کے جسم میں نشوونما پاتا ہے اور جب میجز کاٹتی ہے تو اس کے تھوک کی مدد سے جانوروں کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وائرس ایک دفعہ میجز میں داخل ہو جائے تو ساری زندگی میجز کے جسم میں رہتا ہے وائرس سے پھیلنے والی یہ بیماری گرمیوں کے اختتام پر اور بارشوں کا موسم شروع ہونے کے ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ بلیوننگ خصوصاً مکھیوں کو متاثر کرتی ہے تاہم بکریوں، گائے اور بھینسوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ ناک اور گلے سے جلد اکھڑ جاتی ہے۔ منہ سے لعاب بہنے لگ جاتا ہے اور ناک سے مواد نکلتا ہے جانور کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ گھڑم ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی مڑ جاتی ہے۔

اپنی زونک ہیپورسٹیک بخار کی بیماری میں جانور کے جسم پر زخم بن جاتے ہیں (جلد اکھڑ جاتی

ڈاکٹر محمد سمیل ساجد کی پی ایچ ڈی جامعہ زرعیہ فیصل آباد سے ہے اور تقریباً 18 سال سے یونیورسٹی ہذا سے منسلک ہیں۔ تحقیق کا محور میجز، ان سے پھیلنے والی بیماریوں اور ان کے تدارک پر ہے۔

بطور سپروائزر 2 پی ایچ ڈی اور 21 سے زائد ماسٹر ڈگری کروا چکے ہیں ان کے اردو اور انگریزی مقالہ جات کی تعداد 50 سے زائد ہے۔

drsohailuaf@hotmail.com, drsohailuaf@uaf.edu.pk, 0333-6508667

ریکسیٹی اوسس کی حیوان آدرہ مرض کی اہمیت

عادل انجاز محمد سہیل ساجد محمد ظفر اقبال، صابہناز..... کلیہ امور حیوانات، شعبہ طفیلیات، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

نشوونما پاتا ہے اور جب یہ متاثرہ چیچر خون کے حصول کے لیے کسی دوسرے جانور یا انسان کو کاٹنے میں تویہ کاٹنے کے عمل کے دوران چیچروں کے لعاب کے ذریعے دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر اپنے میزبان کے اندر نشوونما پا کر بیماری کی علامات ظاہر کرتا ہے۔

بیماری کی علامات

اس بیماری کی علامات میں بخار، سر درد، جسم پر مخصوص قسم کے نشان، کمزوری، جگر اور تلی کا حجم بڑھ جانا اور خون کا بہاؤ کم ہو جانا ہے۔

تشخیص کا طریقہ کار

بیماری کی مخصوص علامات اس کی تشخیص میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر مخصوص علامات کے ساتھ ساتھ جانوروں کے جسم پر چیچر بھی موجود ہو تو بیماری کی تشخیص میں مدد ملتی ہے۔ جانور کے خون کا نمونہ لے کر اس کا خورد بینی جائزہ لیا جاتا ہے اور اگر یہ جرثومہ موجود ہو تو اس بیماری کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جدید طریقہ کار مثلاً PCR کے ذریعے بھی اس بیماری کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

احتیاطی تدابیر

اس مرض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر درج ذیل ہیں۔ گھر میں رکھے جانوروں میں چیچروں کی موجودگی کو ناممکن بنایا جائے۔ چیچر کی موجودگی پر کسی مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے معائنہ کروانے کے بعد مناسب سپرے کا استعمال کیا جائے۔ جس جگہ جانور رکھے ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہاں چیچر نشوونما نہ پاسکیں۔ جس جگہ پر جانور رکھے ہیں وہاں کی دیواروں میں موجود دراڑوں کو پُر کر دیا جائے۔

طریقہ علاج

یہ جرثومہ خون کے غلیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جو اس جرثومے کو غلیوں کے اندر جا کر مار سکیں۔ لہذا عام طور پر اس کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس مرض کے لیے موثر ترین دوا ٹیٹرا سائیکلین (Tetracycline) ہے۔

اس بیماری کے تدارک کے لیے جامعہ زرعیہ، کلیہ حیوانات، شعبہ طفیلیات کے ماہرین تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کی مالی معاونت سے ایک تحقیقی پراجیکٹ پر کام جاری ہے جس میں اس بیماری کی پنجاب کے کچھ پننے گئے اضلاع میں صورتحال، جانوروں میں اس کا تناسب اور ویکٹر میں بیماری پھیلانے والے جرثومے کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس جرثومے کو اس کے دور حیات کے مختلف مراحل کے دوران کسی مرحلے پر قابو کیا جاسکے اور اس ابھرتی ہوئی بیماری کو سراسر اٹھانے سے پہلے ہی قابو کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ شعبہ طفیلیات کے ماہرین مویشی پال حضرات کی اس مرض سے متعلق آگاہی کے لیے وقتاً فوقتاً اخبارات اور رسائل و جرائد میں اپنے مقالہ جات شائع کرتے رہتے ہیں تاکہ مویشی پال حضرات اس سے استفادہ کر سکیں۔

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی تعمیر و ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہی منحصر ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ 2015-16ء کے اقتصادی جائزے کے مطابق زراعت پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار (GDP) میں 19.8 فیصد کردار ادا کرتی ہے اور زراعت میں لائیو سٹاک کا کردار 55 فیصد ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کی روزی روٹی لائیو سٹاک اور مال مویشیوں سے وابستہ ہے لہذا اگر ہمارے جانور صحت مند، توانا اور خوشحال ہوں گے تو ہمارے لوگ بھی اور حتی طور پر پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور ترقی کے منازل طے کرے گا۔ جانوروں کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے ان کو بیماریوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ جانوروں کی بیماریوں میں دور حاضر کا ابھرتا ہوا مسئلہ بیرونی طفیلیات (Ectoparasites) اور ان سے منتقل ہونے والی بیماریاں ہیں۔ یہ بیرونی طفیلیات جانوروں میں مختلف بیماریاں پھیلانے کے ساتھ ساتھ ان کی پیداواری صلاحیت کو بھی کم کرتے ہیں۔ بیماریاں پھیلانے والے ایک خلوی جراثیم جو بیرونی طفیلیات کے ذریعے جانوروں میں منتقل ہوتے ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔ اینا پلازما، تھیلیریا اور ایکلیپیا وغیرہ۔ ریکسیٹی اوسس (Rickettsiosis) پوری دنیا میں مویشیوں اور انسانوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یہ مرض ریکسیٹیا بیکٹیریا کے باعث ہوتی ہے۔ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے اور انسانوں میں یہ مرض روکی ماؤنٹین سپاٹڈ فیور (Rocky Mountain Spotted Fever) کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر ان افراد میں پائی جاتی ہے جو سفر کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس مرض کا امتیازی وصف یہ ہے کہ مریض بخار زدہ رہتا ہے۔ جانوروں میں اس بیماری کے عیاں ہونے کی علامات یہ ہیں کہ دودھ اور گوشت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

تاریخی پس منظر

اس جرثومے کی شناخت سب سے پہلے 1991ء میں چائینہ میں ہوئی۔ وسطی افریقہ میں اس جرثومے کی شناخت 1994ء میں ہوئی اور انسانوں کے اندر اس بیماری کی اطلاع 2005ء میں ہوئی۔ پاکستان میں اس بیماری کے حوالے سے زیادہ مواد موجود نہیں لہذا پاکستان میں اس بیماری پر تحقیق کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس بیماری کی موجودگی اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کا سروے کے مطابق تخمینہ لگایا جاسکے اور اس بیماری کو خطرناک حد تک پھیلنے سے پہلے اس پر قابو پایا جاسکے۔

منتقلی کا طریقہ کار

ریکسیٹی اوسس ایک حیوان آدرہ مرض ہے لہذا اس بیکٹیریا کو ایک جانور سے دوسرے جانور میں یا جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کے لیے ایک خط حامل (Vector) کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے خط حامل اس جرثومے کو منتقل کرنے میں مشمل ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم چیچر (Ticks) ہیں۔ چیچر اس جرثومے کی تولید اور منتقلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بیماری چیچروں کے کاٹنے کی وجہ سے ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتی ہے۔ اس مرض کا جرثومہ چیچر کے اندر

الحديث

محمد بن بشر، یحییٰ ابن عدی، سعید، قتادہ، انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر نماز استسقاء کے کسی اور دعا میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے اور (اس میں) اسے ہاتھ اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے لگتی۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک علم اٹھانے لیا جائے گا۔ بکثرت زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے سے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، ہرج میں اضافہ ہوگا، ہرج سے مراد قتل ہے یہاں تک تمہارے اندر مال کی فراوانی ہوگی اس طرح کہ اہل پڑے گا۔

بھیر بکریوں کا انتخاب اور خرید

محمد قمر بلال، محمد اقبال مصطفیٰ، محمد سیف الرحمن..... انسٹیٹیوٹ اینیمل اینڈ ویری سائنسز، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

ہونا چاہیے۔

نر کا انتخاب

نر جانور کو آدھا گلہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی جنسیات ایک مادہ کی نسبت زیادہ بچوں میں موجود ہوتی ہے۔ نسل کی پیداوار اور بڑھوتری کا دار و مدار نر جانور کے انتخاب پر ہوتا ہے۔

نر کا انتخاب اچھی دودھ دینے والی نسل سے کیا جائے اس مقصد کے لیے اس کی ماں کے دودھ کی پیداوار کا ریکارڈ رکھنا مفید ہے۔ نر جانور کو مضبوط عضلات اور مضبوط ہڈیوں کا مالک ہونا چاہیے اور اپنی نسل کے تمام تر عمدہ خواص کا حامل ہونا چاہیے۔ پسلیوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، ٹانگیں سیدھی اور جسم کا وزن سہارنے کے قابل ہوں۔ بکریوں میں نر جانور کے سینک نہیں ہونے چاہئیں تاکہ وہ ممکنہ حادثات سے بچ سکیں۔

برینڈنگ سائڈز انڈیز کے تحت نر جانور کا مکمل معائنہ کرنا بہتر ہے اس پروگرام کے تحت نر جانور کے جسمانی حالت اور بالخصوص تولید و تناسل کی صلاحیتوں کا مکمل جائزہ ضروری ہے۔

یہ پروگرام درج ذیل امور پر مشتمل ہے۔

☆ جسمانی حالت میں کسی قسم کا نقص یا بیماری کی علامت کا پایا جانا اور دیگر اعضاء کا صحیح سالم ہونے کا معائنہ شامل ہے۔

☆ نر جانور کے پاؤں کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہونا چاہیے کیونکہ سمنوں کے بڑھ جانے سے نہ صرف جانور لنگڑا کر چلتا ہے بلکہ ملائی کے وقت بھی اسے دقت ہوتی ہے۔

☆ نر جانور کی ٹانگیں سیدھی، لمبی اور مضبوط ہونی چاہئیں۔

☆ دانتوں کا مکمل طور پر صحیح اور تندرست ہونا ضروری ہے۔

☆ نر جانور کو ہر قسم کے اندرونی و بیرونی کرموں سے پاک ہونا چاہیے۔

☆ نر جانور کے انتخاب میں اہم ترین بات اس کے تولیدی اعضاء کا صحیح اور تندرست حالت میں ہونا ہے۔ نر جانور خریدنے سے پہلے اس بات کی تلی کر لی جائے کہ نر جانور کے دونوں خیمے صحیح سالم اور مناسب سائز کے ہوں۔ کیونکہ کسی بھی نقص کی وجہ سے تولید و تناسل کے نقطہ نظر سے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ خیموں کا سائز تولیدی خلیے کی پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے۔

☆ اس کے علاوہ مصنوعی نسل کشی کے لیے تخم میں موجود حیوانی خلیوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تخم کی ساخت، رنگت اور اس میں موجود زندہ اور مردہ حیوانی خلیوں کا تناسب، نامناسب شکل و صورت کے خلیے اور ان کی حرکات کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تخم میں خون کے دھبے اور خون کے سفید خلیے موجود نہیں ہونے چاہئیں۔ اس میں 85 فیصد سے زیادہ تندرست حیوانی خلیے اور 50 فیصد سے زیادہ حرکات کرنے والے ہوں۔ اس معیار میں کسی قسم کی کمی سے بھیر اور بکریوں کے حاملہ ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔

☆ سائڈ چونکر ریوڑ کی ترقی میں نصف کا ضامن ہوتا ہے اس لیے انتخاب میں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائڈ چست و چالاک، بھرے ہوئے جسم والا، رعب دار اور ہر عیب سے پاک ہونا (باقی صفحہ 20 پر)

بھیر بکریوں کی نسل کشی کے لیے اچھے جانوروں کا انتخاب کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے جانور منتخب کیے جائیں جو پیداواری نظام اور ماحول کے مطابق خود کو ڈھال سکیں اور ان کی فروخت قریبی منڈیوں میں آسان اور موزوں ہو۔ زیادہ تر بھیر بکریوں کو ظاہری خصوصیات کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے لیکن جانوروں کی صحیح پیداوار کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اس لیے بہتر ہے کہ ظاہری تشخیص کے ساتھ ساتھ جانوروں کی کارکردگی کے ریکارڈ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔

جانوروں کے انتخاب کے لیے درج ذیل اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

پیداوار کا حصول

بھیر بکریوں کی نسل کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانور کس مقصد کے لیے پالنے ہیں۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر بھیر بکریاں گوشت اور اون کے لیے جبکہ بکریاں گوشت و دودھ اور بالوں کے حصول کے لیے پالی جاتی ہیں۔ کھالیں اضافی طور پر بھیر اور بکریوں دونوں سے حاصل ہوتی ہیں۔

آب و ہوا سے سازگاری

کسی بھی علاقے کی آب و ہوا ہاں رہنے والے جانوروں کی کارکردگی پر بہت اثر کرتی ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مختلف خطوں میں بھیر بکریوں کی مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں جو کہ اپنے مخصوص علاقوں کی آب و ہوا اور موسمی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ میدانی علاقوں میں رہنے والی بھیر بکریوں کے جسم پر اون کی مقدار کم ہوتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں جہاں شدید سردی پڑتی ہے وہاں کی بھیر بکریوں میں اون اور بالوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ سخت سردی سے بچ سکیں۔ اس لیے جس جگہ فارم کھولنا ہو یا جانور پالنا مقصود ہو اسی علاقے کی آب و ہوا اور موسمی حالات کے مطابق نسل کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔

یکسانیت

جانوروں کو خریدنے سے پہلے یہ جانچنا ضروری ہے کہ تمام جانوروں کی شکل و صورت اور قد و قامت ایک جیسا ہو اگرچہ ایک نسل کے جانوروں میں نسلی خواص ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تاہم جانوروں میں انفرادی طور پر بہت زیادہ فرق نہ ہو

مادہ جانوروں کا انتخاب

بھیر بکریاں دودانت والی تین چار ماہ کی حاملہ خریدنا فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ نسل کشی کے لیے معیاری اور نسلی سائڈ استعمال کیا گیا ہے ورنہ اپنے بھٹ کے مطابق غیر حاملہ بھیر بکریاں خرید کر ان کی ملائی اپنے فارم پر کروائیں تاکہ آنے والی نسل اچھی خصوصیات کی حامل ہو۔ جسم کی بہتر افزائش اور دودھ کی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ مادہ کا قد اونچا ہو، دیکھنے میں صحت مند اور اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑی ہو سکے۔ مادہ جانور کی جلد ڈھیلی ڈھالی، پگھلا اور پگھلا ہو جبکہ گردن پتلی اور سر چھوٹا ہونا چاہیے۔

آنکھیں روشن اور پگھلا ہوں، اچھی دودھ دینے والی مادہ کا حیوانہ نرم اور پگھلا ہونا چاہیے۔ اس میں چربی موجود نہ ہو جس لیے اور سیدھے ہوں اور دودھ دہنے کے بعد حیوانے کو مکمل طور پر خالی

بلیوں کے بارے میں معلومات

شائلہ رحمان، رحمت اللہ شاہد..... شعبہ اناتومی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

خوراک نہیں چا سکتی اس کے دودھ کے 26 دانت ہوتے ہیں جو 6 ماہ کی عمر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں بلی کے 30 مستقل دانت ہوتے ہیں۔ بلی کے دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر Enamel کی موٹی حفاظتی تہہ ہوتی ہے جو دانتوں کو گلنے سے بچاتی ہے، اس کا لعاب (Sliva) زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا اور دانت قریب قریب ہونے کی وجہ سے ان میں خوراک کے ذرات بھی نہیں پھنستے۔ زیادہ میٹھا نہ کھانے کی وجہ سے بھی ان میں Teeth Infections کا امکان کم ہوتا ہے۔ بلی کو خوراک کے طور پر پیاز، لہسن، ٹماٹر، آلو، چاکلیٹ، انگور اور کشمش بالکل نہیں دینے چاہئیں، دودھ ایک بہتر غذا ہے لیکن اسکی زیادہ مقدار سے معدے میں خرابی اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بلیوں میں میٹھا چکھنے کی حس نہیں ہوتی۔ کچھ پودے جیسے Tylenol، Aspirine بلی کے لیے انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح بلی کے جسم پر پسینے کے غدود نہیں ہوتے بلکہ یہ غدود صرف بلی کے پاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ بلی کے بچے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے، جھکوں کو برداشت کرنے، شکار کرنے، جسم کی صفائی کرنے اور چھونے کی حس کا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خشک پتوں پر یہ آواز کے بغیر چل سکتی ہے۔ بلیاں زلزلہ آنے سے 10 سے 15 منٹ پہلے زلزلے کے جھکوں کو محسوس کر لیتی ہیں۔ بلی کے کان میں 32 پٹھے (Muscles) ہوتے ہیں جنکی وجہ سے بلی اپنے کان کو 180 ڈگری کے زاویے میں گھما سکتی ہے۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی ہیں جبکہ ان میں Collar/Clavical (Bone) ہڈی نہیں ہوتی اس لیے جس جگہ یا سوراخ سے بلی کا سر گزر جائے وہاں سے پوری بلی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ بلی کی چمک دار کمر ہے کیونکہ اس میں 53 مہرے ہوتے ہیں جس میں Caudal Vertebrae 3، Sacral 3، Lumbar 7، Thoracic 13 اور دم میں Cervical 7 مختلف تعداد میں ہوتے ہیں۔ بلی اور انسان کے دماغ میں جذبات کو کنٹرول کرنے والے حصے آپس میں بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر بلی کو گھر سے دور دراز جگہ پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی سورج کی روشنی کے زاویے، اپنے سونگھنے کی حس اور دماغ میں موجود مقناطیسی خلیات کی وجہ سے اپنے گھر کا پتہ معلوم کر لیتی ہے جو کہ قطب نما کا کام کرتے ہیں۔ بلی کا دل ایک منٹ میں 110 سے 140 مرتبہ دھڑکتا ہے جو انسانی دل کے دھڑکنے کی رفتار کا دگنا ہے، اگر بلی کے جسم کا درجہ حرارت، 100، ڈگری فارن ہائیٹ سے کم یا 103 ڈگری فارن ہائیٹ سے زیادہ ہو تو بلی بیمار سمجھی جاتی ہے۔ بلیاں ایک دن کا 2/3 حصہ سونے میں گزارتی ہیں اس کا مطلب ہے ایک بلی جس کی عمر 9 سال ہو وہ اپنی زندگی میں صرف 3 سال جاگ کے گزارے گی، جتنا وقت بلی جاگتی ہے وہ سارا وقت اپنی صفائی میں لگی رہتی ہے۔ مادہ بلیاں 5 سے 10 ماہ میں اور نر بلیاں 5 سے 7 ماہ کے عرصے میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ مادہ بلیوں کی مدت حمل 64 سے 67 دن ہوتی ہے۔ زیادہ تر بلیاں ایک سے نو بچے دیتی ہیں لیکن سب سے زیادہ 19 بچے پیدا کرنے کا ریکارڈ ہے۔ سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی بلی کا نام Dusty تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں 420 بچے دیے تھے۔ بلی کے ایک جوڑے کے بچوں سے سات سال کے عرصے میں چار لاکھ بیس ہزار نئے بچے (kitten) پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ سب سے بڑی نسل کی بلی (Ragdoll) ہوتی ہے جسکے وزن 12 تا 20 اور مادہ کا وزن 10 تا 15 پاؤنڈ ہوتا ہے۔

(باقی صفحہ 38 پر)

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات اور فائدے ہیں۔ ان جانوروں میں ایک بلی بھی ہے، بلی کے خاندان میں شیر، لپرڈ اور چیتا شامل ہیں۔ اس خاندان میں موجود تمام جانوروں کو Felid بھی کہتے ہیں۔ بلی چھوٹی، پیاری اور گوشت خور ممالیا جانور ہے جو گھروں میں پالتو جانور کے طور پر پالی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے اپنا ساتھی بنانے اور چوہے پکڑنے کے لیے پالتے ہیں۔ مغربی امریکہ میں سب سے زیادہ پالتو جانور بلیاں ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت 73 لاکھ بلیاں موجود ہیں۔ جس میں 30 فیصد گھروں میں پالی جاتی ہیں اور ان میں 40 فیصد خاص نسل کی بلیاں ہیں۔ 2007ء میں گیلپ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ مرد اور خواتین دونوں ہی بلیاں پالنے کے شوقین ہوتے ہیں اور بلیوں کے شوقین افراد کو (Ailurophilia) کہتے ہیں۔ غیر مسلم ملکوں میں بلی کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، چین کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بلیوں کو زیادہ سردی کے موسم میں کھانا چاہیے کیونکہ اس کا گوشت گرم تا شیر رکھتا ہے۔ صرف ایشیاء میں سالانہ چار لاکھ سے زیادہ بلیاں کھائی جاتی ہیں۔ ہر سال امریکہ میں 40,000 لوگوں کو بلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ 1750ء میں یورپ کے لوگوں نے پہلی بار بلیوں کو کپڑے، کپڑوں کی روک تھام کے لیے امریکہ میں متعارف کروایا تھا۔ 1871ء میں لندن میں پہلی بار Cat Show منعقد ہوا جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ 1880ء میں مصر (Cemetery) میں تین لاکھ سے زائد حنوط شدہ (Mummified) بلیاں پائی گئی تھیں جنکے اوپر لپٹے کپڑے کو بعد میں امریکہ اور انگلینڈ میں بطور کھاد استعمال کیا تھا۔ اس وقت مصر میں بلیوں کی سنگت کرنے پر سزائے موت ہے۔ 1919ء میں بلی کا پہلا کارٹون (Felix) بنایا گیا تھا۔ 1930ء میں روس کے سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ جسم کا درجہ حرارت بدلنے سے Siamese نسل کی بلی کے جسم کے مختلف حصوں کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے یہ خصوصیت صرف Siamese نسل کی بلی میں پائی جاتی ہے۔ 1940ء میں Tom and Jerry تھیٹر میں چلائے جانے والے پہلے کارٹون تھے۔ 1963ء میں فرانسیسی نے Felicette نامی بلی کو پہلی بار خلا میں بھیجا تھا۔ Towser نامی بلی نے اپنی پوری زندگی میں 30,000 چوہے پکڑے تھے اس کے نام پر سکاٹ لینڈ میں ایک Commemorative Tower بنایا گیا تھا۔ امریکہ میں گھریلو بلیاں جنگلی حیات کی سب سے بڑی شکاری ہیں جو ہر سال 1.4 سے 3.7 ارب پرندے اور 6.9 سے 20.7 ارب ممالیا جانوروں کا شکار کرتی ہیں اور اس شکاری وجہ سے پرندوں کی 36 اقسام دنیا سے ختم ہو گئی ہیں، بلیوں کے جسم پر 130,000 فی مربع انچ کے حساب سے بال ہوتے ہیں۔ 24 بلیوں کی کھال سے ایک کوٹ بنایا جاسکتا ہے، اسکے علاوہ بلی کی کھال سے ٹوپیاں، کمبل، جوتے، دستانے، پرس اور کھلونے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ بلی کا جسم مضبوط، لچکدار، ہوشیار اور شکار پکڑنے کے لیے اسکے نوکیلے پنچے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں بلی بہت کم جیسے چوہے کی آواز اور زیادہ فریکوئنسی جیسے چوہے کی آواز سن سکتی ہے۔ بلی مختلف رنگوں میں فرق نہیں کر سکتی جبکہ یہ اندھے میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ بلی درخت سے نیچے اترتے ہوئے پہلے اپنے جسم کا پچھلا حصہ زمین کی طرف لٹکاتی ہے کیونکہ اس کے پنجوں کے ناخن پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ بلی کے جڑے اطراف میں حرکت نہیں کر سکتے اس لیے بلی زیادہ مقدار میں

اوٹنی کا جدید ڈیری فارمنگ اور انسانی بیماریوں کی روک تھام میں مؤثر کردار

فیصل شہزاد، محمد یعقوب، محمد بلال..... کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز اسلام آباد یونیورسٹی بہاولپور، کلیہ پرورش حیوانات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

سورج کی نقصان دہ شعاعیں، خشک کالا پانی، گھاس بھوس کا اعلیٰ کوالٹی کا موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان حالات میں گائے، بھینس، بکری جیسے جانوروں سے نہ صرف دودھ کی پیداوار ختم ہو جاتی ہے بلکہ سایہ دار جگہ، ٹھنڈا پانی اور چارہ کے بروقت مہیا نہ ہونے کی وجہ سے اموات کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ مگر ایسے حالات میں اوٹنی درج بالا جانوروں کے مقابلے میں نہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے بلکہ دودھ بھی فراہم کرتی رہتی ہے۔

پانی کی کمی کا دودھ کے اجزا پر اثرات

ایک تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر دودھ دینے والی اوٹنی کو 7 دن تک پیاسا رکھ جائے تو پھر 2 گھنٹے کے لیے پانی مہیا کیا جائے تو اس میں درج ذیل تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔

اس کے دودھ میں پانی کی مقدار کا تناسب 90 فیصد سے زیادہ تھا اور چربی کی مقدار میں بھی 1% اضافہ ہو گیا اور نمکیات اور حیاتین کی مقدار میں بھی اضافہ پایا گیا۔

پانی اور نمکیات کے بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سخت گرمی میں بھی اوٹنی کے حیوانے سے پانی اس کے جسم کی ضرورت کے لیے جذب نہیں ہوتا کیونکہ ALDOSTERONE اور VASOPRESIN یہ دونوں ہارمونز جسم میں پانی اور نمکیات کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کی کمی کی وجہ سے ان دونوں ہارمونز کی مقدار کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانے کے ساختہ جن غدود پر مشتمل ہوتی ہے اس کی وجہ سے حیوانے میں پانی کی مقدار زیادہ محفوظ ہوتی ہے جو جسم کے پانی کو بھی حیوانے میں جذب کرواتے ہیں۔ جس سے حیوانے میں پانی کی مقدار مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل غور توں، چوہیوں اور کتیا بھی میں بھی پایا جاتا ہے۔

عام طور پر جب اوٹنی کو کم پانی پینے کو ملے تو اس کا دودھ پتلا ہو جاتا ہے اور اس میں نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ شیر خوار بچے کی غذائی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے صحرائوں میں سفر کرنے والے مسافر بھی اپنے ساتھ اوٹنی کا دودھ رکھتے ہیں۔ مزید برآں PH اور VITC کی زیادہ مقدار اوٹنی کے دودھ کو خوش ذائقہ بناتی ہے۔ مہیا کرتی ہے اور اس وجہ سے نہ صرف دودھ زیادہ پتلا بھی ہو جاتا ہے بلکہ اس کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی چیز اس کو بکری، بھینس اور گائے سے ممتاز کرتی ہے اور ہم اس کو زیادہ دودھ دینے والے جانوروں میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔

پرانی کہاوت ہے کہ جب انسان گرم علاقوں میں قحط اور خشک سالی سے مر رہا تھا تو خدا نے اوٹنی کے دودھ کی صورت میں اس کی جان بچائی۔

بوہلی

عام طور پر خانہ بدوش اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بوہلی زہریلی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ نوزائیدہ بچھڑوں کو بوہلی نہیں پلاتے جس سے ان کی نہ صرف قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے۔ بلکہ ان کی موت کا بھی سبب بنتی ہے۔ اوٹنی کی بوہلی گائے کی بوہلی کی طرح پہلی سے لال رنگ کی بجائے سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ جس میں کم چربی اور زیادہ نمکیات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ دست آور ہوتی ہے۔ جس سے بچھڑے کا نظام انہضام متحرک ہو جاتا ہے۔

عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ اوٹنی گائے کے مقابلے میں کتنا دودھ دے سکتی ہے؟ وہ لوگ جنہیں ان دونوں جانوروں کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہیں یا وہ پرانی معلومات پر دھیان دیتے ہیں تو ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ نہ تو گائے ہے اور نہ ہی اس کا موازنہ گائے سے کیا جانا چاہیے اس کی بنیادی وجہ ماحول ہے کیونکہ ماحول کا جانور پر بہت اثر ہوتا ہے۔ موہی تبدیلیاں دودھ کی پیداوار پر اثر کرتی ہیں۔ یہ بات ہمارے ادراک میں ہونی چاہیے کہ اوٹنی ایسے علاقے میں رہتی ہیں جہاں خشک سالی اور قحط سالی بعض اوقات اپنے عروج پر ہوتی ہے مثلاً چلستان کا علاقہ مگران اتر حالات میں اوٹنی سے دودھ کا حاصل ہونا باقی جانوروں کی نسبت اس کی اہمیت کو جتلاتا ہے اور ایسے علاقے میں اوٹنی کے علاوہ کوئی اور جانور دودھ دینا تو دراپنے آپ کو زندہ بھی نہیں رکھ پاتا اور ایسے وقت میں اس کے دودھ کی تھوڑی سی مقدار بھی صحرائیں رہنے والوں کے لیے حیات ہے۔

اونٹوں کو تین ہزار سال پہلے دودھ کے لیے یا بار برداری کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد جنگی فوجوں کا جدید ہتھیاروں سے آراستہ ہونے پر اونٹ کا بار برداری کے طور پر استعمال کم ہو گیا اور اس وجہ سے اس کو ابتدائی زمانے یا معاشرے کا جانور سمجھا جانے لگا اور اس کو جدید فارمنگ کے طور پر تو درکنار اس کو فارم اینیمل بھی سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گائے کو جو سرکاری سرپرستی حاصل ہے وہ اونٹوں کو نہیں ملی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ ایک صحرائی جانور ہے اور اچھے دودھ والا جانور نہیں بن سکتا حالانکہ یہ گائیوں اور بکریوں کی نسبت بہت حد تک اعلیٰ خاصیت کا دودھ دینے والا جانور ثابت ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ابھی تک کوئی ایسے اقدام نہیں کیئے گئے جس سے اونٹوں کی فارمنگ کو فروغ ملے۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں میں خوراک کی کمی ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اونٹوں کی ڈیری فارمنگ کو ابھی تک کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ انتہائی خشک حالات میں جب دوسرے جانور اپنے آپ کو سلامت نہیں رکھ پاتے، اوٹنی نہ صرف اپنی جسمانی نشوونما کو برقرار رکھتی ہے بلکہ اپنے مالک کے لیے دودھ بھی مہیا کرتی ہے۔

ان سب باتوں سے قارئین کے دماغ میں درج ذیل سوالات ابھرتے ہیں جن کا جواب دیا جانا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ ان کو پڑھ کر ہمیں اوٹنی کے دودھ کا اندازہ ہوگا۔

- 1- کیا اوٹنی خشک سالی کے دوران اپنے دودھ دینے کی صلاحیت کو برقرار رکھ سکتی ہے؟
- 2- کیا واقعی منطقی مسائل اوٹنی کے دودھ دینے کی صلاحیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟
- 3- اوٹنی کے دودھ کی پیداوار کو کیسے بڑھایا جاسکتا ہے؟
- 4- اوٹنی کے دودھ کے کیا کیا استعمالات ہو سکتے ہیں؟
- 5- اگر جدید دور میں اوٹنی کے دودھ کا استعمال فائدہ مند ہے تو خانہ بدوشوں کو ابھی تک اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟

خشک سالی میں اوٹنی کے دودھ کی پیداوار

گرم اور خشک زدہ علاقوں میں اوٹنی کی بانسبت گائے، بھینس، بھینس اور بکریوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ علاقے دن میں سخت گرمی، راتوں میں ٹھنڈک،

اؤٹنی کے دودھ کا منطقی جائزہ

یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ اؤٹنی اس وقت بھی دودھ دیتی رہی ہے جب بچوں کے کھانے پینے کے لیے کوئی خوراک میسر نہیں ہوتی (قط سالی میں) اؤٹنی کے دودھ کا یوں بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں کل 9,20,000 اونٹ ہیں جن میں سے 4,10,000 بھی اونٹنیاں ہوں اور ہر ایک کم سے کم 5 لٹر دودھ دے تو تقریباً 20,50,000 لٹر بن جاتا ہے اور اگر ایک بچہ 1 لٹر دودھ روزانہ پیئے تو پاکستان کے قط سالی والے علاقے میں 20,50,000 بچوں کی غذا کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔

عام طور پر اؤٹنی کا دودھ گھر کیلوا استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب جبکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے تو دودھ کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں۔ تاکہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے اندرونی اور بیرونی کرموں سے بچانا ضروری ہے۔ اگر ہم فارمنگ کو جدید سائنسی بنیادوں پر کریں اور اندرونی اور بیرونی کرموں کو بھی کنٹرول کریں تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم تازہ دودھ کی منڈیوں تک پہنچانے تک جو مسائل درپیش ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کی آپس کی مزاحمت کو بھی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف شہروں میں اؤٹنی کے دودھ کے سینٹر بنادینے جائیں۔ جو نہ صرف دودھ اور گوشت کو مہیا کریں بلکہ دوائیاں اور علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اونٹوں کے مالکوں کو جدید طریقے بھی سکھائیں۔

دودھ کی بدھوتی میں کارآمد عوامل

1- وراثتی ٹرنگار (Genetic Makeup)

دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے وراثتی ٹرنگار کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس امر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جانوروں کے انتخاب، مصنوعی نسل کشی اور جدید ٹیکنالوجی مثلاً ایمبر، ویوٹرانسفر کا استعمال کافی حد تک دودھ کی پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے۔

2- صحت مند جانور

صحت مند جانور زیادہ دودھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اونٹ کے علاج کے لیے گائیوں یا گھوڑوں کی دوائیاں استعمال کی جارہی ہیں جن کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اونٹ کے جسم میں پانی کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت باقی تمام جانوروں سے مختلف ہے۔ اس لیے دوائی کے اثرات چاہے گوشت میں ہوں یا رگ میں ہوں یہ مختلف طرح سے رد عمل ظاہر کرتا ہے اسی وجہ سے دوائی لگانے سے پہلے 3% نمکیات والا 50 سے 100 لٹر پانی پلایا جائے تاکہ دوا کے اثرات اس کے جسم کے ماحول کے مطابق حاصل کیئے جاسکیں۔

3- Milking Machines

عام طور پر حیوان کی ساخت اور تھنوں کی لمبائی میں سائز کے فرق ہونے کی وجہ سے ملکنگ مشین کا استعمال اس جانور میں مشکل نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا زیادہ استعمال بھی نہیں کیا جا رہا مگر ہم اس کی فارمنگ کو جدید طریقہ پر کریں تو بریڈر کی وجہ سے نہ صرف ہمیں مناسب جانوروں کا انتخاب کرنے میں مدد ملے گی بلکہ ملکنگ مشین کا استعمال بھی اس کی فارمنگ میں ہو سکے گا۔

دودھ کے استعمالات

دودھ کا سب سے بنیادی استعمال پینا ہے۔ اگر اس کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے تو اس کو پراسس کر کے بڑے پیمانے پر دودھ کے علاوہ اور بھی مصنوعات یعنی تیاری جاسکتی ہیں۔

Pasteurization or Not

مگر ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا اؤٹنی کے دودھ کو پائچرائز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں مٹی اور گرد و غبار کی وجہ سے اس کے دودھ کو حفظان صحت کے

اصولوں کے مطابق نہیں سمجھا جاتا مگر تجربہ بات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ جو جڑی بوٹیاں اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ایسے اجزاء بھی دودھ میں شامل ہو جاتے جو کئی بیماریوں کے خلاف بہتر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دودھ کا استعمال دوسرے جانوروں کی طرح کیا جاسکتا ہے بلکہ یہ قدرتی طور پر صحت میں اضافہ بھی کرتا ہے مگر اس کے لیے ہمیں اؤٹنی کے تھنوں کو دودھ سے پہلے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کرنا پڑے گا تو نہ صرف ہم صرف بیماریوں سے پاک بلکہ ملکنگ مشین پر بھی اچھی کوالٹی کا دودھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اؤٹنی کے دودھ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں مختلف بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے اور کئی لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ یہ دودھ ٹی بی کے جراثیم تباہ کرتا ہے اس لیے اس میں Antiviral اور Antibacterial خصوصیات ہیں۔

شوگر کا علاج

اؤٹنی کے دودھ میں شوگر کے مریضوں کے لیے شفاء ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تجربہ بات سے پتہ چلا ہے کہ اس دودھ میں ایک حیاتین ایسی بھی ہے جو کہ Insulin جیسی ہے۔ ایک تجربے کے مطابق اؤٹنی کے دودھ میں Insulin 40 یونٹ پر لیٹر پائی گئی ہے۔ انسولین ایک حیاتین ہے جو کہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معدے میں جاکر دودھ جم جاتا ہے۔ جس پر Pepsin اور معدے کا تیزاب اثر کرتے ہیں اور اس کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ لیکن اؤٹنی کے دودھ میں قدرتی یہ صلاحیت ہے کہ وہ جمتا نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے دودھ میں موجود Insulin زیادہ مقدار میں معدے سے صحیح سلامت بچ کر آگے نکل جاتی ہے اور انسانی ضروریات پوری کرتی ہے۔

Liver Problems

برائے نام ایشیا میں جگر کے امراض کے لیے اؤٹنی کا دودھ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جس کی Bileduct کام نہیں کرتی تھی۔ کو پہلے گائے کے دودھ پر رکھا گیا۔ لیکن طبیعت بگڑتی گئی لیکن جب اؤٹنی کے دودھ پر رکھا گیا تو Liver Transplant ہونے تک اس کی طبیعت برقرار رہی۔ بہت حد تک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دودھ میں vit.C کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو کہ جگر کے افعال میں مدد کرتا ہے۔

نوزائیدہ انسانی مولود کے لیے اؤٹنی کے دودھ کی اہمیت

ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 145 ملین خوراک کی کمی والے بچوں میں سے 4-5 ملین بچوں کی اموات اسہال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان میں 80 فیصد کی موت عمر کے 2 سال پورے ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ریسرچ کی جارہی ہے کہ جن علاقوں میں اسہال کے زیادہ مسائل ہیں وہاں ماں کے دودھ کی بجائے اؤٹنی کا دودھ استعمال کیا جائے تاکہ ان بیماریوں پر قابو پایا جاسکے۔

عام جسمانی تھکان


ایک آدمی جس نے پچھلے دو سالوں سے 2 گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں کیا تھا۔ ہر طرح کا علاج کرنے کے باوجود اس کی کمزوری کی وجہ پتہ نہ لگ سکی آخر کار تھک ہار کر اس نے اؤٹنی کا دودھ پینا شروع کر دیا اور وہ صرف 6 ماہ بعد ہی 8 گھنٹوں سے زیادہ کام کرنے لگا اور اس نے بتایا کہ اسے اسے بہت زیادہ طاقت محسوس ہوتی ہے اور وہ تھکا بھی نہیں ہے البتہ اس نے شکایت کی کہ اس کی Sexual Power بڑھ گئی ہے۔

(باقی صفحہ 40 پر)

کھل بنولہ: نہ کھانے کی وجوہات

شوکت علی بھٹی، اقرار احمد رانا..... انسٹیٹیوٹ آف انٹل انیڈری سائنسز، سنٹر فار ایگریکلچرل بائیو کیمسٹری اینڈ بائیو ٹیکنالوجی (کیب)، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

درج بالا بات کو ثابت کرنے کے لیے گائیوں اور بھینسوں میں بی ٹی کاٹن اور دیسی کپاس سے حاصل شدہ مکھل بنولہ کو جب بیک وقت جانوروں کے سامنے رکھا گیا تو جانوروں نے ہر طرح سے حاصل شدہ مکھل کو برابر رغبت سے کھایا اور بی ٹی کاٹن یا دیسی کپاس سے حاصل شدہ مکھل بنولہ میں فرق نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو جانور پہلے سے مکھل کھانے کے عادی نہیں تھے انہوں نے کوئی بھی مکھل نہیں کھائی اور جب کھانا شروع کر دی تو کسی مکھل کی کھانے میں امتیاز نہیں برتا۔ بھینسیں اگر پہلے سے مکھل کھانے کی عادی نہ ہوں تو مکھل کو پسند کرنے میں زیادہ دیر لگاتی ہیں جبکہ گائیں جلدی اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں اور کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مکھل نہ کھانے کی وجہ اصل بی ٹی کاٹن نہیں،



بلکہ بی ٹی کاٹن سے حاصل شدہ بنولے کو سنبھالنے سے ہے۔ اگر بنولہ بارش سے بچا لیا جائے تو جانور اس سے کھل کھالیں گے اور اگر وہ جھجک گیا تو اس سے بچ کھل جانور غربت سے نہیں کھائیں گے۔

[illegible]

کھل بولہ دووہیل جانوروں کے لیے ایک من پسند خوراک کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ آج کل بھی قیمت کے لحاظ سے یہ ایک منگنی خوراک میں شامل ہے۔ اس میں پروٹین 23، کل قابل ہضم اجزاء 63، ریشرہ دار اجزاء 26 اور معدنیات 6.5 فیصد ہیں۔ کھل بولہ کھلانے سے دووہیل جانوروں کے دووہیل میں ایک خاص قسم کی خوشبو بھی آتی ہے جو پسند کی جاتی ہے۔ جو پچھلے چند سالوں میں جب سے بی ٹی کپاس یہاں پاکستان میں متعارف ہوئی ہے، کھل بولہ کے بارے میں شکایت آتی شروع ہو گئی کہ جانور کھل بولہ رغبت سے نہیں کھاتے۔ اس بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بی ٹی کاٹن کے اندر ایک زہریلا مادہ ہے جس کی وجہ سے جانور کھل نہیں کھاتے۔ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ کھل بولہ بناتے وقت اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کھل نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ کھل نہ کھانے کی وجہ کیڑے مار ادویات کا استعمال بتاتے اور کچھ لوگوں کے خیال میں کپاس کا کیڑا (Pink ball worm) اس کا سبب ہے کیونکہ اس کی بدبو بڑی ناگوار ہوتی ہے اور کھل بولہ میں اس کے اثرات کی وجہ سے جانور کھل نہیں کھاتے۔ بولہ کھل نہ کھانے کا سبب جاننے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اینڈومنٹ فنڈ کے تعاون سے ایک تحقیقی منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے میں گائیوں اور بھینسوں میں مقامی کپاس اور بی ٹی کپاس سے بنی ہوئی کھل بولہ کو جانوروں کے سامنے رکھا گیا اور



کپاس اُگانے والے کسانوں اور بولہ مل مالکان سے بھی انٹرویو کیے گئے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ بیشک کھل بولہ نہ کھانے کی شروعات اس وقت سے ہوئیں جب سے بی ٹی کاٹن متعارف ہوئی مگر نہ کھانے کی وجہ بی ٹی کاٹن نہیں ہے۔ اسکی اصل وجہ بی ٹی کاٹن کی چٹائی کا موسم ہے۔ بی ٹی کاٹن کی پہلی چٹائی مئی جون میں ہو جاتی ہے اور دوسری چٹائی ستمبر کے مہینے میں ہوتی ہے۔ بی ٹی کاٹن کی پہلی چٹائی سے حاصل شدہ کپاس یا بولہ اگر کھلے آسمان تلے پڑے ہوں اور اس کے اوپر بارش ہو جائے تو نئی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور موسمی حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے کپاس/ بولہ میں بیکٹیریا کے اثرات کی وجہ سے خیر (Fermentation) کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جس سے بولہ گرم ہو کر بدبودار ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ بھی سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اس بولے سے بنی ہوئی کھل جانور غربت سے نہیں کھاتے۔ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتیں وہاں کی بی ٹی کاٹن بولہ سے حاصل شدہ کھل جانور غربت سے کھا لیتے ہیں۔

پولٹری ہاؤس کے لیے گرم موسم کے انتظامات

نواد احمد*، محمد اشرف**، محمد شریف*، عمر یعقوب*..... انسٹیٹیوٹ اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز*، سب کیسپس ٹوپیک سگھ**، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پرندوں سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں اس کا ایک اہم حصہ مناسب درجہ حرارت کی فراہمی بھی ہے۔ پرندوں کو زندگی کی باقی ضروریات کے ساتھ ساتھ مطلوبہ درجہ حرارت مہیا کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ یا کم درجہ حرارت پرندوں اور جانوروں کی پیداوار کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر پولٹری ہاؤس کا درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو پرندوں کی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

خوراک اور خوراک کے انتظامات

زیادہ درجہ حرارت پر کوئی بھی ایسا عمل جو پرندوں کے خوراک کھانے کے عمل میں کمی نہ آنے دے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ان کی پیداوار میں کمی کو روکے گا کیونکہ درجہ حرارت کا ایک خاص حد سے بڑھ جانے سے پرندے خوراک کھانا کم کر دیتے ہیں اور ان کے جسم کی ضروریات پوری نہ ہونے کے باعث پیداوار بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔

- 1- درج ذیل تین باتوں پر عمل کر کے ہم پرندوں میں شرح خوراک کو کم ہونے سے روک سکتے ہیں۔
1- پرندوں کو پانی ڈینٹیشن خوراک دی جائے، مطلب ایسی خوراک جس کا حجم کم اور اس میں انرجی اور لحمیات کی مقدار زیادہ ہو اور خوراک کو دن کے ٹھنڈے اوقات میں دیا جائے۔
- 2- پرندوں کو دو پہر کے وقت خوراک نہ دی جائے اور صبح شام پولٹری ہاؤس کی لائٹ چلانے کے بعد اور لائٹ کو بند کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے فراہم کیا جائے۔
- 3- شام کے وقت پولٹری ہاؤس کا درجہ حرارت کم کر دیا جائے تاکہ پرندے اپنے جسم کی انرجی آسانی سے خارج کر سکیں اس طرح سے شام کے وقت ان کے جسم پر حرارت کا جود ہاؤس ختم ہو جائے گا اور اگلے دن وہ اچھی طرح سے خوراک کھائیں گے۔

ہاؤس کی تعمیر

ہاؤس تعمیر کرنے کی جگہ، ہاؤس کی انسولیشن، چھتوں کی بناوٹ اور آلات وہ تمام چیزیں ہیں جو ہاؤس کے اندر کے درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں اوپن ہاؤس کی بجائے کنٹرولڈ انوائزمنٹ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں جن کی دیواروں اور چھتوں کی انسولیشن زیادہ بہتر ہے۔ تمام پولٹری ہاؤسز کی سمت مشرق سے مغرب کی طرف ہونی چاہیے۔ اس طرح سے سائینڈ والی دیواروں سے سورج کی تپش ہاؤس میں داخل نہیں ہوگی۔ ہاؤس کی چھت کو دونوں اطراف سے بڑھادینے سے بھی تپش کم داخل ہوگی۔ دیواروں اور چھتوں کی انسولیشن بہتر ہونی چاہیے اس کا فائدہ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں ہوگا۔ بین الاقوامی طور پر تمام پولٹری ہاؤسز کی چھتوں اور دیواروں کی ”آر۔ ویلیو“ 18 رکھی جاتی ہے۔

حرارت کی وجہ سے پیدا ہونے والی سڑکس کم کرنے کے طریقے

- پولٹری ہاؤس کے اطراف میں موجود خالی جگہ پر گھاس اُگانے سے ہاؤس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ اس کو وجہ یہ ہے کہ گھاس سورج سے آنے والی شعاعوں کو ہاؤس کے اندر جانے سے روکتی ہے جو خالی زمین سے ٹکرا کر ہاؤس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھاس کی لمبائی ہوا کے چلنے کے عمل پر اثر انداز نہ ہو۔

(باقی صفحہ 20 پر)

اس درجہ حرارت پر پرندے بہت تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے جسم سے حرارت خارج کرتے ہیں۔ پرندوں کے اس خاص عمل کو پینٹنگ کہا جاتا ہے۔ پرندے دوسرے جانوروں کی طرح اپنے جسم سے حرارت خارج نہیں کر سکتے کیونکہ انکو پسینہ نہیں اور انکو صبح سے انرجی خارج کرنے کے لیے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے انکی پیداوار اسی لحاظ سے کم ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت پرندوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کی وضاحت درج ذیل نکات سے کی جاسکتی ہے۔

- 1- 55 سے 75 ڈگری فارن ہائیٹ: درجہ حرارت کی اس رینج کو تھر مو نیوٹل زون کہا جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر پرندوں کو اپنے جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے کوئی اضافی کام نہیں کرنا پڑتا۔
- 2- 65 سے 75 ڈگری فارن ہائیٹ: مثالی درجہ حرارت کی حد۔ اس درجہ حرارت پر پرندے بہت اچھی طرح سے نشوونما پاتے ہیں۔
- 3- 75 سے 85 ڈگری فارن ہائیٹ: یہ درجہ حرارت کہ وہ حد ہے جس پر پرندوں میں شرح خوراک میں کمی کی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی طرح سے پرندوں میں شرح شرح خوراک میں کمی کو روک لیا جائے تو ان کی پیداوار متاثر نہیں ہوتی۔ درجہ حرارت جب اس حد کی اوپر والی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو انڈے دینے والے پرندوں کی پیداوار میں کمی کی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انڈے کا سائز اور کم ہونے لگتا ہے اور ان کا چھلکا بھی باریک ہو جاتا ہے۔
- 4- 85 سے 90 ڈگری فارن ہائیٹ: شرح خوراک میں مسلسل کمی واضح ہوتی ہے۔ اس درجہ حرارت پر پرندوں میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس درجہ حرارت پر ٹھنڈک پیدا کرنے والے نظام کو چلا دیا جائے۔
- 5- 95 سے 100 ڈگری فارن ہائیٹ: درجہ حرارت کی اس حد پر پرندوں میں پانی پینے کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے اور شرح خوراک میں کمی ہو جاتی ہے۔ پرندوں میں شرح اموات بڑھ جاتی ہے۔

زیادہ درجہ حرارت پرندوں کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے

چونکہ پرندے پینٹنگ کے عمل سے اپنے جسم کی انرجی کو کم کرتے ہیں تو اس لیے انہیں بہت تیزی سے سانس لینا پڑتا ہے لیکن اس کا منفی اثر ان کے جسم پر نہ ہوتا ہے کیونکہ جسم میں موجود مائع میں CO2 کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اور جسم کا مائع احساسی حالت اختیار کر لیتا ہے۔ جسم میں موجود مائع کی طبعی حالت میں تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گردوں کو جسم سے زیادہ سے زیادہ نمکیات نکالنے پڑتے ہیں اور گردوں کو

بئیر کے انڈوں اور گوشت کی غذائی اہمیت

حق نواز محمد ہارون اسلم..... انسٹیٹیوٹ آف انیمل اینڈ ڈیری سائنسز زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

دیتے ہیں۔ اسکے ساتھ ساتھ یہ دماغی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور اعصابی نظام کو متوازن رکھتا ہے یہ خون کے سرخ خلیے میں اضافہ کر کے خون کی کمی کو دور کرتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ جسم میں زہریلے مادے اور اضافی دھاتوں (Heavy Metals) کے اخراج کو ممکن بناتا ہے۔ بئیر کے انڈے بہت سی بیماریوں جیسے ٹی بی حتیٰ کہ شوگر کے مرض کے لیے بھی بہت مؤثر ہیں۔

جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بئیر کے انڈے گردے، جگر اور مثانے کے پتھر کے اخراج میں موثر ہیں۔ بئیر کے انڈے میں کالشیئم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے آج کل زیادہ تر عورتیں اور بچے کالشیئم کی کمی کا شکار ہیں اور بئیر کے انڈے اسکا سستا اور آسان حل ہے۔

بئیر کے انڈے ہزاروں سال سے بطور خوراک استعمال ہوتے ہیں اور چینی بہت ساری بیماریوں (Hay fever, Asthma, Rhinitis) اور جلدی بیماریوں کی روک تھام اور علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

بئیر کے انڈے میں اچھے فیٹی ایسڈز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایسی قسم کے کولیسٹرول جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہیں انکی مقدار کو کم کرتے ہیں۔

بئیر کے انڈے میں وٹامنز اور منرلز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ درج ذیل جدول سے ظاہر ہے۔

وٹامنز	مقدار	منرلز	مقدار
وٹامن اے	48.9 انٹرنیشنل یونٹ	کالشیئم	5.8 ملی گرام
وٹامن بی	0 ملی گرام	آئرن	0.3 ملی گرام
تھامین	0 ملی گرام	میگنیشیم	1.2 ملی گرام
رابوفلاوین	0.1 ملی گرام	فاسفورس	20.3 ملی گرام
نیا سین	0 ملی گرام	پوٹاشیم	11.9 ملی گرام
وٹامن B6	0 ملی گرام	سوڈیم	12.7 ملی گرام
فولیرٹ	5.9 مائیکرو گرام	زنک	0.1 ملی گرام
وٹامن B12	0.1 مائیکرو گرام	کوپر	0.0 ملی گرام
.....		میگنیز	0 ملی گرام
.....		سلینیئم	2.9 مائیکرو گرام

بئیر کے انڈے کی غذائیت کا جائزہ

کیلوری یا حرارے	14 کیلوری
سچورٹائیڈ فیٹ	0 گرام
کولیسٹرول	76 ملی گرام
سوڈیم	13 ملی گرام
کاربوہائیڈریٹ	0 گرام

بئیر گرم علاقے میں پایا جانے والا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور کچھ نسلوں میں انڈے دینے کی شرح بہت کم ہے لیکن ان سب میں جاپانی بئیر کی مادہ میں انڈے دینے کی شرح سب سے زیادہ ہے جو کہ سالانہ 200 سے 300 تک ہو سکتی ہے۔ بئیر زمانہ قدیم میں سب سے پہلے مصر میں پالا گیا پھر بعد میں انیسویں صدی میں بئیر کی فارمنگ چین اور جاپان میں ہوئی اور اب اس کو پوری دنیا میں پالا جاتا ہے۔ اس کی فارمنگ، مرغابی سے قدرے آسان ہے اور اس پر لاگت بھی کم آتی ہے۔ بئیر یا کوئل (Quail) کو پہلی دفعہ جاپان میں 1595ء میں گھریلو پرندے کے طور پر پالا گیا۔ پاکستان میں بئیر کی دو نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نسل کے بئیر کا رنگ سیاہ مائل جبکہ دوسری نسل کے بئیر کا رنگ بھورا مائل ہے۔ بھورے رنگ کے بئیر کو گوشت کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔

بئیر کے انڈے

بئیر بچھے ہفتے کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے اور مادہ سات ہفتے کی عمر میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اسکے انڈے قدرے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں جن پر کالے دھبے ہوتے ہیں۔ انڈے کا وزن 9 تا 10 گرام اور انڈے دینے کی شرح تقریباً 80 فیصد ہے۔

بئیر کے انڈے کی غذائیت

ایک انڈہ جس کا وزن 9 گرام ہو اس میں 14 کیلوریز ہوتی ہیں اس میں چکنائی کی مقدار 1 گرام جبکہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کی مقدار بالترتیب 0 گرام اور 1 گرام ہے۔ اس میں High Density Lipoprotein کولیسٹرول کی مقدار 76 ملی گرام تک ہو سکتی ہے اور سوڈیم کی مقدار صرف 13 ملی گرام تک ہوتی ہے۔ اس میں پائے جانے والے وٹامنز اور منرلز کی مقدار کچھ یوں ہے۔

وٹامنز اور منرلز	مقدار (فیصد)
وٹامن اے	1
وٹامن بی	0
کالشیئم	1
آئرن	2

بئیر کے انڈوں کے فوائد

بئیر کے انڈے معدنیات اور وٹامنز سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس میں 13 فیصد پروٹین ہے جبکہ مرغی کے انڈے میں صرف 11 فیصد پروٹین ہے۔ اسی طرح بئیر کے انڈے میں 140 فیصد وٹامن بی ون ہے اور اس کے برعکس مرغی کے انڈے میں صرف 50 فیصد ہے۔ وٹامن اے کی مقدار مرغی کے انڈے کے مقابلے میں دوگنی ہے بئیر کے انڈہ میں مرغی کے انڈے سے پانچ گنا زیادہ آئرن اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ بئیر کا انڈہ الرجی کی وجہ بھی نہیں بنتا درحقیقت بئیر کے انڈے میں کچھ ایسی پروٹین ہوتی ہیں جو کہ الرجی کی وجہ بننے والے عوامل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

باقاعدگی سے بئیر کے انڈے کا استعمال بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ پیٹ کے السر اور خوراک کی نالی کو قدرتی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ بئیر کے انڈے مدافعتی نظام کو مضبوط اور صحت کو فروغ

وٹامن	مقدار	منزل	مقدار
وٹامن اے	52.4 انٹرنیشنل یونٹ	کیٹشیم	12 ملی گرام
وٹامن بی	6.6 ملی گرام	آئرن	4.1 ملی گرام
تھامین	0.3 ملی گرام	میگنیشیم	23 ملی گرام
رابوفلاوین	0.3 ملی گرام	فاسفورس	282 ملی گرام
نیاسین	7.5 ملی گرام	پوٹاشیم	218 ملی گرام
وٹامن B6	0.5 ملی گرام	سوڈیم	46.9 ملی گرام
فولیت	6.4 مائیکرو گرام	زک	2.5 ملی گرام
وٹامن B12	0.4 مائیکرو گرام	کوپر	0.5 ملی گرام
.....		میگنیز	0 ملی گرام
.....		سلیمنیم	16 مائیکرو گرام

بئیر کے گوشت میں کولیسٹرول کی مقدار

نوٹل فیٹ	4.2 گرام
سچو ریٹینڈ فیٹ	1.2 گرام
مونوسچو ریٹینڈ فیٹ	1.2 گرام
اومیگا 3 فیٹی ایسڈ	46 ملی گرام
اومیگا 6 فیٹی ایسڈ	856 ملی گرام

بئیر اور مرغی کے گوشت کی غذائیت کا تقابلی جائزہ (100 گرام وزن)

مرغی	بئیر	
134	263	حرارے (کلو کیلوریز)
5	16	نوٹل فیٹ (گرام)
41	142	چکنائی سے حاصل کردہ کیلوریز
1	3	سچو ریٹینڈ فیٹ (گرام)
70	41	کولیسٹرول (ملی گرام)
51	451	سوڈیم (ملی گرام)
0	15	کاربوہائیڈریٹ (گرام)
0	1	فائبر (گرام)
22	15	پروٹین (گرام)

پروفیسر ڈاکٹر تن نواز شعبہ اینیمل وڈیری سائنس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی 34 پی ایچ ڈی، 160 ایم ایس سی طلبہ ڈگری مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کے HEC سے منظور شدہ مقالہ جات کی تعداد 95 ہے اس کے علاوہ آپ کی بیشتر تحقیقی مقالہ جات قومی و بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔

0302-3444515, dr_haq_nawaz@yahoo.com

پروٹین	1 گرام
اومیگا 3 فیٹی ایسڈ	4.0 ملی گرام
اومیگا 6 فیٹی ایسڈ	84.6 ملی گرام

بئیر اور مرغی کے انڈے کا تقابلی جائزہ

بئیر (وزن 9 گرام)	مرغی (وزن 44 گرام درمیانہ سائز)	
14	63	حرارے (کلو کیلوریز)
1	4	نوٹل فیٹ (گرام)
76	186	کولیسٹرول (ملی گرام)
13	62	سوڈیم (ملی گرام)
0	0	کاربوہائیڈریٹ
0	0	فائبر
1	6	پروٹین

بئیر کے گوشت کی اہمیت

بئیر کا گوشت انتہائی ڈانٹے دار اور کم چکنائٹ والا ہوتا ہے۔ بئیر کے گوشت کو باقی حلال جانوروں کے گوشت کی طرح پکنے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ ایک صحت مند بئیر سے اس کے جسم کے کل وزن کا 70-73 فیصد گوشت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بئیر کا وزن اوسطاً 140 گرام ہو تو اس سے تقریباً 100 گرام گوشت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر بئیر کے گوشت کو ملٹی وٹامنز، پروفیٹز اور کاربوہائیڈریٹس کا خزانہ کہا جائے تو بالکل بے جا نہ ہوگا۔ بئیر کے گوشت میں قدرتی طور پر صحت بخش فیٹس اور معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مرغی کے گوشت کی نسبت بئیر کے گوشت میں کم کولیسٹرول اور کم چکنائی پائی جاتی ہے۔ بلاشبہ بئیر کا گوشت قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کے گوشت میں وٹامن B کے علاوہ نیاں (Niacin)، رابوفلاوین (Riboflavin)، تھامین (Thiamine)، وٹامن C، فاسفورس، آئرن، میگنیشیم اور فولیٹ اضافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ جسمانی ضروریات کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے بئیر کے گوشت میں وٹامن E کی موجودگی کو بھی ظاہر کیا ہے۔ وٹامن E مچھلی اور دیگر سمندری جانوروں کے گوشت میں پائے جانے والا صحت بخش وٹامن ہے۔ بئیر کے گوشت میں پائی جانے والی یہ اضافی خوبیاں اور قوت بخش غذائیت اسے باقی حلال جانوروں کے گوشت سے ممتاز کرتی ہے۔

بئیر کے 100 گرام گوشت میں 234 حرارے یا کیلوریز (Calories) پائی جاتی ہیں جبکہ 100 گرام مرغی کے گوشت میں 197 حرارے یا کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کم کولیسٹرول والی چکنائی بئیر کے گوشت میں 8 گرام جبکہ مرغی کے گوشت میں 10 گرام پائی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی بات کی جائے تو بئیر کے گوشت میں 0.56 فیصد جبکہ چکن میں 0.54 فیصد پائے جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر گوشت میں پائی جانے والی معدنیات یا منرلز (Minerals) بئیر کے گوشت میں 1.12 فیصد جبکہ مرغی کے گوشت میں 1.08 فیصد پائے جاتے ہیں۔

بئیر کے گوشت میں وٹامنز اور منرلز کا مقدار میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ درج ذیل جدول سے

ظاہر ہے۔

خوراک اور پانی میں آرسینک مرکبات کی آمیزش اور اس کے انسانی صحت پر مضر اثرات

سجاد الرحمن، احسن نوید، صباحت عبد اللہ، ثناء اللہ ساجد، محمد عمر سلطان..... انسٹیٹیوٹ آف مائیکرو بیاالوجی، زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد

سے مختلف حیاتیاتی نظام جیسے نظام انہضام، نظام تنفس، گھج جوڑی کا نظام، اینڈوکرائن کا نظام، گردوں کا نظام، نیورولوجی نظام اور تولیدی نظام متاثر ہوتے ہیں جو کہ بعد میں کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ غیر نامیاتی زہریلی آرسینک کا لمبے عرصے تک (5 سے 10 سال) زائد استعمال (0.05 mg/L آرسینک ساس کی وجہ بنتا ہے جس سے عام طور پر صحت کے مسائل جیسے جلد کے امراض، جلد کا کینسر، اندرونی کینسر (مثانہ، گردوں، پیچھے پھڑوں) ناگلوں اور پاؤں کے خون کی رگوں کی بیماریوں اور ممکنہ طور پر ذیابیطس (Diabetes) ہائی بلڈ پریش اور تولید نظام کی بیماریاں ہوتی ہیں۔

حفاظتی اقدامات

آر سینک ملے پانی میں اگائی گئی سبزیوں اور خوراک کے استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل کو کم کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جو خوراک اور سبزیوں میں موجود آر سینک کی مقدار کو کم کر سکے۔ پانی کے نئے پلانٹ لگاتے وقت صاف پینے کے پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ خاص طور پر سطحی پانی کو فاسد مادوں اور آر سینک کی ملاوٹ سے بچانے کا انتظام بے حد ضروری ہے۔ بڑے شہروں میں جہاں پانی کی صاف فراہمی کے پلانٹ لگے جاتے ہیں وہاں اس پانی کو آر سینک سے پاک کیے جانے کا مکمل انتظام ہوتا ہے۔ آر سینک کی زائد مقدار والے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے آر سینک کی کم مقدار والے پانی کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے آر سینک سے آلودہ پانی فصلوں کے ذریعے جانوروں اور پودوں کا حصہ نہ بنے کیونکہ یہ آر سینک انسانی جسم میں شامل ہو کر جان لیوا اثرات مرتب کرتا ہے۔

مانیکو وہیالوجی انسٹیٹیوٹ، زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد نے آرسینک کو کم کرنے والے بیکٹیریا کی تلاش میں خاطر خواہ تحقیق ممکن بنائی اور اس نتیجے میں تین انتہائی فعال اقسام کے بیکٹیریا کی شناخت کی گئی۔ جو آرسینک کے مرکبات کو استعمال میں لاتے ہوئے نشوونما پاتے ہیں اور یوں آرسینک کے مرکبات کو مٹی میں کم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر ان بیکٹیریا کو پروبائیوٹکس میں استعمال کروایا جائے تو کافی حد تک خوراک میں موجود آرسینک کے زہریلے مرکبات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

آرسینک (Arsenic) ایک قدرتی طور پر پایا جانے والا میٹلائڈ ہے۔ یہ زمین کی سطح میں سب سے زیادہ پایا جانے والا میٹال عنصر ہے اور 245 سے زائد معدنیات کا حصہ ہے۔ آرسینک کے مرکبات زیادہ تر کچھ دھاتیں ہیں جو کہ سلفائیڈ کے ساتھ ساتھ کوپر، نیکل، لیڈ، کوبالٹ اور دوسری دھاتوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔

آرسینک کے مرکبات حرکت پذیر نوعیت کے ہوتے ہیں۔ چٹانوں کی ٹوٹ بھوٹ سے آرسینک کے سلفائیڈز آرسینک ٹرائی آکسائیڈ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دھول کے طور پر آرسینک سائیکل کا حصہ بن کر بارش دریاؤں اور زمین کے پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ پودوں اور جانوروں میں وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے غذائی سلسلہ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس سے آرسینک کی کم یا زیادہ مقدار چاہے وہ براہ راست آرسینک ملا آلودہ پانی سے یا آرسینک سے آلودہ خوراک کھانے سے انسانی صحت کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ قدرتی زمینی آلودگی کیساتھ صنعتوں سے نکلنے والے زرہر پیلے اثرات اور نکاسی کے مسائل کی وجہ سے پوری دنیا میں ہزاروں لوگ آرسینک کے زرہر پیلے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ چاول جو کہ آدھی سے زائد دنیا کی عام غذا ہے۔ دلچسپ طور پر بہت سے چاول پیدا کرنے والے ممالک کے زمینی پانی اور مٹی میں آرسینک کی آمیزش ہے۔ چاول میں آرسینک خطرناک حد تک شامل ہوتی ہے اور اس کے روزانہ استعمال کی وجہ سے یہ انسانی جسم میں شامل ہو کر سنگین مسائل کی وجہ بنتی ہے۔ چاولوں کے ساتھ ساتھ آرسینک گندم، گوشت، مکی، اور دوسری کھانہ پکائی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسانی جسم میں پائی جانے والی آرسینک کی آمیزش کی بڑی وجہ سبزیاں اور گوشت بھی ہیں۔

آرسینک کے انسانی صحت پر مضر اثرات

انسانی جسم میں آرینک کی مقدار کا تعلق روزانہ کے طور پر کھائی جانے والی خوراک سے ہوتا ہے۔ آرینک انسانی جسم کا عام جزو ہے اور عام طور پر مونیو میتھائل آرینوسس ایسڈ (Mono methyl arsonous acid) کی شکل میں جسم میں مختلف حصوں میں خون کے ذریعے ترسیل ہوتا ہے۔ آرینک کے انسانی صحت پر مختلف زہریلے اثرات میں میلانوئس، لیو کو میلانوئس، کیرائوس، ہائپرکیرائوس، نان پیٹنگ ایڈیڈ، گینگرین اور مختلف جلد کا کینسر شامل ہیں۔ غیر نامیاتی آرینک کی وجہ

لقیہ

بلیوں کے بارے میں معلومات

ملکوں میں بلیوں کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں کالی بلی کو بد قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ آسٹریلیا اور برطانیہ میں یہ خوش بختی کی علامت ہے۔

مہاورے

بلی کی مختلف عادات اور حرکات کی وجہ سے اس پر کئی مہاورے اور کہتاؤں بھی بنائی گئی ہیں جیسے کہ گھر کی بلی، نوسو چوہے کھا کے بلی جج کو چلی، بلی کے باگوں چھیدا کاٹوٹا، میری بلی مجھی کو میاؤں، کھسپائی بلی کھمبانو چے، بلی کو چھچھڑوں کے خواب، چوہے بلی کا کھیل، جو بلی مندر میں رہتی ہے وہ دیوتا سے نہیں ڈرتی، کبوتر کے آنکھ موندنے سے بلی نہیں چلی جاتی، بلی کتے کا بیرو وغیرہ۔

سب سے چھوٹی بلی کا نام Mr. Pebbles تھا جس کا وزن 6 پاؤنڈ اور قد 6 انچ تھا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جنگلی بلی Siberian Tiger ہے جس کی ٹوٹل لمبائی 12 فٹ اور وزن 317 کلوگرام ہے اور دنیا کی سب سے چھوٹی جنگلی بلی Black-Footed ہے جسکی لمبائی 20 انچ اور وزن 1.2 کلوگرام ہے جبکہ پائتوبلیوں میں دنیا کی سب سے بھاری بلی آسٹریلیا کی تھی جس کا وزن 21 کلوگرام تھا۔ دنیا کی سب سے ہلکی ترین بلی Tinker Toy ہے، جس کا وزن 1 پاؤنڈ، قد 7cm اور لمبائی 19cm ہے۔ عام طور پر بلیوں کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے لیکن دنیا کی سب سے بوڑھی بلی آسٹرن کی تھی جو 1967ء سے 2005ء تک زندہ رہی۔ بلی کے دوڑنے کی اوسط رفتار 49 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ مختلف ثقافتوں اور

ارشاد خداوندی ہے ”جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرو“۔

پاکستان کی زرعی برآمدات کو درپیش مسائل کا سدباب

عبدالغفور*، ظہر رسول**، محمد طیب طاہر***..... انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد*، پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، اسلام آباد**، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان***

اپنے مرحلہ وار زرعی اقدامات کر سکنے اور عالمی منڈیوں میں وقت پر غذائی اجناس کو برآمد کر سکنے۔ بین الاقوامی معیار اور طلب کے مطابق زرعی پیداوار کی طلب کو پورا کرنے کے لیے زرعی انجینئرز نے کیڑے مارا دویات کے سپرے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا متعارف کروانا قابل ستائش ہیں۔ جس سے نہ صرف پاکستانی زرعی اجناس کو بین الاقوامی منڈیوں میں پذیرائی ملی بلکہ مقامی سطح پر زیادہ سپرے زدہ سبزیوں اور پھلوں سے پیدا کردہ بیماریوں کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ جس سے عالمی ضروریات کو پورا کر کے زیادہ منافع اکٹھا کیا جاسکے گا۔

پاکستان چاول کی پیداوار میں دنیا کے بڑے معروف ممالک میں سے ایک ہے جو اپنی خوشبو اور لمبائی کی وجہ سے بین الاقوامی منڈیوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ چاول کی بنیاری کی اور گنے کی کاشت ایک محنت طلب اور دشوار گزار مرحلہ ہے اور انکی وقت پر کاشت بھی اہمیت کا حامل ہے۔ جسکی وجہ سے اس کی کاشت محدود پیمانے پر کی جاتی تھی۔ کسان کی آسانی اور وقت کی بچت کے لئے چاول اور گنے کی کاشت کے لیے سرکاری سطح پر جدید ٹیکنالوجی سے ایس نیوٹیک پلانٹز جو نہ صرف گھنٹوں کا کام منٹوں میں مکمل کرتا ہے بلکہ ناقابل کاشت اراضی کو بھی آباد کر کے قابل عمل بنانے میں کسان لیے معاون ہے۔

دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح پاکستان میں مقامی سطح پر آئل سے بنی ہوئی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ سالانہ اڑھائی ارب سے زیادہ خوردنی تیل کی درآمد پر خرچ کرتا ہے۔ جس کے لیے حکومت پنجاب کے سیکریٹری زراعت نے جہاں زراعت سے منسلک دوسرے اہم اقدامات کیے ہیں وہیں سورج مکھی اور آئل سیڈ کراپ پر سبسڈی دے کر کسان کو اس کی کاشت کی ترغیب دی ہے۔ جس سے نہ صرف قومی سطح پر خوردنی آئل کی درآمدات کو کم کر کے وسیع زرمبادلہ بچایا جائے گا بلکہ مستقبل قریب میں آئل کی پیداوار میں خود کفیل ہو کر اس کو عالمی منڈیوں میں درآمد کیا جاسکے گا۔

بیج جہاں فصل کی دوبارہ کاشت کے لیے موزوں اہمیت رکھتا ہے۔ وہیں مالٹے کے اندر زیادہ مقدار میں بیج کا ہونا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ الحمد للہ اب زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ہارٹیکلچر کے ریسرچرز نے کم بیج والا مالتا متعارف کروایا ہے۔ یہ روٹی نہ صرف ملک کے تمام ریسرچ اداروں کے لیے جہاں قابل فخر ہے بلکہ بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کر کے طلب کو پورا کر کے کافی زرمبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ زرعی پیداوار بڑھتی ہوئی آبادی کی طلب کو گاہک کی قوت خرید کے مطابق مارکیٹ میں فراہم کرنا صنعتوں اور صنعتکاروں کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت کی بنائی گئی پالیسیوں سے نہ صرف زرعی تاجروں کو مستفید ہوں گے بلکہ زراعتی صنعتوں کی استحصالی بھی کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ سپلائی چین کے تمام مراحل کے سٹیک ہولڈرز کو آپس میں تعاون بڑھا کر زرعی اجناس کی مجموعی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق کر کے اچھی پیکنگ اور گریڈنگ کر کے تجارتی عالمی منڈیوں سے کثیر زرمبادلہ کمایا جاسکتا ہے۔ مزید برآں زراعت کا شعبہ مستقل بنیادوں پر ترقی کی طرف گامزن رہے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں گاہک کی قوت خرید اور طلب کے مطابق ماہرین زراعت کو بہتر اور عالمی معیار کی زرعی اجناس کو تخلیق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زرعی ماہرین کی تخلیق کردہ ایجادات کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جامعات کے ریسرچرز اور صنعتوں کے ماہرین آپس میں باہمی تعاون کو یقینی بنائیں تاکہ تجارتی درپیش مسائل و آئندہ آنے والے چیلنجز سے نمٹا جاسکے اور بہتر تجارتی و مزربانی کی جائیں گی۔ زراعت دوست پالیسیاں گیم چیجر بن کر ملک خداداد پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔

دنیا میں زراعت سے وابستہ ممالک معاشی خوشحالی کے اعتبار سے نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دوسرے پسماندہ اور گنجان آباد ممالک کے لیے غذائی اجناس کی فراہمی کا بھی منوڈریعہ ہیں۔ پاکستان میں آبادی کا زیادہ تر حصہ دیہات میں آباد ہے۔ اگرچہ زراعت دیہاتی آبادی کے لیے ذریعہ معاش کی ضامن ہے وہیں زرعی صنعتوں کا دار و مدار بھی زرعی اجناس کی فراخوانی پر منحصر ہے۔ زرعی صنعتوں کا ملک کی اکاؤمی کے لیے متواتر کام کرنا ہی ملکی معیشت کے لیے سودمند ہے لیکن زرعی ملک میں زراعت اور صنعتوں کی ترقی سرکاری بنائی گئی کسان دوست پالیسیوں پر منحصر ہے۔ گزشتہ کچھ دیہاتیوں ملکی حالات میں ملک کی اکثر شعبوں کی صنعتیں اپنا وجود قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ جس کی بنیادی وجہ غیر موثر حکومتی پالیسیاں اور ناقص حکمت عملی تھی۔

پاکستانی زرعی مصنوعات عالمی منڈیوں میں ذائقہ اور معیار کے اعتبار سے اہم مقام رکھتی ہیں۔ جس میں حلال گوشت، چاول، پھل اور سبز یاں سرفہرست ہیں۔ یو ایس ایڈ کے مشن ڈائریکٹر مسٹر جیری کے مطابق پاکستانی مصنوعات کی تسلسل سے طلب کا ہونا عالمی تجارتی منڈیوں میں ریکارڈ توڑنا ہے۔ یہ بات دینی میں بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگری ایکسپو کے دوران کی گئی جہاں دنیا کے 120 ممالک کی کمپنیاں اپنی پیداوار کو ظاہر کیا۔ یاد رہے یہ ایکسپو اسٹریٹیجک کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ جس سے نہ صرف کاروباری مواقع پیدا ہوئے بلکہ بیشتر ممالک کے تعلقات دوسرے ملکوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ جیسے بھارت اور روس گزشتہ 70 زراعت کے شعبے میں دوطرفہ تجارتی تعلقات ہمسایہ ممالک کے لیے مثالی ہیں۔

موجودہ حکومت کی قیادت نے گزشتہ پانچ سالوں میں جہاں صنعتوں کی بحالی پر خصوصی توجہ دی وہیں زراعت کے درپیش مسائل کو حل کرنے میں خصوصی کاوشیں کیں تاکہ چھوٹے کسان کو سپورٹ کر کے عالمی معیار کے مطابق پیداوار کے لیے بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کر کے کثیر زرمبادلہ کمایا جاسکے۔ کپاس جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ وہیں گزشتہ سالوں سے اس کی پیداوار بعض مسائل کی وجہ سے متزلزل کا شکار ہے۔ گورنمنٹ نے کپاس کے زمینداروں کو بیج پر سبسڈی دی ہے تاکہ پچھلے سال کے نقصان کا ازالہ کیا جاسکے۔ اسی طرح کپاس کی اگیتی کاشت پر پابندی بھی کپاس کے کاشتکاروں کے لیے معاون بنی۔ جسکی وجہ سے اس پر حشرات کا حملہ کا ہونا اور مجموعی پیداوار میں کمی کا باعث بنی تھی۔ لوگوں کی تعلیمی معیار کی بہتری اور اچھی صحت کے حصول کے لیے سبزیات کے استعمال کا فروغ ایک خوش آئند بات ہے۔ یو ایس ایڈ اور ایگریکلچرل مارکیٹ ڈیولپمنٹ مل کر پاکستانی زرعی مصنوعات کو بین الاقوامی منڈیوں میں فروغ دے رہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اوسطاً سبزیات کا استعمال چودہ کلو گرام فی کس ہے۔ جس کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے کچن گاڑیوں کا فروغ دے کر مقامی سطح پر نہ صرف لوگوں کو خود کفیل بنایا بلکہ منڈیوں میں رسد کی مقدار کو بھی بہتر کیا اور بین الاقوامی منڈیوں میں بھی تجارت کو یقینی بنایا۔ زرعی پیداوار کے لیے پانی ایک اہم جزو ہے۔ ملک میں جہاں دریاؤں میں خشک سالی اور ڈیمز میں پانی کی وجہ سے نہری نظام متاثر ہوا ہے۔ وہیں گزشتہ سالوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے بھی باقی صنعتوں کی طرح زراعت کو متاثر کیا ہے۔ زرعی اراضی کی آبپاشی کے لیے پانی کی کمی ٹیوب ویل سے کرنے والے کاشتکار بھاری رقم ڈیزل کے لیے خرچ کرنے پر مجبور تھے جس کے لیے ملکی ماہرین نے توانائی کے متبادل ذرائع کا اہتمام یقینی بنایا۔ جیسے کسان کی سہولت کے لیے سولر ٹیوب ویلز اور ڈپ ایری گیٹیشن (نظام آبپاشی) کا فروغ دینا اور ان کی آسان اقساط میں فراہمی زراعت کی ترقی کی جانب قدم ہے تاکہ کسان

اس بات کے لیے کسی سائنسی تجربے کی ضرورت نہیں کہ شدید خشک سالی میں جب صحراؤں میں کچھ بھی نہیں ملتا تب بھی لوگوں کو اپنی اوٹنی سے بغیر ناغے کے دودھ مل رہا ہوتا ہے اوٹنی کے دودھ کے کم استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے دودھ کا ولائتی گائے کے دودھ سے مقابلہ کرتے ہیں حالانکہ اوٹنی کے دودھ کی مقدار میں بھی کافی حد تک اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سالہا سال غلط کراستگ کی وجہ سے اونٹوں کے غلط انتخاب کی وجہ سے ان کا دودھ کم ہو کر 5 کلوٹر تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن اتنی کم مقدار میں پھر بھی یہ دودھ 10 بچوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اونٹ کے دارومدار اس کی

نیوٹیکنالوجی اور ہماری خوراک

محمد کاشف، محمد عرفان مجید، حق نواز..... شعبہ کیمسٹری، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کواے نیوٹیکسپولز میں بند کیا جاتا ہے جو اعصاب تک خوراک کی ترسیل کو یقینی بناتے ہیں اس کی اہم مثال کوکنگ آئل کی نیوٹیکسپولیشن ہے۔ اسی طرح سے لذت اور چٹارے کے لیے نیوٹیکسپولیفیلور اینہا نسر تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے لیس اور گاڑھاپن بڑھانے کے لیے نیوٹیبوز اور نیو پارٹیکلز بنائے جا رہے ہیں۔ گوشت میں موجود کوئلیسٹرول کے حل کے لیے پودوں کے سٹیرائڈز ہارمون سے مطابقت رکھنے والے نیو پارٹیکلز کی آمیزش تیار کی جا رہی ہیں۔ ایسے نیو پارٹیکلز تیار کیے جا رہے ہیں جو خوراک میں سے منتخب کیمیکلز یا جراثیم کو کھینچ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید برآں ایسی نیوٹیکسٹنر تیار کی گئی ہیں جو جسم میں خوراک کے انتشار اور دستیابی کو بڑھاتی ہیں۔ خوراک کی پیکنگ میں بھی نیوٹیکنالوجی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں فلوریسٹ نیو پارٹیکلز کے ساتھ اینٹی باڈیز منسلک کر کے خوراک میں پیدا ہونے والے کیمیائی مادوں اور جراثیم کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ایسے نیوٹیکسٹنر تیار کیے جا رہے ہیں جو جراثیم اور خوراک کی عمر کا معائنہ کرنے کے اہل ہیں۔ ایسی نیوٹیکسٹنر تیار کی جا رہی ہیں جو خوراک میں آکسیجن کے داخلے کو روکتی ہیں اور اسے خراب ہونے سے بچاتی ہیں۔ سلور اور زنک نیو پارٹیکلز کی مدد سے ایسی کوٹنگ تیار کی جا رہی ہیں جو خوراک کو جراثیموں اور فنگائی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ سیلیکیٹ نیو پارٹیکلز کی مدد سے ایسی باریک جلدیں تیار کی جا رہی ہیں جو نہ صرف ہلکی اور مضبوط ہیں بلکہ بلند درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ نیوٹیکنالوجی فوڈ سسٹیمز کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے جن کے استعمال سے جسم میں خاص اجزاء کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایسے نیوٹیکسٹنر تیار کیے جا رہے ہیں جو خوراک کے ضروری اجزاء کے جسم میں انحصار میں اضافہ کرتے ہیں۔ ادویات کی مطلوبہ خلیوں تک دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے سیلولوز کے ساتھ نیوٹیکسٹنر کے مرکب بنائے جا رہے ہیں۔ فعال مالکیولز کے بہتر انحصار کے لیے ایسی وائٹا میسرز تیار کی جا رہی ہیں جس میں مطلوبہ مالکیولز کو نیوٹیکسٹنر میں منتشر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیوٹیکنالوجی کے خوراک کی بہتری میں کردار کا سب سے زیادہ فائدہ ترقی پذیر ممالک کو ہوگا جہاں پر خوراک کی دستیابی محدود ہے اور میسر آنے والی خوراک میں بہت سارے ضروری اجزاء کی کمی ہوتی ہے اور پانی کی آلودگی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ ہمارا وطن عزیز بھی ان ممالک میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیوٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان ترقی کی منازل جلد از جلد طے کرے اور ان تمام مسائل سے نجات حاصل کرے۔ آمین!

کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نیوٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے جائے گی۔ آپ صرف فنکشنل فوڈ کی طرف ہی نگاہ ڈالیں جو کہ حیاتیاتی مالکیولز کی انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اس کی خصوصیات ان سے بہت مختلف ہوتی ہیں جیسی قدرتی طور پر ہونی چاہیے۔ یہ نیوٹیکنالوجی دراصل تحقیق اور ترقی کے نئے افق کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ بلاشبہ اس ضمن میں خوراک کی بے حساب جہتیں تیار کی جا رہی ہیں۔ نیوٹیکنالوجی فوڈ ٹیکنالوجسٹس کو وہ تمام آلات و فنایات مہیا کر رہی ہے جس کی مدد سے نامعلوم انتہا تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

آئیے ذرا نیوٹیکنالوجی کے خوراک کی بہتری میں کردار پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ نیوٹیکنالوجی نے ہماری خوراک اور پہلو بہ پہلو ہماری صحت پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک تعریف کے مطابق وہ خوراک جس کی کاشت، کٹائی، پیداوار، تیاری یا پیکنگ میں نیوٹیکنالوجی استعمال ہوئے ہوں نیوٹوفوڈ کہلاتی ہے۔ یہاں پر ہم نیوٹیکنالوجی کے خوراک کی تیاری اور نگرانی میں ممکنہ کردار میں ہونے والی اب تک کی تحقیق، جانچ یا بعض جگہوں پر مکمل اطلاق کا جائزہ لیں گے۔

زراعت خوراک کی اصل ہے اور بنیادی طور پر خوراک اسی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ نیوٹیکنالوجی نے زراعت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس شعبہ میں اینزائم اور سبسٹریٹ کے باہمی تعامل کا ایک سالمی سطح پر مشاہدہ کرنے میں نیوٹیکنالوجی کا کردار قابل دید ہے۔ ایسے نیوٹیکسپول تیار کیے جا رہے ہیں جو فصلوں میں جراثیم کش ادویات، کھادوں اور دوسرے زرعی کیمیائی مادوں کی موثر ترسیل میں بہت کارگر ہیں۔ اسی طرح سے نشوونما سے منسلک ہارمونز کی بااختیار ترسیل کے لیے نیوٹیکسٹنر بنائے جا رہے ہیں۔ ایسے نیوٹیکسٹنر زایجاد کیے جا رہے ہیں جو باآسانی مٹی کی حالت اور فصل کی نشوونما کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ ایسی نیوٹیکسٹنر بنائی جا رہی ہیں جو پودوں اور جانوروں کی شناخت، حفاظت اور نگرانی کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایسے نیوٹیکسٹنر بنائے گئے ہیں جو پودوں اور جانوروں میں بیماری پھیلانے والے جراثیم کی شناخت کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے نیوٹیکسٹنر بنائے گئے ہیں جو ڈی این اے (DNA) کو مطلوبہ ہدف تک پہنچانے کے لیے انتہائی کارگر ہیں۔

زراعت سے حاصل ہونے والی خام خوراک کو تیار کر کے قابل استعمال حالت میں لانے کا مرحلہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بھی نیوٹیکنالوجی کا وسیع پیمانے پر استعمال سامنے آ رہا ہے۔ خوراک

ایڈسٹیل (خوردنی) لینڈسکیپنگ

بقیہ:

آخری مرحلہ جب پودے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں اور ان کا پھل تیار ہو جائے تو اسے احتیاط کے ساتھ اتار لیا جائے اور اس کو استعمال کر کے دیکھا جائے تو یقیناً وہ بازار سے خریدی ہوئی سبزی اور پھل سے کئی درجہ اچھے معیار اور ذائقے کا حامل ہوگا۔ ہارویسٹنگ کے بعد آپ کی زمین اور گھلے اگلے پودوں کے لیے دوبارہ تیار ہوں گے۔

لیے انہیں کیمیائی ادویات سے آشنا نہیں کرانا چاہیے تاکہ حاصل ہونے والے پھل اور سبزیوں خالص طور پر آرگینک ہوں۔ آرگینک پھل اور سبزیوں کو انسانی اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو انسان کو صحت مند بناتے ہیں۔

گو بریا پتوں کی کھاد کا استعمال

کیمیائی کھاد کی جگہ گر پودوں کو گو بریا پتوں کی کھاد ڈالی جائے تو بہت بہتر ہے۔

الحديث

حمید بن عبد الرحمنؓ سے روایت ہے کہ انہیں ابو ہریرہؓ اور ابوسعید خدریؓ نے بتایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار مسجد پر تھوک لگا دیکھا تو نکمری لے کر اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھوکے تو نہ اپنے منہ کے سامنے اور نہ دائیں جانب تھوکے (بلکہ) بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوک دے۔

فصلوں میں ادویات کا استعمال اور ذخیرہ کرنے کا جدید نقطہ نظر

احمد علی، زبیر اسلم، محمد زویب الیاس.... شعبہ انگریزی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کم مقدار سپرے کو درج ذیل مشینوں سے کرتے ہیں۔

۱۔ بیک میسٹ بلور (Back Mist Blower)

اس میں ایک ہنگھا ہوتا ہے جو انجن کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی ہوا کی رفتار تقریباً 100 سے 200 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس ہوا کے ساتھ محلول مل کردھند کی شکل میں پودوں پر گرتا ہے عام طور پر اس کو پودوں سے چھ فٹ اوپر رکھا جاتا ہے۔

۲۔ الیکٹروسٹیک سپریر (Electrostatic Sprayer)

اس میں ہوا کو دبا کر محلول کے ساتھ ملا یا جاتا ہے اور نوزل کی مدد سے سپرے کو دھند کی شکل میں پودوں پر گرایا جاتا ہے اس کو تقریباً پودوں سے 14 فٹ اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس سے سپرے یکساں گرتی ہے۔

۳۔ روٹری ڈسک سپریر (Rotary Disk Sprayer)

اس میں ایک تیز گھومنے والی ڈسک ہوتی ہے جو پانی یا زہر کے محلول کو بھاپ میں تبدیل کرتی ہے۔ اس بھاپ کے قطروں کا سائز تقریباً 60 سے 80 مائیکرون ہوتا ہے۔

فصلوں کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پودوں کو بروقت غذائی عناصر مہیا کرنے کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کو روکنے کے لیے بہت ساری ادویات کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

ادویات کو استعمال اور ذخیرہ کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں۔

☆ عام طور پر جب جڑی بوٹیوں کا قد چار انچ سے کم ہو تو ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ ورنہ کم از کم ان کے پھول نکلنے سے پہلے سپرے کر دینی چاہیے تاکہ یہ اپنا بیج تیار نہ کر سکے اگر بیج تیار ہو جانے کے بعد سپرے کی جائے تو اس سے پودا تو مر جا جائے گا مگر وہ اپنی اگلی نسل چھوڑ جائے گا۔ شروع میں جڑی بوٹیوں کا تناؤ اور پتے باریک ہوتے ہیں اور سپرے اچھی طرح ان کے تنے اور پتے تک پہنچتی ہے اور زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ تر کسان ایک ہی طرح کی سپرے بار استعمال کرتے ہیں جس سے جڑی بوٹیوں میں ان ادویات کے اثر کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان ادویات کو اور اگلے طریقہ استعمال کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔

☆ ٹینک میں زہر اور پانی کی مقدار کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایک ایکڑ کے لیے تقریباً 40 سے 76 لیٹر محلول کافی ہوتا ہے اور پریشر تقریباً 15 سے 50 پونڈ پرسکینر انچ (15-50 psi) ہونا چاہیے۔

☆ سپرے کرنے سے پہلے ہوا کی رفتار اور سمت ضرور معلوم کریں۔ ہوا کی رفتار تقریباً تین سے سات میل فی گھنٹہ ہونی چاہیے اور اس کی سمت سپرے کرنے والے کی سمت میں ہونی چاہیے۔

☆ سپرے کرتے وقت درج حرارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ زہر کے اثر کو کم کرتا ہے اور یہ 17 سے 28 سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے۔ اگر 17 سینٹی گریڈ سے کم ہو تو جڑی بوٹیاں بہت کم ختم ہوتی ہیں یا پھر بہت دیر بعد ختم ہوتی ہیں اور اگر 28 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو سپرے کا زیادہ تر حصہ بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔

(باقی صفحہ 44 پر)

لفظ ہر بی سائیڈ کا مطلب ہے "جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والا زہر"۔ پیسیٹائیڈ سے مراد نقصان دہ حشرات اور پرندوں کو مارنے والا زہر"۔ تقریباً 4000 سال سے پیسیٹائیڈ استعمال ہو رہی ہے۔ پندرہویں صدی میں آرسینک، مرکری، اور لیڈ بطور پیسیٹائیڈ استعمال ہوتی تھی۔ 1950ء تک آرسینک کا استعمال بھی بہت زیادہ تھا۔

ہر بی سائیڈ کی دو اقسام ہیں۔

(۱) سلیکٹیو ہر بی سائیڈ

وہ ہر بی سائیڈ ہیں جو مخصوص جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں مثلاً نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی ہر بی سائیڈ وغیرہ۔

(۲) نان سلیکٹیو ہر بی سائیڈ

وہ ہر بی سائیڈ ہیں جو ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں مثلاً روٹا پ سپرے کرنے کے مختلف طریقے درج ذیل ہیں۔

☆ ہائیڈراؤلک سپرے (Hydraulic Spray)

اس میں ایک پمپ پریشر مہیا کرتا ہے اور مقرر کی ہوئی جگہ (یعنی پودے) تک سپرے کو پہنچاتا ہے۔ اس سے تقریباً (40-1000psi) تک پریشر پیدا ہوتا ہے۔

☆ کم مقدار سپرے (Low Volume Spray)

اس میں پینکے یا کپیریسر کی مدد سے بہت تیز رفتار ہوا پیدا کی جاتی ہے جس کی رفتار دو سو میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ زہر کا محلول ہوا کے ذریعہ بھاپ نما شکل میں تبدیل کر کے پودوں تک پہنچایا جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ ہائیڈراؤلک سپرے میں سپرے کے قطروں کا سائز تقریباً 200 سے 400 مائیکرون ہوتا ہے (جبکہ انسانی بالوں کی موٹائی ایک سو مائیکرون ہوتی ہے) اور کم مقدار سپریر میں جو دھند پیدا ہوتی ہے اس کے قطروں کا سائز عام طور پر 50 سے 100 مائیکرون ہوتا ہے جو 0.05 مائیکرون تک بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جب قطروں کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو سپرے کی مکمل مقدار پودے تک نہیں پہنچتی اور بہت زیادہ حصہ ہوا میں رہ جاتا ہے۔

ہائیڈراؤلک سپرے کو درج ذیل مشینوں کی مدد سے کرتے ہیں۔

۱۔ ایئر کمپریسر سپریر (Air Compressor sprayer)

اس میں تقریباً ساڑھے تین سے 19 لیٹر والا ٹینک استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر پمپ اور ساتھ سپرے کے لیے نوزل لگی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کم رقبہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۔ بیکپیک سپریر (Backpack Sprayer)

یہ ایک ٹینک پر مبنی ہوتا ہے۔ جس کے اندر تقریباً 15 لیٹر محلول یا پانی ساکتا ہے۔ اس میں ایک پمپ ہوتا ہے جو ہاتھ سے چلایا جاتا ہے تاکہ پریشر پیدا کر کے نوزل کے ذریعہ سپرے کی جاسکے۔

۳۔ سکیڈ موؤنڈ سپریر (Skid Mounded Sprayer)

اس میں بھی ایک ٹینک ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً 750 لیٹر محلول ساکتا ہے اور بہت ساری نوزلیں لگی ہوتی ہیں۔ اس کو ٹریکٹر کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ رقبہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔

کھادوں کے درست طریقہ استعمال کے حوالے سے کسانوں کی رہنمائی

محمد زویب الیاس، زبیر اسلم، احمد علی.... شعبہ ایگرونامی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

میں آسانی سے حل ہو جانے والی کھادیں پودے کو فوار کی شکل میں پتوں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ عام طور پر فوار کے ذریعے نائٹروجن (یوریا) اور وہ غذائی عناصر دیے جاتے جو پودے کو بہت ہی کم مقدار میں چاہیے۔

فوائد

فولیر سپرے سے کھادوں کا زیاں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کچھ کیڑے مارا دیات اور کھاد کے محلول کو اکٹھا کر فوار کی شکل میں بھی پودے کو فراہم کیا جاسکتا ہے۔ فولیر سپرے سے پودے کو غذائی عناصر بہت جلد مہیا ہوتے ہیں۔

نقصانات

اگر کھاد کی مقدار محلول میں زیادہ ہو تو اسے پتے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔

(۴) آبپاشی کے ذریعے فراہمی

اس میں کھاد کے کچھ کوسی ڈرم وغیرہ میں کھالے کے تکرہ پر رکھ دیا جاتا ہے جس طرح پانی پہنچتا ہے ویسے ہی ساتھ ساتھ کھاد پورے کھیت میں پہنچ جاتی ہے۔ نائٹروجن اور سلفر کی کھادوں کو آبپاشی کے ذریعے بھی دیا جاسکتا ہے۔

فوائد

اس کے ذریعے پودوں کو کھاد اس وقت فراہم کی جاتی ہے جب ان کو ضرورت ہو مثلاً مکا جیسی فصلوں کو کھڑی حالت میں بھی کھاد دی جاسکتی ہے۔ یہ سستا اور سادہ طریقہ ہے۔

نقصانات

اس میں غفلت برتنے سے کھادوں کا ضیاع بڑھ جاتا ہے۔ (اس میں احتیاط یہ کریں کہ آبپاشی کے پانی کا درجہ حرارت کم اور کھالے سے دوری زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر زمین ہموار نہیں ہے تو کھیت کو چھوٹے ٹھوسوں میں تقسیم کر لیں۔ کھاد کو پورے کھیت میں یکساں پھیلا نا بہت ضروری ہوتا ہے) پاکستان میں سب سے زیادہ کھادیں یوریا اور ڈی اے پی استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت کم لوگ ایم او پی اور ایس او پی کھادوں کو بطور پوناش استعمال کرتے ہیں۔

ان کھادوں کو زمین میں ڈالتے وقت درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے ان کھادوں کا زیاں کم اور فائدہ بڑھایا جاسکتا ہے۔

یوریا کھاد کا درست طریقہ استعمال: (نائٹروجن 46 فیصد)

تمام پودوں کو نائٹروجن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ پودوں کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی زمینوں میں نائٹروجن کی پہلے ہی بہت کمی ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر زمینیں الکلائن ($pH > 7.5$) ہیں اور اگر یوریا کھاد کو زیادہ درجہ حرارت (30 سے 45 سینٹی گریڈ) میں زمین کی سطح پر چھٹ کیا جائے تو اس کا کچھ حصہ امونیا گیس کی شکل میں ہوا میں چلا جانے سے ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یوریا کو بالخصوص ریتیلی زمینوں میں تر حالت میں، پانی لگانے سے پہلے یا تیز بارش سے پہلے ڈالا جائے تو اس کا زیادہ تر حصہ پانی کے ساتھ زیر زمین بہہ جاتا ہے اور پودوں کی پہنچ سے دور چلا جاتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ استعمال یہ ہے کہ:

☆ یوریا کو درمیانی نم زمین میں ڈالیں اور سطح زمین سے تقریباً دو انچ نیچے ڈالیں۔

موجودہ دور میں غیر نامیاتی کھادیں زراعت کا اہم حصہ بن چکی ہیں اور ان کے درست طریقہ استعمال سے نہ صرف پیداوار بڑھتی ہے بلکہ ان کا زمین سے زیاں کم اور زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے ہاں کھادوں کے غلط طریقہ استعمال سے کھادوں کا بہت کم حصہ پودوں کو ملتا ہے اور باقی ضائع ہو جاتا ہے جو بعد میں ہمارے ماحول کی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔

کھادیں استعمال کرنے کے مختلف طریقے

پودوں کو کھادیں درج ذیل طریقوں سے فراہم کی جاسکتی ہیں۔

(۱) چھٹ

بوائی کے وقت یا فصل کو کھڑی حالت میں کھاد چھٹ کی مدد سے فراہم کی جاسکتی ہے۔ کھادوں کا چھٹ زیادہ تر ہاتھ سے دیا جاتا ہے۔

فوائد

پودے کو وہ کھادیں جو زیادہ مقدار میں چاہیے عام طور پر چھٹ کی مدد سے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سستا اور آسان طریقہ ہے۔

نقصانات

چھٹ میں لائن پلیسمنٹ کے برعکس تین سے دس گنا زیادہ فاسفورس کی کھادوں کا زیاں ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جڑی بوٹیوں کو بھی یکساں غذائی عناصر فراہم کرتا ہے۔ ان فصلوں کو چھٹ کی مدد سے کھادیں فراہم نہ کریں جن کی جڑوں کا پھیلاؤ کم ہو۔

(۲) پلیسمنٹ

اس کے مختلف طریقے ہیں۔

- (۱) بوائی کے وقت ڈال کے ذریعے بیج اور کھاد کو اکٹھا کرنا۔
- (۲) اگر کھاد کو چوڑی پٹیوں کی شکل میں کھڑی فصل کی قطاروں کے ساتھ ڈالا جائے تو اسے سائیڈ ڈریسنگ کہتے ہیں۔
- (۳) اگر کھاد کو پھل دار پودے کے تنے کے ارد گرد گول دائرے کی شکل میں ڈالا جائے تو اسے رنگ پلیسمنٹ کہتے ہیں۔
- (۴) اگر کھاد کو ہر پودے کے قریب ڈالا جائے تو اسے سپاٹ پلیسمنٹ کہتے ہیں۔

فوائد

چھٹ سے یوریا کا زیاں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر اسے زمین میں گہرا ڈالا جائے (پلیسمنٹ) تو اس کا زیاں کم کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے چھٹ کے برعکس پلیسمنٹ سے گندم کی پیداوار 6 سے 7 من فی ایکڑ بڑھ جاتی ہے۔

نقصانات

اگر کھاد کی مقدار پودے کی ضرورت سے زیادہ ڈالی جائے تو پودے کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔

(۳) فولیر سپرے

اس میں کھاد کے محلول (دو سے تین فیصد) کو پھوار کی شکل میں پودے کے پتوں پر ڈالا جاتا ہے۔ پانی

☆ آبپاشی والے علاقوں میں یوریا کی سفارش کردہ مقدار اکٹھی نہ ڈالیں بلکہ اس کو دو یا تین حصوں میں وقفے وقفے سے ڈالیں۔

☆ یوریا کھاد زمین میں صرف اسی وقت ڈالیں جب پودے کو اس کی ضرورت ہو ورنہ یوریا کھاد پودے کو ملے بغیر ہی ضائع ہو جاتی ہے۔

☆ فصلوں کی مختلف اقسام کے لحاظ سے یوریا کھاد آبپاشی کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ بہتر ہے مثلاً کئی کو اگر روایتی طریقہ سے کھاد ڈالی جائے تو اس کے پتے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔

ڈی اے پی کھاد کا درست طریقہ استعمال: (ناٹروجن 18 فیصد، فاسفورس 46 فیصد)

70 سے 80 فیصد پاکستانی زمینوں میں فاسفورس کی کمی ہے۔ فاسفورس کی زمین میں حرکت بہت سست ہے۔ پودے کی جڑ زمین میں فاسفورس اپنے بہت ہی قریبی گرد و نواح سے حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس بہت جلد ایک ایسی شکل میں بدل جاتی ہے جس کو پودا حاصل نہیں کر سکتا اسے فاسفورس کا فکس ہونا کہتے ہیں اور یہ عمل پاکستانی زمینوں میں بہت تیزی سے ہوتا ہے۔

☆ ڈی اے پی کی مکمل - فاش کردہ مقدار زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں اور سطح زمین سے 6 سے 8 انچ نیچے ڈالیں اس کے لیے آخری بار ہل چلانے سے پہلے ڈی اے پی کھا دکا چھو لگا کر ایک بار ہل چلائیں اور اسے سطح زمین پر رنر بننے دیں بلکہ بھوں کی جڑوں کی پہنچ تک رکھیں۔

☆ اگر ڈی اے پی کو زمین کی تیاری کے وقت نہ ڈال سکیں تو اسے پہلے پانی کے ساتھ ضرور ڈالیں کیونکہ پودا اپنے دو روزہ تنگی کے پہلے 30 سے 45 دن میں زمین سے فاسفورس لیتا ہے اس کے بعد پودے کی جڑیں بڑھ کر زمین نیچے چلی جاتی ہیں اور اسے لینے کے قابل نہیں ہتی۔

☆ جب اسے پہلے پانی کے ساتھ دینا ہو تو اسے پودوں کی قطاروں سے 2 انچ دور اور سطح زمین سے 2 انچ نیچے ڈالیں۔

☆ ڈی اے پی کو یوریا کے ساتھ ملا کر بھی دیا جاسکتا ہے لیکن زنک کی کھادوں کے ساتھ نہ دیں۔

پوٹاش کی کھادیں

البتہ پاکستانی زمینوں میں پوٹاشیم کی کمی دوسرے غذائی عناصر کی نسبت کم ہے۔ صرف 20 فیصد

زمینوں میں پوناش کی کمی ہے۔ پاکستان میں پوناش کے لیے ایم او پی (پوناش 60 فیصد) اور ایس او پی (پوناش 50 فیصد) کھاد استعمال کی جاتی ہے لیکن چونکہ پاکستانی زمینیں پہلے ہی جو نوا صفت (Calcareous) ہیں اس لیے ایم او پی (K 60%) کھادیں کم استعمال کریں کیونکہ یہ زمینوں میں کلورائیڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے جو پودے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایس او پی (K 50%) کھاد پوناشیم کے علاوہ پودے کو سلفر بھی مہیا کرتی ہے جو بالخصوص تیل دار اجناس کے لیے اہم ثابت ہوتی ہیں۔ پوناش کی کھادوں کو زمین میں ڈالنے سے پہلے زمین کا پوناش کے حوالے سے تجزیہ ضرور کروائیں۔

پوٹاش کی کھادوں کو زمین میں ڈالتے وقت درج ذیل احتیاتی تدابیر پر عمل کریں۔

☆ پوناش زمین میں 1 انچ سے زیادہ حرکت نہیں کرتی اس لیے پوناش کی کھا دوں کو پودے کی جڑ کے قریب ڈالیں۔ اگر پوناش کی کھا دوں کو پودے کی ضرورت سے زیادہ ڈالا جائے تو یہ مختلف نمکیات میں بدل کر زمین میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے پودے کی جڑوں کو نقصان ہوتا ہے اور پچ کے اگنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔

☆ پوٹاش کی کھادوں کو زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں اور یہ زیادہ گہرائی تک نہ جائے۔ سب سے بہتر طریقہ بیج سے 1 انچ نیچے زمین میں ڈالنا ہے۔

☆ آبپاشی والے علاقوں میں پوٹاش کی کھادوں کو پہلے پانی کے ساتھ بھی دیا جاسکتا ہے جبکہ ریتیلی زمینوں میں پوٹاش کی سفارش کردہ مقدار کو بخالص خصوصاً قفوں کے ساتھ ڈالنا زیادہ مفید ہے۔

5- متفرقات

ناٹرو فاس: (ناٹروجن 22 فیصد، فاسفورس 20 فیصد)

اس میں نائٹروجن، امونیم اور نائٹریٹ دونوں شکلوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ پانی کو بہت تیزی سے جذب کرتی ہے اور یہ پاکستانی زمینوں (الکلائن) میں بہت کارآمد ہے کیونکہ یہ ایک تیزابی (pH=3.5) کھاد ہے۔ یہ ریتیلی زمینوں میں بھی کارآمد ہے۔ نائٹرو فاس کو مچھلی فارم میں مچھلیوں کی خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>

فصلوں میں ادویات کا استعمال اور ذخیرہ کرنے کا جدید نقطہ نظر

تفسير:

☆ سپرے کرتے وقت کوشش کریں کہ سارے کھیت میں برابر ہو کہیں پر بھی دودھ سپرے نہ ہو اس سے فصل کے جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

☆ سپرے کرنے سے پہلے موسم کا خاص خیال رکھیں یعنی بارش وغیرہ کا امکان تو نہیں۔

☆ خالی بوتلوں کو تقریباً اٹھارہ انچ گہرا زمین میں دبائے اور استعمال ہونے والے پانی سے دور دبائے۔

☆ سپرے کرنے کے بعد فوراً نہانا چاہیے تاکہ زہر جسم پر نہ رہے۔

☆ جس فصل پر سپرے کیا ہوا سے جانوروں کو کھلانے سے گریز کریں۔

☆ نوزل کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے کیونکہ جتنے بربیک قطرے (پھوار) ہوں گیں سپرے اتنی ہی زیادہ اثر نیزہ ہوگی۔

☆ کسان کو چاہیے کہ سپرے کرتے وقت فصلوں کی بڑھوتری کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ فینوکسی اور بیئیزونک (Phenoxy and benzoic) ان کو مخصوص ادویات کے ساتھ استعمال کریں ورنہ پیداوار زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتی ہے۔

☆ اگر ادویات کو موزوں طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس لیے ادویات کے استعمال سے پہلے اس پر لگا ہوا لیبل اچھی طرح سے پڑھ لیں۔

☆ جسم کے تمام حصوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، ہاتھوں پر دستا نے اور سر پر ٹوپی پہنے۔
آنکھوں کو بھی اچھی طرح سے محفوظ کریں۔

الحديث: ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا: رات کی نماز دو رکعت ہے جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت اور پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو طاق بنادے گی۔ نافع کہتے ہیں عبد اللہ بن عمرؓ ایک رکعت اور دو رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے اور اپنے بعض کاموں کا حکم دیتے۔

بائیو فریڈلائٹرز کا سورج کبھی کی پیداوار میں کردار

پي ايڇ ڊي سڪالر: محمد عقیل سرور نگران: ڊاڪٽر محمد طاہر شعبہ: ايگرا نومي

ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد شعبہ ایگرونی میں ایک تحقیقاتی منصوبہ ترتیب دیا گیا کہ سورج مکھی کی پیداواری صلاحیت میں نانٹروجن کی کیسیائی کھاد کے ساتھ بائیوفرٹلائزرز کی مختلف اقسام کو شامل کر کے سورج مکھی کی فصل کو بہم پہنچائی جائے تاکہ اس کی پیداوار اور کوالٹی میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے نانٹروجن کھاد کی مطلوبہ مقدار کے 100 فیصد، 75 فیصد اور 50 فیصد کے ساتھ بائیوفرٹلائزرز کے طور پر استعمال کیے جانے والے بیکٹیریا کی دو اقسام ایزوسپائرلیم (Azospirillum) اور ایزوٹوبیکٹر (Azotobacter) کو علیحدہ علیحدہ اور ان دونوں کو ملا کر (Azospirillum+Azotobacter) استعمال کیا گیا۔ تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ بیکٹیریا کی دونوں اقسام اور ان کے کچھر (Azospirillum+Azotobacter) کو نانٹروجن کی مختلف مقداروں کے ساتھ استعمال کرنے سے مثبت نتائج آئے اور کوالٹی (غیر سیرشدہ فیٹی ایسڈز) میں 4 سے 15 فیصد نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آخر میں نتیجہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نانٹروجن کی کیسیائی کھاد اور دونوں بیکٹیریا کے کچھر کا اکٹھا استعمال سورج مکھی کی پیداوار میں اضافے کا ضامن ہے۔ اسکے علاوہ بیکٹیریا کے ان کچھر کے استعمال سے کیسیائی نانٹروجن کھاد کے استعمال میں بھی 25 فیصد تک کی لائی جاسکتی ہے۔

<<<<<<<>>>>>>>>

پاکستان خوردنی تیل کی کل ضروریات کا تقریباً ایک چوتھائی خود پیدا کرتا ہے جبکہ باقی تین چوتھائی اربوں روپے کا قیمتی زرمبادلہ خرچ کر کے دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تیلد ارفصولوں کی کاشت کرفروغ دیا جائے تاکہ برآمد پرفحصار کم کر کے قیمتی زرمبادلہ بچایا جاسکے۔ سورج مکھی خوردنی تیلد ارفصولوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ کم دورانیے کی یہ فصل 90 سے 110 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری اہم فصلوں (گندم، چاول، کپاس) کے رقبہ پرفاثر انداز نہیں ہوتی اور اس کے شانہ خلدیکھیتوں میں باآسانی کاشت کی جاسکتی ہے لیکن ہمارے ملک میں اسکی اوسط فی ایکڑ پیداوار ترقی یافتہ ممالک کی نسبت کم ہے۔ تجربا بات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فی ایکڑ پیداوار کی کمی میں شامل دیگر عوامل کے علاوہ غذائی عناصر خصوصاً نائٹروجن کا غیر متناسب استعمال بھی شامل ہے۔ زیادہ تر نائٹروجن کھاد کیسپانی کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے جو نہ صرف مختلف شکلوں میں ضیاع کی وجہ سے فضائی اور زیر زمین پانی کی آلودگی کا باعث ہے بلکہ گراں قیمت ہونے کی وجہ سے پیداواری لاگت میں بھی اضافہ کا سبب بنتی ہے لہذا ایسے طریقہ کار اپنانا ضروری ہے جس سے نہ صرف کیسپانی کھاد کے استعمال اور پیداواری لاگت میں کمی ہو سکے بلکہ ماحول دوست بھی ہو۔ سائنسدانوں نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ بائیوفیوئلائز میں زر کیسپانی کھاد کے متبادل کے طور پرفاستعمال کیئے جانے کی صلاحیت موجود

گندم کی ایلو پیٹھک خصوصیات کے جڑی بوٹیوں اور رائزوسفیئر پر اثرات

بی ایچ ڈی سکالر: فرحیہ اسلم نگران: ڈاکٹر عبدالخالق شعبہ: شعبہ ایگرونیومی

زریعی یونیورسٹی فیصل آباد کی کلیہ زراعت کے شعبہ فلاحت میں 2011-2013ء کے دوران گندم کی علاقائی اقسام کی الیوپیتھک صلاحیت کو پرکھنے کے لیے تجربات کیے گئے۔ تجربہ کے لیے ہم نے چار نئی اقسام (آری 2011، ملت 2011، لاثانی 2008 اور فیصل آباد 2008) کا انتخاب کیا۔ ان اقسام کو لکھت اور وائز ہاؤس دونوں جگہوں پر جانچا گیا۔ ان اقسام کو ڈمی سٹی اور ہاتھو کے ساتھ 1:1 میں اگا گیا اور ان اقسام کے بھوسے کو بطور ملچ بھی ان جڑی بوٹیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج مطابق استعمال کی گئی اقسام میں آری-2011، ملت 2011 اور لاثانی 2008 نے زیادہ اچھے نتائج دیئے۔ تجربہ میں اس بات کو محسوس کیا گیا گندم کی ان اقسام میں Phenolics کی مقدار گندم کی بدھوتری کے ساتھ زیادہ ہوتی گئی۔ ان اقسام کے بھوسے میں بھی Phenolics، کاربن اور نائٹروجن کی مقدار پودے کی عمر کے ساتھ بڑھی۔ جن پلاسٹ میں گندم اگائی گئی وہاں جڑی بوٹیوں کا خشک وزن 75 فیصد تک کم تھا جو کہ آخر میں بڑھ کے 99 فیصد تک ہو گیا۔ اس کے علاوہ رائز و سفیر کی بیالوجیکل ایکٹی ویٹیز (Enzymes Microbes) میں بھی کنٹرول کے مقابلہ میں خاطر خواہ اضافہ محسوس کیا گیا۔ تاہم اس نوعیت کے مزید تجربات کے ذریعہ بہتر اور عملی طور پر فائدہ مند طریقے دریافت کر کے الیوپیتھک کے میڈیٹو انڈکس حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

گندم دنیا کی سب سے اہم غذائی فصل ہے۔ ہمارے ملک میں گندم کی کاشت کا رقبہ باقی فصلوں سے زیادہ ہے لیکن گندم کی قومی پیداوار موجودہ اقسام کی پیداواری صلاحیت سے کم ہے۔ پیداوار میں کمی کا ایک اہم سبب جڑی بوٹیوں کی بہتات ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں جڑی بوٹیوں کی وجہ پیداوار میں 17.5 فیصد کمی رہی جو زرمبادلہ میں 28 ارب کی خطیر رقم بنتی ہے۔ جدید زراعت میں جڑی بوٹیوں کے انسداد کے بغیر فصلات کی منافع بخش پیداوار کا حصول ناممکن ہے۔ جڑی بوٹیوں کا تدارک بذریعہ کیمیائی زہروں اور علاقائی امور (Cultural control) کیا جاتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے کیمیائی زہروں کا بے دریغ استعمال نہ صرف انسانی صحت اور ماحول پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے بلکہ رائز و سفینر میں جمع ہو کر زمین کی بیا لو جیکل ایکٹی ویٹی کو بھی اثر انداز کر رہا ہے علاوہ ازیں جڑی بوٹیوں میں کیمیائی زہروں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورت حال میں جڑی بوٹیوں کے انسداد اور زمین کی بیا لو جیکل ایکٹی ویٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ماحول دوست طریقہ کار مرتب اور استعمال کیے جانے چاہئیں۔ ایلو پتھتی ایک ماحولیاتی عمل ہے جس میں پودے باہمی تعامل کر کے ایک دوسرے کی بڑھوتی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایلو پتھتی کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے جڑی بوٹیوں کا مناسب انسداد کیا جاسکتا ہے اور اس سے ماحول کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہوگا۔ درج بالا حقائق کی روشنی میں

ایلوٹھتی کا فصلوں کی بڑھوتری میں کردار: ایلوٹھتی کی حامل فصلوں کے محلول کا کم مقدار میں چھڑکاؤ

بی ایچ ڈی سکالر: محمد کامران نگران: پروفیسر ڈاکٹر زاہد عطاء شعبہ: ایگروانومی

انتخاب، بے وقت کاشتکاری، پانی اور کھادوں کا بروقت نہ ملنا، یہ ایسے عوامل ہیں جو ہماری زراعت کے شعبے کی ترقی میں رکاوٹ ہیں لیکن ان سب عوامل میں فصلوں کی اوسط پیداوار میں کمی زیادہ نمایاں

بلاشبہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہماری مجموعی قومی پیداوار میں زراعت کا حصہ تقریباً 40 فیصد سے زیادہ ہے اور ملکی برآمدات کا زیادہ تر انحصار زراعت سے منسلک ہے لیکن نامناسب بیج کا

ہوئے زری یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ انگریزی میں اس پر تحقیق کے لیے تجربات کیے گئے جو لیبارٹری اور فیلڈ تجربات پر مشتمل تھی۔ جوار، مکئی، چاول اور سوبا جینا کے محلول کو مکئی کی پیدوار اور بڑھوتری پر ٹیسٹ کیا گیا۔ مشاہدہ سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جوار اور سوبا جینا کا اکٹھا استعمال زیادہ موثر ہے۔ اس محلول کا اکٹھا استعمال سے مکئی کے پودوں کی لمبائی کے ساتھ ساتھ دانوں کی ایک بھڑ پر تعداد اور ان کے وزن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں مکئی کی پیدوار میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چنانچہ جوار اور سوبا جینا کا کم مقدار میں محلول فصلوں کی بڑھوتری میں اضافہ کے لیے ایک فائدہ مند تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ یہ سستا اور ماحول دوست بھی ہے۔

ہے۔ زرعی سائنسدان دن رات زراعت میں نئی نئی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اچھی اور معیاری پیداوار حاصل کر کے معاشرے کی غذائی ضروریات کو پورا کرے۔ حالیہ سالوں میں الیو پتھی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ الیو پتھی دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے۔ پہلا ایلون (Allelon) جس کا مطلب باہمی (Matual) اور پاتھوز (Pathos) جس کا مطلب اثر انداز ہونا ہے۔ الیو پتھی بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر جو ایک پودا دوسرے پودے پر مرکب کرتا ہے۔ بہت سے تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ الیو پتھی کا زیادہ مقدار میں استعمال پودوں کی پیداوار کو نقصان دیتا ہے جبکہ کم مقدار میں پودوں کی ناصرف پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کوئی بھی بہتر ہوتی ہے۔ الیو پتھی کے اسی پہلو کو مدنظر رکھتے

گندم کی پچھیتی کاشت اور ہائیڈروجن پر آکسائیڈ

پی ایچ ڈی سکالر: اظہر غفاری نگران: ڈاکٹر محمد اشفاق واحد شعبہ: ایگرونامی

تجربے کیے گئے۔ ان میں سے 2 تجربے گلاس ہاؤس میں کیے گئے جس میں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ مناسب مقدار بھرا گاؤ اور کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کی گئی۔ اس منتخب مقدار کو اگلے دو تجربوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ دونوں تجربے تحقیقاتی رقبہ برائے شعبہ ایگرونی میں 2011ء سے 2013ء میں کیے گئے۔ ان میں فصل کو دو تا تینوں (نومبر اور دسمبر کی 20 تاریخ) پر کاشت کیا گیا جن پر ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے دو مختلف طریقہ استعمال کو پرکھا گیا۔ پہلے طریقے میں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ اور خالص پانی کو گندم کی مختلف حالتوں (جھاڑ بناتے وقت، گو بھ کی حالت اور سٹہ بناتے وقت) پر سپرے کیا گیا جبکہ دوسرے طریقے میں گندم کے بیجوں کو ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے محلول اور خالص پانی میں 8 گھنٹے بھگوایا گیا۔ فصل کے مکمل اگاؤ کے بعد ہر پندرہ دن بعد مختلف آلات کی مدد سے فصل کی بڑھوتری کو ماپا گیا۔ ہر پلاٹ میں جھاڑ کی تعداد، سٹوں کی تعداد، سٹوں میں موجود دانوں کی تعداد، دانوں کا وزن اور کل پیداوار کو کماریات کے طریقوں سے جانچا گیا۔ ضیائی تالیف اور زنی اثرات سے بچانے والے خامروں کو مربوط طریقہ سے پیمائش کیا گیا۔ دو سالہ تجربات نے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے دونوں طریقہ استعمال کے مثبت نتائج دیئے۔ چھمکتی کاشت گندم کی کارکردگی کو بہتر انداز سے بڑھایا۔ سٹوں کے بننے وقت ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے سپرے نے دوسرے تمام طریقوں سے بہتر انداز میں فصل کی پیداوار کو بڑھایا۔ اقتصادی تجزیہ نے بھی ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا محلول اور اس کا سپرے (سٹوں کے بننے وقت) کو سب سے زیادہ منافع بخش ظاہر کیا ہے۔

ترقی پذیر ممالک میں گندم چاول کے بعد لحمیات اور حرارے کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ 4.5 بلین لوگ روزانہ 20 اور 21 فیصد لحمیات اور حرارے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ گندم پاکستان میں سب سے زیادہ کاشت ہونے والی فصل ہے۔ پوری دنیا میں اس کی پیداوار 707 ملین ٹن ہے جس میں 25 بلین ٹن پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان گندم کی پیداوار کے لحاظ سے ساتواں بڑا ملک ہے۔ ہماری قومی پیداوار کئی ممالک سے بہت کم ہے۔ اب تک کی جانے والی تمام کوششوں کے باوجود گندم کی فی ایکڑ پیداوار اس کی صلاحیت کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ پاکستان میں 56 فیصد سے زیادہ گندم پختہ کاشت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کمپاس اور چاول کا ناگزیر کھنق نظام ہے۔ جس کی وجہ سے یہ سارا رقبہ پختہ کاشت پر مجبور ہے۔ بہت سارے عوام جو کہ گندم کی پیداوار کو کم کرتے ہیں ان میں پختہ کاشت ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر سال 2 ملین ٹن گندم ضائع ہو جاتی ہے۔ مناسب وقت کے بعد کاشت کی گئی فصل کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فصل کو درجہ حرارت میں تغیر و تبدل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گندم کو جھاڑ بنانے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پختہ کاشت میں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے جس سے فصل کا جھاڑ کم بنتا ہے جبکہ دوسری طرف زیادہ درجہ حرارت فصل کے سٹہ بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ پھول بننے کا عمل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ سٹوں میں دانوں کی تعداد میں واضح کمی دیکھی گئی ہے اور گندم کے دانے زیادہ درجہ حرارت سے پتکے جاتے ہیں جس سے دانوں کے وزن میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ اس طرح پختہ کاشت گندم کو دونوں قسم کے درجہ حرارت سے غمٹنا ہوتا ہے۔ پختہ کاشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع ذریعہ میں 4

لوہرن کے چارے اور بیج بڑھانے کے ضروری عوامل

نی ایچ ڈی سکالر: جمشید احمد نگران: ڈاکٹر آصف اقبال شعبہ: ایگرونامی

کے لیے توانائی، کاربوائیڈ ریٹ اور لحمیات کا ایک قابل قدر اور سستا ترین ذریعہ ہے۔ پاکستان میں چارے کی فصلوں میں لوسرن سارا سال غذائیت سے بھرپور چارا دینے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جسکی پانی کی ضرورت بھی کم ہے۔ لوسرن کا شمار پاکستان کے بہت اہم اور مقوی چارا جات میں ہوتا ہے پھلی دار فصلوں میں اسے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ پودے کی بڑھوتری کا مرحلہ چارے کی کٹائی میں بہت اہمیت کا حامل ہے چنانچہ اگر کسی چارے کو انتہائی نوخیز عمر میں کاٹ لیا جائے تو حاصل شدہ چارہ غذائیت سے بھرپور مگر پیداوار میں بہت قلیل ہوگا اسی طرح تاخیر سے کاٹیں گے تو ناقابل ہضم ریشے کی مقدار بڑھ جائے گی اور جانور اسے رغبت سے نہیں کھائیں گے۔ اس لیے جارہ کی فصل کو درمیانی مرحلہ پر جب اس کی کوٹائی اور

ہماری قومی معیشت میں زراعت اور مویشیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہر سال مویشیوں کی تعداد میں تقریباً 2.4 فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح ان کی خوراک کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان میں چار جات تقریباً 13.2 ملین، ہیکٹیر رقبہ پر کاشت کیے جاتے ہیں جو کہ کل کاشت شدہ رقبہ کا 61.91 فیصد ہے اس کے باوجود ہمارے ملک میں چارے کی کمی ہے، جو کہ مویشیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت کم ہے ہبز چارہ کم ہونے کی بنیادی وجہ کاشت کاروں کا کم پیداواری صلاحیت والی پرانی اقسام کی کاشت، نئی پیداواری ٹیکنالوجی کو نہ اپنانا اور بہتر بیج کی عدم دستیابی ہے۔ پاکستان میں جانوروں کی غذائی ضروریات زیادہ تر چار جات سے پوری کی جاتی ہیں جو کہ جانوروں

فی ہیکٹیر کے حساب سے بوائی کی گئی فصل سے بہتر غذا ایت والہ چارہ حاصل کیا گیا۔ جب دسمبر 28 دن کے وقفے کے ساتھ چارے کی فصل کاٹ کر 19 فروری کو لوسرن کی فصل کو بیج کے لیے چھوڑا گیا جبکہ لائن کا درمیان فاصلہ 60 سم اور 10 کلوگرام فی ہیکٹیر کے حساب سے بوائی کی گئی فصل دوسری دیر سے کافی گئی۔ کم فصل اور زیادہ بیج کی شرح والی فصل سے زیادہ بیج کی شرح حاصل کی گئی لہذا ان تجربات کی روشنی میں کانٹیکاروں کو سفاشی کی جاتی ہے کہ لوسرن کی فصل کو 28 دن کے درمیانی وقفے سے چارے کے لیے کاٹا جائے جبکہ 60 سینٹی میٹر لائن اور 10 کلوگرام فی ہیکٹیر پر بوائی کی جائے تو اس سے بہتر کوالٹی کا چارہ حاصل کرنے کے بعد معیاری اور بہت بیج حاصل کیا جاسکتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>

مقدار مناسب ہو سے کاٹنا زیادہ مناسب ہے عام طور پر چارے کی فصل کو کاٹنے کا مرحلہ پھول کے آنے کے وقت سے منسلک کیا جاتا ہے لوسرن کی بہتر چارے کے ساتھ بیج کی مشترکہ فصل حاصل کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی کے شعبہ فلاحات میں لگا تار دو سال 2011-12ء اور 2012-13ء کے موسم ربیع میں تجربات کیے گئے لوسرن کو تین بیج کی شرح (15، 20 اور 20 کلوگرام فی ہیکٹر) اور چار لائنوں کے درمیانی فاصلے (30، 45، 60 سینٹی میٹر اور چھٹے) پر کاشت کیا گیا چارے کی پہلی کٹائی بوائی کے 70 دن بعد لی گئی دوسری اور تیسری کٹائی 28، 35 اور 42 دنوں کے درمیان وقفہ سے لی گئی تین کٹائی لینے کے بعد لوسرن کی فصل بیج کی پیداوار لینے کے لیے چھوڑ دی گئی جب لوسرن کی فصل کو 42 دن کے درمیان وقفہ سے کاٹا گیا تو اس میں کھجی مادے کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح لوسرن کی 30 سم لائن اور 20 کلوگرام

مکئی کی کاشت پر پانی کی کمی اور فاسفورس کے اثرات

یہ ایچ ڈی سکالر: ظہور احمد نگران: ڈاکٹر اعجاز احمد وڑائچ شعبہ: ایگرونیومی

نمکیات یا اجزا پائے جاتے ہیں جو کہ پانی کی شدید کمی کی صورت میں پودوں کی مدد کرتے ہیں۔ فاسفورس بھی ان اجزا میں سے ایک ہے۔ فاسفورس مکئی کے پودے کو پانی کی کمی کے مضراثرات سے دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ فصل کو فاسفورس فراہم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جن میں سے سہرے کرنا اور زمین میں ڈالنا ہیں۔ ان میں سے سب سے آسان اور موثر طریقہ پتوں پر سہرے کرنا ہے۔ پتوں پر سہرے کرنے سے فاسفورس ماسموں کے ذریعے پتوں میں داخل ہو جاتی ہے اور خوراک بنانے والے خلیوں (Mesophyll Cells) کے اوپر ایک تہیہ بنا دیتی ہے جو کہ پانی کے غیر ضروری اخراج کو کافی حد تک روکتی ہے۔ انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ اگرا انوی کے فارم پر مختلف تجربات کیے گئے۔ ان تجربات کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مکئی کے آٹھ پتے نکل آنے کے بعد فاسفورس کا 8 کلوگرام فی ہیکٹیر سہرے کر دیا جائے تو نہ صرف بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے بلکہ پیداوار میں بھی میں 21 فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>

مکئی کا شمار زراعت کی دنیا میں گندم اور چاول کے بعد اہم فصل کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ اپنی پیداواری صلاحیت اور غلہ دار حصے کی وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مکئی انسانی ضروریات کے علاوہ جانوروں کے لیے چارہ کے طور پر اور مرغیوں کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں اچھی پیداوار دینے والی اقسام کے باوجود اوسط پیداوار دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے کم نسبت بہت کم ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جس میں کمزور غیر صحت مند بھج، پانی کی کمی اور درجہ حرارت کا بڑھ جانا شامل ہیں۔ پانی کی کمی مکئی کی کاشت پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پودے کی نشوونما بھج کے اگاؤ سے دانہ پکنے تک ہر ایک مرحلے پر پانی کی صحیح مقدار اور ترسیل بہت ضروری ہے۔ پانی کی کمی سب سے پہلے پودے کی جڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر پانی کی کمی کئی کئی پتوں پر رونما ہوتی ہے۔ شدید پانی کی کمی میں آئٹک ٹاکسیڈی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پودے میں ضیائی تالیف کے عمل کو بہت ہی طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں پودے کے مسام (Stomata) بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جس وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پتوں میں داخل نہیں ہو پاتی جو کہ ضیائی تالیف کے عمل کو روک دیتی ہے۔ قدرتی طور پر کچھ ایسے

باقاعدہ کم آبپاشی کا گندم کی نشوونما کے مختلف مراحل پر پوٹاشیم کی موجودگی میں گندم کی پیداوار اور پانی استعمال کرنے کی کارکردگی پر اثر

شعبه: انسٹیٹیوٹ آف سائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

بی ایچ ڈی سکالر: محمد عمران
نگران: ڈاکٹر انوار الحسن

اور آبپاشی کو آرمایا گیا، تاکہ ان کے اثرات ایوپوٹرانسپائریشن اور ایوپوٹریشن پر دیکھے جاسکیں، ساتھ ساتھ پیداوار اور انگرہم کی پانی استعمال کرنے کی کارکردگی کا تعین بھی کیا جاسکی۔ کھیت میں زمین کے اندر پانی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے TDR کا استعمال کیا جبکہ لاسی میٹر میں پانی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ڈیٹیکٹل ٹیلنس کا استعمال کیا۔ پوٹنشل ایوپوٹرانسپائریشن معلوم کرنے کے لیے ڈیٹا کراپ فزیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی میکالیاتی رصدگاہ سے لیا جو کہ ہماری تجربہ گاہ سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ Hydrus-1D کو استعمال کرتے ہوئے ایوپوٹرانسپائریشن کوٹرانسپائریشن اور ایوپوٹریشن میں تقسیم کیا جس سے یہ معلوم کیا گیا کہ کتنے فیصد پانی ایوپوٹریشن کے ذریعے ضائع ہوتا ہے۔ دوسالہ تجربات کے بعد نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 40 فیصد پانی ایوپوٹریشن کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے جبکہ پودے صرف آبپاشی کا 60 فیصد استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے زمینداروں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ آبپاشی کرتے وقت صرف 60 فیصد پانی استعمال کرے۔

گندم پاکستان کی اہم فصل ہے جو کہ وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کی کم پیداوار کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے ایک اہم ترین پاکستان کی زمین کی زرخیزی کا قدرتی طور پر کم ہونا ہے۔ دوسری طرف آبپاشی کرتے وقت فصل کی ضرورت اور آبپاشی کے بنیادی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جس سے نہ صرف پیداوار میں کمی ہوتی ہے بلکہ بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی کو برداشت کرنے والی فصلوں کی اہمیت اس وقت مزید شدت اختیار کر جائے گی جب آبادی کا دباؤ اور موسمی تغیرات کے شدید اثرات کا سنگم ہوگا۔ تحقیق کے مطابق اگرچہ گندم پانی کی کمی کو کافی حد تک برداشت کر لیتی ہے مگر خاص بڑھوتری کے مراحل پر پانی کی کمی اس فصل کی پیداوار میں بھی 40 سے 50 فیصد تک کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ پوٹاشیم ان عوامل سے نبرد آزما ہونے کے لیے پودوں میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز، زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد کے ریسرچ فارم پر دو سال تک گندم کی فصل برائیک لائی میٹرا اور دو فیلڈ تجربات کے لئے جن میں مختلف شرح برائوشیم

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہؐ نے فرمایا: اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی بھی خاتون کے لیے روانہ نہیں کہ ایک رات کسی محرم رشتہ دار کی ہمراہی کے بغیر سفر کرے۔

ناٹروجن کے نامیاتی اور غیر نامیاتی ذرائع کے چاول اور گندم کے فصلی نظام میں ناٹریٹ کی زیر زمین حرکت، پانی کے استعمال کی کارکردگی، فصل کی نشوونما اور کاربن مضبوطی پر مقداری اثرات

پی ایچ ڈی سکالر: بکلیل احمد نور نگران: ڈاکٹر محمد اقبال
شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

جس میں کاربن مضبوطی (Carbon Sequestration) کی شرح 1.77 فیصد تھی، اور ان کے استعمال سے ہائیڈرولک کنڈکٹیویٹی اور پانی کی انفلٹریشن میں بھی اضافہ ہوا۔ ان تمام تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ناٹروجن کھاد کے مربوط ذرائع کے ذریعے استعمال کرنے سے زمین کی طبعی و کیمیائی خصوصیات بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور زمین کی صحت مزید بہتر ہو کر ناٹریٹ کی زیر زمین حرکت کو کم کر دیتی ہے اور ماحول کو انسان دوست رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ مزید برآں آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والے پانی کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ فصلوں کی بڑھوتری اور نشوونما کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تجربات سے یہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ زمین میں موجود کاربن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ اضافہ ٹیلی تنوں میں بتدریج کم ہو جاتا ہے۔ ان نتائج کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ کھادوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کا نامیاتی مادہ کے ساتھ مربوط استعمال نہ صرف زمین کی تمام خصوصیات کو بہتر کرتا ہے بلکہ فصلوں کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست بھی ہوتا ہے۔

گندم اور چاول ملک کے اہم ترین اناج ہیں۔ مٹی کی صحت براہ راست ان فصلوں کی نشوونما کو کنٹرول کرتی ہے۔ منتخب فصلوں (گندم اور چاول) میں نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا کاربن مضبوطی (Carbon Sequestration) اور ناٹریٹ کی زمین میں حرکت پر اثرات کا مطالعہ گملے اور فیلڈ تجربات کی مدد سے کیا گیا ہے۔ تمام تجربات میں ناٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم اور تین نامیاتی کھادیں گو بر کی کھاد، مرغیوں کی بیٹھوں کی کھاد اور گنے کی مٹی (Press mud) کو بنیادی ٹریٹمنٹ کے تحت استعمال کیا گیا۔ 0-100 سینٹی میٹر گہرائی تک مٹی کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے فصلوں کی بوئی سے پہلے اور کٹائی کے بعد مٹی کے نمونے لیے گئے۔ چاول اور گندم کے مختلف پہلوؤں (پورے پودے کا وزن، پودے کی اونچائی، اناج کی پیداوار، نٹروجن کی پیداوار، ایک مربع میٹر میں شکوفوں کی تعداد اور اناج کی مقدار) کا جائزہ لیا گیا۔ تجربات سے واضح ہوا کہ جہاں پر 75 کلوگرام ناٹروجن 25 کلوگرام مرغیوں کی بیٹھوں کی کھاد کے ساتھ استعمال کی گئی وہاں پر گندم اور چاول دونوں فصلوں نے بہترین نتائج دیئے

اسی: کلراٹھی زمینوں کے لیے کثیر المقاصد متبادل فصل

پی ایچ ڈی سکالر: محمد عبدالقیوم نگران: ڈاکٹر جاوید اختر
شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ناٹریٹ مرکبات کو مفید غذا بنانے والے خامرے ضیائی تالیف کی شرح، اور ضد تکیدی اجزاء کے تعاملات نمکیات سے متاثر ہوتے ہیں۔ نمکیات برداشت کرنے والی اقسام میں حساس اقسام کی نسبت نامیاتی اجزاء، پزیرناستہ اور لحمیات زیادہ مقدار میں جمع ہوتے ہیں اور پانی کے جمع ہونے اور ضیائی اجزاء کے نمکیات کے برے اثرات سے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ ضد تکیدی خامروں بالخصوص SOD، POD اور APX کی سرگرمی پودے کو تکیدی تعاملات کے نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمک نے حساس اقسام میں خلوی جھلی کو بے حد نقصان پہنچایا جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ خلوی جھلی کی درستگی ایسی میں نمکیات برداشت کرنے میں اہم خصوصیت ہے۔ گملوں میں بھری گئی کلراٹھی مٹی میں ایسی کو اگایا گیا تو یہ نتائج سامنے آئے کہ زیادہ نمک والی مٹی (200mM NaCl) میں فصل بچ بننے سے پہلے ہی تباہ ہو گئی جبکہ کم نمک والی مٹی (100mM NaCl) میں فصل کا گاؤ بہتر رہا اور بیج کی پیداوار بھی حاصل ہوئی۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسان کم نمکیات والی زمین پر ایسی کو کامیابی سے کاشت کر سکتے ہیں جبکہ زیادہ کلراٹھی زمین میں ایسی کو سبز چارہ کے طور پر اگایا جاسکتا ہے۔ ایسی کو کم نمکیات والی زمینوں، موزوں پانی کی قلت والے علاقوں یا مصنوعی کھاد کی کمی والے علاقوں میں کامیابی سے کاشت کیا جاسکتا ہے اور اس سے بہترین ریشہ، تیل اور دیگر مفید اشیاء حاصل کی جاسکتی ہیں کیونکہ یہ فصل نقصان پہنچانے والے جزیوڈیم کو اپنی جڑوں میں روک لیتی ہے اور اس میں ضد تکیدی خامرے اور نامیاتی برق پاشیدے کلراٹھی زمین میں اگنے اور بچھلنے پھولنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

اسی معاشی لحاظ سے ایک اہم کثیر المقاصد فصل ہے۔ اس کے تنے سے ریشہ (Silk) اور بیج سے تیل حاصل ہوتا ہے اسی مختلف علاقوں میں اگنے اور بچھلنے پھولنے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے اور اس سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جامعہ زرعی فیصل آباد کے شعبہ زرعی تحقیقاتی مرکز برائے نمکیات میں نمک کے محلول اور کلراٹھی مٹی کے گملوں میں تجربات کیے گئے۔ پہلے تجربہ میں ایسی کی 60 بنیاتی اقسام کو چارہ فٹوں کے لیے نمک ملے پانی کے محلول میں اگایا گیا اور نمک کی شرح 0، 100mM اور NaCl 200mM (کھانے کا نمک) رکھی گئی۔ اس تجربہ میں اچھی اگنے اور بڑھوتری رکھنے والی اقسام کو نمکیات برداشت کرنے والی جبکہ کمزور اگاؤ، بڑھوتری اور مر جانے والی اقسام کو نمکیات کے لیے حساس قرار دیا گیا۔ دوسرے تجربے میں ایسی کی دو حساس اور دو نمکیات برداشت کرنے والی اقسام میں بیج کے اگاؤ پر نمکیات کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ نمکیات سے ایسی کے بیج کا اگاؤ متاثر ہوتا ہے۔ مگر نمکیات برداشت کرنے والی قسم NO-303 میں بیج اگنے کی سب سے زیادہ شرح دیکھنے میں آئی۔ یہ بات بھی واضح نظر آئی کہ جن اقسام میں بیج کا اگاؤ کم رہا، ان میں پودوں کی بڑھوتری بھی نمکیات کے لیے حساس رہی۔ بڑھوتری میں کمی کی وجہ سوڈیم (Na+) معلوم ہوئی کیونکہ ایسی کی وہ اقسام جن میں سوڈیم کی مقدار کم جزیوڈیم ہوئی ان میں پودے کی بڑھوتری اور صحت بہت بہتر رہی۔ اس کے علاوہ ان پودوں میں سوڈیم کو جڑوں میں روکنے اور جمع کرنے کی صلاحیت باقی اقسام سے بہتر تھی۔ تیسرے تجربے میں یہ حقائق واضح ہوئے کہ ایسی میں پانی کے مندرجات، برق پاشیدوں کا بہاؤ، پتوں کے سوراخوں کا کھلنا اور بند ہونا

پٹرولیم آلودگی کا حیاتیاتی کنٹرول

پی ایچ ڈی سکالر: حافظ محمد رفیق نگران: ڈاکٹر حافظ نعیم اصغر
شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

نتیجہ کے طور پر اتفاقی یا حادثاتی طور پر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے ماحول کے تینوں اجزاء یعنی زمین، پانی اور فضاء پٹرولیم آلودگی کا شکار ہو گئے۔ علاوہ ازیں پٹرولیم انڈسٹری دوران پروسیسنگ غیر ارادی طور پر پٹرولیم آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ پٹرولیم آلودگی چاہے وہ زمینی ہو، آبی ہو یا فضائی ہر صورت

دنیا میں صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی انسانی زندگی میں مبینہ دخل بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پٹرولیم مصنوعات دنیا میں اہمیت اختیار کر گئیں کیونکہ زندگی کا ہر شعبہ توانائی کے لیے پٹرولیم مصنوعات پر انحصار کرتا ہے اس لیے پٹرولیم مصنوعات کی تجارت پوری دنیا میں کثرت سے ہونے لگی۔

سے آلودہ کی گئی زمین پر استعمال کیا گیا۔ ابتداء میں تجربات لیبارٹری میں کیے گئے اور لیبارٹری میں کامیاب تجربات کے بعد ان کو قدرتی موسمیاتی حالات میں جانچا گیا۔ نتائج سے ثابت ہوا کہ پودوں اور بیکٹیریا کو الگ الگ استعمال کرنے سے پٹرولیم مصنوعات کی کم تخریب ہوئی جبکہ پودوں اور بیکٹیریا کے مشترکہ استعمال سے پٹرولیم مصنوعات کی زیادہ تخریب ہوئی۔ ایک بیکٹیریا نے تینوں فصلات کے ساتھ سب سے زیادہ پٹرولیم آلودگی کو کم کیا۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے پٹرولیم آلودگی میں 47 فیصد کمی واقع ہوئی۔ نتائج سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بیکٹیریا اور پودوں کو مشترکہ طور پر استعمال کیا جائے تو پٹرولیم آلودگی کو مناسب حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال صنعتی طور پر کیا جاسکتا ہے کیونکہ پٹرولیم انڈسٹری ہر سال لاکھوں روپیہ پٹرولیم فضلے کو حرارتی اور کیمیائی طریقے سے ٹھکانے لگانے میں خرچ کرتی ہے جو نہ صرف سرمایہ کاریاں ہیں بلکہ فضائی آلودگی کا بھی سبب بنتا ہے۔

انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے عناصر موجود ہیں جو کینسر اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی آلودگی کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ پاکستان ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے مالی تعاون سے ادارہ ارضی و ماحولیاتی سائنسز (Institute of Soil and Environmental Sciences) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک پراجیکٹ کے تحت پنجاب کے مختلف علاقوں سے پٹرولیم آلودہ مٹی کے نمونے حاصل کیے گئے اور ان سے بیکٹیریا حاصل کیے گئے۔ زیادہ تر بیکٹیریا ایسے تھے جن میں پٹرولیم مرکبات کی تخریب کا میکا نام موجود تھا۔ ان بیکٹیریا میں ACC-deaminase خمرے کی موجودگی کو جانچا گیا۔ چنانچہ ایسے بیکٹیریا کی سرسوں، مکئی اور لوسرن سے مناسب چیک کی گئی۔ آخر کار آٹھ بیکٹیریا ایسے پائے جن کی مذکورہ تینوں فصلات کے ساتھ مناسب پائی گئی۔ ان آٹھ بیکٹیریا اور تینوں فصلات کو مشترکہ طور پر اور الگ الگ مصنوعی طور پر پٹرولیم مرکبات

مکئی میں سیلیکون کی غذائیت سے نمکیات کے مضر اثرات کا تدارک

پی ایچ ڈی۔ کالر: وقاص الدین خان نگران: ڈاکٹر طارق عزیز شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

تدابیر کے کچھ فائدے اور نقصانات بھی ہیں جو کہ شائع شدہ ہیں۔ مناسب مقدار میں معدنی غذا کا استعمال ایک طے شدہ تدبیر ہے جو کہ پودوں کو نمکیات کی زیادہ مقدار سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ سیلیکون ایک فائدہ مند غذائی جزو ہے جو کہ پودوں کی بڑھوتری میں اضافہ کرتا ہے۔ خصوصاً وہ بے جان عناصر جو پودوں کی نشوونما میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ پودوں کیلئے کئی طرح سے فائدہ مند ہے جیسا کہ پودوں میں پانی کی مقدار برقرار رکھنا، کلوروفل مواد پر مثبت اثر اور ٹرانسپائریشن کی شرح مناسب رکھنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ مزید برآں یہ غذائی جزو کلراٹھ کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے اور پودے کی بڑا ہوتوں کے وزن میں اضافہ کرتا ہے اور سوڈیم کی مقدار کو بھی پودوں میں کم کرتا ہے۔ سیلیکون کو کلراٹھ زمینوں میں ڈالنے سے مکئی کی بڑا ہوتے کے وزن میں اضافہ، ان کی لمبائی اور فروٹو سنٹھیسز کی سرگرمی میں کافی اضافہ دیکھا گیا، ہم نے لیبارٹری، گلوں اور کھیت میں مختلف تجربات کر کے اس بات کو واضح کیا کہ سیلیکون مکئی میں نمکیات کے اثرات کو کم کرتا ہے اور اسکی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے کلراٹھ زمینوں میں مکئی کی پیداوار میں اضافہ کے لیے سیلیکون کا مناسب استعمال ناگزیر ہے، اور کسانوں میں اسکی باگھی بہت ضروری ہے۔

فوڈ سیکوریٹی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ترقی پزیر ممالک کے لیے نکلین خطرہ بن چکی ہے۔ حالیہ تجزیہ کے مطابق، دوارب سے زائد لوگوں کو غربت یا قدرتی آفات کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خراب زمینوں کو قابل کاشت بنایا جائے۔ کلراٹھ زمین نا قابل کاشت رقبہ کی اہم وجہ ہیں۔ زیادہ تر کلراٹھ زمین یا تو قابل کاشت نہیں ہے یا ان کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہے۔ اس لیے فوڈ سیکوریٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کلراٹھ زمینوں کی اصلاح اور حفاظت کو خصوصی ترجیح دی جائے۔ مکئی پاکستان کی ایک بہت اہم اناج کی فصل ہے جو کہ کافی بڑے رقبے 1.168 ملین ہیکٹر پر کاشت کی جاتی ہے اور اسکی پیداوار 4.944 ملین ٹن ہے۔ یہ خوراک کی دستیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان میں 6.3 ملین ہیکٹر کلراٹھ زمین ہے۔ اگر اس کلراٹھ رقبہ کو مکئی کے لیے قابل کاشت بنایا جائے تو ان زمینوں میں سے 1.34 ملین ٹن مکئی کی پیداوار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسی تدابیر اپنانے کی اشد ضرورت ہے جو کہ ان خراب زمینوں کو قابل استعمال بنا سکیں جیسا کہ، آبپاشی، اونچے زمینی بیڈز، نامیاتی کھادوں کا استعمال اور کلراٹھ فصلوں جیسا کہ کلرگھاس کاگا، ان تدابیر میں شامل ہیں جو ان خراب زمینوں میں فصل کی پیداوار کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ ان تمام

دوست خطیے اور انکی افادیت

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد رحیل نگران: ڈاکٹر نذیر جاوید شعبہ: پلانٹ پتھالوجی

والے دوست خطیوں کا تعلق انہی سے ہے۔ ان خطیوں کے اجسام میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یہ خطیے زمین میں موجود سڈیوں کے اجسام میں سورائوں spiraeals منہ کے ذریعے داخل ہوجاتے ہیں اور ان کے داخل ہوتے ہی ان خطیوں کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریا یا باہر آ جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ایک خاص قسم کا زہر پیدا کرتا ہے جس کے اثر سے 2 سے 3 دن میں سڈی کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ مری ہوئی سڈی کے جسم کے اندر بیکٹیریا اور خطیوں کی افزائش اور تولید ہوجاتی ہے اور ایک سے دو ہفتوں کے اندر ایک سڈی سے 5 لاکھ نئے خطیے باہر نکل آتے ہیں اور نئے حشرات کی تلاش شروع کر دیتے ہیں لہذا ان خطیوں کا استعمال ایک مستقل عمل ہے۔ اس طرح کے کنٹرول سے ماحول پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ یہ خطیے پودوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی ان خطیوں کی وجہ سے زمینی پانی میں آلودگی ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں پر بھی ابھی تک کسی قسم کا منفی اثر نہیں رپورٹ ہوا۔

زرعی پیداوار پر بہت سے قدرتی عوامل کے منفی اثرات ہوتے ہیں جن میں موسمی تبدیلیاں اور مختلف قسم کے دشمن مثلاً جڑی بوٹیاں، بیکٹیریا یا فنجائی، وائرس شامل ہیں۔ پاکستان کی زرعی پیداوار کو صرف مختلف قسم کے رس چوس اور پتہ کھانے والے کیڑوں کی وجہ سے ہی 14 فیصد نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان کو مختلف اقسام کی زرعی زہروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان زہروں کے فوائد کم اور مجموعی طور پر نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ زہر نہ صرف مچھکے ہوتے ہیں بلکہ انسانوں سمیت پورے ماحول کے لیے مضر صحت بھی ہوتے ہیں۔ ان زہروں کے استعمال سے کیڑوں میں ان کے خلاف مدافعت بھی بڑھتی رہتی ہے جس کے بڑھنے سے ان کیڑوں پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے چند بائیو لاجیکل کنٹرول انٹیجنس استعمال میں لائے جاتے ہیں جو کہ IPM (Integrated Pest Management) کا ایک اہم جزو ہوتے ہیں یہ ایک ماحول دوست محفوظ اور موثر طریقہ انسداد ہے۔ زمین میں پائے جانے

مزید یہ کہ ان خطیوں کو ہم مختلف قسم کے پلانٹ ایکسٹریکٹ (Plant Extract) اور بعض کم نقصان دہ کیڑے مار دویات اور آبچھوندی کش زہروں کے ساتھ ملا کر بھی پرے کر سکتے ہیں۔ یہ خطیے عام سپرے والی ٹینکی میں ڈال کر سپرے بھی کیے جاسکتے ہیں جس میں ان کی تعداد 1.5 بلین خطیے فی لیٹر ہوتی ہے۔

ان دوست خطیبوں کو محدود پیمانے پر گرین ہاؤس نرسری، باغات اور انگوٹھوں کی کھیت میں دشمن کیڑوں کے تدارک کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے لہذا ان خوبیوں کے پیش نظر کیڑوں انسداد کے لیے ان خطیبوں کے استعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

برائے چوزوں کی خوراک میں موجود افلاٹاکسن اور اوکراٹاکسن کا تدارک

پی ایچ ڈی سکالر: شیراز احمد بھٹی نگران: محمد ضریح خان شعبہ: امراضیات

موجودہ تحقیق میں مختلف تجربات کا بنیادی مقصد مقامی طور پر دستیاب بینٹو نائٹ (Bentonite) اور بنتا سستی اکٹیویٹڈ چارکول (Charcoal Activated) اور حیاتیاتی مصنوعات ٹرائیکوسپوران مائیکوٹوکسینووران (*Trichosporan mycotoxinovorans*) کا برائے چوزوں پر افلاتا کسن (Aflatoxin) اور اوکراٹاکسن (Ochratoxin) کے مضر اثرات کو زائل کرنے کا جائزہ لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے تین الگ الگ تجربات میں برائے چوزوں کو مقامی طور پر حاصل کردہ بینٹو نائٹ (3.5، 7.5 اور 15 گرام فی کلو)، اکٹیویٹڈ چارکول (2.5، 5 اور 10 گرام فی کلو) اور ٹرائیکوسپوران مائیکوٹوکسینووران (0.5، 1.0 اور 2.0 گرام فی کلو) کے مثبت اثرات کا جائزہ خوراک میں افلاتا کسن (0.1، 0.2 اور 6.0 ملی گرام فی کلو) کے ساتھ شامل کر کے جانچا گیا۔ بینٹو نائٹ اور اکٹیویٹڈ چارکول نے خوراک میں تھوڑی مقدار میں شامل اوکراٹاکسن کے اثرات کو زائل کرنے میں مدد فراہم کی مگر زیادہ مقدار میں موجود زہر کے اثرات کو زائل کرنے میں ناکام رہی۔ ٹرائیکوسپوران مائیکوٹوکسینووران نے 1.0 اور 3.0 ملی گرام فی کلو اوکراٹاکسن کے خلاف مکمل تحفظ فراہم کیا تاہم اوکراٹاکسن کی 1.0 ملی گرام فی کلو کی مقدار پر جزوی تحفظ نظر آیا۔ خوراک میں موجود افلاتا کسن کی مقدار 0.1 اور 0.2 ملی گرام فی کلو کے خلاف بینٹو نائٹ اور اکٹیویٹڈ چارکول کے استعمال کی وجہ سے برائے چوزوں کے وزن اور قوت

مدافعت میں نمایاں بہتری نظر آئی تاہم افلاتاکسن کی زیادہ مقدار کے خلاف جزوی مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ٹرائیکوپوران مانیکوٹاکسنو واران کی تمام مقداریں خوراک میں موجود افلاتاکسن کے مضر اثرات کو روکنے میں ناکام رہی۔ موجودہ تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ برائلر چوزوں کی خوراک میں بینفو نائٹ اور اکیوٹائٹ چارکول کے استعمال سے اوکراٹاکسن کے مضر اثرات روکنے میں جزوی حد تک کامیابی ملی مگر افلاتاکسن (Aflatoxin) کے خلاف ان کے استعمال سے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ٹرائیکوپوران مانیکوٹاکسنو واران کا استعمال اوکراٹاکسن کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مگر اس کے استعمال سے افلاتاکسن کے مضر اثرات میں کوئی خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوئی برائلر چوزوں کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے خوراک میں Toxin binder کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ مرغیوں کی خوراک میں بینفو نائٹ اور ٹرائیکوپوران مانیکوٹاکسنو واران کا آمیزہ شامل کیا جائے تاکہ پھپھوندی کے زہر کے مضر اثرات کا مکمل طور پر سدباب کیا جاسکے۔ یہ تدابیر برائلر چوزوں کی اچھی صحت اور بہتر پیداوار کی ضامن ہو سکتی ہیں اور غذائی صلاحیت اور معیار بھی متاثر نہیں ہوگا۔

<<<<<<<<>>>>>>>>>>

روایتی طبی پودوں کا کینسر کے خلاف صلاحیت معلوم کرنے کے لیے کیمیائی اور حیاتیاتی تجزیہ

بی ایچ ڈی سکالر: عائشہ اشرف نگران: ڈاکٹر راجہ عادل سرفراز شعبہ: کیمسٹری

اس تحقیقاتی مقالے میں پاکستان میں طبی روایتی طریقوں سے استعمال ہونے والے پودوں کا سائنسی طبی بنیادوں پر تجزیہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے موجودہ تحقیق میں پانچ مختلف پودوں کا انتخاب کیا گیا۔ جن میں سفید، بنفشہ، تھوہر، امرود اور بیر شامل ہیں۔ ان پودوں کے عرقیات مختلف نامیاتی حمولات میں تیار کیے گئے۔ مختلف عرقیات کا کیمیائی تجزیہ نباتی کیمیاء کی مختلف تکنیکات (سپیکٹرو فوٹومیٹری، ہائی پرفارمنس، لیکونڈ کروماٹوگرافی اور گیس کروماٹوگرافی ماس سپیکٹرومیٹری) کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ ان تکنیکات نے ہر عرق میں موجود مختلف قسم کے اہم کیمیائی مرکبات کی نشاندہی کی۔ ان عرقیات کی آپسی ڈپشن تعاملات، بہاریاں پیدا کرنے والے خوردبینی جانداروں، ٹیومور انسان کی کینسر کی مختلف اقسام

کے خلاف صلاحیت مختلف قسموں کے تجربات سے معلوم کی گئی۔ آکسی ڈیٹن تعلیمات کے خلاف سب سے زیادہ صلاحیت بیر کے متھانول عرق میں مشاہدہ کی گئی۔ تمام پودوں نے ٹیومر کے خلاف صلاحیت ظاہر کی لیکن سب سے زیادہ صلاحیت بنفشہ کے میٹھانول عرق نے ظاہر کی۔ امرو دکانان پور عرق کو کون کنسیر کے خلاف بہت موثر ثابت ہوا جبکہ بیر کا کلوروفارم عرق انسانی Tongue Squamous Cancer کے خلاف بہت زیادہ موثر تھا۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان پودوں میں مختلف بیماریوں خصوصاً کینسر کے خلاف صلاحیت سے اور یہ پودے کینسر کے خلاف ادویات کی تیاری میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

لیکنیر خامرے کی افادیت بڑھانے کے لیے مختلف تجرباتی عوامل کا باہمی موازنہ

بی ایچ ڈی سکالر: سعدیہ نورین نگران: ڈاکٹر محمد اصغر شعبہ: بائیو کیمسٹری

فجائی کا تعلق جانداروں کے ایسے گروپ سے ہے جس میں مختلف قسم کے خامرے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جدید دور میں سائنسدان نہ صرف اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ بڑھتی ہوئی صنعتی پیمانے میں خامروں کی ضروریات پیداوار کو ناصرف پورا کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان خامروں کی صنعتی پیمانے میں استعمال ہونے کے دوران مثبت افادیت و حصول کو دیر پا قائم رکھا جاسکے۔ اگر ان خامروں کی ہاف لائف کو بڑھا جائے تو صنعتی پیداوار میں مثبت اثرات کے ساتھ صنعتی ترقی کو

فروغ بھی ملے گا۔ موجودہ دور میں سائنسدان اس پر تحقیقاتی و تجرباتی کام کو بروے کار لا کر کئی ٹھوس نتائج کی کھوج میں ہیں۔ چونکہ زیادہ درجہ حرارت پر یہ خامرے اپنی قابلیت کھودیتے ہیں اس لیے سائنسدان مختلف کیمیائی کمپاؤنڈز کے ساتھ کیمیائی تعامل کروا کے ان خامروں کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں کیمیائی تعاملات بذریعہ ایموبلائیشن کے بعد یہ خامرے زیادہ درجہ حرارت اور مختلف کیمیائی عوامل سے گزرنے کے بعد بھی اپنی افادیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان تحقیقاتی کاموں کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ

الپینیت، چیلون اور کراس لکنڈ ایگریگیٹ ایسے کیمیائی مرکبات میں جنکی اس خامرے کے ساتھ کیمیائی تعامل کے دوران یہ خامرہ اپنی نوعیت برقرار رکھتے ہوئے زیادہ دیر تک قابل استعمال رہتا ہے۔ ان کیمیائی مرکبات کے ساتھ کیمیائی تعامل کے دوران یہ خامرہ ایسے مضبوط باندھن تشکیل کرتا ہے جسکی وجہ سے زیادہ درجہ حرارت اور مختلف ماحولیاتی عناصر کے اثرات کے باوجود یہ خامرہ اپنی افادیت اور صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے۔

تحقیق ایک ایسے خامرے پر کی گئی جو صمغی پینانے میں بہت اہمیت کا حامل ہے لیکیز خامرے کو صمغی سطح پر مختلف مراحل میں مخصوص خاصیت کی بنا پر مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے تجرباتی کام میں ہم نے لیکیز خامرے کی پیداوار ایک خاص قسم کی فنجائی ٹریڈیٹور سیکولر *Trametes versicolor* سے کروائی اور بڑھتے ہوئے صمغی رجحان اور خامرے کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہم نے مختلف کیمیائی مرکبات کے ساتھ بذریعہ امیوبلازیشن لیکیز خامرے کا تجرباتی عمل دہرایا مختلف مرکبات میں سے

خشک سبزیوں اور خشک میوہ جات کا تسکیدی اور گلائیکیشن کے عوامل کی روک تھام میں کردار

پی ایچ ڈی سکالر: آسیہ عطا نگران: ڈاکٹر منیر احمد شیخ شعبہ: بائیو کیمسٹری

Antioxidation اور دیگر طبی و حیاتیاتی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہیں۔ یہ مرکبات ہمارے جسم میں بننے والی بہت سی بیماریوں کا سبب بننے والے فاسد مادوں کی بھی تبدیل کرتے ہیں۔ ان تناظر میں ان سبزیوں اور خشک پھلوں کے عریقات کو پیچھے چھوڑ دو اور انٹریوں کے سرطان کے علاج کے لیے بھی آزمایا گیا جن کے نتائج سے ثابت ہوا کہ ان اجناس کا باقاعدہ استعمال سرطان جیسے موذی مرض سے بچاؤ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید برآں تجربہ گاہ میں ان سبزیوں اور پھلوں کو ذیابیطس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں مثلاً امراض چشم، پٹھوں کی کمزوری، ہاتھوں اور پاؤں کی غیر حساسیت کا باعث بننے والے مرکبات (Advanced Glycation End Products (AGEs) پر قابو پانے کے لیے بھی موثر پایا گیا۔ اس تحقیق کی بنا پر منتخب کردہ سبزیاں اور خشک میوہ جات نہ صرف مخفی اینٹی آکسیڈینٹس میں کثیر بلکہ زہریلے مادوں سے پاک پائے گئے۔ ان اجناس کا باقاعدہ استعمال نہ صرف غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ بہت سی بیماریوں سے بچانے کا موثر لائحہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان غذائی اجناس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق سائنس اور طب کے میدان میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

خشک میوہ جات اور تازہ سبز یوں کی اہمیت زمانہ ازل سے ہے۔ اس تحقیق میں روزمرہ استعمال کی مختلف سبزیاں (بیٹی، گاجر، شہجہ، بیگن اور شکر قندی) اور خشک میوہ جات (کھجور، بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، پستہ، گری، کشمش اور خوبانی) کی غذائی افادیت کے ساتھ ساتھ ان کی Antioxidation اور Antiglycation کی خصوصیات کا بھی سائنسی تجزیہ کیا گیا۔ غذائیت کے ابتدائی معائنہ سے یہ ثابت ہوا کہ منتخب کردہ تمام اجناس میں نشاستہ، لحمیات، پکٹائٹ اور وٹامن کی بھرپور مقدار کے ساتھ ساتھ دیگر اہم عناصر مثال کے طور پر سوڈیم، کلسیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اور فاسفورس جیسے ضروری اجزاء بھی اہم تناسب میں پائے جاتے ہیں جو کہ غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دریں اثنا تمام منتخب کردہ سبز یوں اور میوہ جات کا مختلف حلاوت کو استعمال کرتے ہوئے عرق نکالا گیا جن میں میتھانال سے نکالے گئے عرق کی خاصیت سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ تمام سبز یوں اور پھلوں کے سائنسی اور کیمیائی معائنہ سے یہ علم ہوا کہ ان میں بہت سے حیاتیاتی مرکبات جیسا کہ Alaloids، Flavonoids اور Tannins کا وجود ہے جو کہ ان اجناس کی

کم پانی میں زیادہ پیداوار دینے والی گندم کی ایک قسم

بی ایچ ڈی سرکار: عائشہ بٹ نگران: ڈاکٹر نثار احمد شعبہ: بائیو کیمسٹری

کہ گندم کو بدلتے حالات کے موافق بنایا جاسکے اس مقصد کے لیے مٹی کے ایک بیکٹیریا یا E-coli سے ایک جین *gdhA* گندم میں منتقل کیا گیا ہے۔ دوران مطالعہ دیکھا گیا ہے کہ *gdhA* جین پودے کے بہت سارے قدرتی عملوں کو بہتر بناتا ہے پودوں میں خشک سالی کو برداشت کرنے کی طاقت میں کمی گنا اضافہ دیکھا گیا۔ اسکے ساتھ ساتھ کلوروفل B, A اور Caroteneids میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پیداوار کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان پودوں کی لمبائی، جڑوں کی لمبائی، پتوں کی تعداد، سٹوں کی مونائی اور بایوں کی تعداد، دانوں کی تعداد اور وزن میں پودوں کے خشک اور گیلے وزن میں کنٹرول کی نسبت اضافہ دیکھا گیا۔ ان تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹرانسجینک فیصل آباد 2008 نہ صرف خشک سالی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ مانی میں بہتر پیداوار دینے کی بھی حامل ہے۔

گندم ہمارے ملک میں خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ہماری بیشتر صنعتیں بھی اسی کی مرہون منت ہیں۔ ہمارے ملک کی معیشت بڑی حد تک گندم کی پیداوار پر انحصار کرتی ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ زراعت سے منسلک ہے۔ پاکستان کا تقریباً 80 فیصد رقبہ بارانی ہے۔ بڑھتی آبادی اور کم ہوتے ہوئے پانی کے وسائل ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور بارشیں کم ہوتی ہیں دوسری طرف ڈیزلزم ہونے کی وجہ سے پانی کی ایک بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے اور پانی زرعی استعمال کے لیے ناکافی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر بہت ساری زرعی اراضی رہائشی کالونیوں میں منتقل ہو چکی ہے اور پانی نہ ہونے کے باعث بہت ساری اراضی خیر ہو چکی ہے۔ موجودہ صورت حال میں گندم کی پیداوار کو بڑھانے کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ ہم اپنے پودوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ کم پانی پر بھی اچھی پیداوار دے سکیں۔ ان حالات کے پیش نظر ایک تحقیق کی گئی تا

سپاڑولینا: صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور غیر روایتی ماخذ لحمیات

پی ایچ ڈی سکالر: شاہد بشیر
نگران: ڈاکٹر میاں کامران شریف
شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

ترکیبی میں لحمیات 63 فیصد، چکنائی 2.7 فیصد اور معدنیات 4.9 فیصد شامل ہیں۔ سپارولینا میں موجود لحمیات انسانی جسم میں امینو ایسڈز میں تحلیل ہو کر جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں تمام آٹھ لازمی امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں سپارولینا میں موجود

سائرو لینا خوردہ ہیں کائی کی ایک قسم ہے۔ کئی خلیاتی نیلی سبز کائی (Blue green algae) گرم اور نمکین پانی میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی غذا اسیت بخش خوراک ہے کیونکہ یہ لحمیات، چکنائی، نشاستہ، حیاتین، کلوروفل، امینی آکسائیڈز اور معدنیات کا متوازن ذریعہ ہے۔ سائرو لینا کے کھپائی کے اجزاء

رفع کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے سائزولینا اور اس جیسے مزید غذائیت سے بھرپور غیر روایتی ماخذ لحمیات پر تحقیق اور ان کا غذائی فوریٹیکیشن و کمپلیمینٹیشن میں استعمال ناگزیر ہے لہذا اس سلسلے میں مزید تحقیق کو بڑھاوہ دینے کی ضرورت ہے اور صوبائی و قومی سطح پر غذائی پروگرام و حکمت عملی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے خامرے پر کی گئی جو صنعتی پیمانے میں بہت اہمیت کا حامل ہے لیکیز خامرے کو صنعتی سطح پر مختلف مراحل میں مخصوص خاصیت کی بنا پر مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے تجرباتی کام میں ہم نے لیکیز خامرے کی پیداوار ایک خاص قسم کی فنجائی ٹرمیٹوٹر ویکولر *Trametes versicolor* سے کروائی اور بڑھتے ہوئے صنعتی رجحان اور خامرے کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہم نے مختلف کیمیائی مرکبات کے ساتھ بذریعہ ایموبلائزیشن لیکیز خامرے کا تجرباتی عمل دہرایا مختلف مرکبات میں سے الجینیٹ، چٹوٹس اور کراس لکٹڈ ایگریگیٹ ایسے کیمیائی مرکبات میں جنکی اس خامرے کے ساتھ کیمیائی تعامل کے دوران یہ خامرہ اپنی نوعیت پر برقرار رکھتے ہوئے زیادہ دیر تک قابل استعمال رہتا ہے۔ ان کیمیائی مرکبات کے ساتھ کیمیائی تعامل کے دوران یہ خامرہ ایسے مضبوط باندھتکمیل کرتا ہے جسکی وجہ سے زیادہ درجہ حرارت اور مختلف ماحولیاتی عناصر کے اثرات کے باوجود یہ خامرہ اپنی افادیت اور صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے۔

تحقیق ایکٹیو ایڈز میں linoleic acid اور linolenic acid نمایاں ہیں جو کہ کل چکنائی کا بالترتیب 16 اور 17 فیصد ہیں۔ اسکے علاوہ وٹامن اے اور منرلز جیسا کہ سوڈیم، پوٹاشیم، کیکشیم، میگنیشیم، زنک اور فولاد سپارو لینا میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ سپارو لینا میں موجود لحمیات، کلوروفل، وٹامن B12 اور فولک ایسڈ خون کے سرخ ذروں کی مقدار اور استعدا کو بڑھاتے ہیں۔ مینا کیروٹین ایک مانع سرطان جزو ہے جو کہ متعدد سائنسی تحقیقات سے ثابت ہے۔ مزید برآں یہ وٹامن اے کا بھی منبع ہے۔ ان تمام فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تحقیق میں سپارو لینا کا کیمیائی تجربہ اور اس میں موجود لحمیات کو علیحدہ کر کے اسکا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں سپارو لینا کو روزمرہ خوراک کا حصہ بنانے اور زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے Supercritical fluid extrusion جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے میٹھی کرپسی فوڈ بار بنائی گئی جو کہ سپارو لینا کی تمام تر فوائد سے لبریز ہے۔ میٹھی کرپسی فوڈ بار (100 گرام) روزمرہ غذائی ضروریات کے اعتبار سے لحمیات (60-40 فیصد)، وٹامن اے اور سی (60-50 فیصد) اور فولاد و زنک (100 فیصد) کی حامل ہے۔ مزید برآں میٹھی کرپسی فوڈ بار 329 حرارے فی سوگرام مہیا کرتی ہے۔ ایسی پراڈکٹس سکول جانے والے بچوں کی غذائی ضروریات کو کافی حد تک پورا کرنے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں لحمیات، وٹامن اے اور فولاد و زنک کی کمی کو

چیڈر چیز: غذائیت اور اہمیت

شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

یہی ایچ ڈی سکالر: صائمہ رفیق نگران: ڈاکٹر زہت ہما

چیڈر چیز کو بنانے کے بعد کچھ مدت کے لیے ایک خاص درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے۔ اس دوران چیڈر چیز کی خوشبو اور ذائقہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مرکبات بنتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ ان میں سے کچھ مرکبات دل کی بیماری، کچھ کینسر کو کم کرنے اور کچھ جراثیم سے حفاظت میں مدد کرتے ہیں۔ سائنس دانوں نے خاص قسم کے مرکبات (Bioactive peptides) کو چیڈر چیز سے الگ کر کے پاؤڈر کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے جو کہ مختلف ادویات اور خوراک کی مصنوعات میں اضافی طور پر ڈالے جاتے ہیں تاکہ جسمانی بیماریوں کو موثر طور پر کنٹرول کیا جائے۔ اس پر سب سے زیادہ کام (Research) جا پان کا ہے۔ ان کی Bioactive peptides پر مشتمل مختلف خوراک کی مصنوعات انٹرنیشنل مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اس سے ملتا جلتا کام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی کیا گیا۔ چیڈر چیز بنانے کے لیے گائے اور بھینس کا دودھ استعمال کیا گیا۔ اس پتھر سے اخذ شدہ مرکبات کا مختلف بیماریوں کے لیے ٹیسٹ کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں چیڈر چیز کی غذائیت اور اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔

عالمی سطح پر متعدد جسمانی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس میں ڈیپریشن، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور کینسر جیسے امراض سرفہرست ہیں۔ خاص طور پر دل کی بیماریاں عوامی صحت کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ اگرچہ ان بیماریوں کی روک تھام اور علاج کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر ان ادویات کے مضرات بھی ہوتے ہیں جو کہ کئی کئی بیماری کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس تناظر میں فعال اجزاء پر مشتمل کھانے کی مصنوعات کا استعمال ایسی تمام بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ روزمرہ خوراک میں دودھ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس سے تیار ہونے والی مصنوعات (دہی، پنیر وغیرہ) کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنیر میں ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ درج بالا امراض میں کمی کا باعث بننے اور ان کی روک تھام بھی کرتے ہیں۔ پنیر غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں وافر مقدار میں لحمیات (پروٹین)، نمکیات (کلیشیم، فاسفورس) اور وٹامن (B-12, A) موجود ہوتے ہیں۔ پنیر میں موجود پروٹین کی کوالٹی سب سے اچھی ہے جو کہ جسم میں مکمل جذب ہو کر توانائی مہیا کرتی ہے اور اس میں موجود Amino Acid پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ پنیر کی ایک خاص قسم چڈر چز (Cheddar Cheese) غذائیت اور صحت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔

Propolis- شہد کی مکھیوں کی مصنوعات اور اس کے فائدے

شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

بی ایچ ڈی سکالر: محمد شہباز نگران: ڈاکٹر طاہر ظہور

اور اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر کے یہ ممالک کافی زرمبادلہ بھی کمارہے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے پاکستان میں اس کو ایک ویسٹ سمجھتے ہوئے ہر سال کافی بڑی مقدار میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی Propolis کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ سٹڈی ڈیزائن کی گئی تاکہ اس کے فائدوں کو پرکھا جاسکے۔ موجودہ سٹڈی میں Propolis فیمل آباد کے گرد و نواح سے اکٹھی کی گئی اور اس کو صاف کرنے کے بعد اس کی کیمیائی ترکیب کو جانچا گیا۔ جس سے پتہ چلا کہ اس میں موم کے ساتھ ساتھ

پاکستان میں شہد کی مکھیاں ہر سال بہت بڑی مقدار میں شہد پیدا کرتی ہیں لیکن اسکے ساتھ ساتھ مکھیاں موم اور Propolis (مخلی موم - موم سے ملتا جلتا ایک رالی مادہ جسے شہد کی مکھیاں پھولوں اور مکھیاں سے جمع کرتی ہیں) کی بڑی مقدار بھی بناتی ہیں۔ Propolis شہد کی مکھیوں کی ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے بہت سے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ Propolis کو ایک فائلو پروڈکٹ سمجھتے ہوئے اس کو کھانے کے لیے بہت سے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ Propolis کو ایک فائلو پروڈکٹ سمجھتے ہوئے اس کو کھانے کے لیے بہت سے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔

یہ بات سامنے آئی کہ 65 فیصد استھائل الکوحل کے ایکسٹریکٹ نے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں زیادہ اہم کردار ادا کیا اور اسی طرح اس نے ڈی این ایس اور ہائی کولیسٹریل کو بھی کم کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ اس مشاہدہ کے دوران یہ بھی چلا کہ G-Negative، G-Positive بیکٹیریا کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ موجودہ سٹڈی کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ *S. aureus* بیکٹیریا سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس سٹڈی کے نتیجے میں درج ذیل سفارشات کی جاتی ہیں کہ کسانوں کے اندر آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے تاکہ ان کو Propolis کی افادیت کا اندازہ ہو سکے اور اس انتہائی قیمتی پروڈکٹ کو ویسٹ سمجھ کر ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس کو صنعتی پیمانے پر پیدا کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔

انتہائی اہم و نامزد اور منزل بھی موجود ہیں۔ اسے کے ریزرنز کے اندر بہت سے مفید مرکبات پائے جاتے ہیں جیسا کہ پولی فینولز اور فلیوونائڈز وغیرہ شامل ہیں۔ ان مرکبات کا انداز لگانے کے لیے Propolis کا ایکسٹریکٹ الکوحل اور پانی کے محلول میں بنایا گیا۔ جس کو بعد میں کواٹھی کے لحاظ اور مرکبات کی مقدار کے لیے تجزیاتی کیمسٹری کے ذریعے سے پرکھا گیا اور جو ایکسٹریکٹ بہترین نتائج کا حامل ٹھہرا، اس کو الگ کیا گیا اور اس سے ایک ڈرنک بنایا گیا جس کو ڈی این ایس اور ہائی کولیسٹریل کی خرابیوں کے خلاف لیبارٹری چوہوں پر تجربات کر کے پرکھا گیا۔ ان سارے مقاصد کی جانچ پڑتال نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی لیبارٹریوں میں کی گئی۔ بنیادی تجربات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ Propolis کا وہ ایکسٹریکٹ جو استھائل الکوحل اور پانی کے مرکب سے بنایا گیا اس نے بہت واضح نتائج دیئے جس میں

جنگلی اگنے والی اور غیر ملکی آسٹرمشروم کی کاشت اور حیاتیاتی و کیمیائی مطالعہ

پنچ ڈی۔ کالر: حسن سردار نگران: ڈاکٹر محمد آصف علی شعبہ: باغبانی

ملکی کا بھوسہ، مکئی کے خشک پتے، مکئی کے بھٹے، خشک گھاس، لکڑی کا برادہ وغیرہ، زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب ویسٹ میٹیریل کو بہتر غذا آسٹرمشروم کی کاشت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ سستے میڈیا آسٹرمشروم کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہیں۔ آسٹرمشروم کی بہتر پیداوار کے لیے مناسب میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مختلف قسم کے میڈیا میں مختلف قسم کی غذائیت ہوتی ہے جو کہ مشروم کی غذائیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جن میڈیا میں نائٹروجن اور دوسرے عناصر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس میڈیا سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر مشروم میں 80 سے 90 فیصد پانی، 20 سے 24 فیصد پروٹین، 13 سے 65 فیصد کاربوہائیڈریٹ، اور 1 سے 5 فیصد چربی پائی جاتی ہے۔ کاٹن ویسٹ پر آسٹرمشروم کی کاشت سے سب سے زیادہ پیداوار اور غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس ریسرچ میں کاٹن ویسٹ کو آسٹرمشروم کی کاشت کے لیے سفارش کیا ہے۔ مشروم انتہائی مزیدار، غذائیت سے بھرپور اور اسکی آسان کاشت کے باوجود اسکی کاشت کسانوں کی کبھی ترجیح نہیں رہی ہے۔ سرکاری اور نجی فرموں کی عدم دلچسپی، تکنیکی اور تربیت یافتہ لوگوں کی کمی مشروم کی کاشت میں رکاوٹ رہی ہے۔ مشروم کی کاشت ایک انتہائی فائدہ مند زرعی کاروبار ہے۔ جسکی کاشت سے کسانوں کی معاشی حیثیت بہتر ہو سکتی ہے۔

آسٹرمشروم (Pleurotus SPP.) سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر کاشت کی جانے والی خوردنی مشروم میں سے ایک ہے اور، دواؤں بائیو ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اپیلی کیشنز کی وسیع رینج میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر جنگلوں میں اگتا ہے اور لکڑی کی سیلولوز اور لگنان اجزاء سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ آسٹرمشروم شاندار ذائقہ کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر پکوان کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ آسٹرمشروم Pleurotus SPP. عام طور پر اعلیٰ تجارتی اہمیت کی وجہ سے دنیا کے معتدل، ذیلی علاقوں میں کاشت کر رہے ہیں۔ مشروم کی کاشت کئی عوامل کی وجہ سے انتہائی متاثر ہوتی ہے مثال کے طور پر میڈیا، پتھ، درجہ حرارت، نمی کی مقدار اور روشنی ہے۔ جنگلی اگنے والی آسٹرمشروم کو دوسری آسٹرمشروم کی اقسام کی نسبت زیادہ درجہ حرارت پر کاشت کیا جاسکتا ہے۔ میڈیا مشروم کے fruiting کی حمایت کی غذائیت اور lignocellulose مواد کا ایک ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ میڈیا مشروم کو غذائیت مہیا کرتا ہے اور مختلف قسم کے میڈیا پر مختلف قسم کی مشروم اگائی جاتی ہیں جو کہ مشروم کی پیداوار اور غذائیت اجزاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت ساری اقسام کے میڈیا یا آسٹرمشروم کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ جن میں سے کاٹن کا ویسٹ، گنے کا پھوگ، گندم کا بھوسہ، چاول کی پرالی، چاول کا بھوسہ،

دیمک سے لکڑی کی حفاظت بذریعہ مرکبات

پنچ ڈی۔ کالر: رشیدہ فاطمہ نگران: ڈاکٹر سہیل احمد شعبہ: انومالوجی

جبکہ دیمک کا حملہ بیماری لکڑی پر زیادہ دیکھا گیا۔ اسی طرح تین اقسام لکڑی کو Oven میں تین مختلف درجہ حرارت پر دس اور پندرہ دن کے لیے خشک کیا گیا پھر ان کو فیلڈ اور لیبارٹری میں دیمک کے حملے کے لیے پیش کیا گیا۔ ایک ماہ بعد شیشم کے Heartwood جو کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر 15 دن کے لیے خشک کی گئی تھی پر دیمک کا حملہ کم ہوا اور دیمک کی شرح اموات زیادہ نوٹ کی گئی۔ بہترین خشک لکڑی کو پانچ مختلف قدرتی تیل سے ٹریٹ کیا گیا۔ Oil Treatment کے لیے تین طریقے یعنی برش، سرفیس اور ویکيوم پریشر کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ سب سے زیادہ مزاحمت ویکيوم پریشر سے Treat کی گئی لکڑی میں نوٹ کی گئی۔ اسی اور نیم کے تیل نے سب سے کم وزن میں کمی اور 100 فیصد شرح اموات دکھائی۔ سفید، نیم اور اسی کے تیل نے لکڑی کی پک میں بہتری پیدا کی اور لکڑی کو دیمک کے خلاف زیادہ مزاحم بنایا۔ تمام تجربات نے ثابت کیا کہ لکڑی پر تیل کا استعمال اسے دیمک کے خلاف زیادہ مزاحم بناتا ہے اور اس کی خصوصیات میں بہتری لاتا ہے۔

دیمک کی مختلف اقسام قیمتی لکڑی کو نقصان پہنچا کر اس کی خوبصورتی اور کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ لکڑی کی میکانیکی اور کیمیائی خصوصیات دیمک کے خلاف مزاحمت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لکڑی کی کثافت اور اس میں موجود مہلک مرکبات لکڑی کو دیمک کے خلاف مزاحمت میں مدد دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں دیمک کی روک تھام اور دیمک کے خلاف لکڑی کی مزاحمت بڑھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں زہریلی ادویات کا استعمال شامل ہیں۔ اعلیٰ درجہ حرارت پر ہیٹ ٹریٹمنٹ (Heat Treatment) لکڑی کو دیمک کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جس سے لکڑی کی میکانیکی خصوصیات بھی بہتر ہوتی ہیں۔ موجودہ تحقیق تین لکڑیوں (شیشم، کیک، بیار) اور انکی اقسام (Sapwood، Heartwood) کی دیمک کے خلاف قدرتی مزاحمت جاننے کے لیے کی گئی۔ اس مقصد کے لیے لکڑی کو کچھوے ٹکڑوں میں کاٹ کر فیلڈ اور لیبارٹری میں دیمک کے کھانے کے لیے رکھا گیا۔ 30 دنوں کے بعد شیشم کی Heart wood نے دیمک کے خلاف سب سے کم وزن کی کمی دکھائی

کسانوں کے سوالات اور زرعی ماہرین کے جوابات

معزز قارئین! آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ زراعت سے متعلقہ روزہ مسائل پر مشتمل کسانوں کے سوالات اور ان کے حل طلب جوابات پر مبنی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے زرعی مسائل سے متعلقہ سوالات بذریعہ ڈاک بنام دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ، جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے پتہ پر جمع جو ابی لفافہ ارسال فرمائیں تاکہ آپ کو تحریری جواب ارسال کرنے کے علاوہ اس کو آئندہ شائع ہونے والے زرعی ڈائجسٹ کے شمارے میں شامل کیا جاسکے۔ آپ اپنے سوالات بذریعہ ای میل oubmuaf@gmail.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے 70-9200161-041 یکسٹیشن نمبر 3405 پر رابطہ کریں۔ اس تعاون پر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

سوال: ایک کھڑے کو پیدائش کے بعد کب بوبلی پلائی چاہیے؟

جواب: بہتر ہے کہ پیدائش کے بعد ایک گھنٹہ کے اندر اندر بوبلی پلا دی جانی چاہیے۔

سوال: ایک بچھڑے کو روزانہ کتنی بوبلی پلائی جائے۔

جواب: ایک بچھڑے کو اُس کے جسمانی وزن کا 10 سے 15 فیصد یعنی اگر بچے کا وزن 25 کلوگرام ہے تو

اُس کو 2.5 سے 3.5 لیٹر بوبلی روزانہ پلائی چاہیے۔

سوال: میں ماٹ گراس سے متعلق معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

جواب: آپ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زرعی ڈائجسٹ کے آفس سے ماٹ گراس سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

سوال: برسیم کو محفوظ کرنے کا اچھا طریقہ کونسا ہے۔

جواب: برسیم کو خشک کر کے (Hay) چھوٹی چھوٹی گانٹھیں بنا کر خشک کر لیں۔

سوال: کیا لوسرن دو دھیل جانوروں کو بطور چارہ کھلایا جاسکتا ہے۔

جواب: لوسرن دو دھیل جانوروں کیلئے بہترین چارہ ہے۔

سوال: کھڑوں کے ونڈے میں یوریا کھاد کتنی مقدار میں ملائی جاسکتی ہے۔

جواب: 100 کلوگرام ونڈے میں 1 سے 2 کلوگرام یوریا کھاد ڈالی جاسکتی ہے۔

سوال: توڑی میں یوریا کھاد کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔

جواب: یوریا کھاد کا 4 فیصد محلول تیار کر کے اس میں 5 کلوگرام شیرہ ملائیں یہ محلول 200 کلوگرام توڑی پر چھڑکاؤ کریں۔

سوال: ایک بھینس کو روزانہ کتنی بار پانی پلانا چاہیے؟

جواب: گرمیوں میں 3 بار اور سردیوں میں 2 بار لیکن بہتر یہ ہے کہ جانور کو ہر وقت پانی کی دستیابی یقینی بنائیں۔

سوال: کیا تھنوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے دودھ کی جھاگ تھنوں پر لگائی جاسکتی ہے؟

جواب: دودھ کی جھاگ تھنوں پر نہ لگائیں کیونکہ ایسا کرنے سے ساڑ کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

سوال: پہاڑ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟

جواب: میٹائٹس کنٹرول پروگرام پر 100 فیصد عمل کریں۔ تفصیلی معلومات کے لیے ڈیری گائیڈ کا مطالعہ کریں۔

مزید معلومات و رہنمائی کے لیے: ڈاکٹر محمد قمر بلال، انسٹیٹیوٹ آف انیمل وڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی

فیصل آباد موبائل نمبر 0300-7677557 پر رابطہ کریں

سوال: گندم کے ست تیلے کو کس طرح غیر کیمیائی طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے؟

جواب: گندم کے کھیت میں پیلے چکنے والے پھندے لگائیں۔ گندم کے کھیت میں 100 فٹ کے

فاصلے پر کینولہ کی دولائیں لگائیں۔ کھیت کو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھیں۔

سوال: گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے موثر حربے کون سے ہیں؟

جواب: - کپاس کی کاشت یکم اپریل سے پہلے ہرگز نہ کریں۔

- کپاس کی چھڑیوں اور ٹینڈوں کو فوری سے پہلے تلف کر دیں۔

- وقتاً فوقتاً کپاس کی چھڑیوں کو الٹ پلٹ کرتے رہیں۔

- جنسی پھندوں کے ذریعے مارچ میں نکلنے والے نر پروانوں کو پکڑ کر تلف کر دیں۔

- جنسی پھندوں کا استعمال جولائی سے ستمبر تک کپاس کے کھیت میں یقینی بنائیں۔

- ضرورت پڑنے پر ٹرائی ایڑو فاس یا ڈیلٹا فاس کا سپرے سفارشات کے مطابق کریں۔

سوال: مکئی کی سنڈی کا کیمیائی تدارک کیا ہے؟

جواب: بوائی سے پہلے بیج کو زہر آلود کر کے کاشت کریں۔ حملہ کی صورت میں کاربوفیوران بحساب 8 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں۔

سوال: کریلے کی فصل پر پھل کی کبھی کو کس طرح کنٹرول کیا جاسکتا ہے؟

جواب: فصل میں بیوٹانوائس اسپرٹ پر مشتمل جنسی پھندے لگائیں۔

- گلے سڑے پھل جن میں پھل کی مکھی کی سنڈیاں ہوتی ہیں کو اکٹھا کریں اور تلف کر دیں۔

- پانی کے ساتھ کاربوفیوران کھیت میں ڈالیں تاکہ زمین میں موجود مکھی کی سنڈیاں تلف ہو سکیں۔

- کھیت کے گرد مکھی یا جوار کی فصل کی چند لائیں لگائیں اور ان پر ہفتہ وار لمسی زہروں کا سپرے کریں۔

سوال: سفید مکھی کے تدارک کے لیے کونسے طریقے موثر ہوتے ہیں؟

جواب: - بوائی سے پہلے بیج کو سفارش کردہ کیڑے مارزہر سے زہر آلود کریں۔

- کھیت میں سے جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں۔

- فصل میں پانی اور کھاد کا استعمال سفارش کردہ مقدار کے مطابق کریں۔

- فصل کے ابتدا میں کیڑے مارزہروں کو کم سے کم استعمال کریں تاکہ سفید مکھی کے دشمن کیڑوں کی بڑھوتری ممکن ہو۔

- سفید مکھی کی تعداد معاشی نقصان دہ حد سے بڑھنے پر محکمہ زراعت کی سفارش کردہ کیڑے مار زہروں کا استعمال کریں۔

سوال: کینولہ پر حملہ آور اور ایفڈ کی تدارک کے لیے کونسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

جواب: - کینولہ کے کھیت میں پیلے چکنے والے پھندے لگائیں۔

- کینولہ کے کھیت میں 100 فٹ کے فاصلے پر کینولہ کی دولائیں لگائیں۔

۔ زیادہ حملے کی صورت میں کاربوسلفان کا سپرے کریں۔

۔ کھیت کو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھیں۔

سوال: آم کی گدھڑی کا تدارک کیسے ممکن ہے؟

جواب: گدھڑی کے سرمائی نیند سوئے انڈوں کو دسمبر سے پہلے اکٹھا کر کے تلف کر دیں۔

۔ آم کے باغات میں جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں۔

۔ باغات میں تنوں کے گرد پلٹھتھن بینڈ لگا لیں اور ضرورت پڑنے پر اس کو تبدیل کرتے رہیں۔

۔ آم کے درختوں کے تنے پر 2-3 فٹ اونچائی تک زہر مائی سفیدی کر دیں۔

۔ اپریل کے مہینے میں مادہ گدھڑی کو اکٹھا کر کے تلف کر دیں تاکہ وہ زمین میں انڈے نہ دے

پائیں۔

سوال: گوجھی کی تیزی کا کیمیائی تدارک کیا ہے؟

جواب: حملہ کی صورت میں کلور ہائیری فاس، پروفینوفاس، ہائی فیتھورین، لمڈا سائیپلو تھرون یا محکمہ کی

سفارش کردہ زہر کا سفارش شدہ مقدار کے مطابق سپرے کریں۔

سوال: کیمیائی زہروں کے موثر استعمال کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

جواب: کیڑے مار زہروں کی سفارش کردہ مقدار اور مناسب وقت کا خیال رکھیں۔

۔ سفارش کردہ مشین اور نوزل کا استعمال کریں۔

۔ ٹینک مکس کرنے کے لیے نہری پانی کا استعمال سے گریز کریں۔

۔ ہوا کی شدت، ہوائی سمت اور موسمی صورت حال کو مد نظر رکھ کر سپرے کا فیصلہ کریں۔

۔ سپرے کی صحیح کوریج کو یقینی بنائیں۔

۔ سپرے کرنے سے پہلے مشین، اس کے حصوں اور کیڑے مار زہروں کی تعداد کی کیلیبریشن کر لیں۔

سوال: مائٹس کے کیمیائی تدارک کے لیے موثر زہریں کونسی ہیں؟

جواب: سپائروسی فین، کلور فینا پاز، پائریڈا بن، ہیکسی تھا یا زوکس، ایڈوسائیکلوٹن، فینر و کسی میٹ اور

ڈائی فیتھو ران مائٹس کے خلاف استعمال ہونے والی موثر زہریں ہیں جن کو سفارش مقدار اور

طریقے سے سپرے کریں۔

مزید معلومات درج ذیل کے لیے: ڈاکٹر محمد دلدار گوگی، شعبہ انٹو مالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، موبائل نمبر

0345-9668843 پر رابطہ کریں

سوال: کیا بہاریہ آلو کی فصل سے بچ کے لیے آلو رکھ لیں؟

جواب: عام طور پر اس فصل کو مارکیٹ کر دیا جاتا ہے اور بچ کے لیے اس میں سے آلو نہیں رکھتے۔

سوال: آلو کا بچ رکھنے کے لیے کن ہدایات پر عمل کریں؟

جواب: بہاری سے پاک کھیت اور بہاری سے پاک پودوں سے درمیانے سائز کے آلو لگ کر لیں۔ ان

پر کسی قسم کا کٹ یا زخم نہ ہو۔

سوال: کیا اس وقت مرجیں، ٹماٹر منتقل کر لیں؟

جواب: بالکل کر سکتے ہیں۔

سوال: مرچوں کے اکھیڑا/سوکھا کے لیے کونسی حفاظتی تدابیر اختیار کریں؟

جواب: قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا شت کریں۔ بیج کو دوانی لگا کر اونچے زمری بیڈ پر بویں۔

زمری کی صفائی اور دیکھ بھال کریں۔ سپرے کریں اور منتقلی کے وقت محلول میں ڈبوئیں اور

اونچے Ridges یعنی کھلیوں پر لگائیں اور تنے کو پانی نہ لگنے دیں۔ اگر پھر بھی کوئی پودا بیمار ہو

جانے تو نکال دیں۔

سوال: آلو، مولی، گا جرو غیرہ میں Cracking کیوں ہو جاتی ہے؟

جواب: اگر پانی باقاعدگی سے نہ لگے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیر زمین حصہ پر زخم ہونے کے

بعد بھی Healing ہو جانے پر نشان سارہ جاتا ہے۔

سوال: جڑ والی سبزیوں/گوجھی قسم کی سبزیوں میں Bolting کیا چیز ہے؟

جواب: یہ Biennial قسم کی سبزیوں ہیں۔ پہلے مرحلے میں بڑھوتری ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے میں

گندیل نکلتی ہیں جن پر پھول آتے ہیں اور بیج بنتا ہے۔ اگر یہ گندیل (Seed Stens)

وقت سے پہلے آجائیں تو یہ Bolting کہلاتا ہے۔ اس کے لیے اچھا بیج استعمال کریں۔ پانی

باقاعدگی سے لگائیں اور فصل کا وقت پر کھیت میں منتقل کریں۔

سوال: ٹٹل میں کالا پلاسٹک کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: اس سے جڑی بوٹیاں نہیں اُگتیں اور پانی کی بچت رہتی ہے۔ کھیت یعنی ٹٹل صاف رہے گی۔ کسی

بھی وقت کوئی بھی عمل کیا جاسکتا ہے کیونکہ Mulch/پلاسٹک کے ساتھ لوگ Drip بھی

استعمال کرتے ہیں۔

سوال: Mulch/پلاسٹک کے ساتھ پانی کے لیے Drip استعمال کرنا ضروری ہے؟

جواب: ایسا لازمی یا ضروری نہیں۔ اگر کر لیں تو بہتر ہے گا۔ اگرچہ اخراجات کافی بڑھ جائیں گے۔

سوال: ٹٹل میں Drip ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ اندر زیادہ نمی نہیں رہے گی اور کیڑوں/بیماریوں سے بچت ہو

گی۔ ٹٹل صاف ہوگی۔ بروقت عموماً سرانجام دیے جاسکتے ہیں۔ نامور زمین پر یہ استعمال کی

جاسکتی ہے۔

سوال: رس چوسنے والے کیڑوں کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟

جواب: ایک تو فصل کمزور ہو جاتی ہے پھر پیداوار کم ہوگی۔ بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے

علاوہ ان کی وجہ سے وائری بیماریاں پھیلتی ہیں جو بعد میں کنٹرول نہیں ہوتیں لہذا وائری بیماریوں

سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر رس چوسنے والے کیڑوں کو کسی بھی بلکی پھلکی دوائی سے

کنٹرول کر لینا چاہیے۔

مزید معلومات درج ذیل کے لیے: ڈاکٹر چوہدری محمد ایوب، انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی

یونیورسٹی فیصل آباد، موبائل نمبر 0333-8989779 پر رابطہ کریں۔

الحديث: انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلغم قبلہ کی طرف دیکھی تو یہ بات آپ کو ناگوار گزری۔ حتیٰ کہ (آثار غضب) چہرے پر نمودار ہوئے چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا پھر فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے یا اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے لہذا اسے سامنے تھوکنے سے گریز کرنا چاہئے۔ اسے یا تو بائیں جانب یا پھر پاؤں کے نیچے تھوک دینا چاہئے پھر آپ نے اپنی چادر کا پلو لیا اور اس میں تھوک کر اسے الٹ پلٹ کیا اور فرمایا: اس طرح کرے۔ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی دیوار پر تھوک (لگا) دیکھا تو آپ اسے (بذات خود) صاف کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے اس لئے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔

دفتر کتب رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت

تعلیمی و تحقیقی مفید مطبوعات کسان بھائیوں اور تحقیق کاروں کے لیے دستیاب ہیں جو حسب ضرورت بذریعہ مئی آرڈر منگوائی جاسکتی ہیں۔

نمبر شمار	عنوان	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
39-	نمبر چارا	15/-
40-	پاکستان میں اُگائی جانے والی خوبانی کی اقسام	20/-
41-	تغیراتی موسمی حالات میں بھنڈی توری کی کاشت	15/-
42-	ٹٹل میں مریچوں کی کاشت	20/-
43-	ٹٹا کی ٹٹل میں کاشت	15/-
44-	کھارے پانی سے فصلات کی کاشت اور تصور بازہ زمین کی اصلاح	10/-
45-	رجنما کتا بچہ: آم کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کا تناسب استعمال	30/-
46-	ترشاوہ پھلوں کی تصدیق شدہ نرسری کی داغ بیل اور گملوں میں تیاری کا رجحان	25/-
47-	ترشاوہ پھلوں کے باغات کی دیکھ بھال کے چند رجحانات	30/-
48-	گا جری کی کاشت اور بیج کی پیداوار	25/-
49-	آپاچی کے ساتھ کھادوں کا استعمال فزیکیشن	20/-
50-	ترشاوہ پھلوں اور مردہ کی صحت مند نرسری اگانے کے لیے ماڈل نرسری کا قیام	15/-
51-	زرعی مقاصد کے لیے کھارے پانی کے استعمال کی ترکیبات	25/-
52-	منہ کھر پر قابو پاؤ۔ دودھ کی پیداوار بڑھاؤ	10/-
53-	چارے کی مسلسل فراہمی کیوں اور کیسے؟	25/-
54-	بانس کی کاشت	15/-
55-	ترشاوہ پھلوں پودوں میں بذریعہ ٹاپ ورکنگ اقسام کی تبدیلی	15/-
56-	ڈیری فارم مینجمنٹ (ڈیری گائیڈ)	150/-
57-	بیکری مصنوعات، پھلوں اور ہیز یوں کو محفوظ کرنا	150/-
58-	پریکٹیکل ڈیری فارمنگ	150/-
59-	قدرتی طریقے سے تیار شدہ خشک بھجور	20/-
60-	سلائیڈ کیلنڈر: آم کے باغات کی دیکھ بھال	20/-
61-	سلائیڈ کیلنڈر: ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال	20/-
63-	گلڈ ولس کی کاشت: منافع بخش کاروبار	20/-
64-	آلو کی کاشت	40/-
65-	گل داؤسی کی نگہداشت کا سلائیڈ کیلنڈر	20/-
66-	گلاب کی نگہداشت کا سلائیڈ کیلنڈر	20/-
67-	دودھ کی پیداوار بڑھانے کا عملی پروگرام	20/-
68-	دیمک کا تدارک	20/-
69-	جانور کے لیے سپر جوس	20/-
70-	وٹن 2030 (زرعی ترجیحات، نصب العین اور لائحہ عمل)	50/-
71-	ماڈرن پولٹری پروڈکشن (پولٹری گائیڈ)	180/-
72-	بھینس بکریاں پالنا	150/-

نمبر شمار	عنوان	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
1-	زراعت۔ وسائل اور مستقبل (ایک جائزہ)	30/-
2-	کبر یوں میں مصنوعی نسل کشی	25/-
3-	بیری کی اقسام اور ان کی کاشت	20/-
4-	راجنمائے کا شکاران بھجور	30/-
5-	گا جری کی کاشت: صحت مند اور منافع بخش	15/-
6-	پیاز کی پیداواری ٹیکنالوجی	20/-
7-	سارٹ فافور کی کھاد	20/-
8-	یو ایف ایف 11	10/-
9-	تھوڑا بڑھ زمین کے لیے اصلاحی طریقے و ٹیکنالوجی	25/-
10-	کھارے پانی کے استعمال سے تصور بازہ زمین میں کاشت دھان اور گندم کی پیداوار پر جیم اور Seed Priming کے نفع بخش اثرات	10/-
11-	آم۔ پھلوں کا بادشاہ	50/-
12-	امروہ کی بیاریوں سے پاک نرسری اگانے کے جدید طریقے	15/-
13-	کھارشی زمینوں کے لیے نئی غذائی غذا اور فصل	15/-
14-	فصلوں میں قوت مدافعت اور پیداوار بڑھانے کا قدرتی، آسان اور سستا طریقہ	15/-
15-	سلی میرین: امراض جگر میں امیدی کرن	10/-
16-	گل اشرفی	10/-
17-	مانیکرو پاور (زیادہ پیداوار، بہتر کوالٹی اور صحت مند فوٹو ماہر ریجائنز صفر کی پرے)	15/-
18-	قربانی کے جانور: خرید، نگہداشت اور ذبح کرنا	15/-
19-	بھجور کی اقسام	25/-
20-	ماٹ گراس بے مثال چارا	15/-
21-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں ٹٹا کی کاشت	15/-
22-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں موسم گرما کی بیڑیوں کی کاشت	10/-
23-	کلر زہ زمینوں میں بیڑی کی کاشت کے لیے سفارشات	20/-
24-	ٹٹل میں کھیرے کی کاشت	15/-
25-	ترشاوہ باغات میں جڑی بوٹیوں کا تدارک اور فزیکیشن	25/-
26-	ترشاوہ باغات میں آپاچی بذریعہ روپ اریکیشن	20/-
27-	پاکستان میں ترشاوہ پھلوں کے امراض اور ان کا انسداد	10/-
28-	بھنڈی کے بیج کی فصل	20/-
29-	کنٹرولڈ مائیکرو سٹریٹا لوجی	15/-
30-	مٹر کے بیج کی فصل	20/-
31-	آئیسٹر شرم کی کاشت	60/-
32-	بٹن شرم کی کاشت	20/-
33-	موشیوں میں سوزش جیوانی کی تشخیص علاج اور روک تھام کا ایک عملی پروگرام	15/-
34-	جانوروں کو تندرست رکھنے کے لیے بنیادی اصول	15/-
35-	جانوروں کی خوراک کے متعلق اہم سفارشات	15/-
36-	شیر یوریا ملاک	15/-
37-	پاکستان میں نہری پانی کی کمی، اثرات اور احتیاطی تدابیر	15/-
38-	شہروں سے خارج ہونے والے فائو پانی کا آبپاشی کے لیے استعمال اور اس کے نقصانات	15/-

علاوہ ازیں دفتر جامعہ کتب، رسائل و جرائد کے زیر اہتمام سہ ماہی زرعی ڈائجسٹ شائع کیا جاتا ہے جس کے ریگولر شمارے کی قیمت 60/- روپے، سٹوڈنٹس سلائیڈ میمبر شپ - 200/- روپے بشمول ڈاک خرچ، سلائیڈ عام ممبر شپ - 300/- روپے بشمول ڈاک خرچ جبکہ لائف ٹائم ممبر شپ - 5000/- روپے بشمول ڈاک خرچ ہے۔ ممبر شپ کے لیے مئی آرڈر نام اخبار دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ارسال کر دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود ہمارے ممبر بنیں گے بلکہ دیگر کاشتکار حضرات کو بھی اس کی ممبر شپ حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پاکستان بھر میں مطلوبہ مطبوعات منگوانے کے لیے دی گئی قیمتوں کے ساتھ ڈاک خرچ بھی ارسال کریں۔ برائے رابطہ: فون نمبر 3405 Ext. 9200161-041