

ترجمان زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد



ترجمان زمرعی

جولائی تا ستمبر 2020ء

دفتر کتب رسائل و جرائد جامعہ
زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال اتیاز)، انڈوومنٹ فنڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمود احمد رندھاوا کے ہمراہ ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال اتیاز)، ڈین سوشل سائنسز ڈاکٹر سرفراز حسن، ڈاکٹر خالد محمود چوہدری، ڈاکٹر اعجاز اشرف گل، ڈاکٹر عبدالرحمن ودیگر کا جریبوفی پر آگاہی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں



جامعہ زرعیہ کے ٹریژرر و جرنل ارم سعید قادری پراجیکٹ ڈائریکٹر کاشف اکرم اور یونیورسٹی کے ڈیپٹی وائس چانسلرز کے ہمراہ انٹر پرائز ریسورس پلاننگ اور کیمپس مینجمنٹ سسٹم پر عملی کام شروع کرنے کیلئے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال اتیاز) ضلع جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری کوٹ شاہ میں ٹڈی دل کے حملے کی صورتحال کے جائزہ مشن کے دوران پیسٹ وائرنگ اور این ڈی ایم کے ذمہ داران کے ساتھ

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز)، رجسٹرار عمر سعید اور چیئر مین انٹیمالوجی ڈاکٹر منصور الحسن سہابی کے ہمراہ ٹی وی کے زیر تربیت طلبہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں



جامعہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز)، رجسٹرار عمر سعید قادری، ڈاکٹر طاہر صدیقی اور ڈاکٹر مسعود صادق بٹ کے ہمراہ عید ملن پارٹی کا کیک کاٹ کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز)، ڈاکٹر قمر بلال، رجسٹرار عمر سعید قادری کے ہمراہ ایسٹریکٹ کے موقع پر یونیورسٹی اساتذہ، انتظامی افسران کی جانب سے خصوصی تحائف مسیحی کارکنوں میں تقسیم کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز)، گورنمنٹ سائنس ٹیکنالوجی کے چیف ایگزیکٹو گورنمنٹ، پرنسپل آف ایمراسیٹ ڈاکٹر قمر بلال اور ڈیڑر عمر سعید قادری کے ہمراہ یونیورسٹی سٹاف میں عید ڈریس (سوٹ) تقسیم کر رہے ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف یونیورسٹی سینڈ کیٹ کے 320 ویں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اجلاس میں مسٹر جسٹس علی باقر نقوی آن لائن شریک ہیں جبکہ رجسٹرار عمر سعید قادری ایجنڈا آنکھ بٹھائیے پیش کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) یونیورسٹی مہرین کے ہمراہ ٹی وی کے خاتمہ کے لئے استعمال کئے جانے والے ٹیکنیکل پریسنگ لیسے ہوئے، دوسری جانب درختوں پر ٹی وی کی تباہی کی تازہ ترین صورتحال



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز)، ڈائریکٹر فارمز ڈاکٹر محمد طاہر، پرنسپل آفیسر اسٹیٹ ڈاکٹر قمر بلال اور ریڈر رورجر ار عمر سعید قادری کے ہمراہ ایگرونی فارم پر گندم کی کٹائی کا افتتاح کر رہے ہیں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز)، پرنسپل آفیسر اسٹیٹ ڈاکٹر قمر بلال اور ریڈر رورجر ار عمر سعید قادری اور ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ڈاکٹر محمد ارشد کے ہمراہ گندم کی پیداوار و ریکیو پروڈرپ اری گیشن کا جائزہ لے رہے ہیں

دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ - زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



رجسٹرڈ ایل نمبر 7793 جلد نمبر 55 شمارہ نمبر 3

نظمِ شاعری

جولائی تا ستمبر 2020ء

ISSN 2521-0416

سرپرست اعلیٰ :

پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز)
وائس چانسلر

مجلسِ نشر و اشاعت

عمر سعید قادری
پرنسپل آفیسر (پی آر پی)، خازن جامعہ
سید قمر الدین بخاری
ڈپٹی رجسٹرار (پی آر پی)
ممتاز علی
اسسٹنٹ رجسٹرار، انچارج یونیورسٹی پریس
مظفر حسین سالک
ریسرچ آفیسر، شعبہ تصنیف و تالیف
محمد ندیم اختر
گراؤنڈ ڈیزائنر، یونیورسٹی پریس

مجلسِ تنظیمین

پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسراء (کنوینر)
انچارج شعبہ تصنیف و تالیف
پروفیسر ڈاکٹر محمد بلین
پروفیسر ڈاکٹر چوہدری محمد ایوب
پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی بھٹی
ڈاکٹر محمد اشفاق واحد
ڈاکٹر محمد دلدار گوگی
ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان
ڈاکٹر مظفر حسین رانجھا
مسٹر محمد عون
حافظ مسعود احمد
مسٹر عمر دراز
پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال (سیکرٹری)

مجلسِ ادارت

پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسراء
مدیرِ منتظم
پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال
مدیر
مظفر حسین سالک
ریسرچر
محمد آصف بھٹی
یونیورسٹی آرٹس گراؤنڈ ڈیزائنر
عظمت علی
آرٹسٹ
محمد اسماعیل
آفس اسسٹنٹ
محمد امین، آصف محمود
اُردو ٹائپسٹ
قیصر محمود
معاون

شائع کردہ:

دفترِ کتب، رسائل و جرائد جامعہ
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

لائف ممبر شپ 500 روپے
سالانہ ممبر شپ 300 روپے
سٹوڈنٹ ممبر شپ 200 روپے

Phone: 041-9200161-69 Ext. 3405/2949, 041-2619675
email: oubmuaf@gmail.com www.oubm.org / www.uaf.edu.pk



پانی بقائے حیات

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ جنگیں پانی کے مسائل پر ہوں گی مگر ایٹمی طاقت رکھنے والے دو ممالک میدان جنگ کا بھی باقاعدہ آغاز نہیں کر سکتے، یہاں جنگ کے ذریعے نہ تو کشمیر حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی پانی۔ دوسری طرف بھارت کی آبی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، خشک سالی کا عذاب ہمارے قریب آتا جا رہا ہے، فی الحال نہروں کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہروں کی بندش کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح میں بھی تیزی سے کمی آرہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیوب ویلوں کی مدد سے آبپاشی میں بھی مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ مہیا ہونے والے پانی کو ضائع ہونے سے روکیں، خواہ ڈیم بنائیں یا جھیلیں، ہمیں اپنے ذخائر کو محفوظ بنانا ہے، دوسرا معاشرتی سطح پر بھی پانی کو بلاوجہ ضائع ہونے سے بچانا ہے، ورنہ ہماری اپنی زندگی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اگر ہم نے جلد پانی کے ضیاع کو نہ روکا تو آئندہ سالوں کے بعد پاکستان میں خشک سالی اس قدر بڑھ جائے گی کہ ہماری زراعت تباہ ہو جائے گی اور ہر سال قحط سالی کا منظر پیش کرے گا۔ بہر حال ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب سائنسدانوں نے کچھ ایسے طریقے اور حل نکال لئے ہیں جن کی مدد سے ہم پانی کی کم مقدار سے بھی اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں مگر ایسا کرنے کے لئے ہمیں خصوصی بجٹ کی ضرورت ہوگی۔ ایسا کرنا ناگزیر ہے، ہماری حکومت کو یہ چیلنج سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان طریقوں کی مدد سے ایسے منصوبے بنانے چاہئیں کہ ہم کم پانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آبپاشی کر سکیں۔ ساتھ ہی ہمیں عوام کے لئے بھرپور آگاہی کا پروگرام شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگ پانی کو خواہ مخواہ ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ پاکستان میں مہیا ہونے والے پانی کی مقدار ہر سال کم ہو رہی ہے، نہروں کو ملنے والے پانی کی مقدار اتنی کم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے گئی ہے۔ نئے طریقے ایک طرف پانی بچانے کے بہت سے پرانے طریقے بھی ہیں، ان کی مدد سے بھی ہم بہت سا پانی بچا سکتے ہیں۔ دریائی اور بارشی پانی کو بھی بچا کر جمع کر کے زراعت اور انسانی استعمال کے لئے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ چھوٹے بڑے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، خواہ ان سے بجلی پیدا ہو یا نہ ہو، گویا صرف پانی روکنے والے ڈیم یعنی لیج (Leakage Dam)، ڈیلڈ ڈیم (Delayed Dam) وغیرہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بارشوں کے فالتو پانی ضائع نہ ہو بلکہ اس کے ذخیرے بن جائیں اور ہماری پانی کی ضرورت کسی حد تک پوری کر دیں۔ سیلابوں کے پانی کو محفوظ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سیلابی نالے، تالاب اور سیلابی پانی کے نکاسی کے دوسرے نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہمارے عوام پانی کا استعمال آزادی سے کرتے ہیں، پانی بچانے کی بجائے آزادی سے ضائع کرتے ہیں، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پانی کی کل مہیا مقدار کا تقریباً 90 فیصد حصہ صرف زرعی مقاصد کے لئے استعمال ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا آبپاشی کا نظام ہے۔ روایتی آبپاشی کے نظام میں پودوں کو پانی تو مل جاتا ہے ساتھ ہی بہت سا پانی آبی بخارات کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس ضائع ہونے والا پانی بچالیں تو پودوں کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، ان کی پیداوار میں کمی بھی نہ ہوگی جبکہ بچنے والا پانی انسانوں اور جانوروں کے کام آئے گا۔ اب ہم نئے طریقوں کی بات کرتے ہیں، جن کی مدد سے مٹی کم سے کم گیلی ہوتی ہے، مگر پودوں کو زیادہ پانی مل جاتا ہے۔ اس طرح ہم کم پانی استعمال کر کے بھی مطلوبہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاشتکاری کے کچھ ایسے نظام وجود میں آگئے ہیں جن میں آبپاشی کے نئے طریقے استعمال کر کے ایک طرف پانی کم سے کم استعمال ہوتا ہے تو دوسری طرف پیداوار بھی روایتی طریقے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہمارے کسانوں نے ان نئے طریقوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہے اور نہ ہی حکومتوں نے اس طرف توجہ دی ہے۔ کیا ہم اس وقت سوچیں گے جب کوئی قحط ہمارے سر پر آجائے گا۔ پانی کی کمی تو ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے، اگر ہم کو بوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو تباہی بھی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم نے خشک سالی اور قحط سالی کی آفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم پانی بچانے والی تحقیق اور ٹیکنالوجیز کو اپنی زراعت کا حصہ بنائیں تاکہ زرعی مقاصد کے لئے استعمال ہونے والے پانی کی مقدار کم سے کم ہو جائے، اس طرح پانی کی جو مقدار بچ جائے گی وہ جانوروں اور انسانوں کی زندگی محفوظ بنانے کے کام آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ پانی بچانے کے جدید طریقوں پر عمل کریں جیسا کہ ڈریپ اریگیشن (Drip Irrigation)، سپرنکلر (Sprinkler)، اریگیشن، سکپ (Skip) اریگیشن، ہائیڈروپونک فارمنگ (Hydroponik Farming)، ٹنل فارمنگ (Tunnel Farming)، شہری کاشتکاری (Urban Farming) وغیرہ۔ گھریلو سطح پر بھی ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پانی ضائع کرنے سے ہمیں ہمارے مذہب نے بھی روکا ہے۔ اس ضمن میں خصوصی طور پر ہم سب کو پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔

دنیا بھر میں سب سے معتبر اور موقر رینٹنگ سسٹم ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینٹنگ کے مطابق جامعہ زریعہ پاکستان کی نمبروں اور دنیا کی 302 ویں بہترین جامعہ قرار



دنیا بھر میں سب سے معتبر اور موقر رینٹنگ سسٹم ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینٹنگ نے سال 2020ء کیلئے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حوالے سے جاری کی گئی تازہ ترین امیکٹ رینٹنگ میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو عالمی سطح پر غربت کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلیوں پر مؤثر ایکشن کے سلسلہ میں بالترتیب 42 اور 61 ویں بہترین جامعہ قرار دیا ہے۔ اپنی حالیہ درجہ بندی میں ٹائمز امیکٹ رینٹنگ نے دنیا کی ایک ہزار سے زائد جامعات کو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کیلئے پیش رفت کرنے پر سروے میں شامل کیا تھا۔ امیکٹ رینٹنگ کے مطابق 15 ویں ترقیاتی ہدف لائف آن لینڈ کے ساتھ ساتھ 17 ویں ہدف پارٹنرشپس فار ڈاگولز میں پیش رفت کے سلسلہ میں اسے عالمی سطح پر 104 ویں جبکہ پاکستان کی پہلی بہترین جامعہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ 12 ویں ہدف رسپانسیبل

کنزیشن و پروڈکشن کی فہرست میں شریک جامعات میں اسے دنیا کی 201 ویں جبکہ پاکستان کی تیسری بہترین درس گاہ قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ رینٹنگ میں زرعی یونیورسٹی کو تمام ترقیاتی اہداف میں اوور آل پرفارمنس کے حوالے سے عالمی سطح پر 302 ویں بہترین جامعہ قرار دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہو گا کہ ترقیاتی اہداف کے علاوہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن اور آل رینٹنگ میں پاکستان کی 7 جامعات کو دنیا کی ایک ہزار بہترین جامعات میں شامل کیا گیا ہے جن میں زرعی یونیورسٹی بھی نمایاں پوزیشن پر براجمان ہے۔ انہوں نے ٹائمز ہائر ایجوکیشن اور آل رینٹنگ میں دنیا کی ایک ہزار بہترین جامعات میں شمولیت پرفیکٹو شاف اور طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل میں 200 بہترین جامعات میں شامل ہونے کیلئے مزید محنت کی ہدایت کی ہے۔

جامعہ میں تعینات ڈاکٹر ز اور پیرامیڈیکل شاف کی پیشہ وارانہ امور میں محفوظ کارکردگی کو یقینی بنانے کیلئے

40 کرونا وائرس سیفٹی کٹس میڈیکل سنٹر کے منتخب شاف کے حوالے



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تعینات ڈاکٹر ز اور پیرامیڈیکل شاف کی پیشہ وارانہ امور میں محفوظ کارکردگی کو یقینی بنانے کیلئے 40 کرونا وائرس سیفٹی کٹس میڈیکل سنٹر کے منتخب شاف حوالے کر دی گئیں۔ اس حوالے سے ایک خصوصی تقریب یونیورسٹی کے وائس چانسلرز آفس میں ہوئی جہاں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) نے پرنسپل آفیسر میڈیکل سنٹر ڈاکٹر جاوید اختر، رجسٹرار عمر سعید قادری کے ہمراہ کرونا سیفٹی کٹس منتخب ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کے حوالے کیں۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) نے کہا کہ ان کے خیال میں کرونا وائرس عالمی سطح پر اتنی زیادہ تعداد میں انسانی آبادی کو متاثر کرنے والی پہلی وباء ہے کیونکہ انسانی تاریخ اس سے پہلے کسی بھی وباء کے اس قدر عالمی اثرات کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میڈیکل سنٹر کے ڈاکٹروں کو شاف اور طلبہ پر مشتمل 50 ہزار سے زائد کمیونٹی سے واسطہ رہتا ہے لہذا ان کیلئے حفاظتی کٹس کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ مکمل یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اپنے پیشہ وارانہ امور کو بلا خوف و خطر انجام دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کیمپس کمیونٹی میں موجود کم وسائل رکھنے والے ضرورت مندوں کی نشاندہی کے بعد ان میں خوراک اور راشن تقسیم کرنے کیلئے خصوصی امدادی فنڈ قائم کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے فوری طور پر ان کی امداد یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ز اور پیرامیڈیکل شاف کرونا وائرس کے خلاف ہمارا ہر اول دستہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ لوگوں کے علاج معالجہ کے دوران ان کی حفاظت بھی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی کٹس کی فراہمی پر بسم اللہ گروپ آف انڈسٹریز کے میاں وحید الدین کے جذبے اور کردار کو خصوصی طور پر سراہا۔ تقریب کے دوران کرونا حفاظتی کٹس میڈیکل سنٹر کے منتخب شاف ممبران سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر طاہرہ الطاف، ڈاکٹر وسیم مشتاق ڈینٹسٹ، ڈاکٹر قمر خلیل، عمران نوید ڈیپنر، زاہد محمود نیازی لیب اسسٹنٹ، ربیعہ کوشر، شاہد مختار اور ذوالفقار علی کے حوالے کی گئیں۔

آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن (او آئی سی) کے ذیلی ادارہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے جامعہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کی مالی مدد کیلئے سکالرشپس کے چیکس کی تقسیم



آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن (او آئی سی) کے ذیلی ادارہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ جن میں اکثریت کا تعلق افریقی ممالک سے ہے کی مالی مدد کیلئے سکالرشپس کے چیکس مستحق طلبہ کے حوالے کئے گئے۔ فارن سٹوڈنٹس ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صدیقی اور یونیورسٹی ٹریژر عمر سعید قادری نے خصوصی تقریب میں سکالرشپس کے چیکس طلبہ کے سپرد کئے۔ اس موقع پر چیک وصول کرنے والے گیمبیا، سرالی، بینین، نائیجر، صومالیہ اور نائیجیریا کے طلبہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین ماہ سے کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن، یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیوں کی بندش اور پاکستان سے انٹرنیشنل فائٹس پر پابندی سے وہ اپنے پیاروں سے ہزاروں میں دورانی ضروریات مشکل سے پوری کر رہے تھے تاہم زرعی یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے ان کیلئے رمضان المبارک میں سحری و افطاری کا انتظام ان کیلئے خصوصی ریلیف کا باعث بنا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) کی صورت میں یونیورسٹی کو ایک انسان دوست اور محسن قائد نصیب کیا ہے جو پوری کیمپس کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور ان میں آسانیاں تقسیم کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کیلئے شب و روز کوشاں ہے۔ اس موقع پر ٹریژر عمر سعید قادری نے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے تمام غیر ملکی طلبہ میں عید گفٹس تقسیم کئے گئے جبکہ تمام طلبہ نے عید الفطر کے روز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں دو بالائی اور عید ملن پارٹی میں عید یک بھی کاٹا۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ اپنے لئے مثالی تعلیمی، تحقیق، اقامتی اور سماجی سہولیات کا اظہار تشکر کرتے ہیں۔ فارن سٹوڈنٹس ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صدیقی نے توقع ظاہر کی کہ غیر ملکی طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اداروں میں ہمارے سفیر ہونگے جو ہمارے لئے نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے فارن سٹوڈنٹس کلب کے درجنوں گریجویٹس اپنے ممالک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد ہی یونیورسٹی کے سابق انٹرنیشنل طلبہ کی ایلمنٹائی میٹ کا اہتمام کیا جائے جس میں دنیا بھر کے اداروں میں کام کرنے والے ہمارے غیر ملکی طلبہ کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے۔

کرونا وائرس سے تحفظ کیلئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی تمام سڑکوں پر کلوری نیشن سپرے



کرونا وائرس سے تحفظ کے لئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی تمام سڑکوں کو کلوری نیشن سپرے کے ساتھ دھویا گیا جبکہ کیمپس کمیونٹی کو ڈینگی سے محفوظ رکھنے کیلئے تمام ہاؤسنگ کالونیوں میں

اینٹی ڈینگی سپرے بھی کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) کی زیر صدارت ڈیز کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں فیصلہ کے مطابق پرنسپل آفیسر اسٹیٹ منیجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر قمر ہلال تمام سڑکوں اور گزرگاہوں پر کلوری نیشن سپرے کے عمل کی نگرانی کی جبکہ پھروں خصوصاً ڈینگی سے تحفظ کیلئے تمام رہائشی کالونیوں میں اینٹی ڈینگی سپرے پیئر مین شعبہ حشرات پروفیسر ڈاکٹر منصور الحسن ساہی کی زیر نگرانی مکمل کیا جائے گا۔ اس ضمن میں پرنسپل آفیسر اسٹیٹ منیجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر قمر ہلال نے کہا کہ کیمپس پر کلوری نیشن کے عمل کا آغاز مرکزی گیٹ سے ایڈمن بلاک اور گردونواح کی سڑکوں کو کلوری نیشن سپرے کے ذریعے دھوک کیا گیا ہے جبکہ رہائشی کالونیوں کی سڑکوں اور گزرگاہوں پر بھی جراثیم کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کیمپس کمیونٹی کو کرونا وائرس سے محفوظ ماحول فراہم کیا جاسکے۔

فاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اشتراک سے ٹڈی دل کے موثر تدارک کیلئے ملک کے مختلف اضلاع میں فیلڈ سرگرمیوں کیلئے منتخب 25 انٹرنیٹ ڈاٹ نیوز کی تربیتی ورکشاپ کا آغاز



وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اشتراک سے ٹڈی دل کے موثر تدارک کیلئے ملک کے مختلف اضلاع میں فیلڈ سرگرمیوں کیلئے منتخب 25 انٹرنیٹ ڈاٹ نیوز کی تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا۔ جس کے تحت ایم ایس سی طلباء و طالبات تربیت سے آراستہ ہو کر بلوچستان، تھر پارک اور چولستان کے صحراؤں میں ٹڈی دل کی افزائش کے خاتمے کے لئے کسانوں کو عملی تربیت دیں گے۔ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ روم میں شروع ہونیوالی ورکشاپ کے افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی عمر حامد خاں تھے جبکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) نے مہمان اعزاز کے طور پر تقریب میں شرکت کی۔ شرکا سے ویڈیولنک پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی عمر حامد خاں نے کہا کہ ٹڈی دل کے موثر تدارک و خاتمہ کیلئے این ڈی ایم اے کے اشتراک سے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے تاکہ ایک مربوط حکمت عملی کے ذریعے ٹڈی دل کے تدارک کو یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چند قومی غذائی استحکام کو ٹڈی دل کی صورت میں بڑے چیلنج کا سامنا ہے تاہم وہ پر امید ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹ مینجمنٹ اتھارٹی اور صوبائی اتھارٹیز متعلقہ اداروں کی معاونت سے اس کے موثر تدارک میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کیلئے جلد ہی 6 نئے ایئر کرافٹ فیلڈ سرگرمیوں کا حصہ بن جائیں گے جس سے اس کے خاتمے کی مہم غیر معمولی تقویت پکڑے گی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ تربیت حاصل کر نیوالے نوجوان نچلی سطح پر فیلڈ شاف اور کسانوں کو تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ سپرے میں معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی و ریسرچ سید فخر امام کی صورت میں اس ملک کی زراعت کو ایک متحرک لیڈر شپ میسر آئی ہے اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ جلد ہی ٹڈی دل جیسے بڑے چیلنج سے نہرو آزا ہونے میں کامیاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت قومی شرح نمو میں 19 فیصد کی حصہ دار ہے جس میں اضافہ کیلئے وفاقی حکومت تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہے تاکہ اسے پھر سے ایک منافع بخش اور ترقی کاروباری یونٹ کے طور پر آگے لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت زرعی ترقی اور ٹڈی دل کے موثر خاتمے کیلئے زرعی یونیورسٹی ماہرین کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور توقع رکھتی ہے کہ یہاں قائم کیا گیا ریسرچ و ڈیولپمنٹ سیل یقیناً بریک تھرو کرے گا۔ وفاقی سیکرٹری عمر حامد خاں نے کہا کہ وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے زیر اہتمام تربیت حاصل کرنے والے سکارلز میں سے 10 بلوچستان جبکہ 15 تھر پارک اور چولستان کے صحراؤں میں ٹڈی دل کے افزائشی مقامات پر وہاں کے کسانوں کو اس کے تدارک اور موثر کنٹرول کے لئے عملی تربیت کا اہتمام کریں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) نے کہا کہ ٹڈی دل کے موثر تدارک میں شامل حکومتی ذمہ داران، فیلڈ شاف اور کسان پاکستان کیلئے فوڈ سیکورٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کو ناکام کرنے کیلئے فیلڈ شاف سپرے کرتے ہوئے تمام تر حفاظتی اقدامات بروئے کار لائے کیونکہ کیمیکل کے استعمال میں معمولی کوتاہی ان کی صحت اور زندگی کو خطرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے موجودہ چیلنج میں انٹومالوجی (حشریات) کا شعبہ اُبھر کر سامنے آیا ہے اور تمام حکومتی ادارے اس کے خلاف جنگ میں ماہرین حشریات سے توقع وابستہ کئے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں قائم کیا گیا ریسرچ و ڈیولپمنٹ سیل ان توقعات پر ضرور پورا اترے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو ٹڈی دل موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں، غیر متوقع بارش اور سیلاب کی صورت میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے تاہم حکومتی اقدامات میں خلوص اور سنجیدگی سے وہ پر امید ہیں کہ جلد ہی مربوط حکمت عملی سے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مقابلہ میں افغانستان اور ایران میں ونجی ٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے لہذا ٹڈی دل ان ممالک میں اپنی غذائی ضروریات پوری نہ ہونے پر پاکستان کا رخ کرتی ہے اور مستقبل قریب میں بھی ٹڈی دل کے تازہ حملے متوقع ہیں جس کیلئے حکومت کے ساتھ ساتھ کسان کی سطح پر بھی ہماری تیاری اس کے تدارک میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے انٹرنیٹ کی ٹریننگ کو اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ تربیت میں شامل نوجوان دوسرے اضلاع میں اپنی فیلڈ سرگرمیوں کے دوران مقامی لوگوں کو ٹڈی دل پر سپرے کے مناسب طریقہ کار سے ضرور آگاہ کریں گے۔ افتتاحی سیشن سے ڈی جی پلانٹ پروڈکشن ڈاکٹر فلک ناز، چیئر مین شعبہ حشریات ڈاکٹر منصور الحسن ساسی، ڈاکٹر جلال عارف، ڈاکٹر سہیل احمد، ڈاکٹر عامر رسول اور ڈاکٹر صغیر احمد نے بھی خطاب کیا۔ رجسٹرار عمر سعید قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں SAP میڈانٹر پرائز ریسورس پلاننگ اور کیمپس مینجمنٹ سسٹم پر عملی کام شروع کرنے کیلئے دو مختلف کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں SAP میڈانٹر پرائز ریسورس پلاننگ اور کیمپس مینجمنٹ سسٹم پر عملی کام شروع کرنے کیلئے دو مختلف کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا جس کے مطابق آئندہ 15 ماہ میں یونیورسٹی میں انجام پانے والے تمام امور میں کمپیوٹر سسٹم کے تحت شفافیت، تیز رفتاری اور ٹریکنگ سسٹم کی بدولت مختلف معاملات میں بتدریج پیش رفت کی جاسکے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی معاونت سے 8.7 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پراجیکٹ میں طلبہ کے داخلے سے لیکر گریجویٹ ہونے اور بعد ازاں ایلو منائی کے طور پر اس کے ساتھ روابط کے تمام امور کو مربوط اور شفاف سسٹم کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا۔ پراجیکٹ میں عملی پیش رفت کیلئے یونیورسٹی اور کامیاب فرمز کے مابین معاہدے کی تقریب یونیورسٹی کے نیوسٹڈ کیٹ روم میں منعقد ہوئی جہاں یونیورسٹی کے ٹریژرور جسٹار عمر سعید قادری، پراجیکٹ ڈائریکٹر آئی آر پی وی ایم ایس کاشف اکرم، ڈیزوڈائریکٹر زاور دونوں فرموں کے اعلیٰ ذمہ داران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انٹر پرائز ریسورس پلاننگ اور کیمپس مینجمنٹ سسٹم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے پراجیکٹ ڈائریکٹر کاشف اکرم نے کہا کہ SAP میڈانٹر پرائز ریسورس پلاننگ انتظامی امور میں بہتری لانے میں معاون ہوگا جس کی بدولت فنانشل سسٹم، ٹینڈرو پروکیورمنٹ و انوینٹری کنٹرول، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، وہیکل مینجمنٹ، ریسرچ گرانٹ مینجمنٹ اور بناؤنٹ فنڈ مینجمنٹ میں مثالی بہتری لائی جائے گی جبکہ کیمپس مینجمنٹ سسٹم میں آن لائن ایڈمیشن، لائبریری مینجمنٹ، انٹیڈنٹس مینجمنٹ، لرننگ مینجمنٹ، ہاسٹل مینجمنٹ اور آن لائن امتحانات وغیرہ میں مربوط پیش رفت کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ای آر پی اور سی ایم ایس ہائر ایجوکیشن کمیشن فنڈ ڈائی سی ٹی پراجیکٹ کا حصہ ہونگے جس کیلئے دنیا کی لیڈنگ فرموں سے اپنی ضروریات اور مستقبل کے چیلنجز کی سٹڈی کروا کر سسٹم ڈیزائن کروایا گیا ہے اور دونوں منتخب فرموں کا ای آر پی اور کیمپس مینجمنٹ سسٹم میں عملدرآمد کا وسیع تجربہ ہے۔ یونیورسٹی ٹریژرور عمر سعید قادری نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس پورے پراجیکٹ میں یونیورسٹی کے شانہ بشانہ ہے جسے ٹائم لائن کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے یونیورسٹی کے تمام ڈیزوڈائریکٹر، پرنسپل آفیسرز اور تدریسی و انتظامی شعبہ جات کے سربراہان کو آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پراجیکٹ میں اہداف کے مطابق پیش رفت کو یقینی بنانے کیلئے اعلیٰ سطحی عملدرآمد کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جو اس کی پراگرس پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ راولوں کو بھی فوری طور پر دور کرے گی تاکہ پراجیکٹ کو ٹائم لائن کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی میکانزم کے تحت اس پراجیکٹ میں بھی تھرڈ پارٹی آڈٹ کو بھی حصہ بنایا گیا ہے تاکہ شفاف انداز میں منصوبے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ معیار کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے تمام متعلقین پر زور دیا کہ میگا پراجیکٹ میں معاونت کیلئے اپنے انتہائی خنقی اور باصلاحیت لوگ ٹیم کا حصہ بنائیں تاکہ ٹائم لائن کے مطابق پیش رفت ممکن بنائی جاسکے۔ انہوں نے اُمید ظاہر کی کہ نئے سسٹم خصوصاً SAP میڈائی آر پی سسٹم کی تنصیب اور کامیاب عملدرآمد کی صورت میں یونیورسٹی کی رینٹنگ میں بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ یونیورسٹی کے تمام ڈیزوڈائریکٹر نے اُمید ظاہر کی کہ نئے اور مربوط سسٹم کی بدولت طلبہ اور اساتذہ کا قیمتی وقت سرمایہ اور توانائی کی بچت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے پیشہ وارانہ امور میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایک ہزار سے زائد چھوٹے ملازمین میں عید کے خصوصی تحائف تقسیم

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایک ہزار سے زائد چھوٹے ملازمین میں عید کے خصوصی تحائف تقسیم کئے گئے۔ کرونا وائرس کے نتیجہ میں ہونے والے لاک ڈاؤن کے تناظر میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) یونیورسٹی کی تمام کلیہ جات کے اساتذہ اور انتظامی افسران و شاف کی جانب سے جمع کی گئی رقم سے یونیورسٹی کے چھوٹے ملازمین میں عید گفٹس تقسیم کرنے کی تقریب وائس چانسلر آفس میں ہوئی جہاں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) نے پرنسپل آفیسر اسٹیٹ مینجمنٹ و کونویئر فنڈ ریزنگ کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر قمر ہلال، ڈین کلیہ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر اصغر باجوہ، ٹریژرور جسٹار عمر سعید قادری، ڈائریکٹر فنانشل اسسٹنٹس ڈاکٹر جاوید اختر اور بیکریٹری وائس چانسلر محمد جمیل کے ہمراہ ملازمین میں عید تحائف تقسیم کئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نے کہا کہ



یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی اور بڑھتی ہوئی درجہ بندی میں اساتذہ و انتظامی شاف کے ساتھ ساتھ چھوٹے ملازمین کا کردار بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور خصوصی طور پر کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران تمام حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے سرکاری فرائض ادا کرنے والے ملازمین خصوصی طور پر شاباش کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں چھوٹے ملازمین کی مدد کیلئے تمام تدریسی شاف اور انتظامی افسران نے قومی جذبے اور کم وسائل رکھنے والوں کی مدد کیلئے اپنی سماجی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آگے بڑھ کر عطیات جمع کروائے جس سے پہلے مرحلے میں ایسٹر کے موقع پر مسیحی ملازمین میں تحائف تقسیم کئے گئے جس کے بعد رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مسلمان ملازمین میں رمضان گفٹس اور ملبوسات تقسیم کئے گئے جبکہ عید الفطر سے پہلے ایک ہزار سے زائد ملازمین میں عید گفٹس تقسیم کئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملازمین میں رمضان گفٹس یا عید تحائف کی تقسیم میں یونیورسٹی اکاؤنٹ سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا یہ خالصتاً فنڈ ریزنگ کمیٹی کی مخلصانہ کوشش اور تدریسی و انتظامی شاف کا فراغ دلانہ دست تعاون تھا جس کی بدولت ہمیں یہ وسائل میسر آئے۔ اس موقع پر پرنسپل آفیسر اسٹیٹ منیجمنٹ و کنونیئر فنڈ ریزنگ کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال نے کہا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کی ہدایت پر قائم کی گئی فنڈ ریزنگ کمیٹی کے ذریعے یونیورسٹی کے تدریسی و انتظامی شاف کی معاونت سے خاطر خواہ رقم اکٹھی کی گئی تھی جس سے ایسٹر پر مسیحی ملازمین اور رمضان المبارک کی آمد پر مسلمان ملازمین میں گفٹس کے ساتھ ساتھ پورے رمضان المبارک میں سیکورٹی پر معذور شاف کیلئے سحری و افطاری کا مثالی انتظام کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر چھوٹے ملازمین کی خوشیوں میں اضافہ کیلئے کی گئی کوششوں کا حصہ ہوتے ہوئے انتہائی خوش محسوس ہو رہی ہے اور وہ چاہیں گے کہ یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی و شاف کی طرف سے ذاتی حیثیت میں کرونا و بلیفیر فنڈ میں عطیات



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی و شاف کی طرف سے ذاتی حیثیت میں کرونا و بلیفیر فنڈ میں عطیات جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے جس کے ذریعے معاشرے کے روزانہ اُجرت پر کام کرنے والے کارکنوں کے ساتھ ساتھ کم وسائل کے حامل خاندانوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف (ہلال امتیاز) کی زیر صدارت اس بات پر زور دیا گیا کہ تدریسی و انتظامی افسران و شاف معاشرے کے پسے ہوئے طبقے اور خصوصاً لاک ڈاؤن جیسی صورتحال میں روزگار سے محروم ہونیوالوں کیلئے اپنے وسائل سے راشن کا اہتمام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس حوالے سے پرنسپل آفیسر اسٹیٹ منیجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال کی سربراہی میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی ڈین ویٹرنری سائنس، پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد چھٹہ فوکل پرسن

کیس اور ریڈیو رجنسٹر اےمر سعید قادری پر مشتمل فنڈ ریزنگ کمیٹی بھی قائم کی گئی جو یونیورسٹی اور گرد و نواح میں مستحق خاندانوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ تدریسی و انتظامی شاف و افسران کو نیک کام میں حصہ ڈالنے کیلئے ترغیب دے گی۔ پہلے مرحلے میں ڈین کالونیوڈ نیوٹریشن و ہوم سائنس پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق بٹ نے اپنی فیکلٹی کی جانب سے ایک لاکھ 19 ہزار روپے کا چیک وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف اور کمیٹی کے کنونیئر پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال کے سپرد کیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ دوسری کلیہ جات کے ڈینز بھی اپنے اساتذہ و شاف کو اس نیک کام کیلئے متحرک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ فنڈ زکا انتظام کر کے جلد از جلد ضرورت مند خاندانوں تک راشن پہنچانے میں شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ اسی فنڈ سے ایسٹر کے موقع پر یونیورسٹی کے مسیحی کارکنوں میں بھی 130 راشن بیگ تقسیم کئے گئے تھے۔ ڈاکٹر مسعود صادق بٹ نے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کیلئے نیوٹریشن، بہتر رکھے اور قوت مدافعت میں اضافہ کیلئے وٹامن سی و ڈی سے بھرپور سستی اور آسانی سے دستیاب خوراک کے استعمال پر زور دیا۔

انٹرویو

ڈاکٹر اعجاز اشرف ایسوی ایٹ پروفیسر

شعبہ ایگریکچل سائنس اینڈ رورل ڈویلپمنٹ
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



ڈاکٹر اعجاز اشرف بطور ایسوی ایٹ پروفیسر ادارہ توسیع زراعت کی تعلیم و دیہی ترقی میں گذشتہ اٹھارہ سال سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ 1993ء میں زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔

سپورٹس میں ان کی کارکردگی ہمیشہ نمایاں رہی۔ قومی سطح پر سونمگ اور واٹر پولو کے مقابلوں میں گولڈ اور سلور میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ 1997ء میں ملکی سطح پر یونیورسٹیوں کے مابین مقابلہ جات میں بہترین کھلاڑی قرار پائے جس کی بنیاد گورنر پنجاب نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ ڈاکٹر اعجاز واٹر پولو میں پانچ سال تک لگا تار یونیورسٹیوں کے مقابلہ جات میں بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں اب تک 70 سے زائد طالب علم ان کی زیر نگرانی ایم ایس سی (آنرز) اور ایم فل کی ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں جبکہ دو طالب علموں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ان کی زیر نگرانی مکمل کی ہیں۔ انہوں نے آٹھ قومی اور بین الاقوامی سطح کے پراجیکٹ مکمل کئے ہیں اور اس وقت 6 پراجیکٹ ان کے زیر نگرانی جاری ہیں۔ ڈاکٹر موصوف نوکتابوں کے مصنف ہیں اور ان کے 50 سے زائد زراعت کے متعلق موضوعات پر توسیعی آرٹیکل بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے 80 سے زائد تحقیقی مقالہ جات قومی و بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز اشرف نے زرعی یونیورسٹی کے اعلیٰ اختیاراتی ادارے میں سینئر کیٹ کے ممبر کی حیثیت سے 2007ء سے 2010ء تک اپنی خدمات سرانجام دیں جبکہ گزشتہ نو سالوں سے یونیورسٹی سینٹ کے بھی ممبر ہیں۔ مزید برآں انہوں نے سال 2011ء میں بطور سیکرٹری اکیڈمک سٹاف ایسوی ایشن بھی کام کیا۔ حالیہ چند سالوں میں آؤٹ ریچ کے حوالے سے انہوں نے نمایاں سرگرمیاں انجام دی ہیں اور اس حوالے سے ملکی سطح پر مختلف موضوعات پر آگاہی سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کر چکے ہیں۔

کارکن ان کے ہاں کبھی نہیں آتے یا بہت کم تشریف لاتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں اتنی تعداد میں توسیعی کارکنان کو دیکھا جائے کہ وہ ہر ایک زمیندار کے پاس جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر توسیعی کارکنان صرف 1 یا 2 فیصد زمینداروں تک بھی معلومات پہنچا دیں تو کافی ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر چھوٹے زمیندار ہوتے ہیں جو سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے ابھی زرعی معلومات کی فراہمی کے حوالے سے جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے، ایک بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر زمیندار معلومات ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں اسی وجہ سے شاید توسیع کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو

سوال: ڈاکٹر صاحب آپ ابتدائی تعلیم اور اپنی کھیلوں سے وابستگی کے بارے میں بتائیں؟

جواب: میں نے ابتدائی تعلیم لیبارٹری سکول سے ہی حاصل کی اور گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کرنے کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلہ لیا۔ میری بچپن سے ہی کھیلوں سے وابستگی رہی۔ زرعی یونیورسٹی میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے سونمگ پول کی سہولت میسر تھی اس وجہ سے سونمگ سیکھنے کا موقع ملا اور بعد میں سونمگ کے صوبائی اور قومی سطح پر مقابلہ جات میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ مجھے پنجاب کے تیز ترین پیراک کا اعزاز بھی ملا اور اس کے علاوہ صوبائی اور قومی سطح پر متعدد سونے، چاندی اور کانسی کے تمغہ جات جیتنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ قومی سطح پر واٹر پولو میں کاسی کا تمغہ بھی جیتا۔ میں نے انٹرویو یونیورسٹی مقابلہ جات میں مسلسل چھ سال تک یونیورسٹی کی نمائندگی کی اور 50 سے زائد اسناد حاصل کیں۔ 1997ء میں مجھے انٹرویو یونیورسٹی مقابلوں میں بہترین پیراک کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ انٹرویو یونیورسٹی مقابلہ جات میں 5 سال تک مسلسل واٹر پولو کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 1992ء میں گورنر پنجاب کی طرف تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ہینڈ بال، رسہ کشی کے مقابلہ جات میں بھی مجھے یونیورسٹی کی نمائندگی کا موقع ملا اور میں 1990ء میں ضلع کی سطح پر بانسنگ میں چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ یونیورسٹی سروس میں آنے کے بعد مسلسل 18 سالوں سے سونمگ سے منسلک ہوں۔ پہلے بطور وائس پریذیڈنٹ اور اب پریذیڈنٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بطور ریٹیم منیجر قومی مقابلوں میں ایچ ای سی کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ اس وقت یونیورسٹی سپورٹس بورڈ کے ممبر کے طور پر بھی فرائض سرانجام دے رہا ہوں۔

سوال: زراعت کی ترقی میں توسیع زراعت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ توسیع کا شعبہ زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ زراعت کا شعبہ توسیع کے بغیر نامکمل ہے اور تمام کٹے جانے والے اقدامات کے باوجود توسیع زراعت کے لئے ابھی مزید موثر پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے زرعی رقبے ہاؤسنگ کالونیوں کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں پانی کی کمی بھی نمایاں ہے اور آبادی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کبھی قسم کی غذائی قلت نہیں۔ زرعی اجناس کا مہنگا ہونے میں اور بہت سے عوامل کا عمل دخل تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر زرعی اجناس وافر مقدار میں لوگوں کو میسر ہیں اور اس میں توسیع زراعت کی کارکردگی نمایاں ہے۔ ہم جب بھی زمیندار حضرات کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بات ہمیشہ سننے کو ملتی ہے کہ توسیعی

عمل بھی جاری رہے۔ اسی لیے میں نے اپنی سروس کے اوائل سے ہی پرائیکٹس میں کام کرنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے اور مجھے اس سلسلے میں تقریباً پورا پاکستان دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے مجھے مختلف علاقے، شہر دیکھنے، کسانوں کے مسائل سمجھنے اور مختلف ثقافتوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پچھلے ایک سال سے CABI کے ساتھ مل کر جاہر بوٹی کے بارے میں آگاہی مہم بھی چلا رہا ہوں۔ آغاز میں تو صرف فیصل آباد تک ہی محدود تھی لیکن جناب وائس چانسلر کی ہدایت پر ہم نے اس کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھا دیا۔ 2019ء کے آخری تین ماہ میں ہم نے 60 سے زائد آگاہی سیمینار پورے ملک میں منعقد کئے اور مختلف دیہاتوں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس سلسلے میں ورکشاپس اور سیمینار منعقد کئے۔ ان سیمینارز میں خاص طور پر خواتین کی شرکت بھرپور رہی اور اس مہم کو قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں خوب پزیرائی ملی۔ دنیا کے پچاس سے زائد ملک میں کام والے ادارے CABI نے اپنے ہیڈ آفس سے یونیورسٹی کو تعریفی خط بھی لکھا۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس مہم کا تذکرہ عام رہا ہے اور بہت سارے نیوز چینل نے لائیو پروگرام بھی اس مہم کے بارے میں نشر کئے۔ اس مہم کے بارے میں وائس آف امریکہ نے پروگرام نشر کیا جس کو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے 12 لاکھ افراد دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے سال کی کامیاب مہم کو دیکھتے ہوئے CABI نے مزید ایک سال کیلئے فنڈ فراہم کر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ مکئی پر حملہ آور ہونے والے کیڑے (Fall Army Worm) کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دینے کیلئے بھی فنڈ مختص کئے ہیں۔ مزید برآں ٹڈی دل کے کنٹرول کے بارے میں لوگوں میں شعور کیلئے ایک دستاویزی فلم بھی بنایا رہا ہے جس کیلئے تمام وسائل بین الاقوامی ادارے فراہم کرینگے۔

سوال: آپ جو توسیعی کاروائیاں سرانجام دیتے ہیں اس سے طالب علموں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟

جواب: اس مہم میں طالب علموں نے میرے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا ہے جس سے ان کو عملی طور پر توسیعی پروگراموں کی منصوبہ بندی سے لیکر عملی جامہ پہنانے تک کے تمام مراحل کو عملی طور پر دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کا موقع بھی ملا ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے طالب علم اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ از خود ان پروگراموں کا انعقاد کر سکتے ہیں اور اخبارات کیلئے خبروں کی تحریر اور تشہیر کے مراحل کو بھی وہ سیکھ چکے ہیں۔ ان کوششوں میں یونیورسٹی کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا اور تمام وسائل CABI نے فراہم کئے ہیں۔

سوال: مستقبل میں توسیع زراعت کی ترجیحات کیا ہونی چاہئیں؟

جواب: میں اپنے زرعی نظام میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کسان اپنے فصلوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے نئی فصلوں کو متعارف کرانے اور ان سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے میں توسیع زراعت کا کردار اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ سب سے اہم چیز ہمیں اپنے زری توسیع زراعت میں شامل کرنے کی ضرورت ہے وہ ویلیو ایڈیشن۔ اس وقت ہم کسانوں کو زرعی اجناس کو خام شکل میں بیچنے کی ترغیب دے رہے ہیں جس سے ان کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں ہے۔ مستقبل میں ہمیں کسانوں کی اس بات کی ترغیب و تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے زرعی اجناس کو مختلف پراڈکٹ میں تبدیل کر سکیں جس سے ان کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز جس کے طرف توجہ سے زرعی ترقی ممکن ہے وہ کسانوں کی تنظیم سازی ہے۔ ہمارے زیادہ تر چھوٹے کسان ہیں جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں، تنظیم سازی سے یہ ممکن ہے چھوٹے کسان اپنے میسر وسائل کو بروئے کار لا کر زرعی شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں۔

لوگوں کو توسیع کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ توسیعی کارکن کا کام ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کے چند لوگوں کو نئی معلومات متعارف کروائے گا وہ معلومات چند لوگوں کے ذریعے باقی لوگوں تک سرایت کر جائیں گی۔

سوال: زرعی پالیسیاں کس حد تک زراعت کو متاثر کر رہی ہیں؟

جواب: زرعی پالیسیوں کے حوالے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ زرعی حقائق ہیں اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے اور صحیح اعداد و شمار کے بغیر بنائی گئی خاموش پالیسیوں سے کبھی بھی مطلوبہ نتائج شامل نہیں کئے جاسکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ اپنے پاس موجود حقائق کی بنیاد پر حکومت کسی جنس کو درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے اب اس جنس کی قلت ہوگئی ہے۔ اب دنیا میں زرعی اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے ویب سائٹس کا استعمال بھی ہو رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اعداد و شمار کے بغیر کوئی حکومتی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

سوال: مستقبل میں میڈیا یا ٹیکنالوجی کا توسیع زراعت میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟

جواب: میڈیا اس وقت لوگوں کو بروقت معلومات فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ زراعت میں اس وقت پرنٹ میڈیا کا کردار تو خاطر خواہ ہے۔ بے شمار جرائد، میگزین اور اخبارات زرعی معلومات کے لیے مخصوص ہیں لیکن بد قسمتی سے الیکٹرانک میڈیا کی ترجیحات میں زراعت کافی الحال کوئی مقام نہیں ہے اور ملکی سطح پر جتنے بھی نیوز چینل ہیں ان میں آپ کو زرعی معلومات نہ ہونے کے برابر ملیں گے اور نہ ہی یہ چینل کسانوں کے مسائل کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں حالانکہ ہماری آبادی کی اکثریت زراعت سے منسلک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا لوگوں کے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن میڈیا کی اس خوبی سے ابھی تک زراعت کے شعبہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا یا مخصوص نوجوان نسل جس کی دلچسپی دن بدن زراعت میں کم ہو رہی ہے میں زراعت کے بارے میں شوق کو اجاگر کر سکتا ہے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایسے کامیاب لوگوں کے بارے میں پروگرام نشر کرے جو کہ زراعت کے شعبے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں میں زراعت کے بارے میں شوق کو اجاگر کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ نئی معلومات کی بروقت فراہمی، کسانوں کے مسائل زرعی اجناس کی قیمتیں اور موسمی حالات کے بارے میں آگاہی میڈیا کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

سوال: سوشل میڈیا کا استعمال توسیع زراعت کے لئے کس قدر ممکن ہے؟

جواب: سوشل میڈیا اس وقت نوجوان نسل میں بہت سرایت کر چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ نیٹی وی کے کردار کو مزید محدود کر دیگا۔ اس لیے زرعی کارکنان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ اس وقت ہمارے دیہی علاقوں میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بد قسمتی سے بہت سارے لوگ ابھی تک انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں حالانکہ انٹرنیٹ تعلیم کے لئے بھی انتہائی اہم ذریعہ ہے جو حالیہ کرونا وائرس کے بعد اس کی اہمیت کا احساس لوگوں کو ہوا ہے۔ سوشل میڈیا میں معلومات کی فراہمی انتہائی کم اخراجات میں کی جاسکتی ہے جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔

سوال: آپ تدریس کے ساتھ عملی طور پر توسیع زراعت یا آوٹ ریچ کے حوالے سے کونسی سرگرمیاں سرانجام دے رہے ہیں؟

جواب: میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہمیں سیکھنے کیلئے عملی طور پر اپنے کام کو سرانجام دینا چاہیے اور اس طرح سے طالب علموں کو بھی عملی طور پر مشق کروا کر ہم ان کو توسیعی سرگرمیاں سکھا سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر سفر کرنا پسند ہے اور اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اس شوق کو اپنے کام کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ سیکھنے کا

براہ راست چھٹے سے چاول کی کاشت کے حوالے سے ترقی پسند کاشتکار چودھری اکرام اللہ سے خصوصی انٹرویو (انٹرویو پینل: اعجاز احمد صدیقی، مظفر حسین سالک)

چودھری صاحب: میں نے زمین کو وتر آنے کے بعد اس طرح زمین کو تیار کیا جس طرح اور فصلوں کے لئے تیار کرتے ہیں اور ماہرین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھیت میں 15 کلو بیج باسٹی کے لئے اور 18 کلو بیج موٹے چاول (KS-133) کا چھٹہ دیا۔ اس طرح بغیر کدو کے فصل لگ گئی۔ میرے کئی جاننے والوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اکرام اللہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے لے کر آج تک مونجی بغیر کدو کے لگتی نہیں دیکھی۔

ادارہ: چودھری صاحب یہ بتائیں کہ کدو کے طریقے اور چھٹے سے براہ راست کاشت کرنے میں کتنی بچت ہوتی ہے؟

چودھری صاحب: اس نئے طریقے میں تین طرح سے بچت ہوتی ہے۔ ایک تو سیدھی سیدھی پانی کی بچت یعنی پوری فصل کے دوران پانی کو کھیت میں کھڑا رکھنے کے لئے جتنا پانی درکار ہوتا ہے اس سے کہیں کم مقدار میں چھٹے والے طریقے میں ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ پانی کی ضرورت ہر زمین کو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا اندازہ تو ہر کاشتکار اپنے طور پر کر سکتا ہے۔ دوسری بڑی بچت کدو کرنے کے طریقے میں ہوتی ہے۔ کدو کرتے ہوئے 4 سے 6 سیٹیں لگانی پڑتی ہیں، زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، ایک سی پر 5 سے 6 لیٹر ڈیزل کا خرچہ ہوتا ہے اس طرح دو ہزار سے تین ہزار روپے ڈیزل کی بچت ہوتی ہے پٹوائی اور لگوائی کے دو ہزار روپے کی بچت فی ایکڑ اس کے علاوہ 40 سے 50 من گندم کی بچت گھی کے کنسٹر کی بچت اور گھر میں ہماری بیسیوں کی کھپائی کی بچت۔ آپ سوچ رہے ہو گئے کہ گندم کی بچت سے کیا مراد دراصل لاب لگانے والوں کا کھانا لگوائی کی مزدوری کے علاوہ لاب لگوانے والے پر ہوتا ہے میرے جیسے فارمر کی لاب لگوائی کے دوران اتنی گندم خرچ ہو جاتی ہے اور گھر میں ہمارے بیہیاں روٹیاں پکا پکا کر ہلان ہو جاتی ہیں یہ وہ بچتیں ہیں جو کسی گنتی میں نہیں آتیں۔ اس کے علاوہ پیہری لگانے سے لے کر اور کھیت میں لگوائی تک فارم مکمل طور پر بندھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کھیت میں لگانے کے بعد وٹوں کی لپائی، پانی کے نکلنے کا ڈر لگا رہتا ہے، کبھی بکھار جانوروں کے گزرنے سے وٹ ٹوٹ کر کھیت سے پانی نکل جاتا ہے اس طرح کے مسائل کی اور وقت کی بچت جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔

ادارہ: چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہوئی بچت کی بات کیا اس طریقے میں پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟

چودھری صاحب: بالکل جناب یقیناً اضافہ ہوتا ہے گزشتہ سال میں نے 12 ایکڑ پر اس طریقے سے مونجی لگائی تھی اس کے بعد میں عمرے پر چلا گیا ہاں سے واپس آتا تو تبلیغی جماعت کے

جب سے ملک میں پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے اس وقت سے زرعی ماہرین کاشتکاری کے ایسے طریقے دریافت کر رہے ہیں جن کے ذریعے پانی کی بچت ہو سکے۔ چاول کی فصل وہ واحد فصل ہے جس میں تقریباً پوری فصل کے دوران کھیت میں پانی کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یوں فصل میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے چاول کی فصل کو بغیر کدو کے براہ راست بیج کے ذریعے کاشت کرنے کا جو طریقہ ایجاد کیا ہے وہ کاشتکاروں میں بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں وفاقی وزارت زراعت، فوڈ سیکورٹی و ریسرچ کوشش کر رہی ہے وہیں ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالاشاہ کا کو اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ایگرونی کی کوششیں بھی قابل ستائش ہیں۔ آج ہم قارئین کے لئے ایک ایسے بزرگ ترقی پسند کاشتکار چودھری اکرام اللہ کا انٹرویو شائع کر رہے ہیں جو گزشتہ دس سالوں سے چاول کی فصل براہ راست چھٹے سے کاشت کر رہے ہیں۔ چودھری اکرام اللہ کا تعلق حافظ آباد سے ہے۔

ادارہ: چودھری صاحب زراعت سے تعلق کیسا ہے اور کب سے ہے؟

چودھری صاحب: ہم نسلوں سے زراعت سے وابستہ ہیں اور یہی ہمارا آبائی پیشہ ہے۔

ادارہ: چودھری صاحب کیا ہم آپ کو ترقی پسند کاشتکار کہہ سکتے ہیں؟

چودھری صاحب: جب میں جوان تھا کولتارڑ میں کوئی بھی نیانچ، کھاد، زرعی آلات اور زرعی ٹیکنالوجی میرے ذریعے ہی یہاں آتی تھی۔ میں نئے نئے تجربات کرتا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا تھا۔

ادارہ: آپ کی جدت پسندی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی آج ہم آپ سے چاول کی براہ راست بیج سے کاشت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا؟

چودھری صاحب: جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں شروع ہی سے کاشتکاری کے جدید طریقوں کا دلدادہ ہوں۔ دس سال پہلے اسلام آباد سے کچھ لوگ ہمارے گاؤں آئے اور اسی ڈیرے پر جہاں آپ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چھٹے سے براہ راست چاول کی کاشت کی جائے تو نہ صرف پانی کی بچت ہوگی بلکہ اس طریقے سے پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں ڈیرے پر درجن سے زیادہ افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ان ماہرین کی بات کا یقین نہیں کیا لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس سال تجرباتی طور پر کچھ رقبے پر آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاشت کروں گا۔

ادارہ: ہمارے کاشتکار بھائیوں کو بتائیے کہ آپ نے براہ راست بیج سے کیسے کاشت کی؟

پودے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں اس طرح وہ پودا مضبوط ہونے کے باعث اور پودوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث فصل ہواؤں کا بہتر طور پر مقابلہ کرتی ہے اور گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔

ادارہ: چودھری صاحب اگر یہ طریقہ اتنا ہی اچھا اور ان خوبیوں کا مالک ہے تو ہمارے سائنسدانوں نے یہ طریقہ پہلے کیوں نہیں متعارف کروایا؟

چودھری صاحب: ہمارے سائنس دانوں کو ایسا نہ کہیں وہ جن حالات میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے دراصل بات یہ ہے کہ مونجی کے کھیت میں پانی کھڑا رکھنے کا مقصد دراصل کھیت کو جڑی بوٹیوں سے بچانا ہے۔ اس سے پہلے ایسی کوئی دوائی چاول کی فصل کے لئے موجود نہیں تھی جو کھیت میں جڑی بوٹیوں کو پیدا ہونے سے روک سکے اب ایسی دوائی ایجاد ہو گئی ہے جو چاول کے کھیت میں جڑی بوٹیوں کو اگنے سے مکمل طور پر روک دیتی ہے ان دوائیوں میں سے پچھلے سال جو دوائی استعمال کی تھی اس کا نام کلور (Clover) ہے جس کے مجھے بہترین رزلٹ ملے ہیں یہ دوائی گھاس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام جڑی بوٹیوں کے لیے بھی بہترین ہے اس کے علاوہ ایک دوائی اور مارکیٹ میں آئی ہے اس کا نام زبرا (Zebra) ہے۔ یہ بھی فائدہ مند ہے

ادارہ: یہ دوائیاں کب اور کیسے استعمال کرنی چاہئیں؟

چودھری صاحب: چھٹے سے لگائی ہوئی فصل میں اس دوائی کا استعمال فصل لگانے سے 25 سے 30 دن کے اندر کر لینا چاہیے یہ بات واضح رہے جس وقت اس دوائی کا استعمال کیا جائے اس وقت کھیت میں تر و ترخوب اچھا ہونا چاہیے۔

ادارہ: چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ اپنے پچھلے سال کے تجربے کو دیکھتے ہوئے اس سال کتنے رقبے پر اس طریقے سے چاول کی فصل لگا رہے ہیں؟

چودھری صاحب: جناب اس سال میں نے 190 ایکڑ رقبے پر پورے اعتماد کے ساتھ مونجی اس طریقے سے لگائی ہے۔ میں پاکستان کا دیگر کاشتکاروں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دھان لگانے کے لئے چھٹے والا طریقہ اختیار کریں میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کو انشاء اللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پاکستان کا کوئی بھی کاشتکار مجھ سے جس طرح کی بھی رہنمائی لینا چاہے میں حاضر ہوں۔ کولتارڈ حافظ آباد میں میرا قبہ مین روڈ کے دونوں جانب ہے اس طریقہ کاشت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر کوئی فارم اپنی آنکھوں سے ہمارے فارم کو دیکھنا چاہیے تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔

ادارہ: آپ کے خیال میں یہ طریقہ پاکستان میں کتنا اور کتنی دیر میں کامیاب ہوگا؟

چودھری صاحب: آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ تین چار سال تک چاول کا ایریا اس طریقہ کاشت پر منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا سہ ماہی مجلہ زرعی ڈائجسٹ اور انجناز صدیقی صاحب کی زیر ادارت شائع ہونے والے ماہنامہ سوہنی دھرتی کے توسط سے پاکستان بھر کے کسانوں کو یہ پیغام ملے گا وہ آپ لوگوں کی اس کام میں دلچسپی دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں انشاء اللہ اگلے چند سالوں میں چاول کے کاشتکار کی اکثریت چھٹے کا طریقہ اپنائیں گے۔ جو ملک کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔

ساتھ بگلہ دلش چلا گیا میرے فارم کی دیکھ بھال میرا نٹی ہے باوجود اس کے کہ میں غیر حاضر رہا پھر بھی مجھے اپنے کھیت سے 48 من باستی کی پیداوار ملی ہے جبکہ وہ کھیت جن پر کدو طریقے سے کاشتکاری کی تھی وہاں سے 40 سے 42 من پیداوار آئی۔

ادارہ: چودھری صاحب اس اضافی پیداواری کی کوئی بنیادی وجہ بتا سکتے ہیں؟

چودھری صاحب: جناب بات بڑی سیدھی سی ہے جو میری سمجھ میں آئی اور امید ہے کہ میرے کاشتکار بھائی بھی اس بات کو سمجھ لیں گے۔ اس طریقے میں 15 کلونچ استعمال ہوتا ہے۔ جس سے 37 لاکھ پودے بنتے ہیں اس میں سے اگر صرف 50 فیصد اگاؤ بھی ہو جائے تو کھیت میں 18.5 لاکھ ناؤ کھیت میں ملتے ہیں جبکہ عام طریقے میں 35 سے 60 ہزار پودے بڑی مشکل سے کھیت میں لگتے ہیں اگر فرض کریں ایک پودے سے 20 نالیاں بنتی ہیں تو عام طریقے سے لگائی ہوئی فصل میں 12 لاکھ نالی دستیاب ہوتی ہے اب آئے۔ چھٹے سے لگی ہوئی مونجی کی طرف سب لوگ جانتے ہیں کہ چٹھی نالی کا سائز موٹا ہوتا ہے یہ سب سے الگ ہوتی ہے نالی جتنی موٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ خوراک حاصل کرے گی اس پر لگنے والا ٹھہرا اچھا اور صحت مند ہوتا ہے اس کا چاول صحت مند اور وزنی ہوتا ہے۔ جبکہ چٹھی نالیوں کے علاوہ بننے والی دیگر نالیاں باریک اور چٹھی نالی کی طرح صحت مند نہیں ہوتیں اس لیے ان پر لگنے والے ٹھہر کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ چھٹے کے طریقے سے 18.5 لاکھ چٹھی نالیاں کھیت میں ہوتی ہیں اور اگر صرف 12 لاکھ نالیاں بھی ہوں تو چٹھی نالیاں ہوں گی ان کے ٹھہر صحت مند، بڑے اور زیادہ وزن والے ہوں گے، میرے خیال میں آپ کو چھٹے والے طریقے میں پیداوار زیادہ ہونے کی وجہ سمجھ آگئی ہوگی۔

ادارہ: چودھری صاحب مونجی کی فصل جب تیاری کے قریب ہوتی ہے اس کے گرنے کی شکایت بھی بڑی عام ہے۔ چھٹے سے لگائی ہوئی فصل کا گرنے کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟

چودھری صاحب: کیا بات ہے جناب یہ بھی خوب یاد کروایا ہم نے جو پچھلے سال چھٹے سے فصل لگائی تھی اس کا ایک پودا بھی نہیں گرا جبکہ کدو سے لگائی ہوئی فصل میں گرنے کی شکایت عام تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں ہی اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ پیری جب لگائی جاتی ہے تو پودا وہاں پر اپنی جڑیں نکال کر زمین میں جما لیتا ہے ایک ماہ تک پودا اپنی تمام خوراک لینے والی جڑیں نکال لیتا ہے پھر جس وقت اس کو اکھاڑا جاتا ہے اور اکھاڑنے والا جوتش داس کے ساتھ کرتا ہے اس کا اندازہ تو اس وقت ہی آپ کو ہو سکتا ہے کہ جڑوں کے اعتبار سے پودے کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اب آئی لگانے والے کی طرف وہ سارا دن کمر کے بل جھک کر سخت جس کے موسم میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، اس کیفیت میں وہ کتنی گہرائی تک پودے کو لگا سکے گا اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لاب لگانے کے بعد پودا 10 سے 15 دن اپنی جڑوں کے نقصان کو پورا کرنے میں لگتا ہے مگر میرے خیال میں وہ اس کی ابتدائی جڑوں کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے پودا زمین میں اپنی گرفت مضبوط کرنے میں ناکام رہتا ہے اور فصل بڑی ہونے پر ہوا کے پھیپڑے کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔

جبکہ چھٹے سے لگائی ہوئی فصل پر جب سہاگہ پھیرا جاتا ہے تو بیج مناسب گہرائی تک چلا جاتا ہے اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے ابتدا سے نکلنے والی جڑیں زمین میں مضبوطی سے

سورج مکھی کی کاشت

* غلام قادر، ** محمد شفاق واحد، بارون زمان خان، فرخ سلیم * شعبہ اگرونی، پیرمہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی، ** شعبہ اگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- ☆ پچھلے سال سورج مکھی کی مناسب قیمت نہ ملنا
- ☆ موسمی حالات کی وجہ سے بیج کا کم اگاؤ ہونا اور دانہ نہ بننا

زمین کا انتخاب اور تیاری

میرا اور بھاری میرا زمین سورج مکھی کاشت کے لئے موزوں ہے۔ سیم زدہ اور بہت ریتیلی زمین اس کے لئے موزوں نہیں ہے۔ زمین کی تیاری کے لئے راجہ ہل یا ڈسک ہل پوری گہرائی تک چلائیں تاکہ پودوں کی جڑیں گہرائی تک جا سکیں۔ دھان والے کھیتوں میں یہ اور بھی ضروری ہے کیونکہ ایسی زمینوں میں سخت تہہ پائی جاتی ہے۔ وریاں زمینوں کو تیار کرنے کے لئے 2 تا 3 مرتبہ ہل چلا کر سہاگہ دیں۔ جبکہ فصلات کی کٹائی کے بعد والی زمینوں میں 3 تا 4 مرتبہ ہل چلا کر سہاگہ دیں تاکہ زمین نرم ہو جائے۔ ناہموار زمینوں کو لیزر لینڈ لیولر کے ذریعے ہموار کر کے فصل کاشت کریں۔

اقسام کا انتخاب اور تیاری

کھیت میں پودوں کی تعداد کا پورا ہونا بہتر پیداوار کے حصول میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر ایکڑ میں 22000 تا 23000 پودے ہونے چاہئیں۔ اس لئے پودوں کی مطلوبہ پوری کرنے کے لئے 2 تا 5-2 کلوگرام بیج فی ایکڑ ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کاشتکار حضرات مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کی دوغلی اقسام کے بیج جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں کاشت کے لئے استعمال کریں۔ بیج کی اقسام میں ہائی سن-33، ہائی سن-39، اگورا-4، این کے-278، ڈی ایف ایچ-331 اور 164A93 اچھی پیداوار کے ضامن ہیں۔

طریقہ کاشت

سورج مکھی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے صحیح وقت پر اس کی کاشت انتہائی ضروری ہے۔ تاہم کاشت کرنے کی صورت میں نہ صرف اس کی پیداوار میں کمی آجاتی ہے بلکہ اس سے تیل بھی کم حاصل ہوتا ہے بارانی علاقوں میں اس کی کاشت کا زیادہ تر انحصار بارشوں کے پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ سورج مکھی کی سال میں دو دفعہ کاشت کی جاسکتی ہے۔ ایک موسم بہار میں اور ایک موسم خزاں میں۔ مختلف علاقوں میں سورج مکھی کا وقت کاشت درج ذیل ہے۔

اضلاع	وقت کاشت
موسم بہار	موسم خزاں
رجیم یار خان، بہاولپور، بہاولنگر، ملتان، خانپور، وہاڑی، لودھراں، راج پور، لیہ، ڈیرہ غازی خان، بھکر اور مظفر گڑھ	10 جنوری تا 10 فروری
میانوالی، سرگودھا، خوشاب، جھنگ، فیصل آباد، ساہیوال اور اکاڑہ	25 جنوری یا 15 فروری
سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، قصور، منڈی بہاؤ الدین، نارووال، اٹک، راولپنڈی، گجرات اور چکوال	25 جنوری تا آخر فروری
	25 جولائی تا 10 اگست

خوردنی تیل انسانی خوراک کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان میں ایک فرد 12 تا 13 لٹر سالانہ خوردنی تیل استعمال کرتا ہے۔ اس وقت ہم کل ضرورت کا صرف 34 فیصد تیل خود پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ 66 فیصد ہمیں درآمد کرنا پڑتا ہے۔ جس پر سالانہ 216.4 ارب روپے صرف ہوتے ہیں۔ آبادی میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے خوردنی تیل ضرورت ہر سال بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سورج مکھی کی فصل غیر روایتی تیل دار اجناس میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سورج مکھی کی فصل خوردنی تیل کی ملکی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بیج 40 فیصد سے زیادہ خوردنی تیل ہوتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا تیل انسانی صحت بالخصوص امراض قلب سے بچاؤ کے لئے نہایت مفید ہے۔ مزید برآں اس کے تیل میں حیاتین اے، بی اور کے پائے جاتے ہیں۔ یہ فصل تقریباً 110 تا 120 دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ فصل سال میں با آسانی دو دفعہ کاشت کی جاسکتی ہے۔ جس سے کسان اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ سورج مکھی کی بہاریہ فصل خزاں میں کاشت کردہ فصل سے زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ اس لئے سورج مکھی کی بہاریہ فصل کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پچھلے پانچ سالوں میں پنجاب میں سورج مکھی کے زیر کاشت رقبہ پیداوار اور فی ایکڑ پیداوار درج ذیل گوشوارے میں دی گئی ہے۔

نمبر شمار	سال	رقبہ ہزار ایکڑ	پیداوار ہزار ٹن	اوسط پیداوار سن فی ایکڑ
1	2009-10	84.29	65.05	20.68
2	2010-11	80.40	61.25	20.41
3	2011-12	114.25	94.05	22.05
4	2012-13	127.75	92.24	19.34
5	2013-14	67.30	51.70	20.58

فصلوں کی کاشت کی ترتیب

پنجاب میں جس طرح کپاس، دھان، گندم اور گنا کی فصلیں کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سورج مکھی کی فصل بھی کامیابی سے کاشت ہو سکتی ہے۔ مزید برآں کاشتکار حضرات اگر رینج (خصوصاً گندم) یا خریف کی فصلیں کی وجہ سے وقت پر کاشت نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں سورج مکھی کاشت کر کے بھی خاطر خواہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورج مکھی کو فصلوں کی ادل بدل میں پنجاب کے تمام علاقوں میں بڑی آسانی سے بڑی فصلوں کے رقبہ اور پیداوار میں کمی کے بغیر شامل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً

- ۱۔ کپاس، سورج مکھی، بہاریہ کپاس
- ۲۔ دھان سورج مکھی (بہاریہ)، دھان
- ۳۔ آلو-سورج مکھی (بہاریہ) چارے
- ۴۔ کما، سورج مکھی (بہاریہ) گندم، مکئی
- ۵۔ سورج مکھی (بہاریہ) چارے گندم
- ۶۔ گندم سورج مکھی (بہاریہ) گندم
- ۷۔ سورج مکھی (خزاں) گندم، مونگ پھلی

رقبہ اور پیداوار میں کمی کے اسباب

- ☆ گندم کے رقبہ میں اضافہ

کہ ایک طرف تو زیرگی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ پھول کے مرکز میں بیج نہیں بنتے اور جو بننے ہیں ان کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے اور وہ اندر سے خالی رہ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر بہار یہ فصل کے لئے 4 تا 5 دفعہ آبپاشی کریں۔ جس میں پہلا پانی فصل اگنے کے 15 سے 20 دن کے بعد، دوسرا پانی پہلے پانی کے 15 سے 20 دن کے بعد، تیسرا پانی پھول آنے پر، چوتھا پانی دانہ بننے وقت، پانچواں پانی اگر ضرورت ہو تو دانہ کی بڑھوتری کے دوران لگائیں۔ اگر بارش ہو جائے تو بارش کی مقدار کو سامنے رکھتے ہوئے فصل کو پانی لگائیں۔ زیادہ تر بارش ہونے کی صورت میں فالٹو پانی کھیت سے نکال دیں۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی

جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا زیادہ پیداوار کے لئے بہت ضروری ہے فصل کاشت کرنے کے بعد پہلے آٹھ ہفتے تک جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا بہت اہم ہے۔ چنانچہ اس عرصہ میں ان کی تلفی ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ فصل میں گوڈی کر کے جڑی بوٹیاں تلف کی جائیں۔ اگر گوڈی کے ذریعے ان کی تلفی ناممکن ہو تو پھر جڑی بوٹی مارزہروں کا استعمال کریں۔

سورج مکھی کے ضرر رساں کیڑے اور ان کا انسداد

سورج مکھی کی فصل کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں میں سبز تیتلا، سفید مکھی، سُست تیتلا، چور کیڑا، لشکری سنڈی، امریکن سنڈی اور میٹلی بگ شامل ہیں۔

طریقہ انسداد

مشاہدہ میں بات آئی ہے کہ سورج مکھی کی فصل پر بہت سے ضرر رساں کیڑوں پر دوست یا شکاری کیڑے موجود ہیں جن میں کیڑا خور لیڈی برڈ ٹیل، کرائی سوپا، پائیریت بگ، سرفڈ فلائی، مکڑے۔۔۔ فلائی اور آسٹین بگ وغیرہ شامل ہیں جو رس چوسنے والے کیڑوں کو کھاتے ہیں اور فصل کو ان کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ امریکن سنڈی کے زہر پر دانوں کو جسی پھندے لگا کر تلف کریں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ضرر رساں کیڑوں کے خلاف سپرے کا فیصلہ کھیت میں موجود دوست کیڑوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پیسٹ سکاؤٹنگ کے بعد کریں۔ مزید برآں زرپاشی کے وقت زہروں کے سپرے سے اجتناب کریں۔

سورج مکھی کی بیماریاں اور ان کا انسداد

۱۔ جڑ اور تنے کی سرمن

یہ بیماری ایک پھپھوندے سے لگتی ہے۔ یہ تنے کے نچلے حصہ پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تنے کا اندرونی و بیرونی حصہ کو نلکے کی طرح کالا نظر آنے لگتا ہے۔ متاثرہ حصے پر کالے رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں۔ یہ دھبے تنے کے اندر گودا پر بھی دیکھے جاسکتے ہیں اور جڑ کے سوکھنے سے پودا مر جھکا جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً پھول آنے سے پہلے اور پھول آنے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس مرض سے بیج کم بنتا ہے۔ پودے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پورا پودا سوکھ جاتا ہے۔ بیج کو بوائی سے پہلے پھپھوند کش زہر لگا کر کاشت کریں۔ فصل کو خشک سالی نہ آنے دیں۔ فصلوں کو مناسب ادل بدل اپنائیں۔

۲۔ پھول کر سمن

یہ بیماری ایک پھپھوندے سے لگتی ہے۔ پھول کے پچھلے حصے پر خاکی رنگ کے مندار دھبے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو آہستہ آہستہ اپنے سائز میں بڑھتے جاتے ہیں۔ جلد ہی یہ دھبے جھلکے سے گہرے کالے رنگ کی روئی سے ڈھک جاتے ہیں۔ شدید حملے کی صورت میں پودے کا پورا پھول گل کر پودے سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرض زیادہ اس وقت پھیلتا ہے جب فصل پکنے کے قریب ہو اس مرض سے بیج سکر جاتے ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر پرندوں کی وجہ سے زخم آنے پر اور کیڑوں کے حملے سے پھیلتا ہے۔

سورج مکھی سے اچھی پیداوار لینے کے لئے فصل کا قطاروں میں کاشت کرنا بے حد ضروری ہے درمیانی فاصلہ سواد تاڑھاٹنی فٹ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ آپاش علاقوں میں 9 انچ اور بارانی علاقوں میں 12 انچ رکھیں۔ سورج مکھی کی کاشت بذریعہ ڈرل، پوریا کیرا جیسے طریقہ ہائے کار ہے لیکن ان کے لئے زمین کا تروتازہ حالت میں ہونا بنیادی شرط ہے۔ سورج مکھی کے لئے سب سے بہتر طریقہ ڈبلنگ (چوپا) ہے۔ اس طریقہ کاشت میں پہلے اڑھاٹنی فٹ کے فاصلے پر بنائی جاتی ہیں۔ پھر پانی دے کر 8 یا 9 انچ کے فاصلے پر سوراخ کر کے دو دو بیج ڈالے جائیں۔ خیال رہے کہ بیج پانی میں نہ ڈوبے۔ کھیتوں پر لگائی ہوئی فصل کو بہتر اگاؤ کے لئے جلد چھدرائی کریں۔ اگاؤ مکمل ہونے کے بعد جب پودے چار پانچ پتے نکالیں تو فصل کی چھدرائی کر دیں۔

استعمال

سورج مکھی کی پیداوار بڑھانے کے لئے کھادوں کا متناسب استعمال کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سورج مکھی کی فصل جس کے بیج کی پیداوار 20 من فی ایکڑ ہو وہ زمین سے نائٹروجن 12 کلوگرام فاسفورس، 29 کلوگرام پوناش جبکہ 3.8 کلوگرام سلفر زمین سے حاصل کرے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ بوائی سے قبل زمین کا تجزیہ کروالیا جائے تاکہ اس میں عناصر کا درست پتہ چل سکے۔ کیمیائی کھادوں کا استعمال زمین زرخیزی کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ 15 ٹن گوبر کی گلی سڑی کھاد فی ایکڑ بوائی سے کم از کم ایک ماہ پہلے کھیت میں ڈالیں ورنہ بھونڈی کے حملے سبب ہنسی ہے۔ عام طور پر سورج مکھی کی فصل کو درمیانی زرخیزی والی زمین کے لیے 12 کلوگرام نائٹروجن، 23 کلوگرام فاسفورس اور 23 کلوگرام پوناش کی فی ایکڑ ضرورت ہے۔ بوائی کے وقت دو بوری نائٹروفس + ایک بوری پوناش سلفیٹ یا پونے دو بوری ٹی ایس پی + دو بوری یوریا + ایک بوری امونیم نائٹریٹ دوسرے پانی کے ساتھ آدھی بوری امونیم نائٹریٹ، یوریا یا ایک بوری امونیم نائٹریٹ جبکہ پھولوں کی ڈوڈیاں بننے وقت ایک بوری درمیانی ایکڑ استعمال کریں۔ فاسفورس اور پوناش والی ساری کھادیں بوائی کے وقت کھیت کو دیں جبکہ نائٹروجن والی کھادوں تین اقساط میں استعمال کریں۔ پہلی قسط بوائی وقت دوسری چھدرائی کے بعد جبکہ تیسری قسط فصل کو پھول آنے پر ڈالیں۔

گوڈی اور مٹی چڑھانا

فصل کو گوڈی کرنے سے جہاں جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں وہاں اس کا اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین نرم ہو جاتی ہے اور اس کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ پہلا پانی لگانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ گوڈی ضرور کریں۔ جب پودے ایک فٹ کے ہو جائیں تو ان کی جڑوں کے گرد مٹی چڑھا دیں۔ مٹی چڑھانے کا عمل بعد از دوپہر کرنا چاہیے۔ مٹی چڑھانے سے پودوں کے تنوں کو مضبوطی ملتی ہے اور وہ مقابلتہ کم گرتے ہیں جس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔

آپاشی

فصل کے لئے آپاشی کا درامد مونسیمی حالات پر ہوتا ہے۔ اگر موسم گرم اور خشک ہو تو پودوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بارش ہو جائے یا موسم سرد اور مرطوب ہو تو پودوں کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ سورج مکھی کی فصل اگرچہ کسی حد تک خشک یا سوکا برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے تاہم بہتر پیداوار کا حصول پودوں کو ان کا مطلوب پانی نہ ملنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ سورج مکھی کی فصل کو اس کی کل ضرورت 20 سے 25 فیصد پانی اگنے سے لے کر ایک ماہ تک چاہیے ہوتا ہے۔ ستار بننے سے بیج کی بڑھوتری تک فصل کو ہلکا ہلکا پانی ضرور لگاتے رہنا چاہیے۔ اس دورانیہ میں اگر فصل کو سوکا لگ جائے تو بیج کی پیداوار میں 40 فیصد سے زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

اس مرض سے بچاؤ کے لئے پرندوں اور کیڑوں کی روک تھام کرنی چاہیے۔ بیج کو بوائی سے پہلے پھپھوند کش زہر لگا کر کاشت کریں۔

۳۔ پتوں کا جلساؤ
یہ بیماری ایک پھپھوند سے لگتی ہے۔ پتوں پت چھوٹے گہرے خاکی اور سیاہ رنگ کے دھبے سب سے پہلے نچلے پتوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان دھبوں کی شکل گول ہوتی ہے اور ان کے ارد گرد کا حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پتے گر جاتے ہیں۔ یہ حملہ نمدار موسم میں خزاں کی فصل پر زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ حملہ کی صورت میں عمل زیری رک جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ انسداد کے لئے بیج کو بوائی سے پہلے پھپھوند کش زہر لگا کر کاشت کریں۔

۴۔ بیج کو الی گنا
بیج کو الی گنا لگائی جاتی ہے۔ بیج کی سطح پر کئی اقسام کے پھپھوند لگے ہوتے ہیں۔ اس کا انسداد بیج کو اچھی طرح خشک کر کے سنور کرنا ہے۔

۵۔ روئیں دار پھپھوند
یہ بیماری ایک پھپھوند سے لگتی ہے۔ یہ پتوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ پتوں کی بالائی سطح پر زردی مائل نوکدار دھبے ظاہر ہوتے ہیں۔ جبکہ پتوں کی زیریں سطح پر کالے ابھرے ہوئے داغ نقطوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس طرح متاثر پتے خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری عام طور پر پھول آنے پر ظاہر ہوتی ہے نمدار موسم میں اس کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ مرض پتوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس لئے اس بیماری کا پیداوار پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ پتوں پر سبز مادہ خوراک بنانے کے عمل میں کافی عمل دخل رکھتا ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لئے فصلوں کا مناسب ادل بدل اپنائیں۔ بیماری کے حملہ کی صورت میں زیادہ پانی نہ لگایا جائے۔ حملہ بڑھنے کی صورت میں پھپھوند کش زہر کا سپرے کریں۔

برداشت
فصل کو اس وقت برداشت کریں۔ جب اس کے زیادہ تر ٹکھوں کی پشت زردی مائل ہو جائے اس وقت پرندوں کے حملہ کا خطرہ مقابلتا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا فصل کی برداشت میں زہر کرنا کا شکار کے نقصان میں ہے۔ فصل کو کمبائن ہارویٹر سے کاش کریں یا درافتی سے کاش کر تھریشر یا ڈنڈوں کی مدد سے بیج کو الگ کر لیں بیج کو اچھی طرح خشک کر لیں۔ بیج میں جب نمکی کا تناسب 8 فیصد رہ جائے تو پٹ سن کی بور یوں میں سنور کریں۔

میتھی (صحت اور حسن کے لئے قدرت کا بہترین تحفہ)

اطباء کہتے ہیں کہ اگر میتھی کی افادیت کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں میتھی دانہ موجود نہ ہو۔ نزلہ و زکام کے لئے، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اس کا استعمال از حد مفید ہے۔ صبح و شام دو چائے کے چمچ ایک کپ پانی میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے پی لیں۔ مسلسل استعمال سے دائمی نزلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو استعمال کرانے سے سارا بلغم نکل جاتا ہے۔ بالوں کی خوبصورتی کے لئے، گھنے بال ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس مقصد کے لئے ایلو ویرا کو درمیان سے اس طرح کا ٹیس کہ دونوں سرے جڑے رہیں۔ اس گھیکوار میں میتھرے بھر کر دھاگے سے باندھ کر ہفتہ، دس دن فریج میں رکھ دیں، اس کے بعد میتھرے گھیکوار سے نکال کر کڑوے تیل میں جلا لیں۔ یہ تیل ان شاء اللہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ آ زمودہ اور آ سان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بھی تیل آپ بالوں کے لئے استعمال کریں اس میں میتھرے ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں اور چند دن بعد وہ تیل استعمال کرنا شروع کریں، بالوں کو سیٹ کرنا ہو تو اس مقصد کے لئے میتھرے کا اہلا ہوا پانی لگا کر رول کرنے سے بالوں میں گھنگھر یا لپن آ جاتا ہے اور بال سیاہ چمکدار، گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس کو اچا رہیں استعمال کریں یا پیس کر آٹے میں شامل کر کے روٹی بنالیں یا سبزیوں اور دالوں میں ملائیں۔ غرض ہر ڈش میں اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ کڑا ہی گوشت یا نمائز گوشت میں میتھرے اور ثابت دھنیا ایک ایک چمچ بھون کر پیس کر ڈالیں جبکہ ہنڈیا تیار ہو چکی ہو اور ایک نئے لذیذ ذائقہ کا لطف اٹھائیں۔ مصالحہ والی بریانی بھی چند دانے پیس کر ڈال کر دیکھیں اور اچا گوشت تو اس کے بغیر بنتا ہی نہیں۔ جن لوگوں کو بادی کا مرض ہو یعنی کھانے کے بعد ان کے ہاتھ، پاؤں سن ہونے لگتے ہوں یا مسوڑھے پھول جاتے ہوں۔ ان کو عمومی طور پر اس کا استعمال رکھنا چاہیے یعنی چاول، دہی، خیر روٹی، آلو وغیرہ نقصان دیتے ہیں تو کچے یا کچے میتھرے ضرور استعمال کریں۔ دونوں میں سن یا س کے بعد پائے جانے والا ڈپریشن اور پیسے کی زیادتی کے لئے بھی مفید ہے۔ اس کے لئے یا تو اس کا پانی اہال کر پی لیں یا چاول بناتے وقت اس کی پوٹلی اٹھتے ہوئے چاولوں میں ڈال دیں۔ ماہرین کے مطابق ذیابیطس کے مریض اگر 25 گرام میتھی دانہ اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کر لیں تو اس سے شوگر لیول اور کو لیٹرول اعتدال پر آ جاتا ہے۔

بقیہ:	جامن کی نگہداشت	1- جنگلی تم
اقسام	پاکستان میں کوئی خاص اقسام نہیں پائی جاتیں البتہ جسامت اور رنگ کے لحاظ سے جامن کی	2- راتم
دوا اقسام ہیں۔	گودارس دار اور جامنی رنگ کا ہوتا ہے گھٹلی چھوٹی ہوتی ہے۔	گودا کم اور سفید، گھٹلی بڑی ہوتی ہے۔

ایک من بیج سے ایک ایکڑ کاشت، کماد کی کاشت میں ایک نیا انقلاب

فضل حسین سولنگی، معروف ماہر زراعت

سالوں سے چل رہا ہے اور دیگر ممالک میں بھی اس طریقہ کاشت میں بیج صرف 12 من درکار ہے۔ اس گنے کی چھائی آپ ہاتھوں سے کریں درانتی یا برجھی کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ درانتی کے استعمال سے اس کی گانٹھیں ضائع ہو سکتی ہیں جب آپ گنڈیری لینے جاتے ہیں تو دکاندار جو گانٹھیں نکال لیتا ہے، ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ گنے سے گانٹھیں، آنکھیں، بڈز، جو بھی نام دیں نکال دیں اور دس منٹ اس کو 200 لٹروں میں پانی ڈال کر ایک لٹر کوئی اچھی پھپھوندی کش دوائی ڈال دیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد پھر وہ گانٹھیں آپ نکال دیں آپ کے پاس بھل کی مٹی ہوئی چاہیے وہ مٹی آپ پلاسٹک کے اس شاپر میں ڈال دیں جو مختلف فصلات کی زمری کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلاً مرچ، ٹماٹر، سفیدہ وغیرہ۔ آپ اگر ایک شاپر میں ایک گانٹھ رکھیں گے تو 12 سے 15 شاپر ہونگے اگر دو گانٹھیں رکھیں گے تو 30 پودے تیار ہونگے مختلف ممالک کی ریسرچ جو بات آتی ہے کہ ایک گانٹھ سے پودوں کی فی ایکڑ مقدار 40 سے 45، جبکہ دو گانٹھیں رکھنے سے 80 سے 90 ہزار ہو جاتی ہے جو کہ اس وقت بطور ثبوت کے مختلف زمینداروں کے پاس موجود نہیں اس پیری کا آپ نے درجہ حرارت اور آب و ہوا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پانی کے ساتھ دوسرے پوریا کھاد کی ہلکی مقدار بھی دیتے ہیں ٹھیک دو ماہ بعد اس کا قدرتی پھل 2 فٹ کے قریب آ جاتا ہے اگر آپ ایک کھلی میں 2 گانٹھ استعمال کریں گے تو 2 من سیڈز استعمال ہوگا اگر 1 گانٹھ استعمال کریں گے تو صرف ایک من سیڈز استعمال ہوگا۔ باقی گنا آپ فروخت کر سکتے ہیں۔

جب آپ کی پیری تیار ہو جائے تو آپ نے جو کھیلیاں بنائی ہیں وہ اس طرح ہوں کہ کھیلی کی چوڑائی، ایک فٹ اور کھیلی سے کھیلی کا فاصلہ 3 فٹ ہو۔ پودے سے پودے کا فاصلہ 2 فٹ ہو، اس میں صرف 2 عدد مزدوروں کی ضرورت ہے ایک مزدور دو فٹ فاصلے پر کبھی سے کھائی کرے تو دوسرا مزدور بلڈ سے کھیلی کو کٹ لگا کر وہاں پودا رکھ کر اوپر سے مٹی چڑھا دے اس کے لئے آپ کو زمین بہترین طریقے سے تیار کرنا ہوگی، تاکہ کوئی ذلیلہ وغیرہ نہ رہے اس کے بعد پھر خوراک کا عمل جاری رکھیں۔ اس کے لئے 2 عدد مزدور کافی ہیں جس پر 1000 روپے لاگت آتی ہے جبکہ دوسرے جدید ذرائع سے 40 ہزار مزدوری آتی ہے یہ طریقہ تمبر کاشت اور فروری کاشت دونوں کے لئے موزوں ہے اس طریقہ کاشت سے آپ انٹرکراپ بھی لے سکتے ہیں۔

عالمی زرعی ماہرین کہتے ہیں، کہ جس زمین میں آپ گنا کاشت کر رہے ہیں اس کھیت کے اندر نامیاتی مادے کی مقدار سے 5 فیصد ہو لیکن آپ سن کر حیران ہونگے کہ ہمارے زمینوں میں نامیاتی مادہ 1 فیصد بھی نہیں ہے ہمارے زرعی ماہرین بھی سارا زوارا جزائے کبیرہ پر دیتے رہتے ہیں لیکن فصل کی جو بنیادی ضرورت ہے۔ اس طرف آتے ہی نہیں، کیمیائی کھادوں کے دھڑا دھڑا استعمال سے ہماری زمینوں کا پی ایچ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ آرکینک کھادوں کے استعمال سے زمین کا پی ایچ لیول ٹھیک ہو جاتا ہے نیز آہستہ آہستہ زمین کے اندر نامیاتی مادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ آرکینک طریقہ کاشت گنا سے چینی یا شکر بنا کر یورپ بھیجیں تو آپ کو دو گنا ریٹ مل سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہونگے اور پیداوار بڑھانی ہوگی کیونکہ پھر وہی بات دھراؤں کا جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ کسان بھائی مزید معلومات کے لئے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔

حکمہ زراعت پنجاب نے تسلیم کیا ہے کہ اگر ہم کماد کی کاشت پر بھرپور توجہ دیں تو 1500 سے 2000 من فی ایکڑ پیداوار آسانی سے آسکتی ہے چلو حکمہ زراعت نے ہماری پوری بات نہ سہی آدھی بات تو سچ مانی۔ راقم نے آج سے 5 سال پہلے جب کماد کی 5000 ہزار من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی بات کی تو بہت سے ہمارے مہربان ایسے تھے جو اس ٹیکنالوجی کو ماننے کے لئے تیار بھی نہیں تھے وہ تحریر بھی ہمارے پڑھے لکھے زمیندار کی تھی جس میں انہوں نے پورا طریقہ اور ٹیکنالوجی ماہنامہ کسان ورلڈ کے اندر تفصیل سے لکھی تھی اگر گندم کی پیداوار 50 سال پہلے دس ہندہ من فی ایکڑ تھی تو آج 90 من فی ایکڑ تک لی جاسکتی ہے تو گنے کی پیداوار میں 4 گنا اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ عجیب ستم ہے کہ اس زرعی ملک کا کوئی شخص ریسرچ کرے یا پانی محنت سے کوئی نئی چیز دریافت کر لے تو بجائے حوصلہ افزائی کے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں جو چیز میں نہیں کر سکتا وہ اور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کماد کی فصل تیسری بڑی نقد آور فصل بن چکی ہے۔ پورے پاکستان میں ہزاروں ایکڑ رقبہ پر گنا کاشت ہو رہا ہے۔

پاکستان میں کماد کی کاشت مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر کاشت روایتی طریقہ سے کی جاتی ہے اور کماد کو خوراک بھی روایتی طریقہ سے دی جاتی ہے اس لئے اوسط پیداوار 610 من فی ایکڑ ہے جو کہ پوری دنیا میں نہیں بلکہ جنوبی ایشیاء میں بھی سب سے کم ہے۔ جدید طریقہ کاشت میں اس وقت دو طریقے زیادہ کامیاب جا رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی چند خامیاں ہیں، پہلا طریقہ کاشت پٹ پلائس (گڑھے بنا کر) ہے اس میں پودوں کی تعداد بھی ایک لاکھ پوری ہو جاتی ہے گرنے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں اور اگر ایک پودے (گنے کی چھری) کا وزن کم از کم 2 کلو بھی ہو جائے تو 2 لاکھ کلو بن جاتے ہیں جس سے 5000 من فی ایکڑ پیداوار آ جاتی ہے جو ہمارے زمیندار لے بھی چکے ہیں۔

دوسرا طریقہ کاشت جو ہمارے پاکستانی ماہرین جس میں راقم کا بھی کچھ ہاتھ ہے وہ متعارف کراتا ہے جو دو سالوں سے یہ کامیاب جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گڑھے کی بجائے 2 فٹ چوڑی اور ایک فٹ گہری کھلی نکالی جاتی ہے اور کھلی سے کھلی کا فاصلہ اڑھائی فٹ رکھا جاتا ہے ہر 2 فٹ کے فاصلے پر انگلیوں کی طرح 12 سے 13 سے قلم کی طرح کاٹ کر ساتھ ساتھ رکھ دینے جاتے ہیں پٹی مرتبہ زمین کے تجربے کے بعد آپ کیمیائی کھادوں کا استعمال کریں گے اور کمپوسٹ آرکینک کھاد کا بھی پھر اس کے بعد آپ صرف ہر پانی پر آرکینک کھاد کا استعمال کریں اور کیمیائی کھادوں کی ضرورت میں طریقے دونوں ہی ایک جیسے ہیں صرف وہاں گڑھوں کی بجائے کھلی بنادی گئی کیونکہ گڑھے بنانے کے لئے مشین پھر ڈیزل کا خرچہ اور ٹریکٹر کم از کم 30 سے 40 ہزار روپے فی ایکڑ کا خرچہ آتا ہے جو کہ کاشتکار کے بس کا روگ نہیں لیکن کھلیوں پر کاشت کا خرچہ تقریباً ایک ہزار آ جاتا ہے۔ بیج دونوں طریقوں سے 120 سے 130 من تقریباً ضرورت ہوتی ہے۔ پودوں کی تعداد دونوں طریقوں سے ایک لاکھ فی ایکڑ مل سکتی ہے۔

ہمارے ماہرین پاکستان میں ایک زبردست انقلاب لائے ہیں جو ہمارا عام کاشتکار سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جب وہ فقرہ سنتا ہے کہ ایک من گنے سے ایک ایکڑ کماد کاشت کریں تو وہ حیران ہو جاتا ہے لیکن ریسرچ میں کوئی چیز عبید نہیں ہے۔ وضاحت کرتا چلوں کہ انڈیا میں یہ طریقہ گذشتہ بیس

الیوپیتھک ٹیکنالوجی

زاد عطا پیہر، محمد فاروق، محمد ابوبکر شعبہ اگرا نومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ان جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اس حوالے سے بھی کام جاری ہے کہ جڑی بوٹیوں کے خلاف استعمال ہونے والی کیمیائی زہروں کی مقدار کو الیوپیتھک خصوصیات رکھنے والے پودوں کے آبی محلول کے ساتھ ملا کر جڑی بوٹیوں کا تدارک کیا جائے اور ایسے قدرتی مرکبات تیار کئے جائیں جو کہ جڑی بوٹیاں مارنے والی کیمیائی زہروں کا متبادل ثابت ہوں۔ الیوپیتھک خصوصیات کے حامل مختلف پودوں یا فصلات کے آبی محلول کو اکیلے یا ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر جڑی بوٹیوں کے انسداد کیلئے استعمال کیا گیا۔ ان فصلوں میں جوار، سورج مکھی، سرسوں اور شہتوت کے آبی محلولات کو آپس میں ملا کر استعمال کیا گیا جس میں ہر ایک کی مقدار 12 سے 21 لیٹر فی ہیکٹر تھا۔ ان کو گندم اور مکئی کی جڑی بوٹیوں کے خلاف استعمال کیا گیا اور اس طرح ان فصلوں کی جڑی بوٹیوں کے انسداد میں بالترتیب 40 سے 75 فیصد تک کامیابی ہوئی اور ان کی پیداوار میں بالترتیب 15 سے 25 فیصد اضافہ ہو گیا۔ جوار، سورج مکھی، سرسوں اور شہتوت کے قدرتی مرکبات سے بنائے گئے آبی محلول کو جڑی بوٹی مارزہروں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے جڑی بوٹی مارزہروں کے استعمال میں 50 سے 70 فیصد تک کیلئے کامیابی ہوئی۔ جڑی بوٹی مارزہروں کی مقدار میں کمی اور ان کی جگہ قدرتی مرکبات کے حامل پودوں کے محلول کو استعمال کرنے سے مندرجہ ذیل فصلوں میں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

فصل	پودوں سے حاصل کی جانے والی قدرتی مرکبات کا محلول	جڑی بوٹی مارکیمیائی زہریں	کیمیائی زہروں کی مقدار میں فیصد کمی
گندم	جوار + سورج مکھی	تمام سفارش شدہ کیمیائی زہریں	70
کیاس	جوار + سورج مکھی	پنیز میٹھالین + ایلین میٹھال کلور	66
چاول	جوار + سورج مکھی	پیوٹا کلور + پریٹیل کلور	66
مکئی	جوار + سورج مکھی + سرسوں + شہتوت	ایٹرا زین + ایلین میٹھال کلور	66
کیٹولا	جوار + سورج مکھی	پنیز میٹھالین + میٹھال کلور	50

قدرتی مرکبات والی فصلوں کا دوسری فصلوں کے درمیان اگانا فصلوں کی ہیر پھیر اور فصلوں کی باقیات سے زمین کو ڈھانپنا بھی جڑی بوٹیوں کے مستقبل انسداد کے لئے مددگار ہیں۔

محلول بنانے کا طریقہ کار

پکی ہوئی فصل کو کاٹنے کے بعد خشک کر لیں اور سائے کے نیچے رکھ لیں۔ پھر پودوں کے تنے اور پتوں کو چارہ کاٹنے والی مشین (ٹوکر) کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں (دو سے تین سینٹی میٹر) میں کاٹ لیں۔ 10:1 کی نسبت سے پانی میں چوبیس گھنٹوں کے لئے بھگوئیں۔ اسکے بعد اسکو چھان لیں اور حاصل ہونے والے محلول کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پالیں تاکہ اسکی مقدار 20 گنا کم کیا جاسکے۔ اب اس ایلے ہوئے سیر شدہ محلول کو سٹور کر لیں اور فصلوں میں سفارش شدہ مقدار کے مطابق پانی میں ملا کر پسرے کر دیں۔

جڑی بوٹیاں زراعت میں ناپسندیدہ اور متنازع مقام رکھتی ہیں۔ جہاں ان جڑی بوٹیوں کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان برداشت کرنا پڑتا ہے وہاں کبھی کبھار ان کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں زراعت کا استحکام خطرے میں ہے اسی لئے جڑی بوٹیوں کو سائنسی تحقیق کیلئے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ الیوپیتھک ایک ایسا عمل ہے جس میں پودے زمین میں ایسے مرکبات شامل کرتے ہیں جو دوسرے پودوں کے مختلف عوامل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ قدرتی مرکبات کے تمام پودوں اور ان کے بافتوں میں موجود ہوتے ہیں اور زمین میں مختلف طریقوں سے خارج ہوتے رہتے ہیں۔

جس کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔

(1)۔ پودوں کی باقیات کی توڑ پھوڑ سے (2)۔ بخارات کی شکل میں پودوں سے اخراج

(3)۔ جڑوں سے اخراج

ان قدرتی مرکبات کی ساخت اور عمل کرنے کا طریقہ کار متنوع ہے الیوپیتھک تحقیق کا مرکز و محور جڑی بوٹیوں کے مختلف طریقوں کو اجاگر کرنا ہے جن میں فصلوں کی باقیات سے حاصل ہونے والے قدرتی مرکبات کے عمل کا طریقہ اور قدرتی مرکبات کا استعمال، قدرتی مرکبات والی فصلوں کا دوسری فصلوں کے درمیان اگانا، ان مرکبات کے عمل کا طریقہ اور قدرتی مرکبات پیدا کرنے والی جینز کو تلاش کرنا شامل ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے پودوں سے حاصل کئے جانے والے قدرتی مرکبات کو جڑی بوٹیوں کے انسداد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور طریقوں پر کسانوں کو غور و فکر کرنی چاہیے۔

(1)۔ زمین کو ڈھانپنے والی فصلیں اگانا۔

(2)۔ فصلوں کا ہیر پھیر۔

(3)۔ فصلوں کی باقیات سے زمین کو ڈھانپنا

(4)۔ قدرتی مرکبات کا محلول کی شکل میں فصلوں پر پسرے کرنا شامل ہے۔

درج بالا نقطے ہماری تجربہ گاہ کے اہم ترین مقاصد ہیں۔

شعبہ اگرا نومی میں جڑی بوٹیوں کی سائنس پر کام کا آغاز 1970ء کی دہائی میں ہوا جب کے الیوپیتھک میں اسکا آغاز 1980ء کے وسط سے ہوا۔ 1994ء میں جڑی بوٹیوں کے تدارک بذریعہ قدرتی مرکبات پر کام کرنے والی تجربہ گاہ قائم ہوئی اور شعبہ اگرا نومی میں ماسٹر ڈگری کرنیوالے طلبہ کے نصاب میں ”فصلوں کی پیداوار میں الیوپیتھک کا کردار“ کے نام سے یہ کورس 1998ء میں شامل کیا گیا۔ یہ کورس ہر دوسرے سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے جو پاکستان کی زرعی یونیورسٹی میں اپنے طرز کا پہلا کورس ہے جو دوسرے شعبہ جات کے طلبہ و طالبات کیلئے بھی پرکشش ہے۔

الیوپیتھک کا اہم ترین نقطہ جڑی بوٹیوں کے علم کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے جن میں الیوپیتھک کی خصوصیات رکھنے والے پودوں یا فصلوں کی باقیات اور انکے آبی محلول کا استعمال، الیوپیتھک خصوصیات رکھنے والی فصلوں کی مخلوط کاشت اور ان فصلوں کی ہیر پھیر بھی شامل ہے تاکہ

موسم خریف کے چارے

چوہدری افتخار احمد سندھو، مدیر اعلیٰ کسان ورلڈ لاء ہور

- ☆ چلائیں۔ فصل کے لئے ایک بوری سونا ڈی اے پی اور آدھی بوری سونا یوریا پی ایکڑ زمین کی تیاری کے دوران بوائی سے پہلے ڈالیں۔ ایک بوری سونا یوریا پی ایکڑ فصل کی حالت کے پیش نظر دوسرے پانی کے ساتھ استعمال کی جاسکتی ہے۔
- ☆ چارے کی فصل کو دو سے تین پانی درکار ہوتے ہیں۔ پہلا پانی بوائی کے تین ہفتے بعد دیں اور بقیہ پانی حسب ضرورت دیتے رہیں۔
- ☆ اگر فصل کا قد 3 فٹ سے کم ہو اور فصل پانی کی کم کا شکار ہو جائے تو اسے جانوروں کو احتیاط سے کھلائیں کیونکہ ایسی حالت میں اس میں ایک زہریلا مادہ ہائیڈروسائینک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے جو جانوروں کے لئے نہایت مضر ہے۔ اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ چارہ ایک پانی لگا کر جانوروں کو کھلائیں۔ مونڈھی فصل کا چارہ کھلانے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اس صورت میں بھوسہ وغیرہ یا کوئی اور سبز چارہ اس کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔
- ☆ چارے والی فصل پر عام طور پر کسی زہر کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جواری فصل پر پریڈ لیف سپاٹ کا حملہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کی روک تھام کے لئے صحت مند بیماریوں سے پاک بیج استعمال کریں۔
- ☆ چارے کے لئے فصل کو پھول نکلنے پر کاٹ لیں۔ اس وقت فصل کاٹنے پر زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے

باجرہ

- ☆ باجرہ موسم گرما کا ایک اہم چارہ ہے۔ اس کے سبز چارے اور بیج میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں پانی کی کمی کو دوسرے چارہ جات کے مقابلہ میں بہتر طور پر برداشت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسے بارانی علاقوں کی فصل بھی کہا جاتا ہے جہاں اس کے زیر کاشت رقبہ کا دار و مدار بارشوں پر ہوتا ہے۔ یہ فصل دو چھل اور بار برداری والے جانوروں کے لئے یکساں مفید ہے۔ یہ فصل کیڑوں کے حملوں سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ نہری علاقوں میں بارانی علاقوں کی نسبت کم از کم دو تین گنا زیادہ پیداوار لی جاسکتی ہے۔ بارانی علاقوں میں 8 تا 10 میٹر ٹن اور آبپاش علاقوں میں 20 تا 25 میٹر ٹن سبز چارہ فی ایکڑ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ یہ فصل کلراٹھی اور سیم زدہ زمینوں کے سوا ہر قسم کی زمین پر کاشت کی جاسکتی ہے۔ تاہم ہلکی میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو اس کی کاشت کے لئے موزوں ہے۔ زمین کا ہموار ہونا اچھی پیداوار کے لئے ضروری ہے۔ دو تین دفعہ ہل اور سہاگہ چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کریں تاکہ وہ نرم اور بھر بھری ہو جائے۔
- ☆ چارہ کے لئے نہری علاقوں میں 6 کلو گرام اور بارانی علاقوں میں 4 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ صاف ستھرا صحت مند بیج اچھی پیداوار کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لئے بوائی سے پہلے بیج اچھی طرح صاف کریں۔

ہمارے ملک میں تقریباً 5.5 ملین ایکڑ رقبہ پر مختلف قسم کے چارہ جات کاشت ہونے کے باوجود بھی جانوروں کو ضرورت کے مطابق سبز چارہ نہیں مل رہا اور ہمارے جانوروں کی خوراک میں تقریباً 25 فیصد قابل ہضم غذائی اجزاء اور 40 فیصد قابل ہضم لحمیات کی کمی پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے جانوروں کی عمومی کمزور حالت سے بخوبی ظاہر ہے۔ خوراک کی اس کمی کی وجہ سے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زراعت اور بار برداری بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اگر ہم نے وافر دودھ اور گوشت پیدا کرنا ہے تو اس کی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چاروں کی پیداوار میں کمی کی سب سے بڑی وجہ کسانوں تک نئی اقسام کا بیج اور جدید فنی مہارتوں کا نہ پہنچنا ہے۔ ہم چارہ جات کی کاشت میں بہتر منصوبہ بندی، ان کی مخلوط کاشت، زمین کا مناسب انتخاب، اچھا بیج، کھادوں کا مناسب استعمال، بروقت کاشت، آب پاشی، برداشت اور دیگر زرعی عوامل و سفارشات پر عمل کر کے ان کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ خریف کے اہم چارے کئی، جوار، باجرہ، سوڈان گھاس اور سدا بہار ہیں۔ مگر ہم یہاں پر تین اہم چارہ جات جوار، باجرہ اور گوارا کا ذکر کر رہے ہیں۔

جوار

- ☆ جوار یا چری گرمیوں کا اہم اور جانوروں کا پسندیدہ چارہ ہے۔ اس میں اقسام کی مناسبت سے لحمیات تقریباً 7 سے 12 فیصد ہوتے ہیں۔ اس فصل میں چونکہ خشک سالی برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لئے یہ فصل پاکستان کے آبپاش اور بارانی دونوں علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جاسکتی ہے۔
- ☆ چارے کے لئے فصل مارچ سے اگست تک حسب ضرورت کاشت کی جاسکتی ہے۔
- ☆ چارے کے لئے صحت مند، بیماریوں سے پاک سفارش کردہ اقسام کا 32 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ گوچھٹا سے کاشت کا عام رواج ہے لیکن اچھی پیداوار لینے کے لئے ایک فٹ کے فاصلے پر لائنوں میں بوائی کریں۔ چھٹا سے بیج کا اگاؤ کم ہوتا ہے اس لئے پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔
- ☆ جوار کی سفارش کردہ اقسام درج ذیل ہیں۔

1- جے ایس 2002

نئی منظور شدہ قسم ہے جو سب سے مروجہ اقسام سے زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ یہ قسم زیادہ دیر تک سبز رہتی ہے اور جانور اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔

2- جے ایس 263

زیادہ پیداوار دینے والی قسم ہے۔ چارے اور دانے دونوں مقاصد کے لئے موزوں ہے۔

3- بیگاری

چارے کے علاوہ اس کے بیج کی پیداوار بھی حوصلہ افزاء ہے۔

☆ بوائی سے ایک ماہ قبل 10 سے 12 گڈے گوبر کی گلی سڑی کھاد فی ایکڑ یکساں بکھیر کر ہل

- ☆ ایم بی 87: جانٹ باجرہ 18، بی وائی، گھان وائیٹ، ایف پاپ اور بی ایس 2000 باجرہ کی معیاری اقسام ہیں جو کہ چارے اور غلے دونوں کے لئے یکساں مفید ہیں۔
- ☆ اس چارے کے لئے فصل کی کاشت اپریل سے اگست تک کی جاسکتی ہے۔ چارے کی اگیتی فصل میں اگر لوہیا ملا کر کاش کریں تو چارے کی غذائیت اور پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ زمیندار اسے عام طور پر ایک ہزار لیٹر چھٹا بنی کاشت کرتے ہیں لیکن ایک ایک فٹ کے فاصلے پر قطاروں میں ہزار لیٹر بولائی کرنے سے پیداوار بڑھ جاتی ہے۔
- ☆ بولائی کے وقت ایک بوری سونا ڈی اے پی بی ایکڑ الیں۔ بعد ازاں جب فصل کا قد ڈیڑھ سے دو فٹ ہو جائے تو ایک بوری سونا پوری بی ایکڑ الیں۔
- ☆ نہری علاقوں میں پہلا پانی کاشت کے تین ہفتے بعد لگائیں۔ کم آگاہی کی صورت میں پانی جلد ی لگانا مفید ہوتا ہے اور بعد ازاں پانی حسب ضرورت موسمی حالات کے مطابق لگاتے رہیں۔ یہ فصل چونکہ سیم زدہ حالات برداشت نہیں کر سکتی اس لئے خصوصاً برسات کے دنوں میں کھیت میں زیادہ پانی کھڑا نہ رہیں۔
- ☆ چارہ کے لئے کاشت فصل کم و بیش اڑھائی ماہ میں تیار ہوتی ہے۔ سٹوں پر آئی ہوئی فصل غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اس لئے اس کی کٹائی کا مناسب ترین وقت یہی ہوتا ہے۔ چونکہ اس چارہ میں زہریلا مادہ نہیں ہوتا اس لئے اسے کسی وقت بھی جانوروں کو کھلایا جاسکتا ہے۔
- ☆ گوارہ
- یہ ایک پھلی دار چارہ ہے۔ اس کو اگر ہل چلا کر زمین میں دبا دیا جائے تو یہ زمین کی زرخیزی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں لحمیاتی مادہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے
- ☆ اسے غیر پھلی دار چاروں مثلاً جوار، باجرہ وغیرہ کے ساتھ ملا کر کاشت کیا جاتا ہے۔ تاکہ ان کی افادیت اور غذائیت میں اضافہ ہو جائے۔ اس کی کاشت عموماً ریتلے اور کم بارش والے علاقوں میں کی جاتی ہے۔ اس کی کاشت کے لئے گرم آب و ہوا درکار ہے۔ یہ خشکی کو کافی برداشت کر سکتا ہے۔
- ☆ ہلکی میرا زمین جس میں پانی کی نکاسی بہتر ہو اس کی کاشت کے لئے موزوں ہے۔ زمین کا اچھی طرح تیار اور جڑی بوٹیوں سے صاف ہونا اچھی پیداوار کے لئے بنیادی شرط ہے۔ زمین کی تیاری کے دوران زمین کی ہمواری پر خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ نشیبی جگہوں پر پانی کھڑا ہونے سے فصل کے پودے مر جاتے ہیں اور اونچی جگہوں پر پانی نہ پہنچنے سے اس کا اگاؤ صحیح نہیں ہوتا اور دونوں صورتوں میں پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
- ☆ چارہ کے لئے 20 سے 25 کلوگرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں۔ چارہ کے لئے فصل اپریل سے جولائی تک کسی وقت بھی کاشت کی جاسکتی ہے۔ اس کی کاشت ایک ایک فٹ کے فاصلے پر قطاروں پر کریں۔
- ☆ بہتر پیداوار کے حصول کے لئے ایک بوری سونا ڈی اے پی زمین کی تیار کے دوران بولائی سے پہلے ڈالیں۔
- ☆ بعض اوقات فصل میں سوکا کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے جس کا تدارک فصلوں کے ہیر پھیر سے کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ چارے والی فصل ڈیڑھ دو ماہ میں کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مناسب دیکھ بھال سے نہری علاقوں میں 10 سے 15 ٹن سبز چارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ بارانی علاقوں میں سبز چارہ کی پیداوار 6 ٹن فی ایکڑ لی جاسکتی ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

ٹرکٹر کی دیکھ بھال (Maintenance of Tractor)

بقیہ:

- 4- ایئر کلیئر کا تیل تبدیل کریں۔
- 5- گیر بکس، ڈیفریٹل اور فائنل ڈرائیو کا تیل تبدیل کریں۔
- 6- ہائیڈرولک سسٹم کا تیل تبدیل کریں۔
- 7- آئل فلٹر تبدیل کریں۔
- 8- دونوں فیول فلٹر تبدیل کریں۔
- 9- ہائیڈرولک فلٹر تبدیل کریں۔
- 10- ڈیزل ٹینک صاف کروائیں۔
- 11- ریڈیٹر کو صاف کروائیں۔
- 12- ریڈی ایٹر پریشر کیپ چیک کریں۔ اگر ضرورت ہو تو تبدیل کریں۔
- 13- سٹیرنگ ویل (Steering Wheel) کی ایڈجسٹمنٹ کروائیں۔
- 14- ٹپٹ کلیرنس (Tappet Clearance) ایڈجسٹ کروائیں۔
- 15- سلینسر (Silencer) کو صاف کروائیں۔
- 16- تھرموسٹیٹ والو (Thermostat Valve) کی حالت چیک کریں اگر ضرورت ہو تو
- تبدیل کریں۔
- 17- سیلف سٹارٹر (Self Starter) کی سروس کروائیں۔
- 18- جنریٹر (Generator) کی سروس کروائیں۔
- 19- فیول انجکشن پمپ (Fuel Injection Pump) کی سروس کروائیں۔
- 20- آٹومائزر/انجیکٹر (Automozer/Injector) کی سروس کروائیں۔
- 21- کلچ، بریک اور ٹائی راڈ (Tie Rod) وغیرہ کی مرمت کروائیں۔
- 22- ویل بیلننگ (Wheel Balancing) اور ویل الائنمنٹ (Wheel Alignment) کروائیں۔
- 23- بیٹری کی حالت چیک کریں اگر ضرورت ہو تو تبدیل کریں۔
- 24- ٹائروں کا بطور معائنہ کریں۔ اگر گھس گئے ہوں تو تبدیل کریں۔
- 25- انجن کمزور ہو تو انجن کی اوور ہالنگ (Overhauling) کروائیں۔
- 26- ضرورت ہو تو باڈی کی ڈینٹنگ و پیینٹنگ (Denting & Painting) کروائیں۔

مکئی کی منافع بخش پیداوار میں فاسفورس، زنک اور بوران کا کردار

محمد طارق سعید (پی ایچ ڈی۔ کالر)، محمد اشفاق واحد..... شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

وقت کی ایک اہم ضرورت ہے زرعی سائنسدانوں نے اس مقصد کیلئے ایگری انومک بائیوفورٹیفیکیشن (Agronomic Biofortification) کے طریقہ کار کو بہتر پایا ہے۔ اس طریقہ کار میں فصلوں میں زنک کی مناسب فراہمی کو زمین یا سپرے کی مدد سے پورا کیا جاتا ہے۔ مزید برآں تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دانوں میں زنک کی مقدار کو بڑھانے کیلئے ان میں موجود جمع شدہ نامیاتی فاسفورس کی مقدار کے تناسب کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس طرح زنک اور فاسفورس کے مناسب استعمال سے فصلات میں ان عناصر کے مابین تعلق کو بہتر انداز میں سمجھا جاسکتا ہے۔ مذکورہ بالا عناصر کے علاوہ بوران بھی پودوں کی غذائیت کا اہم عنصر ہے زنک کے علاوہ بوران بھی پودے کے غلیوں کی خلوی دیوار اور خلوی جھلی کی تشکیل اور مضبوطی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح پودا مختلف قسم کے ماحولیاتی تناؤ کو برداشت کرنے اور نقصان دہ کیمیائی مادوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعے سے اپنی تولیدی نشوونما کو برقرار رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مکئی کی فصل میں بوران کی شدید کمی سے پھلی بننے کا عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ نتیجتاً پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی زمینوں میں اجزائے صغیرہ (Micronutrients) کی 50 تا 60 فیصد تک کمی پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں زنک کے بعد فصلوں میں بوران کی کمی کو اہم مسئلہ کے طور پر گردانا جاتا ہے اور اس عنصر کی کمی سے چاول اور مکئی کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ مکئی کی فصل کیلئے فاسفورس کی یکساں فراہمی بوران اور زنک کی غذائی کمی، بیج میں موجود فاسفورس اور اس کا اجزائے صغیرہ (زنک اور بوران) سے کلیدی تعلق کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین نے ایک تحقیق کی ہے جس کو ایک طالب علم نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران مکمل کیا۔ تحقیق کے نتائج سے پتہ چلا کہ فاسفورس کی مقدار 120 کلوگرام بحساب فی ہیکٹر کے استعمال سے مکئی کی پیداوار اور فصل کی بڑھوتری میں اضافہ ہوا تاہم 150 کلوگرام بحساب فی ہیکٹر کا استعمال پیداواری لاگت کے حساب سے زیادہ موزوں رہا۔ زنک اور بوران کے فاسفورس کے ساتھ استعمال سے پودے کے تولیدی مراحل مثلاً دانہ بننے اور فصل کی بروقت برداشت میں بہتری آئی اور جہاں ان عناصر کا استعمال نہیں کیا گیا وہاں پودوں کی افزائش اور دانے بننے کا عمل کافی متاثر ہوا۔ تاہم زنک کے استعمال سے پودے کے مختلف حصوں جیسے سبز، پتے اور بیج میں اس کے ذخیرہ ہونے کا عمل پروان چڑھا جبکہ فاسفورس اور بوران کی مقدار کے ذخیرہ ہونے کا عمل بھی مشاہدے میں آیا۔ تحقیق کے مجموعی نتائج کے اعتبار سے یہ بات سامنے آئی کہ 8 کلوگرام زنک، 4 کلوگرام بوران اور 150 کلوگرام فاسفورس بحساب فی ہیکٹر کے استعمال سے فصل کی پیداوار منافع بخش اور نمایاں رہی اور مکئی کی پیداوار کا تناسب 61 فیصد تک بڑھ گیا لہذا فیصل آباد کے کسانوں کو ایم آر ٹی یلو (MMRI-Yellow) ورائٹی کیلئے مذکورہ بالا کھادوں کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے تاکہ زمین اور فصل کی غذائی ضروریات متوازن انداز میں پوری ہوں اور منافع بخش فصل کا حصول ممکن ہو سکے۔

پاکستان میں مکئی کی فصل کو کاشت رقبہ اور پیداوار کے حساب سے دانے دار اجناس کی فہرست میں تیسرے نمبر پر گردانا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے ملک کی مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کیلئے خوراک کے وسائل ناقافی ہیں، جو کہ ملک کی فوڈ سکیورٹی کیلئے ایک اہم چیلنج ہے اور اس مسئلے کو مکئی کی بہتر پیداوار کے حصول سے حل کیا جاسکتا ہے۔ گوکہ مکئی کی فصل کی پیداواری صلاحیت باقی دانے دار اجناس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس فصل کو کافی زیادہ وسائل مثلاً بہتر بیج، بروقت پانی اور کھادوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ بہتر انتظامی صلاحیتوں کے حامل طریق کار کی ضرورت ہے۔ مکئی کی فصل کو کافی زیادہ مقدار میں نائٹروجن اور فاسفورس کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز ابتدائی دنوں میں فاسفورس کی شدید کمی فصل کی پیداوار میں کمی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پر زمین سے زیادہ غذائی عناصر جذب کرنے والی فصلات کی کاشت سے زمین فاسفورس کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ مزید برآں غذائی اجزاء کا توازن بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق، پاکستان کی تقریباً 90 فیصد زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں۔ جس میں مختلف عوامل مثلاً فصلوں کا زمین سے زیادہ غذائیت جذب کر لینا، زمین میں موجود فاسفورس مہیا کرنے والے منرلز (Minerals) کی کمی اور زیادہ کیلشیم والے مادے کی وجہ سے زمینوں میں فاسفورس کا فکس ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ مجموعی طور پر کسانوں میں گزشتہ چند سالوں سے ہائپر ڈمکٹی کی کاشت کا رجحان بڑھ گیا ہے اور ہائپر ڈمکٹی کو غذائی اجزاء بالخصوص فاسفورس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا سال بہ سال ایک جیسی فصلوں کی کاشت سے زمینیں غذائی اجزاء کی شدید قلت کا شکار ہو گئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زمین میں موجود فصلات کے حصول میں یہی طریقہ کار اہم ہے۔ فصل کے ابتدائی دنوں میں زمین میں موجود فاسفورس کی فراہمی تمام دانے دار اجناس بالخصوص مکئی کی افزائش اور پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور فصل جلدی پھول پیدا کرنے اور برداشت کے مدارج طے کر لیتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زمین سے دستیاب فاسفورس کو پودا اپنے بڑے، تنے اور پتوں کے نشوز میں غیر نامیاتی شکل جبکہ بیج میں نامیاتی شکل میں جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے جب پودے کو زمین میں موجود فاسفورس کی دستیابی میں کمی واقع ہوتی ہے تو بیج میں ذخیرہ شدہ شکل پودے کے اُگاؤ کے دوران اور ابتدائی افزائش کے عمل میں غذائی ضرورت کی فراہمی کا متبادل ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ زنک کی کمی بھی فصلوں اور انسانوں کی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے کیونکہ تمام جانداروں کو اپنی جسمانی ساخت اور مختلف عوامل سرانجام دینے کیلئے اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان پاکستان، انڈیا، چائینہ، ترکی اور ایران کی زمینوں میں زنک کی خاطر خواہ کمی مشاہدے میں آئی ہے مزید برآں وہاں بسنے والے انسانوں کی غذا میں بھی زنک کی کمی پائی گئی ہے۔ زیادہ تر ترقی پزیر ممالک میں دانے دار اجناس انسانوں کی اہم غذائیت اور پروٹین سے سیر شدہ خوراک کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں۔ اس اہمیت کے پیش نظر زنک سے بھرپور دانے دار غذائی اجناس کا حصول

الحديث

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بنانے والے، بھوانے والے، پینے والے، اٹھانے والے، جس کیلئے اٹھا کر لائی جائے، پلانے والے، فروخت کرنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، خریدنے والے اور جن کیلئے خریدی جائے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

گاجر کی کاشت

محمد مزمل جہانگیر، چوہدری محمد ایوب، کریم یار عباسی..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

یا 60-75 سینٹی میٹر پر بنائی گئی پٹریوں کے دونوں کناروں پر بیج کا کیرا کریں اور مٹی سے بیج کو ڈھانپ کر پانی لگا دیں۔

آپاشی

پہلی دو آپاشیاں بڑی احتیاط سے 5 سے 7 دن کے وقفے سے کریں تاکہ بیج اچھی طرح اُگ آئے۔ بعد میں وتر آنے پر اچھی طرح گوڑی کر کے آب پاشی کا وقفہ 14-10 دن کر لیں۔ اس کے بعد پانی روک دیں ورنہ گاجر بننے کی بجائے پتے زیادہ بنیں گے۔

چھدرائی، گوڑی

اگاؤ کے بعد جب پودے اچھی طرح سنبھل جائیں تو 3-4 سینٹی میٹر کے فاصلہ پر اچھے اور صحت مند پودے چھوڑ کر باقی پودوں کو نکال دینا چاہیے۔ چھدرائی ہمیشہ وتر میں کرنی چاہیے تاکہ پودے کھینچتے وقت نہ ٹوٹیں۔ اسی وقت اچھی گوڑی کر کے خورد و جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں۔ گوڑی کرتے وقت جڑوں پر مٹی کو چڑھاتے رہنا چاہیے۔

کھادوں کا استعمال

بوائی کے وقت کھیت میں ڈبڑھ بوری ٹرپل سپر فاسفیٹ، ایک بوری یوریا اور ایک بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی ایکڑ کے حساب سے ملا کر ڈالنی چاہیے۔

وقت برداشت

فصل 3-4 ماہ میں قابل برداشت ہو جاتی ہے اور عموماً دسمبر سے مارچ تک برداشت کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ جب اوپر سے گاجریں 3-2.5 سینٹی میٹر موٹی ہو جائیں تو برداشت کے قابل ہو جاتی ہیں۔

اقسام

T-29 سرخ رنگت والی قسم کا شکاریوں میں بہت مقبول ہے کیونکہ یہ زیادہ پیداوار دیتی ہے اور ڈالتے میں بہت اچھی ہے اس کے علاوہ میکرو۔ اور نیز اور ٹپ ٹاپ بھی اچھی اقسام ہیں۔ ریڈ لانگ (انڈین) بھی اہم ہے۔

پیداوار

اچھی پیداواری ٹیکنالوجی اپنانے سے عموماً 8-10 ٹن فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔

اہم بیماریاں، کیڑے اور انک کنٹرول

کھیت میں بیمار اور دوسری اقسام کے پودوں کو بروقت نکال دیا جائے تاکہ فصل بیمار یوں اور ملاوٹ سے پاک ہو۔ گاجر کی اہم بیماریاں میں پھپھوندی جھلساؤ شامل ہیں۔ یہ بیمار پودے پراؤنل حالت میں کالے دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور بعد میں جلد ہی سارے پودے جھلسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابتدائی علامات ظاہر ہونے پر ڈائی ٹھین ایم-45 کا سپرے بحساب 1 کلوگرام فی ایکڑ کریں۔ سفید پھپھوندی کو اسی طرح ختم کرنا چاہیے۔

عام طور پر کیڑوں سے فصل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا پھر بھی اگر رس چوسنے والے کیڑے حملہ کریں تو سنڈا فاس یا ٹھیرا ان وغیرہ کا سپرے کر دیں یا پھر کیڑے کی شناخت کے بعد مناسب دوائی استعمال کر کے ان کو کنٹرول کر لیں۔

گاجر کی فصل تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے اپنی خوشنارنگت اور غذائی اعتبار سے دیگر سبزیوں میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ ایسی سبزی ہے جس کی کاشت زمانہ قدیم سے ہو رہی ہے۔ اپنی سرخ رنگت کی وجہ سے نہ صرف کھانوں میں دلکشی پیدا کرتی ہے بلکہ حیاتین کا بہترین ذریعہ ہے۔ عام حالات میں باقی سبزیوں کی نسبت وہ دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ اس کا قدیم وطن بھی پاکستان یا اس کے گرد و نواح کے علاقے تصور کیئے جاتے ہیں۔ گاجر میں حیاتین الف اور ج، معدنی نمکیات، لوہا، چونا اور فاسفورس کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا استعمال خون اور آنکھوں کی بیماریوں کے خلاف انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ گاجر کا مرہ دول اور دماغ کو فروخت بخشتا ہے۔ گاجر چونکہ پیشاب آور سبزی ہے لہذا اس سے پیشاب میں تیزابیت کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور چہرے کے نکھار میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سبزی پکانے کے علاوہ سلاڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اچار، گاجر کا حلوہ اور گجر بیلا بالذید بنتا ہے۔ لوگ اس کا جوس بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ اس کے پتے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔

موسم اور آب و ہوا

گاجر کی کاشت کے لئے سرد مرطوب موسم درکار ہے۔ خوبصورت رنگ، اچھی شکل، مناسب سائز اور بہتر پیداوار کے لئے درجہ حرارت 15-20 درجہ سینٹی گریڈ تک موزوں ہوتا ہے۔ اگر اسے گرم موسم میں کاشت کیا جائے تو اس کے پودے سوکھ جاتے ہیں اور اگر گرم موسم کے ساتھ خشکی بھی ہو تو پودے کا اگنا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر پودے اُگ بھی آئیں تو گاجر میں چھوٹی، سخت اور کھردری ہوتی ہیں۔ اس لئے بہتر اُگاؤ کے لئے زمین میں 20 فیصد تک نمی کافی ہوتی ہے۔

پیداواری ٹیکنالوجی

زمین کی تیاری

گاجر کی کاشت کے لئے زرخیز بھر بھری اور پانی کے بہترین نکاس والی زمین بہت موزوں ہوتی ہے۔ نرم و ملائم زمین میں اس کی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے۔ جن زمینوں کی مقدار 5-6 کے قریب ہو وہاں سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ بوائی سے پہلے زمین میں پانچ چھ مرتبہ ہل چلا کر زمین کو اچھی طرح نرم کیا جاتا ہے۔ ہر دفعہ ہل چلانے کے بعد سہاگہ دینا ضروری ہے تاکہ زمین زیادہ ملائم ہو جائے۔ اگر زمین کی تیاری بہتر طریقے سے نہ کی گئی ہو تو گاجر کی جڑیں چھوٹی اور پیداوار بہت کم رہ جاتی ہے۔

وقت کاشت

گاجر کی کامیاب کاشت کے لئے سرد مرطوب موسم درکار ہے۔ گاجر کی اگیتی کاشت کے لئے ولایتی اقسام ماہ نومبر میں بوئی جاتی ہیں۔

شرح بیج: 10 سے 12 کلوگرام بیج فی ایکڑ کافی ہوتا ہے۔

طریقہ کاشت

کاشت سے 15-20 روز پہلے اچھی طرح ہموار کئے ہوئے کھیت کو پانی لگا دینا چاہیے تاکہ جڑی بوٹیاں اُگ آئیں۔ ہموار زمین پر بیج چھٹھ کرنے کے بعد ٹریکٹر سے کھیلیاں بنالیں

شالجم کی کاشت

چوہدری محمد ایوب، محمد مزمل، جہانگیر، کریم یار عباسی، ثاقب ایوب..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جائے۔ لیکن اگر اس وقت زمین خشک ہو تو پھر بوائی کے فوراً بعد پانی لگا دینا چاہیے اور بعد میں زمین کی حالت اور موسم کے مطابق مناسب وقفے سے آبپاشی کی جانی چاہیے۔

چھدرائی، علائی اور گوڈی

شالجم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لئے چھدرائی کرنا بہت ضروری ہے۔ جب پودے 5-7 سینٹی میٹر بڑے ہو جائیں تو 10-8 سینٹی میٹر کے فاصلے پر صرف صحت مند پودے چھڑ کر باقی نکال دیئے جائیں۔ اسی طرح علائی کرتے وقت مٹی چڑھائیں کیونکہ علائی جڑی بوٹیوں کی تلفی میں مدد دیتی ہے۔

کھادوں کا استعمال

کاشت کے وقت کھیت میں ایک بوری یوریا، دو بوری سینگل سپر فاسفیٹ اور ایک بوری پوٹاش بکھیر دیں یا چھوٹ کر دیں۔

وقت برداشت اور مارکیٹنگ

جب فصل کو برداشت کرنا ہو تو اس وقت کھیت میں مناسب نمی موجود ہونی چاہیے۔ پہلے ہمیشہ بڑے سائز کے شالجم برداشت کئے جائیں اور درمیان میں سے چھوٹے چھوٹے شالجم نہ نکالیں برداشت کے بعد انہیں دھو کر منڈی میں بھجوانا چاہیے منڈی بھیجنے سے قبل ان کے پتے کاٹ دیئے جائیں۔

پیداوار

زمین کی زرخیزی اور مختلف اقسام کے مطابق شالجم کی پیداوار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے جبکہ اچھی زمین میں سے 10-6 ٹن فی ایکڑ پیداوار یا آسانی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اقسام

شالجم کی دیسی اقسام نکانہ ریڈ اور واں راہارام ریڈ کے علاوہ دیسی سرخ، پرپل ٹاپ، گولڈن بال عام ہیں۔

اہم بیماریاں، کیڑے اور ان کا کنٹرول

شالجم کے پتوں پر پھپھوندی دھبے سیاہ رنگ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں یہ ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں اس کے خاتمے کے لئے ڈائی تھین ایم۔45 یا مینلیٹ کا سپرے کریں جبکہ تیلہ یا کھمی اور رس چوسنے والے کیڑے کی روک تھام کے لئے انٹراکول یا ایلپیٹ سپرے کریں۔

انسانی استعمال اور ریفریجریٹیشن کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے۔

۵۔ UHT ٹریٹمنٹ

UHT الٹرا ہائی ٹریٹمنٹ (Ultra high treatment) کا مخفف ہے۔ اس طریقے میں دودھ کو دو مرحلوں میں گرم کیا جاتا ہے: پہلے 75 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور پھر 3 سینکڑ کے لئے تقریباً 143 ڈگری سینٹی گریڈ پر۔ اس عمل کے دوران دودھ جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد دودھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور جراثیم سے پاک ماحول میں جراثیم سے محفوظ بیکٹوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

یہ جڑ والی سبزیوں میں نمایاں مقام کی حامل سبزی ہے۔ غذائی اور اقتصادی لحاظ سے اہم ہے۔ پنجاب میں وسیع رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ شالجم میں حیاتین الف، ج، معدنی نمکیات لوہا، چونا اور فاسفورس مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں ان کے پتوں میں حیاتین ب خاصی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ شالجم کو اگر پتوں سمیت استعمال کیا جائے تو بھرپور غذائیت کی حامل سبزی ہو سکتی ہے۔

موسم اور آب و ہوا

سرد اور معتدل مرطوب آب و ہوا شالجم کی کاشت کے لئے نہایت موزوں ہے۔ اگر اسے گرمیوں میں کاشت کیا جائے تو پھر شالجم سخت، ترش اور چھوٹے سائز کے بنتے ہیں۔

زمین اور اس کی تیاری

بہتر پیداوار کے لئے زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو بہترین ہے۔ ویسے تو شالجم کی فصل بغیر گوہر کی کھاد کے بھی اگائی جاسکتی ہے اگر پھر بھی کھاد ڈالنا ہو تو بوائی سے تقریباً ایک ماہ پہلے 10-15 ٹن گوہر کی گلی سڑی کھاد ڈال کر زمین میں ہل چلا کر اسے کھیت میں اچھی طرح ملا پانی لگا دیں۔ جب زمین میں وتر آ جائے تو اس میں دوبارہ ہل چلا کر سہاگے کے ساتھ وتر دبا دیا جائے اور فصل بونے کی تیاری کریں۔

وقت کاشت

پنجاب میں اس کی اگیتی بوائی اگست سے شروع ہوتی ہے جبکہ عام فصل کی کاشت ستمبر سے اکتوبر تک ہوتی ہے۔ شالجم کی پختی فصل نومبر میں کاشت کی جاتی ہے۔

شرح بچ

ایک ایکڑ کے لئے ایک کلوگرام بچ کافی ہے۔

طریقہ کاشت

شالجم کی کاشت کے لئے زمین ہموار کرنے کے بعد بچ چھڑ کر کے ٹریکٹر سے کھیلیاں بنالیں یا 60-75 سینٹی میٹر چوڑی پٹریاں بنائی جائیں اور ان کے دونوں جانب لکڑی سے لکیر لگا کر بچ کیا کیا جائے۔ چونکہ شالجم کا بچ باریک ہوتا ہے۔ اس لئے اگر بچ سے دو گنی مقدار میں مٹی ڈال کر کیا کیا جائے تو آسانی رہتی ہے ورنہ بعد میں چھدرائی پر بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔

آب پاشی

کاشت کے وقت اگر زمین میں نمی موجود ہو تو پہلی آب پاشی بچ کے اگاؤ کے بعد کی

بقیہ: دودھیل جانوروں سے صاف اور صحت بخش دودھ کا حصول

۳۔ ہائیڈروجن پراسائیڈ کا اضافہ

اگر دودھ کو فوری طور پر بچ کرنے کی سہولت میسر نہ ہو تو دودھ میں 0.04-0.05% ہائیڈروجن پراسائیڈ ڈالنے سے دودھ کی زندگی بڑھ جائیگی۔

۴۔ پاستورائزیشن (Pasteurization)

دودھ کو 30 منٹ کیلئے 63 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا جاتا ہے یا 16 سینکڑ کے لئے 75 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور پھر تیزی سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس طرح دودھ

گوہی کی مختلف اقسام کی کاشت

چوہدری محمد ایوب، محمد مزمل جہانگیر، حرافض..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- i - بیج کی قسم
- ii - پودے کاشت کرنے کا وقت
- iii - صحت مند پودے
- iv - بیج کا گاؤ اچھا ہو
- v - کسی مصدقہ ادارے سے بیج کی خرید
- vi - اگیتی نمبر 1 کے لئے ملکی بیج کا استعمال
- vii - پھول گوہی کی کامیاب کاشت کے لئے اپنا بیج خود پیدا کریں تاکہ آپ کو اپنی قسم کے متعلق ضروری باتیں معلوم ہوں

پھول گوہی

تعارف و اہمیت

یہ سردیوں کی ایسی سبزی ہے جسے عوام میں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ غذائی اعتبار سے بھی اہم ترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں حیاتین الف، ج، معدنی نمکیات لوہا، چونکا اور فاسفورس مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اقتصادی لحاظ سے اس کا شمار منافع بخش سبزیوں میں ہونے لگا ہے۔ پھول گوہی کی اگیتی کاشت کافی مقبول ہے۔

موسم اور آب و ہوا

پھول گوہی کے لئے سرد مرطوب آب و ہوا درکار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پھول گوہی کی اگیتی اقسام کے پھول نسبتاً چھوٹے کھلے ہوئے اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ پھول گوہی کی پختیمتی اقسام کے پھول جو کہ سرد موسم (نومبر سے فروری) تک تیار ہوتے ہیں وہ ٹھوس بڑے بڑے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ تاہم بہت زیادہ کھور بھی پھول کی نگت کو متاثر کرتا ہے۔ موسمی لحاظ سے پھول گوہی کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن کی کاشت آخر زمینی سے آخر اکتوبر تک کی جاتی ہے۔ ان اقسام کی پود لگانے اور کھیت میں منتقل کرنے کے اوقات درج ذیل جدول میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ تاہم ان اقسام کی صحیح وقت پر کاشت اور پھر مناسب وقت پر کھیت میں منتقلی اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے بے حد ضروری ہے۔

مثال کے طور پر اگر ہم اگیتی اقسام کو دیر سے کاشت کریں گے تو چھوٹے چھوٹے پودوں پر بھی پھول آجائیں گے جو کہ زیادہ وزن دار نہیں ہوتے اس لئے مصدقہ بیج کی خرید صحیح وقت پر کاشت اور کھیت میں منتقلی اقتصادی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔

نام قسم	زسری لگانا	کھیت میں منتقلی	برداشت	رنگت / سائز
اگیتی فیصل آباد نمبر 1	مئی کا آخری ہفتہ جولائی کا پہلا ہفتہ اگست،	جولائی کا پہلا ہفتہ	آخر اکتوبر	پھول زرد سفید، بڑے اور درمیانے
اگیتی فیصل آباد نمبر 2	ستمبر - اکتوبر	اگست کا دوسرا ہفتہ	نومبر - دسمبر	خوبصورت سفید
چمپا - چینیو لیٹ - سنو ڈرفٹ		ستمبر	دسمبر - جنوری	
سنوبال		نومبر	فروری تا مارچ	

پود کو کھیت میں منتقل کرنا ہو تو صبح کے وقت صبح آپاشی کریں۔ منتقلی ہمیشہ شام کے وقت کریں۔

پھول گوہی کی کامیاب کاشت کے لئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

زمین اور اس کی تیاری

پھول گوہی کی بہتر پیداوار کے لئے زرخیز میرا زمین جو کہ بہتر پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور جس میں مناسب مقدار میں نامیاتی مادہ موجود ہو موزوں ہے۔ چنانچہ کاشت سے ایک ماہ پہلے ہموار کھیت میں 15-20 گڈے گوبر کی گلی سڑی کھاد زمین میں ملا کر آبپاشی کر دیں و تر آنے پر دو تین بار ہل اور سہاگہ چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کریں تاکہ کاشت کے وقت تک جڑی بوٹیاں اگ آئیں۔ بوائی سے پہلے کھیت میں تین بوری سنگل سپر فاسفیٹ، آدھی بوری یوریا ایک بوری امونیم سلفیٹ اور ایک بوری پوٹاش بکھیر کر دو تین بار ہل چلائیں۔

طریقہ کاشت

کھیت میں 75 سینٹی میٹر کے فاصلہ پر پٹریاں بنائیں اور ان پر 30 سینٹی میٹر کے فاصلہ پر گوہی کی پود منتقل کریں یہ طریقہ اگیتی کاشت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اور آب پاشی بعد میں کی جاتی ہے جبکہ درمیانی اور چھیتی کاشت کے لئے کھڑے پانی میں 45 سینٹی میٹر کے فاصلہ پر گوہی کی پود لگائیں۔

پھول کا بننا

سفید اور بڑے گتھے ہوئے پھول حاصل کرنے کے لئے مناسب احتیاط بہت ضروری ہے۔ معمولی کوتاہی اچھے پھول کی خرابی کا باعث ہو سکتی ہے۔ عموماً کم نمی بیج کی خرابی موسم میں یک لخت تبدیلی و پانی کی زیادتی کی وجہ سے فوراً پھول نکل آتے ہیں یا پہلے سے کھلے ہوئے پھول خراب اور بد نما ہو جاتے ہیں۔ جب پھول مکمل طور پر بن جائیں تو ان کو برداشت کر لینا چاہیے بصورت دیگر سفید رنگت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لئے پھول کے اندرونی پتے موڑ کر پھول کے اوپر باندھ دینے چاہئیں۔

طریقہ برداشت

تیار پھولوں والے پودے پتوں کے قریب سے ڈھنسل سے کاٹیں۔ پھول کے ارد گرد تھوڑے سے پتے چھوڑ کر باقی پتے کاٹ دیں تاکہ نقل و حمل کے دوران پھول کے زخمی اور خراب ہونے کے مواقع کم سے کم ہوں۔ 3-4 دن کے وقفے کے بعد پھول کو برداشت کریں۔

شرح بیج

پھول گوہی کیلئے ایک کلو گرام بیج ایک ایکڑ کے لئے کافی ہوتا ہے۔

آبپاشی

اگیتی اقسام کو ہر چار پانچ روز کے وقفہ سے اور درمیانی موسمی اور چھیتی اقسام کو سات دن کے وقفے سے آبپاشی کرتے رہیں۔ پانی ہمیشہ ہلکا لگانا چاہیے اور احتیاط رکھیں کہ پانی دوپہر کے وقت نہ لگائیں۔

گوڈی

گوڈی انتہائی ضروری ہے کیونکہ گھاس اور خوردہ جڑی بوٹیاں فصل کے لئے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ پھول گوہی کے نرم و نازک پودوں کو دھوپ کے مہلک اثر سے بچاتے رہیں۔ گوڈی کرتے وقت پودوں کو مٹی بھی چڑھا دیں۔

کھاد کا استعمال

بوائی پر 3 بوری سنگل سپر فاسفیٹ، 1/2 بوری یوریا اور ایک بوری پوٹاش ڈالیں۔ بعد ازاں کھیت میں بیجی منتقل کرنے کے ایک ماہ بعد 1/2 بوری یوریا یا ایک ایکڑ ڈال کر پودوں کو مٹی چڑھا دیں پھر ایک ماہ بعد دوبارہ ایک بوری یوریا یا دو بوری امونیم سلفیٹ ڈال کر پودوں کو مٹی چڑھا دیں۔

اقسام

اگیتی M-55، درمیانی M.60، چھیتی M-80، M-70، چپا، منوں، سنو ڈرفٹ، سنو بال اور سیالکوٹ وغیرہ

ضرر رساں کیڑے، بیماریاں اور ان کا کنٹرول

تیلہ، گوہی کی تیزی، گوہی کی سنڈی، ڈائمنڈ بیکڈ ماتھ اور میلی بگ کے سلسلے میں لارسیں، ٹیما ران یا سیون وغیرہ کو لیل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اکھڑے اور مرجھاؤ کی بیماری کے خاتمے کے لئے ڈائی تھین ایم۔145 استعمال کریں۔

پیداوار: 6 سے 8 ٹن فی ایکڑ

بند گوہی

تعارف و اہمیت

گوہی کے خاندان میں اہم ترین سبزی بند گوہی ہے۔ یہ غذائی اجزاء کی موجودگی کے لحاظ سے پھول گوہی سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں جیاتین اے، سی، معدنی نمکیات لوہا، چونا، اور فاسفورس وغیرہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی کاشت بڑے شہروں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ عموماً بند گوہی کو پھول گوہی سے کم پسند کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی غذائیت پھول گوہی سے بہتر ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بند گوہی سارا سال مارکیٹ میں موجود رہتی ہے۔

موسم و آب ہوا

بند گوہی کو سرد مرطوب آب و ہوا میں بڑی کامیابی سے کاشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کی کاشت کے لئے زمین کی تیاری کھاد کا استعمال چھدرائی اور نرسری لگانے کا طریقہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ پھول گوہی کی صورت میں اپنایا جاتا ہے۔

گوبر کی کھاد

15-20 ٹن فی ایکڑ کے حساب سے گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈالنے کے بعد اچھی طرح زمین میں ملا دیں۔

کیمیائی کھادیں

بوائی پر 3 بوری سنگل سپر فاسفیٹ، ایک بوری پوٹاش اور آدھی سے ایک بوری یوریا ڈالیں بعد ازاں ایک ایک ماہ کے وقفے سے آدھی بوری یوریا یا ایک ایکڑ ڈالیں۔

شرح بیج

1/2 سے ایک کلو گرام بیج ایک ایکڑ کیلئے کافی ہوتا ہے۔ بیج کو پہلے نرسری میں بویا جاتا ہے اور بعد میں کھیت میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔

وقت کاشت

اگست سے اکتوبر کے دوران بند گوہی کی کاشت کی جاتی ہے جبکہ بیجی کی منتقلی کا وقت ستمبر، اکتوبر ہے۔

وقت برداشت

بند گوہی کو عام طور پر کھیت میں منتقل کرنے کے 90-100 دن بعد برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ایسے پودے جنہوں نے قابل خوردنی (Head) مکمل کر لئے ہوں برداشت کرنے چاہئیں۔ یہ

پتے ٹٹولنے پر سخت اور گیند کی طرح ہوتے ہیں۔
اقسام

اس کی کاشت کیلئے 1/2 کلو گرام بیج کافی ہوتا ہے۔ جس کی پیوری اگائی جاتی ہے۔

پیوری کی کاشت اور منتقلی

میدانی علاقوں میں اس کی پیوری اگست سے اکتوبر کے دوران کاشت کی جاتی ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں پیوری مارچ سے جولائی کے دوران سایہ دار جگہ پر بوئی جاتی ہے۔ زسری بیڈا اچھی طرح تیار کیا گیا ہو جس میں روٹی بھی ملا دیں۔ اس بیڈ پر لائنوں میں کیرایا پھر چھٹے کے ذریعے پیوری کاشت کریں۔ بیج کو کم گہرائی میں لگانے کے بعد احتیاط سے پانی لگا دیں۔ جب پیوری 4-6 ہفتوں کی ہو جائے تو اسے کھیت میں منتقل کریں۔ پیوری عام طور پر صبح سویرے یا شام کے وقت منتقل کریں۔

کاشت کا طریقہ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ

عام طور پر اس سبزی کو کھیلپوں پر یا چھوٹی چھوٹی پٹریوں پر دونوں جانب منتقل کیا جاتا ہے۔ پٹریوں کا درمیانی فاصلہ 45-60 سم اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 25-30 سم رکھا جاتا ہے۔ پودوں کی منتقلی سے پہلے کھیت میں پانی لگانے کے بعد وتر حالت میں پیوری منتقل کر لیں جو بہتر طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر منتقلی کے فوراً بعد پانی لگا دیں۔

آپاشی

پیوری کی منتقلی کے فوراً بعد کھیت کو پانی دیں پھر ایک دو ہفتہ اور اور بعد ازاں پندرہ دنوں کے بعد پانی دیں۔ یاد رہے کہ پھول بننے کے دوران پانی کی کمی نہ آنے دیں۔

گوڈی، صفائی اور مٹی چڑھانا

کھیت کو صاف رکھنے کے لئے 1-2 بار گوڈی کریں تاکہ جڑی بوٹیاں تلف کی جاسکیں۔ گوڈی کرتے وقت پودوں کے تنوں کے ساتھ مٹی بھی چڑھائیں۔

اقسام

گانڈھ گو بھی کی سب سے مقبول اور اہم اقسام ارلی وائیٹ اور ارلی پرپل ہے۔

کیڑے، بیماریاں اور ان کی روک تھام

پھول اور بند گو بھی پر حملہ کرنے والے کیڑے اس سبزی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے کنٹرول کے سلسلے میں رس چوسنے والے کیڑوں کے لئے امیڈا کلو پرڈ، سنڈا فاس یا ایمارن استعمال کریں جبکہ سنڈیوں کے تدارک کے لئے لار سین، کراٹے، ٹریسرو وغیرہ کا استعمال کریں۔

اسی طرح پھول گو بھی اور بند گو بھی پر حملہ آور ہونے والی بیماریاں اس سبزی کے لئے بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کی روک تھام کے سلسلے میں وہی تدابیر اور دوائیں کارگر ہوں گی جو پھول گو بھی اور بند گو بھی کے سلسلے میں تجویز کی گئی ہیں۔

برداشت

میدانی علاقوں میں اس کی فصل دسمبر سے اپریل تک جبکہ پہاڑی علاقوں میں جولائی اگست سے اکتوبر، نومبر میں برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کے تنے کو تیز چاقو کی مدد سے زمین کے اوپر سے پتوں کے ساتھ کاٹ لینے کے بعد اس کے پتے کاٹ کر درمیانی گیند نما گول سخت سا قابل استعمال حصہ الگ کر لیا جاتا ہے جسے ٹوکریوں میں ڈال کر منڈی تک پہنچایا جاتا ہے۔

پیداوار: 5-7 ٹن فی ایکڑ

گولڈن ایکڑ کو بین یگن، مارکیٹ رلی، ویک فیلڈ مشہور اقسام ہیں۔ چونکہ ان اقسام کا بیج یہاں نہیں بنتا اس لئے غیر ملکی بیج ہی لگانا پڑتا ہے۔

پیداوار: 6 سے 8 ٹن فی ایکڑ

اہم بیماریاں، کیڑے اور ان کا تدارک

☆ اس کی اہم بیماریوں میں اکھیر اسے پودے ابتدائی دنوں میں جڑوں کے گلے سڑنے سے مر جاتے ہیں۔ بونے سے پہلے وائٹ ویکس یا بنیلٹ یا ڈائی تھین ایم۔ 145 استعمال کریں۔

☆ مرجھاؤ کے خاتمہ کے لئے ڈائی تھین ایم۔ 145 استعمال کریں۔

☆ گو بھی کی سنڈی کے خاتمے کے لئے سیون استعمال کریں۔ اسی طرح میلی بک کوٹیماران اور لار سین استعمال کر کے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

گانڈ گو بھی

تعارف و اہمیت

اسے عرف عام میں گانڈھ گو بھی یا گنڈھ گو بھی اور انگریزی میں Kohl یا Knol Khol کہا جاتا ہے جبکہ اس کی فیملی کا نام Cruciferae ہے جو گو بھی خاندان کے نام سے مشہور ہے یعنی اس فیملی کے بقیہ ممبران میں پھول گو بھی، بند گو بھی، شام جو اور مولی قابل ذکر ہیں۔ گانڈھ گو بھی کا تعلق یا آغاز مغربی یورپ سے بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری کھلی سبزی ہے یعنی پہلے اس کے پتے جڑیں، شانیں وغیرہ بنتی ہیں اور دوسرے مرحلے میں پھول، پھلیاں اور بیج بننے ہیں۔ گانڈھ گو بھی خاصی مزید اور لذیذ سبزی ہے جو غذائیت سے بھرپور ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مقبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت محدود پیمانے پر بڑے شہروں کے گرد و نواح میں کاشت ہوتی ہے۔ اس سبزی سے ہمیں پروٹین، کیلشیم اور وٹامن اے اور سی میسر آتے ہیں۔

آب و ہوا

بند گو بھی اور پھول گو بھی کی مانند یہ سبزی سرد مروط آب و ہوا میں کامیابی سے اگائی جاسکتی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ موسم سرما میں کاشت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گرم موسم ہو جانے کی بدولت اس کے قابل استعمال حصے کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

زمین اور اس کی تیاری

دو تین بار زمین میں ہل چلانے کے بعد سہاگہ دیگر زمین کو اچھی طرح تیار کیا جائے اور اس دوران گوبر کی کھاد بھی اچھی طرح مکس کر دیں۔ اچھی فصل کیلئے زرخیز میرا زمین جس کا نکاس اچھا ہو اس سبزی کے لئے بہتر تصور کی جاتی ہے۔

گوبر کی کھاد اور کیمیائی کھادیں

زمین کی تیاری کے دوران گلی سڑی گوبر کی کھاد 15-10 ٹن فی ایکڑ کے حساب سے زمین میں ملا دیں۔ اس کے علاوہ بوئی پر ایک بوری پوناش ایک سے دو بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور آدھی سے ایک بوری پوریانی ایکڑ کے حساب سے ڈالیں۔ بعد ازاں کاشت کے ایک ماہ بعد ایک بوری پوری یا مٹی چڑھاتے وقت ضرور ڈالیں۔

آڑو کی کاشت

محمد سعید، چوہدری محمد ایوب، راشد وسیم خاں، ثاقب ایوب..... فیکٹی آف ایگریکلچر، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تہیں جمادی جاتی ہیں اس پر پھر ریت کی 10 سم تہہ بچادی جاتی ہے اور اس کے اوپر آڑو کی دو تہیں حتیٰ کہ بکس بھر جائے ان کو گاہے گاہے پانی دیتے رہنا چاہیے۔ جنوری میں ان کو نکال لینا چاہیے اور جو گھٹلیاں پھوٹ آئیں یا ترخ گئی ہوں ان کو نکال کر 15 سم کے فاصلے پر قطاروں میں لگائیں اور قطاروں کا فاصلہ 60 سم رکھیں۔ اچھی حالت میں چھ ماہ بعد سٹاک پیوند کے لئے تیار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کافی عرصے کے لئے زمین اور اس کی نگہداشت پر خرچ بچ جاتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ جولائی/اگست میں مطلوبہ قسم کی لکڑی سے چھلا اتار کر چڑھا دیا جاتا ہے جو پودے بذریعہ چھلا اور چشمہ کامیاب نہ ہوں دسمبر/جنوری میں اسی سٹاک پر بذریعہ چھلا انما یا زبان نما پیوند کیا جاتا ہے۔ پیوند کے تقریباً ایک سال بعد پودے باغ میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

باغ لگانا

آڑو کے پودے لگانے کا موزوں وقت اوائل بہار ہے اور یہ عمل پودوں کے چشمے پونے سے پہلے سرانجام دینا چاہیے۔ موسم کے مطابق پودے جنوری سے مارچ تک لگائے جاسکتے ہیں۔ آڑو کے پودے باغ میں لگانے سے پہلے ان کی جڑوں کو ہلکا ہلکا تراش لیا جائے اور ان کے سر قلم کر دینے چاہیں تاکہ پودوں کا غذائی توازن برقرار رہے۔ پودوں کو داغ تیل کے مربع طریقے کے مطابق 8 میٹر کے فاصلے پر لگایا جائے۔ زمین کی قسم اور روٹ سٹاک کے مطابق قطاروں کا درمیانی فاصلہ کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

شاخ تراشی

باغ کی نگہداشت کے سلسلے میں شاخ تراشی کی بڑی اہمیت ہے چونکہ اس سے باغ کی خوبصورتی، عمر اور پھل کی پیداوار کا براہ راست تعلق ہے اگر پودے کی صحیح طور پر شاخ تراشی کی جائے تو کمزور پودوں کی بھی صحت اور ان کی شکل کو بڑی حد تک ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ شاخ تراشی کا کام پودے کی باغ میں منتقلی سے لے کر باغ ختم ہونے تک جاری رہتا ہے اور ہر سال شاخ تراشی ضروری ہے۔ آڑو کے درختوں کی شکل کھلے مرکز میں ترتیب دی جاتی ہے۔ کھلے مرکزی شکل کے درختوں کو سورج کی روشنی اچھی طرح پہنچتی ہے پھل اتارنے میں سہولت رہتی ہے۔ پھل بھی اچھی جسامت کے اور خوش رنگ ہوتے ہیں اور پودوں کو کیڑوں اور بیماریوں کے حملے کے خلاف زہر پاشی کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ باغ میں پودے لگانے کے بعد ان کے سروں کو 75 سم کی بلندی پر سے کاٹ دیا جاتا ہے اور رسیدگی شاخ پر 3 سے 4 صحت مند چشمے باقی رہ جاتے ہیں انہی چشموں میں سے آنے والے سالوں میں پودے کی بنیادی شاخیں نکلتی ہیں اور پہلے سال میں شاخیں ترتیب پاتی ہیں۔ یہ شاخیں تنے کے چاروں طرف برابر فاصلوں پر چھوڑی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نئی شاخ سطح زمین سے کم از کم 22 سم اور باقی ایک دوسرے سے تقریباً 15 سم کے فاصلے پر ترتیب دینی چاہیں۔ ان شاخوں سے نکلنے والی بغلی شاخوں کی نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ ہر شاخ کو تنے کے جوڑے سے 10 سے 15 سم تک کے فاصلے پر قلم کر دیا جائے تاکہ باغ میں درخت یکساں شکل میں نشوونما پائیں۔ اگر تنے پر مناسب شاخیں نہ ہوں تو متذکرہ بالا شاخوں کا انتخاب دوسرے سال پر چھوڑ دیا جائے۔

آڑو پت جھاڑ پودوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا پھل لذت شربی اور خوشبو کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آڑو میں شکر، لحمیاتی مادہ اور اہم معدنی اجزاء مثلاً لوہا، فاسفورس اور چونا وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں وٹامن اے، بی، سی بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے پھولوں کو کالی کھانسی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اطباء اس کے پھولوں کو بطور کرم کش دوا استعمال کرتے ہیں اس کے بیج سے جو تیل نکلتا ہے اس سے بالوں کی زیبائش میں مدد لی جاتی ہے اور اسے بطور خوراک بھی کام میں لایا جاتا ہے۔

زمین اور آب و ہوا

آڑو کے لئے طویل موسم سرما اشد ضروری ہے جہاں ایسے حالات نہیں وہاں اس کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں آڑو کے درخت تو خوب نشوونما پاتے ہیں مگر ان کو پھل نہیں لگتا۔ پاکستان میں بلوچستان کے پہاڑی علاقہ، پشاور، مالاکنڈ اور وزیرستان میں اس کی کاشت ہوتی ہے۔ مری کی پہاڑیاں بھی اس کے لئے موزوں ہیں۔ وادی پشاور میں مردان اور ضلع پشاور کا آڑو بہت اچھا تقو رکھا جاتا ہے۔

افزائش نسل

آڑو کی افزائش نسل بیج سے ذریعہ موزوں نہیں کیونکہ بیج سے حاصل کردہ درختوں میں یکسانیت نہیں ہوتی لہذا آڑو کی افزائش نسل نباتاتی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پیوند اور چشمہ لگانے کا عمل کسی موزوں روٹ سٹاک پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے حاصل شدہ درختوں میں پھل کی یکسانیت قائم رہتی ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ زرد دلی آڑو کا روٹ سٹاک پشاور رینجن کے لئے اور کوئٹہ کے علاقوں کے لئے اور کوئٹہ کے علاقوں کے لئے کڑوے بادام کا روٹ سٹاک موزوں ثابت ہوئے ہیں۔ آڑو کے لئے روٹ سٹاک کا انحصار زمین کی قسم پر ہے ریٹلی زمینوں کے لئے بادام، میرا زمینوں کے لئے زرد دلی آڑو وچکنی میرا زمین کے لئے خوبانی اور بھاری زمینوں جہاں زیادہ نمی رہتی ہے کے لئے آلوچہ کا روٹ سٹاک موزوں ہے۔ مگر مقامی حالات کے تجربے کے مطابق روٹ سٹاک کا انتخاب کرنا چاہیے۔

روٹ سٹاک تیار کرنا

روٹ سٹاک حاصل کرنے کے لئے گھٹلیوں کو نومبر/دسمبر میں تیار شدہ زمین میں 60 سے 90 سم چوڑی قطاروں کی صورت میں 8 سے 10 سم کے فاصلے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ دواڑھائی مہینے تک آڑو کی گھٹلیاں پھوٹ پڑتی ہیں اور مارچ میں تقریباً سارے پودے نکل آتے ہیں۔ پودوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے تو نومبر/دسمبر میں کاشت کی گئی آڑو کی گھٹلیوں سے جولائی/اگست میں پودے چشم کاری کے قابل ہو جاتے ہیں۔

عمل تہ سازی (Stratification)

گھٹلیوں کو کھیت میں براہ راست لگانے کی بجائے ان کو ایک بکس میں تہ بہ تہ اس طرح رکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ریت کی 10 سم تہ بچادی جاتی ہے اور اس کے اوپر آڑو کی گھٹلیوں کی دو

دوسرے سال کی شاخ تراشی

پہلے سال شاخ تراشی کے ذریعے ترتیب شدہ شاخیں اگر غلط وضع قطع میں بڑھ رہی ہوں تو ان کی اصلاح کے لئے شاخ تراشی کریں تاکہ صرف صحیح اور منتخب شاخیں تنے پر نشوونما پائیں۔ اس طرح شاخ تراشی کھلے مرکزی شکل میں دوسرے سال بھی جاری رہتی ہے۔

تیسرے سال کی شاخ تراشی

پچھلے دو سال میں اگر شاخ تراشی میں غلطی ہوگئی ہو تو تیسرے سال سے اٹھیک کر دیا جاتا ہے اور اگر تنے پر شاخوں کے مانعہ رہ گئے ہوں تو انہیں حسب منشا ترتیب دیا جاتا ہے علاوہ ازیں درخت کی راسی شاخوں کو مناسب لمبائی میں قلم کر کے درخت کی بلندی یکساں حالات میں قائم رکھی جاتی ہے۔

پنچہ عمر کے درختوں کی شاخ تراشی

آڑو کے درخت تین چار سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھل صرف یکساں شاخوں پر لگتا ہے جو دو تین سال پرانی شاخوں پر چھوڑی جاتی ہیں۔ کمزور اور ناکارہ شاخوں کو کاٹ کر بالکل ختم کر دیا جاتا ہے صحت مند اور توانا شاخوں کی ہلکی ہلکی شاخ تراشی ضروری ہے۔ اگر شاخ تراشی بالکل نہ کی جائے تو شاخوں کی نباتاتی بھڑکتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے اگرچہ پھل کی پیداوار تو زیادہ ہوتی ہے مگر حاصل ہونے والا پھل گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔ ایسے درخت جن کی شاخ تراشی نہ کی گئی ہو عمر میں کم اور صحت میں کمزور ہوتے ہیں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ نو عمر آڑو کے درختوں کی ہلکی شاخ تراشی فائدہ مند ہے لیکن جوں جوں درخت کی عمر بڑھتی جائے تو شاخ تراشی نسبتاً زیادہ کرنی چاہیے۔

کھاد اور پانی

کھاد اور پانی پھل کی پیداوار باغ کی عمر اور درختوں کے پھیلاؤ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ نائٹروجنی کھاد درخت کی نباتاتی نشوونما بڑھاتی ہے۔ آڑو کو نائٹروجن اور غیر نائٹروجنی دونوں کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گو بر کی کھاد پھول آنے سے دو ماہ پہلے دی جاتی ہے کیسائی کھاد کی آدھی مقدار پھل آنے سے دس پندرہ دن قبل اور باقی مقدار اس وقت ڈالی جاتی ہے جب پھل کا سائز بادام کے برابر ہو جائے کھاد کو اچھی طرح زمین میں ملا کر آبپاشی کر دی جاتی ہے۔

آڑو کے پودوں کو دیئے گئے گوشوارے کے مطابق کھاد دینی چاہیے۔

پودے کی عمر (سال)	گو بر کی کھاد (کلوگرام)	امونیم سلفیٹ (کلوگرام)	سنگل سپر فاسفیٹ (کلوگرام)	پوٹاشیم سلفیٹ (کلوگرام)
3-1	5	0.25	-	-
5-4	20-10	1.5-0.75	1-0.5	50
6 سے زائد	40-20	3-2	2-1.5	1

پھل کی چھدرائی اور چٹائی

پھلوں کی تعداد اور صحت کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے تاکہ پھل کا سائز اور رنگ مناسب ہوں۔ اگر پھلوں کی چھدرائی نہ کی جائے تو پھل کی جسامت یکساں طور پر قائم نہیں رہتی۔ زرعی تحقیقاتی ادارہ (پشاور) میں تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ آڑو کی قسم 4-ایف پر ایک ہزار سے زیادہ پھل نہ چھوڑے جائیں اور شمر آڑو شاخوں پر انکی ترتیب 10 سے 15 سم کے فاصلے پر ہونی چاہیے۔ پھل کی چٹائی مناسب حالت میں کرنی چاہیے۔ پھل ایسی حالت میں چنے جائیں کہ منڈی پہنچ کر صحیح پختہ حالت میں ہو جائیں اگر پھل کو لمبی مسافت طے کرنا ہو تو اسی حالت میں چنے جائیں کہ اس کا سبز رنگ زردی مائل یا لیموں کے رنگ کی مانند ہونا شروع ہو جائے۔ ڈبل میں محفوظ کرنے کے

لئے اور سرد خانوں میں رکھنے کے لئے آڑو کو تقریباً دو تہائی پختگی کی حالت میں توڑنا چاہیے۔

آڑو کی اقسام

آڑو کی اہم اقسام درج ذیل ہیں۔

اگیتی اقسام

☆ رابن: اس کا رنگ ہلکا سرخ، جسامت درمیانی، راس نوکدار، گودا سفید سبزی مائل، گھٹلی سفید، ذائقہ درمیانے درجے کا، خوشگوار اور مٹھاس اچھی ہوتی ہے۔ اس کا پھل مئی کے دوسرے ہفتے میں پک کر تیار ہو جاتا ہے۔

☆ ریڈ فرنج: اس کا پھل قدے بے قاعدہ شکل نوکدار ہوتی ہے۔ نچلا حصہ گڑھے دار، پھل کا رنگ سرخی مائل، گودا سفید خوشبودار اور رسدار ہوتا ہے۔ گھٹلیاں گودے سے آزاد ہوتی ہیں۔ مئی کے آخر میں پکتا ہے۔

گھٹتی اقسام

☆ 4-ایف: یہ آڑو کی اقسام میں بہترین اور مشہور ترین ہے۔ پھل گول، پیندا پھیلا ہوا، راس نوکدار، رنگ ہلکا زردی مائل، گودا مضبوط خوش رنگ، رسدار اور ذائقہ خوشبودار ہوتا ہے۔ جولائی کے دوسرے ہفتے میں پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے۔

☆ اریٹا: اس کا پھل قدرے گول ہوتا ہے۔ گودا زرد، پھل پیندے کے نزدیک سرخ، رسدار اور میٹھا ہوتا ہے۔

ضرر رساں کیڑے

1- پھل میں سوراخ کرنے والی مکھی

یہ سبز رنگ کی مکھی ہوتی ہے جس کا سریا ہوتا ہے مسکھسی پھلوں پر ماہ جون اور جولائی میں اٹھ دیتی ہے۔ جن سے کرم نکل کر پھل میں گھس جاتے ہیں۔ پھل خراب ہو کر کپنے سے پہلے گر جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لئے حملہ شدہ پھلوں کو اکٹھا کر کے گڑھے میں دبا دیا جائے۔ دیپٹرکس یا میلا تھیان کا سپرے کرنا چاہیے۔

2- تنے اور شاخوں میں سوراخ کرنے والا کیڑا

یہ ایک نہایت نقصان دہ کیڑا ہے اس کی سنڈیا تینوں اور شاخوں کے اندر سرنگ بناتی ہیں۔ جس سے گوند جیسے مادے کا اخراج عمل میں آتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں متاثرہ درخت کمزور ہو کر خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لئے تھائیوڈان کا سپرے بہت حد تک مفید ہے۔

بیماریاں

1- سکیب

یہ بہت ہی تباہ کن بیماری ہے۔ پتے اور پھل داغ دار اور بدنما ہو جاتے ہیں۔ پھلوں کی نشوونما رک جاتی ہے۔ متاثرہ پھل بد ذائقہ ہو جاتے ہیں۔ گندھک اور چونے کے مرکب کے چھڑکاؤ سے تدارک ہو جاتا ہے۔

2- پاؤڈری ملڈیو

یہ سفید سفوف والی بیماری ہے جو آڑو کے پتوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ متاثرہ پتے اپنا سبز رنگ کھو دیتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں۔ حملہ شدہ ہونے کی صورت میں پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھل جسامت میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تدارک کے لئے میٹالیکسل + منکوزیب کا سپرے کریں یا بورو ڈیکسپر 50:4:4 کے چھڑکاؤ سے اس پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ یا کسی مناسب دوائی کا سپرے کریں۔

پلجی کی کاشت

راشد وسیم خاں، چوہدری محمد ایوب، محمد سعید، ناہید اختر..... فیکلٹی آف ایگریکلچر، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہے۔ چار پانچ ماہ بعد اس شاخ کے گملے میں دبی ہوئی جگہ سے جڑیں نکل آتیں ہیں داب سے پیچھے 5، 6 سم جگہ چھوڑ کر شاخ کو کاٹ دیا جاتا ہے گملوں کو سایہ دار مرطوب جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ داب کا یہ عمل دو موسموں یعنی بہار (فروری/مارچ) اور برسات (جولائی/اگست) میں کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر 5 جون سے 5 جولائی تک کامیابی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر شاخیں زمین کے قریب ہوں تو ٹہنیوں سے چھلنا مٹا طریقے سے چھلکا اتار کر زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور زمین کو باقاعدہ مندار رکھا جاتا ہے تاکہ جڑیں با آسانی نکل سکیں۔ چار پانچ ماہ بعد داب سے پیچھے 5، 6 سم جگہ چھوڑ کر شاخ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔

پودے لگانا

پلجی کے پودے فروری/مارچ یا ستمبر/اکتوبر میں لگائے جاتے ہیں پودوں کا درمیانی فاصلہ 8 سے 10 میٹر رکھا جاتا ہے پودے لگانے کے لئے میٹر سائز کے گڑھے کھود کر ان کو بھل، گڑھے کی اوپر کی 30 سم سطح کی مٹی اور گلی سڑی کھاد ملا کر بھردینا چاہیے۔ پودے لگانے کے فوراً بعد آبپاشی کر دینی چاہیے۔

آب پاشی

پلجی کے پودے کو عام طور پر موسم بہار میں کھیت میں منتقل کیا جاتا ہے اس دوران ہفتے میں دو مرتبہ ہلکا پانی لگانا چاہیے۔ یہ عمل تقریباً ایک ماہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد ہر ہفتے پانی دیتے رہنے سے پودوں کے مرنے کا احتمال بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ پلجی کے جوان پودوں کو نسبتاً زیادہ پانی درکار ہوتا ہے مگر پانی کا کھڑا رہنا ہرگز مناسب نہیں۔ بہر حال زمین کو کبھی خشک نہیں ہونا چاہیے خصوصاً جب پودا تیزی سے بڑھوتری کر رہا ہو۔ مگر پانی میں نمکیات کی کثرت مہلک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ پلجی نمکیات کے خلاف بہت کم برداشت رکھتی ہے۔

کھاد ڈالنا

پلجی کے پودوں کی بہتر نشوونما اور اچھی پیداوار کے لئے کھاد کا ایک بہتر پروگرام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا پروگرام عموماً زمینی حالت کے پیش نظر ہی بنایا جاسکتا ہے اور وہی زیادہ کارگر ہو گا۔ مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ باغ میں لگائے گئے چھوٹے پودے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اس لئے ان کی مناسب بڑھوتری کے لئے گوبر کی گلی سڑی کھاد زیادہ مقدار میں مہیا کرنی چاہیے۔ تین سال بعد جب ایک صحت مند پودا پھول نکال لیتا ہے اس دوران کھاد کی مقدار زیادہ کر دینی چاہیے اور کیمیائی کھادیں خصوصاً نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم مناسب تناسب اور مقدار میں گوبر کی کھاد کے ساتھ ڈالنی چاہئیں۔ پلجی کا پودا تقریباً تین سے پانچ سال کی عمر کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اور پیداوار کی مقدار کی مناسبت سے کھاد کی مقدار بڑھائی جاتی ہے عام طور پر ایک جوان پودے کو دسمبر میں 100 کلوگرام گلی سڑی گوبر کی کھاد کے علاوہ 15 کلوگرام پوریا، 3 کلوگرام سپر فاسفیٹ اور 1 کلوگرام پوٹاشیم سلفیٹ ڈالنی چاہیے۔ نائٹروجن کی کھاد کا نصف حصہ فاسفورس اور پوٹاش کی پوری مقدار کے ساتھ پھول آنے سے 2 ہفتے پہلے اور نائٹروجن کی کھاد کا باقی حصہ پھل بننے کے دو ہفتے بعد دینا چاہیے۔ کھاد ڈالنے کے فوراً بعد پانی لگا دینا چاہیے۔

پلجی ایک لذیذ پھل ہے۔ اس کا اصل وطن جنوبی چین ہے جہاں یہ آج سے دو ہزار سال قبل بھی کاشت کی جاتی تھی۔ اس کا درخت گھٹا، زمین کی طرف جھکا ہوا اور گہرا سبز ہوتا ہے جس کی اونچائی عام طور پر 5 سے 7 میٹر ہوتی ہے مگر بعض موزوں علاقوں میں 13 میٹر تک بھی ہو سکتی ہے۔ پھل سے لدا ہوا درخت بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جس میں گلابی اور سرخ رنگ کے پھلوں کے بڑے بڑے گچھے لٹکے ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں جب اس پر زردی مائل سفید پھول نکلتے ہیں تو وہ بھی ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اس کا پھل ایک باریک مگر سخت اور جلدی پھٹ جانے والا خول میں بند ہوتا ہے۔ کھانے والا حصہ عموماً سفید جیلی نما خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے۔

آب دہوا

پلجی ان علاقوں میں با آسانی لگائی جاسکتی ہے۔ جہاں سردیوں اور گرمیوں کے درجہ حرارت میں ایک واضح فرق ہو۔ گرم مرطوب آب و ہوا پھول کے کھلنے اور پھل کی بڑھوتری کے لئے نہایت موزوں ہے۔ سردیوں میں کچھ دیر درجہ حرارت 4 سے 5 درجہ سینٹی گریڈ ضروری ہے۔ اس سے اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے اور پھول بننے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں بارشیں خصوصاً اس کے لئے مفید ہیں۔ پلجی کا درخت زیادہ خشک گرمی اور سخت سردی قطعاً پسند نہیں کرتا۔ مگر بڑے درخت کم عمر پودوں کی نسبت سخت موسم متاثر ہوتا ہے بہتر طور پر برداشت کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دریائے راوی اور ستلج کے ارد گرد کے علاقے جن میں لاہور، شیخوپورہ اور قصور کے اضلاع شامل ہیں۔ پلجی کی کاشت کے لئے موزوں ہیں۔ دریائوں کے آس پاس کئی دیگر علاقوں میں بھی پلجی کے باغات کامیابی سے لگائے جاسکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ملتان میں آم کے باغات کے اندر بھی پلجی کے درخت کامیابی سے پھل دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ پلجی کا پودا آم کے درخت کے سائے میں نہیں ہونا چاہیے اور ان کو ہر حال میں خوب دھوپ لگنی چاہیے۔

زمین

یہ درخت مختلف قسم کی زمینوں میں بڑی کامیابی سے لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم ایسی زمین جو گہری اور میرا قسم کی ہو اور جس میں نمی قائم رکھنے کی قوت بھی موجود ہو پلجی کے لئے نہایت ہی موزوں قرار دی جاتی ہے۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لئے ایسی زمین کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں نباتاتی مادے کی مقدار وافر ہو۔ تھوڑا سا زمین میں پلجی کی تجارتی پیمانے کا کاشت سودمند نہیں ہوتی۔

افزائش

پلجی کی افزائش عام طور پر بذریعہ بیج یا ہوائی داب کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن اس میں وقت اور خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ چین میں اس کی افزائش نسل بذریعہ بغل گیر پیوند ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کی افزائش نسل بذریعہ ہوائی داب کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں پختہ اور تقریباً پھل جتنی موٹی شاخیں منتخب کی جاتی ہے۔ پتے کے قریب سے دو سو چوڑا چھلکا چھلنے کی شکل میں اُتار دیا جاتا ہے اور اس شاخ کو مخصوص گملے جس میں بھل اور پتوں کی گلی سڑی کھاد بھری ہوئی ہو، میں تار کے ذریعے گملے کے دونوں سروں پر باندھ دیا جاتا ہے۔ ان گملوں کو روزانہ دو دفعہ پانی دیا جاتا

جامن کی نگہداشت

محمد سعید، چوہدری محمد ایوب، ثاقب ایوب..... شعبہ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جامن ایک بلند قامت سدا بہار پھلدار درخت ہے۔ اس کا پھل جامنی رنگ کا اور پھل کا گودا نرم ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جامن برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے پایا گیا اور پھر دنیا کے دیگر ملک مثلاً جنوبی فلوریڈا، جنوبی کالیفرنیا، الجزائر، انڈونیشیا، فلپائن تھائی لینڈ اور برما وغیرہ میں پہنچا۔ جامن کا پھل غذائی اور طبی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اطباء اسے زیاہٹس میں مفید گردانتے ہیں۔ علاوہ ازیں جامن کے پھل سے سرکہ شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ جو کہ جسم کی گرمی اور ہاضمے کے لئے مفید بتایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جامن کے درخت عام طور پر سڑک کے کناروں یا کھیتوں کے ارد گرد لگائے جاتے ہیں یا پھر باغات کے گرد ہوا توڑ باڑوں کے طور پر لگائے جاتے ہیں۔

آب و ہوا

جامن کی کامیاب کاشت کے لئے نیم گرم اور مرطوب آب و ہوا بہت موزوں تصور کی جاتی ہے۔ پھولوں کے موسم میں بارشوں کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے عمل زیرگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ چھوٹے پودوں پر کھر برا اثر ڈالتی ہے۔ پھل پکنے کے وقت خشک سالی جامن کی پیداوار کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔

زمین

جامن کو مختلف قسم کی زمینوں میں لگایا جاسکتا ہے لیکن ریستلی، سخت تہ والی اور سیم زدہ زمین اس کی کاشت کے لئے غیر موزوں ہے۔ اچھی بڑھواری اور پیداوار کے لئے گہری اور اچھے نکاس والی بھاری میر زمین زیادہ موزوں ہے۔

افزائش

جامن کی افزائش بذریعہ بیج اور نباتاتی طریقے سے کی جاسکتی ہے۔ تخی پودے صحیح النسل نہیں ہوتے ان کو روٹ شک کے طور پر استعمال کر کے اچھی نسل کے پودے بذریعہ چشمہ یا بغل گیر پیوند تیار کیے جاتے ہیں روٹ شک تیار کرنے کے لئے بیج کو جولائی/اگست میں 22 سے 30 سم فاصلے کی چڑیوں پر 15 سم فاصلے پر لگا کر پانی دے دیں۔ بیج دو تین ہفتوں میں اگ آتے ہیں۔ سردیوں میں چھوٹے پودوں کو کھر سے بچائیں۔ اس مقصد کے لئے سرکٹے وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے یا نرسری میں مناسب فاصلہ پر جنبت کے پودے لگائے جاسکتے ہیں۔ تیار شدہ شک کو فروری/مارچ یا جولائی/اگست میں گملوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ دس پندرہ روز کے بعد ان گملوں کو اعلیٰ اقسام کے پودے کے ساتھ بغل گیر طریقے سے پیوند کر دیا جاتا ہے۔

پودوں کا درمیانی فاصلہ

پودے دونوں موسموں یعنی خزاں اور بہار میں لگائے جاسکتے ہیں۔ باغ لگانے کی صورت میں 12 سے 14 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ ہوا توڑ باڑ لگانے کی صورت میں ان کو 5 سے 7 میٹر کے فاصلے پر لگائیں منتقلی کے وقت پودے کی عمر کم از کم دو سال ہو۔ گاجی نکالتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جڑیں کم سے کم کشیں۔ جڑوں اور پتوں کا تناسب برقرار رکھنے کے لئے پودوں کو چوٹی س تھوڑا سا

کاٹ دینا چاہیے پودے شام کے وقت باغ میں منتقل کریں اور منتقلی کے فوراً بعد پانی لگادیں۔ آب پاشی شروع شروع میں ہفتہ میں ایک بار پانی لگائیں جب پودا جڑ پکڑ لے تو دو ہفتوں کے بعد اور دخت بن جانے پر موسم سرما میں ایک بار پانی کافی ہوتا ہے البتہ موسم گرما میں دو ہفتے بعد پانی دیں۔ پھل پکنے کے دوران آب پاشی کرنے سے پھل بڑا اور ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔

کھاد

پودا لگانے کے بعد عام طور پر کھاد نہیں ڈالی جاتی لیکن اگر ہر سال جنوری/فروری میں گو بر کی گلی سڑی کھاد ایک سے چار سال کی عمر کے پودوں کو بشرح 10 تا 25 کلو گرام، 4 سے 8 سال کی عمر تک 30 تا 40 کلو گرام اور اس کے بعد 60 سے 80 کلو گرام فی درخت دی جائے تو پودے کی بڑھوتری خوب ہوگی اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔

گوڈی

باغ کی صورت میں سال میں تین چار مرتبہ گوڈی کرنے سے پودے خوب نشوونما پاتے ہیں اور پھل کی خاصیت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ہوا توڑ باڑ کے طور پر لگائے گئے جامن کے درختوں کی بھی گوڈی کرنی چاہیے تاکہ سخت مٹی نرم ہو جائے، پانی زیادہ جذب ہو سکے اور جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جائیں۔

شاخ تراشی

جامن کے چھوٹے اور بڑے پودوں کی شاخ تراشی بہت کم کی جاتی ہے پودے کی ابتدائی زندگی میں کاٹ چھانٹ ان کی شکل اچھی اور ڈھانچہ مضبوط بنانے کے لئے کی جاتی ہے۔ زمین سے 1.5 میٹر تک ایک ہی شاخ رکھنی چاہیے۔ ہوا توڑ باڑ کے لئے پودے کی شاخ تراشی نہ کریں لیکن اگر زیادہ اونچائی والے پودوں کی ضرورت نہ ہو تو ہر سال فروری/مارچ میں شاخوں کو اوپر سے کاٹنا چاہیے۔ درختوں سے بیمار اور خشک شاخیں کاٹ دینی چاہیے۔ موسم برسات میں جامن کی بڑی بڑی شاخیں از خود یا اندھیوں سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ درخت کو صحیح حالت میں لانے کے لئے ان ٹوٹی پھوٹی شاخوں کی ضرورت شاخ تراشی کریں۔

پھل کی برداشت

جامن کو عام طور پر مارچ/اپریل میں پھول آتے ہیں۔ اس کا پھول مکمل ہوتا ہے۔ عمل زیرگی اکثر کیڑے مکوڑوں سے ہوتا ہے۔ پھل گچھوں میں لگتا ہے اور ہر گچھے میں تقریباً دس پندرہ پھل لگتے ہیں۔ پھل جولائی/اگست میں پک جاتا ہے۔ پھل نازک ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے اتارا جاتا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ اس مقصد کے لئے بانس کی سیڑھیاں درخت کے باہر کی طرف لگائی جاتی ہیں۔ پکا ہوا پھل ہاتھوں سے توڑ کر کپڑے کے تھیلوں میں ڈال کر اتار لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹوکروں میں ڈال کر قریبی منڈی میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہوا توڑ باڑوں کے طور پر لگانے کی وجہ سے درختوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی اس لئے پیداوار 80 سے 120 کلو گرام فی درخت سے زیادہ حاصل نہیں ہوتی۔ (باقی صفحہ 15 پر)

نباتات القرآن: انار

اعجاز احمد صدیقی، مدیر سہ ماہی سوسٹی دھرتی، لاہور

Hanging Garedn of Babylon کی بابت جو تاریخی شہادتیں دستیاب ہوئی

ہیں ان کی رو سے علم ہوا ہے کہ اس حسین باغ میں جا بجا انار کے درخت ایک پر فریب منظر پیش کرتے تھے۔

آج کل انار کی اچھی قسمیں ترکی، ایران، پاکستان، افغانستان، شام، مراکش اور اسپین میں پیدا کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں انار کی انمول قسم بے دانہ اپنی مثال آپ ہے اس قسم کی خوبی یہ ہے کہ اس انار کے بیج اتنے نرم ہوتے ہیں کہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس اعتبار سے اس کے بے دانہ یعنی بغیر دانہ والا انار کہتے ہیں۔ اس کی پیداوار پاکستان میں جنوبی پنجاب مظفر گڑھ کے ضلع میں ہوتی ہے۔ ہندوستان میں پونا اور شولا پور کا انار اپنے مزہ کے لئے مشہور ہے ترکی میں شادی بیاہ کی تقریبات میں مہمانوں کی خاطر ایتھے انار سے کی جاتی ہے۔ وہاں ایک دلچسپ رسم یہ بھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد دلہن سے پکے ہوئے انار کو فرش پر بیٹھنے کے لئے کہا جاتا ہے اور انار کے پھٹنے سے جتنے دانے زمین میں بکھر جاتے ہیں اتنی ہی اولادیں نئے جوڑے کے ہونے کی پیشین گوئی کی جاتی ہے، وہاں یہ ایک خوبصورت رسم ہے نہ کہ توہم پرستی۔

انار ایک حیرت انگیز اور نایاب پودا ہے۔ پھل سمیت اس کے ہر حصے کے طبی فوائد مسلم ہیں۔ اس کا پھل غذائیت سے بھرپور ہے۔ اسی لئے کچھ لوگ انار کے دانوں کو طبی غذا یا طبی (شیر) پھل بھی کہتے ہیں۔ اس میں بڑی مقدار میں شکر (کلوکوز، فیکٹوز) کے علاوہ مختلف حیاتیاتین موجود ہیں۔ خاص طور سے Thiamine اور Riboflavin وٹامن 'سی' یعنی Ascorbic acid بھی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ فاسفورس، سوڈیم، کلسیم، سلفر Oxalic acid اور Carotene کا انار ایک اچھا ذریعہ مانا جاتا ہے۔

انار کے دانوں کا رس ایک ہلکی اور فرحت انگیز غذا ہے جو دل کے امراض میں بہت سودمند ہے۔ میٹھا انار قبض کشا ہوتا ہے جبکہ تھوڑی سی کھٹاس والے انار کے دانے معدہ کے ورم اور دل کے درد کے لئے جواب دہ اور ٹانگ ہیں۔ ان دانوں سے تیار کیا گیا شراب Dyspepsia جیسے معدہ کے امراض میں فائدہ کرتا ہے۔ اسہال یا خونی پیچش میں مبتلا مریضوں کے لئے پیچاس گرام انار کا رس ایک بہترین علاج بھی ہے اور کمزوری رفع کرنے کا طریقہ بھی قلت خون (Anaemia)، بربقان (Jaundica)، بلڈ پریشر، بواسیر اور ہڈیوں و جوڑوں کے درد (Arthritis) میں انار کے طبی فوائد طب یونانی آیوریدک اور ایلیو پیٹھی میں بھی تسلیم کیے گئے ہیں۔ شہد کے ساتھ انار کا رس Bilioussness میں کمی لاتا ہے۔

انار کا پھل دل و دماغ کو اس حد تک فرحت اور تازگی بخشتا ہے کہ ایک پیغمبر نہ قول کے مطابق اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ زائل ہو جاتا ہے۔

انار کی جڑ کی چھال ایک ایسی بے مثال دوا ہے جسے پانی میں ابال کر مریض کو پلانے سے Tapeworm سمیت پیٹ کے سارے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایسا اُبلّا ہوائی ٹی۔ بی اور پرانے بخار کو ختم کرنے میں موثر ثابت ہوا ہے۔ مزید برآں ملیریا کے

قرآنی نام: زُمان

دیگر نام:

انگریزی: Pomegranate، فرانسیسی: Granat، روسی: Granatapfel، جرمن: Punicum، لاطینی: Melagrana، اطالوی: Rimmon، عبرانی: Granade، ہسپانوی: Roa، یونانی: واڈم (سنسکرت: تیگلو) داؤن (کشمیری)، ماتلم (لمیالم)، مادولائی (تامل)، ڈالم (بنگالی)، زمان (عربی)، انار (فارسی، اردو، ہندی، پنجابی)، ڈالمب (مرہٹی)، واڈم (گجراتی)، واڈم (بنگالی، تیگلو)۔

نباتی نام: Punica Granatum linn

Family: Funicaceae

قرآنی آیات بسلسلہ انار

- (1) سورۃ الانعام VI - آیت نمبر 100
- (2) سورۃ الانعام VI - آیت نمبر 142
- (3) سورۃ الرحمن VI - آیت نمبر 68-69

انار کا ذکر زمان کے نام سے قرآن حکیم میں تین مرتبہ آیا ہے اور تینوں بار انسان کو انہم نصیحتیں کی گئی ہیں مثلاً سورۃ الانعام کی آیت میں حکم ہوا ہے کہ کھجور، زیتون اور انار وغیرہ پھلوں کی جب فصلیں کاٹی جائیں تو فوراً اس میں سے ایک حصہ حق داروں کو دے دیا جائے۔ اس طرح اشارہ کیا گیا ہے اس اصول کی جانب کہ قدرت کی نعمتیں عام انسانوں کے لئے ہیں اور جو لوگ باغ کے پھلوں کو اور رکیت کی پیداوار کو اپنے لئے مخصوص رکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں نا پسندیدہ انسان ہیں۔ قرآن کا یہ ارشاد سماج میں اجارہ داری اور سرمایہ داری کو مناسب قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کریم کے انعم ترین حکم یعنی عشر کی طرف اشارہ ہے۔ عزیز کا شکار بھائیوں جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح عشر بھی فرض عین ہے۔ اپنی زرعی اجناس کی پیداوار میں سے عشر کی ادائیگی کے بغیر روزی پاک و حلال نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اس کی طرف قطعی توجہ نہیں دی جاتی۔ دین کے ٹھیکدار بھی زکوٰۃ پر تو زور دیتے ہیں لیکن عشر کو بیکس فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ مساکین، ضرورت مندوں کا حق ادا کیے بغیر آپ کی روزی پاک نہیں ہوتی۔ جس کا خمیازہ ہم دیگر طرح سے نقصان کی شکل میں برداشت کرتے ہیں۔ لہذا اپنی زرعی پیداوار سے عشر ادا کر کے اللہ کی حکم عدولی کا جو ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اس سے فوراً باز آجائیں اور اللہ رحمتوں کا دروازہ اپنی طرف کھول لیں۔

نباتی سائنس کی رو سے انار کا نام (Granatum Punica) ہے۔ مشہور سائنسدان ڈی کینڈونے کی رائے کے اعتبار سے اس کا وطن ایران ہے۔ حالانکہ جنگلی انار افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان (ہمالیہ) اور شام میں آج بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کاشت کیا ہوا اعلیٰ قسم کا انار فلسطین، شام اور لبنان کے علاقوں میں کافی عام ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے اس علاقہ کا ایک مشہور شہر مان کہلاتا ہے۔

نیم مرطوب علاقہ جات میں گل لالہ کی کاشت

محسن بشیر (پی ایچ ڈی۔ کالر)، محمد اسلم خاں..... شعبہ انٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پھول کی قوت مدافعت کو تقویت بخشی بلکہ کاشت کو بھی دوام بخشا۔ اسی تحقیق کے تناظر میں روز بروز اس کی کاشت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے خصوصاً اس کی کاشت لاہور کے نواحی گاؤں شاکی بھٹیاں اور پتوکی کے مضافاتی علاقوں میں مقبولیت بڑھنے لگی ہے۔

زمین کی تیاری

زمین کی مندرجہ ذیل خصوصیات ٹولپ کی حوصلہ افزاء کاشت کے لئے بے حد ضروری ہیں۔
کیسائی مادہ $1 = 150 > K, P > 15, N > 20g/m^2$ ٹولپ کی کاشت سے پہلے زمین میں اچھی طرح ہل چلا کر زمین کی اندرونی تختی کم کر کے اسکو اچھی طرح بھرا بھرا کر لینا چاہیے۔ تاکہ زمین کی پانی جذب کرنے کی اہلیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ زمین کو اچھی طرح نرم اور ہموار کرنے کے بعد کھالیوں اور کھاریوں میں ٹولپ کی کاشت کی جاسکتی ہے۔ میرا اور ہلکی سطح کی زمین اسکی کاشت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہلکی زرخیز زمین میں ٹولپ کی کاشت کامیاب طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔ کلرٹھی، کلواٹھی اور دیگر زمینیں اس پھول کی کاشت کے لئے غیر موزوں ہیں۔ شاندار پیداوار خصوصاً ل کیلئے زمین کی روانی کے بعد دو سے تین بار ہل چلایا جائے اور بعد میں زمین کی نرمی کیلئے سہاگہ پھیرا جائے تاکہ زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ سکے۔ موسم خزاں میں بوائی صبح یا شام کے وقت کی جائے تو نتائج بہتر آئیں گے اور پانی کے بعد تری بھی محفوظ رہے گا۔ بیج بلب کی موٹائی کا ڈیڑھ سے دو گنا زمین کے اندر کاشت کرنا چاہیے اور بوائی کے ایک گھنٹہ بعد پانی لگا دینا چاہئے۔

وقت کی کاشت

پاکستان اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں آب و ہوا کے پیش نظر موسم بہار میں ٹولپ کی کاشت کی جاتی ہے بہار کے موسم میں یہ فصل نومبر کے مہینے میں کاشت کر دینی چاہیے ایک مناسب حد سے زیادہ سرد اور گرم موسم ٹولپ کی پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں کاشت کے وقت میں تاخیر سے اگاؤ کی نسبت میں کمی اور پھول کی خاصیت متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔

شرح غم (بیج)

بوائی کرتے وقت بیج کی موٹائی کا ڈیڑھ سے دو گنا زمین کے اندر گہرا رکھنا چاہیے۔ اگر کھاریوں میں کاشت کرنی ہو تو ایک مرلہ کی کھاری میں 250-200 بلب ایک مرلے فٹ میں لگائے جائیں اور اگر کھالیوں میں کاشت کرنا مقصود ہو تو 8-9 بلب ایک مرلے فٹ میں لگائے جائیں۔ شرح بیج میں کاشت کا وقت اور موسمی حالات میں تبدیلیوں کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری امر ہے۔

جراثیمی ٹیکہ

چونکہ ٹولپ پھول کے ساتھ ساتھ اس کا بیج بھی انتہائی نازک اور حساس ہوتا ہے کہ موسم میں ہونے والی تبدیلیاں اسکو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لہذا زمین میں بوائی سے پہلے جراثیمی ٹیکہ (Fungicide) لگانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ فضائی ناخن و جن جذب کرنے والے بیکٹریا یا پودے کی جڑوں میں گھٹیں بنا کر ناخن و جن جذب کر کے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکیں۔

(باقی صفحہ 32 پر)

لفظ ٹولپ ”گل لالہ“ پہلی مرتبہ مغربی یورپ میں 1554ء میں ترکی میں استعمال کیا گیا۔ بعد ازاں انگریزی زبان میں اسکو ٹیولیا یا ٹیولسیوٹ اور پھر فرانسیسی زبان میں اسکو ٹیولپ کہا جانے لگا۔ ٹیولپ شمالی امریکہ اور یورپ کے نباتات کی وطنی جنس ہے۔ یہ پودا ہیز میں بلب سے پیدا ہونے والا پھول ہے اور بلیسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بوٹی دار پھول ہے اور اس پھول کے مختلف رنگ قوس قزح کے رنگوں کا حسین دامتراج پیش کرتے ہیں۔ اس پھول کی 57 سے زیادہ اقسام اپنی خوبیوں کی بنا پر تحقیق کے میدان میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں۔ ٹولپ موسم بہار میں پیدا ہونے والا پھول ہے۔ جو بیج ”بلب“ سے پیدا ہوتا ہے اور اسکی ٹہنی کی حد 75cm - 10cm تک ہو سکتی ہے۔

ٹیولپ کا پھول عموماً لمبا اور پیالہ نما ہوتا ہے اور اسکے ایک بلب سے ایک ہی ٹہنی نمودار ہوتی ہے جسکے آخر میں پھول ہوتا ہے۔ اس خولے صورت پھول کے گرد پتیوں کا گیرا ہوتا ہے جو اسکی وجہ خوبصورتی ہے۔ کچھ پھولوں میں پتیوں کی تعداد کم اور کچھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ ماضی میں عام طور پر یہ پودا شدید علاقہ جات میں قابل ستائش نشوونما پاتا تھا گویا اس پھول کو صرف اور صرف ٹھنڈے علاقوں میں کاشت کرنے پر محیط کیا گیا۔ ان علاقہ جات میں اسکے بیج کو گرمیوں کے آخر اور سردیوں کے آغاز میں برف باری سے پہلے لگایا جاتا ہے اور سردی کی شدت اور برف کی تہہ کے نیچے زمین میں لگے بلب خوب پنپتے اور بہار کی آمد سے چند روز قبل ان بلیوں سے کوٹلیں پھوٹی ہیں۔ پودوں کی ترقی کے مراحل تقریباً 15 سے 20 روز بعد پودا تولیدی ترقی کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے اور پودوں کی ڈوڈیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈوڈی سے تراشیدہ پھول کی ہیئت تک پہنچنے کیلئے اس پودے کو تقریباً 7-5 دن کا عرصہ درکار ہوتا ہے لیکن ان عوامل کا دورانیہ اسکی مختلف اقسام میں تغیر و تبدل اور تنوع رکھتا ہے اسکی سینکڑوں اقسام ایک دوسرے سے بالکل مختلف خصوصیات رکھتی ہیں۔ جن میں سے چند ایک صرف پہاڑی علاقہ جات میں بھی کاشت کیے جانے کا احتمال رکھتی ہیں۔

آب و ہوا

ٹیولپ ایک نہایت حساس پھول ہے جس پر موسمی تبدیلیوں کا گہرا اور جلد اثر ہوتا ہے اس کی کاشت کے لئے سورج کی مکمل روشنی اور کم درجہ حرارت درکار ہوتا ہے جبکہ ڈوڈی بننے میں زیادہ روشنی متاثر کرتی ہے۔ دن کی زیادہ لمبائی اس کے پھول نکلنے کے عمل کو منفی طور پر متاثر کر سکتی ہے اور اس کی پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے مناسب پانی، روشنی، درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کا تناسب اس کی افزائش کیلئے نہایت ضروری ہے۔ پاکستان میں اس پھول کی کاشت سے کسان لاعلم ہے اور محض ٹھنڈے علاقوں میں کاشت کے قابل سمجھتے ہیں اور اس کے اگنے کے لئے خاص تعداد میں ٹھنڈے گھنٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جس عمل کو روناٹا لائٹیشن کہا جاتا ہے جو اس کی خوبیدگی توڑنے کیلئے اشد ضروری ہے جبکہ تحقیق نے اس کے برعکس نتائج پیش کیے ہیں۔ اس کی بہت سی اقسام نے پاکستان کے میدانی علاقوں میں بہت عمدہ کارکردگی پیش کی جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی چند اقسام کی کامیابی نے اسے کاشت کے قابل بنایا بلکہ اس کی خوبیوں میں مزید اضافہ بھی کیا۔ جس میں نہ صرف اس

دودھیل جانوروں سے صاف اور صحت بخش دودھ کا حصول

شوکت علی بھٹی..... انسٹیٹیوٹ آف اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

دودھ دوہنے والے برتن

دودھ دوہنے والے برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کیونکہ گندے برتن آلودگی کا باعث ہوتے ہیں۔ دودھ دوہنے والے برتنوں کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لینا چاہیے اور دودھ دوہنے کے بعد ان برتنوں کو دوبارہ دھو کر خشک کر لینا چاہیے۔ اُن دھلے برتن جراثیموں کی آماجگاہ بن سکتے ہیں۔ سورج کی دھوپ ایک قدرتی جراثیم کش ہے۔ برتنوں کو دھوپ میں خشک کرنے سے اُن کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ خشک کرنے کے لئے برتنوں کو اُٹار رکھنا چاہیے۔ دھلے ہوئے صاف برتن ایسی جگہ رکھے جائیں جہاں پر کھیاں، کیڑے مکوڑے، مٹی اور گندگی وغیرہ نہ ہو۔ بصورت دیگر دھلے ہوئے برتن دوبارہ آلودہ ہو جائیں گے۔ دودھ دوہنے والے برتنوں میں جوڑ کم سے کم ہونے چاہیے۔ کیونکہ یہ برتن کی دھلائی میں مشکل پیدا کرتے ہیں اور وہاں جراثیموں کے چھپنے والی جگہ بن جاتی ہے۔ دودھ دوہنے کے بعد اس کو صاف ستھرے برتنوں میں ڈال کر رکھنا چاہیے اور ان برتنوں میں ڈالنے سے پہلے دودھ کو صاف کپڑے سے چُن لینا چاہیے تاکہ دودھ میں کھیاں اور گوہر وغیرہ نہ شامل ہوں۔ دودھ فلٹر کرنے والے کپڑے کو بعد میں دھو کر دھوپ میں خشک کر لینا چاہیے۔ دودھ کو جلد از جلد ٹھنڈا کر لینا چاہیے اور اگر ٹھنڈا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو جلدی اسکی منزل تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ جلدی استعمال ہو سکے۔ دودھ میں یوریا، سرف، کاسک وغیرہ ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ غیر قانونی بھی اور غیر اخلاقی بھی کیونکہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لئے مضر ہیں۔

درج بالا امور کو مد نظر رکھ کر صاف اور صحت بخش دودھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دودھ کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے مختلف طریقے

جب دودھ حیوانے میں اترتا ہے تو اس وقت وہ تقریباً جراثیم سے پاک ہوتا ہے لیکن حیوانے سے نکلنے کے فوراً بعد اس میں بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں جو کہ دودھ دوہنے والے شخص کے ہاتھوں اور دودھ کے گندے برتنوں سے آتے ہیں۔ عام طور پر حیوانے سے دودھ 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر آتا ہے، جو بیکٹیریا کی افزائش کے لئے ایک انتہائی موافق درجہ حرارت ہے۔ دودھ دوہنے کے بعد جب تک دودھ اس درجہ حرارت پر رہے گا بیکٹیریا کی افزائش تیزی سے جاری رہتی ہے، جس سے دودھ کچھ دیر بعد خراب ہو جائیگا۔ یہ بیکٹیریا دودھ میں موجود لیکٹوز پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ لیکٹوز کو لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid) میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب لیکٹوز لیکٹک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو دودھ کھٹا ہو جاتا ہے۔

دودھ کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے مختلف طریقے درج ذیل ہیں

1۔ دودھ کو ٹھنڈا کرنا

اگر دودھ کو دوہنے کے بعد 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹھنڈا کر لیا جائے تو دودھ کی کوالٹی برقرار رہتی ہے کیونکہ ٹھنڈا کرنے کا عمل دودھ میں پہلے سے موجود بیکٹیریا کی افزائش کو روک دیتا ہے، جس سے کوالٹی برقرار رکھنے کی صلاحیت بہت حد تک بڑھ جاتی ہے۔

(باقی صفحہ 23 پر)

صاف دودھ سے مراد ایسا دودھ ہے۔ جو کہ صحت مند جانوروں سے صاف ستھرے برتنوں میں حاصل کیا جاتا ہے اور یہ بیرونی مواد مثلاً مٹی، گندگی، گوبر، چارے کے ٹکڑوں اور کھیتوں وغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں سے دودھ کی قدرتی خوشبو آتی ہے۔ اس میں بیکٹیریا کی تعداد کم ہوتی ہے اور یہ انسانی استعمال کے لئے صحت بخش ہوتا ہے۔ اس میں بیماریاں پھیلانے والے جراثیم نہیں ہوتے یہ زیادہ دیر تک محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی قیمت زیادہ ملتی ہے۔ زیادہ فاصلے تک لے جانا آسان ہوتا ہے اور اس سے بہتر مصنوعات تیار کی جاسکتی ہیں۔

صاف دودھ، صاف ستھرے اور صحت مند جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مزید برآں صحت بخش اور صاف ستھرا دودھ حاصل کرنے کے لئے جانوروں کے باڑے، گوالے کے ہاتھ، دودھ دوہنے والے برتن صاف ہونے بھی ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں دودھ میں آلودگی کا باعث بننے والے عوامل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

جانور

دودھ میں آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ خود جانور ہی ہیں۔ اگر جانور صحت مند اور صاف ستھرے ہوہے تو ان سے صاف اور صحت بخش دودھ حاصل کرنا آسان ہوگا۔ بصورت دیگر صاف دودھ کا حصول مشکل ہوگا۔ گندے اور گوبر سے بھرے جانور سے حاصل کیا ہوا دودھ آلودہ ہوگا۔ اس لئے دودھیل جانور ہمیشہ صاف ستھرے رکھے جائیں۔ اُن کی ٹانگوں اور پسلیوں اور حیوانے پر بال وغیرہ باقاعدگی سے کاٹے رہنا چاہیے۔ دودھ دوہنے سے قبل حیوانے کو پانی سے دھو کر صاف کپڑے سے خشک کر لینا چاہیے۔ سوزش حیوانہ (mastitis) سے متاثرہ جانوروں کا دودھ صحت کے لئے فائدہ مند نہیں ہوتا اس لئے اس کو صحت مند جانوروں کے دودھ میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔

گوالہ

صاف دودھ کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ گوالہ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو۔ اس کے ناخن کٹے ہوئے ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں۔

اُس کے ہاتھ صاف ہوں اور دودھ دوہنے سے قبل ہاتھ صابن سے دھو کر تولیے سے خشک کر لئے جائیں اور پھر ہاتھوں کو جانور کے جسم پر پھیرنے سے احتراز کرے۔ دودھ کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دینا چاہیے کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

جانوروں کے باڑے اور ارد گرد کا ماحول

صاف دودھ حاصل کرنے کے لئے جانوروں کے باڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے۔ دودھ دوہنے والی جگہ اور باڑے، پیشاب، گوبر اور خوراک کی باقیات سے پاک ہوں تاکہ وہ دودھ میں شامل نہ ہونے پائیں۔ باڑوں کے اندر سے پانی وغیرہ نکلنے کا مناسب بندوبست ہوتا کہ باڑوں کے اندر کی جگہ گیلی نہ رہے۔ جانوروں کے حیوانے کو دھونے، دودھ والے برتن دھونے کے لئے صاف پانی کا علیحدہ بندوبست ہونا چاہیے۔ اور دودھ دوہنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔

جانوروں میں وبائی امراض، روک تھام اور حفاظتی اقدامات

عرفان یوسف، منیب اللہ، معاون، ایاز حسن..... شعبہ اپنی ڈمالوجی اینڈ پبلک ہیلتھ، پیرمہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی، راولپنڈی

تعارف وبائی امراض حیوانات

کسی علاقے، ملک یا براعظم میں حیوانات کے دوہ امراض جن کی وقوع متعلقہ حکام اور خطے کے مویشی پال حضرات کے توقعات کے برعکس ہوں، وہ وبائی امراض حیوانات کہلاتے ہیں۔ وبائی امراض حیوانات کو روکنے اور ان پر قابو پانے کے اقدامات کی چار اقسام ہیں۔

- 1- وہاں روک تھام کے اقدامات جہاں مستقل طور پر پائی جاتی ہیں۔
- 2- ایسے ممالک میں جہاں بیماریاں مستقل طور پر پائی جاتی ہیں وہاں بیماریوں کی روک تھام کے اقدامات اور ان سے محفوظ رہنے کی طریقے۔
- 3- بیماری کی وباء پھیلنے کے بعد کے اقدامات۔
- 4- علاقائی یا ملکی حدود کے ارد گرد بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے ضروری اقدامات۔

وہاں روک تھام کے اقدامات جہاں مستقل طور پر پائی جاتی ہیں

ایسی تمام معلومات جو کہ درج ذیل کے متعلق ہوں ان کو اکٹھا کرنا اور ان پر غور کرنا۔

☆ بیماری کی نوعیت

☆ جراثیم جو کہ اس بیماری کا باعث ہے۔

☆ جانور کے ماحول میں جراثیم کا زندہ رہنا (جانوروں کے جسم کے علاوہ بھی)

☆ ماحولیاتی اثرات کے خلاف جراثیم کی مدافعت جیسا کہ تیز دھوپ، ہوا وغیرہ۔

☆ بیماریوں کے پھیلاؤ اور ان کے متعلق اقدامات اور معلومات۔

ایسے ممالک میں جہاں بیماریاں مستقل طور پر پائی جاتی ہیں میں اقدامات برائے۔

تدارک وبائی امراض

☆ روک تھام کے جدول کی مطابقت حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال بیماریوں کا موسم (جو بیماریاں موسمی ہوں) آنے سے دو یا تین مہینے پہلے حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال تاکہ ان حالات میں جن میں بیماری کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو، جانوروں کی قوت مدافعت زیادہ ہو۔

☆ ویٹرنری ڈاکٹر یا لیبارٹری سے بہترین رابطہ اور اطلاعی نظام قائم کرنا۔ اس نظام کی مدد سے بیماریوں کے پھیلاؤ اور ان کی وباء کے متعلق اطلاعات جمع کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے جتنی جلد ممکن ہو جانوروں کی صحت سے متعلق حکام تک رسائی ہوتی ہے اور وبائی امراض کو پھیلنے سے روکا جاتا ہے۔

☆ کسانوں کو بیماریوں کے متعلق تعلیم دینا۔ کسانوں کو بیماریوں اور ان کی علامات کے متعلق تعلیم دینے سے بیماریوں کو پہچاننا اور اس کی روک تھام آسان ہو جاتی ہے۔

☆ ایسے علاقوں میں جہاں بیماری عام ہو اور ایسے علاقے جہاں بیماری عام نہ ہو کے درمیان آمد و رفت کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ جن علاقوں میں بیماری عام ہو وہاں کے جانوروں کے اندر بیماری کے جراثیم مستقل طور پر پائے جاتے ہیں لیکن وہ ظاہراً بیماری پیدا نہیں کرتے تاہم بیماری پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں کیونکہ جو وباء ان جانوروں سے پھیلتی ہے وہ

بہت خطرناک ہوتی ہے اور اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے جانوروں سے بچنا، ناممکن ہو اور علاقے سے جہاں بیماری ہو جانوروں کو لانا پڑے تو نئے آنے والے جانور کو لانے سے کم از کم تین ہفتہ پہلے حفاظتی ٹیکہ لگا دینا چاہیے۔

وباء کے دوران حفاظتی اقدامات

☆ جب وباء آجائے تو یہ بہت اہم ہے کہ فوری طور پر اس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جاسکے۔ حفاظتی ٹیکوں کا استعمال وباء کے دوران بھی جاری رکھنا ضروری ہے۔ ایسے موقعوں پر پانی میں مردہ جراثیم یا پھسکلڑ یا Gel شدہ معدہ جراثیم سے بنائے گئے حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال بہتر ہے۔ خالی مردہ جراثیم کے بنائے گئے حفاظتی ٹیکہ جات کا جانوروں پر ایک ہی وقت میں جسم کی مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

☆ ایسے جانور جو بیماری کے علامات ظاہر کرتے ہیں ان کو علیحدہ کر کے مناسب جراثیم کش ادویات سے علاج کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ان فارموں کے لئے بہت آسان ہے جہاں جانوروں کو رات کے لئے یادن کے ایک وقت کے لئے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔

☆ ریوڑ میں موجود تمام جانوروں کے جسم کا درجہ حرارت دیکھنا ضروری ہے۔ یہ طریقہ ہرج اپنا نا چاہیے اور ایسے جانور جن کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہو ان کے لئے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔

☆ روزانہ بیمار جانور یا مردہ جانور کو تلاش کریں خاص طور پر جس حصے میں وہ آزادانہ پھرتے ہیں۔

☆ جتنا ممکن ہو سکے ریوڑ کو ایک جگہ رکھیں اور بیماری کے علاقے سے اندر باہر جانوروں کی آمد و رفت پر قابو رکھیں۔

☆ فوری طور پر مردہ جانوروں کا پوسٹ مارٹم کے لئے جسم سے نکالے گئے نمونے لیبارٹری بھیجوائیں۔

☆ ایسے نمونوں کو مناسب جگہ پر محفوظ کریں اور ایسے آمد و رفت کے سلسلے اپنائیں جن میں ان نمونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے اور یہ صحیح حالت میں لیبارٹری پہنچائے جاسکیں۔ مردہ جانوروں کو مناسب طریقے سے ضائع کریں یا مردہ جانوروں کو بہت گہرا گڑھا کھود کر دبا دینا یا پھر جلادینے کے طریقے تجویز کیے گئے ہیں۔

☆ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب جانور مر جائے تو کوئی بھی کسان اس کو اپنانے سے انکار کر دیتا ہے اور آوارہ کتے یا آزاد پھرنے والے دوسرے جانور اس مردہ جانور کے مختلف حصے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جاتے ہیں اس طریقے سے وباء ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتی ہے۔

☆ مردہ جانور کی لاش اگر نندی نالوں میں موجود ہو تو اس سے بھی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

☆ ایسے علاقے جہاں پر وباء پھیلی ہو، میں جو خوراک اور توڑی یا پرالی (جو جانوروں کے نیچے

ظاہر کرتا ہے کہ حال ہی میں کوئی بیماری جانوروں پر آئی تھی اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس علاقے میں اس بیماری کے جراثیم موجود ہیں۔

☆ جانوروں کو لیجانے سے دو یا تین ہفتے پہلے ایک مخصوص حصے میں مستقل رکھا جائے۔ ان دوران اس جانور کے مختلف ٹیسٹ کرنے چاہیں جن میں مختلف سیرم کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ ایسے جانور جن میں بیماری کے جراثیم پائے جائیں ان کو نکال دینا چاہیے۔

☆ ایسے جانوروں جن میں بیماری کے جراثیم موجود ہوں لیکن بیماری نہ ہو اور ایسے جانور جن کا مدافعتی نظام بہت زیادہ فعال ہو اور ان میں اینٹی باڈیز زیادہ ہوں اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جانوروں کو لانے لے جانے سے پہلے ایک مخصوص حصے میں کچھ وقت کے لئے رکھنا ضروری ہے۔

جانوروں کو نئی جگہ پر لانے کے بعد کے حفاظتی اقدامات

☆ نئی جگہ پر لانے کے بعد پھر جانوروں کو ویسے ہی حالات میں رکھنا جیسا کہ لانے سے پہلے کے حالات بتائے گئے ہیں ضروری ہے۔

☆ بیماری سے آزاد علاقے سے اگر جانور ایسے علاقے میں لائے گئے ہوں، جہاں بیماری عام ہو ان کو فوری حفاظتی ٹیکے لگادینے چاہیے۔ جانوروں کو ایک مخصوص وقت کے لئے رکھنے کے بعد فوراً ایسے حفاظتی ٹیکہ جات جن میں تیل ڈالا گیا ہو، کی ایک خوراک اور اس کے کچھ دنوں بعد دوبارہ حفاظتی ٹیکوں کی ایک خوراک دے دینی چاہیے۔

بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا

کسی بھی ملک نے ابھی تک بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس اقدام کو اپنانے کے لئے ایسے جانور جن میں جراثیم عام طور پر پائے جاتے ہوں اور بیماری نہ پیدا کریں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ابھی حال ہی میں اس نظریے کو ثابت بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایسے جانور بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی بیماری ظاہر نہیں ہوتی مگر اس کے جراثیم ان جانوروں کے اندر چھپے رہتے ہیں۔

بچائی جاتی ہے۔ استعمال ہو اس کو بھی مناسب طریقے سے ضائع کر دینا چاہیے۔ اس علاقے میں ان چیزوں کو یا تو گہرائی میں دبا دیں یا سکھا دیں اور یا پھر جلا دیں۔

☆ گائیوں، بھینسوں کے بازوؤں میں موجود چیزوں یا ان کے گوبر کو دھونا نہیں چاہیے کیونکہ دھونے سے یہ ایک سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ ان کو چیک کرنے کے لئے بنائی گئی نالیوں کو بہت بڑے اور گہرے گڑھے میں کھولنا چاہیے اور گڑھے کو محفوظ طریقے سے بند کر دیں یا پھر پوری جگہ کی نالیوں سمیت جراثیم کش ادویات کے استعمال سے صفائی کرنی چاہیے۔ بارشوں سے متعلق زرعی کاموں کا غور اور تفصیل سے جائزہ لینا مثلاً جب چاولوں کی کاشت کے لئے زمین کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بوجھ ڈھونے والی گائیوں، بھینسوں کی آمدورفت ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت بڑھ جاتی ہے اور بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتی ہے۔ مثلاً گل گھوٹو بارشوں کے موسم کی بیماری ہے۔

ہلکی علاقائی حدود کے ارد گرد بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام

☆ جب جانوروں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں درآمد کیا جائے تو ایسے اقدامات اپنانے چاہیں کہ بیماری کے پھیلاؤ کو ختم کیا جائے یا کم سے کم کیا جائے۔

☆ اس بات کا تعین کر لیں کہ جس علاقے سے جانور درآمد کرنا ہوں وہاں پر کم سے کم ایک سال پہلے تک بیماری نہ ہو کسی علاقے کا بیماری سے آزاد ہونا ان اسباب پر منحصر ہے کہ وہاں پر جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں اور جانوروں کو کن حالات میں رکھا پالا جاتا ہے اگر جانوروں کو فارم کی حدود کے اندر رکھا جائے تو پھر اس علاقے کا دائرہ اتنا تنگ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آدھے کلومیٹر تک محیط ہو اور ایسے علاقوں میں جہاں جانوروں کی آزادانہ حرکات و سکنات ہوں وہاں بیماری پھیلنے کا دائرہ کئی کلومیٹر تک بھی محیط ہو سکتا ہے۔

☆ مدافعتی طاقت کو مرنے کے لئے خون اور سیرم کے مختلف ٹیسٹوں کے دوران اگر جانوروں کا مدافعتی نظام بہت زیادہ فعال ہو اور بیماریوں کے خلاف اینٹی باڈیز زیادہ ہوں تو اس بات کو

شجر کاری کا آسان طریقہ

بقیہ:

مختلف پودا جات لگانے کا طریقہ

بقول شاعر

وہ رنگین صبح بھی اک روز آئے گی زمانے میں
کہ جب اقوامِ عالم مختلف اشجار کی صورت
بھریں گی دوستی کا رنگ دنیا کے فسانے میں
باہم ملک کر رہیں گی سنبل و کچنار کی صورت
یہیں شیشم بڑھیں گے آم و جامن روپ لائیں گے
شرف سب خدمتِ انسان کا دنیا میں پائیں گے

<<<<<<<<>>>>>>>>

سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کریں پھر اس کے بعد پودوں کا انتخاب کریں۔ پودے کی جتنی جڑ کی لمبائی ہے اس سے تقریباً چار انچ زیادہ گہرا گڑھا کھودیں۔ پودے کو گڑھے کے درمیان میں سیدھا رکھ کر اطراف میں مٹی ڈال کر ذرا دبا دیں اور مٹی کا لیول پودے کے کارپوائنٹ تک کر لیں اس طرح گڑھے کے اوپر والے چار انچ حصے میں پانی ڈالنے کی گنجائش باقی رہے گی لہذا گڑھے کے اوپر والے حصے کو پانی سے بھر دیں اور ایک ایک کر کے پودے لگاتے جائیں، پانی دیتے جائیں اور ملک کو سرسبز و شاداب بناتے جائیں۔ ان شاء اللہ وہ وقت دور نہیں جب ہماری تعلیم یافتہ نوجوان نسل کی کاوشوں سے پاکستان ہرے بھرے اور خوشحال ممالک کی دوڑ میں سرفہرست ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ، میں عرض گزار ہوا کہ حضور! میں پڑھوں جبکہ قرآن مجید تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک مجھے یہ پسند ہے کہ دوسرے کی زبانی اسے سنوں۔ حضرت ابو مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جس نے دو آیتیں پڑھیں، حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھیں تو وہ اس کو کفایت کریں گی۔

الحمد لله

ہاتھی کی کھال سخت لیکن دل نرم ہوتا ہے

بخت بیدار خان، محمد قمر بلال، خالد محمود چودھری، اسد اللہ حیدر..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ایسے دستاویزی ثبوت موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی مردہ ہاتھی کو دیکھ کر دوسرے ہاتھی بہت مشتعل اور مضطرب ہو جاتے تھے۔ اُن کے اضطراب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منفرد تجربہ کیا گیا۔ جس میں بھینسوں، گینڈوں اور ہاتھیوں کی کھوپڑیاں، ہاتھیوں کے ایک گروپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ وقت لگا کر ہاتھیوں کی کھوپڑیاں علیحدہ کر لیں اور ان کو بغور دیکھنے میں دوسرے جانوروں کی کھوپڑیاں دیکھنے کے مقابلے میں دوہرا تاخم صرف کیا۔ ہاتھیوں کی اسی فیملی میں سے ایک ہاتھی کو کسی نے فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ جس سے اُن کی فیملی کے دو ہاتھی تو اس قدر مشتعل ہو گئے کہ وہ بالکل پاگل محسوس ہونے لگے۔ وہ گھنٹوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنے مردہ ساتھ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک بار اُسے سیدھا بٹھانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن ایک لمحہ کے بعد وہ پھر دم سے گر گیا۔ تیسرا ہاتھی کچھ گھاس لاکر اُس کے منہ میں تھونسنے کی کوشش کرتا رہا۔ تھک ہار کر انہوں نے مندرجہ بالا طریقے کے مطابق لاش کو ڈھانپ دیا اور راضی برضا ہو گئے۔ بطور، مکاں، ہتھنی کا پیار: ہاتھی فیملی میں ایک خوبصورت ہتھنی نے ایک نر بچے کو ہم دیا جو کہ اپنی اگلی نسلوں میں خرابی کے باعث کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود اس کے لیے چند سینکڑوں سے زیادہ اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ اپنی سی کوشش کر کے ہاتھی فیملی کے سب ممبر چلے گئے۔ لیکن اس معذور بچے کی ماں اور 9 سالہ بہن اُس کی دیکھ بھال کیلئے ادھر رک گئے۔ اگرچہ ماں اور بہن بھی بھوک اور پیاسی تھیں لیکن وہ اُس بچے کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ تھیں۔ بہت تک و دوڑ کے وہ تینوں پانی والی جگہ پر پہنچے جہاں پانی پینے کے علاوہ انہوں نے اپنے اوپر اور معذور بچے پر بھی پانی چھڑکایا۔ بعد ازاں ہتھنی اور اسکی بیٹی نے خصوصی طریقہ کار کے مطابق پیغام رسانی کر کے فیملی کے دوسرے ممبران کو بھی بلایا۔ تین دن گزرنے کے بعد ہتھنی کے بچے جو قدرے نرم ہوئے اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا جو کہ ایک بہت مثبت علامت تھی۔ ہتھنی کے بچے کو کھڑا ہونے کی سہولت ملنے کے ساتھ ہی ایک اور حادثہ وقوع پزیر ہوا۔ کسی شکاری کی برچھی اُس بچے کی کمر میں ایک فٹ گہرا زخم کر گئی۔ اگرچہ اس دوران ہتھنی ایک اور بچے کو بھی جنم دے چکی تھی لیکن وہ زخمی بچے کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی بلکہ وہ وٹس (Vets) کو علاج کیلئے بچے کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ حتیٰ کہ جب اُسے بغرض علاج بہوش کیا گیا اور وہ گر پڑا تو تینوں ماں بیٹیوں نے اُسے گھیرے میں لے لیا۔ حتیٰ کہ وٹس کو انہیں پرے ہٹانے کیلئے ہوائی فائر کرنے پڑے۔ تاہم اُس کا علاج شروع ہونے کے چند ہفتے بعد مکمل شفا ہو گئی۔ اُسکی ماں اور بہنوں کی محبت اور مسلسل دیکھ بھال نے اُسکو ایک بھرپور 12 سالہ ہاتھی بنادیا۔ مختلف انواع جانوروں کی باہمی دوستی: یہ دوستی دو معذور جانوروں کے درمیان تھی۔ اُن میں سے ایک نابینا خچر تھی اور دوسرا ایک بیل تھا جسکے کندھے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ دونوں کولورائیڈ (Colorado) کے جنگل میں جانوروں کی پناہ گاہ کے رہائشی تھے۔ دونوں علیحدہ علیحدہ چراگاہوں میں رکھے گئے تھے جہاں اور بھی جانور تھے۔ تاہم ایک بہت سردرات کے دوران سب جانوروں کو ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تا کہ کمرہ خوب گرم ہو جائے۔

(باقی صفحہ 38 پر)

چند سال قبل ایک محقق نے شمالی کینیا کے علاقہ بنام سمبوروکا دورہ کیا۔ وہاں جنگلی ہاتھیوں کے بڑے بڑے گروپ اپنے قریب دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا۔ اُن کا پُر جلا باخبر اور جذباتی هجوم اپنی فطری حالت اور قدرتی ماحول میں سامنے نظر آ رہا تھا۔ جس سے آسانی سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ قدرتی ماحول میں اور چڑیا گھر کے محدود ماحول میں زندگی بسر کرنے میں کس قدر فرق ہے۔ ہاتھی یقیناً تھوڑی بہت چہل قدمی کرنا بھی پسند کرتے ہیں لیکن تنہائی میں وہ مکمل مصنوعی زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے بڑے چڑیا گھروں میں ایک کے بجائے دو یا تین ہاتھی بھی رکھے جاتے ہیں تا کہ تنہائی کا احساس قدرے کم ہو سکے۔ ہاتھیوں کے ایک گروپ کا بغور جائزہ لینے پر اُس محقق کو یہ معلوم ہوا کہ اُن میں سے ایک ہتھنی لنگڑا کر چلتی ہے۔ جس کے باعث وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتی ہے لیکن گروپ کے باقی ساتھ کچھ دور جا کر رک جاتے ہیں تا کہ وہ بھی گروپ میں شامل ہو جائے۔ اس عمل سے ہاتھیوں کے اُس گروپ میں ایک دوسرے سے گہری ہمدلی اور ہمدردی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ نیز یہ کام وہ بغیر کسی لالچ کے کئی سالوں سے انجام دے رہے ہیں۔ ہاتھیوں کے گروپ میں اس مادہ نظام کا مشاہدہ کر کے اُس محقق کو انتہائی روحانی، فکر انگیز اور کایا پلٹ قسم کا احساس ہوا۔

جدائی کا غم

ہاتھیوں سے متعلقہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہندوستان کے مشرقی حصہ کے ایک علاقہ میں پیش آیا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھیوں میں بھی دوستی اور ہمدلی کی بنیاد پر مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ ایک بستی کے قریب جنگل میں چودہ ہاتھی پائے جاتے تھے۔ اُن میں کسی طرح ایک ادھر گھرے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اُس کی لاش کو گڑھے سے نکال کر دفن کر دیا۔ چند دن تو باقی ہاتھی اپنے ساتھی تلاش کرتے رہے۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے بستی والوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا اور اُن سے حساب لینے کا پروگرام بنا کر ایک دن اچانک بستی پر چڑھ دوڑے۔ ان تمام باتوں سے یہ عیاں ہے کہ ہاتھیوں کو اپنے ساتھی کی جدائی کا کس قدر غم تھا۔ اُس غم کو کم کرنے کے لیے انہوں نے انسانی جانوں سے کیلئے سے بھی پرہیز نہیں کیا۔ ہائے! ساتھی کی جدائی۔

تدفین قبل

اپنے مردہ ساتھیوں کے لیے ہاتھی اپنی تشویش اور تجسس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں پھنسنے ہوئے پاکر یا کہیں کسی ہاتھی کی لاش دیکھ کر ہاتھی بہت زیادہ پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی ویران جگہ ایک ہاتھی کی لاش پڑی تھی۔ اُس گروپ کے سب ہاتھی لاش کے گرد گھڑے ہو گئے۔ بڑی نرمی سے اُسے چھو کر دیکھتے رہے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہ پتھر یا علاقہ تھا۔ ارد گرد زمین گیلی تھی۔ تاہم ہاتھیوں نے پتھروں کے درمیان میں سے کچھ مٹی نکال کر لاش کے اوپر ڈال دی۔ کچھ ساتھی قریب ہی واقع جھاڑیوں سے ٹہنیاں توڑ کر لائے جو کہ لاش پر پڑی مٹی کے اوپر ڈال دی گئیں۔ اس طرح رات ہونے تک انہوں نے لاش کو مکمل ڈھانپ دیا اور پھر باقی رات لاش کی پہرہ داری کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو تمام ہاتھی بہت بے دلی سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لاش کو احترام سے سنبھالنے میں وہ کسی رشتہ داری یا دوستی کو ملحوظ نہیں رکھتے۔

چاروں کی اہمیت اور اُن کی غذائیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل

شوکت علی بھٹی..... انسٹیٹیوٹ آف انیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

مویشیوں کی سب سے اہم خوراک چارے ہیں۔ چارے جانوروں کی خوراک کا سب سے مستاذر یعیہں۔ ہمارے ملک میں مویشی اپنی خوراک کا 51 فیصد حصہ چاروں اور ان کی باقیات سے اور 38 فیصد حصہ جنگلات اور چرائی سے حاصل کرتے ہیں۔ چاروں کی عدم موجودگی میں جانوروں کی خوراک کا خرچ ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے اور یوں لائیوسٹاک کو تجارتی پیمانے پر منافع بخش بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ چارہ دیتے وقت مویشی پال حضرات عموماً چارے کی غذائیت کی طرف دھیان نہیں دیتے جس سے جانوروں کا پیٹ ٹوٹا نہ بھر جاتا ہوگا مگر اس سے ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ جانوروں کو اچھی کوالٹی والا چارہ مہیا کیا جائے۔

ایچھا چارہ کونسا ہوتا ہے؟

ایسا چارہ جس میں کل قابل ہضم اجزاء زیادہ ہوں، اور جانور اس کو شوق سے کھالیں اچھا چارہ کہلاتا ہے۔ بوائی سے لیکر کٹائی تک چارے کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر مرحلے پر اس کی کوالٹی مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں چارے کو اس وقت کاٹنا چاہئے جب اس میں غذائی اجزاء بھرپور طور پر موجود ہوں اور اُن کی زہمیت بھی زیادہ ہو۔

چارے کی غذائیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل مندرجہ ذیل ہیں

1.

عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چارے میں ریشہ دار اجزاء کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ان کی باضمیت بھی کم ہو جاتی ہے، چارے کی کوالٹی عمر کے ساتھ کس طرح متاثر ہوتی ہے۔

۲ موسم کافرق

گرم موسم میں بوئے جانے والے چارے جلدی پک جاتے ہیں لہذا ان کی کوالٹی موسم سرما میں باسرد علاقے میں پیدا ہونے والے چاروں کی نسبت کم ہوتی ہے۔

۳۔ روشنی کا اثر

زیادہ روشنی میں ضیائی تالیف زیادہ ہوتی ہے، لہذا عجب علاقوں میں روشنی زیادہ دیر تک رہتی ہے، یعنی جہاں زیادہ وقت سورج نظر آتا ہے۔ وہاں کے چارے زیادہ بہتر ہوتے ہیں بمقابلہ

ایسے چاروں کے جو کم روشنی میں اُگتے ہیں

۴۴ کھادوں کا اثر

اگر چاہے کو یوریا کھاؤ ڈالی جلے تو اس میں پروٹین و لحمیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے بہ نسبت اُس چارے جس میں کھاؤ نہیں ڈالی گئی ہوتی۔

۵. گھاس بمقابلہ پھلی دار فصلیں

تمام پھلی دار فصلوں میں (مثلاً برسیم، رواں، موٹھ، گوارہ، لوسرن وغیرہ) میں پروٹین کی مقدار 18 سے 20 فیصد تک ہوتی ہے جبکہ غیر پھلی دار چاروں میں (مثلاً مکئی، جوار، باجرہ، جئی وغیرہ) پروٹین کی مقدار 8 سے 10 فیصد تک ہوتی ہے۔ رائی گراس (Rye grass) کو اسٹیل حاصل ہے، اس لئے کہ گھاس ہونے کے باوجود اس میں پروٹین کی مقدار پھلی دار چاروں کے برابر ہوتی ہے۔

مختلف چارہ جات کو کاٹنے کا مناسب وقت:

۱۔ جوار: بونے کے 45-60 دن کے بعد، پچاس فیصد پھول آنے پر

۲۔ مکئی: بونے کے 60-70 دن کے بعد، دودھیاں سیج پر

۳۔ باجرا: دس فیصد پھول آنے پر

۴۔ رواں: بونے کے 70-75 دن بعد

۵۔ برسیم: پہلی کٹائی 60-70 دن بعد، پھر 40-45 دن بعد، اور آخری

کٹانیاں 20-25 دن کے وقفہ کے بعد

۶۔ لوسرن: بونے کے 60-70 دن بعد، بعد کی کٹائی دن 40-45 بعد، گرمیوں میں

20-30-دن بعد

۷۔ ماٹ گھاس: بوائی کے 105-120 دن تک تیار ہو جاتی ہے، دوسری کٹائیاں 40-45 دن کے بعد تیار ہو جاتی ہیں، 4-5 فٹ اونچی فصل کو کاٹ لینا چاہئے اس کے بعد اس کی کوالبی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

۸۔ سدا بہار: بونے کے 60 دن بعد۔ اس کے بعد 40-45 دن کے وقفہ سے کٹائیاں کرتے رہنا چاہئے۔

<<<<<<<>>>>>

ہاتھی کی کھال سخت لیکن دل نرم ہوتا ہے

بقية:

کرنے کے دوران اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر سوتے تھے۔ علیحدگی برداشت نہ تھی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر مختلف قسم کے جانور ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آسکتے ہیں تو بطور انسان ہمیں بھی دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے، بلکہ جہاں ممکن ہو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ متن کا بیشتر حصہ (Bekoff (2007 سے ماخوذ ہے۔

<<<<<<<>>>>>>

ناینا خچر اور ٹوٹی ہڈی والا بیل اُس کمرے میں ایک ساتھ تھے۔ اُس رات کے دران بیل نے خچر کے جسم کے ساتھ اپنا جسم اور ناک رگڑی اور کھیلنا شروع کر دیا۔ جسکے نتیجے میں بے تکلفی اور دوستی بڑھنے لگی۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے جدا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس دوستی سے پہلے ناینا خچر کو پانی پینے کیلئے پانی کے ٹینک تک جانے میں بہت مشکل پیش آتی تھی لیکن اب وہ بیل اُسے اپنے ہمراہ لے کر جاتا تھا۔ اس طرح آگاہہ میں بھی بیل اُسکی راہنمائی کرتا تھا کہ وہ باڑ کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ دن کو بارات کو آرام

بکریوں کے فارم کے لئے جانوروں کا انتخاب

محمد قمر بلال، بخت بیدار خاں، خالد محمود چودھری، اسد اللہ حیدر..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

بکریوں کے انتخاب کے لیے کہاں جانا چاہیے؟

بکریوں کے سرکاری فارموں سے، فارموں کے ارد گرد رہنے والے زمینداروں اور بکریاں پالنے والے پیشہ ور لوگوں سے نیز کچھ شوقین حضرات کے ڈیروں پر سے بھی بکریاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ بکریوں بھیڑوں کی مال منڈیوں سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ نہ بکرے بھی انہیں جگہوں سے مل سکتے ہیں۔ نہ بکرے دیکھنے میں بھی نہ ہونے چاہیں۔ ممکن حد تک جوان عمر ہوں۔ جس نسل کی بکریاں میں اسی نسل کے بکرے ہوں۔ ہو سکے تو ان کے مادہ منویہ (Semen) کا تجزیہ بھی کروایا جائے۔ بلکہ انہیں ایک دو بار عملی طور پر سرسوں کرتے بھی دیکھا جائے کیونکہ کچھ نہ جانور دیکھنے میں بہت خوب معلوم ہوتے ہیں مگر سرسوں کرتے وقت جھجک جاتے ہیں۔

جہاں تک بکریوں کا تعلق ہے ایسی بکریاں پسند کریں جو لگ بھگ جوان ہوں جن کے بچوں میں پرورش پانے کے بعد زیادہ گوشت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو جن کا قدر میناں اور جسم چوڑا چکھ ہو۔ جن کے بچوں میں روزانہ یا ہفتہ وار بڑھوتری کی شرح زیادہ ہو۔ جو کم خوراک کھا کر بڑھوتری زیادہ حاصل کریں۔ نیز بہتر ہوگا اگر وہ اڑھائی ماہ کی گاہن بھی ہو۔ بکریوں کو چرائی کرتے یا چار کھاتے ہوئے ضرور چپک کریں تاکہ ان کے دانتوں کی صحت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ دم کے نیچے اور دائیں بائیں بھی چپک کریں کہ موک تو نہیں لگی ہوئی۔ ایسی بکریوں کا انتخاب کریں جو ہر بار دو بچے پیدا کرتی ہوں۔ بلاوجہ بہت ناک اور نیچتی رالیں بھی کچھ پرائملز کی نشان دہی کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں نہ جانوروں کے مزاج کو بھی پرکھنے کی کوشش کریں بڑے سیگنوں والے جانوروں سے اجتناب کریں۔ جانور کی چمک دمک، چہرے کی رونق اور چال سے بھی کافی حد تک اُس کی صحت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم ترجیحاً یہ ضروری ہے کہ بکریوں اور بکروں کے انتخاب کے وقت جانوروں کے جسم کی ساخت اور صحت سے متعلقہ کسی ماہر تجربہ کار کی مدد حاصل کر لی جائے۔

تعداد کے اعتبار سے کتنے جانور خریدے جائیں؟

اس بات کا انحصار فارم کے مجوزہ سائز اور منبج کے تجربہ پر ہے۔ اگر تجربہ کا جواب نفی میں ہے تو شروع شروع میں تعداد تقریباً 30 بکریاں اور ایک نہ بکرا (بہتر ہوگا دو بکرے) تک محدود رکھیں۔ چھ آٹھ ماہ کے تجربہ کے بعد تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ اگر آغاز کار ہی تعداد سو سا سو بکریوں تک لے جائیں تو خدشہ ہے کہ ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے۔

مزید احتیاط

اگر فارم پر پہلے ہی سے کچھ جانور موجود ہیں تو نئے آنے والے جانوروں کو پہلے سے موجود جانوروں سے بالکل علیحدہ رکھیں۔ یہ عمل تین سے چار ہفتوں تک جاری رہے گا اور اس دوران اگر نئے جانوروں میں کسی متعددی مرض کا شک گزرے تو اُس کا فوری طور پر مناسب علاج کرایا جائے۔ نیز نئے اور پرانے جانوروں کو ایک دم ایک دوسرے میں شامل نہ کریں بلکہ مطلوبہ اور مروجہ احتیاط برتیں تاکہ زیادہ جانور زخمی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ نئے آنیوالے جانوروں کو فوری طور پر زیادہ دانہ وغیرہ نہ کھلائیں۔ بلکہ دانہ کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھائیں تاکہ نظام ہضم کا تعاون بھی میسر ہے۔

ہمارے ہاں بکریاں رکھنے سے مراد دودھ دینے والی بکری ہی تصور کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر بکری جو بچے پیدا کرتی ہے یقیناً تھوڑا دودھ بھی دیتی ہے لیکن ایسی بکریوں کا دودھ بمشکل بچوں کی غذائی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ اگر تین بچے اکٹھے ایک بکری سے پیدا ہو تو اُن کی دودھ کی طلب پوری کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ان میں سے ایک آدھ بچہ بہت کمزور رہ جاتا ہے یا کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال کا تعلق زیادہ تر اُن ایک یا دو بکریوں سے ہے جو دودھ کی گھریلو ضرورت پوری کرنے کے لیے پالی جاتی ہیں۔ تاہم جب بکریاں ریوڑ کی شکل میں کسی فارم پر رکھی جائیں تو اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بکریاں وہ رکھی جائیں جن کے بچوں سے جوان ہونے کے بعد زیادہ گوشت حاصل ہو۔ اگرچہ بکری کا دودھ بھی ایک قیمتی اینٹیم ہے بالخصوص طبی اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے لیکن پتلا ہونے کے باعث بھینس کے دودھ کے مقابلہ میں کم اہم شمار ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا کہ یورپی ممالک اور شمالی امریکہ وغیرہ میں زیادہ تر زیادہ دودھ پیدا کرنے والی بکریاں ہی پالی جاتی ہیں۔ اُن کی روزانہ دودھ کی پیداوار ہماری کئی گائیوں اور کچھ بھینسوں سے حاصل ہونے والے دودھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اُن بکریوں کی بھی کچھ نسلیں ہیں قدرے کم دودھ دیتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی پیداوار ہماری دودھیل بکریوں سے زیادہ ہے۔ اُن ممالک میں بکری کے دودھ کی مانگ بہت زیادہ ہے کیونکہ بکری کے دودھ سے وہ پنیر بناتے ہیں جو اُن لوگوں کی خوراک کا ایک اہم جزو ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پنیر دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ شمالی امریکہ اور یورپی ممالک کی بکریاں عام طور پر چھوٹے قد کی ہوتی ہیں۔ انہیں وہ ڈیری گوٹس کہتے ہیں۔ اُن ممالک کے لوگ ہمارے مقابلہ میں بکری کے گوشت کے بجائے بھیڑ کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں قربانی دینے کے لیے بھی لوگ بھیڑ کے مقابلے میں بکرے زیادہ خریدتے ہیں۔ تاہم گذشتہ دو تین سالوں سے بھیڑ کی قربانی کی تعداد میں قدرے اضافہ ہوا ہے چونکہ قیمت کے لحاظ سے نہ بھیڑ، بکرے سے کچھ حد تک سستی دستیاب ہے۔

بکریوں کے انتخاب اور خریداری کے مرحلہ سے پہلے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ انہیں گرمی، سردی، بارش وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی عمارت موجود ہے۔ اس عمارت میں شیڈ (Shed) رہائش خانے باڑے وغیرہ شامل ہیں۔ پانی کا انتظام ضروری ہے جو پینے اور صفائی کے لیے استعمال ہوگا۔ حاملہ بکریوں کے لیے جنم خانے یعنی ہر بکری اور اُس کے ایک دو بچوں کے لیے جگہ نما جگہ (1/2x1/2 میٹر) جہاں وہ پیدا نش کے بعد چند ہفتوں کے لیے ماں کے ساتھ اکٹھے رہ سکیں، ضرور مہیا ہونے چاہیں۔ اگر بکریاں زیادہ تعداد میں ہیں اور زیادہ دودھ دینے والی ہیں تو شاید بچوں کو پلانے کے بعد کچھ دودھ بیچ جائے تو اُسے سستے داموں فارم کے ملازمین میں تقسیم کر دیا جائے۔ علاوہ ازیں چار اور اور دانہ کی سپلائی، بیمار جانوروں کے لیے ادویات اور ویکسین درکار ہیں۔ فارم کے قریب کچھ فاصلہ پر بارانی یا بخر زمین میں ایسی جگہ ہو جہاں سے موسمی فصل کی کٹائی ہو چکی ہوتا کہ بکریاں اُدھر گھوم پھر کر چر چگ لیں۔ فارم سے کچھ فاصلہ پر اگر تین چار سایہ دار بڑے سائز کے درخت ہوں تو بہت بہتر ہوگا۔ اُن کے سایہ میں موسم گرمی میں جانوروں کو چانا مل سکتی ہے۔

دلیسی ادویات سے جانوروں کا کامیاب علاج معالجہ

عاصم فراز..... انسٹیٹیوٹ آف اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

مرکب ملتا ہے اسے افیون کہتے ہیں یہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس میں جوہر مارفین (Morphine) پایا جاتا ہے افیون اصلی پاؤڈر کی حالت میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ٹکچر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا اثر قابض ہوتا ہے اور یہ کتوں اور بلیوں میں دستوں کی بیماریوں میں کیسٹر آئل (Caster Oil) کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے۔

ارٹھ کے بیج (Caster Seed)

ان بیجوں کا تیل نکالا جاتا ہے جو زرد رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اس کو کیسٹر آئل کہتے ہیں یہ جانوروں میں لیگز بیو (Lexative) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

پھلکوی (Alums)

یہ سفید رنگ کا مرکب ہوتا ہے یہ زبان کو خشک کر دیتا ہے۔ یہ جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے اور اس کے علاوہ خون کو روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو گلیسرین کے ساتھ ملا کر جانوروں کو غرارے بھی کروائے جاتے ہیں۔

حفظل (Colocinth)

اس کو عنہ بھی کہا جاتا ہے یہ چھوٹے خر بوزے کی شکل کا پھل ہوتا ہے اس کا گودا استعمال کیا جاتا ہے ذائقہ نہایت کڑوا ہوتا ہے مقوی معدہ ہے اور خاص طور پر شاک پاؤڈر میں استعمال ہوتا ہے۔

پینگ (Asafoetida)

یہ مرکب دانے دار ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ بو آتی ہے جانوروں میں یہ اینٹی زائی موٹک (Anti Zymotic) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قونج میں اس کو تارپین کے تیل کے ساتھ ملا کر گھوڑوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کی خوراک 20 گرام گھوڑوں میں اور 30 گرام مویشیوں میں ہے۔

جمال گھونہ کے بیج (Croton seeds)

یہ بیج پستے کے بیجوں سے ملتے جلتے ہیں ان میں تیل پایا جاتا ہے جو چشم پر لگتے ہی آبلے ڈال دیتا ہے بہت تیز جلاب آور ہے۔

السی کے بیج (Linseed)

السی کے بیجوں میں سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو روغن السی (Linseed Oil) کہا جاتا ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے یہ قونج میں تارپین کے تیل کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔

تارپین کا تیل (Turpentine Oil)

یہ دیودار، جیڑ کے درختوں سے حاصل ہوتا ہے اس کو السی یا تلوں کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے یہ دافع جراثیم ہے گیس کی پیدائش کو روکتا ہے اور مویشیوں میں اچھارے کے مرض میں استعمال ہوتا ہے اس سے آنتوں کو حرکت ملتی ہے۔

(باقی صفحہ 43 پر)

انگریزی ادویات کے ساتھ ساتھ جانوروں کے علاج معالجہ میں متعدد دلیسی ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں ان ادویات کے بارے میں معلومات، ان کے خواص و فوائد ذیل میں درج کئے گئے ہیں۔

سہاگہ (Borax)

اس کو سوڈیم بوریت کہا جاتا ہے۔ یہ سفید رنگ کی قلمیں ہوتی ہیں۔ یہ طاقتور جراثیم کش دوا (Antiseptic) ہے اور جانوروں میں بیرونی طور پر استعمال ہوتا ہے تاہم منہ کی سوزش میں کبھی کبھار گلیسرین کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔

سوفن (Aniseed)

یہ پودے کے بیج ہوتے ہیں یہ زیادہ تر شاک پاؤڈر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ بدبھومی اور معدے کے مختلف جملہ امراض میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا تیل نکال کر اس کو کارمینٹیو میکچر (Carminative Mixture) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ گھوڑوں اور مویشیوں میں 40 سے 60 گرام تک دیا جاتا ہے جبکہ بھیڑ اور بکریوں میں 15 گرام تک استعمال ہوتا ہے۔

سونٹھ (Ginger)

سونٹھ ادراک کی خشک جڑ کہتے ہیں اس کا تیل اڑنے والا ہوتا ہے اور مقوی معدہ ہے یہ گیس کے اخراج میں دیتا ہے جانوروں میں پاؤڈر کی شکل میں ٹکچر جیڑ کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ خوراک برائے مویشی، گھوڑا 5 سے 10 گرام پاؤڈر کی شکل میں 30 سے 60 ملی لیٹر ٹکچر کی شکل میں۔

کٹھا (Catechu)

یہ مرکب لیکر کے درخت کی ٹہنیوں اور پتوں سے حاصل ہوتا ہے سرخی مائل اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایک الیٹرینجٹ (Astringent) اور کانٹسٹیپٹ (Constipant) کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر اس کو ٹکچر اور جیڑ (Tinc.opium) کے ساتھ ملا دیں تو درد کم کرتا ہے۔

خوراک برائے گھوڑا 70 سے 120 ملی لیٹر ٹکچر کی شکل میں برائے مویشی 15 سے 30 گرام اصلی حالت میں۔

چھالیہ اسپاری (Aricanut)

یہ ایک درخت کے پھل کی گھلیاں ہوتی ہیں جس میں جوہر (Arecoline) ہوتا ہے۔ یہ آنتوں کے کیڑے مارنے کے کام آتا ہے۔ مگر دور حاضر میں اس کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا۔ اس کا جوہر (Arecoline Hydrobromide) گھوڑوں کے قونج اور بڑی آنت کی بندش میں دیتے ہیں۔

افیوم (Opium)

اس کو افیون بھی کہتے ہیں پوست کے ڈوڈوں سے حاصل کردہ دودھ کو خشک کرنے سے جو

پولٹری فارم کو بیماریوں سے بچائیں

آفتاب خان، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد اس کے علاج اور انسداد کے بارے میں خصوصی تدابیر بتا سکتے ہیں۔ بیماری پھیلنے کا دوسرا اہم طریقہ وہ ہے جس میں بیماری کے جراثیم ایک پرندے سے دوسرے پرندے تک کسی واسطے یا ذریعے سے پھیلتے ہیں۔ ان ذرائع میں اہم ترین ذریعہ انسان اور دیگر پرندے، پانی و خوراک کے برتن، فارم کا دیگر ساز و سامان، گرد و غبار، مرغیوں اور انڈوں کو لالے جانے والے کریٹ، ٹوکڑے اور خوراک کی بوریاں وغیرہ ہیں۔ چونکہ مختلف انسانوں نے فارم کے کام سرانجام دینے ہوتے ہیں اور انہیں بیمار و تندرست پرندوں کے کمروں میں آنا جانا پڑتا ہے اس لئے انسان چھوٹ پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ فارم میں ملاقاتیوں اور دیگر لوگوں کی آمد و رفت کی اجازت نہ دی جائے۔ بیماری پھیلنے کے اس دوسرے طریقے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کا پولٹری فارم دوسرے فارموں سے جس قدر الگ تھلک ہوگا اتنا ہی بیماریوں کے انسداد اور روک تھام کے نقطہ نظر سے مناسب ہوگا چونکہ قریب قریب واقع فارموں کے مالکان یا نوکر چاکر ایک دوسرے سے اکثر ملنے رہتے ہیں اسی طرح بیماری کی چھوٹ ایک فارم سے فارم تک بہت جلد اور آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے پولٹری فارم کے قیام سے پہلے اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ فارم کی ایسے علاقے میں کھولا جائے جہاں ارد گرد بہت سے فارم نہ ہوں۔

ایسی صورت میں کسی ملاقاتی کو فارم دکھانا ضروری ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو گم بوٹ پہنائے جائیں جو لازماً فارم کے اندر جانے کیلئے استعمال کیئے جاتے ہیں نیز ان لوگوں کو فارم کی مخصوص ڈانگری بھی پہنائی جائے جو فارم کے دیگر کارکن کام کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ ضروری ہے کہ مرغیوں کے کمرے سے یا شیڈ میں جانے سے پہلے گم بوٹ کو فینائل لوٹن (ایک فیصد) میں صاف کیا جائے اور کمرے کے باہر چوڑے پاؤں میں سے گزر کر لوگوں کو اندر جانے دیا جائے۔ فارم پر کام کرنے والے تمام کارکنوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ کام پر آتے وقت اپنے گھریلو کپڑے اتار کر ڈانگری پہن لیں اور گم بوٹ استعمال کریں یہ ڈانگری اور گم بوٹ لازمی طور پر فارم کے اندر رہنے چاہیے اور کسی صورت بھی انہیں فارم کے باہر نہیں پہنچانا چاہیے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ مرغیوں کے کمرے کے اندر جانے سے پہلے فینائل لوٹن اور چوڑے پاؤں ڈر میں ہر شخص گزرے اور سختی مرتبہ بھی وہ کمرے کے اندر یا باہر آئے ہر مرتبہ اس عمل سے گزرنا چاہیے بظاہر یہ عمل تکلیف دہ اور وقت ضائع کرنے کے مترادف دکھائی دیتا ہے لیکن فارم پر جب ایک مرتبہ اس عمل پر عمل شروع کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کسی فارم پر ایک سے زائد آدمی کام کرتے ہوں تو یہ ضروری ہے کہ بیماری پھیلنے کی صورت میں ایک آدمی کی ڈیوٹی صرف بیمار یا متاثرہ پرندوں پر لگادی جائے۔ اس آدمی کو کسی حالت میں بھی تندرست پرندوں کے کمرے یا شیڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور بیماری کے مکمل خاتمے تک اس آدمی کو لازمی طور پر بیمار پرندوں کی دیکھ بھال تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ پولٹری فارم کا مالک خود بھی مرغیوں کے معائنے کے سلسلے میں جب فارم کے مختلف کمروں یا شیڈوں میں جائے تو اس کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ پہلے وہ فارم کے اس حصے کا معائنہ کرے جہاں سب سے کم عمر چوزے

بیمار پرندے فارم کے دیگر تندرست پرندوں میں بیماری کے جراثیم پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی فارم پر جراثیم کے حامل پرندوں کی موجودگی بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک مستقل ذریعہ ہے جس سے فارم کے پرندوں میں بیماری وقفے کے ساتھ پھیلتی رہتی ہے اس میں تمام اہم متعدی امراض از قسم خونی پیچش، مرغیوں کا ٹائیفائیڈ، مرغیوں کا ہیضہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ قدرتی طریقے سے بیماری پھیلنے کے اس طریقہ کو ختم کرنا تو کسی حد تک ممکن نہیں تاہم اس کے انسداد کیلئے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے چونکہ قدرتی طریقے سے بیماری پھیلنے میں پرندے ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ مختلف اقسام کے پرندوں کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ رکھا جائے۔ مختلف عمر کے چوزوں، نو عمر پرندوں اور بالغ مرغیوں کو کسی صورت میں بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ بالخصوص ان کمروں میں چوزوں یا نو عمر پرندوں کو نہیں رکھنا چاہیے جہاں بڑی عمر کے پرندوں میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں وہ چوزوں یا نو عمر پرندوں کو جلدی لگ جاتے ہیں اور ان کو بیمار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی جگہ یہ ضروری ہو کہ مختلف عمر کے پرندوں کو کسی ایک کمرے میں رکھا جائے یا ایسے کمروں میں چوزوں کو رکھنے کی ضرورت پیش آئے جہاں پہلے بڑی عمر کے پرندے رکھے جاتے تھے تو ان کمروں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے۔ کمروں کی صفائی میں نہ صرف فرش اور دیواروں کو جراثیم کش ادویات سے دھونا چاہیے بلکہ مختلف ادویات کا سپرے بھی کرنا چاہیے۔ بیماری کے انسداد کے ضمن میں یہ ضروری ہے کہ فارم کے باہر کی مرغیوں کو کسی صورت میں بھی فارم میں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ اسی طرح کسی اور جگہ سے خرید کردہ مرغیوں کو بھی فارم میں نہیں لانا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک دفعہ فارم کی مرغیوں کو فارم سے باہر کسی بھی مقصد کیلئے لے جایا جائے تو انہیں دوبارہ فارم واپس نہیں لانا چاہیے کیونکہ وہ پرندے باہر سے مختلف امراض کے جراثیم لاکر فارم کے تندرست پرندوں کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا استعمال شدہ فرش برادہ وغیرہ کسی صورت میں بھی دوسری دفعہ مرغیوں کی پرورش کیلئے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس فرش برادہ میں مختلف بیماریوں کے جراثیم اور کیڑے موجود ہوتے ہیں اور اس طریق پر تندرست پرندوں میں وہ بیماری پھیل سکتی ہے۔

اس بات کا خیال پانی اور خوراک کے برتنوں کیلئے بھی کرنا ضروری ہے لیکن چونکہ برتنوں وغیرہ کی تبدیلی ہر دفعہ نہیں کی جاسکتی اس لئے ضروری ہے کہ پرندوں کے پانی اور خوراک کے برتن دوبارہ استعمال میں لانے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لئے جائیں اور تمام برتنوں کو فینائل لوٹن یا پوٹاشیم پرمینگنیٹ لوٹن سے اچھی طرح دھو کر انہیں دھوپ میں خشک کر لیا جائے۔ اس چیز کا اطلاق ان پولٹری فارموں پر بھی ہوتا ہے جہاں ایک دفعہ متعدی بیماری پھیل گئی ہو۔ اس قسم کے فارموں کی عمارات کو اس وقت تک دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک ان کی اچھی طرح سے صفائی نہ کر لی گئی ہو۔

ایسی صورت میں کہ کسی فارم میں کوئی بیماری مسلسل ایک عرصہ سے چلی آ رہی ہو تو اس کی تشخیص اور پرندوں کے علاج کیلئے محکمہ پرورش حیوانات کی کسی لیبارٹری سے رجوع کیا جائے جو تمام حالات کا

نمک	6 کلوگرام	پھٹکری	175 گرام
راب یا شیرہ	1/4 گیلن		
یہ فارمولا کڑی کی چھت اسپیسٹاس سینٹ کی چھت وغیرہ کیلئے مفید خیال کیا گیا ہے۔			
دھات کی چادروں سے بنائی گئی چھتوں کیلئے درج ذیل فارمولا استعمال کیا جاسکتا ہے۔			
بجھا ہوا چونا	25 کلوگرام	پانی	6 گیلن
سریش	ڈیڑھ کلوگرام	چونا	3 کلوگرام
نمک	6 کلوگرام	پھٹکری	175 گرام
شیرہ یا راب	2 گیلن	پانی	10 گیلن

مرغیوں وغیرہ کو لے جانے کیلئے جو کریت، پنجرے ٹوکرے استعمال ہوتے ہیں چونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے ہوتے ہیں اس لئے اس امر کا امکان ہوتا ہے کہ ان میں کسی جگہ سے بیماری کے جراثیم کی چھت لگ جائے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے تمام کمریوں، پنجروں وغیرہ کو کسی مناسب دوائی سے سپرے کیا جائے۔ ماہرین نے نیووان نامی دوائی کی 0.15 فیصد لوشن سپرے کرنے کی سفارش کی ہے چونکہ مرغیوں میں بیماری کے جراثیم پھیلانے میں دیگر پرندے از قسم چڑیاں اور کوئے وغیرہ بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ فارم میں اس قسم کے تمام پرندوں کی آمدورفت کو کم سے کم کیا جائے۔

مختلف متعدی امراض سے بچاؤ کیلئے اس قسم کے حفاظتی ٹیکے یا ویکسین موجود ہیں جن کے بروقت استعمال سے مرغیوں میں متعدی امراض کے وقوع کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے امراض میں رانی کھیت، ہیضہ، چچک وغیرہ چند اہم امراض ہیں جن سے پرندوں کو محفوظ رکھنے کیلئے پرندوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے چاہیے۔

یاد رہے کہ پاکستان میں درج بالا امراض کے حفاظتی ٹیکے یا ویکسین بنائی جاتی ہے۔ پولٹری فارم میں ویکسین کرانے کا انتظام اکثر و بیشتر خوراک بنانے والی کمپنی یا جہاں سے چوزے خریدے تھے اس پمپری کا نمائندہ کر دیتا ہے تاہم ٹیکہ لگانے کا کام بہت مشکل بھی نہیں۔ ایک عام آدمی ایک مرتبہ اس تمام کام کو دیکھ کر بعد میں اپنی مرغیوں کو خود ہی ٹیکہ لگا سکتا ہے۔

بھیڑا بکری 4 تا 8 گرام

سنا کے پتے (Senna Leaves)

سنا کے پتے اور پھلیوں کا پاؤڈر استعمال ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی قبض کشا ہوتا ہے۔

گونڈ کتیرا (Tragacanth)

یہ گوند درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا بلکہ نرم ہو کر پھول جاتا ہے اور اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے یہ مورے اور آنتوں میں اندرونی اسٹرکونگ (Coating) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

سنت پودینہ (Menthol)

یہ قلمیں پودینے کے تیل کو ٹھنڈا کرنے پر حاصل ہوتی ہے خوشبودار ہوتی ہیں اور منہ کو ن کرا دیتی ہیں۔ یہ بیرونی جلد پر خراش پیدا کرتا ہے جلد کو سرخ کر دیتا ہے لیکن بعد میں اس گلد کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کو پاؤڈر کا فورمین ملا کر حاصل ہوتا ہے جو گرمی دانوں کو ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ہوں اس کے بعد بڑے چوزوں شید میں جائے اور پھر بالغ مرغیوں کے شید میں جائے تاکہ بیماری کی چھت بڑے پرندوں سے چھوٹی عمر کے پرندوں کو نہ لگ سکے۔ چونکہ بڑی عمر کے پرندوں کو چھوٹی عمر کے چوزوں سے بیماری نہیں لگ سکتی اس لئے اس ہدایت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی وجہ سے مالک دوبارہ چھوٹی عمر کے چوزوں کے کمرے میں جانا پڑے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی ان تمام ہدایات پر عمل کرے دوسرے لوگوں کیلئے بنائی گئی ہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے دیگر لوگوں اور فارم کے ملازمین میں اس ہدایت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔

انسانوں کے بعد بیماری کے جراثیم پھیلانے میں اہم حیثیت خوراک اور پانی کے برتنوں کو حاصل ہے۔ اس بات کی احتیاط کرنی بہت ضروری ہے کہ بیمار پرندوں کے برتن تندرست پرندوں کے برتنوں سے علیحدہ رہیں اور کسی صورت میں انہیں آپس میں نہیں ملانا چاہیے۔ اگرچہ بیماری کے انسداد کے نقطہ نظر سے یہ ضروری ہے کہ فارم کے تمام پرندوں کے برتنوں کو روزانہ نہیں تو کم از کم دوسرے دن اچھی طرح سے دھویا جائے۔ بیماری کی صورت میں متاثرہ پرندوں کے برتن روزانہ اچھی طرح سے فینائل لوشن یا پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے ایک فیصد محلول سے دھوئیں جائیں اور انہیں دھوپ میں خشک کیا جائے اس طرح دیگر پرندوں کے برتنوں کو بھی دھونے کیلئے ان ادویات کا محلول استعمال کریں اور برتنوں کو دھوپ میں خشک کیا جائے۔ خوراک اور برتنوں کی صفائی کے بعد یہ ضروری ہے کہ فارم کی دیگر عمارات کی صفائی کی جانب توجہ دی جائے۔ بیماری کے انسداد کے نقطہ نظر سے یہ بہت ضروری ہے کہ پرندوں کو صاف ستھرے ماحول میں پروان چڑھایا جائے۔ عمارات کی صفائی کے ضمن میں کمروں اور شیدوں میں سفیدی کرانی بہت ضروری ہے۔ فارم کی عمارت میں سفیدی کرنے کیلئے ذیل میں چند فارمولے درج کیئے جا رہے ہیں۔ جن سے سفیدی تیار کرتے وقت مدد لی جاسکتی ہے۔

سفیدی کیلئے عام طور پر بجھا ہوا چونا استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ یہ بذات خود جراثیم کش اثر رکھتا ہے اور اس سے جراثیم اور کیڑے وغیرہ تلف ہو جاتے ہیں تاہم اس میں مختلف جراثیم کش ادویات از قسم فارلین ملانے سے اس کی جراثیم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 23 کلوگرام چوئے میں سوا کلوگرام فارلین (خاص) استعمال کرنے سے عمدہ نتائج حاصل کیئے جاسکتے ہیں۔

بجھا ہوا چونا 25 کلوگرام پانی 6 گیلن

بقیہ: دیسی ادویات سے جانوروں کا کامیاب علاج معالجہ

خوراک گھوڑا 30 تا 60 ملی لیٹر

بھیڑا بکری 5 تا 10 ملی لیٹر

کچلہ (Nuxvomica)

یہ مرکب ایک درخت سٹریچنوس کسمو ویکا (Strychnes Nuxvomica) سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک سخت قسم کا زہر ہوتا ہے مگر مناسب مقدار میں دینے سے جانوروں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے یہ پاؤڈر اور ٹکچر دونوں اشکال میں استعمال ہوتا ہے اگر زیادہ مقدار میں دے دیا جائے تو اس سے جھکے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔

خوراک

گھوڑا 15 تا 25 گرام مویشی 25 تا 30 گرام

شجرکاری کا آسان طریقہ

شجر اہل مقصود احمد بسراء، حافظ مسعود احمد..... فیکلٹی آف ایگریکلچر، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

فراش، بیر، کپنار اور پیلو کے درخت انتہائی موزوں سمجھے جاتے ہیں جبکہ وسطی اور شمالی پنجاب میں مورنگا، شیشم، نیم، بکائن جامن، بیر، پاپلر، شہتوت، ارجن، گولڈمور، المٹاس، کپنار، نیلم، گل نشتر، انجیر اور کپنار جیسے درخت لگانے چاہئیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں جیڑ، کیل، پرنٹل، سپروس، صنوبر، چلغوزہ، اخروٹ، سیب، ناشپاتی، آڑو اور آلو بخارہ کے پودے لگائے جائیں۔ پاکستان کے کچھ خاص درختوں کا تعارف اور لگانے کا طریقہ حسب ذیل ہے۔

(1) مورنگا (سومانجا)

سومانجا ایک کثیرالمقاصد تیزی سے بڑھوتری حاصل کرنے والا درخت ہے جس کی غذائی اور ادویاتی افادیت پاکستان میں پائے جانے والے درختوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بیج مٹی سے اگست تک پلاسٹک کی تھیلیوں میں لگائے جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیوں میں تیار شدہ پودے جن کا قدم از کم ڈیڑھ فٹ ہوں مختلف مقامات پر 10x10 فٹ کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔ اگر وسیع پیمانے پر بطور فصل کاشت مقصود ہو تو پھر ایک ایک فٹ کے فاصلے پر لگانے چاہئیں۔

(2) نیم

نیم ایک تیزی سے بڑھنے والا، زیادہ روشنی چاہنے والا اور کورے سے بچنے والا درخت ہے۔ اس کے بیج وسط جون سے وسط جولائی کے درمیان تھیلیوں میں اگائے جاتے ہیں۔ نیم کے بیجوں کی قوت نمو صرف ایک مہینہ ہوتی ہے اس لئے اس کے بیجوں کو ایک مہینے سے زیادہ محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ زمری میں تیار کردہ پودے جن کی لمبائی کم از کم ایک فٹ ہو چکی جگہوں پر جولائی اگست یا پھر فروری مارچ میں 9 انچ گہرے گڑھے کھود کر لگائے جاتے ہیں۔ نیم کو پاکستان کا سنہری درخت قرار دیا جاتا ہے۔

(3) بکائن یا دھریک

بکائن ایک گہرے سبز رنگ والا، گہرے سائے والا، کثیر پنکھی، تیز روشنی میں پھلنے والا درخت ہے۔ بکائن گرمی کے موسم میں تیزی سے نشوونما پاتا ہے جبکہ سردیوں میں اپنے پتے مکمل طور پر جھاڑ دیتا ہے۔ نیم کے برعکس بکائن کے بیجوں کو سال ہا سال تک محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ بکائن کے مکمل طور پر پکے ہوئے بیج فروری، مارچ میں زمری میں پلاسٹک کی تھیلیوں یا پھر براہ راست زمین میں پٹریوں پر لگائے جاتے ہیں۔ پھر 6 ماہ بعد یعنی جولائی اگست میں جہاں شجرکاری کرنا مقصود ہو وہاں لگائے جاتے ہیں۔

(4) سرس یا شیریں

سرس ایک پھلی دار، سردیوں میں پتے جھاڑنے والا، کثیر پنکھی، سنہری پھولوں والا درخت ہے۔ سرس کی پھلیاں مٹی، جون میں پک کر پیلے رنگ کی ہو جاتی ہیں جنہیں جون، جولائی میں زمری میں کاشت کر کے اگلے سال فروری، مارچ یا پھر جولائی، اگست میں، پودے مطلوبہ جگہوں پر لگائے جاتے ہیں۔ سخت گرمی اور وافر پانی کی موجودگی میں یہ درخت چند دنوں میں چھلانگیں لگاتا ہوا یعنی تیزی سے بڑھتا ہوا کافی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ سرس لگا کر اسے وافر پانی دیں یہ اتنی تیزی سے بڑھے گا کہ آپ کو نوکارس کو بھول جائیں گے۔

درخت کسی ملک و قوم کا انتہائی قابل قدر اور قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور ملک کی اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی حالت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ درخت ہی تو ہیں جن کی بدولت ہمیں صاف ہوا، غذا اور پانی کے ساتھ ساتھ عمارتی لکڑی، فرنیچر، ایندھن، نباتاتی ادویات، پھل، سبزیاں اور میوہ جات حاصل ہوتے ہیں۔

قدرتی ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لئے کم از کم 25 فیصد جنگلات کی ضرورت ہوتی ہے مگر وطن عزیز میں جہاں زیادہ تر ادارے تباہ ہو چکے ہیں وہیں جنگلات کی مسلسل کٹائی اور مناسب منصوبہ بندی کے فقدان سے جنگلات کم ہوتے ہوئے 4 فیصد کی خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں اور ماہرین کے مطابق اگر یہ حالات رہے تو 50 سال بعد جنگلات ایک فیصد سے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں خطے میں مسلسل گرمی میں اس قدر اضافہ اور آلودگی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ ایسی صورت نہ بن جائے کہ یہ خطہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس مسئلے کا واحد حل جنگلات میں اضافہ ہی ہے جو عوامی سطح پر ایک تحریک کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اگست کا مہینہ درختوں کی بوائی کیلئے بہترین ہوتا ہے اور 18 اگست کو عالمی شجرکاری کا دن منایا جاتا ہے جس کی کارکردگی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ 14 اگست پاکستان کا قومی دن ہے جس میں ملک بھر میں سبز ہلالی جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 18 اگست کی بجائے 14 اگست کو ہی شجرکاری کا قومی دن منانے کا اہتمام کیا جائے اور حکومتی سطح پر اس کی منظوری دی جائے۔ اگر سرکاری اور عوامی سطح پر منظم انداز سے شجرکاری کی جائے تو چند سالوں میں ہی ہم جنگلات کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال ہم ایک نعرہ متعارف کروا چکے ہیں جو شوشل میڈیا پر پھر پوز پڑیائی حاصل کر چکا ہے۔

”ملک کو جھنڈیوں سے زیادہ درختوں کی ضرورت ہے“

”14 اگست ایک قومی دن - ایک قومی شجرکاری دن“

پاکستان میں موجودہ آبی بحران اور گرمی کی شدت پر قابو پانے کا ایک پائیدار حل وسیع پیمانے پر شجرکاری میں مضمر ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ حضور ﷺ کے نام پر، پیارے وطن پاکستان کے نام پر، اپنے والدین کے نام پر، اپنے اساتذہ اور پیاروں کے نام پر، اپنے اور اپنی اولاد کے نام پر ایک ایک درخت لازمی لگائے اور خاص طور پر اس 14 اگست پر سبز جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ سبز پودے لگا کر ہم یہ عزم کریں کہ جس طرح ہمارے آب و اجداد نے ایک جدوجہد کر کے غلامی سے نجات حاصل کی تھی اسی طرح ہم بھی شجرکاری کر کے گرمی کی شدت، آبی قلت اور آلودگی سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے درخت لگانے چاہئیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی درخت اُس علاقے کی آب و ہوا کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں وہ لگانے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی درخت ایسا پیدا نہیں کیا جو آکسیجن خارج نہ کرتا ہو اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب نہ کرتا ہو۔ تاہم کسی بھی علاقے کے مقامی درختوں (Native species) کو ترجیح دینی چاہیے اور اسی طرح ایک ہی قسم کے درخت لگانے کی بجائے مختلف اقسام کے درخت لگانے چاہئیں۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے لئے مورنگا، شیشم، بیکر، المٹاس، بکائن، آم، جامن، جنڈ،

5) کچنار

زیادہ ہوں گے اتنی ہی اس کی آبی ضرورت بھی زیادہ ہوگی اس لحاظ سے جامن کے درخت کا سائز بھی بڑا، پتوں کی تعداد بھی زیادہ اور پتوں کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جامن سیلابی اور سیم زدہ زمینوں کے لئے بہترین انتخاب ہے۔ اس پر مستزاد اس کی سدا بہاری عادت (Evergreen nature) سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ جامن کو تر استوائی اور نیم استوائی علاقے کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے جو جولائی، اگست میں وافر مقدار میں پھل دیتا ہے۔ جامن بھی اُن چند ایک درختوں میں شامل ہے جس کی جڑ، تنا، چھلکا، شاخ، پتے اور پھل سمیت ہر چیز کسی نہ کسی استعمال میں آکر بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جامن کی کاشتکاری جولائی، اگست میں پہلے زمری میں کی جاتی ہے پھر چھ ماہ بعد یا سال بعد پودوں سے جہاں ضرورت ہو وہاں پر شجرکاری کی جاتی ہے۔

10) شہتوت

ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور دنیا میں سب سے اعلیٰ قسم کی ہاکی شہتوت کی لکڑی سے بنتی ہے لہذا ہم ایک اعلیٰ قسم کی شہتوت کی لکڑی پیدا کر کے، اعلیٰ قسم کی ہاکیاں اور یہ اعلیٰ قسم کی ہاکیاں ذہین کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں تھا کر اپنے قومی کھیل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا آئیڈیا میں نے ایک شاعر باکمال کے ایک شعر سے لیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو

کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا

بہر حال شہتوت کی شجرکاری بیج اور قلم دونوں طریقوں سے کی جاتی ہے تاہم قلمیں فروری، مارچ اور بیج اپریل، مئی میں لگائے جاتے ہیں اور ان پودوں سے شجرکاری جولائی اگست یا پھر اگلے فروری مارچ میں کی جاتی ہے۔

11) شیشم یا ہلی

شیشم ایک وسیع جغرافیائی رینج رکھنے والا، پاکستان میں فرنیچر کے لئے سب سے معیاری لکڑی مہیا کرنے والا اور زمین کی زرخیزی بڑھانے والا پھلی دار پودوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا درخت ہے۔ زرعی زمینوں پر لگانے کے لئے اپنا ثنائی نہیں رکھتا۔ اسلام آباد کے پیپ ملبری کا ایک زبردست متبادل ہے۔ پہاڑی، نیم پہاڑی، میدانی اور دریائی علاقوں کی جان ہے۔ ایگر و فارسٹری کی آن بان اور شان ہے۔ آبپاشی والے جنگلات کی معیشت کا سر تاج ہے اور محکمہ جنگلات کی زمریوں سے لاکھوں کی تعداد میں ادھر ادھر گئے کے لئے ہر وقت تیار ہے بشرطیکہ وافر مقدار میں پانی میسر ہے اور اگر پانی دستیاب نہیں بھی ہے تو بھی فکر نہ کریں۔ اس کا متبادل فراش کا درخت کم پانی میں بھی اچھے نتائج دینے والا ایک درخت سمجھا جاتا ہے۔

12) فراش یا اکاں

اسے فراش، کھگل یا اکاں بھی کہا جاتا ہے۔ اکاڑہ کا نام بھی اکاں واڑہ سے کم ہو کر اکاڑہ بن گیا کیونکہ پرانے وقتوں میں اکاڑہ میں اکاں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا تھا۔ فراش پاکستان کے انتہائی بلندی والے پہاڑی علاقے چھوڑ کر باقی ہر علاقے اور صوبے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے تبدیل ہو کر تاروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ چیز کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس درخت میں بیک وقت پانی کی کمی اور نمکیات کی زیادتی برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ زمری میں اسے زیادہ تر قلموں سے تیار کیا جاتا ہے۔ فروری، مارچ میں لگائی ہوئی قلمیں جولائی، اگست میں پودے بن کر شجرکاری کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

(باقی صفحہ 36 پر)

کچنار ایک سدا بہار، سادہ پتوں پر مشتمل، پھلی دار، سفید اور ہلکے جانی رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والا انتہائی خوبصورت درخت ہے۔ اس کے پھول اور ڈوڈیاں سبزی کے طور پر پکا کر کھائے جاتے ہیں جو ذائقے میں اپنا ثنائی نہیں رکھتے۔ اس کا پتا دو نصف کڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کی شکل دل سے مشابہہ ہے کچنار کے پھول نومبر، دسمبر میں جس وقت کسی اور پودے پر پھول بہت کم دکھائی دیتے ہیں اپنی بہار دکھاتے ہیں اور دیکھنے والوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ یہی کچنار کے پھول پک کر پھلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور مارچ کے اوائل تک یہ پھلیاں ہمیں بیج مہیا کرتی ہیں جنہیں ہم اپریل سے جولائی تک زمری میں تھیلیوں میں لگا کر پودے حاصل کرتے ہیں اور بطور خاص شہری شجر کاری میں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پودا پہاڑی، نیم پہاڑی اور میدانی و ساحلی علاقوں میں ہر جگہ لگایا جاتا ہے۔

6) المٹاس

المٹاس سردیوں میں کسی حد تک پتے بھاڑنے والا درخت ہے جو کبھی بھی مکمل طور پر پتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا مرکب پتہ 4 سے 6 بڑے سائز کی پتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے گہرے پیلے رنگ کے پھول تھارا ندر قطار ایک با ایک لمبی ڈنڈی کے ساتھ یوں لگے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کسی نے پھولوں کا ہار پرویا ہوا ہو۔ اس کی پھلیوں کی لمبائی بعض اوقات دو فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے جس میں بیج تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مئی، جون میں المٹاس کا درخت اس طرح پھولوں سے لدا ہوتا ہے جس طرح کوئی امیر کبیر گھرانے کی دلہن زیورات سے لدی ہوئی ہو۔ ان میں سے کچھ پھول پھلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ پھلیاں نومبر، دسمبر میں ہمیں بیج مہیا کرتی ہیں جنہیں ہم فوراً لگا کر موسم برسات تک شجرکاری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

7) گولڈموریا گل مہر

گولڈموریا ایک گہرے سبز رنگ کا ڈبل مرکب کثیر پیکھی پودا ہے جس کی دو اقسام میں سے ایک قسم چھوٹے بھاڑی نما پودوں پر مشتمل ہے جبکہ دوسری قسم چھتری نما شامیانہ برگ والے بڑے درختوں پر مشتمل ہے جس کے پھول مئی، جون میں آتش فشاں کا منظر پیش کرتے ہیں اس کی پنکھڑیوں کی بناوٹ کومور پرندے کی پنکھڑیوں سے مشابہہ ہونے کی وجہ سے گولڈموریا کا نام دیا گیا ہے۔ گولڈموریا باغات اور پارکوں میں شجرکاری کے لئے ایک انتہائی موزوں درخت ہے جسے زمری میں تھیلیوں یا گملوں میں تیار کر کے موسم بہار اور موسم برسات میں شجرکاری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

8) گل نشتر

گل نشتر کا پتہ بھی ڈھاک کے پتے کی طرح تین پتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک پھلی دار، شوخ سرخ رنگ کے پھولوں والا، تیزی سے بڑھنے والا، آبی ذخیروں اور آبی گزرگاہوں کے قریب پایا جانے والا درخت ہے۔ جس کے پودے بیج اور قلم دونوں طریقوں سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس کی قلمیں پودے تیار کرنے کے لئے فروری، مارچ میں لگائی جاتی ہیں جبکہ بیج کی کاشت جولائی میں کی جاتی ہے لہذا قلم والے پودے جولائی، اگست میں شجرکاری کے کام آئیں گے جبکہ بیج والے پودے فروری، مارچ میں کام آئیں گے۔ یاد رہے کہ گل نشتر کورے کی شدت کو تو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے لیکن پانی کی قلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔

9) جامن

قدرت کا ایک اصول یاد رکھیں کہ جس درخت پر پتے، جتنے بڑے سائز کے اور تعداد میں

ٹریکٹر کی دیکھ بھال

عبدالغفور، نذر حسین، عرفان اشرف، گلستان شیر..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- ٹریکٹر کی صحیح دیکھ بھال اور صحیح استعمال سے اس کی زندگی بڑھائی جاسکتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹریکٹر کا کونسا پرزہ یا حصہ خراب ہے تاکہ اس کی بروقت مرمت کروائی جاسکے اور کسی بڑے خرچے اور پریشانی سے بچا جاسکے۔ اس لئے ہر ٹریکٹر ڈرائیور کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹریکٹر اور دیگر زرعی آلات کی کارکردگی، مرمت، آئل اور فلٹروں کی تبدیلی کا ریکارڈ بطور یادداشت لاگ بک میں درج کرے تاکہ بروقت دیکھ بھال ہو سکے اور آئل اور فلٹروں کو بروقت تبدیل کیا جاسکے۔
- ٹریکٹر کی دیکھ بھال کے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔**
- 1- روزانہ یعنی ہر دن گھنٹے بعد کی دیکھ بھال
 - 2- ہفتہ وار یعنی ہر پچاس گھنٹے کی دیکھ بھال
 - 3- ماہانہ یعنی ہر سو گھنٹے بعد کی دیکھ بھال
 - 4- سالانہ یعنی ہر ہزار گھنٹے کی دیکھ بھال
- روزانہ یعنی ہر دن گھنٹے بعد کی دیکھ بھال (Daily Maintenance)**
- 1- ڈیزل ٹینک میں ڈیزل کی مقدار چیک کریں اگر کم ہو تو ڈیزل بھریں۔
 - 2- ریڈی ایٹر میں پانی کی سطح چیک کریں اگر کم ہو تو پورا کریں۔
 - 3- انجن آئل پمپ میں موئل آئل کی سطح بڑھائیے چیک کریں۔ اگر کم ہو تو پورا کریں۔
 - 4- ایئر کلیئر میں آئل کی سطح اور حالت چیک کریں۔ اگر ضرورت ہو تو آئل باؤل صاف کریں اور آئل تبدیل کر کے آئل باؤل کو باڈی کے ساتھ اچھی طرح کس دیں۔
 - 5- ایئر کلیئر کے ہوز پائپ صحیح کسے ہوئے چاہیں۔
 - 6- پری ایئر کلیئر کو صاف کریں۔
 - 7- ٹائروں میں ہوا کا دباؤ چیک کریں۔ اگلے ٹائروں میں 24 تا 28 PSI پونڈ فی مربع انچ اور پچھلے ٹائروں میں 14 تا 18 PSI دباؤ ہونا چاہیے کھیتوں میں ہوا کا دباؤ کم جبکہ سڑک پر زیادہ ہونا چاہیے۔
 - 8- بیٹری میں الیکٹرولائٹ (محلول) کی سطح چیک کریں۔ یہ سطح پلیٹوں سے 3 ملی میٹر تک اوپر ہونی چاہیے۔
 - 9- ٹریکٹر کے کسی حصے سے ڈیزل، موئل آئل یا پانی کا اخراج ہو تو اسے بند کریں۔
 - 10- ٹریکٹر کے اطراف بغور معائنہ کریں اگر کوئی نٹ یا بولٹ ڈھیلا ہو تو کس دیں۔
 - 11- ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بریک، کلچ، اسٹیرنگ، لائٹیں اور انڈیکیٹر وغیرہ چیک کریں کوئی نقص ہو تو دور کریں۔
 - 12- ٹریکٹر کو اچھی طرح صاف کریں۔
- ہفتہ وار یعنی ہر پچاس گھنٹے بعد کی دیکھ بھال (Weekly Maintenance)**
- 1- گرین گن کے ذریعہ تمام گرین نیلز میں گرین بھریں۔ گرین ہمیشہ اچھی کوالٹی کا استعمال
- ماہانہ یعنی ہر سو گھنٹے کی دیکھ بھال (Monthly Maintenance)**
- 1- روزانہ اور ہفتہ وار دیکھ بھال مکمل کریں۔
 - 2- انجن آئل سمپ کا آئل تبدیل کریں۔
 - 3- آئل فلٹر تبدیل کریں۔
 - 4- دونوں مینول فلٹر تبدیل کریں۔
 - 5- ایئر کلیئر کا آئل باؤل (پیالہ) صاف کریں اور آئل تبدیل کریں۔
 - 6- ہائیڈرولک فلٹر صاف کریں۔
 - 7- فرنٹ ویل الائنمنٹ (Front Wheel Alignment) چیک کروائیں۔ ضرورت ہو تو ایڈجسٹ کروائیں۔
 - 8- گیئر بکس، ڈیفریینشل اور ہائیڈرولک سسٹم کا آئل چیک کریں۔ کم ہو تو پورا کریں۔
 - 9- بیٹری ٹرمینل (Battery Terminal) صاف کریں اور گرینس (Grease) لگائیں۔
 - 10- فین کلیئرنس (Tappet Clearance) چیک کریں ضرورت ہو تو ایڈجسٹ کریں۔
- سالانہ یعنی ہر ہزار گھنٹے بعد کی دیکھ بھال (Yearly Maintenance)**
- 1- ٹریکٹر کی سالانہ دیکھ بھال کسی ماہر میکانک یا ٹریکٹر ڈیلر سے کروائی جائے۔
 - 2- ٹریکٹر کی روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ دیکھ بھال مکمل کریں۔
 - 3- انجن آئل سمپ کا تیل تبدیل کریں۔
- (باقی صفحہ 20 پر)

قیوٹا کلرٹری زمینوں کے لئے ایک ابھرتی ہوئی فصل

پی ایچ ڈی سکالر: شاہد اقبال نگران: ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسراء شعبہ: ایگرونی

پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ باسٹھ لاکھ ایکڑ قیوٹا کلرٹری اور تھوڑے سا متاثرہ علاقہ رقبہ بینٹھ لاکھ ایکڑ ہے ان میں سے کچھ رقبہ جزوی طور پر زیر کاشت ہے جبکہ بیشتر حصہ ویران اور بے آباد پڑا ہے۔ سارے زرعی رقبہ کی اصلاح کر کے قابل کاشت بنانا زمیندار کے بس میں اور نہ ہی حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں اس لئے اب نئی سوچ یہ ہے کہ اس رقبے کو اسی حالت میں نمکین زراعت (Saline Agriculture) کے ذریعے استعمال میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قدرت نے کچھ پودوں میں کلر کے خلاف قوت برداشت پیدا کر کے انہیں اس قابل بنادیا ہے کہ یہ درمیانی متاثرہ زمینوں میں اپنی بڑھوتری کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس لئے ان فصلوں کا انتخاب کر کے انہیں متاثرہ زمینوں میں اگایا جاسکتا ہے۔ ان منتخب فصلوں میں ایک فصل قیوٹا بھی ہے۔ قیوٹا غذا کی اہمیت کے اعتبار سے ایک منفرد فصل ہے۔ اس کے دانوں میں باقی فصلوں کی نسبت چار سے پانچ فیصد پروٹین زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اور ضروری عناصر مثلاً زنک، آئرن اور کلسیم کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ غذائی فصل کے علاوہ یہ مختلف صنعتوں مثلاً ادویات اور کاسمیٹکس میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مزید برآں یہ موسم کی شدت اور تغیرات کو برداشت کرنے صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ قیوٹا کا پودا چار سے پانچ فٹ لمبا ہوتا ہے اور اسکی جڑیں زمین میں ایک فٹ تک گہری چلی جاتی ہیں جہاں سے یہ ضرورت کے مطابق پانی اور نمکیات جذب کرتا رہتا ہے۔ تنے پر سٹے لگتے ہیں جن میں بیج / دانے پیدا ہوتے ہیں اور اس فصل کا دورانیہ 120 دن سے 140 دن تک ہوتا ہے۔ قیوٹا بنیادی طور پر لاٹینی امریکہ کی فصل ہے لیکن اسکی بے پناہ خوبیوں کے مد نظر لیبارٹری کے متبادل فصلات شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زرعی سائنسدانوں نے اپنی آٹھ سالہ انتھک محنت سے اسے پاکستان بھر میں متعارف کروایا ہے۔ اور تجربات کے دوران اس کی کچھ ایسی اقسام بھی منتخب کی گئی ہیں جو ہماری کلرٹری زمینوں پر اچھی پیداوار دے سکتی ہیں اب یہ فصل پاکستان کے ہر صوبہ میں کاشت ہو رہی ہے۔ اس کی کامیاب کاشت کیلئے درج ذیل نکات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔

وقت کاشت

قیوٹا کی کاشت رجب کے موسم میں کی جاتی ہے۔ بہترین پیداوار حاصل کرنے کیلئے اسے 15 نومبر سے 15 دسمبر تک کاشت کر لینا چاہیے جبکہ شمالی علاقہ جات میں سے اپریل میں کاشت کرنا چاہیے۔

زمین کی تیاری اور طریقہ کاشت

دو سے تین بار عام بل چلا کر زمین کو نرم کر کے سہاگہ کی مدد سے ہموار کیا جائے اور اس کی کاشت قطاروں میں یا ڈٹوں پر کی جائے۔ قطار سے قطار کا فاصلہ ڈھائی سے تین فٹ ہونا چاہیے۔ قطاروں میں کاشت کیرا کے طریقہ سے جبکہ ڈٹوں کے دونوں اطراف پر چوبی کی مدد سے کی جائے جس سے پودوں کا آپس میں درمیانی فاصلہ چار سے چھ انچ ہونا چاہیے۔ کلرٹری زمینوں میں اسکی کاشت ڈٹوں پر زیادہ دیکھی گئی ہے۔ بیج زیادہ گہرائی تک کاشت نہ کیا جائے۔ اس کی گہرائی 3 سے 5 سنٹی میٹر ہونی چاہیے۔ شرح بیج دو سے تین کلوگرام فی ایکڑ ہونی چاہیے۔

کھادوں کا استعمال

زمین کی تیاری کے وقت ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کرنی چاہیے اور آدھی بوری یوریا دوسرے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

آپاشی

اس فصل کو دو سے تین بار آپاشی کی جاتی ہے۔ فصل اگنے کے تیس دن بعد پہلا پانی، دوسرا پانی پہلے پانی کے چالیس دن بعد اور اگر ضرورت ہو تو تیسرا پانی بوائی کے سودن بعد لگانا چاہیے۔

جزی بوٹیوں کی تلفی

فصل کے شروع شروع میں جزی بوٹیاں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں جن کا تذکرہ وقت پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جزی بوٹیوں کی تلفی پہلے پانی کے بعد وتر آنے پر گوڈی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس دوران قیوٹا کے پودے کی شناخت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہاتھو سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔

حشرات

اس فصل پر ابھی تک کوئی بیماری یا حشرات کا حملہ سامنے نہیں آیا ہے۔

کٹائی اور گہائی

قیوٹا کی فصل عام طور پر اپریل کے پہلے ہفتے میں پک کر کٹائی کیلئے تیار ہو جاتی ہے جب پچاس فیصد پودے کی رنگ سبز سے بھوری یا سرخی مائل ہو جائے تو کٹائی کر لینی چاہیے۔ اسے عام طور پر درختی سے کاٹا جاتا ہے۔ کٹائی کے بعد اسے کھیت میں تین سے پانچ دن کیلئے مزید خشک کر کے عام گندم والی تھریشر سے اکی گہائی کی جائے۔ اس کے علاوہ دھان کی طرح ڈرموں پر مار کر بھی اس کے دانوں کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

ذخیرہ

قیوٹا کے دانوں کو نمی سے پاک تھیلیوں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ذخیرہ کی جگہ کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور نمی 35% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

مناسب بندوبست کے ذریعے کپاس کے پتہ مروڑ وائرس کا علاج

پی ایچ ڈی سکالر: فدا حسین نگران: ڈاکٹر ریاض احمد شعبہ: ایگرونی

کپاس کو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کا شمار کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں کپاس کی پیداوار کم ہونے کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ پتہ مروڑ وائرس ہے یہ بیماری ایک خاص قسم کے وائرس "بیگمو وائرس" سے پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کیلئے کافی کوششیں کی گئیں جن میں نئی وراثیوں کا متعارف کرانا اور شعاعوں کے ذریعے علاج وغیرہ شامل ہیں تاکہ ہم کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی حتیٰ کہ بی ٹی کاٹن بھی اس بیماری کے حملے سے محفوظ نہ رہ سکی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بیماری کا علاج مناسب بندوبست (Managment) بیج بونے کا مناسب طریقہ وراثی اور پودوں کی موزوں تعداد کے ذریعے کیا جائے (اس پر بہت کم کام ہوا ہے) چنانچہ 2010ء میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فلاح (ایگرونی) کے تجرباتی ایریا میں دو سال کیلئے ایک نہایت عمدہ تجربہ لگایا گیا۔ اس تجربے میں کاشت کے دو طریقے (پڑیوں اور ہموار زمین پر کاشت) پودوں کے درمیان دو فاصلے 55.22 سم اور 30 سم) اور دو بی ٹی وراثیوں (AA-703/FH-113) کا انتخاب کیا گیا ہے دونوں تجربات 28 مئی کو کاشت کئے گئے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مختلف ٹریٹمنٹس / Treatments / پلاسٹ میں تندرست اور بیمار پودے، صحت مند اور متاثرہ پتے، فی پتہ سفید کھمی کی تعداد، ٹینڈے کی تعداد، ٹینڈے کی جسامت اور روٹی کی پیداوار نوٹ کی گئی دونوں سال کے اوسط نتائج کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 30 سم پودے سے پودا فاصلہ رکھنے سے سفید کھمی 8.79

فیصد کم ہوئی۔ پتہ مروڑ وائرس کا حملہ 7.16 فیصد کم ہوا لیکن روٹی کی پیداوار اس فاصلے پر 17.23 فیصد کم رہی اسکی وجہ یہ تھی کہ پودوں کو 30 اسم (ایک فٹ) کے فاصلے پر کاشت کرنے سے پوری ایک تہائی پودے کم ہو گئے تھے جسکی کمی کو بیماری اور سفید مکھی کا کم ہونا پورا نہ کر سکا بیج کے طریقہ کاشت میں سے بیڈ (پٹریوں) پر کاشت نے سفید مکھی اور بیماری کم کرنے میں تو کوئی کردار ادا نہ کیا مگر پٹریوں پر کاشت سے پیداوار میں 20.99 فیصد اضافہ ہوا۔ جہاں تک بی ٹی ورائٹیوں کا تعلق ہے۔ AA-703 ورائٹی میں سفید مکھی 8.27 فیصد اور بیماری کا حملہ 6.86 فیصد کم ہوا جس کے نتیجے میں 14.19 فیصد پیداوار بڑھی۔ ان دوسالوں میں مختلف طریقہ کاشت ورائٹی اور پودوں کے درمیانی فاصلے کا معاشی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ جب AA-703 کو پٹریوں (Beds) پر 22.5 سم کے فاصلے پر کاشت کیا جائے تاکہ پتہ مروڑ وائرس کا حملہ کم سے کم ہو اور پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کی جاسکے۔ اسلئے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ کپاس کی بی ٹی ورائٹی AA-703 کو 22.5 سم (9 انچ) کے فاصلے پر پٹریوں (Beds) پر کاشت کیا جائے تاکہ پتہ مروڑ وائرس کا حملہ کم سے کم ہو اور پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کی جاسکے۔

کلراور تھور کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی گندم کی اقسام

پی ایچ ڈی سکالر: محمد تنیل صادق نگران: ڈاکٹر عرفان افضل شعبہ: ایگرا نومی

پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ پاکستان میں تقریباً 6.18 ملین ہیکٹر کلراور تھور سے متاثرہ ہے۔ اس میں کچھ رقبہ جزوی طور پر زریکاشت ہے جبکہ بیشتر حصہ ویران اور بے آباد پڑا ہوا ہے۔ کلراور تھور کی وجہ سے پاکستان کے چاروں صوبے بہت تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔

گوشوارہ نمبر 1: پاکستان کا زمینی رقبہ، زریکاشت رقبہ اور تھور سے متاثر زریکاشت اور بنجر رقبہ

صوبہ	زمینی رقبہ (ملین ہیکٹر)	زریکاشت رقبہ (ملین ہیکٹر)	کلراور تھور رقبہ (ملین ہیکٹر)		
			کل رقبہ	بنجر رقبہ	زریکاشت
پنجاب	20.63	12.35	2.67	1.16	1.51
سندھ	14.09	5.81	2.11	0.94	1.15
بلوچستان	10.17	1.86	1.35	1.24	0.11
خیبر پختونخواہ	34.75	2.07	0.05	0.02	0.03
کل رقبہ	79.61	22.16	6.18	3.38	2.80

اس بڑھتے ہوئے کلراور تھور کی کئی وجوہات ہیں

- 1- درختوں کی بلا وجہ کٹاؤ کی وجہ سے زمین کی زرخیزی ختم ہوتی جا رہی ہے۔
 - 2- دوسری اہم وجہ نہری پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے کسانوں نے ٹیوب ویلز کا استعمال زیادہ کر دیا ہے۔ کیونکہ زمین کا اندرونی پانی نمکین ہے جس کے باعث نمکیات زمین کی سطح پر جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ ان بڑھتے چل پذیر نمکیات کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں بہت تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے جو کہ مستقبل میں اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔
- گندم پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے اس بڑھتے کلر سے اس کی پیداوار میں بتدریج کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ پاکستان میں گندم کا دس فیصد زریکاشت رقبہ کلراور تھور سے متاثر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کلراور تھور سے گندم کی پیداوار 65 فیصد کمی ہو جاتی ہے۔

ایسی زمینوں میں درج ذیل عوامل گندم کے گاؤں کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔

- 1- بیج کو مطلوب نمی میسر نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں متاثر ہوتا ہے۔
- 2- حل پذیر نمکیات (مثلاً سوڈیم، پتاشیم، کلورائیڈ، میگنیشیم، سلفیٹ اور بوریت) کی وافر مقدار پودوں کی جڑوں کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے جس سے نمکیات زہریلے اثرات کی بناء پر پودے کے مختلف فعلیاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔
- 3- حل پذیر نمکیات پودوں میں پانی حاصل کرنے کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں نتیجتاً پودے میں جڑوں کے ذریعے پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
- 4- نمکیات کی شدت کے باعث پودوں کے اہم اعمال (مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جذب کرنا، پروٹین تیار کرنا اور سانس لینا وغیرہ) متاثر ہوتے ہیں۔
- 5- نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے زمین کے محلول میں پودوں کے اجزائی خوراک کا عمل غیر متوازن ہو جاتا ہے۔

اس سارے کلراور تھور سے متاثر رقبے کی اصلاح کر کے کاشت کے قابل بنانا نہ تو زمیندار کے بس میں ہے اور نہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ اس لئے اب نئی سوچ یہ ہے کہ رقبہ کو ایسی حالت میں نمکین کی قوت مدافعت رکھنے والے پودوں کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔

اس مقصد کے حصول کی خاطر ہمیں ایسی قوت مدافعت اقسام والی گندم کی ضرورت ہے جو اس تھور میں زندہ رہ سکے اور اچھی پیداوار دے سکے۔ اس حصول کو عملی جامع پہنانے کے لئے تحقیقاتی ادارہ برائے ایگرا نومی، کراپ فزیالوجی لیب، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے زرعی سائنسدانوں نے مسلسل مختلف تجربات کے بعد گندم کی ایسی اقسام دریافت کی ہیں جو کلراور والے رقبہ پر اچھی پیداوار کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ کلر کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں جن میں V-02156، V-03094، V-005، TRUACO اور PVN اقسام شامل ہیں۔

ان تجربات سے حاصل شدہ کلر برداشت کرنے والی گندم کی اقسام کو مزید Wheat Breeding Program کے استعمال میں لاکر نئی قوت برداشت رکھنے والی گندم کی اقسام متعارف کروائی جاسکتی ہیں جو کلر زدہ رقبوں پر اچھی پیداوار دے سکتی ہیں کسانوں اور ملک کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہیں۔

کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت، ایک منافع بخش ماڈل

پی ایچ ڈی سکالر: عامر سجاد نگران: ٹیکنیکل ایڈوائس: شعبہ: ایگریکولٹی

گندم پاکستان میں مختلف فصلوں کے ساتھ ریج کے موسم میں کاشت کی جاتی ہے۔ زیادہ تر گندم کے ساتھ اگائی جانے والی فصلوں میں کپاس، دھان، بکئی اور گنا شامل ہیں۔ پاکستان کے تقریباً 20 فیصد رقبہ پر گندم، کپاس اور دھان کو کاشت کیا جاتا ہے۔ پنجاب کا 56 ملین زیر کاشت رقبہ گندم اور کپاس پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب کا علاقہ کپاس اور گندم کے لیے مشہور ہے۔ ان علاقوں سے 7 ملین ٹن گندم پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اس کی اوسط پیداوار 27 من فی ایکڑ ہے۔ پنجاب کے کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں گندم کی پیداواری صلاحیت وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ جس کی اہم وجوہات میں کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ، صاف پانی کی عدم دستیابی اور گندم کی کھیتی کاشت شامل ہے۔ گندم کی کھیتی کاشت کی کئی اہم وجوہات میں کپاس کی بروقت چٹائی کے لئے لیبر کا دستیاب نہ ہونا، کپاس کی دیر سے پھٹی پیدا کرنے والی اقسام کا کاشت کرنا اور گندم کو کاشت کرنے کے لئے زمین کی تیاری کا درکار وقت شامل ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کپاس کے کاشت کار اکثر کپاس کی کٹائی دسمبر کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اگر زمیندار کو کپاس کی پھٹی کے بہتر دام مارکیٹ میں مل رہے ہوں تو وہ کپاس کی فصل کو جنوری کے مہینے تک کھیت میں رکھتا ہے۔ اگر 15 دسمبر کے بعد گندم کو کپاس کی چھڑیوں کو کاٹنے کے بعد کاشت کیا جائے تو اس کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ دیر سے کاشت کرنے کی وجہ سے گندم کے مختلف پیداواری عوامل متاثر ہوتے ہیں۔ جس میں پودے کے قد کا چھوٹا رہ جانا، جھگوٹوں کا کم بننا، ٹے میں دانوں کا کم بننا اور دانوں کے سائز کا چھوٹا رہ جانا شامل ہیں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے، کہ اگر گندم 15 نومبر کے بعد کاشت کیا جائے تو، گزرتے دن کے ساتھ 20 کلوگرام تک گندم کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس ساری صورت حال میں کسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی اپنائے جس سے کپاس اور گندم دونوں کی پیداوار متاثر نہ ہو۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت ایک اہم ٹیکنالوجی ہے، جو اس مسئلہ کو حل کر سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں گندم کو دسمبر کے پہلے ہفتے میں کپاس کی کھڑی فصل میں جھپٹے کی مدد سے کاشت کر دیا جاتا ہے۔ گندم کو چھڑے دینے کے فوراً بعد پانی لگا دیا جاتا ہے۔ جس میں 12 گھنٹے بھگو یا ہوا گندم کے بیج کا چھڑے کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار سے کسان دسمبر کے مہینے تک پھٹی حاصل کر سکتا ہے اور دسمبر کے آخر میں کپاس کی چھڑیوں کو کھیت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یوں گندم کی بھر وقت بوائی کی وجہ سے گندم کی پیداوار بھی متاثر نہیں ہوتی، اور نہ ہی کپاس کی کھڑی فصل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس طریقہ کاشت میں گندم کو کاشت کرنے کے لئے اٹھائے جانے والے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ گندم کی کاشت کے لئے اٹھائے جانے والے اخراجات بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ گندم کو کاشت کرنے کا یہ غیر روایتی طریقہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنایا جاتا ہے۔ جس سے زمینداروں کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے زمین کی طبعی اور کیمیائی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کپاس کے گرے ہوئے پتے کھیت میں سبز مادہ کا کام دیتے ہیں۔ جس سے زمین کی بافت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو جڑوں کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ روایتی طریقہ کار کے مقابلہ میں گندم کا اگائے جانے والا یہ طریقہ اب زمینداروں میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ اب تو زمیندار کماد میں پننے اور مسوری دال کو کاشت کر کے بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں۔

کپاس کی پیداوار، معیار اور بوران کی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے پودے کی بڑھوتری منظم کرنے والے اجزاء کا استعمال

پی ایچ ڈی سکالر: علی ذویب نگران: ڈاکٹر عبدالجبار شعبہ: ایگریکولٹی

کپاس دنیا کی اہم ترین اور نقد اور فصل ہے پاکستان کو کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے اور پاکستان دنیا میں کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں کپاس کی فصل 2.9 ملین ہیکٹر رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے اور روٹی کی پیداوار 10.1 ملین تیل ہے۔ کپاس نہ صرف کپڑا اور دھاگہ بنانے کے کام آتی ہے بلکہ اس کے بیج سے حاصل ہونے والا خوردنی تیل بھی بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار دوسرے ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ بہت سے عوامل اس کی پیداوار میں کمی کا باعث ہیں۔ جن میں زمین میں کیمیائی مادے کی کمی، کپاس کی فصل کا ناقص طریقہ کاشت، کوالٹی بیج کی عدم دستیابی، کھادوں کا غیر مناسب استعمال، اور پودوں کی فی ایکڑ تعداد میں نمایاں کمی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی زمینیں اجڑے صغیرہ جیسے بوران اور تنک کی کمی کا شکار ہیں اور تقریباً 50 فیصد زمینوں میں بوران کی کمی ہے۔ بوران کپاس کی بڑھوتری کے لئے نہایت ضروری ہے اور پتوں میں ضیائی تالیف سے بننے والی غذا کو پودے کے تولیدی حصوں میں پہنچاتا ہے۔ جس سے کپاس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداوار بڑھ جاتی ہے اس کی کمی کا نقص پودے کی نشوونما کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کی کمی سے پیداوار میں بھی نمایاں کمی آتی ہے اور پودے کے تولیدی حصے اور عوامی بُری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے پھول کم تعداد میں بنتے ہیں اور کپاس کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ بوران کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بوران کی کھادوں کا بروقت استعمال بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ بوران کی کارکردگی کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کپاس کا پودا قدرتی طور پر غیر متعین بڑھوتری کا حامل ہے اور اس کا پودا جسامت میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے کپاس کے نیچے والے حصوں پر سایہ کی وجہ سے پھول اور ٹینڈے گر جاتے ہیں، تولیدی حصوں میں غذا کی کمی ترسیل کی وجہ سے ٹینڈوں کے وزن میں بھی کمی آتی ہے اور پیداوار اور ریشے کے معیار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ کپاس کی فی ایکڑ پیداوار اور اس کے ریشے کے معیار کی بہتری پر توجہ دی جائے۔ اس سلسلے میں پودے کی بڑھوتری منظم کرنے والے اجزاء مثلاً مپیکو ایٹ کلورائڈ (Mepiquat Chloride) بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف پودے کی غیر ضروری بڑھوتری محدود کرتا ہے بلکہ کپاس کی پیداوار اور ریشے کے معیار کے ساتھ ساتھ غذائی اجزاء کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ ایگریکولٹی فارم، زرعی یونیورس فیصل آباد میں مسلسل دو سال تک تجربات کئے گئے جن میں بوران کی کھاد کو بذریعہ چھڑے زمین میں ڈالا گیا اور اس کے محلول بنا کر پودوں کے پتوں پر سپرے کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مپیکو ایٹ کلورائڈ کا محلول بنا کر کپاس کے پودوں پر اس کی نشوونما کے مختلف مراحل پر چھڑکا گیا تاکہ مپیکو ایٹ کلورائڈ کپاس کی جسامت میں غیر ضروری بڑھوتری کو محدود کر سکے اور بوران کپاس کی عملی تولید میں مدد کر سکے تاکہ مناسب قد و جسامت کے پودوں پر زیادہ اور صحت مند ٹینڈے لگیں جن سے زیادہ اور معیاری ریشہ حاصل ہو اور کسان بوران کی کھاد اور قد میں غیر ضروری اضافے کو روکنے والے کیمیائی اجزاء کا استعمال کر کے اچھی اور منافع بخش پیداوار حاصل کر سکے۔ اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر مپیکو ایٹ کلورائڈ کو گڈی بننے کے عمل کے دوران استعمال کیا جائے اور بوران کو 2.5-2 گلوگرام فی ہیکٹر کے حساب سے بوائی کے وقت چھٹا کیا جائے 1.2-1 گرام فی لیٹر پانی کے لحاظ سے 350 لیٹر پانی فی ہیکٹر گڈی بننے کے عمل پر استعمال کیا جائے تو اس سے پودے پر پیداواری شاخوں کی تعداد، ٹینڈوں کی تعداد اور ان کے وزن میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیداوار، ریشے کے معیار اور بوران کی کارکردگی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے لہذا کسانوں کو چاہیے کہ وہ کپاس کی کاشت میں بوران کی کھاد کا بروقت اور مناسب استعمال کرے اور ساتھ ہی کپاس کی جسامت میں غیر ضروری اضافے کو روکنے والے کیمیائی اجزاء کا استعمال کر کے منافع بخش اور معیاری پیداوار کو یقینی بنائیں۔

بوران کے تناسب تغذیہ کا گندم کی پیداوار اور دانوں میں بوران کی مقدار پر اثر

پی ایچ ڈی سکالر: صباحال نگران: ڈاکٹر محمد فاروق شعبہ: ایگریکولٹی

بوران پودوں، انسانوں اور جانوروں کی بہتر نشوونما کے لئے بہت ضروری ہے۔ پنجاب میں تقریباً 54 فیصد زمین بوران کی کمی کا شکار ہے۔ گندم پاکستان کی ایک اہم فصل ہے جو کہ پاکستان میں کاشت کی جانے والی فصلوں میں سب سے زیادہ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ زمین میں بوران کی کمی گندم میں دانے بننے کے عمل کو متاثر کرتی ہے جس کے باعث گندم کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے اور اس فصل سے پیدا ہونے

والی گندم کے دانوں میں بھی بوران کی مقدار کم ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم میں بوران کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ گندم کی بھرپور پیداوار کے لئے بوران کی متناسب مقدار فصل کو فراہم کی جائے۔ فصل کو بوران چار طریقوں سے فراہم کی جاسکتی ہے جن میں پتوں پر بوران کا سپرے، زمین میں براہ راست بوران ڈالنا، بوران کی پرائیمنگ اور بیج پر بوران کی تہ چڑھانا شامل ہے۔ چونکہ بوران کی کمی اور زیادتی کی حد بہت تھوڑی ہے اس لئے ضروری ہے کہ فصل کو بوران فراہم کرنے سے پہلے اس کی صحیح مقدار کا تعین کر لیا جائے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لئے ایک تحقیقاتی منصوبہ بنایا گیا جس میں فصل کو بوران فراہم کرنے کے طریقوں، گندم کی پاکستانی اقسام کا جینیاتی تنوع اور گندم کی پیداوار اور دانوں میں بوران کی مقدار بڑھانے کے لئے بوران اور بوران کی دستیابی بڑھانے والے جراثیم کے مختلف طریقوں سے استعمال کو جانچا گیا۔ نتائج سے پتا چلا کہ گندم کے بیج کو 10-0 مولر بوران کے محلول میں بھگوئے، بیج پر 52-0 گرام بوران کی تہ چڑھانا ایک کلونج، پتوں پر 10-0 مولر بوران کے محلول کا سپرے اور زمین میں ایک کلوگرام بوران فی ایکڑ ڈالنے سے گندم کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کاشت کی جانے والی گندم کی اقسام پیداواری اور بیج میں بوران کی شرح کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ سب سے زیادہ بوران کی مقدار گندم کی قسم چناب 2000 میں دیکھی گئی۔ تمام طریقوں سے بوران ڈالنے سے گندم کی پیداوار اور دانوں میں بوران کے مقدار میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ تاہم بیج پر 25-0 گرام بوران کی تہ چڑھانا ایک کلونج + بوران کی دستیابی بڑھانے والے جراثیم کے استعمال سے گندم کی پیداوار اور گندم میں بوران کی مقدار میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ ان تجربات کی رو سے ثابت ہوتا ہے کہ بوران کو بزرگ بیج ڈالنے سے گندم کی پیداوار اور دانوں میں بوران کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے نیز بوران کی دستیابی بڑھانے والا جراثیم گندم کی پیداوار اور بیج میں بوران کی مقدار بڑھانے میں موثر ثابت ہوا۔

مکئی کی مقامی دوغلی اقسام کی بھرپور اور متعارف شدہ اقسام کا استحکام کا پیداواری صلاحیت اور پروٹائین اے بائیوفارمی فیکیشن کے لئے مطالعہ

سکالر: محمد عامر مقبول نگران: ڈاکٹر محمد اسلم شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

مکئی غذائی اجناس والی فصلوں گندم اور چاول کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پاکستان میں مکئی کی دو فصلیں (بہاریہ) اور (موسی) کاشت کی جاتی ہیں۔ یہ فصل کم درجہ کاشت کی خاصیت کی وجہ سے دوسری فصلوں کی گردش میں باآسانی کاشت کی جاسکتی ہے۔ پاکستان اس فصل کو خوراک کے علاوہ مال مویشیوں اور مرغیوں کی خوراک اور مختلف انڈسٹریوں میں بطور خام مال استعمال کرتا ہے۔ غذائی لحاظ سے مکئی میں نشاستہ 72 فیصد، لحمیات 10 فیصد، تیل 4.9 فیصد، فائبر 5.8 فیصد، شوگر 3 فیصد، اور ایش 1.7 فیصد پائے جاتے ہیں۔ وٹامن اے کی ترقی پزیر مالک کے غریب خاندانوں میں غالب آتی جا رہی ہے۔ وٹامن اے کی غذائی قلت کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ مناسب اور قابل رسائی طریقہ مکئی کے باؤم فارنی فائیڈ ہائبرڈ کی پیداوار ہے۔ موجودہ تحقیق میں مکئی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وٹامن اے کی کمی پر قابو پانے کے لئے پروٹائین اے بائیوفارمی فیکیشن کے لئے منتخب کیا گیا۔ مکئی کی 150 زرد اقسام موسم خزاں اور بہار میں لگائی گئیں اور مختلف پیداواری اور کوالٹی کی خصوصیات کی بنا پر ڈیٹا لیا گیا جسے بعد ازاں انالسز آف ویرینس، پرنسپل کمپوننٹ انالسز، سٹیٹسٹیکل اینڈ انسز اور جی ای بائپلاٹ انالسز سے پرکھا گیا۔ دونوں موسموں میں مکئی کی اقسام کی پیداوار میں واضح فرق نظر آیا۔ کیروٹین کی مقدار میں بھی قابل غور فرق پایا گیا جس نے پروٹائین میں فرق کو مزید عیاں کیا۔ زرد مکئی کی پیداوار موسم بہار میں موسم خزاں کی نسبت زیادہ تھی۔ جی جی ای بائپلاٹ انالسز، کلکولر اسپرڈ ریٹری انڈیکس، سٹیکسٹیکل اور کرس ایکولنس کو انالک کا تخمینہ لگانے کے لئے استعمال کیا گیا۔ بیان کئے گئے تینوں اندکس نے اپنے لحاظ سے مکئی کی اقسام کو مختلف صفوں میں تقسیم کر دیا۔ ان تمام شماریاتی تجزیات کے نتائج نے واضح کیا کہ جی جی ای بائپلاٹ اور مختلف اندکس کو تقابلی طور پر مکئی کے مختلف خدوخال کو موازنہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مالیکولیو لریول پر بھی مکئی کی 150 زرد اقسام میں جینیاتی فرق کو ماپا گیا۔ اس مطالعہ میں 12 مختلف ایس ایس آر پرائمرز کا انتخاب کیا گیا اور ان کی بنیاد پر جینوٹپک فرق کو جانچا گیا۔ اس مطالعہ میں الیکٹریک فریکوئنسی، البیڈ کی تعداد، ہوموزائگوسٹی، کلسٹرنگ انالسز اور پرنسپل کوارڈینیٹ انالسز نے بھی جینوٹائپس میں مالیکولیو لریول پر فرق کو واضح کیا۔ مختلف جینوٹائپس کو مستقل بنیادوں پر جانچنے کی شدہ ضرورت ہے تاکہ اس سے مکئی کی پیداواری صلاحیت اور کوالٹی میں بہتری کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس مقصد کے لئے مختلف جینوٹائپس کو بطور زراعتی مادہ منتخب کیا گیا اور ان کی ٹیسٹریٹیک کے مطابق ملاپ کروایا گیا اور ایف 1 نسل کو مختلف پیداواری اور کوالٹی کے پیمانوں پر پرکھا گیا جس کے نتیجے میں وضع جینیاتی فرق دیکھنے میں ملا۔ ڈیٹریٹ اور بیٹریٹ ہائبرڈ وگر کی جانچ کے نتیجے میں مختلف کورسز میں نمایاں بہتری کے امکان ملے بالخصوص پیداواری اور منتخب شدہ وٹامن اے اور کوالٹی پیمانوں میں واضح بہتری کا امکان موجود ہے۔ گندم اور مکئی کی بہتری کے بین الاقوامی ادارہ کے تعاون سے مکئی کی پروٹائین اے بائیوفارمی فائیڈ دوغلی اقسام کو پاکستان میں متعارف شدہ دوغلی اقسام کو پاکستان کے چھ مختلف مقامات پر کاشت کیا گیا اور ان کی خصوصیات کو تقابلی طور پر جانچا گیا۔ اس جانچ کے دوران حاصل شدہ ڈیٹا کو مختلف جدید شماریاتی تجزیات کے تحت پرکھ کر واضح نتائج حاصل کئے گئے۔ اس مطالعہ کے ذریعے نمایاں کارکردگی ادا کرنے والی تین پروٹائین اے بائیوفارمی فائیڈ دوغلی اقسام کا انتخاب کیا گیا جن کے نام درج ذیل ہیں: ایچ پی 1097-11، ایچ پی 1097-2 اور ایچ پی 1097-18۔ متعارف شدہ پروٹائین اے بائیوفارمی فائیڈ اقسام کے پیداواری اور کوالٹی پیمانوں کا مقامی منتخب شدہ اقسام کے ساتھ موازنہ کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ بین الاقوامی ادارہ کی طرف سے متعارف شدہ اقسام کی پیداواری اور کوالٹی کی صلاحیت مقامی اقسام سے نمایاں طور پر بہتر تھی۔ اس مطالعہ کے نتیجے میں یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ بین الاقوامی ادارہ کے تعاون سے پروٹائین اے بائیوفارمی فائیڈ اقسام کو متعارف کروانا مقامی غذائی قلت پر قابو پانے کے لئے نہایت ہی موزوں عمل ہے۔ ایک اور ذیلی مطالعہ میں پروٹائین اے بائیوفارمی فائیڈ کی دوغلی اقسام کو بلا واسطہ طور پر کاشت کی دھوپ میں خشک کرنے کے دوران ہونے والے کوالٹی کے نقصان کو جدید پیمانوں پر پرکھا گیا۔ اس مطالعہ نے یہ واضح کیا کہ بائیوفارمی فائیڈ اقسام کو براہ راست سورج کی دھوپ میں خشک کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ اس عمل سے ان اقسام کی کوالٹی شدید متاثر ہوتی ہے۔

کپاس - پانی کی ضروریات اور کم پانی برداشت کرنے والی اقسام

پی ایچ ڈی سکالر: وقاص شفقت چٹھہ نگران: ڈاکٹر عامر ثقلیل شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

کپاس کی فصل صوبہ پنجاب کی سب سے اہم نقد آور فصل ہے۔ یہ بڑی حساس فصل ہے اس فصل کی کھاد اور پانی کی ضروریات قسم کے لحاظ سے متعین کرنی پڑتی ہیں۔ جھاڑی دار اور لمبے قد والی اقسام کی کھاد اور پانی کی ضروریات نسبتاً کم جب کہ نیم جھاڑی دار اقسام کی یہ ضروریات قدرے زیادہ ہوتی ہیں۔ تاہم چھوٹے قد والی اقسام جن کی کانٹھوں کا درمیانی حصہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کی کھاد اور پانی کی ضرورت درج بالا دونوں اقسام سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کھاد اور پانی بلحاظ قسم نہ دیا جائے تو زیادہ کھاد اور پانی دینے کی صورت میں جھاڑی دار اقسام کی بڑھوتری زیادہ ہو جائے گی اور وہ پھول اور ٹینڈے کم لیں گی۔ اگر چھوٹے قد والی اقسام کو کھاد اور پانی کم لگایا جائے گا تو ان کی بڑھوتری یا تو رُک جائے گی یا پھر کم ہوگی۔ نتیجتاً پیداوار میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی۔ کپاس کی کچھ اقسام بوائی کے 35-40 دن بعد پھول لینا شروع کر دیتی ہیں اور سارا سیزن لگاتار پھول اور ٹینڈے لیتی رہتی ہیں۔ ایسی اقسام کو اس وقت پر پانی اور کھاد شروع کر کے درمیان میں میں پانی اور کھاد کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور کمی کی صورت میں ان کی بڑھوتری نہ صرف رُک جاتی ہے بلکہ بعض حالات میں بڑھوتری مستقل طور پر رُک جاتی ہے اور پھر دوبارہ بڑھوتری کی طرف مائل بھی نہیں ہوتیں۔ لہذا ایسی اقسام 15 ستمبر تک کھاد اور 15 اکتوبر تک پانی 8 سے 10 دن کے وقفہ سے دیتے رہیں۔ اس کے برعکس کچھ اقسام ذرا دیر سے پھول اور ٹینڈے شروع کرتی ہیں۔ یعنی 40 سے 45 دن بعد ان اقسام کو اگر اس دورانیہ سے پہلے کھاد اور پانی کی زیادتی ہو جائے تو غیر ضروری بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً پھول اور ٹینڈے لینے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اوسط پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ لہذا ان اقسام کو شروع میں کھاد اور پانی کم دینا ہوتا ہے۔ ان اقسام کو بھرپور پھول اور ٹینڈے لگنے پر کھاد اور پانی ضرورت کے عین مطابق ہو۔ تاہم دیر سے ڈالی گئی

کھاد فصل کی برداشت کو پچھت کر دے گی اور گندم کی بوائی ممکن نہ ہو سکے گی اور بعض اوقات اگر گندم کاشت نہ بھی کرتی ہے۔ درجہ حرارت میں کمی اور دھند وغیرہ کی صورت میں ٹینڈے کھلے بھی نہیں پائیں گے۔ لہذا اخراجات بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اقسام کی بڑھوتری اور برتاؤ کو مد نظر رکھنے کے علاوہ زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ کلرلٹی زمین کی صورت میں وٹر کاشت نہیں کرنی چاہیے بلکہ کھلیوں پر کاشت کی جائے اور مکمل آگاہی کے لئے 3 دن کے وقفہ سے دو پانی لگانا ضروری ہوتے ہیں۔ میرا زمین میں وٹر کاشت مناسب ہوتی ہے۔ ریپٹی زمین کی صورت میں پانی کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ پانی کا وقفہ کم کرنا پڑتا ہے۔ زرخیز زمین کی صورت میں مجموعی طور پر کم کھاد اور پانی کی ضروریات ہوتی ہیں تاہم کم زرخیز زمین کی صورت میں کھاد کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں اور پانی بھی قدرے زیادہ لگانے پڑتے ہیں۔ اگیتی کاشت کی صورت میں مجموعی کھاد اور پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ پچھت کاشت کی صورت میں بوائی کے وقت فاسفورس کھادوں کے ساتھ آدھی نائٹروجنی کھاد بھی ضرور ڈالنی پڑتی ہے اور پہلا پانی بھی نسبتاً پہلے لگانا پڑتا ہے۔ تاہم 15 سے 20 اگست تک نائٹروجنی کھاد ڈال دینی چاہیے۔ پچھت کھاد کے استعمال سے فصل کی برداشت پچھتی ہو جاتی ہے اور خاطر خواہ پیداوار کا حصول ممکن نہیں رہے گا۔

پہلا پانی

بوائی کے بعد پہلے پانی کا وقفہ بلحاظ قسم، زمین کی نوعیت اور طریقہ کاشت پر ہونا چاہیے، ہموار کاشت یا لائنوں کی کاشت کا پہلا پانی 30 سے 45 دن کے بعد بلحاظ قسم، مثلاً ایف ایچ-142 ایف ایچ-114 اور ایم این ایچ-886 کو تقریباً 30 دن کے بعد جبکہ ایف ایچ-942 کو 40-45 دن کے بعد۔ بعد ازاں آبپاشی کا وقفہ 15-12 دن رکھنا چاہیے۔ کھلیوں پر کاشت فصل کو دو پانی کیے بعد دیگرے لگا کر آگاہی مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب فصل ڈوڑیوں پر آجائے تو پانی لگا دینا چاہیے اور بعد ازاں آبپاشی 7-9 دن کے وقفہ سے کریں۔

آبپاشی

آبپاشی زمین کی زرخیزی طریقہ کاشت، کپاس کی قسم اور موسمی حالت کو مد نظر رکھ کر کی جائے۔ نہ فصل کو سوکا آئے نہ زیادہ بھر کر پانی دیا جائے۔ زمین زیادہ وقت و تر حالت میں رہنی چاہیے۔ پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کی وجہ سے کم پانی برداشت کرنے والی اقسام دریافت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

کم پانی برداشت کرنے والی کپاس کی اقسام

ایف ایچ-142 ایف ایچ-114 اور ایم این ایچ-886 ایف ایچ-942، ایف ایچ-207، آئی آر-6، ایس-15

زمین کی حالتیں

چکنی میرا زمین (Loam soil) میں پودے کے نیچے کی مٹی مٹی میں دبا کر چھوڑنے پر اگر ایک مضبوط بال بن جائے تو آبپاشی کی ضرورت نہیں۔ اگر بال کمزور بنے تو پھر آبپاشی کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ ریپٹی زمینوں میں بال نہ بننے کی صورت میں زمین میں نمی بہت کم ہو جاتی ہے لہذا فصل کو فوری پانی لگانا چاہیے۔ ریپٹی زمین میں آبپاشی کا وقفہ جبکہ چکنی میرا زمین میں آبپاشی کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے۔

فصل کو پانی دینے کے لئے پودے کی حالتیں

پتوں کا کھردرا ہونا، سنے کا اوپر والا حصہ نیل گوں ہونا (جو توڑنے پر ٹوک کی آواز دے) اور پوالی کانٹوں کی درمیانی لمبائی میں کمی، سفید پھول کا چوٹی پر نظر آنا، اگر ان میں کوئی تین حالتیں ظاہر ہو جائیں تو فصل کو فوری پانی دینا چاہیے۔

کٹری کے پودے کا دفاعی نظام

پی ایچ ڈی۔ سکالر: ثروت ظہور نگران: ڈاکٹر معصومہ نصیر چیمہ شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنٹیکس

پودوں کا دفاعی نظام مختلف مزاحمتی پروٹین پر مشتمل ہے، جس میں عام طور پر این بی ایس۔ ایل آر آر ڈی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غیر این بی ایس۔ ایل آر آر جیسے ایس اے ایم ڈی سی، اے ڈی سی، ایس پی ایم، ایس پی ڈی، ایچ ایس پی 90، ایچ ایس پی 17، ایچ ایس ایف اے اور ایچ ایس ایف بی۔ جینز بھی پودے کو دفاع کیلئے تیار کرتے ہیں۔ مائیکرو آراین اے دفاع کی دوسری پرت کی نمائندگی کرتے ہیں اور منظر کے پیچھے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مطالعات تین اجزاء کے کردار کو تلاش کرنے کیلئے منعقد کیا گیا تھا۔ کٹری کے پودوں کو وائرس (سی۔ ایم۔ وی) کے ساتھ چیلنج کرنے کے بعد کٹری کے پودوں کی مدافعتی رد عمل کو پیدا کرنا تھا۔ کٹری کے پودے کی 21 اقسام کو وائرس کے خلاف ٹیسٹ کیا۔ ایمیز۔ 26917 کوسب سے زیادہ حساس اور پی۔ 1-618950 کوسب سے زیادہ مزاحم کے طور پر ظاہر ہوا۔ 57 جینز کے تسلی تجزیہ اور ان کی ترتیب سے جینی خاندان کے مختلف طبقات کو دکھایا۔ 17 سی ڈی ڈی میں پر مشتمل جین کے ساتھ ٹرانسکریپشن کی فہرست کو غیر این بی ایس۔ ایل آر آر اور این بی ایس۔ ایل آر آر جینز کو منتخب شدہ جینوٹائپس میں سے 8 دن اور 15 دن کے نمونوں کو آر ٹی۔ پی سی آر سے ٹیسٹ کیا۔ مزاحم جینوٹائپ میں این بی ایس۔ 1، این بی ایس۔ 5 اور این بی ایس۔ 7 کا لیول غیر متاثرہ پودوں کے مقابلے میں 15 ڈی پی آئی پر متاثرہ پودوں میں سب سے زیادہ جبکہ 8 ڈی پی آئی پر لیول وائرس کی وجہ سے کم تھا۔ حساس جینوٹائپس میں اسی رجحان کا مشاہدہ کیا گیا لیکن ٹرانسکرپٹ لیول نسبتاً حساس جینوٹائپس کے مقابلے میں کم تھا۔ غیر متاثرہ پودوں میں 8 اور 15 ڈی پی آئی کے لیول میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ غیر این بی ایس جینز میں دونوں حساس اور متاثرہ جینوٹائپس کا 8 اور 15 ڈی پی آئی پر ٹرانسکرپٹ تجزیہ کا رجحان بھی تھا سوائے ایچ ایس پی۔ 17 کے میں ٹرانسکرپٹ لیول 15 ڈی پی آئی پر تھوڑا زیادہ تھا۔ مائیکرو آراین اے کا کردار معلوم کرنے کیلئے کمپیوٹر کے پروگرام کا استعمال کیا۔ 10 مائیکرو آراین اے ان جینز کے ساتھ جینز کے ساتھ مکمل طور پر مل گئے۔ ان کے کردار کے ساتھ تعلق کی تصدیق کی گئی۔ جس سے پتہ چلا کہ صرف غیر متاثرہ جینوٹائپس میں نظر آئے۔ اس تجرباتی کام سے پتہ چلا کہ کٹری کے پودے میں دفاعی نظام تب تک نہیں چلے گا جب تک وائرس اپنے حملہ کرنے کی سطح پر نہیں پہنچ جاتا۔ غیر NBS جینز کا پودوں کے دفاعی نظام میں کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ سوائے 17-HSP نے صرف 10 مائیکرو آراین اے نے متاثرہ پودوں میں این بی ایس۔ جینز کے ساتھ اپنا کردار دکھایا۔ جبکہ باقی غیر جانبدار ہے۔

مکئی کا نمکیات کے خلاف قوت برداشت کا جینیاتی مطالعہ

پی ایچ ڈی۔ سکالر: خلیل احمد نگران: ڈاکٹر محمد اسلم شعبہ: پی بی جی

غیر حیاتیاتی دباؤ کا ماحول پودوں کی صحت کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان کی نمی سے محروم آب و ہوا کی وجہ سے نمکیات کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خوراک کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لہذا اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے پاس نمکیات کے خلاف قوت برداشت رکھنے والی مکئی کی جینوٹائپس موجود ہوں۔ اس ڈاکٹریٹ کے مطالعہ میں مکئی کی چالیس جینوٹائپس قومی زرعی تحقیقاتی ادارے اسلام آباد سے اکٹھی کی گئیں اور نمکیات کے خلاف قوت برداشت رکھنے والی جینوٹائپس کی جانچ کی گئی۔ اس تجربے کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پودوں کے شعبہ افزائش نسل و جینیات میں لگایا گیا۔ اسی طرح کا ایک تجربہ پنڈی بھٹیاں کے ادارے برائے تحقیقات نمکیاتی زمین کے قدرتی نمکیات کھیتوں میں بھی لگایا گیا۔ ان تجربات میں جینوٹائپس کے سنے کی لمبائی، جز کی لمبائی، تازہ سنے کا وزن، خشک سنے کا وزن، سوڈیم

پونا شیم، پروٹین کی مقدار اور سوڈیم پونا شیم کی نسبت کی بنیاد پر نمکیاتی اور غیر نمکیات ماحول میں جانچ کی گئی۔ قدرتی کھیتوں میں جو تجربہ لگایا اس میں کچھ اضافی خصلتوں مثلاً کلوروفل، نیپٹا پانی کی مقدار، پانی، پروٹین، کل حل شدہ شوگر اور کچھ نشوونما والی خصلتیں مثلاً تازہ پتے کا وزن، پتے کا احاطہ، عمل ضیائی تالیف، پودے کی اونچائی، سٹومیٹا کنڈکٹنس، اخراجات، بخارات، چھلی پر دانوں کی مقدار، 100 دانوں کا وزن اور ایک پودوں پر دانوں کی پیداوار کو بھی جانچا گیا۔ بائی پلاٹ تجربہ کی مدد سے ایک عدد نمکیات کے خلاف بہت ہی قوت برداشت رکھنے والی اور ایک عدد حساس جینو ٹائپ کا انتخاب کیا گیا، ان کو والدین کا نام دیا گیا۔ ان والدین کو دو غلاتی لائحہ کار میں استعمال کر کے ایف ون، ایف ٹو، بی سی ون، اور بی سی ٹو نسلیں بنائی گئیں۔ والدین (پی ون اور پی ٹو) اور ان نسلیں کو غیر نمکیاتی اور نمکیاتی ماحول میں پھر جانچا گیا۔ ایف ٹو میں 150 پودے چنے گئے اور ان میں مختلف خصلتوں کی بنیاد پر تعلق کا مطالعہ کیا گیا۔ اور مختلف جینیاتی اثرات (ایڈیٹو، ڈومی نینس) کا مطالعہ کیا گیا۔ جس سے پتا چلا کہ زیادہ تر خصلتوں پر ایڈیٹو، ڈومی نینس X ڈومی نینس کا اثر ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر ہم نمکیات کے خلاف خصلتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو باہر ڈیج کی پیداوار کو بڑھانا پڑیگا اور پیداوار کا تازہ پتے کے وزن، پودے کی اونچائی، چھلی پر دانوں کی تعداد اور 100 دانوں کے وزن سے گہرا تعلق ہے اس لئے انہیں جانچ پڑتال کے لائحہ کار میں مد نظر رکھنا پڑیگا۔ تجویز یہ ہے کہ لائحہ عمل میں ایڈیٹو اور اہم ٹیکٹک اثرات پر توجہ دی جائے اور اس کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ یو ایس 0020 جینو ٹائپ میں نمکیات کے خلاف قوت برداشت موجود ہے لہذا اسے آگے افزائش نسل کے لائحہ عمل کا استعمال کرنا چاہیے۔ جینو ٹائپس کا انتخاب اگر اگلی نسلیں سے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں نمکیات کے خلاف قوت برداشت رکھنے والی اور جینو ٹائپس تلاش کرنی چاہیے۔ ایسے جینو تلاش کریں جو نمکیات کے خلاف قوت برداشت رکھتے ہوں۔ جو صرف تب ممکن ہو سکتا ہے۔ جب ہم جینو ٹکس پروٹیوکس اور بائیو انفارمٹکس میں ترقی کریں۔

موسمیاتی تغیر و تبدل کا مٹی کی پیداوار پر اثر

پی ایچ ڈی سکالر: حافظ محمد واصف علی نگران: ڈاکٹر محمد سلیم شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

مٹی اپنی پیداواری صلاحیت کی وجہ سے غلہ دار اجناس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ پاکستان میں گندم اور چاول کے بعد رقبہ کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر کاشت ہونے والی فصل ہے جبکہ فی ایکڑ اوسط پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے کئی حصوں خصوصاً شمال مغربی پہاڑی علاقوں کے باشندوں کی خوراک کا اہم حصہ مٹی ہے۔ مٹی انسانی خوراک کے علاوہ یہ مویشیوں اور مرغیوں کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس سے نشاستہ، خوردنی تیل، گلوکوز، کمرڈ، جلی اور کاربن فلیکس وغیرہ بھی تیار کئے جاتے ہیں۔ مٹی سے مختلف مصنوعات بنانے والی فیکٹریاں لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، رحیم یار خان اور راولپنڈی میں واقع ہیں۔ پاکستان میں مٹی کی کاشت کے حوالے سے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخواہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مٹی کے زیر کاشت کل رقبہ میں پنجاب کا حصہ 56.76 فیصد اور پیداوار 80.21 فیصد ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کا زیر کاشت رقبہ 42.52 فیصد ہے اور پیداوار 19.59 فیصد ہے پنجاب میں مٹی تقریباً سترہ لاکھ ایکڑ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ پچھلے کئی سال سے مٹی کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافہ کی بنیاد پر جانچ پڑتال اور بہتر پیداواری ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ کیونکہ ہا ہرڈ اقسام بہترین پیداواری صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہا ہرڈ اقسام کا قد درمیانہ، تناور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جسکی وجہ سے یہ زیادہ کھاد برداشت کر لیتی ہیں۔ اور گرنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود، پاکستان میں مٹی کی فی ایکڑ اوسط پیداوار دنیا کے (مٹی کی کاشت کرنے والے) باقی تمام ملک سے بہت کم ہے۔ اسکی بنیادی وجہ موسمیاتی تغیر و تبدل ہیں۔ موسم میں اچانک ظہور ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے نہ صرف مٹی، بلکہ دوسری غلہ دار اجناس اور نقد آور فصلوں کی پیداوار بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں درجہ حرارت کا اتنا بڑھاؤ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ان ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ جو ان موسمیاتی تبدیلیوں کا زیادہ شکار ہیں۔ پاکستان میں موسم گرم پہلے سے طویل اور موسم سرما مختصر ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں موسم بہار اور خریف، مٹی کی کاشت کے لئے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ بہار یہ مٹی وسط خوری تا فروری اور مئی (خریف) مٹی شروع جولائی سے وسط اگست تک کاشت کی جاتی ہے۔ بہار یہ مٹی کو اپریل اور مئی کے مہینوں میں پھول نکلنے، عمل زیرگی (Pollination) اور دانہ بننے کے مراحل کے دوران زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ سے فصل کو قد میں کی گانٹھوں کا درمیانی فاصلہ، سٹ (Tassel) کا میچورنہ ہونا، زرد دانوں کا ضیاع، بیج کی تعداد اور بیج کے وزن میں کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کے تدارک کے لئے اکثر اس بات پر زور دیا جاتا ہے۔ کہ بہار یہ مٹی کی کاشت دسمبر میں شروع کر دی جائے۔ تاہم ایسا ممکن نہیں کیونکہ مٹی کو بیج کے اگاؤ سے لیکر فصل کی کٹائی تک ہر مرحلے کے لئے مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمیں ذرا سی کمی بیشی فصل کی پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے اگاؤ (Germination) کی بہترین شرح حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اوسط درجہ حرارت 7 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو۔ جبکہ پھول آنے (Flowering) سے لیکر بیج بننے اور فصل کی کٹائی تک کے مراحل کے لئے دن کا اوسط درجہ حرارت 25-30 سینٹی گریڈ اور رات کا اوسط درجہ حرارت 16.7-23.3 سینٹی گریڈ فصل کی بہترین پیداوار کے لئے نہایت موزوں خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس درجہ حرارت پر عمل ضیائی تالیف کی شرح عمل تنفس سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ پودے کی بڑھوتری اور زیادہ پیداوار کا پیش خیمہ ہے۔ مٹی کے لئے مناسب درجہ حرارت کی حد 5 سے 35 سینٹی گریڈ ہے۔ انتہائی حد (35 سینٹی گریڈ) سے 4-3 سینٹی گریڈ کا اضافہ فصل کی پیداوار میں 35-15 فیصد کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیداوار کی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے سائنسدان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے والی ہا ہرڈ اور سٹھیک (Synthetic) اقسام متعارف کروائی جائیں۔ اس مقصد کے لئے مٹی سطح پر مختلف زرعی تحقیقاتی اداروں سے 70 مختلف اقسام کی Inbred lines کا بیج حاصل کیا گیا۔ اس بیج کا خالص پن جانچنے کے لئے موسم خریف 2013 میں اسے کاشت کیا گیا۔ اور مختلف خواص کا مطالعہ کیا گیا۔ خواص کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں Inbred lines 50 کو منتخب کیا گیا اور غیر معیاری و ناقص لائنوں کو تلف کر دیا گیا۔ منتخب 50 لائنوں کا بیج دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان اقسام کے مختلف ایگرائونومی اور فزیالوجیکل خواص کی جانچ پڑتال کی گئی۔ تمام خواص میں اوسط بہترین کارکردگی دکھانے والی چھ Inbred lines کو مستقبل میں مزید تجربات کے لئے منتخب کیا گیا۔ مختلف شماراتی تجزیوں کے بعد منتخب ہونے والی Inbred lines کا نام یہ ہیں ڈی-103، این سی آئی ایل-4، 20 ڈی-135، این سی آئی ایل-5، 10 ڈی-3748 اور این سی آئی ایل-5، 30۔ ان چھ لائنوں نے 45 سینٹی گریڈ پر مختلف ایگرائونومی اور فزیالوجی کے خواص میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ ان لائنوں کو موسم خریف (2014) محکمہ پلانٹ بریڈنگ اور جینیٹکس کے کھیتوں میں کاشت کیا گیا جب فصل پر پھول بننے کا عمل شروع ہوا تو مادہ لائنوں کے سٹ (Tassel) کو توڑ دیا گیا۔ اور پھلیوں کو ڈھانپ دیا گیا۔ اس طرح نر لائنوں کے سٹ کو بھی ڈھانپ دیا گیا تاکہ کنٹرول Pollination کروائی جاسکے ان لائنوں کو مکمل Diallel انداز میں کراس کر دیا گیا۔ 1 بیج حاصل کیا گیا۔ موسم بہار (2015) میں منتخب چھ لائنوں کو ان کے ایف-1 بیج کے ساتھ کھیتوں میں اس طرح کاشت کیا گیا کہ آدھا بیج 8 فروری کو اور باقی آدھا 8 مارچ کو بویا گیا۔ آٹھ مارچ کو کاشت کا مقصد فصل کو عمل زیرگی (Pollination) اور بیج بننے کے مراحل کے دوران حد سے بڑھے ہوئے درجہ حرارت کے اثرات کا مطالعہ کرنا تھا۔ زرد دانوں کے بننے کے وقت سے لے کر فصل کی کٹائی تک نابل اور زیادہ درجہ حرارت والے ماحول میں کاشت کی گئی فصل میں چوبیس (24) مختلف ایگرائونومی اور فزیالوجیکل خواص کا مشاہدہ کیا گیا۔ حاصل کردہ اعداد و شمار کا حیاتیاتی شماریات کے ذریعے مختلف جینیاتی پہلوؤں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تجزیہ کے نتیجے میں زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے والی لائنوں اور ایف ون کراس کا انتخاب کیا گیا۔ حیاتیاتی شماریات کے مختلف تجزیوں سے جو نتائج حاصل ہوئے ان کا بنیاد پرین (3) Inbred lines ڈی-103، این سی آئی ایل-4، 20 اور این سی آئی ایل-5، 10 جبکہ دو سنگل کراس ایف ون ڈی-103x این سی آئی ایل-30، 5 اور این سی آئی ایل-20x این سی آئی ایل-5، 10 کو زیادہ درجہ حرارت والے علاقوں میں مٹی کی بہترین پیداوار کے لئے منتخب کیا گیا۔

سرسوں کی پیداوار اور تیل کی خصوصیات میں جینیاتی تبدیلی کی اہمیت

پی ایچ ڈی سکالر: حافظ بشیر احمد نگران: ڈاکٹر حفیظ احمد صداقت شعبہ: پی بی جی

خالق کائنات نے اپنی مخلوق میں ہر طرح کی خوبصورتی رکھ دی ہے۔ اور خوبصورتی تبدیلی کی صلاحیت کا نام ہے اور اس تبدیلی کو ارتقاء یا ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ تغیر زندگی کی علامت اور ثبات موت ہے۔ اگر یہ تبدیلی نہ ہوتی تو شاندار کائنات کا وجود برقرار نہ رہتا اور ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف وجود خالق پر دلالت نہ کرتے۔ اشرف المخلوقات میں خوبصورتی کے ساتھ اس کی غذا کے لئے پیدا شدہ خوبصورت سامان عالم نباتات کو بڑی اہمیت حاصل ہے جو نہ صرف بنی نوع انسان کو ہر طرح کی امداد پہنچاتے ہیں بلکہ اس کی زندگی کا دار و مدار ہی عالم نباتات پر ہے۔ اس عالم نباتات میں ایک مخصوص چیز کا نام سرسوں بھی ہے۔ سرسوں اور انسان کا تعلق شاید پیدائش کا ہے۔ سرسوں کا پودا نہ صرف انسان کی غذا کا جزو لا ینفک ہے بلکہ اس کی خوبصورتی کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ سائنسی ترقی کی بدولت علاج کی دریافت اور بیماریوں پر کنٹرول اور بہتر زندگی کے مواقعوں کے وجود نے انسانی آبادی کو بڑھا دیا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی ضروریات میں اضافہ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مضر شدہ عالم میں تبدیلی لاسکے۔ چنانچہ سرسوں کی پیداوار کو پورا کرنے کے لئے سائنسی علوم کی بدولت تبدیلیاں جاری ہیں۔ سرسوں کا پودا جہاں بہت اعلیٰ قسم کی خصوصیات کا حاصل ہے وہاں کچھ ایسے اجزاء اس کے روغن میں پائے جاتے ہیں جو انسانی طبیعت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس زرعی علوم کی ماہر علمی میں کچھ تجربات گئے اور سرسوں کی مختلف نوع کو آپس میں ملا کر آمیزج کی پیداوار میں اضافہ کے لئے قدم اٹھائے گئے ہیں۔ سرسوں کی مختلف انواع کو جہاں آپس میں ملا لیا گیا ہے وہاں کینڈا سے ایسی اقسام بھی منگوائی گئیں ہیں جو خصوصیات کے لحاظ سے انسانی صلاحیت کا موافق ہوں اور ان کے ملاپ سے ایسی اقسام تیار کی جائیں جو ہماری دیں پنجاب میں نہ صرف اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں بلکہ خصوصیات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں اور بفصل خدا، ہم اس کوشش میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی راہ کو پالیں گے۔ پیداوار کو بڑھانے اور تیل کی خصوصیات میں تبدیلی لانے کے عمل کے تجزیے میں مختلف توارثی خصوصیات کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرسوں کی مختلف انواع کو انسانی سے مصنوعی طور پر ملا لیا جاسکتا ہے اور نئی سے نئی خصوصیات میں اپنی من پسند تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ تحقیق کے سلسلے میں حاصل ہونے والے کچھ مختصر سے نتائج یوں ہیں۔

- 1- ایک ہی نوع میں ملاپ میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔
- 2- مختلف انواع کو ملانے سے پیداواری صلاحیت وقتی طور پر کم ہو جاتی ہے۔
- 3- مختلف انواع کو ملانے سے فصل بڑھوتی اور پکنے میں زیادہ وقت لیتی ہے۔
- 4- مختلف انواع کو ملانے سے چارہ جات کی ایسی اقسام بنائی جاسکتی ہیں جو صرف جانوروں کی خوراک کے لئے ضروری ہوں۔
- 5- تیل اور پروٹین میں تعلق مثبت ہے گویا ایک خاصیت کو بڑھانے سے دوسری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
- 6- اولک ایسڈ اور وٹک ایسڈ میں تعلق بھی مثبت سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
- 7- وراثتی اور جینیاتی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اگر درج ذیل خصوصیات کو مد نظر رکھ کر اقسام کی چننا براہ راست کی جائے تو پیداوار میں اچھا اضافہ ممکن ہے۔

- i- مکمل بڑھوتی کے دنوں کو مد نظر رکھنا۔
- ii- پھلیوں کی پودے پر تعداد۔
- iii- پھلیوں میں بیج کی تعداد۔
- iv- پودے کا قد۔
- v- پودے پر ثانوی شاخوں کی تعداد۔

تجربات کے نتیجے میں پیدا شدہ ایک ہی نوع کی اقسام کے ملاپ میں اور مختلف انواع کے ملاپ سے اقسام آئندہ تحقیق کے پروگرام میں مددگار ثابت ہوگا۔ چنانچہ شدہ اقسام کم وقت میں پکنے، زیادہ پیداوار اور اچھی خصوصیات کا حامل تیل والی ہیں اور ہمارے مقامی فصلوں کے ہیر پھیر کے نظام میں موزوں ہیں۔ ان اقسام کو استعمال کر کے ہم 6.67 ملین روپے زر مبادلہ پر خرچ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔

نومولود بچوں کی غذا پر مشتمل ایک تحقیقی منصوبہ

پی ایچ ڈی سکالر: احمد بلال نگران: ڈاکٹر اللہ رکھا شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

پاکستان میں غذائی کمی کی وجہ سے نومولود بچوں میں نہ صرف جسمانی اور ذہنی کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ شرح اموات بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نومولود بچوں کے لئے دو سال تک ماں کا دودھ ضروری ہے کیونکہ اس میں موجود مخصوص غذائی اجزاء صحت کے لئے مفید ہیں اور کئی قسم کی بیماریوں کے تدارک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن چھ ماہ کے بچے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ نیم ٹھوس غذاؤں کا استعمال توانائی اور غذائی ضروریات کے حصول کے لئے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں غذائی ماہرین کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں کاشت کی جانے والی دالوں اور اناج کو نومولود بچوں کی غذا میں شامل کریں۔ کیونکہ صرف اناج پر مبنی غذا نومولود بچوں کی پروٹین کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ جبکہ دالیں پروٹین کا بہترین اور سستا ذریعہ ہیں۔ مزید برآں یاد رہے کہ دالوں کی شمولیت سے غذائی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسکے برعکس دالوں میں کچھ ایسے مضر صحت عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ پروٹین کے انہضام اور معدنیات کی فراہمی میں کمی لاتے ہیں اسکے پیش نظر گزشتہ تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ پکانے کے عمل سے ان غیر مفید اور مضر صحت عناصر میں کمی لائی جاسکتی ہے۔ اس کے مد نظر موجودہ تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ لوہا میں موجود پروٹین کی مقدار موگ کی نسبت زیادہ ہے۔ جبکہ معدنیات موگ میں زیادہ ہیں۔ علاوہ ازیں لوہا اور موگ کو نومولود بچوں کی غذا میں استعمال کرنے سے قبل چھوٹا گیا اس عمل سے ان میں موجود غیر مفید عناصر کو ستر سے اسی فیصد تک کم کیا گیا۔ بعد میں اس لوہا (20 فیصد) موگ (20 فیصد) اور اسکے مجموعے 10/10 فیصد کے تناسب سے اناج کے ساتھ شامل کر کے نومولود بچوں کی غذا ترتیب دی گئی۔ اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ لوہا اور موگ کے مجموعے 10/10 فیصد سے مرتب پانے والی غذائاتی غذاؤں کی نسبت پروٹین اور توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان غذاؤں کو چھوہوں پر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ مجموعہ نشوونما اور پروٹین کی دیتابی کے لحاظ سے بہتر ہے مزید برآں ان غذاؤں کو نومولود بچوں پر بھی آزمایا گیا۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مجموعہ کسی لحاظ سے بھی مارکیٹ میں موجود نومولود بچوں کے برائڈ پروڈکٹس سے کم نہیں بلکہ کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین غذا ہے۔

زک فورٹیفائیڈ چاول اور ان کی افادیت

پنیا ایچ ڈی سکالر: عبدالسیح نگران: ڈاکٹر مسعود صادق بٹ شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

ترقی پذیر ممالک میں غذائی قلت کی وجہ سے جسمانی نشوونما اور پیداواری قوت میں کمی جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ناقص اور نامناسب غذا / خوراک کا لیے عرصے تک استعمال اسکی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یوسنٹیف کی مطابق ترقی پذیر ممالک کو مائیکرو نیوٹریشن خصوصاً آئرن، زنک، آیوڈین اور وٹامن اے کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سالانہ دو بلین سے زائد افراد میں براہ راست زنک کی کمی کی رپورٹ کی جا چکی ہے۔ اور جسم میں زنک کی کمی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا غذائی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق سب سے زیادہ زنک کی کمی حاملہ عورتوں میں 47.6 فیصد اور غیر حاملہ عورتوں میں 41.3 فیصد رٹ کی گئی۔ اس سلسلے میں نیوٹریشن اگاہی پروگرام انسانی غذائیت کو پورا کرنے کے لئے بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر چاول پر زنک کی فوٹیفیکیشن ایک جدید، محفوظ، قابل اعتماد اور بھرتی ہوئی حکمت عملی ہے چاول، گندم کے بعد دوسری سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک ہے۔ جس نے پاکستان کی جی ڈی پی میں 0.6 فیصد اضافہ کیا جبکہ حالیہ سال 2015-16 میں چاول کی پیداوار 6160 ہزار ٹن ریکارڈ کی گئی۔ زنک ایک بہت ہی اہم مائیکرو نیوٹریٹس ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ تمام جسمانی نشوونما اور مادہ میں پائی جاتی ہے جسم میں کل زنک کی مقدار 30 ملی مول یا 2 گرام ہے جو کہ ہڈیوں میں 30 فیصد اور دماغی سلسلہ میں 60 فیصد تک موجود ہوتی ہے۔ تقریباً 10 فیصد انسانی پروٹین بھی زنک سے بنی ہوئی ہے۔ جو غلٹی میک آپ کو خوب سے خوب تر بناتی ہے۔ زنک نہ صرف تین سو سے زائد خامروں (Enzymes) کا ہم جزو ہے بلکہ اہم ترین کو فیکٹر بھی ہے جو جسم میں نشاستہ، پروٹین، لحمیات اور نیوکلیک ایسڈ کی مرمت اور نوڑ پھوڑ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسم میں نارمل فنکشن اور قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے اس کا براہ راست ذیابطیس کے ساتھ تعلق ہے جو جسم میں انسولین کی پیداوار میں اضافہ، ذخیرہ اندوزی، عمل اور اسکی ریگولیشن میں مدد فراہم کرتا ہے انہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر غذائیات نے روزانہ عورتوں کیلئے 8 ملی گرام / دن اور مردوں کیلئے 12 ملی گرام / دن تجویز کی ہے۔ جسم میں زنک کی کمی بہت قد، بامجہ پن، بالوں کا گرنا، قوت مدافعت میں کمی، زخموں کا فوری نہ بھرنا، بھوک کا نہ لگنا، جھنسی نابالغی، خون کی کمی، غلغلہ دماغ، انتڑیوں میں سوزش، کینسر، نشوونما کا رکنا، جھنسی پیداوار میں کمی اور ذیابطیس جیسی امراض کا موجب بنتی ہے۔ موجودہ سرسبز پروڈیکٹ کا مقصد زک فورٹیفائیڈ چاول ان کی افادیت، اسکی غذائی خصوصیات کو برقرار رکھنا اور جسم سے زنک کی کمی کو دور کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

خوراک میں غیر روایتی پروٹین کا استعمال

پنیا ایچ ڈی سکالر: محمد سبط عباس نگران: ڈاکٹر مسعود صادق بٹ شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

ترقی پذیر دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، جانوروں کے پروٹین کی قیمتوں میں اضافہ اور خوراک کی غیر معیاری وغیرہ محفوظ دستیابی نے محققین کی توجہ اس امر کی طرف مرکوز کی ہے کہ اب پروٹین کے کچھ نئے ذرائع تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ معیاری پروٹین کی کمی کی وجہ سے عوام الناس خاص طور پر بچے غذائی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ پروٹین انسانی جسم کے مختلف افعال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لہذا ان کی مناسب مقدار میں فراہمی انسانی جسم کی بڑھتی ہوئی کوئی بھی بات ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے اعلیٰ معیاری پروٹین غذا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین کو سبز یوں اور پودوں سے حاصل کردہ پروٹین کے مقابلے میں زیادہ معیاری سمجھا جاتا ہے لیکن یہ نہایت مہنگی ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر پروٹین کے کچھ نئے اور موثر ذرائع تلاش کرنا انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ موجودہ دور میں غذائی ضروریات اور وسائل کو دیکھتے ہوئے پودوں سے حاصل کردہ پروٹین پر انحصار کیا جا رہا ہے جسکی بنیادی وجہ ان پروٹینز میں موجود معیاری امینو ایسڈز ہیں۔ اگر مختلف پودوں کو دیکھا جائے تو تیل دار اجناس پروٹین کا ایک غیر روایتی ذریعہ ہیں کیونکہ انہیں بنیادی طور پر تیل نکالنے کے مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیل دار اجناس میں تیل، اسی کیونکہ انہیں مخصوص ساخت کے حامل ہیں۔ ذیلی بر اعظم میں ان تیل دار اجناس کو بعض مقامی کھانے کی مصنوعات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں کیشیم، آئرن، فاسفورس، کاپر، زنک، پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے معدنیات شامل ہیں۔ ان اجناس سے تیل نکالنے کے بعد بچ جانے والا مواد معیاری پروٹین کا اہم ذریعہ ہے جس میں امینو ایسڈز کی متوازن مقدار موجود ہوتی ہے۔ جبکہ یہ مواد عام طور پر جانوروں کی فیڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا انسانی خوراک میں ان تیل دار اجناس سے حاصل کردہ پروٹین کا استعمال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ان پروٹینز کو استعمال کرنے کیلئے اور انسانی غذا کی غذائیت کو بہتر بنانے کے لئے ایک خصوصی لائحہ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں متعدد غذائی اشیاء کی تیاری کے لئے مجموعی آغا کا استعمال کر کے ہدف حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بیکری اشیاء کھانے کے اجزاء جیسے پروٹین کو شامل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اگر بیکری اشیاء خاص طور پر مرثن میں تیل دار اجناس سے حاصل کردہ پروٹین شامل کی جائے تو یہ لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پروٹین توانائی کی غذائیت میں کمی کو دیکھتے ہوئے مختلف تیل دار اجناس یعنی تیل، اسی اور کیو لاسے معیاری پروٹین حاصل کر کے اس کو متعدد غذائی اشیاء میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ غذائی اشیاء یقینی طور پر کمزور طبقہ کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ نیز ان سے لوگوں کی غذائی ضروریات کو بھی کافی حد تک پورا کیا جاسکتا ہے۔

فورٹیفائیڈ اسٹیک کی غذائی اہمیت

پنیا ایچ ڈی سکالر: فیض الحسن شاہ نگران: ڈاکٹر میاں کامران شریف شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

اسٹیک فوڈ عام طور پر ایسے فوڈز ہیں جو مقدار میں عام کھانے سے کم ہوتے ہیں اور کھانے کے عام اوقات کے درمیان کھائے جاتے ہیں۔ جان موٹھو نے پہلی مرتبہ اسٹیک کی اصلاح کو استعمال کیا جب اس نے سڈ ہووچ کو ایک اسٹیک فوڈ قرار دیا۔ اب سڈ کوچ پوری دنیا میں ایک مشہور اسٹیک فوڈ ہے۔ آج پوری دنیا کی مارکیٹس مختلف اقسام کے اسٹیک فوڈز سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں اسٹروڈ سیریلز، ناشتے میں استعمال ہونے والے سیریلز اور دوسرے بے شمار پروڈکٹس شامل ہیں۔ یہ کیسے جانا جائے کہ اسٹیک فوڈ ہیلتھی ہے یا نہیں؟ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس حوالے سے خاص ہدایت جاری کی ہیں جس سے ہم آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ کسی بھی فوڈ میں کتنی غذائیت ہے اور ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لئے پورے دن میں کتنی غذائیت کے ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم مختلف کھانوں کو غذائیت کے معیار پر پرکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اسٹیک فوڈز کے صحت مند ہونے یا نہ ہونے کو بھی جانا جاسکتا ہے۔ یعنی یہ دراصل کسی بھی فوڈ میں موجود غذائیت ہے جو اسے مفید یا غیر مفید بناتی ہے۔ اسی طرح اسٹیک فوڈز کا آپس میں بھی موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی ہیلتھی اسٹیک میں توانائی کم ہوتی ہے جبکہ غذائیت والے اجزاء زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسے فوڈ کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں جس میں توانائی کم جبکہ غذائیت والے عناصر زیادہ ہوں تو ہم نہ صرف اپنے وزن پر قابو رکھ سکتے ہیں بلکہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس پروڈیکٹ کا بنیادی مقصد ایسا اسٹیک فوڈ بنانا تھا جو پروٹین، فائبر، وٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہو۔ اس مقصد کے لئے فورٹیفائیڈ اسٹیک فوڈ بنائی گئی جس کو مختلف لیبارٹری ٹیسٹ سے جانچا گیا۔ ایسے فورٹیفائیڈ اسٹیک فوڈ جن میں سویا بین ڈالی گئی تھی، ان میں پروٹین، ایش اور فائبر عام اسٹیک فوڈز سے زیادہ تھی۔ ان میں آئرن، زنک اور وٹامن اے کی روزانہ کی ضرورت پوری کرنے کی اہلیت بہتر تھی۔ ان اسٹیک فوڈز کو اسکول کے بچوں کی گروٹھ اور نشوونما کے لئے بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایسے اسٹیک فوڈ جن میں سویا بین تھی اس نے بچوں کی نشوونما میں نمایاں کردار ادا کیا جس سے بچوں کے اوسط قد میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ سیرم فریٹن، ایچ بی، آر بی سی، پی وی سی، ایم سی وی، ایم سی ایچ اور ایم سی ایچ میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ بعد ازاں نیوٹریشن بار بھی بنائی گئیں جن کے بنیادی اجزاء میں چاول، سویا بین، پروٹین اور مائیکرو نیوٹریٹس شامل تھے جس کے استعمال سے پروٹین اور وٹامنز کی روزانہ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ پس ثابت ہوا

کہ ایسی پروٹین اور مائیکرو نٹریٹس سے بھرپور غذا کے استعمال سے اسکول کے بچوں میں غذائی کمی کو دور کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی سطح پر اسکول میں نیوٹریشن پروگرام شروع کئے جاسکتے ہیں جس میں اس قسم کی فوریٹینڈ اکسٹروڈا سٹیک فوڈ کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

گندم کے آٹے کی بسکٹ بنانے کے لحاظ سے مکمل جانچ

پی ایچ ڈی سکالر: عائشہ ریاض گمران: عمران پاشا شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

پاکستان میں بیکنگ انڈسٹری روز افزوں ترقی کر رہی ہے اور ملک کی معاشی ترقی میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ بیکنگ انڈسٹری کی مختلف اقسام کی مصنوعات میں بسکٹ ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد میں یکساں مقبول ہیں۔ اگرچہ غذائی اعتبار (افادیت) سے کسانوں، آٹا بنانے والی ملوں اور عوام کی دلچسپی گندم کی زیادہ لمبیات والی اقسام میں پائی جاتی ہے اور عام طور پر ایسی اقسام روٹی (Bread) بنانے میں بھی زیادہ فعال ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن بسکٹ کی کوالٹی کو کم لمبیات والی گندم کی ایسی قسم جس میں 7 سے 10 فیصد تک پروٹین لمبیات ہو، سے وابستہ ہوتی ہے۔ مزید برآں، بسکٹ کی کوالٹی کا انحصار گندم کے آٹے کے کیمیائی اجزاء کے پانی جذب کرنے کی صلاحیت پر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ زیادہ پانی جذب کرنے والے اجزاء، بسکٹ کی تیاری کے دوران گلوٹن (Gluten) بننے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں جس کا اس کی کوالٹی پر منفی اثر پڑتا ہے اور ان کی ساخت بھی سخت ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اگائی جانے والی گندم کی مختلف اقسام کو ان کی خصوصیات اور ان سے بننے والی بیکری پروڈکٹ (Baked Products) کے اعتبار سے الگ کرنے اور تجارت کا منظم نظام موجود نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے فلور ملز گندم کو آٹا میں تبدیل کرنے کے لئے تجارتی طور پر دستیاب گندم کی مختلف اقسام کا مرکب (Mixture) حاصل کرتی ہیں اور جسے بعد میں بیکنگ انڈسٹری مختلف بیکری مصنوعات کی تیاری میں استعمال کرتی ہیں۔ بسکٹ کی تیاری میں آٹے کی ضروری خصوصیات کی حامل قسم کی عدم دستیابی کی وجہ سے بیکنگ انڈسٹری زیادہ تر گندم کی جملہ اقسام کے آٹے (Mixed wheat flour) کے متعلق مسائل سے دوچار ہیں۔ کیونکہ اس کی خصوصیات غیر یقینی ہوتی ہیں۔ لہذا آٹے کو ایک خاص معیار کے مطابق ڈھالنے کیلئے بیکنگ انڈسٹری زیادہ مقدار میں چھنائی (Fat) اور لیویننگ ایجنٹ (Leavening Agent) استعمال کرتی ہے۔ لیکن اس کا اضافی خرچ نہ صرف انڈسٹری کو معاشی نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے بلکہ افراط زر کا رجحان بھی بڑھاتا ہے۔ اس تناظر میں، حالیہ تحقیق کا مقصد پاکستان میں بیکنگ انڈسٹری کو درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور مختلف ٹریڈسٹ کا مقصد آٹے کی فعال خصوصیات کو تبدیل کرنا اور Mixed Wheat flour کی کوالٹی میں بہتری کو یقینی بنانا ہے۔ اس تحقیق کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا پہلے مرحلے میں گندم کی پانچ اقسام کو صوبہ پنجاب اور سندھ سے حاصل کیا گیا۔ اور اس کے مختلف طبعی، کیمیائی اور Sensory لحاظ سے تجربات کئے گئے۔ ان نتائج کے مطابق گندم کی قسم (AARI-2011) کو بسکٹ بنانے کے لئے دیگر اقسام سے بہتر تصور کیا گیا۔ اور یہ مشاہدہ بھی کیا گیا کہ اگرچہ پنجاب اور سندھ کی گندم کی مختلف اقسام کا موازنہ کیا جائے تو سندھ کی گندم کی اقسام اگرچہ غذائی اعتبار سے پنجاب سے بہتر پائی گئیں لیکن بسکٹ بنانے کے لئے انتہائی ناموزوں ہیں اور ان کا بہتر مستعمل روٹی کے لئے مناسب ہے۔ تحقیق کے دوسرے مرحلے میں گندم کی اس منتخب شدہ وراثی (AARI-2011) کو بھی Mixed flour کے ساتھ بسکٹ بنانے کے لئے مختلف ٹریڈسٹ مثال کے طور پر کیمیائی طور پر تبدیل نشاستہ (Chemically modified starch)، ایرکاربک ایسڈ (Ascorbic acid)، انزائم (خامرے) پوٹاشیم آئیوڈیٹ (Potassium iodate) اور سوڈیم مینا بائی سلفائیٹ (Sodium meta bisulfite) کے ساتھ جانچا گیا۔ بنیادی طور پر ان ٹریڈسٹ (treatment) کا مقصد Mixed wheat flour سے بننے والے بسکٹ کی کوالٹی کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے علاوہ گندم کے آٹے پر اور اس سے بننے والے بسکٹ کی بیکنگ کوالٹی (Baking quality) پر مرتب ہونے والے اثرات کا اندازہ لگایا گیا۔ مختلف ٹریڈسٹ کے تقابلی جائزہ نے ثابت کیا کہ آٹے میں کیمیائی طور پر تبدیل شدہ نشاستہ (Chemically modified Starch) کے 15 فیصد استعمال سے بننے والے بسکٹ کے پھیلاؤ (Spread) کی شرح سب سے زیادہ پائی گئی۔ تاہم اس کے 10 فیصد سے زیادہ استعمال نے بسکٹ کے خواص پر منفی اثر ڈالا۔ مجموعی طور پر مختلف ٹریڈسٹ میں سے انزائم (خامرے) اور سوڈیم مینا بائی سلفائیٹ (Sodium meta Bisulfite) گندم کے آٹے میں استعمال سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا اور اس سے بننے والے بسکٹ کے پھیلاؤ کی شرح اور تمام خواص دیگر سے بہتر پائے گئے۔ بسکٹ بنانے کے کے بیکنگ انڈسٹری مخصوص معیار کی گندم کی غیر فراہمی کی مشکلات سے دوچار ہے پس موجودہ تحقیق میں بسکٹ بنانے کے لئے ایک خاص قسم کی گندم یا آٹے کی ضرورت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مختلف ٹریڈسٹ کی بیکنگ کوالٹی پر مثبت اثر انداز ہوا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا۔ کہ مختلف (Processing Aids) کو گندم کے خاص معیار سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس تحقیق کا فائدہ نہ صرف انڈسٹری کو ہوگا۔ بلکہ کسان، فلور ملز مالکان اور سب سے بڑھ کر صارف کو بھی خاطر خواہ فائدہ ملے گا۔

بعد از کٹاؤ امرود کی کوالٹی پر ایم سی پی کے اثرات

پی ایچ ڈی سکالر: ظفر اقبال گمران: اعلیٰ محمد عاطف رندھاوا شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

پھلوں کی غذائی اہمیت کی بدولت دنیا بھر میں پھلوں کا استعمال ہر سال بڑھ رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ملک میں سے ایک ہے جہاں انواع و اقسام کے پھل کاشت کئے جاتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے پاکستان میں پھلوں کا بعد از کٹاؤ ضیاع 25 تا 40 فیصد ہے۔ امرود باوجود اپنی غذائی اہمیت کے ان پھلوں میں شامل ہے جن کو بعد از کٹاؤ محفوظ کرنے کے لئے بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ امرود میں پکنے کا عمل پھل کے کٹاؤ کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اگر بعد از کٹاؤ امرود میں انتھلمین کی پیداوار کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھل کو کافی عرصہ تک محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ میتھائل سائیکلو پروپیئن (۱-ایم سی پی) کو عالمی سطح پر پھلوں کو انتھلمین کے منفی اثرات سے بچانے کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ پاکستان میں ۱-ایم سی پی کا استعمال تحقیقی اور صنعتی طور پر قدرے کم ہے۔

موجودہ تحقیق میں امرود کی دو اقسام (گولا اور صحرائی) کو ۱-ایم سی پی کی مختلف مقداروں (0، 200، 500 اور 800 پی پی بی) سے گزارا گیا جسکے بعد انہیں دو مختلف ماحول میں محفوظ کیا گیا اور ہر 6 دن بعد ایک ماہ کے لئے تجربات کئے گئے۔ دوران تحقیق یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ پھل جن پر ۱-ایم سی پی کو اپلائی نہیں کیا گیا وہ 6 دن کے اندر قابل استعمال نہ رہے۔ جبکہ وہ پھل جن کو 200 پی پی بی کی مقدار سے گزارا گیا تھا، ایسے امرود ابتدائی 12 دنوں کے لئے محفوظ رہے۔ امرود کی دو اقسام کے لئے ۱-ایم سی پی کی کم مقدار کا اثر وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔

وہ پھل جن کو ۱-ایم سی پی کی انتہائی مقدار (800 پی پی بی) سے گزارا گیا تھا وہ مکمل طور پر پک نہ سکے جیسا کہ انکی ساخت اور رنگت سے ثابت ہوا۔ ججز نے بھی ایسے پھلوں کو رنگت، خوشبو، ذائقہ، ساخت اور مجموعی طور پر پسند نہیں کیا۔ امرود کی سب سے اچھی کوالٹی 500 پی پی بی نے برقرار رکھی اور ججز نے دوران تحقیق ایسے پھلوں کو اسکے ذائقے، خوشبو اور دیگر عوامل کی بنیاد پر پسند کیا۔

موجودہ تحقیق کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ:

۲۔ ایسے امرود جسکو ۱-ایم سی پی کی مقدار دی گئی انکی کوالٹی ایسے پھلوں سے بہت بہتر تھی جن کو ایم سی پی کے عمل سے نہیں گزارا گیا۔ مزید برآں 500 پی پی بی نے امرود کی کوالٹی کو سب سے بہتر محفوظ کیا جسکے بعد 200 پی پی بی کی بجائے 800 پی پی بی کی مقدار نے پھل کو پکنے کے عمل سے روکا۔

- ۲۔ پھلوں کو 5 فیصد کاربن ڈائی آکسائیڈ والی فضاء میں صرف اسی صورت میں رکھیں اگر انکو 12 ایام سے زائد عرصہ تک محفوظ کرنا ہو۔ تاکہ ان کے کھانے کا معیار کم نہ ہو۔
 - ۳۔ انتھلین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو ۱-ایم سی پی نے قابو میں رکھا جسکی وجہ سے پھل محفوظ رہے۔
 - ۴۔ دوران تحقیق پھلوں کی pH بڑھنے کا دار و مدار مردکی قسم، ۱-ایم سی پی کی مقدار اور سٹوریج حالات پر تھا۔
 - ۵۔ ایک ماہ کے تحقیقی دورانیہ میں وٹامن سی اور شرک الیڈ اور نارٹارک الیڈ کی مقدار ایک خاص ترتیب سے تبدیل ہوئی۔
 - ۶۔ تمام شوگرز ایک خاص وقت تک بڑھی اور پھر انکی مقدار کم ہونا شروع ہوگئی۔ اس خاص تبدیلی کا انحصار ۱-ایم سی پی کی مقدار، مردکی قسم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار پر تھا۔
- درج بالا نتائج کی روشنی میں یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ ۱-ایم سی پی کو استعمال کرتے ہوئے پھل کی قسم، سٹوریج کے حالات اور پھل کے استعمال کے دورانیہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ مقدار پھل کو پکنے سے روکتی ہے۔ ۱-ایم سی پی اور دوسرے طرح کے دوسرے کلائمیٹرک پھلوں کو محفوظ کرنے کا ایک جدید اور موثر طریقہ ہے۔ جسکو پاکستان میں پھلوں کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ 25 تا 40 فیصد بعد از کٹاؤ نقصان کو کم کیا جاسکے۔

اونٹ کا دودھ، استعمال اور فوائد

پی ایچ ڈی سکالر: زہد قدیر نگران: نزہت ہما شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

اونٹ جہاں صحرا کا جہاز کہلاتا ہے وہی صحرائیں ایسے والے لوگوں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے خاص طور پر اس کا دودھ جو اپنے اندر بیش بہا خوبیاں رکھتا ہے۔ تقاضا اس چیز کا ہے اس کے استعمال کو عام کیا جائے۔ اونٹ کا دودھ اپنے بے شمار فوائد کیساتھ مکمل غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ ان ہی خوبیوں کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی ساخت پر غور کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صحرا کے سخت موسم میں کئی دن تک کھائے پینے بغیر گزارہ کر سکتا ہے اور شدید خشک سالی میں بھی اپنی کوہان کی چربی کو استعمال کرتے ہوئے دودھ کی پیداوار کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خشک سالی کے دنوں میں اس کے دودھ میں ایسی کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں جو صحرا کے رہنے والوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے اونٹ کا دودھ کو فلاح، ذیابیطس، ٹی بی، بریقان اور جلدی امراض کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس پر سائنسی تحقیق بھی کی جا رہی ہے۔ جو اس کے طبی فوائد کو موثر طریقہ سے بیان کر رہی ہے اور یہ بطور پرکھا جاسکتا ہے کہ اونٹ کا دودھ بہت سی بیماریوں کا قدرتی علاج ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریا ختم کرنے کا جزو باقی جانوروں کے دودھ کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل اونٹ کے دودھ کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غذائیت کے لحاظ سے اس دودھ میں وٹامن C کی مقدار گائے اور بھینس کے دودھ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ وٹامن بی فوائڈ اور نمکیات بھی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس دودھ کو پینے سے شریانوں سے کولیسٹرول کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ جو اس کی مقبولیت کی ایک اور وجہ بن گئی ہے۔ پیداوار کے لحاظ سے سعودی عرب، صومالیہ اور لبیا سرفہرست ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی اور نعمتوں کے علاوہ اونٹ کی بھی ایک بہترین نسل عطا کی ہے۔ جو دودھ کی پیداوار کے لئے مشہور ہے لیکن بد قسمتی سے ابھی تک اس قیمتی اثاثہ کو کمرشل بنیادوں پر وہ درجہ نہیں ملا جو اس کا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی صحرائی طبقے کا انحصار زیادہ تر اونٹ اور اونٹ کے دودھ پر ہی ہے۔ یہ لوگ اس دودھ کو زیادہ تر تازہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد دودھ کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے جو اس دودھ کو لمبے عرصے تک استعمال کے قابل بناسکے۔ عرب ممالک میں غیر شدہ دودھ کی مصنوعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دودھ کی غذائی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے دودھ روز کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جاسکے۔ چیز یا پھر بنانا دودھ کے غذائی اجزاء کی کو محفوظ کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اونٹ کے دودھ سے پھر بنانا بہ نسبت گائے یا بھینس کے دودھ سے مشکل کام ہے۔ کیونکہ اس اونٹ کی لحمیات کی ساخت بھینس اور گائے کے دودھ سے مختلف ہے۔ لیکن اگر طریقہ میں کچھ تبدیلیاں کر لیں تو یہ کام آسان کیا جاسکتا ہے۔ جیسے خاص درجہ حرارت پر دودھ کو گرم کرنا۔ اس pH کم کرنا، دودھ میں کیشیم کلورائڈ شامل کرنا اور اونٹ کے دودھ کے ساتھ بھینس کے دودھ کو شامل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ دہی میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا جو زیادہ تر زہایت پیدا کر سکیں مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کا زائمر Rannet پیڑ کی کوئی کو بہتر بنانے کے لئے موثر ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم بھینس کے دودھ کی کچھ مقدار اونٹ کے دودھ کے ساتھ پیڑ بنانے کے لئے شامل کر لیں اس سے نتائج اور بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ حاصل شدہ پیڑ کو پلاسٹک ڈبوں میں بند کر کے فروغ میں محفوظ کیا جاسکتا ہے اور اس طرح ہم ایک قدرتی قیمتی نعمت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اس کی افادیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پیڑ کو مختلف کھانے میں شامل کیا جاسکتا ہے اور خاص طور پر بچوں کے لئے بنائے گئے۔

ملٹھی: مختلف بیماریوں کا دیکھی علاج

پی ایچ ڈی سکالر: محمد تبیل نگران: ڈاکٹر اللہ رکھا شعبہ: فوڈ ٹیکنالوجی

بدلتے ہوئے غذائی رجحانات مثلاً نباتاتی خوراک کا کم استعمال اور پروسسڈ غذائی مصنوعات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بہت سی بیماریوں جیسا کہ جگر کی خرابی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس، موٹاپا، دل کی بیماریوں اور مختلف اقسام کے سرطان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں فاسٹ فوڈ مثلاً برگر، شورما، پیزا، اور سینڈویچ کے استعمال میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس صورتحال میں پودوں سے حاصل ہونے والے غیر توانائی بخش اہم ادویاتی اجزاء مختلف امراض کے علاج کے لئے خاص ہتھیار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ "غذا بطور دوا اور دوا بطور غذا" کے نظریے نے غذائی مصنوعات میں موجود اہم ادویاتی اجزاء کے استعمال کو ٹھوس بنیاد فراہم کی ہے۔ پودوں میں قدرتی طور پر موجود ان اجزاء کو مختلف سائنسی عوامل کے تحت علیحدہ کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں ان کو دیگر غذائی مصنوعات کی تیاری میں استعمال کیا جاسکے۔ یہ مفید اور ادویاتی اجزاء اینٹی آکسیڈینٹس، فائبر اور دیگر خصوصیات کے حامل ہونے کی وجہ سے بیماریوں کے خلاف بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ ملٹھی پھلیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک پودے کی جز کا نام ہے جو کہ پاکستان کے کچھ علاقوں کے ساتھ ساتھ بھارت، ایران، افغانستان، قازقستان، تاجکستان، چین، روس اور بھارت میں وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں پنجاب، بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر کے کچھ علاقے میں ملٹھی کی وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ غذائی مصنوعات میں ملٹھی کا استعمال عام طور پر ذائقہ بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے اور امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ملٹھی کو انسانی صحت کے لئے محفوظ اور کسی نقصان سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ ملٹھی پر کی جانے والی مختلف سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ قوت مدافعت بڑھانے، دل اور جگر کی بیماریوں کو کم کرنے اور کینسر کو روکنے میں مدد گار ثابت ہوئی ہے۔ تازہ ملٹھی کی جڑوں میں سے تقریباً 20 فیصد ادویاتی اجزاء کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے جن میں سب سے اہم کیمیائی جزو "گلیسرائزن" (3-5 فیصد) ہے جو کہ کولیسٹیم کی نمکیات کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ملٹھی میں پایا جانے والا دوسرا اہم جزو فلیوونائیڈ (2-1 فیصد) ہے جو ملٹھی کی جڑوں میں پائے جانے والے زرد رنگ کا باعث ہے۔ ملٹھی میں ان اجزاء کے علاوہ دیگر 400 سے زائد مفید اور صحت بخش کیمیائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ زیر نظر تحقیقی مقالہ کولیسٹرول کم کرنے کی قوت مدافعت بڑھانے اور جگر کی بیماریوں کے خلاف ملٹھی میں پائے جانے والے اہم اجزاء کی صلاحیت کو جانچنے کے لئے ترتیب دیا گیا۔ اس تحقیق میں مختلف سائنسی عوامل کے ذریعے ملٹھی میں موجود ان اجزاء کو علیحدہ کیا گیا اور ان کی مختلف مقدار شامل کر کے کئی مشروب تیار کئے گئے جن کا بعد میں آپس میں موازنہ کیا گیا۔ اس کے بعد

یہ مشروب ایک مخصوص عرصے کے لئے صحت مند اور بیمار چوہوں کو پلایا گیا تاکہ ان چوہوں کے خون اور پٹھوں کے نمونہ جات کے طبی معائنے کے بعد بیماریوں کے خلاف ان اجزاء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاسکے۔ تحقیق کے نتائج سے پتہ چلا کہ مِلٹھی میں پائے جانے والے اجزاء نیکیلیسٹرول اور خون میں پائے جانے والے نقصان دہ فیٹی ایسڈز کم کرنے اور جگر میں بننے والے زہریلے مادوں کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ پس، مِلٹھی سے تیار کردہ شربت اپنے اندر موجود زیادہ اینٹی آکسیڈینٹس (کینسر سے بچانے والے کیمیائی مادے) اور خوشگوار ذائقے کی بناء پر عوام کے لئے ایک آسان انتخاب ہے۔ مزید برآں، پاکستان میں کم قیمت پر دستیاب مِلٹھی کا شربت تیار کرنے میں زیادہ لاگت بھی نہیں آتی جس کی وجہ سے عوام پر ادویات کے اخراجات کا بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں، موجودہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مِلٹھی سے تیار کردہ شربت کے باقاعدہ استعمال سے انسانی صحت پر کسی قسم کے نقصان دہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ مِلٹھی میں پائے جانے والے اجزاء بیماریوں کے علاج میں مفید ثابت ہوتے ہیں اور ان سے بنی ہوئی مصنوعات کا استعمال ناقص طرز زندگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے تدارک کے لئے بہترین نسخہ ہے۔

سیوج سلج اور کمپوسٹ کے مٹی کی صحت اور پودے کی نشوونما پر اثرات

پی ایچ ڈی۔ کالر: عمیر ریاض نگران: ڈاکٹر غلام نقی شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

سیوج سلج (گندی نکاسی کا کچھڑ) اور کمپوسٹ (بلدیاتی، صنعتی اور زراعت کے فضلہ مرکب) کا زرعی زمین پر استعمال اسے ضائع کرنے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ سیوج سلج اور کمپوسٹ کی ساخت میں بہت سے فائدہ مند اجزاء خوراک کے ساتھ ساتھ بھاری مقدار میں نامیاتی مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھاری دھاتوں کا ایک خاص حد سے زیادہ پایا جانا پودوں اور انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا پنجاب کے مختلف اضلاع سے صنعتی اور بلدیاتی گندے پانی کو ٹھیک کرنے کا یونٹ سے سیوج سلج کے نمونہ جات اکٹھے کئے گئے اور ان کے چاول کی پیداوار اور نشوونما پر اثرات دیکھے گئے۔ مشاہدات سے ثابت ہوا کہ واسیوج سلج نے مٹی کی برقی موصلیت کو سب سے زیادہ بڑھایا جبکہ چاول کی سب سے کم پیداوار واسیوج سلج اور کواکولائیٹ سیوج سلج سے پائی گئی۔ مختلف تجارتی کمپنیوں سے اکٹھے کئے گئے نمونہ جات نے سیوج سلج کے نمونہ جات سے زیادہ پیداواری۔ سب سے زیادہ پیداوار اور پودے کی بہترین نشوونما سپر بلوم ملتان کمپوسٹ کے استعمال سے پائی گئی اور مٹی کی خصوصیت میں واضح بہتری پائی گئی۔ اس لئے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سیوج سلج کے براہ راست استعمال سے گریز کیا جائے اور سپر بلوم ملتان کمپوسٹ کو چاول کی پیداوار کے لئے کم سطح پر استعمال کیا جائے اور کمپوسٹ (تجارتی کمپنیز اپنی مصنوعات کے اوپر بھاری دھاتوں کی مقدار کو بھی چسپاں کریں تاکہ اس کے استعمال سے مٹی اور پودوں کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔

بائیوچار کے استعمال سے گندے پانی سے سیراب شدہ بزیوں میں بھاری دھاتوں کی مقدار کو کم کرنا

پی ایچ ڈی۔ کالر: ذیشان اسلم نگران: ڈاکٹر محمد خالد شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

ضائع شدہ پانی دنیا کے شہروں اور ان کے ارد گرد کے علاقوں میں بزیوں (ٹوٹل ضائع شدہ پانی کا 30 فیصد) چارہ جات اور خوراک کے طور پر استعمال ہونے والی فصلوں کی آبپاشی کے لئے مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ پانی پودوں کے غذائی اجزاء کی بہت زیادہ مقدار رکھنے کے ساتھ نامیاتی اور غیر نامیاتی آلودہ کاروں کی وسیع اقسام پر مشتمل ہوتا ہے غیر نامیاتی آلودہ کاروں میں بھاری دھاتیں اپنے ثابت، زہریلے پن اور غیر حیاتیاتی ٹوٹ پھوٹ کی نوعیت کی وجہ سے بڑا اہم مسئلہ ہیں۔ پاکستان میں ضائع شدہ پانی سے زیر آب ہونے والی بزیوں میں زہریلی دھاتیں خاص طور پر کیڈمیم، کرومیم اور لیڈ کی مقدار پودوں کے لئے زہریلی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ مزید برآں یہ زہریلی دھاتیں خوراک کے طور پر استعمال ہونے والی آلودہ فصلوں، خاص طور پر بزیوں کے استعمال کے ذریعے سے غذائی سلسلہ میں داخل ہو جاتی ہیں اور انسانوں میں بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ بھاری دھاتوں سے آلودہ مٹی اور ضائع شدہ پانی کو ٹھیک کرنے کے لئے بائیوچار کا استعمال ایک ابھرتی ہوئی اور امید افزا ٹیکنالوجی ہے۔ اس مطالعہ کی بنیاد یہ مفروضہ قائم کیا گیا کہ بائیوچار کا استعمال ضائع شدہ پانی سے زیر آب بزیوں میں بھاری دھاتوں کی مقدار کو کم کر سکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں کئے گئے ایک مطالعہ میں چار مختلف بائیوچار کو دو طرح کے خام مادوں ضائع شدہ گھاس اور پالپ کی شاخیں اور دو طرح کے کیمیائی تعفن درجہ حرارت 350°C اور 650°C کو استعمال کر کے بنایا گیا۔ ان بائیوچار کو انکی غذائی، کیمیائی اجزاء، مولر اور آکسیجن پر مشتمل فعلی گروپس کی بنیاد پر الگ کیا گیا کم کیمیائی تعفن درجہ حرارت (350°C) پر ضائع شدہ بزرہ اور پالپ کی شاخوں سے تیار کی گئی بائیوچار بہترین کیمیائی خصوصیات (جیسا کہ مثبت چارج کے حامل آنز کے تبادلہ کی زیادہ صلاحیت رکھنا) اور نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کے اجزاء کی حامل بہترین غذائی خصوصیات اور آکسیجن پر مشتمل فعلی گروپس کی زیادہ مقدار پر مشتمل تھی با نسبت زیادہ درجہ حرارت (650°C) پر تیار کی گئی بائیوچار کے۔ ان چاروں اقسام کی تیاری گئی بائیوچار کو بھاری دھاتوں سے آلودہ پانی اور مٹی کی اصلاح کے لئے اور انکی اہلیت کو چیک کرنے کے لئے بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ کم کیمیائی تعفن درجہ حرارت یہ تیاری گئیں بائیوچار جیسا کہ ضائع شدہ بزرہ گھاس سے 350°C درجہ حرارت پر بنائی گئی بائیوچار اور پالپ کی شاخوں سے 350°C درجہ حرارت پر تیار کی گئی بائیوچار کو پانی اور مٹی سے بھاری دھاتوں (لیڈ، کیڈمیم اور کرومیم) کے زیادہ سے زیادہ خاتمے انہیں غیر متحرک بنانے کے لئے جانچا گیا۔ ان دونوں بائیوچار کو ضائع شدہ پانی سے زیر آب ہونے والی مٹی اور چکیرہ فارم فیصل آباد سے لائے گئے۔ ضائع شدہ پانی سے بھاری دھاتوں کے زیادہ سے زیادہ خاتمے انہیں غیر متحرک کرنے کی بنیاد پر بائیوچار کی بہترین شرح وزن کو معلوم کرنے کے لئے جانچا گیا۔ یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ منتخب شدہ بائیوچار کی دو فیصد (وزن با وزن) اور 4 گرام فی لیٹر شرح نے مٹی اور پانی کے لئے بالترتیب زیادہ سے زیادہ بھاری دھاتوں کو غیر متحرک بنایا اور زیادہ سے زیادہ ان کا خاتمہ کیا۔ بہتر ہوئی مٹی کی کیمیائی خصوصیات جو مٹی کی مثبت چارج کے حامل آنز کے تبادلہ کی زیادہ صلاحیت کو رکھتا اور بڑھنے ہوئے نامیاتی کاربن کے اجزاء کو اپنے اندر شامل کرتی ہیں مٹی میں بڑھی ہوئی خوردبینی حیاتیاتی کاربن اور بائیوچار کی خصوصیات (جیسا کہ آکسیجن پر مشتمل فعلی گروپس کی زیادہ مقدار اور مثبت چارج کے حامل آنز کے تبادلہ کی زیادہ صلاحیت رکھنا) بھاری دھاتوں سے آلودہ مٹی اور پانی کو ٹھیک کرنے کے لئے بنیادی طریقہ کاروں سے منسلک تھا۔ مٹی کے اندر بائیوچار کا استعمال بھاری دھاتوں کی مٹی سے تدارک کے ساتھ مٹی کی غذائیت سے متعلقہ خصوصیات کو اس طرح بہتر بناتا ہے کہ یہ زمین میں ٹوٹل نائٹروجن، پودوں کو دستیاب فاسفورس اور پوٹاشیم کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ گیلے میں کئے گئے آخری تجرباتی مطالعہ میں ضائع شدہ پانی سے زیر آب تیار ہونے والی پالک کی بڑھوتری، پیداوار معیار اور بھاری دھاتوں کی مقدار پر بائیوچار کے اثر کو جانچنے کے لئے پالک کو ٹیسٹ کی جانے والی فصل کے طور پر لگایا گیا۔ نتیجہ ظاہر کیا کہ ضائع شدہ پانی سے زیر آب ہونے والی زمین جس میں 50% تجویز کی گئی کھاد کی مقدار کے ساتھ بائیوچار کو براہ راست زمین میں ڈالا گیا۔ بھاری دھاتوں سے متعلقہ حفظان صحت کے معیار اچھی غذائیت کی حامل پالک کی زیادہ بہتر پیداواری دی۔ با نسبت اس زمین کے جس میں بائیوچار سے صاف کیا گیا یا بہتر کیا گیا پانی کو آبپاشی کے لئے استعمال کیا گیا۔

کوئلہ پوریا: نائٹروجنی کھادوں میں جدت

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد اویس خالد نگران: محمد یلین شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

ایک صحت مند پودے میں نائٹروجن کی مقدار تقریباً 3-4 فیصد تک ہوتی ہے۔ دوسرے غذائی اجزاء کی نسبت نائٹروجن کی یہ مقدار کافی زیادہ ہے۔ نائٹروجن پودے کی بہترین نشوونما کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کلوروفل کا حصہ ہے اور کلوروفل پودے کا وہ اہم ترین حصہ ہے جس کے ذریعے پودا سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراک تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نائٹروجن امانتو

ایسڈ کا بھی حصہ ہے جو پروٹین پودے کے بائیولوجیکل ری ایکشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس پر زندگی کا انحصار ہے۔ نائٹروجن DNA اور Genetic Material کا بھی حصہ ہے جس سے پودے کی بڑھوتری اور ری پروڈکشن ہوتی ہے۔ پودوں کے لئے نائٹروجن کی سب سے زیادہ مقدار رکھنے والی کھاد یوریا ہے۔ جو پانی میں بہت جلد حل پذیر ہو جاتی ہے۔ بے شک اس سے دوسری کھادوں کی نسبت فریٹلائزرز برن کا خطرہ کم ہے۔ لیکن ایسے علاقے جہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں یوریا کے استعمال سے فریٹلائزرز برن کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ Volatization کے ذریعے کھاد کا ضیاع بھی بڑھ جاتا ہے۔ جہاں کھاد پانی میں حل پذیر کیے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ حل پذیر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کھاد پانی میں حل ہو کر بہت کم عرصے کے لئے پودے کو مہیا رہتی ہے اور ماحول میں اخراج سے ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد پودا نائٹروجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے پودے کی نشوونما کے تمام مراحل بہت آہستہ ہو جاتے ہیں اور فصل کی کم پیداوار کا باعث بنتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے بہت سے مرکبات حل پذیر کھاد کے اوپر تہہ کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ جو کھاد کی حل پذیر میں کافی حد تک کمی واقع کر دیتے ہیں اور نائٹروجن کی فراہمی کو متواتر رکھتی ہے۔ ان مرکبات میں سب سے مؤثر ترین مرکب ایک خاص قسم کا پولیمر ہے جس کی کوٹنگ سے حل پذیر کھاد فوری طور پر پانی میں حل نہیں ہوتی بلکہ یہ آہستہ آہستہ پانی جذب کر کے کم رفتار سے نائٹروجن کا اخراج کرتی ہے۔ اور کھاد کو ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ زیادہ عرصے تک پودوں کے لئے نائٹروجن کی دستیابی کا سبب بھی بنتی ہے۔ جس کی وجہ سے پودے اپنی بڑھوتری کے تمام عرصے تک نائٹروجن استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب یوریا کھاد کے اوپر پولیمر کی تہہ چڑھادی جاتی ہے تو یہ فوری طور پر نال حل پذیر کھاد کے طور پر کام کرتی ہے۔ جو عارضی طور پر یوریا کے دانے کو مٹی کے انوائرنمنٹ سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ پولیمر کوٹنگ کے لئے ایک پولیمر یا زیادہ پولیمر کا مجموعہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جو ایک پرمی ایبل (Permeable) یا پرمی ایبل (Impermeable) ممبرین کے طور پر کام کرتے ہیں جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں۔ غذائی اجزاء ان سے آہستہ آہستہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ممبرین کی پرمی ایبلٹی کی خصوصیات حرارت اور پانی کی مقدار سے متاثر ہو سکتی ہیں جبکہ مٹی کی خصوصیات جیسے سوائل pH، salinity، cation exchange capacity، اس پرائنڈنڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے پولیمر کوٹڈ کھادوں سے غذائی اجزاء کے اخراج کی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے۔

پولیمر کوٹڈ کھادوں کے فوائد

چونکہ نائٹروجن کا استعمال ہر طرح کی فصل کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے نائٹروجن رکھنے والی کھادوں پر پولیمر کوٹنگ سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

- 1- اس کے استعمال سے فریٹلائزرز برن کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے۔
- 2- Volatization Losses کم ہو جاتے ہیں۔
- 3- بیج کے ساتھ استعمال کرنے سے بیج Toxic اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔
- 4- Light Textured Soil میں پولیمر کوٹڈ کھادوں کے استعمال سے Leaching Losses کو بہت حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- 5- کوٹڈ کھادوں کے استعمال سے Split application کو ختم کر کے اخراج کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- 6- زمین کی سطح پر اس کے استعمال سے بعد میں incorporate کرنے کا مسئلہ بھی نہیں رہتا۔
- 7- ایسی کھادوں کا استعمال پودوں کو لمبے عرصے تک ایک جیسی مقدار مہیا کرنے کو یقینی بناتا ہے۔

پولیمر کوٹڈ فریٹلائزرز (کھادیں)

پی ایچ ڈی سکالر: ثوبیہ نور نگران: ڈاکٹر محمد سلیمان شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

فاسفورس پودے کی اعلیٰ نشوونما، پیداوار اور بہتر بڑھوتری کے لئے بے حد ضروری ہے۔ پاکستان میں فاسفورس کا سب سے اہم ذریعہ ڈی۔ اے۔ پی کھاد ہے۔ لیکن ڈی۔ اے۔ پی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ زمین میں ڈالی جاتی ہے تو اس سے نکلنے والی فاسفورس دوسرے اجزاء کے ساتھ مرکبات بنا کر غیر حل پذیر ہو جاتی ہے اور تقریباً 75 فیصد تک مقدار غیر حل پذیر ہو کر پودے کو دستیاب نہیں رہتی۔ صرف 25 فیصد فاسفورس پودے کی بہتر نشوونما اور اعلیٰ پیداوار کے لئے دستیاب ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے فاسفورس کا بہت سا حصہ پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتا ہے اور پودا فاسفورس کی شدید کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔

پولیمر کوٹڈ ڈی۔ اے۔ پی

پولیمر کوٹڈ ڈی۔ اے۔ پی عام کھاد کی طرح ہی ہے۔ مارکیٹ میں دستیاب حل پذیر کھاد کے اوپر پولیمر کی تہہ بھادی جاتی ہے جس سے فاسفورس ایک خول میں بند ہو جاتی ہے اور دوسرے اجزاء کے ساتھ مرکبات نہیں بناتی۔ جس سے پولیمر کوٹڈ کھاد سے نکلنے والی فاسفورس پودے کے لئے حل پذیر حالت میں رہتی ہے۔ پولیمر کوٹڈ کھاد کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ زمین میں ڈالی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ پانی جذب کرتی ہے جس سے اس کا حجم بڑھنے لگتا ہے اور یہ پودے کو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر فاسفورس کو حل پذیر حالت میں رکھتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اجزاء کے ساتھ غیر حل پذیر مرکبات بنانے سے بھی بچاتی ہے تاکہ یہ حل پذیر حالت میں زیادہ سے زیادہ دیر تک رہ سکے اور پودے اس حل پذیر فاسفورس کو بآسانی جذب کر سکیں۔ ڈی۔ اے۔ پی کے اوپر موجود پولیمر کم نمی میں بھی کام کرتا ہے۔ جیسے ہی پانی جذب ہوتا ہے اس کے اندر موجود فاسفورس حل پذیر حالت میں آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پودے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جڑیں اس کو آسانی سے جذب کر لیتی ہیں۔ پولیمر کوٹڈ کھاد کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اور ایک کنٹرول رفتار سے پودے کو فاسفورس مہیا کرتا رہتا ہے۔ جس سے پودے کی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے۔ پولیمر کوٹڈ کھادوں کا استعمال اعلیٰ پیداوار کا ضامن ہے۔ یہ زمین کی ذرخیزی کو قائم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کم خرچ ہے، پودے کو آنا ہوتے ہیں اور اس کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ حل پذیر کھادوں کی زمین میں حل پذیر کی کوٹنگ بوبیں رکھنے کے لئے اس کے اوپر مختلف اقسام کی تہیں چڑھائی جاسکتی ہیں۔ حل پذیر کھادوں کی حل پذیر کی کوٹنگ بوبیں رکھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی، معاشی خوشحالی اور پیداوار میں اضافہ۔ کوٹنگ مواد کی اجزاء ترکیبی اور تہوں کی تعداد سے غذائی اجزاء کے اخراج کو ضرورت کے مطابق قابو کیا جاسکتا ہے۔ کوٹڈ کھادوں سے غذائی اجزاء کا اخراج کچھ ہفتوں سے کچھ مہینوں تک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جو کوٹڈ کھادیں بازار میں دستیاب ہیں وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ لیکن ہماری تیار کردہ کوٹڈ کھادیں کم خرچ ہیں۔ اور اس کے خرچ کے مقابلے میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔

کوٹڈ کھادوں کی فوائد

کوٹڈ کھادیں زراعت اور سبزیوں اور پھلوں کے اگاؤ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ زیادہ عرصے تک غذائی اجزاء کی ترسیل کو یقینی بناتی ہیں۔ اس کے استعمال کے بہت زیادہ فوائد ہیں جیسے کہ:

- ☆ اس کا استعمال کھادوں کے ضیاع (leaching and runoff) کو کم کرتا ہے۔
- ☆ جب کوٹڈ کھاد کو بیج کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بیج کو تا باری اثرات سے بچاتی ہیں۔

☆ پودوں کو لمبے عرصے تک تقریباً ایک جیسی مقدار میں غذائی اجزاء کی دستیابی کو یقینی بناتی ہیں۔ جو کہ پودوں کی اچھی نشوونما اور اچھی پیداوار کا باعث بنتی ہیں۔

☆ کوئلہ کھادوں سے زیادہ سے زیادہ فوٹو انداس صورت میں حاصل کئے جاسکتے ہیں کہ غذائی اجزاء کا اخراج اور پودے کی ضرورت ایک ہی وقت پر ہو۔

☆ پولیمر کوئلہ کھادوں کے استعمال سے 25-15 فیصد تک پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔

مختصر اُکھا جاسکتا ہے کہ فاسفورس کا آہستہ آہستہ ملنا پولیمر کی تہوں کی تعداد پر منحصر ہے اور پولیمر کی تہیں کھادوں کے دانے کے اوپر بڑھا کر یا کم کر کے ہم اس کی دستیابی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فاسفورس کے ضیاع کو روکتی ہے اور فاسفورس کی دیر پا دستیابی کو بھی ممکن بناتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بیکٹیریا یا پولیمر کوڈی کمپوز (Decompose) کر دیتے ہیں کیونکہ اس پولیمر کی ساخت کے اندر نائٹروجن اور کاربن موجود ہوتے ہیں جوڈی کمپوزیشن (Decomposition) کے عمل کو تیز کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اس طرح یہ پولیمر زینی آلودگی کا باعث بھی نہیں بنتا۔

بیکٹیریا کی مدد سے تیار شدہ جھاڑیوں کی طرف سے نٹری کے اثرات کی یاد دہانی

پی ایچ ڈی اسکالر: ثوبیا اشرف نگران: ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر شعبہ: سوانہل اینڈ انوٹرمنٹل سائنسز

عالمی سطح پر صنعتی ترقی نے ماحول کی کیفیت کو بایو گراؤنڈ سے آگاہ کر کے خراب کر دیا ہے۔ تمام صنعتوں میں ٹریڈ سب سے زیادہ آلودگی والے ہیں۔ اگرچہ چمڑے کی ٹینگ دنیا بھر میں ایک اہم اقتصادی سرگرمی ہے، خام چھپو اور جانوروں کی کھالوں کو مفید چمڑے کے سامان اور مصنوعات میں تبدیل کرنے میں بہت زیادہ مقدار کا اثر پیدا ہوتا ہے، انتہائی زہریلا نامیاتی اور غیر نامیاتی آلودگی کے ساتھ بوجھ ہوتا ہے۔ یہ زہریلا آلودگی عام طور پر بغیر کسی علاج کے بغیر براہ راست ماحولیاتی طور پر خارج کر دیا جاتا ہے، جس میں ماحولیاتی نظام کو انتہائی خطرناک نقصان پہنچا سکتا ہے جو اس سے رابطے میں آتا ہے، زیادہ سے زیادہ مٹی اور پانی وسائل اور منسلک بائیو۔ متعدد فزیکل و کیمیکل عمل ترقی پذیر ممالک میں صنعتی اثرات کا علاج کرنے کے لئے استعمال کئے جا رہے ہیں، لیکن روایتی ٹیکنالوجی لاگت سے ممنوع ہیں، ثانوی آلودگی پیدا کرتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک میں بڑے پیمانے پر پیچیدہ نٹری کے اثرات کا علاج کرنے کے لئے مشکل ہے کہ وہ اعلیٰ بوجھ اور آگنا نیشن کے ساتھ۔ لہذا، اس موجودہ منظر میں، حیاتیاتی عملوں کا استعمال کرنے کے لئے سب سے زیادہ قابل عمل اختیار ہے، لہذا، اس سلسلے میں آلودگی کو دور کرنے کے لئے ایک پائیدار، سستی اور عملی طریقہ کی طرف سے آبی آلودگی پر قابو پانے کے لئے جیل لینڈز کی تعمیر کا ایک اور وعدہ حل پیش کرتا ہے۔ بد قسمتی سے، ٹی وی ایٹمی کیشن ٹریڈ کے اثرات میں آلودگی کی سطح کو کم کرنے کے لئے درخواست کی تحقیق کے بجائے نظر انداز کی گئی ہے۔ موجودہ تحقیقی کام میں، مختلف میکرو فائٹس ویز، برچہیر یا، کینا انڈیکا، سائبرس لیو یوگٹس، لپٹو چو افسی، اور ٹانفا ڈو مینٹکسنس کے ساتھ نٹری کے اثرات کو بہتر بنانے کے لئے پوچھ گئیں۔ اس کے علاوہ، بیکٹیریا کے ساتھ کو بڑھانے کا اثر بھی ان کی اصلاحی صلاحیت میں بہتری کے لئے تحقیق کی گئی تھی۔ اس منصوبے سے پتہ چلتا ہے کہ آلودگی سے برداشت کرنے والے سیواؤں کے ساتھ سی ڈبلیوز کو پودوں اور آلودگی سے محروم ہونے والے بیکٹیریا کے ساتھ بائیو لائٹس کے ساتھ ہی ممکنہ طور پر معدنی ٹھنڈیری آلودگیوں کو بہتر بنانا اور خارج کرنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے۔ مزید برآں، مچھلی بائیو کے ذریعہ ہر بلا تخصیص کا پتہ چلتا ہے کسی ڈی ڈبلیو کے ذریعہ نٹری کے اثرات کا علاج اس کی زہریلا سطح کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔

لیڈ آلودہ مٹی کا پودوں کی بڑھوتری والے جڑوں کے ذریعے پودوں کا زمین سے لیڈ کا تدارک

پی ایچ ڈی۔ کارل: محمد سلیم نگران: ڈاکٹر حافظ نعیم اصغر شعبہ: انٹیٹیوٹ آف سوانہل اینڈ انوٹرمنٹل سائنسز

موجودہ دور میں زمین کے گرد آلودگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جس میں زیادہ مقدار بھاری دھاتوں کی ہے۔ بھاری دھاتوں میں سے لیڈ ایک اہم دھات ہے جو کہ زینی آلودگی میں اہم مضر اثرات مرتب کر رہی ہے۔ لیڈ پودے کی صحت اور بڑھوتری کو بھی بری طرح نقصان پہنچا رہی ہے۔ زمین میں لیڈ کی منتقلی کے کئی ذرائع ہیں جن میں سے صنعتی فضلات، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار زرعی ادویات اور چمڑے رکنے والی صنعتیں اہم ہیں۔ اس کے خاتمے کے لئے بہت سے طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی ترکیبات بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ مگر ان میں سے موثر ترین حیاتیاتی ترکیب ہے۔ حیاتیاتی طریقوں میں سے پودوں کی بڑھوتری بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے ایسے جڑوں سے جو کہ پودوں کی بڑھوتری میں مددگار ہوں ان کا استعمال کرنا مفید ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک پی۔ ایچ۔ ڈی تحقیق انٹیٹیوٹ آف سوانہل اینڈ انوٹرمنٹل سائنسز میں منعقد کی گئی جس میں لیڈ آلودہ مٹی کا پودوں کی بڑھوتری والے جڑوں کے ذریعے پودوں کا زمین سے لیڈ کا تدارک پر تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق کے لئے مٹی کے نمونے پنجاب کے دھات آلودہ مٹی والے علاقوں میں سے اکٹھے کئے گئے۔ ان علاقوں کے نام قصور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور اور ملتان ہیں۔ مٹی کے ان نمونوں سے لیڈ کی مقدار کا تجزیہ کیا گیا اور ان سے جڑوں سے نکالے گئے جن کی تعداد 142 تھی۔ اس کے بعد ان جڑوں کی لیڈ برداشت کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی۔ پھر وہ جڑوں سے جن میں لیڈ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی ان کو علیحدہ کیا گیا۔ پھر ان کو انڈول ایسلک ایسڈ (IAA) اے۔ سی۔ سی۔ Deaminase، فاسفورس کو حل کرنے کی صلاحیت اور کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی۔ پھر ان میں سے بہت اچھی صلاحیت رکھنے والے جڑوں کو گروتھ روم میں سورج مکھی، لوہن اور سرسوں کی بڑھوتری کے لئے آزما یا گیا۔ اس کے بعد جن جڑوں کی کارکردگی زیادہ اچھی تھی ان کو لیڈ آلودہ مٹی میں لگائے گئے سورج مکھی، لوہن اور سرسوں کے پودوں پر استعمال کر کے پودوں کی بڑھوتری کا تجزیہ کیا گیا۔ ان میں سے مزید جن جڑوں کی کارکردگی زیادہ اچھی تھی ان کا لیڈ آلودہ مٹی میں سورج مکھی، لوہن اور سرسوں کے پودوں پر کھلی فضا میں گملوں میں تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ لیڈ برداشت کرنے والے پودوں کی بڑھوتری والے جڑوں سے نہ صرف پودوں کی بڑھوتری میں مددگار ہوتے ہیں بلکہ پودے میں لیڈ کی ترسیل کی رفتار کو بھی تیز کرتے ہیں۔ ان نتائج کی توثیق کے لئے قصور کے چمڑے کی صنعتی فضلات سے آلودہ زمین میں جس میں لیڈ دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے یہی تحقیق بڑے پیمانے پر کھیتوں میں لگائی گئی جس میں سورج مکھی، لوہن اور سرسوں کے بیجوں کو پودوں کی بڑھوتری والے لیڈ برداشت کرنے والے جڑوں کی لیپ کے تجزیہ لگایا گیا اور پودوں کی بڑھوتری اور لیڈ برداشت کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے نتائج سے یہ ثابت ہوا کہ لیڈ برداشت کرنے والے پودوں کی بڑھوتری والے جڑوں سے نہ صرف پودوں کی بڑھوتری میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ زمین سے لیڈ کی پودوں میں ترسیل کو تیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے مٹی میں لیڈ دھات کا خاتمہ ممکن ہے۔

ان میں بہتر کارکردگی والے پودے کی بڑھوتری، لیڈ برداشت کرنے والے جڑوں سے درج ذیل ہیں۔

- 1- سوڈوموناس گیساردی (Pseudomonas gessardii)
- 2- سوڈوموناس سائرنجی (Pseudomonas syringae)
- 3- سوڈوموناس فلورسینس (Pseudomonas fluorescens)
- 4- سوڈوموناس سٹوٹزیری (Pseudomonas stutzeri)

نہیں کوئی چڑکی قدرت کے کارخانے میں

پی ایچ ڈی۔ کالر: رضوان محمود نگران: ڈاکٹر سعید احمد شعبہ: ہارٹیکلچر

وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہتی پہلوؤں سے دنیا میں ممتاز کر رکھا ہے۔ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان موسموں کے اعتبار سے، زمینی خدوخال کے اعتبار سے دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کی آب و ہوا ہر اقسام کی اجناس و پھل دار کاشت کاری کے لیے موزوں ہے ترشادہ پھل پاکستان کی ملکی اور غیر ملکی سطح پر ایک نمایاں پہچان ہیں۔ اس سب سے زیادہ ترشادہ پھل (سٹرس) پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کنوئوں کے تو کیا کہنے۔ موجودہ ادوار میں جبکہ ہر چیز کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ ایسے میں ایک نہایت قیمتی مگر نظر انداز کئے جانے والی چیز ترشادہ پھل کے چھلکے سے حاصل ہونے والے خوشبودار تیل ہیں۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سینکڑوں سال قبل یمنوں کا جوس ایک دوسرے درجے کی چیز تھی جبکہ اس کے چھلکے کا خوشبودار تیل ہی اصل سمجھا جاتا تھا۔ گئے وقتوں سے اسے خوشبوؤں کی تیاری میں بنیادی عنصر گردانا جاتا ہے۔ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں یہ خوشبودار تیل اپنی اہمیت منوا چکے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق یہ تیل ادویہ سازی میں بھی استعمال ہو رہے ہیں جہاں کینسر اور ریشہ جیسی بیماریوں کے خلاف ادویات میں ان کا استعمال بھی شامل ہے۔ کامپیکس کی مصنوعات اور اعلیٰ درجے کے صابن کی تیاری میں بھی اس خوشبودار تیل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہینگل انڈسٹری بھی ایشیاء کی تازگی کو تادیر برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ خوشبودار تیل استعمال ہوتے ہیں۔ وطن عزیز ہر سال سینکڑوں ملین روپے ان کی درآمد پر خرچ کرتا ہے۔ تو پاکستان ناصرا پنی ضرورت پوری کر سکتا ہے بلکہ دنیا کو یہ قیمتی خوشبودار تیل مہیا کر کے زرمبادلہ کم کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں کنوئ، چکوڑہ، لیمن، اور میٹھا وغیرہ کے چھلکے سے نکلنے والے تیل کی قیمت پاکستان 50 سے 60 ہزار روپے فی کلو ہے۔ وطن عزیز میں پھلوں کا یہ چھلکا کوڑا کرکٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس پر مناسب توجہ دی جائے۔ حکومتی سطح پر اس کی آگاہی کی ہم چلائی جائے۔ ایسے صنعتکار جو جوس نکالنے کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں وہ اپنے پاس موجود اس چھلکے میں سے تیل نکالنے کے پلانٹ لگائیں تو ایک خلیہ اضافی رقم حاصل کی جاسکتی ہے۔ چھوٹے سرمایہ کار بھی شہروں ہی موجود جوس کی دوکانوں سے یہ چھلکے جمع کر کے یہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس تیل کو نکالنے کیلئے کئی ایک طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ جن میں سب سے آسان اور نتائج کے اعتبار سے بہترین طریقہ بھاپ سے تیل کی کشید کا ہے۔ جو سینکڑوں برس سے استعمال ہوتا آیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق چکوڑہ کے پھل کے چھلکے میں سے نکلنے والا خوشبودار تیل اپنے اندر موجود کیمیائی اجزاء کے اعتبار سے سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ سرکاری سطح پر اس کام کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ ملکی زرمبادلہ بچایا جاسکے۔ غیر ملکی انحصار ختم ہو۔ ادویہ سازی کی تحقیق آگے بڑھے اور علاوہ ازیں دنیا میں اروما تھراپی (خوشبودار سے علاج) بھی اپنی اہمیت منوار رہی ہے سٹرس کے یہ خوشبودار تیل کئی ایک بیماریوں کے خلاف کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔

درآمد شدہ دو غلے اور سبزیوں کی کاشت

پی ایچ ڈی۔ کالر: عبدالمنان سلیم نگران: ڈاکٹر محمد شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

پاکستان کی معیشت کا دارومدار زراعت پر ہے۔ روایتی فصلوں کی کاشت کے علاوہ سبزیوں کی کاشت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی ضرورت کو پورا کیا جاسکے۔ سبزیوں ہماری خوراک کے اہم اجزاء جیسا کہ کاربوہائیڈریٹس، ویتامنز اور بہت سارے ضروری نمکیات کا موجب ہیں جن کی ہمارے جسم کی نشوونما اور بہتر کارکردگی میں بہت اہم حصہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ ضروری ہے کہ سبزی ہر انسان کی روزمرہ خوراک کا لازمی جزو بنیں تاکہ جھٹمند رہا جاسکے۔ پاکستان میں سبزیوں کی کاشت کا دارومدار زیادہ تر درآمد شدہ دو غلے بیج پر ہے۔ پاکستان ہر سال اربوں روپے زرمبادلہ کے طور پر بیج کی درآمد پر صرف کرتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ پاکستان نے 2009-2008 میں 2674 ٹن دو غلے بیج صرف سبزیوں کی کاشت کے لیے درآمد کیا جس کی کل مالیت 763 ملین تھی۔ اس سے فوراً اگلے سال دو غلے بیج کی بڑھتی ہوئی طلب 3553 ٹن تک جا پہنچی جس کی کل مالیت 1085 ملین روپے تھی واری ضرورت اگلے سالوں میں اس سے بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ دو غلے بیج کی درآمد سے ملکی معیشت کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا کسان مہنگا بیج خریدتا ہے اور اس کے علاوہ کھاد اور پیرے کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں جس کے نتیجے میں فی کس پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور کسان کو اپنی پیداوار کا مناسب مول نہیں ملتا اور اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا کسان دوسری روایتی فصلوں کی کاشت کو سبزیوں کی کاشت پر ترجیح دیتا ہے جس سے ہمیں ملکی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سبزیوں انڈیا سے منگوانی پڑتی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہیں۔ دو غلے بیج کے استعمال کے کئی نقصانات سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ یہ بیج بہت مہنگا ہے جو کسان کو سبزیوں کی کاشت میں سب سے بڑا دھچکا ہے۔ صرف درآمد شدہ دو غلے بیج کی لاگت باقی تمام پیداواری کھپت سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دو غلے بیج کو صرف ایک بار استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس بیج کو اگلے سالوں کے لیے محفوظ بھی نہیں کیا جاسکتا جس کی وجہ سے یہ ہر سال درآمد کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیج ہمیں صرف ایک ہی فصل دیتا ہے نہ کہ بیج جو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تیسرا یہ کہ دو غلے بیج میں کچھ ملاوٹ کی شکایات سامنے آتی ہیں جس سے بیج کے اگاؤ پر بھی منفی اثر پڑتا ہے اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے سبزیوں کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زرعی اداروں کو بھی اپنی توجہ سبزیوں کے اعلیٰ نسل کے بیج کی تیاری کی طرف مبذول کرنی چاہیے۔ ہماری اکثر سبزیوں کے مقامی پیدا شدہ بیج دو غلے نسل کے درآمد شدہ بیج کا پیداواری صلاحیت میں مقابلہ کر رہے ہیں جیسا کہ ایک تحقیق کے مطابق مقامی تیار کردہ (ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ) بھنڈی کا بیج (اکرا-02 اور اکرا-04) اور انڈیا سے درآمد شدہ بھنڈی کے بیج کی پیداواری صلاحیت اور مارکیٹ میں مقبولیت ایک جیسی تھی۔ اس کے علاوہ اکرا-02 اور اکرا-04 کا بھنڈی کا پھل بھی انڈیا سے درآمد شدہ بھنڈی کے بیج کی مختلف اقسام کے مقابلے میں زیادہ دن تک نرم اور تازہ رہا۔ سبزیوں کے مقامی بیج کو خالص حالت میں لانے اور اس کو کسانوں میں متعارف کروانے کی طرف توجہ دینے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ سبزیوں کی کاشت کی ابتدائی لاگت جو کہ ہر سال اربوں روپے کی صورت میں ضائع ہوتی ہے، کو کم کر کے کسانوں میں مقامی بیج کی خالص اور اعلیٰ نسلیں متعارف کروانے کے آج کل کے کسان کو خوشحال بنایا جائے تاکہ معاشرہ خوشحال ہو سکے کیونکہ جس معاشرے کا کسان خوشحال نہیں اور کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہے اس معاشرے کی ترقی غیر یقینی ہے۔

بعد از برداشت کیمیائی مرکبات اور سٹور بیج کے گولائیچہ پھل پر اثرات

پی ایچ ڈی۔ کالر: ساجد علی نگران: ڈاکٹر احمد ستار خاں شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

پاکستان میں پلچکی کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سے گولائیچہ کا پھل اپنی بعد از برداشت سُرخ رنگت کو برقرار رکھنے کی خاصیت رکھتا ہے اور پاکستان میں تجارتی بنیادوں پر کاشت کیا جاتا ہے تاہم طلب کے حساب سے پلچکی کی کاشت میں وسعت سُست روی کا شکار ہے جسکی بنیادی وجوہات میں زیادہ ابتدائی اخراجات، آبپاشی کے اچھے پانی کی کمی، اعلیٰ نسل کے پودوں کی کمی اور بعد از برداشت ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی کی کمی اور اس کا بعد از برداشت بھورے پن کا ہو جانا شامل ہیں۔ برداشت کے بعد پلچکی کو زیادہ تر مقامی منڈیوں میں ہی فروخت کیا جاتا ہے اور اسکی برآمد نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ پاکستان کے لئے ایک پریشان کن بات ہے۔ برآمدات نہ ہونے کی بنیادی وجوہات میں پلچکی کے چھلکے کے سُرخ رنگ کا بھورا ہو جانا سب سے اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کا سُرخ رنگ کا چھلکا ہی اسکے معیار کا فیصلہ کرتا ہے اور تجارتی سطح پر قابل قبول ہے اسی لئے دنیا بھر میں برداشت کے بعد اس کے سُرخ رنگ کو برقرار رکھنا تحقیق دانوں کا بنیادی مجرور ہے کیونکہ پلچکی کا پھل برداشت کے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں کے دوران ہی اپنی سُرخ رنگت کھودیتا ہے اور یہ بڑھتی ہوئی پلچکی کی مارکیٹ کی اہمیت اور نقل و حمل میں سنگین مسائل پیدا کر دیتا ہے اور نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ پلچکی کے بھورے پن کی بنیادی وجوہات میں برداشت کے دوران اور بعد میں اسکی سطح سے نمی کے اخراج کی وجہ سے سُرخ

تھیں۔ جسکی وجہ سے ان کو بہتر طریقے سے آگے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ قسمیں 0175583، A-75، 017592، G-33، A-48، A-23، G-61، HBRS-1 اور 017566 کو پانی کے کمی کے اندر زندہ رہ جانے والی قسموں میں شامل کیا گیا۔ جبکہ 017577، CM-621، HA-124، HA-133، HA-342 اور HA-341 کو شمار بری ترین قسموں میں کیا۔ کراسوں میں سے G-61xHA-124 اور A-48 x HA-342 کو اچھی قسموں میں شامل کیا گیا۔ ان پیداوار اور ان کی اہلیت پانی کی کمی کے اندر زندہ رہ جانے کی وجہ سے پودے کا تازہ وزن، خشک وزن اور پیداوار کو مناسب سمجھا گیا کہ آگے تحقیق کے لئے استعمال کیا جائے۔ G-61xHA-124 اور A-48xHA342 کو مزید تحقیق کے لئے استعمال کیا جائے۔ G-61x HA-124 اور A-48x HA342 کو مزید تحقیق کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو مختلف ماحول میں لگایا جانا چاہیے تاکہ اس کے اندکی قابلیت کو مزید نکھارا جائے۔ اس طرح سے وہ قسمیں جنکو اچھی قسموں میں شامل کیا گیا اُن کو بھی مزید تحقیق میں لے کے آنا چاہیے۔

بھاری دھاتوں سے متاثرہ مہجر کارپس کے خون، سیرم یا نیوکیمسٹری اور DNA کی سالمیت کا تجزیہ

پی ایچ ڈی۔ سکارلر: وردہ حسن نگران: ڈاکٹر ساجد عبداللہ شعبہ: زوالوجی وائلڈ لائف اینڈ فشریز

بھاری دھاتیں آبی آلودگی کا ایک بڑھاروں بناتی ہیں اور آبی ماحول میں بڑی مقدار میں جمع ہو جاتی ہیں۔ انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے فضلہ جات کا آبی ماحول میں اخراج عام طور پر مچھلیوں کے لئے دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے دھاتوں کی وجہ سے تین مختلف اقسام کی مچھلیوں کے خون، سیرم یا نیوکیمسٹری اور DNA کی سالمیت میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لئے دو حصوں پر مشتمل ایک تجربہ کیا گیا۔ پہلے مرحلہ میں تجرباتی مچھلیوں جیسا کہ *Lebeo rohita*، *Cata catla* اور *Cirrhinus mrigala* کو کیڈیم، کارپر، نکل، اور زنک کی 96-hr LC50 میں رکھا گیا اور دوسرے مرحلہ میں مچھلیوں کو 30 دن کے لئے دھاتوں کی (Sub-lethal) $(1/5LC50, 1/4LC50, 1/3LC50)$ مقداروں میں رکھا گیا۔ Acute exposure کے دوران خون کے پیرامیٹرز جیسا کہ ریڈ بلڈ سیلر، ہیموگلوبن، ہیپیٹو کرٹ وائٹ بلڈ سیلر، مین سیل والیوم، مین سیل ہیپیٹو گلوبن، کنسنٹریشن اور سیرم یا نیوکیمیکل پیرامیٹرز جیسا کہ سوڈیم، پوٹاشیم، کلورائیڈ، ٹوٹل پروٹین، یوریا، ایلیمین، گلوکوز، AST اور ALT کا معائنہ کرنے کے لئے کنٹرول اور دھاتوں سے متاثرہ مچھلیوں کے خون کے نمونے 24، 48، 72، 96 گھنٹوں کے بعد لئے گئے۔ DNA کی سالمیت کا تجزیہ کرنے کے لئے جگر کے نمونے ہر طے شدہ اوقات پر کنٹرول اور دھاتوں سے متاثرہ مچھلیوں سے لئے گئے۔ مچھلیوں کے DNA کی سالمیت پر دھاتوں کے اثرات کو جانچنے کے لئے RAPD-PCR تکنیک استعمال کی گئی۔ Chronic Exposure کے دوران اوپر دیئے گئے تمام پیرامیٹرز کا معائنہ کرنے کے لئے خون اور جگر کے نمونے 15 اور 30 دن کے بعد اکٹھے کئے گئے۔ دھاتوں کی 96-hr LC50 اور Sublethal مقداروں سے متاثرہ تجرباتی مچھلیوں کے خون میں کنٹرول کے مقابلے میں واضح ($P < 0.01$) تبدیلی ہوئی۔ کارپر کے Exposure نے مچھلیوں پر زیادہ واضح اثرات مرتب کئے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلر، ہیموگلوبن اور وائٹ بلڈ سیلر، مین سیل والیوم، مین سیل ہیپیٹو گلوبن اور مین سیل ہیپیٹو گلوبن کنسنٹریشن واضح طور پر زیادہ ہوئی۔ جبکہ زنک کے Exposure نے دوسری دھاتوں کے مقابلے میں خون کے پیرامیٹرز پر سب سے زیادہ ہر طے اثرات مرتب کئے۔ مختلف اقسام کی مچھلیوں کی دھاتوں کے زہریلے اثرات کی وجہ سے اپنے خون اور سیرم یا نیوکیمیکل پیرامیٹرز میں تبدیلی کی صلاحیت ذیل ترتیب میں تھی۔ ($C.catla > L.rohita > C.mrigala$)۔ دھاتوں کی وجہ سے مختلف اقسام کی مچھلیوں کے خون اور سیرم یا نیوکیمیکل پیرامیٹرز میں تبدیلی دھاتوں کی مقدار بڑھنے سے زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ جیسا کہ $1/3LC50 < 1/4LC50 < 1/5LC50$ ۔ مچھلیوں کے مختلف دورانیے کے لئے دھاتوں کے Exposure کی وجہ سے سب پیرامیٹرز پر مختلف زہریلے اثرات مرتب ہوئے۔ دھاتوں کے Exposure کے تمام ادوار میں سے Exposure 96-hr نے تمام تجرباتی مچھلیوں پر سب سے زیادہ منفی اثرات مرتب کئے۔ مچھلیوں کے سیرم یا نیوکیمیکل پیرامیٹرز میں دھاتوں کے دونوں Acute اور Chronic مراحل میں واضح تبدیلی ($P < 0.01$) ظاہر ہوئی۔ دوسری دھاتوں کے مقابلے میں کارپر کے Exposure کی وجہ سے مچھلیوں کے سیرم کے سوڈیم، کلورائیڈ ایلیمین اور ٹوٹل پروٹین کی مقدار میں واضح ($P < 0.01$) کمی دیکھی گئی جبکہ پوٹاشیم، یوریا، گلوکوز، AST اور ALT کی مقدار زیادہ تھی۔ تاہم اوپر بیان کئے گئے یا نیوکیمیکل پیرامیٹرز پر سب سے کم زہریلے اثرات زنک سے متاثرہ مچھلیوں میں دیکھے گئے۔ Acute اور Chronic مراحل میں DNA کی سالمیت کو سب سے زیادہ نقصان کارپر سے متاثرہ مچھلیوں میں دیکھا گیا۔ جبکہ زنک نے مچھلیوں کے DNA کی سالمیت کو سب سے کم نقصان پہنچایا۔ Acute مرحلہ میں دھاتوں کے زہریلے اثرات کے لئے *C.catla* سب سے زیادہ حساس تھی۔ دھاتوں کے Chronic Exposure کے دوران *L.rohita* اور *C.catla* کے مقابلے میں *C.mrigala* کے DNA میں سب سے زیادہ نقصان دیکھا گیا۔ تجرباتی مچھلیوں میں سب سے زیادہ نقصان دھاتوں کی 1/3rd LC50 کی وجہ سے ہوا جبکہ 1/5th LC50 کی وجہ سے DNA کو سب سے کم نقصان ہوا۔ اس تجربے سے ثابت ہوا کہ آبی ماحول میں بھاری دھاتوں کی موجودگی کا مچھلیوں کے خون، سیرم یا نیوکیمسٹری اور DNA کی سالمیت پر واضح اثر ہوتا ہے۔

کیڑے مار ادویات کے آمیزوں کا مہجر کارپ مچھلیوں کے یا نیوکیمیکل اور مالیکیولر تبدیلیوں پر اثرات کا تجزیہ

پی ایچ ڈی۔ سکارلر: ہماناز نگران: ڈاکٹر ساجد عبداللہ شعبہ: زوالوجی وائلڈ لائف اینڈ فشریز

اس موجودہ تحقیق میں کیڑے مار ادویات کے اثرات کی تین مچھلیوں پر جاتیوں کے یا نیوکیمیکل اور مالیکیولر تبدیلیوں کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کو دو مراحل میں منعقد کیا گیا تھا۔ جو کہ درج ذیل ہیں 1۔ شدید زہریلائیٹ 2۔ دائمی زہریلائیٹ اس موجودہ تحقیق میں انڈین مہجر کارپ مثلاً تھیلہ، موری اور روہو کو استعمال کیا گیا تھا۔ کلورپائیری فوس + بائیفٹھرین، بائیفٹھرین + اینڈوسلفان، کلورپائیری فوس + اینڈوسلفان، بائیفٹھرین + کلورپائیری فوس + اینڈوسلفان کی تین مچھلیوں پر جاتیوں کے لئے رواداری کی حدود کا تعین کرنے کے لئے شدید زہریلائیٹ کنٹرول لیبارٹری حالات (مستقل پانی کے درجہ حرارت $30^{\circ}C$)، پی۔ ایچ (7.5) اور کل سختی (250mg/L) پر منعقد کیا گیا۔ ہر مچھلی پر کیڑے مار ادویات کے آمیزوں کی 96-hr LC50 مقدار کے تعین کے بعد ہر مچھلی کو الگ الگ ہر ایک کیڑے مار ادویات کا مرکب کی (96-hr) ذیلی مہلک ارتکاز (زہریلے کا تیسرہ حصہ) میں بالترتیب چار اور ساٹھ دن کے لیا رکھا گیا۔ اس کے بعد کیڑے مار ادویات کے آمیزے کے اثرات مچھلی کے اینٹی آکسیڈینٹ خامروں میں تبدیلیاں بعد اور جینیاتی نقصان کا تجزیہ مدت اور ادویات پر انحصار کے لئے لحاظ سے کیا گیا۔ مچھلی کے جسم کے اعضا مثلاً گھٹھو، جگر، گردے، دماغ، دل اور پٹھوں کو ان کے متعلقہ کیڑے مار ادویات کے مرکب کے لئے اینٹی آکسیڈینٹ خامروں میں تبدیلی کا تجزیہ کیا گیا۔ ڈی این اے کے نقصان کی حدود کو کوکومت اور مائیکرو نیوکلیائی پرکھ کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ رواداری کی حدود (96-hr 40LC50 اور مہلک تعداد کی اصلاح) تین مچھلیوں پر جاتیوں (تھیلہ، موری اور روہو) بانسری اور ٹھری کیڑے مار ادویات کا آمیزے (کلورپائیری فوس + اینڈوسلفان، بائیفٹھرین + کلورپائیری فوس، بائیفٹھرین + اینڈوسلفان، کلورپائیری فوس + بائیفٹھرین + اینڈوسلفان) کے لئے نمایاں طور پر مختلف تھی۔ تین مچھلیوں پر جاتیوں کے درمیان تھیلہ نمایاں طور پر پایا گیا تھا۔ مجموعی زہریلے پن کے بارے میں تینوں کیڑے مار ادویات کا مرکب زیادہ زہریلا تھا۔ کیڑے مار ادویات کے آمیزے 96 گھنٹوں کے لئے مچھلیوں کے اینٹی آکسیڈینٹ خامروں میں اہم تبدیلیاں رونما کی۔ کیڑے مار ادویات کے آمیزہ کی وجہ سے سپر آکسائیڈ سمولیٹس، پراکسی ڈیس اور گلیوٹائیوٹھین ایس۔ ٹرانسفریس کی سرگرمیوں میں اہم اضافہ کیا۔ تاہم کیفیٹس کی سرگرمی غیر نمایاں طور پر کیڑے مار ادویات کے آمیزے کی وجہ سے اختلافات دکھایا۔ تھیلہ نمایاں طور پر تمام خامروں کی سرگرمیوں میں اعلیٰ جبکہ روہو اور موری اسکے بعد دکھائی دی خامروں کی سرگرمیوں میں اضافہ / کمی وقت کی مدت کے ساتھ نمایاں طور پر مختلف تھا۔ کیڑے مار ادویات نے 96 گھنٹوں کے لئے مچھلی کے خون میں ڈی این اے کو شدید نقصان پہنچایا۔ تین مچھلیوں پر جاتیوں کے درمیان تھیلہ تینوں کیڑے مار ادویات کے آمیزے کی وجہ سے ڈی این اے کو زیادہ نقصان ہوا تین مچھلیوں پر جاتیوں کے ڈی این اے کا نقصان کا انحصار وقت کی مدت پر نمایاں طور پر پایا گیا۔ کیڑے مار ادویات کے مرکب کی وجہ سے تین

دھاتوں کی مچھلی کے DNA میں خرابی پیدا کرنے اور ان کے جسموں میں ذخیرہ ہونے کی صلاحیت کو جانچنے کیلئے ایک منصوبہ بنایا گیا جو دو مراحل پر مشتمل تھا۔ 1- شدید زہریلے پین کو جانچنا۔ 2- دھاتوں اور ان کے آمیزے کے مچھلی کے جینیاتی مادے پر دائمی اثرات کا مشاہدہ کرنا۔ پہلے مرحلے میں 110 دن عمر کی تین اقسام کی مچھلیوں Catla Catla، Labeo rohita اور Cirrhina mrigala کو مخصوص درجہ حرارت، pH اور پانی کے بھاری پن میں Co، Cr، Pb، Co+Cr، Co-Pb، Cr+Pb، Co+Cr+Pb میں 96-hr LC50 کے آس پاس سمنا کر دیا گیا تاکہ ان کی 96-hr LC50 اور مہلک مقدار معلوم کی جا سکے اسی دوران میں دھاتوں اور ان کے آمیزوں کی مچھلی اعضاء میں جمع ہونے کی صلاحیت کو بھی جانچا گیا۔ ان تینوں اقسام کی مچھلیوں میں Catla catla تمام انفرادی دھاتوں اور ان کے آمیزوں کی 96-hr LC50 اور مہلک مقدار کے لئے باقی دونوں اقسام کی نسبت زیادہ حساس ثابت ہوئی۔ ان تجربات میں 96-hr LC50 دھاتوں اور ان کے آمیزوں کے زہریلے پین کی ترتیب کچھ یوں رہی: $Co < Cr < Pb < Co+Cr < Cr+Pb < Pb < Co+Pb < Co+Cr+Pb$ جبکہ مہلک مقدار کی ترتیب اس طرح ہے: $Co < Cr < Co+Cr < Pb < Co+Pb < Pb < Cr+Pb < Co+Cr+Pb$ اور Labeo rohita کی نسب Catla catla دھاتوں اور ان کے آمیزوں کو جمع کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے ان تینوں اقسام کی مچھلیوں کے اعضاء میں دھاتوں اور ان کے آمیزوں کے ذخیرہ پین کی ترتیب یہ ہے کہ گردے > جگر > کلیہ > دل > عضلات دوسرے مرحلے میں مچھلی کی تینوں اقسام کا دھاتوں اور ان کے آمیزوں کی معلوم کردہ 96-hr LC50 مقداروں کے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں حصے سے 84 دنوں کیلئے exposure کر دیا گیا تاکہ ان کے دائمی اثرات کا دوطرح سے مشاہدہ کیا جاسکے۔

- اس مقصد کے لئے مچھلی کے خون کے سرخ خلیات 14, 28, 42, 56, 70, 84 دنوں کے بعد اکٹھے کئے گئے اور ان میں جینیاتی مادے کی تباہ کاری کی حد کو percentage of damaged genetic material, comet assay, cumulative tail length, damage index, nuclei کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مچھلی کے اعضاء میں دھاتوں کی ذخیرہ شدہ مقدار، دائمی دکھاوٹ کے دورانیہ اور دھاتوں کی مقدار (تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں حصہ) کے ساتھ بتدریج بڑھتی گئی۔ تمام قسم کی treatments میں سے مچھلی کے جسم میں سب سے زیادہ دھاتی آئن Co+Cr+Pb آئیز کے exposure کی وجہ سے ذخیرہ ہوئے جبکہ یہ آئن سادہ پانی میں گئی مچھلی کے اعضاء میں سب سے کم مقدار میں دیکھے گئے۔ تینوں اقسام کی مچھلیوں میں سے نسبت Labeo rohita اور Catla catla کے Cinchona mrigala میں سے زیادہ دھاتی آئن ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ وقت کے دورانیہ اور دھاتوں کی مقدار کے لحاظ سے تینوں مچھلیوں کے اعضاء میں دھاتی آئن کی جمع پذیری کو اس ترتیب میں دیا گیا گردے > جگر > گھٹنھڑے > دل > عضلات ایسے دکھائی دیتا ہے کہ آئیز کے شکل میں دھاتوں کا باہمی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دھاتیں ایک دوسرے سے تقابلی جمع پذیری کا اظہار کرتی ہیں جو کہ synergistic, additive اور antagonistic عمل ہو سکتا ہے۔ دھاتوں اور ان کے آئیزوں کا exposure cumulative genetic damage index, percentage of damaged nuclei میں تحقیق پر (p<0.05) جینیاتی نقصان پہنچاتا ہے جو کہ موجودہ تحقیق میں Catla catla اور Labeo rohita نے Cirrhina mrigala سے زیادہ حساسیت کا اظہار کیا۔ Labeo rohita میں نسبت Catla catla اور Cirrhina mrigala کے واضح طور پر زیادہ لمبی comet tail length کے واضح طور پر زیادہ کمی لکھا گیا۔ مختلف دھاتوں (Co, Cr, Pb) اور ان کے آئیزوں (Co+Cr+Co+Pb, Cr+Pb, Co+Cr+Pb) کے درمیان بھی percentage of damaged nuclei اور GDI of damaged nuclei کے واضح طور پر باہمی اختلاف پایا جاتا ہے ان کے تقابلی جائزہ سے پتہ چلا کہ Co+Cr+Pb نسبت سب سے زیادہ خون کے سرخ خلیات کے جینیاتی مادہ کو نقصان پہنچایا جبکہ Co کے انفرادی exposure کی وجہ سے یہ نقصان سب سے کم رہا۔ تمام treatments میں percentage of damaged nuclei اور CTL وقت کے دورانیہ کے ساتھ بتدریج بڑھتے گئے جو کہ 56 دنوں کے بعد سب سے زیادہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو گئے جس کی بنیادی وجہ DNA repair کا مکمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مختلف اقسام کے زہریلے مواد سے آبی حیات کے جینیاتی مادے میں ہونے والے نقصان کو comet assay کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے جو کہ ایک حساس biomarker کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مچھلی میں بھاری دھاتوں کی وجہ سے جنیناتی زہریلے پن کی تشخیص بذریعہ سنگل سیل جیل الیکٹروفورس کیلیے ایک تحقیقاتی کام منعقد کیا گیا۔ جسکی تکمیل درج ذیل دو مراحل میں ہوئی۔ مچھلی میں دھاتوں کی وجہ سے تیز زہریلا پن ii۔ مچھلی میں دھاتوں کے جنیناتی زہریلے پن کے اثرات۔ مچھلی کی تین انواع یعنی لیپو روپٹا (ہو) سپرس کارپیو (گٹام) اور پوکروس نائی لوکس (تلاپا) میں ایلومینیم، آرسنک، میگنیز اور انکے دھاتی مرکبات یعنی میگنیز + ایلومینیم، آرسنک اور میگنیز + ایلومینیم + آرسنک کے تیز زہریلے پن کا تین 96 گھنٹے کی ایل سی 50 اور مہلک مقدار کے لحاظ سے پانی کے مستقل درجہ حرارت (26 ڈگری سینٹی گریڈ) پانی (7.60) اور کل سخت پن (240 ملی گرام فی لیٹر) پر ان دھاتوں اور دھاتی مرکبات کو مسلسل تین دفعہ استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ دھاتوں اور انکے مرکبات کے استعمال کے 96 گھنٹے کے دوران انکی ایل سی 50 اور مہلک مقداروں پر تینوں انواع کی مچھلیوں کے جسمانی اعضاء یعنی جگر، گلیڈز، گردے، دل، پٹھے، آنت، ہڈیاں، چٹکڑ اور جلد میں ان دھاتوں کے مجموعے کو بھی معلوم کیا گیا۔ اس کام کے دوسرے مرحلے میں مچھلیوں کی تینوں انواع کا سامنا علیحدہ علیحدہ آٹھ مفتوں کے لئے لیبارٹری کے مستقل حالات میں انکی متعلقہ 96 گھنٹے کی ایل سی 50 کی نصف، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور پانچویں حصے سے کرائی گئی۔ اس آٹھ ہفتے کی مچھلی کی دھاتی رومنائی کے کام میں وقفے وقفے سے ہر نوع کی مچھلی کے خون کے بیرونی سرخ خلیوں کے ڈی این اے کے نقصان کا تجزیہ نقصان دہ خلیوں کی فیصد، کوشٹس ٹیل کی مجموعی لمبائی

اور جینیاتی نقصان کے انڈیکس (جی ڈی آئی) کے لحاظ سے کیا گیا۔ انفرادی دھاتوں اور ان کے مرکبات کی دائمی رو نمائی کے بعد ہر قسم کی مچھلی کے اعضاء یعنی گھڑوے، گردے، دل، پٹھے، آنت، ہڈیاں، پچک، جلد اور خون میں متعلقہ دھاتوں کے مجموعے کا تجزیہ کیا گیا۔ دھاتوں کے تیز اور جینیاتی زہریلے پن کے دونوں مراحل کے دوران ہر ٹیسٹ دھاتی مقدار پر پانی کے طبعی و کیمیائی خواص کا تجزیہ 12 گھنٹے کے وقفوں سے کیا گیا۔ دھاتوں کے تیز زہریلے پن کا تعین پروٹ تجزیاتی طریقہ کار سے 95 فیصد اعتماد کی حد کے ساتھ کیا گیا۔ متغیرات کے تجربے (ایبلسن آف ویری انس) اور کئی سیٹ کو استعمال میں لاتے ہوئے متعدد متغیرات کے درمیان شماراتی فرق تلاش کئے گئے۔ مخصوص متغیرات کے درمیان رجعت (ریگریشن) اور باہمی تعلقات (کوری لیشن) بھی شمار کئے گئے۔ انفرادی دھاتوں میں سے نمایاں طور پر مچھلی کے لئے آرسینک، ایلومینیم، اور میگنیز کی نسبت زیادہ زہریلے پن کا موجب بنی۔ مچھلی کی تینوں انواع نے نمایاں طور پر میگنیز، ایلومینیم + آرسینک کے تین دھاتی مرکب کی طرف سب سے زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا جبکہ آرسینک، ایلومینیم + آرسینک، میگنیز + ایلومینیم، ایلومینیم اور میگنیز کی طرف مچھلیوں کی حساسیت اس سے کم درجہ پر رہی۔ تینوں انواع کی مچھلیوں کی انفرادی دھاتوں اور دھاتی مرکبات کے خلاف برداشت کی حد میں نمایاں طور پر متغیر رجحانات کی تصدیق ان کے جسمانی تغیرات اور مخصوص انواع کا منفرد انداز میں مختلف قسم کی دھاتوں سے تعامل کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے۔ یہ بات تینوں قسم کی مچھلیوں کی دھاتی بوجھ معمول پر لانے کے لئے میٹیلو تھاپونین پروٹین پیدا کرنے اور دھاتوں کے جسمانی اخلاک کی صلاحیتوں کی پیش گوئی کرتی ہے تاکہ دھاتوں سے آلودہ پانی میں رہتے ہوئے ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہا جاسکے۔ تینوں طرح کی مچھلیوں میں سے رہنے والے انفرادی دھاتوں اور ان کے مرکبات سے نمایاں طور پر زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا جبکہ تھاپا دھاتوں سے سب سے کم حساس مچھلی ثابت ہوئی۔ ایک مرکب میں دھاتوں کی خاص ترکیب، مقدار اور رو نمائی کے اور دورانیہ کے لحاظ سے مچھلی پر دھاتی مرکبات کے زہریلے اثرات نمایاں طور پر انفرادی دھاتوں کی نسبت زیادہ شدید ظاہر ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی بھی مرکب میں میگنیز، ایلومینیم اور آرسینک نے رو نمائی کے دوران مچھلی کی تینوں انواع کی حساسیت پر مجموعی اثرات مرتب کئے۔ مچھلی کی انفرادی دھاتوں اور ان کے مرکبات کی 96 گھنٹے کی ایل سی 50 اور مہلک مقداروں سے رو نمائی ان کے اعضاء میں نمایاں طور پر متغیر مجموعے کا باعث بنی دھاتوں میں میگنیز نمایاں طور پر سب سے زیادہ تینوں قسم کی مچھلیوں میں زیادہ جمع ہوئی بلکہ آرسینک نے نمایاں شماراتی فرق کے مجموعی طور پر دھاتوں کو جمع کر کے کی صلاحیت اس ترتیب سے رہی: تھاپا < گلفام < رہو۔ مچھلی کے جسمانی اعضاء نے بھی دھاتوں کو جمع کرنے کی متغیر صلاحیت کا نمایاں طور پر مظاہرہ کیا۔ عمومی طور پر گردے، جگر اور گھڑوے دھاتوں کو جمع کرنے کے کام میں فعال اعضاء کے طور پر ظاہر ہونے جبکہ جلد آنت پچک، ہڈیاں اور پٹھوں میں سب سے کم دھاتی مجموعے کا رجحان پایا گیا۔ عمومی طور پر مچھلی کی تینوں انواع کے جسمانی اعضاء میں دھاتوں کے مجموعے کی درج ذیل ترتیب دیکھی گئی۔ گردے < جگر < گھڑوے < دل < خون < جلد < آنت < پچک < ہڈیاں < پٹھے۔ دھاتوں میں ایلومینیم کی دائمی رو نمائی مچھلی کے جسمانی اعضاء میں نمایاں طور پر سب سے زیادہ مجموعے کا باعث بنی جبکہ آرسینک سب سے کم جمع ہوئی۔ تینوں انواع کی مچھلیاں یعنی رہو، گلفام، اور تھاپا نے دھاتوں اور دھاتی مرکبات کے نصف، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور پانچویں حصے کی ایل سی 50 کی رو نمائی مقداروں کے طور پر متغیر حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خون کے بیرونی سرخ خلیوں میں ڈی این اے کا نقصان 56 دنوں کے دائمی رو نمائی کے دوران میں فیصد نقصان زدہ نیوکلیائی جی ڈی آئی اور کمیٹ ٹیل کی مجموعی لمبائی کی صورت میں معلوم کیا گیا۔ میگنیز + ایلومینیم + آرسینک کے مرکب کی رو نمائی نمایاں طور پر سب سے زیادہ مچھلی کے خون کے سرخ خلیوں کی اوسط فیصد تباہ شدہ سلیر (37.38 ± 1.35%) جینیاتی نقصان کے انڈیکس (1.32 ± 0.05) اور کمیٹ ٹیل کی مجموعی لمبائی (145.37 ± 4.64) ٹانکرو میٹر کے لحاظ سے سب سے زیادہ تباہی کا موجب بنی جبکہ میگنیز کی رہنمائی نے بالترتیب سب سے کم نقصان کا مظاہرہ نمایاں طور پر اس طرح کیا: 0.88 + 0.04، 17.85 + 0.93% اور 68.95 + 1.87 ٹانکرو میٹر تینوں اقسام کی مچھلیوں کی انفرادی دھاتوں اور ان کے مرکبات سے حساسیت ان کے ڈی این اے کو تھکان پہنچانے کے لحاظ سے اس ترتیب سے رہی رہو، گلفام، تھاپا اضافی طور پر ڈی این اے کا نقصان مسلسل طور پر دھاتی آئنوں کی رو نمائی کے دوران میں مقداروں کے ساتھ بڑھتا گیا۔ جو کہ ری ایکٹو آکسیجن سپیشیز (آراو ایس) کے پیدا ہونے اور ڈی این اے کی مرمت میں رکاوٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جسکی وجہ سے مچھلی میں جینیاتی عدم اختصاص اور آکسی ڈی ایکسوتاؤ ہو سکتا ہے کیونکہ دھاتی ری ڈاکس سائیکل کے ذریعہ آراو ایس بنائی ہیں جو کہ ڈی این اے دھاگوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لئے میگنیز + ایلومینیم + آرسینک مرکب دوسری دھاتوں اور دھاتی مرکبات کی نسبت اس تحقیقاتی کام کے دوران نمایاں طور پر سب سے زیادہ زہریلا ثابت ہوا۔ تینوں اقسام کی مچھلیوں میں کئی دھاتوں کی وجہ سے متفرق جینیاتی زہریلے پن کا دارو آمد مچھلی کے جسم میں دھاتوں کے مجموعے پر ہے۔ تینوں قسم کی مچھلیوں میں انفرادی دھاتوں اور دھاتوں کے مرکبات کی وجہ سے ہونے والا ڈی این اے کا نقصان رو نمائی کی مقدار اور دورانیہ کے ساتھ مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ جسکی ترتیب اس طرح رہی رہو < گلفام < تھاپا۔ مچھلی کے جسم میں ڈی این اے کے نقصان کی حد کا دارو مدار دھات کی قسم پر بھی تھا اس لئے ترتیب کمیٹ ایسے رہو، گلفام اور تھاپا کے خون کے بیرونی سرخ خلیوں میں موجود ڈی این اے کے نقصان کی تشخیص کے لئے ایک حساس ٹیکنک ثابت ہوا کیونکہ مچھلی کی یہ اقسام پاکستان کے قدرتی آبائی ماحولیاتی نظام میں دھاتی آلودگی کے حیاتیاتی اشاروں کا کام سرانجام دیتی ہیں۔

پاکستان میں مچھلی پالنے کے لئے موردی تنوع کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: نادیہ نازش نگران: ڈاکٹر خالد عباس شعبہ: حیوانات، جنگلی حیاتیات اور مانی پرووری

ماہر غذائیت کے مطابق مچھلی کو کم چربی، اعلیٰ درجے کی پروٹین، اور بہت سے غذائی اجزاء کی کثرت کی وجہ سے انسانی خوراک کا اہم جزو سمجھا جاتا ہے۔ وزن کی بنیاد پر تازہ مچھلی میں 13-25 فیصد پروٹین جبکہ 20-25 فیصد تک چربی پائی جاتی ہے۔ مچھلی میں وٹامن خاص طور پر اے، بی، سی اور ڈی کی مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن اے 5 سال سے کم عمر بچوں میں موت کی شرح کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وٹامن ڈی بچوں میں ہڈیوں کی نشوونما اور بڑھوتری کے ساتھ ساتھ کینسر کی تحول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وٹامن سی خلیوں کی معمول کی صحت کو برقرار رکھنے، زخموں کو مند مند کرنے اور انسانی جسم میں آئرن کو جذب کرنے کیلئے معاون ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں مانی پرووری کے وسائل غذائی تحفظ، آمدنی اور اقتصادی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں مچھلی کی پیداوار 2011 اور 2012 میں 82.6 اور 79.7 بلین ٹن بالترتیب ہے۔ دنیا میں مچھلی کی فی کس کھیت 1960 میں 9.9 کلو گرام سے بڑھ کر 2012 میں 19.2 کلو گرام ہو چکی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں مچھلی کی اوسط کھیت 1961 میں 5.2 کلو گرام سے 2010 میں 17.8 کلو گرام بالترتیب ہے۔ حیاتیاتی پیداوار کی سطح پر مچھلی کے اشاک میں 1974 میں 90 فیصد اور 2011 میں 71.2 فیصد کی کارحان دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں مانی گیری کا تقریباً 1 فیصد حصہ ہے۔ تازہ ترین تخمینہ کے مطابق پاکستان میں مچھلی کے تالاب کا کل احاطہ 60.500 ہیکٹر ہے۔ جن میں سے سندھ میں 49170 ہیکٹر، پنجاب میں 10500 ہیکٹر، سرحد میں 560 اور بلوچستان اور شمالی علاقہ جات میں 240 ہیکٹر ہے۔ پاکستان میں تقریباً 13000 مچھلی کے تالاب موجود ہیں۔ حالیہ حکومتی ریکارڈ کے مطابق 07-2006 میں پاکستان میں مچھلی کی پیداوار تقریباً 590000 میٹرک ٹن ہے جن میں سے 400000 میٹرک ٹن سندری ذرائع سے اور 190000 میٹرک ٹن زمینی وسائل سے آتی ہے۔ پاکستان میں 531 اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے 233 اقسام تازہ پانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ماہر مانی پاکستان کی قومی مچھلی ہے۔ جینیات اور نوع (Species) سطح پر مچھلی کی تنوع میں کمی پراثر انداز ہونے والے عوامل میں ماحولیاتی بگاڑ اور انسانی مداخلت سرگرم عمل ہیں۔ مچھلی کی قدرتی افزائش نسل کیلئے جینیاتی تنوع کی بقاء ضروری ہے۔ جینیاتی تنوع کی بقاء کا دارو مدار آبادی اور تاریخی اعداد و شمار پر ہوتا ہے جو کہ نوع (Species) کی سطح پر مچھلی کی تنوع کی بقاء کیلئے اعلیٰ سطح کے اقدامات کرانے کیلئے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اقتصادی، سماجی اور ثقافتی اقدار میں اضافے کیلئے مطلوبہ خصوصیات کی افزائش نسل کی مچھلی کا انتخاب مناسب عمل ہے۔ جینیاتی تنوع کے بغیر جاندار ماحولیاتی تبدیلیوں کو اپنا نہیں سکتے۔ کسی بھی ملک میں چھری (Hatchery) مچھلی کے اچھے اشاک کی فراہمی کا

بہترین ذریعہ ہے۔ قدرتی اور مصنوعی طریقے سے مچھلی کی پیداوار میں اضافہ جینیاتی تنوع میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بھیری (Hatchery) کے بچوں کو دریاؤں میں چھوٹے سے معیاری مچھلی میں کمی چھوٹا سائز، جلد جھٹی بلوغت، کم شرح نمو اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں کمی کا پیدا ہونا مابہی گیری کے طریقہ کار پر مبنی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس لئے مچھلی کی افزائش نسل اور مابہی گیری کے انتظامات کیلئے بنیادی جینیاتی علوم سے آگاہی ضروری ہے۔ مچھلی کی سماجی اور اقتصادی اہمیت کے باوجود، بہت سی وجوہات کی بنا پر مابہی گیری دنیا کے مختلف علاقوں میں زیادہ کامیاب شعبہ نہیں ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران انسانی عوامل مثلاً ماحولیاتی آلودگی، مچھلی کی پیداوار، پانی کے بہاؤ میں تبدیلی اور انتہائی ناقص طریقوں نے مختلف سطحوں پر مابہی گیری کے وسائل پر مبنی اثرات مرتب کئے ہیں۔ مچھلی کی قدرتی پیداوار کی کمی میں ماحولیاتی آلودگی، افزائش نسل کے مقامات میں تبدیلی، منتقلی کے راستوں میں رکاوٹ اور غیر قانونی مچھلی کا شکار نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ ان عوامل میں غیر قانونی مچھلی کا شکار مچھلی کی افزائش میں کمی کیلئے ایک اہم ٹھکانہ ہے۔ مچھلی کے خاتمے کیلئے جلد کی تبدیلی 71 فیصد، غیر قانونی مچھلی کا شکار 29 فیصد اور ماحولیاتی آلودگی 26 فیصد حصہ لیتے ہیں۔ ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کیلئے بہت سی تجاویز پیش کی گئی ہیں جن میں مچھلی کی افزائش کے کچھ طریقوں پر پابندی، عالمی نفاذ کے ذریعے مابہی گیری تک رسائی کی روک تھام اور مچھلی کی تجارت کیلئے مثبت ترغیبات اور قوانین پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ مجموعی طور پر سبب عوامل مل کر مابہی گیری کی بقاء کیلئے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک عمل اکیلے اس مسئلہ کا حل تلاش نہیں کر سکتا۔ جینیاتی تحقیق کو بڑھانے، اعلیٰ سطح پر مچھلی کو پالنے اور باقاعدہ طور پر ان کی کارکردگی کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ مچھلی کے اسٹاک کو ایک دوسرے سے اور قدرتی اسٹاک سے علیحدہ کرنے کیلئے اچھی سہولیات میسر کی جاسکیں۔ مچھلی کی جینیات میں بہتری کیلئے اعلیٰ درجے کے انڈوں کی پیداوار میں اضافہ اور تیز افزائش نسل نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ بطور معاون و مددگار پاکستانی حکومت کو مابہی گیری کے ساتھ دوسرے شعبوں میں خاص طور پر لائیو اسٹاک اور زراعت کے درمیان باہمی روابط قائم کرنے چاہیے۔ انہیں نجی سرمایہ کاری کی توجہ مابہی گیری کی طرف مبذول کروانے اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے کیلئے باہمی تعاون کے ساتھ شراکت داری کرنی چاہیے۔ لہذا حکومت کو ماحولیاتی بقاء کو فروغ دینے اور آبائی تنوع کو ماحولیاتی بگاڑ سے بچانے کیلئے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے اعلیٰ اداروں کے قیام، مابہی گیری کی پالیسی پر عملدرآمد کرانے اور اسکی ترقی کی حمایت کیلئے انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مابہی گیروں کو جدید ترین علوم سے آگاہی کیلئے تربیتی سہولیات کا فراہم کرنا ضروری ہے۔ مستقبل کی پالیسی رہنمائی کیلئے مچھلی کی تنوع، ان کی پیداوار اور ان کے افزائش نسل کے مختلف طریقے کا فیصد مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکومت کی سماجی اور ماحولیاتی ذمہ داری ہے کہ مابہی گیری کے شعبے کی وسیع پیمانے پر حمایت کرے تاکہ یہ جینیاتی مسائل سے نمونہ آزا ہو سکے۔ مابہی گیری کے عمل کو قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کیلئے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کیلئے مچھلی کی جینیاتی ساخت کے متعلق معلومات سے آگاہی ضروری ہے۔ مچھلی کے قدرتی اور مصنوعی اسٹاک کی باقاعدہ نگرانی کے حوالے سے استعداد کار میں اضافے کی اشد ضرورت ہے۔

ہائبرڈائزیشن میجر کارپس کی جینیاتی سالمیت کے لئے ایک سنگین خطرہ

پی ایچ ڈی۔ کالر: بشکیلہ پرویز نگران: ڈاکٹر خالد عباس شعبہ: زواہجی، وائلڈ لائف اینڈ فشریز

گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں ہونے والی حیاتی تنوع میں کمی کی ایک وجہ انٹروگرہس سادی ہائبرڈائزیشن ہے۔ جینیاتی آلودگی کے خطرہ کا اندازہ لگانے کیلئے ہائبرڈ کی نشان دہی کرنے کے لئے مانٹرنگ طریقوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ میجر کارپس ٹیٹھے پانی میں پائی جانے والی اہم اکیوا پکچرل فیش سپر ہیں اور پنجاب کے دریائی نظام میں بھی خصوصی طور پر پائی جاتی ہیں۔ تحفظات میں سے ایک بڑا خطرہ چچر یز اسٹاکز میں ہائبرڈائزیشن کی شرح میں اضافہ متوقع تھا۔ شیپر کے ارتقاء کے لئے اکیس سال درکار ہوتے ہیں۔ لہذا میجر کارپس کی شیپر یا ہائبرڈ کا مناسب تعین شیپر کے تحفظ کے لئے ضروری ہے۔ موجودہ تحقیق کا مقصد میجر کارپس کے اسٹاکز میں جینیاتی انٹروگرہس سادی ہائبرڈائزیشن کا تعین کرنا مقصد تھا۔ میجر کارپس میں ہائبرڈائزیشن کی حد کا تعین کرنے کے لئے ڈی این اے مارکرز کا ایک پینل (RAPDs, microsatellites) اور بارکوڈ کو مجموعی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میجر کارپس کی جینیاتی سالمیت RAPDs تجزیہ سے کسی حد تک موثر ثابت ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر RAPDs طریقہ کار موجود مطالعہ میں ہائبرڈ اور شیپر کے مناسب تعین کے لئے کم مناسب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن ہائبرڈ اور انٹروگرہس افراد کا پتہ لگانے کے لئے microsatellite مارکر بہت مناسب اور ثابت ہوئے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے، ارتقاء اور تحفظ حیاتیات کیلئے ہائبرڈائزیشن کا کردار ایک مرکزی سوال رہا ہے۔ قدرتی ہائبرڈائزیشن ایک شیپر کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور کئی ٹیکسا، خاص طور پر مچھلیوں اور پودوں میں دیکھی گئی ہے۔ حیاتی تنوع کی تشکیل میں انسانی ہائبرڈائزیشن کا کردار تشویشناک ہے۔ شیپر کے تحفظ اور مینجمنٹ کے لئے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے ہائبرڈائزیشن قدرتی یا انتھروپوجینک ہے۔ حالیہ تحفظ کے قوانین میں انسانی ہائبرڈائزیشن کے جینیاتی اثرات غور کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر اس کے اثرات ناقابل تلافی اور دیر پا خیال کئے گئے ہیں۔ تازہ پانی میں پائی جانے والی مچھلیوں میں ہائبرڈائزیشن کی طرف پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ انٹروگرہس سادی ہائبرڈائزیشن جینیاتی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ جس کی وجہ سے شیپر کے معدوم ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ مچھلیوں کے دیگر گروہوں کے مقابلے میں ہائبرڈائزیشن، سپر پیڈز کے گروپ میں پائی گئی ہے۔ میجر کارپس، لمبیو روینا، کینلہ کینلہ اور سر ہائش مرگیا لابی اس گروپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ پاکستان، بھارت اور دوسرے جنوبی ایشیائی ممالک میں تجارتی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران میجر کارپس کے قدرتی اسٹاک کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے انکی نسل مصنوعی طریقے سے بڑے پیمانے پر تیار کی جا رہی ہے جو ان شیپر کی جینیاتی سالمیت پر سمجھوتہ ہے۔ حیاتی تنوع کو درپیش خطرات کا جائزہ لینے کے لئے ہائبرڈائزیشن پر غور و خوض اور ہائبرڈ افراد کا کھوج لگانا ابتدائی مراحل ہیں۔ میجر کارپس کے درمیان ہائبرڈائزیشن کے بارے میں خدشات شیپر کے مینجمنٹ اور تحفظ کے لئے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہائبرڈائزیشن اور جینیاتی انٹروگرہسشن کی جانچ پڑتال کے لئے تدریسی طریقے واضح اور قابل رسائی انداز میں ہونے چاہئے۔ مالیکولر ٹیکنالوجی میں حالیہ ترقی کی وجہ سے ہائبرڈ جانداروں کی جینیاتی شناخت میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور مختلف جینیاتی مارکرز ہائبرڈ جانداروں کی شناخت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مشاہداتی شواہد سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میجر کارپس فیش شیپر کا تحفظ پاکستان میں غیر یقینی ہے اور بہت سے پھر یز میں ان کا شاک جینیاتی طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ قبل ازیں میجر کارپس کے درمیان ہائبرڈائزیشن کے شواہد بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی ملے ہیں۔ لہذا، ہائبرڈائزیشن کے جینیاتی اور ماحولیاتی نتائج کے بارے میں آگاہی نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ ملک میں ان کی مابہی پروری کی پیداوار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ہم مقامی فانا کے بہتر تحفظ اور مینجمنٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

ادویاتی پودوں سے ہائبرڈائزیشن کا علاج

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد ریاض نگران: ڈاکٹر محمد شاہد شعبہ: بائیو ٹیکنالوجی

اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، مردانہ اور زنانہ جراثیموں کے ملاپ سے بچے کی پیدائش تک کے حقیقی مراحل کو شمار کرنا ممکن نہیں تو لیدی عمل سے مردانہ اور زنانہ جراثیموں کے ملاپ سے زائیدگی بنتا ہے اس عمل میں خرابی یا ہائبرڈائزیشن کا باعث بن سکتی ہے۔ ہائبرڈائزیشن تو لیدی نظام کی ایک بیماری ہے یا ایک جوڑے کی حیاتیاتی بیماری ہے جسے قدرتی ذریعہ سے ایک بچے کو جنم دینا ہے، مرد اور عورت میں سے کسی میں بھی تو لیدی نظام کی خرابی یا ہائبرڈائزیشن کا باعث بن سکتی ہے، زمین پر انسان کے پہلے ظہور سے یہ سب سے زیادہ متنازع طبی اور سماجی تنازعات میں سے ایک رہا ہے، بعض تہذیبوں میں بے اولادی کو عورتوں کے تو لیدی نظام کی بیماری سمجھا جاتا ہے، بے اولادی سے عورت کی سماجی اور نفسیاتی حالت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہائبرڈائزیشن کی بیماری جنوب مشرقی ایشیاء خاص طور پر پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ مرد اور عورت دونوں کے سماجی، اخلاقی اور تہذیبی اقدار ہیں، پاکستان میں 8 سے 10 فیصد جوڑوں میں ہائبرڈائزیشن کی بیماری ہوتی ہے، جس کی وجہ غذائی عدم توازن، ذہنی انتشار اور ماحولیاتی عوامل ہیں۔ ہائبرڈائزیشن جوڑوں میں مرد کا 40

فیصد اور عورت کا 50 فیصد کردار ہوتا ہے اور بقیہ ہانچہ پن 10 کا سے 15 فیصد نامعلوم عوامل کی وجہ سے ہیں۔ پودوں کو مصنوعی ادویات کی جدت سے پہلے مختلف امراض کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے زمانہ قدیم کے لوگوں کا یقین تھا کہ پودوں کو ادویات، خوراک اور دوسری ضروریات کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کلینیکل مطالعہ سے ثابت ہوا ہے کہ رایتی ادویات جیسے کوئین، اسپرین اور مورفین تمام پودوں سے حاصل کردہ ادویات ہیں۔ لہذا قدرتی مصنوعات اور اس سے اخذ کئے گئے مصنوعات بہت اہمیت رکھتے ہیں اور موجودہ ادویات کا تقریباً 40 فیصد جڑی بوٹیوں اور ان کے ماخذ سے حاصل ہوتے ہیں، پودوں میں متعدد حیاتیاتی طور پر فعال مرکبات شامل ہیں، جیسے فینولکس، فلاویونائڈز، کاروٹینوئیدز، وناسن، پروٹین اور انزائمز جو بہت سی بیماریوں کے علاج میں مددگار ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ قدرتی کم قیمت اور صحت کی ضروریات کیلئے زیادہ سے زیادہ ادویاتی پودوں کا پتہ لگائیں۔ بہت سی بیماریوں کے علاج کیلئے جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے مثلاً تولیدی نظام کی بیماریوں، جلدی امراض، معدے کے مسائل، دل کے امراض، اعصابی نظام کی بیماریاں اور جگر کی بیماریاں وغیرہ۔ اگرچہ مصنوعی ادویات بہت سی جسمانی بیماریوں کے علاج کیلئے ادویاتی پودوں سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد (پاکستان) اور یونیورسٹی آف گلاسگو (سکاٹ لینڈ UK) کے باہمی اشتراک سے ایک وسیع تحقیقی مطالعہ کیا گیا ہے جس میں تولیدی نظام میں خرابی کے خلاف علاج کیلئے منتخب کردہ ادویاتی پودوں کی صلاحیت کو جانچا گیا، ادویاتی پودے یعنی کوکچ (Mucuna pruriens) اور عرققرا (Anacyclus pyrethrum) کا مطالعہ کیا گیا میتھانول کو استعمال کرتے ہوئے کوکچ کے بیجوں اور عرققرا کی جڑوں سے Extract تیار کیا گیا ابتدائی طور پر حاصل کردہ Extract کا حیاتیاتی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا گیا جس سے پتہ چلا کہ ان پودوں میں اچھی آئی آکسیڈنٹ صلاحیت موجود ہے اور اس میں انی آکسیڈنٹ مرکبات کی کافی مقدار پائی گئی اور ان میں کوئی خاص نقصان دہ اثرات نہیں ہیں۔ پودوں سے تیار کردہ Extract کونسل کشی کی بڑھوتری اور اینڈروجنک سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کیلئے چوبیس کوڈے گئے، دونوں پودوں میں اینڈروجنک صلاحیت پائی گئی، جن چوبیسوں کا پودوں سے علاج کیا گیا ان میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی مقدار زیادہ پائی گئی بنسبت عام چوبیسوں کو عام خوراک کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا۔ اور ان سے بھی جن کو کاربن ٹیڑا اکلورائیڈ کے انجکشن لگائے گئے۔ مزید سپرمز (Sperms) کی پیداوار میں بھی واضح بہتری پائی گئی۔ اس مطالعہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوکچ کے بیجوں اور عرققرا کی جڑوں میں عمدہ انی آکسیڈنٹ صلاحیت، سائیکو ٹاکس سرگرمی میں کی اور اینڈروجنک صلاحیت میں واضح بہتری پائی گئی ہے جن کا سٹیرائڈ (Steroid) ہارمون خاص طور پر مردانہ تولیدی نظام کے ہارمونز کے اخراج میں اہم کردار ہے، جو سپرم بنانے کے ذمہ دار ہیں ان پودوں کے مردانہ اور زنانہ تولیدی نظام کے ٹشوز (Tissues) کا ٹائیکو سکوپ سے مطالعہ کرنے پر بھی پتہ چلا کہ یہ ان کی ساخت پر بھی مثبت اثرات رکھتے ہیں۔ مستقبل میں جانوروں یا انسانی رضا کاروں پر بڑے پیمانے پر ایسی طرح کی نوعیت کے ادویاتی پودوں سے سائنسی بنیاد پر تجارتی مصنوعات کو فروغ دینے کیلئے کئے جاسکتے ہیں۔ جو پاکستان سے بے اولادی جیسی لعنت کو ختم کیا کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

Silymarin اور دیگر ادویاتی پودوں سے تیار کردہ ہربل امتزاج کی جگر کی بیماریوں کے خلاف مافیتی صلاحیت

پی ایچ ڈی۔ سکالر: شمن حنا نگران: ڈاکٹر غلیل الرحمن شعبہ: بائیو کیمسٹری

ساری دنیا میں موت کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ جگر کی بیماریاں ہیں۔ جگر کی بیماریاں صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہیں جو نہ صرف صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد بلکہ فارماسیوٹیکل صنعتوں اور ڈرگ ریگولیٹری ایجنسیوں کے لئے ایک چیلنج ہیں۔ جگر کی بیماریوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی اور سرس شامل ہیں۔ جو جگر کے کینسر کا موجب ہیں۔ ہیپاٹائٹس (Hapatitis) ایک خطرناک مرض ہے اور ہر سال اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے منہ چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی مقامی آبادیوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی ہیپاٹائٹس ہی عام ہو چکے ہیں۔ جگر کی بیماریوں کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی روایاتی اور ایلیو پیٹھک ادویات یا تو ناکافی ہیں یا پھر سنگین منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ لہذا مصنوعی اور ایلیو پیٹھک ادویات کی جگہ لینے کے لئے عارضہ جگر کے علاج کے لئے موثر اور محفوظ ہربل ادویات کی تلاش ضروری ہے۔ اس لئے موجودہ تحقیق کا مقصد جگر کے امراض سے بچاؤ اور ان کے علاج کے لئے Silymarin اور دیگر ادویاتی پودوں (Medicinal Plants) کا استعمال کرتے ہوئے ایک طاقتور اور موثر ہربل امتزاج (Herbal Combination) بنانا اور اس کا تجزیہ کرنا تھا۔ یہ تحقیق دو مرحلوں بشمول *In vitro* اور *In vivo* تجربات میں مکمل کی گئی تحقیق کے پہلے مرحلے میں منتخب کردہ ادویاتی پودوں کو مختلف *In vitro* سرگرمیوں جیسا کہ Antioxidant، Hepatoprotective اور Toxicity assays کے ذریعے جانچا گیا۔ جبکہ تحقیق کے دوسرے مرحلے میں نمایاں طور پر بہتر نتائج ظاہر کرنے والے ادویاتی پودوں کے ہربل امتزاج کو جانوروں پر آزمایا گیا۔ منتخب کردہ ادویاتی پودوں کی تین مختلف مقداروں کے *In vitro* تجربات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ ادویاتی پودوں کی مقدار بڑھانے سے ان کی Antioxidant طاقت بھی بڑھتی ہے۔ H₂O₂ سے پیدا ہونے والے oxidative stress کے خلاف بھی ادویاتی پودوں نے pBR322 DNA پر حفاظتی اثرات ظاہر کئے۔ جبکہ Toxicity assays جن میں Hemolytic Assays اور Mutagenicity Assays شامل تھے۔ ان کے نتائج سے معلوم ہوا کہ ادویاتی پودے استعمال کے لئے موثر اور مفید ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کے مضر اثرات سے محفوظ ہیں۔ Liver Slice culture model کے ذریعے تمام ادویاتی پودوں کی Hepatoprotective activity کا تجزیہ کیا گیا۔ جس کے نتائج سے یہ تصدیق ہو گئی کہ تمام ادویاتی پودے مختلف مقداروں پر جگر کی حفاظت کرتے ہیں۔ Hepatoprotective Activity کی وجہ ادویاتی پودوں میں پائے جانے والے مختلف Bioactive compounds جیسا کہ Phenolic acids اور Flavonoids ہو سکتے ہیں۔ منتخب کردہ ادویاتی پودوں کی Chemical Profiling بذریعہ HPLC اور GC-MS کی گئی۔ جس سے ان موجودہ Bioactive Compounds کی شناخت کی گئی۔ *In vitro* تجربات کے آخر میں Response surface methodology (RSM) کا استعمال کرتے ہوئے۔ ادویاتی پودوں کے پچاس (50) مختلف ہربل امتزاج بنائے گئے جن کی hepatoprotective activity بذریعہ Liver Slice culture Assay کی گئی۔ تحقیق کے دوسرے مرحلے میں CCl₄-induced Hepatotoxicity کے خلاف ہربل امتزاج کی Preventive اور Curative Hepatoprotective activity کا تجزیہ کیا گیا۔ جانوروں کے جگر کے مختلف Hematological، Biochemical اور Antioxidant Parameter کی جانچ سے معلوم ہوا کہ موجودہ ہربل امتزاج جگر کی مختلف بیماریوں کے خلاف نہ صرف بچاؤ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ان کے علاج کے لئے بھی موثر ہے۔ جانوروں کے جگر کی Histopathological Examination کے نتائج سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہربل امتزاج جگر کی مختلف بیماریوں کے خلاف حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ Silymarin اور دیگر ادویاتی پودوں سے تیار کردہ ہربل امتزاج موجودہ مصنوعی اور ایلیو پیٹھک ادویات کی نسبت سستا، موثر اور استعمال کے لئے محفوظ ہونے کی بنیاد پر جگر کی بیماریوں کے خلاف ایلیو پیٹھک ادویات کا بہترین متبادل ہو سکتا ہے۔

کپاس کی داءس کی بیماری کے تدارک کے لئے ٹرانسکرپشن ایکٹیویٹر لائیک (TALES) کا استعمال

پی ایچ ڈی۔ سکالر: ذوالقرنین خان نگران: ڈاکٹر سلطان حبیب اللہ خان شعبہ: بائیو کیمسٹری

کائٹن لیف کرل کی بیماری پاکستان میں کپاس کی ایک نقصان دہ بیماری ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں اس کپاس کی فصل کو بڑا نقصان پہنچا گیا ہے۔ اقتصادی شرائط میں، 1988 سے پاکستان نے کپاس کی 7.6 ملین ہیکٹار نقصان پہنچایا ہے جس سے اس تباہی کی وجہ سے 71 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پاکستان میں کائٹن لیف کرل کی بیماری پہلی بار ملتان (فہ سلطانپور) کے قریب 1967 میں رپورٹ کی گئی تھی۔ ابتدا میں، بیماری کو سنگین توجہ نہیں دی گئی تھی۔ بعد میں یہ سب سے زیادہ کپاس کی جاتیوں (Hussain and Ali, 1975) کے لئے ممکنہ خطرہ بن گیا۔ اس کے بعد، بیماری پاکستان کے علاقے جیسے وھارٹی، ملتان، بہاول پور،

خانیوال اور ساہیوال میں اچھی طرح سے پھیل گئی اور 1987 میں 80 فیصد نقصان ہوا تھا۔ 1990 کے آغاز میں، یہ پاکستان کے کپاس کی پیداوار کے لئے ایک سنگین خطرہ بن گیا تھا۔ وائرس کی نقل و حمل کی روک تھام وائرس لفیکشن کو روکنے کے لئے ایک پرکشش نقطہ نظر ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران، جینوم انجینئرنگ میں ترقی بنیادی اور مصنوعی حیاتیات میں بڑی اپیلی کیشنز کے ساتھ ایک بڑی چھلانگ تھی۔ ہم نے وائرس جینوم میں چار علاقوں کو منتخب کیا، دو کوڈنگ اور دو غیر کوڈنگ۔ غیر کوڈنگ کے علاقے وائرس کے محفوظ علاقوں میں موجود ہیں۔ Nonnucleotide Gemini وائرس کے درمیان سب سے زیادہ محفوظ علاقہ ہے جو کہ وائرس کی نقل کی ابتدا ہے۔ کوڈنگ کے علاقوں میں نو نائیکلوٹائیڈ اور دوبارہ بانڈنگ سائٹ میں ہم نے محسوس کیا کہ ان علاقوں کو حذف کرنے والے ٹیل اور TALEN تعمیرات کو وائرس کی تائید میں کمی اور بیماری کی ترقی میں تاخیر میں موثر تھا۔ TALEN اور TALE میں وائرس جمع کرنے میں 70-80 فیصد کمی پائی گئی۔ علامات کی ترقی میں 4-5 دن کی تاخیر ریکارڈ کی گئی تھی۔ TALEs کو سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا اور اس کے اظہار سے متعلق پودوں میں *N. benthamiana* کیپروٹوپلاست میں بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد CLCuMB/CLCuKV کے ساتھ TALEs کو پودوں میں شریک کیا گیا تھا۔ یہ پایا گیا تھا کہ TALEs وائرس کو *N. benthamiana* پودوں میں دبانے میں موثر تھے۔ TALEN کی وائرس کیلئے تمام رکاوٹ کو *N. benthamiana* کے ذریعے پودوں میں اظہار کیا گیا تھا۔ TALEN کو دوبارہ پابند کرنے والی سائٹ کو ہدف بنانے کے لئے وائرس کو کم کرنے کے لئے موثر پایا گیا تھا۔ پلانٹ میں علامات کی نشاندہی میں تاخیر اور کم وائرس جمع کرنے کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ ہم نے دو TALEN تعمیرات کے ساتھ دوبارہ جین کے کوڈنگ خطے کو بھی نشانہ بنایا۔ ہم نے محسوس کیا کہ TALEN ریجن جین کوڈنگ کو حذف بنانے کے لئے وائرس انفیکشن اور پودوں میں جمع کرنے میں ناکام تھا۔ ڈی این اے میں ڈی ایس بیز (DSBs) کی جانچ کرنے کے لئے T7E1 سے جانچا گیا۔ ایک TALEN کی تعمیر کے لئے مثبت تھا لیکن T7E1 ہم آہنگی کے کوئی مدہ نتائج مثبت نہیں تھے۔ qPCR کی طرف سے TALEN کی صورت میں وائرس ٹائٹریں 10-20 فیصد کمی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ علامات کی ترقی میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ ریجن جین کو حذف کرنے میں وائرس کی کمی کی ناکامی کی مرمت کے نظام کی کارکردگی یا وائرس کی طرف سے مزاحمت کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے نتائج کاٹن لیف CURL وائرس کو کم کرنے کے لئے TALEN اور TALEs کی امکانات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسرے وائرس کے دباؤ کے لئے مزید استعمال کے امکانات پیدا کرتے ہیں۔

کھمبیوں کی خصوصیات اور نیو ذرات کے ذریعے ادویاتی افادیت کا تعین

پی ایچ ڈی سکالر: عامر ارشد نگران: ڈاکٹر محمد شاہد شعبہ: بائیو کیمسٹری

اینٹی بائیوٹک کا استعمال متعدی بیماریوں کے واقعات کو کم کر رہا ہے، لیکن ان کا وسیع پیمانے پر استعمال دنیا بھر میں ایک بڑا عوامی صحت کا مسئلہ بن رہا ہے جو ادویات سے مدہم جرثوموں کی وجہ سے ہے، چاندی کے نیو ذرات کو وسیع پیمانے پر موثر اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، کھمبیوں سے اخذ شدہ گلوکونیکٹو کوریڈیوسنگ اور کپنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کر کے اس کی "ٹوکسیسٹی" کو رد کیا گیا ہے۔ کھمبیوں غذائی ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی ادویات، اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنکشنل ایجنٹس کا بھی ذریعہ ہے۔ موجودہ مطالعہ بنیادی طور پر مشروم کی غذائی، اینٹی مائیکروبیئل اور حیاتیاتی خصوصیت پر تھا اور بالآخر چاندی کے نیو ذرات کو کھمبیوں کے اخذ شدہ گلوکونیکٹو کے استعمال سے قدرتی ذرات میں تبدیل کر کے اس کی خصوصیات کو پرکھنے اور "ان وی وو" اور "ان وٹرو" تجربات کے ذریعے ان کی اینٹی مائیکروبیئل اور "ہیکٹو" رائیٹک" تحقیق کرنا تھی۔ اس کے لئے چار مختلف پلیر وٹس کھمبی کی نسلوں بشمول "پی وٹ" سفید شگفتی کھمبی (امریکہ سے درآمد شدہ) "پی وٹ" فینکس شگفتی کھمبی (کینیڈا سے درآمد شدہ) "پی وٹ" وائیلڈ کھمبی (FW-133) اور "پی ایٹ" بلیو شگفتی کھمبی (برطانیہ سے درآمد شدہ) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان کے انسٹی ٹیوٹ آف ہورٹیکلچرل سائنسز کے میڈسل مشروم لیبارٹری کی مشروم کلچر بینک سے جمع کئے گئے تھے۔ عرقیات نکالنے سے قبل ان تمام منتخب شدہ کھمبیوں کے پروٹین، چربی، راس گل، کاربوہائیڈریٹ، فائبر اور توٹونائی کا مرکب تجربہ (Proximate Analysis) کیا گیا۔ کھمبیوں کو پہلے ایتھانول سے اخذ کیا گیا پھر مختلف نامیاتی محلول (این: ہیکزین، ڈائی کلورو میتھین، ایتھانل، ایسیٹک اور پانی کے ساتھ الگ الگ) (فریکٹینیٹ) کیا گیا۔ چار مختلف پلیر وٹس کھمبی کی نسلوں کے مختلف نامیاتی عرقیات TFC, TPC, DPPH, TPC اور دیگر مختلف سکیو بیجنک سرگرمی کی صلاحیت اور ریڈیوسنگ طاقت کے ذریعے اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمیوں کا مطالعہ کیا گیا پھر "ڈی این اے" کے نقصان کے تحفظ کے نتائج اخذ کئے گئے۔ کھمبیوں کا منتخب شدہ جرثوموں (ایس۔ اور لیس، بی۔ سیٹلس، ای۔ ولانی اور پی۔ ملٹی سوڈا) (ای۔ مائیکرو، ای۔ فلیووس، ایف۔ سولینی اور ایچ۔ مائیکس) کے خلاف معتدل اینٹی مائیکروبیئل سرگرمی کا مشاہدہ کیا گیا۔ GC-MS کے ذریعے چکنائی کی پروفائیل نے ثابت کیا کہ ان سپور ریڈیفیٹی ایڈز کو سپور ریڈیفیٹی ایڈز پر فضیلت حاصل تھی پروٹین کا پیکیٹو فوٹو میٹرک تجربات نے ثابت کیا کہ کھمبی کی تمام نسلوں میں پروٹین، بہترین مقدار میں پائی جاتی ہے۔ شوگروں کے HPLC تجزیہ سے 6 مختلف مونو اور ڈائیسیکرائڈز اخذ کئے گئے، نتائج سے اخذ کیا گیا اور فوٹو میٹرک وٹس کھمبی کے تمام منتخب شدہ نسلوں میں پائی جاتی ہیں۔ HPLC تجزیہ سے نامیاتی ایڈز کا تعین کیا گیا، نتائج میں اخذ کیا گیا کہ ٹارٹرائک ایڈ، سٹرک ایڈ اور اگرائز ایڈ چاروں کھمبیوں میں اچھی مقدار میں موجود تھے۔ نیوٹراسیوٹیکل تجربات سے اخذ کیا گیا کہ اسکوربک ایڈز مواد تمام کھمبیوں میں اچھی مقدار میں موجود تھا۔ ایلفا۔ٹوکوفرول کے HPLC تجربات سے ثابت ہوا کہ منتخب شدہ کھمبی کی نسلوں میں مناسب مقدار میں موجود تھے۔ پٹا۔کیروٹین کے HPLC تجربات سے ثابت ہوا کہ پٹا کیروٹین منتخب شدہ کھمبی کی نسلوں میں اچھی مقدار میں موجود تھے۔ کھمبی کی تمام نسلوں میں معدنیات (Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Cu, Mn, Zn) کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جبکہ بھاری دھاتیں جیسے کہ Pb کم مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ مطالعہ کا حتمی مقصد حاصل کرنے کیلئے خام گلوکونیکٹو کو خالص اور خشک کیا گیا۔ حاصل شدہ خالص گلوکونیکٹو چاندی کے نیو ذرات کی ترکیب کیلئے استعمال کیا گیا پھر UV-VIS سپیکٹر اسکینر کے ذریعے خالص کئے گئے گلوکونیکٹو اور Glucan-AgNPs کی تصدیق کی گئی۔ خالص کردہ گلوکونیکٹو کی خصوصیات FT-IR, SEM اور XRD سے پرکھا گیا جبکہ Glucan-AgNPs کی خصوصیات FT-IR, SEM, EDS اور XRD سے پرکھا گیا۔ ان وٹرو جائزوں سے ظاہر ہوا کہ Glucan-AgNPs بیکٹیریا کی نسلوں کے خلاف بہترین اینٹی بیکٹیریل سرگرمی اور پھیپھوندی کی نسلوں کے خلاف اعتدال پسند اینٹی فنکشنل سرگرمی ادا کرتے ہیں۔ حیاتیاتی فلم (BIOFILM) کو بننے سے روکنے کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ Glucan-AgNPs جرثوموں کی حیاتیاتی فلم بنانے کی صلاحیت کو روکنے کے لئے طاقتور ہتھیار ہے۔ میوٹا جینیسیٹی اور کارکائینو جینیسیٹی طاقت کا تجربہ ایبز ٹیسٹ اور ہیملیٹک سرگرمی سے کیا گیا۔ ایبز ٹیسٹ نے انکشاف کیا کہ Glucan-AgNPs سالمونیللا ٹائفیموریم جرثوموں کی نسلوں TA98 اور TA100 کے خلاف نان میوٹا جینیٹک تھے۔ ہیملیٹک تجربہ نے انکشاف کیا کہ Glucan-AgNPs نان ہیملیٹک تھے۔ ان ویوو مطالعہ بالغ ایلیمینو چوہوں پر کیا گیا تھا۔ تمام خون، حیاتیاتی اور عضلاتی پیرامیٹرز (پیانے) صفر نمونوں پر ٹھیک تھے۔ جسم کا درجہ حرارت، (ESR) ای ایس آر خون کے کل ذروں کی مقدار، خون کے خاص سفید ذروں کی مقدار (نیوٹروفلز) اور سی ری ایکٹو پروٹین میں جرثوموں (ایس۔ اور لیس اور ای۔ کولائی) کو خون میں شامل کرنے سے اضافہ ہو گیا اور جیسے ہی Glucan-AgNPs سے علاج کیا گیا۔ خون میں بیماری پیدا کرنے والے جرثوموں کی تعداد ختم ہو گئی اور تمام پیرامیٹرز (پیانے) پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ تجربات کے اختتام پر بالغ ایلیمینو چوہوں کو کاٹا گیا۔ عضلات کے تجربات کے مطالعہ سے انکشاف ہوا کہ چوہوں میں کوئی عضلاتی سوزش موجود نہیں تھی۔ نہ ہی چاندی کے ذرات چھوٹی آنٹوں، جلد، جگر یا گردوں میں پائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پٹا ٹوکسیسٹی یا دیگر وٹوکسیسٹی نہیں پائی گئی۔

جینیاتی بنیاد پر لیوکیمیہ کے مریضوں کا معالجاتی رد عمل

پی ایچ ڈی۔ سکارل: امتیاز محمود طاہر نگران: ڈاکٹر طاہرہ اقبال شعبہ: بائیو کیمسٹری

جینیاتی پولیمورفزم سے مراد افراد کے درمیان وہ جینیاتی متغیرات ہیں جو جینز میں کچھ نمایاں البڈز (Alleles) کے رد و بدل سے منسلک ہوں۔ مختلف نسلی حلقوں میں ان البڈز کا تناسب مختلف پایا گیا ہے۔ تاہم ڈی این اے کی ترتیب میں ہے تبدیلی اچانک یا تارکاری مادے سے یا کچھ وائرس کے حملے سے وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ جینیاتی مواد کا وہ حصہ جو خاص طور جینیاتی عمل میں حصہ لیتا ہے اسے ایگزون (Exon) کہتے ہیں۔ ایک ایگزون بہت سے نیوکلیوٹائیڈز کے ترتیب پر مشتمل ہے۔ کسی ایگزون میں ایک واحد نیوکلیوٹائیڈ کی تبدیلی کو "سنگل نیوکلیوٹائیڈ پولیمورفزم" (SNP) کہا جاتا ہے۔ تمام جینیاتی متغیرات کا 90 فیصد SNP سے عبارت ہے۔ پولیمورفزم کا یہ عمل جینز کی مصنوعات کے حیاتیاتی عوامل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو اس منطق کی واضح دلیل ہے کہ افراد ایک جیسی ادویات کے خلاف مختلف رد عمل رکھتے ہیں۔ جینیاتی بنیادوں پر افراد میں ادویات کے خلاف انفرادی رد عمل کا مطالعہ "فارمیو جینومکس" کہلاتا ہے۔ جس میں ہم ان خاص جینز کے متغیرات کا مطالعہ کرتے ہیں جو ادویات کے مختلف اہداف بشمول پروٹینز، خلیوں کے ڈرگ ٹرانسپورٹرز اور خامروں کے بننے کا باعث ہوتے ہیں۔ جدید دور میں ان تحقیقات کی روشنی میں دوا سازی کے عمل کو مریضوں کے لیے انفرادی سطح پر موثر بنایا جا رہا ہے۔ ایکوٹ لمفو بلاسٹک لیوکیما (Acute Lymphoblastic Leukemia; ALL) امراض بچکان میں خون کے سفید خلیوں کا ایک اہم سرطان ہے، یہ مرض اکثر 2 سے 5 برس کی عمر میں ہوتا ہے۔ بچوں میں پائے جانے والے ہمد قسم کے سرطان کا تقریباً 30 فیصد ALL پر مشتمل ہے اور 14 برس سے کم عمر کے بچوں میں یہ سرطان کا ایک تہائی تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس مرض میں مبتلا بچوں کی شرح بچیوں سے زیادہ ہے۔ ایٹانیا اور افریقی آبادی میں کچھ خاص جینیاتی پولیمورفزم ALL کے مرض کا باعث قرار پائے ہیں۔ MDR1 جین ایک ڈرگ ٹرانسپورٹر پروٹین ہوتا ہے جو P-Glycoprotein کہلاتی ہے۔ یہ پروٹین خلیوں کی دیواروں میں جڑی ہوتی ہے اور متعلقہ خلیوں سے ادویات کے اخراج کے ذریعے مجموعی طور پر ادویات کے خلاف مزاحمت کا باعث بنتی ہے۔ MDR1 میں C1236T SNP (جو اس جین کے بارہویں ایگزون پر ہے) سے منسلک جینیاتی پولیمورفزم کا تناسب دوسرے ممالک بشمول روس، جرمنی، روم، ہنگری اور ترکی کی نسبت پاکستان میں بہت مختلف دیکھا گیا ہے۔ لہذا اس پس منظر کے پیش نظر ALL کے حوالے سے پاکستان میں فارمیو جینومک رسرچ وقت کی اہم ضرورت ہے لیوکیمیہ کے مریضوں میں ادویات کے خلاف مزاحمت کو MDR1 جین کی C3435T SNP کے جینیاتی پولیمورفزم سے منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ SNP انسان کے MDR1 جین کے پچیسویں ایگزون پر پائی جاتی ہے۔ اس SNP کے زیر اثر افراد میں P-Glycoprotein کی مقدار یا عملی نوعیت تبدیل ہوتی ہے۔ مقامی آبادی میں موجود ALL میں مبتلا مریضوں کا مجموعی ادویات کے خلاف مزاحمت کی جینیاتی بنیاد کا مطالعہ موجودہ تحقیق کا اہم مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے صحت مند لوگوں میں دوا (Digoxin) کا استعمال بھی کیا گیا تاکہ خون میں اس دوا کی P-Glycoprotein کی مقدار کو جانچا جاسکے۔ حالیہ تحقیق میں MDR1 میں C3435T SNP کی جینیاتی پولیمورفزم (CC, CT, TT Phenotypes) کی شرح 35 فیصد CC، 47.75 فیصد CT اور 21.25 فیصد TT دیکھی گئی ہے۔ MDR1 کے C3435T جینیاتی پولیمورفزم کا خون میں موجود P-Glycoprotein کی مقدار سے واضح ربط دیکھا گیا ہے۔ جینوٹائپ 3435CC کے حامل افراد کے خون میں P-Glycoprotein کی مقدار جینوٹائپ 3435TT کے حامل افراد سے بہت زیادہ دیکھی گئی اور خون میں Digoxin کی مقدار کا برعکس تناسب نظر آیا جو اس بات کی دلیل ثابت ہوا کہ 3435CC جینوٹائپ کے حامل افراد میں P-Glycoprotein کی زیادہ مقدار میسر ہوتی ہے جو ان میں ادویات کے خلاف مزاحمتی عمل کو زیادہ مؤثر کرتی ہے۔ اس کے برعکس 3435TT جینوٹائپ کے حامل لوگ انہیں ادویات کے استعمال سے جلد صحت یاب ہوتے ہیں۔ تاہم 3435CT جینوٹائپ کے حامل افراد کے خون میں P-Glycoprotein اور Digoxin کی مقدار نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ ہماری آبادی میں MDR1 جین کی C3435T SNP کی جینیاتی پولیمورفزم کا کوئی جنسی ربط نہیں دیکھا گیا۔ مندرجہ بالا تحقیق کے علاوہ خون کا تفصیلی مونیٹرنگ، کیمیائی ٹیسٹس بشمول جگر، گردہ اور خامروں کے ٹیسٹ، مجموعی آکسائیڈیشن اینٹی آکسائیڈیشن اور مخصوص بی۔ سیل لمفو باؤٹین (BCL-2) کا مطالعہ بھی حالیہ تحقیقی منصوبے کا حصہ تھا۔

سبزیوں کی پیداوار اور کسانوں کی تربیت

پی ایچ ڈی۔ سکارل: نگہام حسن نگران: اعجاز شرف شعبہ: ایگریکولچرل سائنسز اینڈ رورل ڈیولپمنٹ

سبزیوں کی پیداوار کا اہم جزو ہیں۔ جو انسانی صحت کی نشوونما کے لیے بہت ضروری معمول کی مینا بولک (Metabolic) سرگرمیوں کے لیے معدنیات غذا کی لازمی اجزاء ہیں اور سبزیوں ان معدنیات کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبزیوں انسانی جسم کی بڑھوتری اور معیار کے لیے دوسرے اہم اجزاء بھی فراہم کرتی ہیں۔ سبزیوں کے پتوں، تنے پھل اور کھانے والی جڑوں کی شکل میں استعمال کی جاتی ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبزیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریات کو قدرتی اجزاء کا ایک تحفہ ہے۔ سبزیوں مختلف بیماریوں کی روک تھام کو یسٹروکولک کرنے، اور کینسر کی زیادتی کو کم کرنے میں اہم کردار کرتی ہیں۔ سبزیوں کو انسانی خوراک کا اہم جزو تصور کرتے ہوئے دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں جس سے دل کی بیماریوں میں 23 فیصد واضح کمی آئی ہے۔ مثلاً خون کا کینسر، ذیابیطس جیسی بیماریوں کا علاج مضر اور کھرا کے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سبزی پھلیاں استعمال کرنے سے شوگر اور کولیسٹرول کم ہوتی ہے۔ (FAO) خوراک اور زراعت کی تنظیم کی روپورٹ کے مطابق دنیا کی کل زرعی زمین میں سبزیوں کے زیر استعمال زمین کا کل رقبہ 1.1% فی صد ہے جس میں براعظم یورپ 12% فی صد اور وسط ایشیا 14 فی صد پیداوار دے رہے ہیں۔ براعظم یورپ اور وسط ایشیا نے 2010ء میں 136 ملین ٹن سبزیوں کی پیداوار حاصل کی ہے۔ براعظم یورپ میں ترکی سبزیوں اگانے میں سب سے آگے ہیں۔ پاکستان میں سبزیوں کی چھ سے زائد اقسام بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہیں۔ آلو، پیاز، مرچ، ٹماٹر، ٹیٹم، گاجر، گوہی، مٹر، کدو، توری اور بھنڈی زیادہ تر اس ملک میں پنجاب میں بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں سے صوبہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں سبزیوں کے زیر کاشت رقبہ 367,000 ہیکٹر ہیں۔ سبزیوں کی کاشت کے لیے دو موسم درکار ہیں، رنج اور خریف رنج موسم میں کاشت ہونی والی سبزیوں، آلو، پیاز، گوہی جب کہ خریف میں ٹماٹر، مرچ، ٹیٹم وغیرہ ہیں۔ پاکستان پیاز کی برآمدات میں سرفہرست ملک ہے لیکن پیاز کی پیداوار سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ جس سے اس کی برآمدات میں واضح کمی آئی ہے۔ پھل اور سبزیوں کی برآمدات کا پاکستان کی کل برآمدات میں صرف 1 فی صد حصہ ہے۔ سبزیوں کی پیداوار پر اثر انداز ہونے والے اسباب جن میں رقبہ کا تھوڑا ہونا، قحط، سیلاب، کیڑوں کا حملہ، کھاد کی عدم فراہمی اور پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت کا زیادہ وصول کرنا وغیرہ ہیں۔ کسانوں کو سبزیوں کی برداشت، ان کی پیکنگ کرنا اور سبزیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کا علم نہ ہونا بھی سبزیوں کی پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں میں پاکستان میں سبزیوں کی پیداوار بہت کم رہی تھی کیوں کہ تحقیقاتی ادارے اور تحقیقی ماہرین سبزیوں کی پیداوار کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے 2005 میں سبزیوں اور پھل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پروگرام متعارف کرایا جس کا نام (Fruit and Vegetable Development Project) تھا جو پنجاب کے 12 اضلاع میں شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد پھل اور سبزیوں کے کاشتکاروں کو ریفرینڈ دینا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر جائے۔ جون 2010 میں یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا پھر پنجاب حکومت نے اس پروگرام کو 2013ء میں پنجاب کے مزید 20 اضلاع میں متعارف کروایا جن میں رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور ملتان آسم کی پیداوار کے لیے، لیہ، منڈی، بہاولدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سرگودھا سیکٹر کی پیداوار کے لیے، شیخوپورہ، اوکاڑہ، قصور، سیالکوٹ، ٹانک، روالپنڈی، حافظ آباد، پاکپتن، ساہیوال، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور سبزیوں کی پیداوار کے لیے شامل کیا گیا۔ اس پروگرام نے کسان کھیت سکول کی شاخ کو استعمال کرتے ہوئے کسانوں کو تربیت دی ان کو اعتماد میں لے کر کسانوں کو معلومات فراہم کی، سبزیوں، معدنیات، وٹامنز انسانی جسم کو مہیا کرنے کا

بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان سبزیوں کی پیداوار دینے والے ممالک میں سے ایک الگ ملک ہیں حالانکہ تمام ذرائع دستیاب ہیں۔ کسانوں کی خاصی تربیت کا نہ ہونا اور کچھ تکنیکی علم کا نہ ہونا سبزیوں کی پیداوار پر اثر انداز ہوا ہے۔ اگر ہم سبزیوں کی پیداوار کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمام موجودہ ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے کسانوں کو تکنیکی علم مہیا کیا جائے۔ حالیہ زرعی تحقیق کے مطابق کسانوں کی زیادہ تعداد حکومت پنجاب کی زرعی سفارشات (سبزیوں کیلئے) سے ناواقف ہے۔ اس ساری صورت حال کے پیچھے بروقت کسانوں کی زرعی تربیت کا نہ ہونا سب سے بڑا عنصر ہے۔ توسیعی کارکنان کی ناکافی تربیت پیداواری اہداف کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ جس کے لئے حکومت کو چاہیے کہ تربیتی اداروں کے تعاون سے توسیعی کارکنان کو اعلیٰ سطحی تربیت دی جائے تاکہ وہ زرعی میدان کی جنگی بنیادوں پر کسانوں کی تربیت کر سکیں اور کسانوں کی زرعی پیداوار خصوصی سبزیوں کی پیداوار خصوصی سبزیوں کی پیداوار میں اضافے کے لئے ان کی مدد کر سکیں۔

دھان کے کاشتکاروں کی علمی و عملی تربیت میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا کردار

پی ایچ ڈی۔ کارل: عمیر طالب نگران: انجنا اشرف شعبہ: ایگریکیشن اینڈ رورل ڈویلپمنٹ

دھان کی فصل دنیا میں گندم اور مکئی کے بعد کاشت کی جانے والی سب سے بڑی غذائی جنس ہے۔ دنیا کی دو تہائی پسماندہ آبادی برائے علم ایشیاء میں رہتی ہے اور اپنی روزمرہ کی 80 فیصد غذائی انرجی کے لئے دھان پر انحصار کیے ہوئے ہے۔ چاول کی فصل عالمی طور پر 21 اور 15 فیصد فی کس غذائی انرجی اور پروٹین مہیا کر رہی ہے۔ یہ غذائی انرجی 1527kj/100g، پروٹین 7.9g/100g کے علاوہ پوٹاشیم، کلسیم، فاسفورس، آئرن اور زنک کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں آمینو ایسڈز اور وٹامنز کی اضافی خوبیاں بھی موجود ہیں جو انسان کو بیماریوں خصوصاً عورتوں کو بچوں کی پیدائش اور ان کو دودھ پلانے کے دورانیے میں جسمانی کمزوریوں کی خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ اپنے آئرن اجزاء کی وجہ سے Anemic Diseases کو کنٹرول کرنے میں بھی کافی کارآمد ہے۔ پاکستان کی زینی اور موسمیاتی conditions انتہائی سازگار ہونے کی وجہ سے موسم خریف میں ہر کل رقبے کا 52 فیصد کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی عالمی تجارت میں پاکستان کا 25 فیصد حصہ ہے۔ اس کا ملکی معیشت میں سالانہ 1.3-1.6 فیصد اور زرعی اجناس کی Value addition میں 6.7 فیصد حصہ ہوتا ہے۔ یہ ملکی آبادی کے 9 فیصد لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتی ہے۔ پاکستان چاول کی پیداوار میں چین، انڈیا اور انڈونیشیا کے بعد دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ چاول پاکستان کی کپاس کے بعد دوسری بڑی برآمد کی جانے والی غذائی جنس ہے۔ چاول کی سالانہ برآمد سے پاکستان تقریباً 13 فیصد بیرونی زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ پاکستان سالانہ تقریباً 6 ملین ٹن چاول پیدا کرتا ہے جس میں سے 2 ملین ٹن ملکی غذائی ضروریات کے لئے اور باقی 4 ملین ٹن برآمد کر دیا جاتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے نتیجے میں دیکھا گیا ہے کہ:

عام طور پر دھان کے کاشتکار بوڑھے، کم پڑھے لکھے اور چھوٹے درجے کے زمیندار ہیں۔ انکی جدید زرعی ٹیکنالوجی کے بارے میں استعداد نہ ہونے کے برابر ہے جسکی وجہ سے انکا منافع بھی عالمی شرح سے بہت کم ہے۔ ان نتائج کی روشنی میں تحقیقاتی اداروں کے مطابق پاکستان میں دھان کے کاشتکاروں میں قدامت پسندوں (Laggards) اور دیر سے کا اختیار کرنے والوں کی اکثریت (Late majority) ہے۔ کاشتکاروں کو موزوں اقسام، پمپری کی کاشت، دھان کی پیداواری اور حفاظتی ٹیکنالوجیز کی جانچکاری بھی بہت کم ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ انکی جدید زراعت کی استعداد کار نچلے درجے کی ہے۔ اس سے ماخوذ ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری زرعی توسیعی اداروں کی کارکردگی متعین کردہ مقاصد کے مطابق نہیں ہے۔ دونوں توسیعی ادارے کسانوں کو دھان کی موزوں اقسام کے بہتر چناؤ سے لیکر اسکی کٹائی تک کے تمام مراحل کے بارے میں آگاہی نہیں دیتے بلکہ کچھ خاص مراحل پر ہی زور دیتے ہیں جبکہ تعلق انکی نوکری اور تربیت سے ہوتا یا انکی اس میں مہارت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سرکاری ملازمین زیادہ تر فصل اور زمین کی مینٹننس پر، Pesticide Companies کے ملازمین فصل کی حفاظتی تدابیر اور Seed Companies بیج کی صحت اور چناؤ اور Fertilizer Companies زمین کی قوت اور ذخیرہ پر دیتے ہیں۔ دونوں توسیعی ادارے جدید زرعی توسیعی طریقوں کے استعمال میں بھی اتنے موزوں اور کارآمد نہیں جتنا کہ انکو ہونا چاہیے۔ پس ثابت ہوا کہ اداروں کے ملازمین کی Communicational اور Developmental استعداد ہی کم ہے جسے بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ کسان دونوں اداروں کی زرعی توسیعی سرگرمیوں سے ناخوش ہے جبکہ مطلب ہے موجودہ ملکی زرعی توسیعی نظام بہتر بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

سفارشات

کسان کیونکہ عام طور پر کم پڑھے لکھے اور چھوٹے درجے کے کسان ہیں اس لئے حکومت کو چاہیے کہ زراعت کو میٹرک تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائے تاکہ جو بچے تعلیم ادھوری چھوڑ کر کھیتی باڑی سے منسلک ہو جاتے ہیں انکو بھی جدید زرعی ٹیکنالوجیز کے استعمال کا احاطہ ہو سکے اور وہ چھوٹے درجے پر رہے کہ انکی منافع بخش کھیتی باڑی کر سکیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری زرعی توسیعی ملازمین کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے انکو زرعی توسیعی امور کے علاوہ کہیں دوسری جگہ مستقل یا عارضی طور پر بھی تعینات نہ کیا جائے تاکہ وہ پوری دلجوئی اور لگن کے ساتھ زرعی توسیعی امور سرانجام دے سکیں۔ کسانوں کی اس شکایت کہ سرکاری اور غیر سرکاری زرعی توسیعی ملازمین صرف مخصوص مراحل پر ہی زور دیتے ہیں کا ازالہ کرنے کے لیے دونوں اداروں کو چاہیے کہ اپنے اپنے ملازمین کو نوکری کے دوران تربیت کے ذریعے جدید زرعی تحقیقات سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ کسانوں کو کاشتکاری کا موقع ہی نہ ملے۔ جدید زرعی توسیعی طریقوں کے استعمال میں انتہائی معمولی نوعیت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے HEC کو چاہیے کہ Communication & Development کے ذریعہ کورسز B.sc(Hons).Agri. Sciences کے نصاب میں شامل کریں جو کہ کسی بھی ادارے میں زراعت آفیسر کی کم سے کم تعلیمی قابلیت ہے تاکہ وہ اپنی خدمات بہتر سرانجام دے سکیں۔ دونوں اداروں کو نوکری کے دوران بھی ملازمین کی استعداد کار کو بڑھانے کے لئے ٹریننگز کرواتے رہنا چاہیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ موجودہ زرعی توسیعی نظام کو بہتر بنائیں جس سے زراعت کا پیش منافع بخش بنے گا، بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا اور ملکی معیشت درست سمت میں آگے بڑھائے گی جس سے پاکستان بھی زرعی خوشحالی والے ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔

پنجاب کے مختلف حیاتیاتی علاقوں میں ڈیٹیکٹی میچر کے تدارک کے لئے استعمال ہونے والی ادویات کا آپس میں موازنہ

پی ایچ ڈی۔ کارل: محمد عرفان اکرم نگران: ڈاکٹر ویم اکرم شعبہ: حشریات

نقصان دہ کیڑوں کے تدارک کے لئے پوری دنیا میں مختلف کیمیائی دواؤں کا استعمال عرصہ دراز سے کام آ رہا ہے۔ دوسرے کیڑوں کی نسبت چھروں کی افزائش ایسی چھوٹی اور تنگ جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی بھی کیمیائی دوائی کا استعمال نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ انسانی جانوں کے لئے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی جگہوں پر چھروں کی افزائش تیز ہو جاتی ہے اور انکی آبادی میں ناقابل برداشت اضافہ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت سے نمٹنے کے لئے نامیاتی فاسفیٹ کے مرکبات یعنی آرگنوفسفات (Organophosphate) اور پائیریتھرائیڈز (Pyrethroids) کیمیائی مرکبات کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ڈیٹیکٹی میچر کی وجہ سے ہونے والے نقصانات نے حکومت اور شہریوں کو نا صرف پریشان کر دیا بلکہ اس کے تدارک کیلئے ہر ممکن کوشش بھی کی گئی۔ حکومت پنجاب کے ڈیٹیکٹی کنٹرول پروگرام میں مشہور زمانہ کیڑوں کو مارنے والی دوا ڈیلٹامیٹھرین کا استعمال زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ ڈیلٹامیٹھرین کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا ناقص مشینز اور تکنیکی کمزوریوں کی وجہ سے چھروں میں اس زہر کے خلاف مدافعت دیکھنے میں آئی ہے جس کے نتیجے میں بے تحاشا ڈیلٹامیٹھرین کے استعمال کے باوجود چھروں کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا جس طرح سے وہ عمومی طور پر ہوتے ہیں۔ دریں اثناء اتنی زیادہ مقدار میں زہر کا استعمال عالمی ادارہ برائے صحت (WHO) کے وضع کردہ قوانین کے بھی منافی ہے۔ موجودہ تحقیق پنجاب کے مختلف علاقوں میں استعمال ہونے والے میچرکش زہروں کا آپس میں

موازنہ کرنے کے لئے کی گئی۔ اس تحقیق میں پنجاب کے تین اضلاع جن میں لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی شامل تھے، سے نمونے لینے گئے اور ان پر تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق میں تمام زیر بحث علاقوں کا موسمیاتی ڈیٹا بھی لیا گیا اور اس کا موازنہ ایک دوسرے کیساتھ ڈیٹا کی گنجائش کے پیش نظر کیا گیا۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بارش میں اضافہ یا کمی سے ڈیٹا کی گنجائش پر مثبت اثر ہوا۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پائیری پروکسیفن (Pyriproxyfen) کو جب مچھر کے لاروؤں پر استعمال کیا گیا تو اس نے دوسری زہروں جیسا کہ (1G اور 50EC) کے مقابلے میں بہتر نتائج مہیا کئے۔ اس طرح جب بالغ مچھروں پر مختلف ادویات استعمال کی گئیں تو یہ چلا کہ ایلفا سائپھر مینتھرین (10% سی ایس ایس) نے باقی ادویات کے مقابلے میں بہتر طور پر مچھر کو مارنے میں مدد کی جبکہ اس دوڑ میں ایلفا سائپھر مینتھرین (10% سی ایس ایس) مچھروں کے تدارک میں دوسرے نمبر پر رہی۔ تاہم ڈیٹا مینتھرین (5% ڈیلیو پی) اس دوڑ میں تیسرے نمبر پر رہی۔ تاہم ان ادویات کے استعمال میں دوا کی مقدار ڈیٹا کی گنجائش پر مچھر کی عمر اور ڈیٹا کی گنجائش پر مچھر کی آبادی کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے اگر مذکورہ بالا زہروں کو مناسب مقدار کے ساتھ استعمال کیا جائے تو 90 فیصد سے زیادہ ڈیٹا کی گنجائش مچھر کو خاص طور پر اور عام مچھروں کو عام طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

مرغیوں کے فضلے سے کچھ میڈ ویکسلیک (Mesostigmatic) مائٹس کا شناختی/یکسا نوک مطالعہ

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد آصف قیوم نگران: ڈاکٹر بلال سعید خان شعبہ: حشرات

مائٹس (mites) خوردبینی جاندار ہیں جو کہ کیڑوں سے مماثلت رکھتے ہیں اور انہیں عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ مائٹس کیڑوں سے واضح طور پر الگ کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ کیڑوں کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن مائٹس کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ مائٹس میں حرکت کرنے کا ایک مختلف رویہ پایا جاتا ہے۔ جیسے فورٹیک روئے (Phoretic behavior) کہتے ہیں۔ فورٹیک روئے میں مائٹس پرندہ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کے لئے دوسرے جانداروں کے ساتھ چٹ جاتے ہیں۔ زیادہ تر فورٹیک روئے کیڑوں کے مدد سے طے پاتا ہے۔ مائٹس اور کس دوڑوں کو جانداروں کی درجہ بندی میں کلاس اریکینڈا (Arachnida) جبکہ مائٹس کو چھوٹی کلاس اکیری (Acari) میں رکھا گیا ہے۔ چھوٹی کلاس اکیری میں سے آرڈر میڈ ویکسلیک (Mesostigmata) سب سے زیادہ متنوع گروپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آرڈر میڈ ویکسلیک کے ارکان عمومی طور پر ہر قسم کے چھوٹے بڑے ماحول میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ سمندری پانی، تازہ پانی کے ذخیروں، مٹی، گلے مڑے پتوں اور جانوروں کی جلد کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے بیشتر ارکان شکاری روئے رکھتے ہیں جو کہ نرم جسم کے کیڑوں کے ساتھ ساتھ مائٹس کو بھی اپنی خوراک بناتے ہیں، جبکہ کچھ ارکان پولٹری پرندوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں جو کہ انسانوں میں بھی پھیلنے کا خدشا ہوتا ہے۔ اس تحقیق ریسرچ کے دوران مصنف نے ترکی کے صوبہ ساسمن اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے مرغیوں کے فضلے اکٹھے کئے، جن کو لیبارٹری مراحل سے گزرا کر آرڈر میڈ ویکسلیک کے ارکان کی شناخت کی گئی۔ مصنف نے تحقیق کے دوران آرڈر میڈ ویکسلیک کے پانچ خاندانوں (Uropodina، Ligamasellidae، Parasitidae، Dermanyssidae، Laelapidae، Macrochelidae) سے تعلق رکھنے والی مائٹس کی شناخت اور درجہ بندی کی ہے۔ پاکستان میں 1971ء جبکہ ترکی میں 1963ء اوپر والے خاندانوں کے پہلے رکن کی شناخت کی گئی تھی۔ اس تحقیق ریسرچ کے نتیجے میں شناخت کئے جانے والی مائٹس کے نمونے ترکی کی جامعہ انیس، ساسمن کے شعبہ تحفظ نباتات اور پاکستان کی جامعہ زریعہ، فیصل آباد کے شعبہ حشرات کی ایکالوجی ریسرچ لیبارٹریوں میں محفوظ کئے گئے ہیں، جبکہ کچھ مائٹس کے نمونے امریکہ کی جامعہ اوہائیو میں بھی جمع کئے گئے ہیں۔ ماضی میں پاکستان سے آٹھ ارکان کی نشاندہی Macrochelidae خاندان سے کی گئی جبکہ ترکی سے کل باسٹھ ارکان کی نشاندہی کی گئی تھی جن کی تفصیل درج ذیل ہے: سات، چھ، چار، چھبیس اور چھبیس جو کہ بالترتیب (Uropodina، Digamasellidae، Parasitidae، Laelapidae، Macrochelidae) خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ (Beaulieu et al. 2011) کی طرف سے نسل پرستی کی درجہ بندی مناسب پایا گیا اور اس تحقیق ریسرچ کو اس درجہ بندی کے مطابق لکھا گیا ہے۔ مصنف نے اس تحقیق ریسرچ کے نتیجے میں نئے ریکارڈز کے طور پر ترکی سے چھ اور پاکستان سے 14 جبکہ چھ نئے ارکان کی نشاندہی کی ہے جن میں سے تین نئے ریکارڈز کو دنیا کے مشہور سائنسی تحقیق کے شاروں شائع کیا جا چکا ہے۔ جغرافیائی معلومات (ستوں)، واضح تصاویر اور نئے درجے کے ساتھ ساتھ نئی پر جانہ کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے جو پاکستان اور ترکی سے متعلق ہر جنس کی نوعیت کو کلیدی شکل میں پیش کرتی ہے۔ ڈینڈروگرام موازنے کے نتیجے میں M. P. fimetorum، E. stabularis اور G. heartus n. sp. میں 100 فیصد مماثلت پائی جاتی ہے جبکہ Laelapidae اور infraorder Uropodina کے خاندانوں کی رکارڈ اندرونی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔

سم تھور زدہ علاقوں میں پائے جانے والے پودے آبی ڈیلے کی تھور کو برداشت کرنے کی زبردست صلاحیت

پی ایچ ڈی۔ کالر: مہوش نصیر نگران: منصور حمید شعبہ: نباتات

تھور زراعت کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق چالیس لاکھ مربع میٹر تھور کی وجہ سے ناقابل کاشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں آج کل تھور زدہ زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لئے بہت کوشش کی جارہی ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک موثر ذریعہ ان پودوں کی کاشت ہے جو کہ اپنے اندر تھور کو برداشت کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تھور کی شدت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور بالآخر زمین کو قابل کاشت بنایا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں بھی سم تھور ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ فصلوں کی پیداوار کو انتہائی حد تک کم کر کے معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لئے موجودہ تحقیق کے لئے آبی ڈیلے (Cyperus laevigatus) کا انتخاب کیا گیا جو کہ سم تھور زدہ علاقوں میں پایا جانے والا آبی پودا ہے۔ اس پودے کے اندرونی و بیرونی ساخت اور افعال کو جائزہ لیا گیا۔ آبی ڈیلے کی چھ مختلف اقسام پورے پنجاب سے اکٹھی کی گئیں اور انہیں ریسرچ ایریا میں لگایا گیا۔ یہ اقسام ساہیانوالہ، پکا آند، سرگودھا، ساٹنگھل، بکرکھا راور ڈومیلی سے لی گئیں۔ ساہیانوالہ، پکا آند اور ساٹنگھل تھور سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں۔ ان تمام اقسام کو تھور کے پانچ مختلف درجوں میں اگایا گیا اور ان کی ساخت و افعال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ اس تجربے سے ثابت ہوا کہ جو قسم پکا آند سے لی گئی تھی، اس میں تھور کو برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا گیا کہ پکا آند والی قسم سے تھور کو بہتر طور پر برداشت کیا۔ اس قسم نے اپنے اندر نمکیات کو ذخیرہ کیا اور پھر بھی ان کی نشوونما میں واضح کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آبی ڈیلے نہ صرف تھور کی انتہائی زیادتی کو برداشت کر سکتا ہے بلکہ زمین میں سے نمکیات کو نکالنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے تھور زدہ زمینوں میں کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے اور ان کو قابل کاشت بنایا جاسکتا ہے۔

سورج مکھی کو نمکیاتی دباؤ کا عادی بنانے میں ایلفا ٹوکوفیرول کے بیرونی استعمال کا کردار

پی ایچ ڈی۔ کالر: عرفانہ لالہ رخ نگران: ڈاکٹر محمد شہباز شعبہ: باغی

نمکیاتی دباؤ دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خوراک کی طلب اور فراہمی میں وقفہ بڑھاتا ہے۔ پودوں کی نشوونما کے ناظموں، سنگلنگ، الیکٹرونک، اور موپروٹیکٹینٹ اور نو انزائمیک اینٹی اوکسی ڈینٹنس خاص طور پر پراسیکوربک ایسڈ اور ایلفا ٹوکوفیرول کا بیرونی استعمال فصل میں نمکیاتی برداشت کو بڑھانے کے لئے ایک مختصر اور موثر حل ہے۔ وٹامن بنیادی بائیو لیگو لیٹرز ہیں اور ان کا قلیل مقدار میں استعمال پودوں کی نشوونما بہتر کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ جانچنے کے لئے کہ سورج مکھی میں نمکیاتی برداشت پیدا کرنے میں ایلفا ٹوکوفیرول نے کوئی فیصلہ کن کردار نبھایا ہے یا نہیں۔ زرعی

یونیورسٹی فیصل آباد کے یونیٹیکل گارڈن کے وائر ہاؤس میں گملوں میں دو علیحدہ علیحدہ تجربات کئے گئے۔ یہ تجربات مسلسل دوسالوں (2015-2016) میں فردری سے جون تک کئے گئے۔ پہلا تجربہ نمکیاتی اور غیر نمکیاتی حالات میں سورج مکھی پر ایلیفا ٹوکوفیرول کے ساتھ pre-sowing seed treatment کا اثر جانچنے کے لئے کیا گیا۔ یوب زرعی تحقیقاتی ادارہ، فیصل آباد، پاکستان کے آئل سیڈ تحقیقاتی ادارے سے سورج مکھی کی دو درانیوں (ایف ایچ - 572 اور ایف ایچ - 621) کے بیج حاصل کئے گئے۔ ان بیجوں کو پلاسٹک کے گملوں میں ریت میں بونے سے سولہ گھنٹے قبل ایلیفا ٹوکوفیرول کے چار لیولز میں بھگوایا گیا جو کہ کنٹرول (کشید کردہ پانی)، سو، دوسواو تین سو ملی گرام فی لیٹر ایلیفا ٹوکوفیرول پر مشتمل تھے۔ اس تجربے کے لئے سی آر ڈی ڈیزائن، چار نقلوں کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ بیج بونے کے پینتیس دن بعد پودوں کو جڑوں کے ذریعے دو نمکیاتی لیولز (0mM اور 120mM) سے Hoagland's nutrient solution کیساتھ دو ہفتوں کے وقفے سے تجربہ مکمل ہونے تک سیراب کیا جاتا رہا۔ دوسرے تجربے میں اوپر مذکورہ ایلیفا ٹوکوفیرول کے لیولز، سورج مکھی کے بیج بونے کے اگتیس دن بعد جب پودے Vegetative مرحلے میں تھے، پتوں پر سپرے کئے گئے۔ پتوں پر سپرے کے اکسیں دن بعد فعلیاتی اور کیمیائی صفات اور فصل پکنے پر پیداواری صفات کے اعداد و شمار اکٹھے کئے گئے۔ سیڈ پرائمنگ کے تجربے میں نمکیاتی دباؤ کے نفاذ کی وجہ سے تنے اور جڑ کے تازہ اور خشک وزن میں تنے کی لمبائی میں پتے میں پانی کے مواد میں SOD خرابی، فروکس، جڑیں پونا شیم کی مقدار، جڑیں پونا شیم اور سوڈیم کے تناسب اور تنے میں کلشیم کی مقدار میں واضح کمی آئی۔ جبکہ نمکیاتی دباؤ کی وجہ سے پتے کے turgor potential کمپنا یا، گلوتناقیون ریڈیکلائسر اور پروکسڈیز کے خامروں میں، حل پذیر چینی، پروٹین، امینو ایسڈز، تنے میں سوڈیم، تنے میں پونا شیم اور سوڈیم کے تناسب، تنے میں پونا شیم اور جڑیں پونا شیم کی مقدار میں واضح اضافہ ہوا۔ ایلیفا ٹوکوفیرول کے ساتھ seed priming کی وجہ سے تمام ساتھی صفات میں بشمول تنے اور جڑ کے تازہ خشک وزن اور تنے کی لمبائی میں بہتری ہوئی۔ ایلیفا ٹوکوفیرول کی وجہ سے ضیائی تالیف، stomatal، ایصایت، پانی کے استعمال کی کارکردگی، کمپنایز اور پروکسڈیز خامروں، پتے میں ایسکو ربک ایسڈ، فروکس، گلائسن پیٹین، امینو ایسڈز، حل پذیر نشاستہ، سو (100) بیجوں کے اور پودوں کے تمام بیجوں کے وزن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ایلیفا ٹوکوفیرول کے ساتھ پرائمنگ کی وجہ سے پتے میں MDA اور تنے میں سوڈیم کی مقدار میں واضح کمی ہوئی۔ دوسرے تجربے میں نمکیاتی دباؤ کی وجہ سے سورج مکھی کی دونوں درانیوں کے تنے اور جڑ کے تازہ اور خشک وزن اور تنے کی لمبائی میں واضح کمی ہوئی۔ نمکیاتی دباؤ کی وجہ سے پتے میں پانی کے فیصد مواد میں کلوروفیل اے اور بی کے تناسب، پودوں کے تمام بیجوں کے وزن اور سو (100) بیجوں کے وزن میں واضح کمی ہوئی۔ البتہ نمکیاتی دباؤ کی وجہ سے stomatal ایصایت کلوروفیل بی، کیروٹینائڈز، سپر آکسائیڈ ڈیسمیٹوز، گلوتناقیون ریڈیکلائزر، گلائسن پیٹین، پروٹین، حل پذیر لکھیات، امینو ایسڈز، جزا اور تنے میں سوڈیم، جڑیں پونا شیم اور سوڈیم کے تناسب اور جڑیں پونا شیم کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ پتوں پر ایلیفا ٹوکوفیرول کے سپرے سے تنے اور جڑ کے تازہ اور خشک وزن میں جڑا اور تنے کی لمبائی میں بہتری کے ساتھ ساتھ stomatal ایصایت سپر آکسائیڈ ڈیسمیٹوز، پروکسڈیز، گلوتناقیون ریڈیکلائزر، پروٹین، حل پذیر لکھیات اور نشاستہ، امینو ایسڈز، تنے میں کلشیم، تنے میں پونا شیم، تنے میں پونا شیم اور سوڈیم کے تناسب، جڑ کے کلشیم اور سو (100) بیجوں کے وزن میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سورج مکھی کی ورانٹی ایف ایچ - 621 نے نمکیاتی دباؤ بہتر کارکردگی دکھائی۔ نمکیاتی دباؤ کو کم کرنے میں seed priming کا طریقہ ایلیفا ٹوکوفیرول کے پتوں پر سپرے سے زیادہ موثر رہا۔ دوسواو تین سو ملی گرام فی لیٹر ایلیفا ٹوکوفیرول کی مقدار پودوں میں نمکیاتی دباؤ کو تخفیف کرنے میں زیادہ موثر رہی۔

سطح مرتفع پوٹھوہار کی گھاٹیوں پر سطح سمندر سے بلندی کے اثرات

نی ایچ ڈی سکالر: ثناء فاطمہ نگران: ڈاکٹر فاروق احمد شعبہ: نباتیات

عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کو جانچنے کے لیے پہاڑی سلسلے ایک بہترین ذریعہ ہیں، کیونکہ ان میں تھوڑے فاصلے پر بڑی موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ موجودہ تحقیق کے لیے پٹھو ہار کا علاقہ منتخب کیا گیا جو کہ اپنی طرز کے منفرد مقام کا حامل ہے۔ پٹھو ہار کا پہاڑی سلسلہ آج سے تقریباً پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے معرض وجود میں آیا۔ پٹھو ہار میں پائے جانے والے جنگلات زیادہ تر جھاڑی نما پودوں پر مشتمل ہیں، جن میں گھاس کی بہت سی اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں مختلف قسم کے نباتات بکثرت پائے جاتے ہیں جن میں سے بہت سے نادر ہیں اور صرف انہیں علاقوں میں ہی ملتے ہیں۔ پٹھو ہار کے علاقے میں جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جائیں تو ہمیں پودوں کی مختلف انواع میں بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ موجودہ تحقیق میں اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ گھاس کی مختلف اقسام میں بلندی کی وجہ سے ان کی ساخت و افعال میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر ہم حیاتیاتی تنوع کے بارے میں موثر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے نباتاتی وسائل کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ موجودہ تحقیق میں ہم نے گھاس کی چھ مختلف اقسام کو میسرور بلندی کے فرق سے منتخب کیا اور ان سب اقسام میں بلندی کی وجہ سے وقوع پذیر ہونے والی ان کی ساختی اور افعالی تبدیلیوں کا تفصیلاً جائزہ لیا گیا ہے۔ ان چھ اقسام میں کھیل گھاس، لمبز گھاس، پلوان گھاس، کھوی گھاس، چٹا گھاس اور لیس گھاس شامل ہیں۔ گھاس کی یہ تمام اقسام جو کہ زیادہ بلندی پر آگ رہے تھے اپنے قد و قامت کے لحاظ سے کم بلندی پر آگئے والے پودوں سے بہت چھوٹے تھے۔ اس کے علاوہ ان تمام اقسام کے پودوں کی اندرونی ساخت میں بھی واضح تبدیلی واقع ہوئی اور یہ تبدیلی ان گھاس کی اقسام کو انتہائی ناموافق حالات میں بھی ان کی بقاء کا سبب بنتی ہے۔ لمبز گھاس میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ اہم ان کے پتوں کی چوڑائی، پتے پر پائے جانے والے بالوں کی تعداد، اور دیگر بافتنی تبدیلیاں ہیں۔ کھیل گھاس تمام پٹھو ہار میں بکثرت پائی جاتی ہے اور اس میں بھی بہت واضح ساختی تبدیلیاں مشاہدہ کی گئیں۔ اس گھاس میں بانفوں کے درمیان وافر خلاء تھی، کچھ لمبز بانفوں کے غلیوں میں ٹوٹ چھوٹ نظر آتی۔ لیس گھاس اپنے قد و قامت کے لحاظ سے سب سے بڑی تھم کی طرح ہے گھاس کم بلندی پر زیادہ گھنی تھی۔ اس کے برعکس چٹا گھاس کے پودوں کی بہت زیادہ بلندی پر تھی۔ موجودہ تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پٹھو ہار میں پائی جانے والے گھاسوں میں ہر نامناسب ماحول کے خلاف زبردست قوت مدافعت ہے، اور اس خصوصیت کی بنیاد پر ان گھاسوں کو خشک و نیم خشک زمینوں پر با آسانی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ ان سے نہ صرف گھریلو میویشی بلکہ جنگلی جانور بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹھو ہار سے ملتے جلتے علاقوں پر ان گھاسوں کی کاشت سے بہت فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نیز ان گھاسوں میں پائے جانے والے مفید جینز (Genes) سے دوسری فصلوں کے جینز میں بہتری کی جاسکتی ہے جس سے ان کی قوت مدافعت اور ان کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

ہیماٹائٹس سی کے دائمی مریضوں میں سرطان جگر کے خطرات، وجوہات اور احتیاطی تدابیر و علاج

نی ایچ ڈی سکالر: محمد احمد شاہ نگران: افتخار حسین شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف مائیکرو بالوجی

جگر کا سرطان انسانی صحت کا بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ پائے جانے والے کینسر میں پانچویں نمبر پر ہے اور کینسر سے ہونے والی اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ ہر سال تقریباً سات لاکھ پچاس ہزار افراد اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور تقریباً تین ہی لوگ اسکی وجہ سے جان ہو جاتے ہیں جگر کے سرطان کی کئی وجوہات ہیں لیکن دنیا میں ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرس سب سے بڑی وجہ ہیں جچین اور افریقی ممالک میں ہیپاٹائٹس بی، پاکستان اور دیگر ممالک میں ہیپاٹائٹس سی اس کا بنیادی سبب ہیں۔ دنیا میں پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرس جگر کے سرطان کا ذمہ دار ہے۔ ہیپاٹائٹس سی وائرس اس کینسر کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ دنیا میں 17 کروڑ سے زیادہ افراد انکی ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی انسانی ڈی این اے میں داخل ہو کر کینسر پیدا کرتا ہے اسکے برعکس ہیپاٹائٹس سی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ اس وائرس کی افزائش خلیہ کے مرکزہ کے باہر ہوتی۔ اس لئے سی وائرس سے منسلک سرطان کی پیدائش کا متبادل طریقہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس میں جگر کی سوزش اور سی وائرس کی ریڈیویشن مثلاً کورائبرا این ایس 3 بہت اہم کردار ادا

کرتی ہیں۔ سی وائرس کے جسم میں داخل ہوتے ہی انسان کا قدرتی مدافعتی نظام وائرس کو ختم کرنے کیلئے حرکت میں آجاتا ہے تاہم اکثر اوقات سی وائرس مدافعتی نظام سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ وائرس کی بیرونی ساختہ اجزاء میں تبدیلی ہے۔ جن کی وجہ سے جسم کے مدافعتی مادے (اینٹی باڈیز) غیر موثر ہو جاتے ہیں اور دائمی ہپاٹائٹس سی لاحق ہو جاتی ہے۔ انٹیک انیمل پر ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ جن چوہوں میں کورائبرائن ایس 3 جین ڈالے گئے تھے ان چوہوں میں سرطان کی شرح نارمل جین والے چوہوں سے زیادہ تھی۔ ان تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہپاٹائٹس سی وائرس کی پروفیٹ براہ راست کارسینوجینک ہیں۔ جسم کے مدافعتی نظام میں سفید خلیات اور کچھ دوسرے خلیات کے اندر اور بیرونی سطح پر ایسے حیاتی حصے (ریسپیکٹر) موجود ہوتے ہیں جو وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹ اور فنجائی کے اجزاء کو پہچان سکتے ہیں انہیں پی آر آر کہتے ہیں ان میں ٹال لائیک ریسیپٹر بھی شامل ہیں ٹال ریسیپٹر زسب سے پہلے فروٹ فلائی میں دریافت ہوئے۔ فروٹ فلائی کے کچھ نوزائیدہ بچوں میں ایک پیدائشی نقص پایا گیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ فروٹ فلائی کے ڈی این اے کے ٹال جین میں تغیر اس کا سبب ہے۔ یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ نقص زدہ نوزائیدہ کلیات صحت مند نوزائیدہ کلیوں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدگی کا شکار ہوتی ہیں۔ مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ ٹال جین ایک اینٹی بائیونک ڈروسو مائین پیداکرتا جو کھپوچھوندی کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس دریافت کے بعد انسانوں میں ان کی موجودگی کے بارے میں تحقیقات شروع ہوئیں اور انسانوں میں بھی ٹال کے مماثل ریسیپٹر کی موجودگی کا علم ہوا۔ اسلئے انہیں ٹال لائیک ریسیپٹر کہتے ہیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ٹال لائیک ریسیپٹر انسانوں میں نازف قدرتی مدافعتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ڈیپٹڈ مدافعتی نظام کو متحرک کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب تک انسانوں میں دس ٹال لائیک ریسیپٹر ز دریافت ہو چکے ہیں ان میں سے ٹال لائیک ریسیپٹر 2 بہت اہم ہے یہ وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹس اور فنجائی کے مالکیولز کو شناخت کر سکتا ہے۔ ٹال لائیک ریسیپٹر کے لئے حرکت کا کام کرتے ہیں۔ ٹال لائیک ریسیپٹر کے بعد خلیہ کے اندر مالکیولز کو متحرک کرتے ہیں جو آخر کار خلیہ کے مرکزہ میں ہیں موجود جیز کو متحرک کتے ہیں جو کئی قسم کے سائٹو کائین مالکیولز پیدا کرتے ہیں جن میں سوزش پیدا کرنے والے سائٹو کائینز، انٹرفیرنوز اور کیمو کائینز شامل ہیں۔ اس طرح مدافعتی نظام وائرس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اکثر اوقات یہ کوشش بار آور ثابت نہیں ہوتی اور دائمی سوزش وجود میں آتی ہے جو جگر کے خلیات کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اس دوران ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو نئے خلیات بننے کے عمل کو تیز کرتے ہیں خلیات کی مسلسل تباہی اور ساخت کا عمل فائبرسٹک نمو کا باعث بنتا ہے جو آخر کار جگر کے سکرے کا باعث بنتا ہے جسے سرورس کہتے ہیں سرورس جگر کے کینسر کیلئے موزوں سرورس مین مہیا کرتا ہے تقریباً 90 فیصد جگر کے کینسر سرورس کے پس منظر میں وجود میں آتے ہیں سوزش ہمارے مدافعتی نظام کا اہم جزو ہے سوزش کے نتیجے میں ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو جراثیم کو تباہ کرتے ہیں تاہم یہ مادے ڈی این اے کو نقصان پہنچانے کا سبب بھی بنتے ہیں یہ نقصان جیز میں تغیر یا میٹیشنز پیدا کرتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تغیرات جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ سرطان کی صورت میں رونما ہوتا ہے سو سال سے زائد عرصہ پہلے ایک محقق درکو نے سوزش کو سرطان کی بنیاد کا نظریہ پیش کیا تھا لیکن اس نظریہ کو مسترد کر دیا گیا تاہم جدید ٹیکنالوجی نے اب اس کی تصدیق کر دی ہے اب خیال کیا جاتا ہے کہ 25 فیصد انسانی کینسرز کی بنیادی وجہ سوزش ہے اس کا ثبوت ان تحقیقات سے ملا ہے جو دائمی سوزش کے مریضوں پر کی گئیں جن کے مطابق سوزش کو کم کرنے والی ادویات کے استعمال سے سرطان کی شرح میں کمی واقع ہوئی۔ ڈی این اے میں قدرتی رونما ہونے والے تغیرات سے ہونے والی تبدیلی کو پو لیمافریم کہتے ہیں اگر یہ تبدیلی ایک ڈی این اے میں ایسے کی وجہ سے رونما ہوئی ہو تو اسے سنگل نیگلٹو ٹائڈ پو لیمافریم کہتے ہیں یہ قدرتی تبدیلی انسانی ڈی این اے میں اتنے سے ملتی ہے کہ سبب بنتی ہے۔ وراثتی مادے میں یہ تغیرات مختلف لوگوں جراثیم اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں کمی پیش پر مبنی ہوتی ہے نتیجتاً ایس این پیز کی موجودگی بیماریوں بشمول کینسرز کے امکانات میں اضافہ یا کمی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جدید تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ بیماریوں میں بعض ایس این پیز کی موجودگی کینسرز کے خدشات میں اضافہ کا موجب بن سکتی ہے معدے اور پرائیٹ کے سرطان پر تحقیق سے بھی یہ علم ہوا ہے کہ بعض ایس این پیز کی موجودگی میں کینسرز کے خطرات میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ معدے اور پرائیٹ کے سرطان کے مطالعے میں ٹی ایل آر کی اہمیت مزید نمایاں ہوئی ہے۔ دونوں قسم کے سرطان میں مزمن سوزش کینسر کا بنیادی سبب ہے۔ اس کے علاوہ اندامی میں پتے اور خواتین کے جنسی اعضاء پر تحقیق سے بھی ایس این پیز اور سرطان کے اضافی خطرات کا ثبوت ملا ہے۔ مزید تحقیقات سے علم ہوا کہ ایس این پیز کی موجودگی میں پتے، معدے، چہان اور نائندہ جنسی عضورس کے سرطان کے واقعہ ہونے کا اندیشہ قابل ذکر حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس حذف/ادخال جینیاتی تغیر کی موجودگی میں مختلف قسم کے سرطان کے شدید خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے موجودہ تحقیق کی منصوبہ بندی کی گئی۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ ایس این پیز کی حذف بہرہ و پتہ کی موجودگی، دائمی ہپاٹائٹس سی کے مریضوں میں جگر کے سرطان کے خطرات میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہپاٹائٹس سی کی جینیوٹائپ 3 کی موجودگی جگر کے سرطان کے خطرات کو مدید بڑھا دیتی ہے۔ سرطان جگر کا علاج مہنگا اور غیر موثر ہے اور علاج کے باوجود اوسط زندگی کی شرح ایک سال سے کم ہے۔ کیونکہ سی وائرس سے متاثرہ تمام لوگوں کو کینسر نہیں ہوتا لہذا ایسے مریض جن میں کینسر کا اندیشہ زیادہ ہوان کی تلاش اور بروقت علاج انہیں کینسر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حال ہی میں ہپاٹائٹس کی نئی ادویات مارکیٹ میں آئی ہیں جس سے اس بیماری کے علاج میں پیشرفت ہوئی ہے۔ تاہم ہپاٹائٹس سی وائرس کی موثر ویکسین کی غیر موجودگی میں سی وائرس کی بیماری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں (سرورس و سرطان) مزید کمی کی دہائیوں تک سامنے آتی رہیں گی۔ لہذا ایسے بائیو مارکر کی ضرورت باقی ہے جو ان مریضوں کا پتا چلائے میں مدد دے سکیں جن میں کینسر کا خطرہ زیادہ ہو۔ موجودہ تحقیق ایسے افراد کی تلاش میں مددگار ہو سکتی ہے جن میں کینسر کا زیادہ خطرہ ہو۔ پس ایسے افراد جو حذف بہرہ و پتہ اور ہپاٹائٹس سی کی جینیوٹائپ 3 سے متاثر ہوں ان میں سرطان جگر کے خطرات زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور انہیں ترجیحی علاج کی ضرورت ہے۔

نورپورٹھل میں کراچی زمینوں پر سفیدے کی کاشت

پی ایچ ڈی۔ کارل: شازیہ افضل نگران: ڈاکٹر محمد فرخ نواز شعبہ: فارمیری

فارمی شجرکاری کا دانشمندانہ استعمال غربت کو کم کرنے اور کسانوں کی ماہانہ آمدن کے اضافے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فارمی شجرکاری کے طریقوں میں حالیہ پیش رفت، کاشتکاروں کی بروقتی ہوئی آگاہی اور ایندھن کی کمزوری میں بے تحاشہ اضافے نے کسانوں کو فارمی شجرکاری کی خوب تر تیب دی ہے۔ مثال کے طور پر ضلع خوشاب کے علاقے نورپورٹھل میں کراچی اور ریتیلی زمینوں کے مالک کاشتکاروں نے چنے کی کاشت کو چھوڑ سفیدے کو کاشت کرنا شروع کر دیا ہے۔ بارانی اور ریتیلے علاقے کی زمین کے استعمال میں اس تبدیلی کی وجہ سے بہت سا ماحولیاتی اور اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جن کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ تاکہ اس علاقے کے لئے سفیدے کی کاشت کی اہمیت کو جانچا جاسکے۔ فارمی شجرکاری کا کردار اور کسانوں کے معاشی و اقتصادی حالات کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لئے ایک منظم سوالنامہ تیار کیا گیا۔ تفصیلی چانچ پڑتال کے بعد یہ پتہ چلا کہ سوالنامے کا جواب دینے والے زیادہ تر کسانوں کی عمر 30 سے 50 سال تھی اور وہ پچاس ایکڑ سے کم زمین کے مالک ہے۔ 59 فیصد کسانوں کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ اور ان کا اہم ذریعہ معاش زراعت سے منسلک تھا۔ جائزہ لئے گئے رقبے میں سب سے زیادہ فی ایکڑ درخت سفیدے کے تھے۔ جس کے بعد پھرواں کے درخت موجود تھے۔ جبکہ دوسرے درخت مثال کے طور پر شیشم، شرش اور کیکر کے درخت بہت کم تعداد میں تھے جائزہ کے نتیجے میں بتا ہے کہ زیادہ تر کسان چھوٹے پودے فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کی سرکاری نرسیوں سے یا اپنے علاقے کی پرائیویٹ نرسیوں سے حاصل کرتے تھے۔ اور کسانوں کی زیادہ تر تعداد کا سفیدے اور پھرواں کے درخت لگانے کا مقصد آمدن میں اضافہ تھا۔ پچھلے پانچ سالوں میں کسانوں نے سب سے زیادہ پودے سفیدے کے لگائے اور پھر اس کے بعد پھرواں (فرش) کے درخت کو پسند کیا گیا۔ اس علاقے کے کسان درختوں کی چار اقسام کو ایندھن کی کمزوری کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جن میں بالترتیب سفیدہ کیکر، شیشم اور فرش شامل ہیں۔ پچھلے پانچ سالوں میں سب سے زیادہ کمزوری سفیدے کی پتی گئی

جسکے بعد فراش اور بیر کی نمبر آتا ہے۔ اس علاقے کے کسان درختوں کے ماحولیات پر مثبت اثرات سے باخوئی واقف تھے۔ ان کے خیال میں درخت ہمارے زندہ رہنے کے لئے آکسیجن مہیا کرتے ہیں، ریت والے جگہروں میں کی کرتے ہیں۔ آندھیوں کی رفتار کو کم کرتے ہیں، آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ توانائی کے بچاؤ اور زمین زرعی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ جائزے کے مطابق خواہدہ اس بات سے بکثرت اتفاق رائے کرتے ہیں کہ درختوں کی مانگ میں اضافہ آمدن میں کمی انتظامی امور میں غفلت، استحصال میں زیادتی اور آبادی میں اضافہ کٹاؤ اور زوال کے اہم اسباب ہیں۔ مزید برآں آگاہی میں کمی اور موزوں تربیت کی عدم موجودگی فارمی شجرکاری کے اضافے میں اہم رکاوٹیں ہیں۔ خواہدہ کاشتکاروں کی کثرت نے اس بات کا اقرار کیا کہ فارمی شجرکاری ان کی آمدن میں اضافہ کرتی ہے۔ 63.50 فیصد کسانوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ درخت ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں۔ خرچہ اور آمدن کے موازنے سے پتہ چلا کہ پانچ سالوں کے بعد کسان سفیدے کی کاشت سے 3,34,868 روپے فی ایکڑ جبکہ چنے کی کاشت سے 24,500 روپے فی ایکڑ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔

نور پور تھل کے علاقے میں فارمی شجرکاری مختصراً تین طرح کے فوائد فراہم کر رہی ہے۔

1۔ کسان درختوں سے چارہ اور نمایاں کھادوں کی صورت میں براہ راست فائدہ لے رہے ہیں۔

2۔ درخت زمین کی کٹاؤ کی روک تھام، سایہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنے وغیرہ کی خدمات سے اس علاقے میں ماحولیاتی فوائد فراہم کر رہے ہیں۔

3۔ ایندھن کی لکڑی، عمارتی لکڑی اور دوسری بغیر لکڑی کی اشیاء جیسے شہد اور خشک پتے وغیرہ جیسی بیچنے والی چیزوں سے اس علاقے کو اقتصادی اور معاشی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سفیدے کا خراب زمینوں پر فارمی شجرکاری میں استعمال، نور پور تھل جیسے علاقے میں زمین کی بہتری اور غربت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

مالکیو لکر کیسٹرائیشن، ڈرگ ریسٹنٹس پیٹرن آف مائیکروبیکٹیریم بوس اینڈ انیکوبیکٹیریم ٹیڈرکلوکس اینڈ جینیٹک سسٹمیٹکس اینڈ ٹیننگ ان انٹیمپلر اینڈ ہیومنز

پی ایچ ڈی سکالر: صہیب اسلم نگران: ڈاکٹر محمد طارق جاوید شعبہ پتھالوجی، کلیہ بریطاری

ٹی بی (تپ دق) ایک بہت ہی پرانی بیماری ہے جو ہر صدمہ دراز سے انسان کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ اس بیماری کی وجہ ایک جراثیم ہے جس کو مائیکوبیکٹیریم کہا جاتا ہے۔ اس جراثیم کی ساخت ایک چھڑی کی مانند ہوتی ہے۔ اس بیماری کے جراثیم تقریباً تمام قسم کے گرم خون والے جانوروں بشمول انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو جراثیم کی قسم انسان اور جانوروں میں تپ دق کرتی ہے ان کا تعلق جینیاتی طور پر ایک بہت ہی ملتے جلتے گروپ کے ساتھ ہوتا ہے جس کو عرف عام میں مائیکوبیکٹیریم ٹیڈرکلوکس کمپلیکس آرگن ازم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بیماری سانس کے ذریعہ منتقل ہوتی ہے تاہم یہ کچھ دودھ اور گوشت کے ذریعہ بھی انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے اس طرح کے منتقلی کو حیوانی منتقل بیماری کہا جاتا ہے۔ حیوانی منتقل بیماری کو انسانوں میں عام طرح کے ٹیسٹوں کے ذریعہ تشخیص نہیں کیا جاسکتا، اس کے لئے خاص قسم کے جینیاتی بنیادوں پر جدید طریقہ کار بننے گئے ہیں جن کو سپولیگونا ٹینگ کہا جاتا ہے۔ درج بالا تجرباتی سٹڈی بیک وقت انسانوں اور جانوروں میں سے کچھ مخصوص گروپوں پر کی گئی۔ فیصل آباد کی دو بڑی بھینس اور گائے کالونیاں اور دو بری فارم منتخب کئے گئے، جبکہ انسانوں کا مطالعہ مختلف ٹی بی ہسپتالوں اور لیبارٹریوں پر کیا گیا۔ ان دونوں میں بیماری کی مقدار اور اس کی منتقلی کے طریقہ کار پر معلومات حاصل کی گئی۔ مختلف کالونیوں اور فارموں پر بیماری کی مختلف شرح ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی طور پر دو کالونیوں میں 56-10 فیصد جبکہ فارموں پر 72-15 فیصد شرح بیماری ریکارڈ کی گئی۔ بھینسوں میں شرح بیماری گائیکوں کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ بڑی عمر کے جانور زیادہ بیمار تھے اور شرح بیماری زیادہ دودھ دینے والے جانوروں میں بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ لاجسٹک ریگریشن کے مطابق ثابت ہوا کہ جانوروں کی عمر جسمانی وزن اور دودھ دینے کی کیفیت کا ٹیکلیٹ ٹیسٹ مثبت آنے کا بالواسطہ تعلق تھا۔ جراثیم رکنے کا عمل زیادہ ہنسٹو جبکہ ٹیکلیٹ ٹیسٹ کا عمل زیادہ سپسٹک ثابت ہوا۔ فیصل آباد کے سب سے بڑے منڈ خانے میں ذبح ہونے والے جانوروں کے جسمانی اعضاء کی تپ دق کے زخموں کی جانچ پڑتال کے لئے معائنہ کیا گیا جس میں 200 گائیکوں اور 200 بھینسوں کے اعضاء دیکھے گئے جس میں سے بھینسوں میں زیادہ جبکہ گائیکوں میں کم شرح بیماری ریکارڈ کی گئی۔ جراثیموں کا زیادہ اجتماع پھیپھڑوں، جگر اور ملحقہ علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا۔ ندرست اور بیمار جانوروں کے درمیان خون کے سرخ اور سفید خلیات کی تعداد میں فرق کا اندازہ لگایا گیا جس میں سفید خلیات لمفوسائٹ، مانوسائٹ کی قابل ذکر تعداد بیمار جانوروں میں زیادہ پائی گئی جبکہ ہیملوگوبن بیمار جانوروں میں زیادہ تعداد میں پائی گئی۔ انسانوں کے اندر ایک کثیر تعداد میں بیمار کے جراثیم برآمد کئے گئے۔ مردوں میں عورتوں کی نسبت گیارہ فیصد زیادہ بیماری خطرہ ریکارڈ کیا گیا۔ جبکہ سولہ سے تیس سال کی عمر کے زیدہ لوگ بیماری میں مبتلا نظر آئے۔ جن لوگوں میں بیماری کا مطالعہ کیا گیا ان میں سے انسانوں کے اندر جانوروں کا مخصوص کردہ تپ دق کا جراثیم ان لوگوں میں عام نظر آیا جو کہ بالواسطہ طور پر جانوروں کی دیکھ بھال اور دودھ وغیرہ دھونے میں مصروف رہتے تھے۔ غیر پھیپھڑوں کی نسبت پھیپھڑوں کی ٹی بی زیادہ نظر آئی۔ 46 فیصد سے زیادہ لوگوں سے کلچر میں زندہ جراثیم حاصل کئے گئے۔ جن کو بعد میں جدید جینیاتی طریق کار کے مطابق جانچا گیا۔ بیک وقت جانوروں اور انسانوں کے جراثیم کے جینیاتی خدوخال جاننے کے لئے پہلی دفعہ پاکستان میں سپولیگونا ٹینگ کا استعمال کیا گیا جس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ 210 آسٹریٹس کو استعمال کیا گیا جس میں سے 51 مختلف الاقسام سٹریٹز کی اقسام دریافت کی گئی جن میں سے 39 اقسام کو پاکستان میں پہلی دفعہ دریافت کیا گیا جبکہ 12 وہ سٹریٹز تھیں جن کو پہلے سے دنیا کے مختلف حصوں میں دریافت کیا جا چکا تھا۔ معلوم سٹریٹز میں سے سب سے زیادہ کمیونسٹریٹز ایٹیا سٹریٹز کے معلوم ہوئے جس کو عرف عام میں دہلی سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیکٹیریا کی قسم کا جینیاتی خاکہ اور جانوروں میں بیماری کرنے والا جراثیم ایک ہی طرح کے برآمد ہوئے جس نے ثابت کر دیا کہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں ایک ہی جگہ پے رہنے کی وجہ سے منتقل ہو رہی تھی جس کا پتا سپولیگونا ٹینگ کے علاوہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ اس مطالعہ میں جراثیموں کے اندر ٹی بی کی دو ادویات یعنی آئیونیٹاز اور فلوکسائیڈ سین کا خلاف مدافعتی عمل کا جینیاتی مطالعہ کیا گیا جس نے ثابت کیا کہ 25 فیصد سے زیادہ آئیونیٹس میں آئیونیٹاز ڈز جبکہ لگ بھگ 13 فیصد میں رفاہیسمین کے خلاف جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے مدافعت موجود ہے۔ کچھ انسانوں اور جانوروں میں ٹی بی کے خلاف قدرتی مدافعت موجود ہوتی ہے اس کی وجہ جینیات میں ایک مخصوص تبدیلی شذوذی این اے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے انسانوں اور جانوروں میں اس تبدیلی کا مدافعت پے اثر ہے کہ نہیں اس کے لئے خون میں سے ڈی این اے نکال کر اس کو پی سی آر۔ آرا فائیل پی طریقے سے جانچا گیا۔ نتائج نے ثابت کیا کہ اس تبدیلی کا ہمارے علاقے کے لوگوں کی مدافعت پے کوئی اثر موجود نہیں جبکہ جانوروں میں کوئی تبدیلی ہی ریکارڈ نہیں کی گئی۔

ذیابیطس کا علاج بذریعہ کھجور، ہلدی اور کالی مرچ

پی ایچ ڈی سکالر: ملیحہ سرفراز نگران: ڈاکٹر تنویر خالق شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی، فزیالوجی اینڈ فارماکالوجی

شوگر کو بلڈ گلوکوز بھی کہتے ہیں۔ بلڈ گلوکوز نہ صرف کاربوہائیڈریٹس سے بلکہ پروٹین اور چکنائی سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیماری خاندانی بھی ہوتی ہے۔ اور عموماً 50 سے 60 سال کے عمر کے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ جن اشخاص کو موٹاپا ہو ان کو یہ بیماری دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اس بیماری میں گلوکوز لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو خون میں اور دوسرے جسم کے تمام اعضا تک گلوکوز کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ذیابیطس کی دو اقسام ہیں ایک شکر کی ٹائپ نمبر 1 اور دوسری شکر ٹائپ نمبر 2۔ شوگر میں انسولین پیدا کرنے والے بیٹا آئی لیٹ سلیر تباہ ہو جاتے ہیں۔ مریض کو پیاس لگتی ہے۔ پیشاب بار بار

آتا ہے اور مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کی پیچیدگیوں میں نیوروپتی اور دیگر ویتھنی شامل ہے اس کے علاوہ نظام دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے۔ کھجور کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ یہ پھل جنت ہے اور اس میں نہ ہر سے شفا ہے۔ کھجور کا استعمال دنیا بھر میں مذہبی و ثقافتی لحاظ سے اہم اور بنیادی شے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہلدی میں بھی کافی بیماریوں سے شفا کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ کالی مرچ میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کسی بھی عنصر کے کام کو بڑھا دیتی ہے ہلدی میں اہم عنصر کرکیو مین پایا جاتا ہے اور کالی مرچ میں پائیرین پایا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عجمہ کھجور کے گودا اور گھٹلی میں کافی مقدار میں فلافو نمیدز (Flavonoids) اور فینولکس (Phenolics) کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ عجمہ کھجور کے گودا اور گھٹلی میں اگر ہلدی اور کالی مرچ شامل کر کے کھایا جائے تو یہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر کی وجہ سے ڈی جینریشن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو کھایا جائے تو بیٹا سیل سے انسولین کی مزید مقدار پیدا ہونے لگ جاتی جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں کی اموات کی بڑی وجہ شوگر بھی ہے شوگر کے علاج کے لئے مختلف قسم کی ادویات ہیں شوگر گلوکوز کے لیول کو کم کرتی ہیں وہ مختلف طریقوں سے گلوکوز کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صحت کے لئے خطرہ بھی ہوتی ہے۔ جیسا گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں اس لئے شوگر کے علاج کے لئے کچھ چیزوں کی دریافت کی ضرورت ہے۔ موجودہ تحقیق بھی اس لئے کی گئی ہے تاکہ مختلف قسم کے بائیو ایکلوکپاؤنڈ کو تلاش کیا جائے جو کہ شوگر کی بیماری کے لئے مددگار ہوں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہلدی کالی مرچ عجمہ کھجور کے گودے اور گھٹلی میں کیلشیم، میگنیشیم، آئرن اور زنک بھی پایا جاتا ہے۔ شوگر کی بیماری میں کو لیوسٹرول ٹرائی گلسرائڈ لوڈنسی لیپو پروٹین جو کہ دل کے دورے اور شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے بنتی ہے یہ ہر بل ایکسٹریکٹ ہائی ڈنسی لیپو پروٹین کو زیادہ اور باقیوں کی مقدار کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹوٹل اینٹی آکسیڈنٹ کپٹی جو کہ اس کا لیول بھی بہتر ہو جاتا ہے جو کہ سب سے بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل اینٹی آکسیڈنٹ کپٹی جو کہ اس پر بیماری میں بہت کم ہو جاتی ہے ان قدرتی اجزاء کو کھانے سے اس کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل آکسیڈنٹس (TOS) بھی بڑھ جاتا ہے جو کہ اس ایکسٹریکٹ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے انزائمز جیسا کہ ALP, ALT, AST کا لیول بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اگر علاج سے ان انزائمز کا بہتر ہو جائے اس کا مطلب ان سب میں اگر عجمہ کھجور کی گھٹلی کا پانی میں عرق نکلا کر استعمال کیا جائے تو یہ ان جگر کے انزائمز کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بلی رو بن پوریا اور پورک ایسڈ کا لیول بھی بہتر ہوتا ہے۔ پنکریاز جسم کا اہم آرگن ہے اس میں بیٹا سیل جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ وہ گلوکوز کے لیول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ شوگر کی بیماری میں یہ سیل تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انسولین پیدا کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ ہماری تحقیق میں ہسٹو پتھالوجی اور امینونو بیوشیمیسٹری سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہلدی، کالی مرچ، عجمہ کھجور کا گودا اور گھٹلی کے استعمال سے نئے بیٹا سیل بننے جنہوں نے انسولین کو پیدا کرنا شروع کر دیا اور نتیجے کے طور پر گلوکوز کا لیول کنٹرول ہوا تاہم ان چیزوں نے کیسے اور کس راستے سے کنٹرول کیا اس کے لئے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔

خف گرمی کے اثرات کو کم کرنے کے لئے مرغیوں کی خوراک میں بیٹھے سوڈا کا استعمال

پنی ایچ ڈی۔ کارل: غلام عباس نگران: ڈاکٹر سلطان محمود شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز

پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں واقع ہے جہاں موسم سال کا بیشتر حصہ خف گرم رہتا ہے اور کچھ علاقوں میں تو ماحولیاتی درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے جبکہ مرغیوں کی بہترین پیداوار کیلئے درجہ حرارت 25 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تاہم ماحولیاتی درجہ حرارت کے بڑھنے سے مرغیوں کی پیداوری صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ لہذا پاکستان کے بیشتر حصوں میں گرمیوں میں حرارتی دباؤ ایک اہم مسئلہ ہے۔ حرارتی دباؤ سے مرغیوں میں انڈوں کی پیداواری صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے جس سے پولٹری فارم کی اقتصادیات متاثر ہوتی ہے۔ لیسر فارم پر حرارتی دباؤ نہ صرف یہ کہ انڈوں کی پیداوار، انڈوں کے سائز اور کوالٹی کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ مرغیوں کی جسمانی استعداد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نتیجتاً مرغیوں کی شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماحولیاتی درجہ حرارت کے بڑھنے سے مرغیوں میں سانس لینے کی رفتار دس گنا تک بڑھ جاتی ہے اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا اخراج بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے مرغیوں کے خون کی پی۔ ایچ (pH) زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس سے جسم کا تیزابی اور اساسی توازن بگڑ جاتا ہے۔ جبکہ جسم کے تیزابی اور اساسی توازن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی Alkalosis یا Acidosis کا باعث بنتی ہے جس سے مرغیوں کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ مرغیوں میں حرارتی دباؤ سے نمٹنے کیلئے عام طور پر مختلف انتظامی اور غذائی طریقہ کار استعمال کئے جاتے ہیں۔ انتظامی طریقہ کار میں پولٹری ہاؤس کی سمت اور اس میں مناسب ہوا کی آمد و رفت، کوئلہ پیڑز کا استعمال، مرغیوں کو دن کے ٹھنڈے اوقات (صبح و شام) میں خوراک کی فراہمی، Intermittent فیڈنگ اور مرغیوں کے جسمانی درجہ حرارت کو کم کرنے کیلئے ان پر پانی کا چھڑکاؤ شامل ہیں جبکہ غذائی طریقہ کار میں مرغیوں کی خوراک میں تیل کے استعمال میں اضافہ، خوراک کے لحمیاتی اجزاء میں کمی، خوراک میں ضروری امینو ایسڈز کا استعمال اور خوراک میں وٹامنز، الیکٹرولائٹس اور معدنی مرکبات کا استعمال کرتے ہوئے حرارتی دباؤ میں کمی لائی جاسکتی ہے۔ بیٹھا سوڈا، سوڈیم اور بائی کاربونیٹ آئیز کا مرکب ہے۔ یہ ایک سستا الیکٹرولائٹ ہے جو کہ حرارتی دباؤ کو کم کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ حرارتی دباؤ کے زیر اثر پانی کے جسم میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سوڈیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے جبکہ بیٹھا سوڈا اس کمی کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹھا سوڈا ابراہن پرندوں میں حرارتی دباؤ کو کم کرنے میں کارگر ہے۔ جبکہ لیسر مرغیوں میں حرارتی دباؤ کے دوران بیٹھا سوڈا کے استعما ل پر خاطر خواہ سائنسی معلومات میسر نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کے جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیسر مرغیوں میں حرارتی دباؤ سے نمٹنے کیلئے یہ تحقیقی منصوبہ عمل میں لایا گیا۔ اس منصوبہ میں حرارتی دباؤ کے دوران مرغیوں کو دی جانے والی خوراک میں بیٹھا سوڈا مختلف مقداروں میں استعمال کیا گیا اور اس بیٹھا سوڈا ملی خوراک کا مرغیوں کی پیداواری صلاحیت، مرغیوں کے خون میں پائے جانے والے کیمیاوی مرکبات اور مرغیوں میں خوراک کے اجزاء کے ہاضمہ پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ان کے مطابق ایک فیصد بیٹھا سوڈا امارا شن دینے سے مرغیوں میں خوراک اور پانی کا استعمال، جسمانی وزن میں بڑھوتری، انڈوں کی پیداوار اور خوراک کی کارکردگی دوسرے گروپس کی نسبت نمایاں طور پر بہتر پائی گئی۔ مزید برآں خوراک میں ایک فیصد بیٹھا سوڈا کے استعمال سے مرغیوں میں انڈے کا وزن، انڈے کے چھلکے کی موٹائی اور انڈے کی Specific gravity میں نمایاں بہتری آئی۔ مرغیوں میں بیٹھا سوڈا ملی خوراک کے استعمال سے انڈوں کی زردی میں کو لیوسٹرول کی مقدار واضح طور پر کم ہوئی جبکہ انڈے کی سفیدی اور زردی کی pH میں نمایاں اضافہ ہوا اس کے علاوہ عمل تنفس کی شرح اور جسمانی درجہ حرارت میں واضح بہتری پائی گئی۔ بیٹھا سوڈا ملی خوراک کے استعمال سے (ایک فیصد بیٹھا سوڈا ملی خوراک) مرغیوں میں رانی کھیت کی بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہوا اور خون میں پائے جانے والے مختلف کیمیاوی مادوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ تحقیق کے نتائج سے یہ ثابت ہوا کہ بیٹھا سوڈا (ایک فیصد) ملی خوراک کھلانے سے مرغیوں میں مختلف غذائی اجزاء کے ہاضمہ میں اضافہ ہوا اور مختلف معدنیات کے جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئی۔ لہذا سخت گرمیوں کے موسم میں مرغیوں کی خوراک میں بیٹھا سوڈا کا استعمال انہیں گرمیوں کے بُرے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے معاون ہو سکتا ہے۔

SMOKING AND ITS EVIL EFFECTS

Bahadur Ali Kang, Muzaffar Hussain Salik,
University of Agriculture, Faisalabad

It is said that when Sir Walter Ralieggh, a brilliant courtier of Queen Elizabeth I, returned from America where he had been sent on a colonizing expedition, he brought with him from the new world to the old world two novel gifts i.e Tobacco and Potatoes. Both of them immediately caught the fancy of and in no time became immensely popular with the people all over the world. One of them i.e potatoes have ever since proved a boon to humanity at large, but the other i.e tobacco has been the bane of its life since then.

Tobacco the harmful effects of which have been conclusively proved, is the principal crop that man grows to furnish not a necessity but to provide for a habit. This habit is satisfied by using tobacco in a variety of ways-smoking (cigarettes, cigars, pipes and hookahs) sniffing (Snuff) and chewing (alone and in Pans). In the beginning the people in the west smoked pipes and cigars in the East hookahs. Women, especially of respectable families, did not smoke at all. Cigarettes were not very popular. Their smoking has, however, increased more than a hundred and fifty times since the year 1905, while that of cigars and pipes have gone down. Today in the United States, people smoke more than 500 billion cigarettes each year and about seven billion Cigars.

Pakistan, a developing country has not lagged behind others in the production and consumption of tobacco. Infact, we are the sixth largest tobacco growing country in the world. The production of tobacco has been increasing at a much faster pace than that of several other crops of nutritional value. In 1947 tobacco was grown over an area of 28 thousand acres but now it has increased to 135 thousand acres. The production has gone up from 16 thousand tons to 74 thousand tons. When Pakistan came into being, there were no cigarette factories in the country, today their number is 24. They are producing 34 billion cigarettes and still cannot fully meet the demand. At the time of independence only a few million cigarettes were imported and consumed. Now it has increased to ten billion in the consumption in the past three years alone. Even the villages, who usually prefer hookah, are switching over to Cigarettes.

Smoking, especially cigarette smoking has given birth to a number of diseases, many of them quite deadly and has aggravated and increased the incidence of many others. By far the most common are lung cancer, bronchitis and emphysema. The cancer of lips, tongue, mouth, larynx and bladder is on the increase among smokers. Smoking has increased the number of coronary cases and accelerated the morbidity rate with its consequent absenteeism, loss of working hours and excessive demands on medical services. Even the babies, yet to be born have not escaped the harmful effects of smoking. Smoking pregnant mothers gives birth to babies prematurely. Their off springs are twice prone to respiratory infections and attacks of bronchitis and pneumonia, than those of non-smokers.

By far the most deadly disease that has come in the wake of smoking is cancer which has practically embraced every nation in its grip in varying degrees. However, the United States is its worst victim. Hundreds of scientists are engaged there in well equipped laboratories to find a cure of cancer. But in spite of millions of dollars that have been spent on research, the cure eluded them. The only thing that has been proved is that there is a definite link between cancer and smoking.

In the west a relentless campaign against smoking has been going on for years. In Pakistan the authorities too, have though belatedly, realized its harmful effects. It has been made incumbent upon cigarettes. But the campaign is only slipshod and perfunctory. If those who count are serious about it, the very first step is the prohibition of T.V., Radio and Newspaper advertisements. Smoking ought to be banned in all public places. The children from the very early age be made aware of the dangerous effects of smoking. The area under tobacco cultivation be gradually decreased and brought under crops of nutritional value. Ways to convert cigarettes manufacturing plants to the production of other goods may be explored. This is possible only if smoking is disliked and discouraged everywhere.

Nicotine is naturally present in tobacco and added to some electronic cigarettes. Nicotine is the root cause of addiction to and physical dependence on tobacco products. You can become dependent

quickly, sometimes even before you become a daily smoker. Smoking 1 to 5 cigarettes a week can be enough for a person to become addicted. Nicotine dependence is comparable to heroin or cocaine addiction.

The brain actively develops during gestation and adolescence. As such, the nicotine to which a pregnant woman is exposed adversely affects the brain of a developing fetus. The development of an adolescent's brain is also adversely affected if exposed to nicotine. The negative consequences associated with nicotine are not necessarily evident at birth or in adolescence but rather in the long term.

Cigarette smoke contains over 7,000 chemical substances, 69 of which are known carcinogens. Inhaled smoke circulates in the human body and reaches nearly every organ, affecting both the health

and well-being of smokers. The smoke also affects the health of non-smokers exposed to it.

Other tobacco products, such as cigars and cigarillos, or the use of a water pipe are not safer alternatives to cigarettes because they also present major health risks.

Electronic cigarettes are a special case. Their long-term health effects, for both users and people who are regularly exposed to the vapours (aerosols), are still unclear. It would seem, however, that electronic cigarettes also present significant health risks. There are many varieties of electronic cigarettes, and their manufacture in Canada has not yet been regulated. Keeping in view of the damages and predicaments, we should start a campaign against smoking. Particularly at institutions, it should be strictly banned.

STRATEGIES FOR CONTROLLING RESPIRATORY DISEASES IN POULTRY

*Bahar E Mustafa, **Muhammad Khalid Bashir, *Muhammad Ashraf,
*M. Zohaib Arshad, *UAF Sub Campus Toba Tek Sing,
**Directorate of Graduate Studies, University of Agriculture, Faisalabad

The respiratory diseases that cause severe problems to the poultry birds include Avian Influenza (AI), IB, ILT, CRD and Newcastle disease (ND). These diseases must be controlled by the adopting appropriate disease eradication and control policies.

There are many other factors that played their role in controlling disease. The first and the foremost strategy may be to improve the genetic potential of the birds to fight against the respiratory pathogens. Afterwards, implementation of variety of biosecurity practices may also reduce the incidence of many respiratory diseases in chicken such as adopting the policy of all in and all out placement. This reduces the life cycle of different pathogens that affect the birds of different age group or carry out their life cycle in the birds of different age groups. During outbreak, there is need to restrict the movement of affected birds, feeders, drinkers and the affiliated personnel's in order to reduce the disease spread to the healthy nearby flocks. Dogs, cats and other rodents must be controlled to curtail the spread of the outbreak. Moreover, after every flock, there is some gap before next flock is reared. Adoption of various other biosecurity measures also tends to inhibit the virus spread. This technique also helps in the inactivation of different pathogen with the environmental practices. Implementation of

appropriate vaccination schedule at farm may also help in the prevention of various respiratory diseases which may cause heavy economic losses to local farmers.

Control of respiratory disease

ND and IB are one of the most frequently prevalent diseases in birds, while ILT appears to be sporadic in nature. Vaccination is one of the most effective ways to control the respiratory diseases in chickens. Various factors that can impact the vaccine efficacy include the vaccine strain, dose, application method, seasonal and weather variation and fluctuations and *Mycoplasma* status. Modified live vaccine is used to prevent against the disease. Examples of live vaccines in poultry include LaSota, ND Clone 30, I2 and V4, which belong to lentogenic strains. The live vaccines are usually administered as the spraying, beak dipping, intranasal and intra ocular. If the vaccine is needed to be administered by the drinking water, then water is needed to be withheld for about 2 hours. Extreme care should be taken as virus can become inactivated if the water temperature is higher or chlorinated water is being used. Dried skimmed milk powder can be added (@1: 400) to the drinking water as it has virus stabilizing effects. While using aerosol method, particle method play an important role. Using coarse spray cannot penetrate deep in

the respiratory system and therefore does not provide full protection. Live vaccine can lead to bird to bird transmission and thus generation of humoral immunity. In serum vaccination produces IgG whereas in mucosa vaccination appears to produce the IgA. When boosting is done, it results in generation on anamnestic immune response. Under ideal conditions, virus in the vaccine replicates in the target tissue, and thus produces the local protection of the respiratory system. In case of the breeder flocks, killed vaccines are carried out which result in the generation of higher and prolonged antibody titre as well as transfer of the antibodies to the newly hatched chicks. Various examples of the killed strains include the Mukteswar, Komorov and Raokin strains which belong to the mesogenic strains. These killed vaccines are frequently administered as intra muscular injection. It should be kept in mind that they can only be used in the countries where the ND is endemic in nature. This represents the passive immunity, which tends to last for shorter duration of period and therefore, there is need to administer the vaccines. In order to avoid the reaction between serum antibodies and antigens, vaccines in the breeder are done so that minimal amount of antibodies are transferred to the newly born chicks so that vaccination at day 1 does not result in waning of overall antibody titre in serum.

More than 1 antigen can be added in the vaccines to make them bivalent or polyvalent vaccine. Several different viruses such as Coronavirus, Avibirna virus, adeniovirus and reovirus may be added in ND vaccine to make it a polyvalent vaccine.

Vaccine programs are designed keeping in view various factors and they include maternal immunity, climate, geographical conditions, availability of labor, breed and concurrent disease challenges. Market age of the broiler birds vary from 35-42 days of age. In routine, most of the broiler birds are vaccinated at 1 day of age and this vaccine is a combination of ND and IB. Afterwards, a second dose of vaccine is carried out at day 10-15 of age (varies in different areas) and finally, 3rd vaccine may be done between 20-30 days of age in the area where the disease incidence is higher. ND and IB vaccines mostly appear in the lyophilized forms and they are more convenient to be used under field conditions.

IB is caused by avian Coronavirus, which are basically structurally same but antigenically different. A variety of live vaccines are being used

to prevent against the clinical disease. There are many strains of the avian coronaviruses, among which Massachusetts (Mass), Arkansas (Ark) and Connecticut (Conn) strains are routinely administered along with the ND vaccine. Sometimes, these strains are not capable of providing full protection against the other strains such as D-274, D-1466 and 4/91 are also used along with H 120 and Mass strain in most if the Asian countries. Inactivated oil emulsion vaccine may also be needed to be done in case of the breeder and layer flocks and is usually done at 10-18 weeks of age (before the onset of egg production) and they are usually administered usually 3-4 weeks after 3-4 immunization with the live vaccines. Inactivation of the virus is usually carried out by using some chemicals such as beta propiolactone, formaline or using some other chemical. Broilers are usually administered IB vaccine on Day 1, which is repeated on day 10-18 of age. Mineral oil are used as adjuvant to enhance the immune response against the injected antigen.

Vaccine programs should be routinely monitored for vaccination. In case of any disease problem despite vaccination, the vaccine is first needed to be evaluated and moreover, challenge study is needed to be evaluated, however, such studies are needed to be done isolation facility.

Serological assessment is also needed to be done at market age and this can also help in the evaluation of the vaccine quality. In case of ND vaccination, live lentogenic vaccination can produce the HI titre of the 2^4 to 2^6 but much higher titers (up to 10^{11}) can be achieved after killed vaccination. Under normal conditions, healthy flocks without any disease conditions tend to have lower ELISA titres. On the other hand, flocks having higher ELISA titers are infected with the virulent field virus.

ILT vaccines are available in two form; one is tissue culture and other one is the chicken origin. The latter one is more effective and is used to immunize the broiler flocks in the regions where the disease is endemic. Application method is critical for the success of vaccine and oral administration provides better immune response. It has been found that the administration of 10^5 embro infective dose is necessary in order to obtain the satisfactory immune response following oral vaccination. Administration of modified live vaccine. Broiler flock is usually vaccinated at 10-21 days of age in endemic areas.

Nowadays, new generation of vaccines is also being employed in the prevention of respiratory pathogens and these include gene deleted vaccines, vectored vaccines and immunomodulators are used for the vaccination against the respiratory pathogens.

Examples of these vaccines include the immunization by incorporating the HN gene into various other viruses such as Fowl ox virus and turkey herpes virus/ pigeon herpes virus.

AMELIORATIVE EFFECTS OF PROBIOTICS, PREBIOTICS AND SYNBIOTICS IN LIVER DISEASES

Haroon Rashid, Junaid Ali Khan

Institute of Physiology and Pharmacology, University of Agriculture, Faisalabad

The diseases of malnutrition are most often associated with nutritional imbalances or excessive consumption; there are more people in the world who are malnourished. According to the United Nations World Health Organization, the greatest challenge in developing nations today is not starvation, but insufficient nutrition – the lack of nutrients necessary for the growth and maintenance of vital functions. The causes of malnutrition are directly linked to inadequate macronutrient consumption resulting in diseases such as obesity and metabolic syndrome.

Compromised gut-liver axis is considered an important player in mediating the obesity, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and metabolic syndrome. High fat high sugar (HFHS) diet causes gut dysbiosis and leads to production of lipopolysaccharides (LPS) by Gram negative gut bacteria. HFHS-diet also causes hepatic fat accumulation, inflammation, oxidative stress, obesity and ultimately NAFLD. The NAFLD often converts into more severe forms like non-alcoholic steatohepatitis, necrosis, fibrosis, cirrhosis and ultimately hepatocellular carcinoma. The hepatocellular inflammation and kidney injuries are secondary to altered intestinal permeability of toxins generated by Gram negative bacteria. The microbiota under normal physiological conditions produces endotoxins that are absorbed through hepatic portal circulation and normally cleared by Kupffer cells. Oxidative stress and low-grade inflammation in gastrointestinal tract are common features of metabolic diseases mediated via gut dysbiosis. Therefore, in this study, the mechanisms of anti-oxidants production for scavenging free radicals through use of probiotics, prebiotics and synbiotics were investigated. Intestinal integrity plays key role in lowering the endotoxin production and impaired lipid metabolism, which are considered as major players for pathogenesis of NAFLD and non-alcoholic steatohepatitis (NASH).

As the probiotics, prebiotics and synbiotics are associated with gut health, so the impact on gut-liver and kidney axis was also investigated in the present study.

The impact of specific intestinal bacteria such as *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Eubacteria rectal* and *Blautia coccoides* ratio is well studied regarding host energy imbalance, obesity and chronic kidney diseases. Pharmacological strategies with healthy life style modification including bile acid pool modulators, reduction in weight, exercise, insulinotropic agents, balanced diet, and vitamin supplementation are adapted to alleviate the pathogenesis of NAFLD.

In present investigation, managerial aspects to minimize pathogenesis of NAFLD were explored using economical dietary interventions by exploiting probiotics and prebiotics potential in mitigating oxidative stress related hypercholesterolemia and hyperglycemia through improvement in gut microbiota. In our study, HFHS-diet administration for 18 weeks resulted in hypercholesterolemia and elevated triglyceride levels. Further, the higher values of ALT, AST, ALP and bilirubin in HFHS-Vehicle group suggested hepatic malfunction. Thereafter, probiotics, prebiotics and synbiotics supplementation for 4 weeks significantly ameliorated the increased serum lipid profile and liver function markers. The probiotics, prebiotics and synbiotics produced significant ameliorative effects on metabolic hormonal profile. The results from our studies suggested that administration of probiotics, prebiotics and synbiotics mitigates HFHS-diet induced oxidative stress and improved liver and kidney function markers presumably through anti-oxidant mechanism.

دفتر کتب رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت

تعلیمی و تحقیقی مفید مطبوعات کسان بھائیوں اور تحقیق کاروں کے لیے دستیاب ہیں جو حسب ضرورت بذریعہ مئی آرڈر منگوائی جاسکتی ہیں۔

نمبر شمار	عنوان (مختصر)	قیمت (علاقہ ڈاک خرچ)
45-	رہنما کتابچہ: آم کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کا تناسب استعمال	20/-
46-	ترشاہ پھلوں کی تصدیق شدہ زمری کی داغ بیل اور گلوں میں تیاری کا رجحان	25/-
47-	ترشاہ پھلوں کے باغات کی دیکھ بھال کے چند رہنما اصول	30/-
48-	گا چری کاشت اور بیج کی پیداوار	25/-
49-	آپاشی کے ساتھ کھادوں کا استعمال فریکیشن	20/-
50-	ترشاہ پھلوں اور امرود کی صحت مند زمری اگانے کے لیے ماڈل زمری کا قیام	15/-
51-	زرعی مقاصد کے لیے کھارے پانی کے استعمال کی ترکیبات	25/-
52-	منکھر پر قابو پاؤ۔ دودھ کی پیداوار بڑھاؤ	10/-
53-	چارے کی مسلسل فراہمی کیوں اور کیسے؟	25/-
54-	بائس کی کاشت	15/-
55-	ترشاہ پھلوں پودوں میں بذریعہ ناپ درنگ اقسام کی تبدیلی	15/-
56-	قدرتی طریقے سے تیار شدہ خشک کھجور	20/-
57-	جانور کے لیے پیر جوں	20/-
58-	سالانہ کیلنڈر: آم کے باغات کی دیکھ بھال	20/-
59-	سالانہ کیلنڈر: ترشاہ باغات کی دیکھ بھال	20/-
60-	گلڈ ولس کی کاشت: منافع بخش کاروبار	20/-
61-	آلو کی کاشت	40/-
62-	گل داؤ کی نگہداشت سالانہ کیلنڈر	20/-
63-	گلاب کی نگہداشت سالانہ کیلنڈر	20/-
64-	دودھ کی پیداوار بڑھانے کا عملی پروگرام	20/-
65-	دیکھ کا مدارک	20/-
66-	پاکستان میں پانچاب کے مختلف علاقوں کے کارآمد درخت	20/-
67-	چکن گڑنگ	20/-
68-	سڑا ہیری کی کاشت، نگہداشت اور برداشت	30/-
69-	وٹن 2030ء (زرعی ترجیحات، نصب العین اور انجمن)	50/-

نمبر شمار	عنوان (خصوصی شمارہ جات)	قیمت (علاقہ ڈاک خرچ)
1-	ڈیری فارم مینجمنٹ (ڈیری گائیڈ)	150/-
2-	بیکری مصنوعات، پھلوں اور سبز پھلوں کو محفوظ کرنا	150/-
3-	پریکٹیکل ڈیری فارمنگ	150/-
4-	ماڈرن پولٹری پروڈکشن (پولٹری گائیڈ)	180/-
5-	بھیر بکریاں پالنا	150/-
6-	کپاس کی کاشت	50/-
7-	گندم کی کاشت	70/-
8-	دھان کی پیداوار یکنیٹا لوجی	40/-
9-	شجر کاری بدلے ہوئے ماحولیاتی تناظر میں	60/-
10-	سبز پھلوں کی کاشت	160/-
11-	کماؤ کی کاشت	60/-
12-	پھلوں کی کاشت	140/-

علاقہ اتریں دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے جس کے ریگولر شمارے کی قیمت 60/- روپے، سٹوڈنٹس سالانہ ممبر شپ 200/- روپے بشمول ڈاک خرچ، سالانہ عام ممبر شپ 300/- روپے بشمول ڈاک خرچ جبکہ لائف ٹائم ممبر شپ 5,000/- روپے بشمول ڈاک خرچ ہے۔ ممبر شپ کے لیے مئی آرڈر بنام انچارج دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ارسال کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود ہمارے ممبر بنیں گے بلکہ دیگر کاشتکار حضرات کو بھی اس کی ممبر شپ حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پاکستان بھر میں مطبوعات منگوانے کے لیے دی گئی قیمتوں کے ساتھ ڈاک خرچ بھی ارسال کریں۔

فون نمبر 3405 Ext. 70-9200161-041 ای میل ایڈریس oubmuaf@gmail.com

نمبر شمار	عنوان (مختصر)	قیمت (علاقہ ڈاک خرچ)
1-	زراعت۔ وسائل، مسائل اور مستقبل (ایک جائزہ)	30/-
2-	کبریوں میں مصنوعی نسل کشی	25/-
3-	بیری اقسام اور ان کی کاشت	20/-
4-	راہنمائے کاشتکاران کھجور	30/-
5-	گا چری کاشت: صحت مند اور منافع بخش	15/-
6-	پیاز کی پیداوار یکنیٹا لوجی	20/-
7-	سارٹ فاسٹوری کھادیں	20/-
8-	یو ایف 11	10/-
9-	تھور باڑہ زمین کے لیے اصلاحی طریقے دیکھنا لوجی (نفع بخش کاشت)	25/-
10-	کھارے پانی کے استعمال سے تھور باڑہ زمین میں کثیف دھان اور گندم کی پیداوار	10/-
11-	آم۔ پھلوں کا بادشاہ	50/-
12-	امرد کی پیاریوں سے پاک زمری اگانے کے جدید طریقے	15/-
13-	کلرلجی زمینوں کے لیے غذائی نقد آور فصل (قیٹوا)	15/-
14-	سوبا پھلوں میں قوت مدافعت اور پیداوار بڑھانے کا قدرتی آسان اور سستا طریقہ	15/-
15-	سلی میرین: امراض کھجور میں امپید کی کرن	10/-
16-	گلشنی	10/-
17-	یو بی مائیکرو پاور (زیادہ پیداوار، بہتر کوالٹی اور صحت مند نشوونما بذریعہ اجزائے صغیرہ کی ہرے)	15/-
18-	قربانی کے جانور: خرید، نگہداشت اور ذبح کرنا	15/-
19-	کھجور کی اقسام	25/-
20-	ماٹ گراس بے مثال چارا	15/-
21-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں نمائندگی کاشت	15/-
22-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں موسم گرما کی سبزیوں کی کاشت	10/-
23-	کھڑدہ زمینوں میں سبزیات کی کاشت کے لیے سفارشات	20/-
24-	فٹل میں کھجور کی کاشت	15/-
25-	ترشاہ باغات میں جڑی بوٹیوں کا مدارک اور فریکیشن	25/-
26-	ترشاہ باغات میں آپاشی بذریعہ رپ آرکیشن	20/-
27-	پاکستان میں ترشاہ پھلوں کے امراض اور ان کا انسداد	10/-
28-	بھینڈی کے بیج کی فصل	20/-
29-	سی اے یکنیٹا لوجی	15/-
30-	مٹر کے بیج کی فصل	20/-
31-	آئیسز مشروم کی کاشت	60/-
32-	بٹن مشروم کی کاشت	20/-
33-	مونیٹیو میں سوزش حیوان کی تشخیص علاج اور روک تھام کا ایک عملی پروگرام	15/-
34-	جانوروں کی صحت اور افزائش سے متعلق اہم سفارشات	15/-
35-	دو دوہیل جانوروں کی خوراک سے متعلق مفید مشورے	15/-
36-	جانوروں کی خوراک میں یوریا کھاد کا استعمال (شیرہ یوریا پاک)	15/-
37-	پاکستان میں نہری پانی کی کمی، اثرات اور ضیاعی تدابیر	15/-
38-	شہرول سے خارج ہونے والے فالتو پانی کا آپاشی کے لیے استعمال اور اس کے نقصانات	15/-
39-	خمیرہ چارا	15/-
40-	پاکستان میں اگائی جانے والی خوباتی کی اقسام	20/-
41-	تغیراتی موسمی حالات میں بھینڈی توری کی کاشت	15/-
42-	فٹل میں مریچوں کی کاشت	20/-
43-	نمائندگی فٹل میں کاشت	15/-
44-	کھارے پانی سے فصلات کی کاشت اور تھور باڑہ زمین کی اصلاح	10/-