

ترجمان زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد








زمرعی سہلی

اپریل تا جون 2021ء



شعبہ تصنیف و تالیف
زمرعی یونیورسٹی فیصل آباد

شعبہ تصنیف و تالیف کی چند گرانقدر مطبوعات



جدید زرعی ٹیکنالوجی سے استفادہ کے لئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ترجمان جریدے سے ماہی زرعی ڈائجسٹ کے مستقل ممبر بنیے

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام سہ ماہی زرعی ڈائجسٹ 1966ء سے وطن عزیز کے زمینداروں اور کاشت کاروں کی راہنمائی کا فریضہ سرانجام دینے کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔ جس کے موضوعات میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی، کاشتکاری کے منفرد امور، موسم کی مناسبت سے فصلوں کی کاشت و برداشت، زرعی ادویات، کھادوں کے بروقت استعمال اور مارکیٹنگ جیسے عوامل سے انہیں روشناس کرانا شامل ہے۔ اس ڈائجسٹ میں زرعی ماہرین، محققین کے مضامین، کالمز، سائنسدانوں و ترقی پسند کاشتکاروں اور زرعی ماہرین کے انٹرویوز، اثمار و اشجار، امور حیوانات و پولٹری جیسے اہم موضوعات اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام ہونے والے تعلیمی و تحقیقی پروگرامز کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی سکالرز کی تحقیق اور مختلف تحقیقی منصوبہ جات کے ثمرات بھی شامل اشاعت ہوتے ہیں۔ اس مجلے میں شائع ہونے والی جدید ترین معلومات سے استفادہ کر کے ہمارے کسان بھائی ملک کو غذائی خود کفالت کی منزل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ پھلوں، سبزیوں اور دیگر غیر روایتی فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سہ ماہی ”زرعی ڈائجسٹ“ کو مزید بہتر بنانے کے لئے ہمارے ساتھ دست تعاون بڑھائیں تاکہ آپ بھی زراعت کی ترقی اور ملک میں سبز انقلاب برپا کرنے کے اس مشن میں شریک سفر ہو جائیں۔ آپ اپنے تجربات، مفید زرعی معلومات اور کوئی بھی ایسی تحریر جو ملکی زراعت کی ترقی اور بہتری کے حوالے سے ہو، ہمیں ارسال کریں تاکہ اسے اس ڈائجسٹ کا حصہ بنایا جاسکے۔ مجلے کی ممبر شپ انچارج شعبہ تصنیف و تالیف (بالائی منزل ایف ایم بلڈنگ) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے نام بذریعہ منی آرڈر بھیج کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اہم اُمید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود ہمارے ممبر بنیں گے بلکہ دیگر افراد کو بھی اس کی ممبر شپ حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔

آپ کے تعاون کا متنی

پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مقصود احمد بسرا،

انچارج شعبہ تصنیف و تالیف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

دفتر کتب رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تحت

تعلیمی و تحقیقی مفید مطبوعات کسان بھائیوں اور تحقیق کاروں کے لیے دستیاب ہیں جو حسب ضرورت بذریعہ مئی آرڈر منگوائی جاسکتی ہیں۔

نمبر شمار	عنوان (مغفلش)	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
45-	رہنما کتا بنی: آم کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کا متناسب استعمال	30/-
46-	ترشاوہ پھلوں کی تصدیق شدہ زمری کی داغ بیل اور گملوں میں تیاری کا رجحان	25/-
47-	ترشاوہ پھلوں کے باغات کی دیکھ بھال کے چند رہنما اصول	30/-
48-	گاڑی کی کاشت اور بیج کی پیداوار	25/-
49-	آبپاشی کے ساتھ کھادوں کا استعمال فریکیشن	20/-
50-	ترشاوہ پھلوں اور امرود کی صحت مند زمری اگانے کے لیے ماڈل زمری کا قیام	15/-
51-	زری مقاصد کے لیے کھارے پانی کے استعمال کی ترکیبات	25/-
52-	منہ کھر پر قابو پاؤ۔ دودھ کی پیداوار بڑھاؤ	10/-
53-	چارے کی مسلسل فراہمی کیوں اور کیسے؟	25/-
54-	بائس کی کاشت	15/-
55-	ترشاوہ پھلوں پودوں میں بڑا بیج ٹاپ ورنگل اقسام کی تبدیلی	15/-
56-	قدرتی طریقے سے تیار شدہ فٹک بھجور	20/-
57-	جانور کے لیے سپر جوس	20/-
58-	سالانہ کیلنڈر: آم کے باغات کی دیکھ بھال	20/-
59-	سالانہ کیلنڈر: ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال	20/-
60-	گلڈ پوس کی کاشت: منافع بخش کاروبار	20/-
61-	آلو کی کاشت	40/-
62-	گل داؤ کی نگہداشت کا سالانہ کیلنڈر	20/-
63-	گلاب کی نگہداشت کا سالانہ کیلنڈر	20/-
64-	دودھ کی پیداوار بڑھانے کا عملی پروگرام	20/-
65-	دیکھ کا مدارک	20/-
66-	پاکستان میں پنجاب کے مختلف علاقوں کے کارآمد درخت	20/-
67-	چکن گارڈنگ	20/-
68-	سٹر اپری کی کاشت نگہداشت اور برداشت	30/-
69-	وڈن 2030ء (زرعی ترجیحات، نصب العین اور لائحہ عمل)	50/-

نمبر شمار	عنوان (خصوصی شمارہ جات)	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
1-	ذری فارم مینجمنٹ (ذری گائیڈ)	150/-
2-	یکری مصنوعات، پھلوں اور سبز پھلوں کو محفوظ کرنا	150/-
3-	پریکٹیکل ذری فارمنگ	150/-
4-	ماڈرن پولٹری پروڈکشن (پولٹری گائیڈ)	180/-
5-	بھیر بکریاں پالنا	150/-
6-	کپاس کی کاشت	50/-
7-	گندم کی کاشت	70/-
8-	دھان کی پیداواری ٹیکنالوجی	40/-
9-	شیر کاری بدلنے ہوئے ماحولیاتی تناظر میں	60/-
10-	سبز پھلوں کی کاشت	160/-
11-	کما دی کاشت	60/-
12-	پھلوں کی کاشت	140/-

علاوہ ازیں دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ کے زیر اہتمام سہ ماہی زرعی ڈائجسٹ شائع کیا جاتا ہے جس کے ریگولر شمارے کی قیمت 60/- روپے، سٹوڈنٹس سالانہ نمبر شپ 200/- روپے، بشمول ڈاک خرچ، سالانہ عام ممبر شپ 300/- روپے بشمول ڈاک خرچ جبکہ لائف ٹائم ممبر شپ 5,000/- روپے بشمول ڈاک خرچ ہے۔ ممبر شپ کے لیے مئی آرڈر بنام انچارج دفتر کتب، رسائل و جرائد جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ارسال کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف خود ہمارے ممبر بنیں گے بلکہ دیگر کاشتکار حضرات کو بھی اس کی ممبر شپ حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پاکستان بھر میں مطبوعات منگوانے کے لیے دی گئی قیمتوں کے ساتھ ڈاک خرچ بھی ارسال کریں۔

فون نمبر 041-9200161-70 Ext. 3405 ای میل ایلر بس oubuuaf@gmail.com

نمبر شمار	عنوان (مغفلش)	قیمت (علاوہ ڈاک خرچ)
1-	زراعت۔ وسائل اور مستقبل (ایک جائزہ)	30/-
2-	بکریوں میں مصنوعی نسل کشی	25/-
3-	بیر کی اقسام اور ان کی کاشت	20/-
4-	راجہ سائے کا شکاران بھجور	30/-
5-	گاڑی کی کاشت: صحت مند اور منافع بخش	15/-
6-	پیاز کی پیداواری ٹیکنالوجی	20/-
7-	سارٹ فاسفوری کھادیں	20/-
8-	یو اے ایف 11	10/-
9-	تھور باڑہ زمین کے لیے اصلاحی طریقہ و ٹیکنالوجی (نفع بخش کاشت)	25/-
10-	کھارے پانی کے استعمال سے تھور باڑہ زمین میں کاشت دھان اور گندم کی پیداوار	10/-
11-	آم۔ پھلوں کا بادشاہ	50/-
12-	امردو کی بیماریوں سے پاک زمری اگانے کے جدید طریقے	15/-
13-	کلر انجی زمینوں کے لیے نئی غذائی نقد آور فصل (قینوا)	15/-
14-	سونا بھجور: فصلوں میں قوت مدافعت اور پیداوار بڑھانے کا قدرتی آسان اور سستا طریقہ	15/-
15-	سلی میرین: امراض جگر میں امید کی کرن	10/-
16-	گل اشرفی	10/-
17-	یونی مائیکرو پاور (زیادہ پیداوار، بہتر کوالٹی اور صحت مند نشوونما بذریعہ اجزائے صغیرہ کی پرے)	15/-
18-	قربانی کے جانور: خرید، نگہداشت اور ذبح کرنا	15/-
19-	بھجور کی اقسام	25/-
20-	ماٹ گراس بے مثال چارا	15/-
21-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں نمائندگی کاشت	15/-
22-	بدلتے ہوئے شدید موسمی حالات میں موسم گرما کی سبز پھلوں کی کاشت	10/-
23-	کلر زہ زمینوں میں سبز پھلوں کی کاشت کے لیے سفارشات	20/-
24-	نٹل میں کھیرے کی کاشت	15/-
25-	ترشاوہ باغات میں جڑی بوٹیوں کا مدارک اور فریکیشن	25/-
26-	ترشاوہ باغات میں آبپاشی بذریعہ ڈرپ افریکیشن	20/-
27-	پاکستان میں ترشاوہ پھلوں کے امراض اور ان کا انسداد	10/-
28-	بھند کی بیج کی فصل	20/-
29-	سی اے ٹیکنالوجی	15/-
30-	مزرے بیج کی فصل	20/-
31-	آئیسٹر مشروم کی کاشت	60/-
32-	ٹن مشروم کی کاشت	20/-
33-	موشوں میں سوزش جیوانی تشخیص علاج اور روک تھام کا ایک عملی پروگرام	15/-
34-	جانوروں کی صحت اور افزائش سے متعلق اہم سفارشات	15/-
35-	دودھیل جانوروں کی خوراک سے متعلق مفید مشورے	15/-
36-	جانوروں کی خوراک میں یوریا کھاد کا استعمال (شیر یوریا ہلاک)	15/-
37-	پاکستان میں مہری پانی کی کمی، اثرات اور احتیاطی تدابیر	15/-
38-	شہروں سے خارج ہونے والے فائو پانی کا آبپاشی کے لیے استعمال اور اس کے نقصانات	15/-
39-	خیرہ چارا	15/-
40-	پاکستان میں آگائی جانے والی خوراک کی اقسام	20/-
41-	تغذیاتی موسمی حالات میں بھند کی توری کی کاشت	15/-
42-	نٹل میں مچروں کی کاشت	20/-
43-	ٹماٹر کی نٹل میں کاشت	15/-
44-	کھارے پانی سے فصلات کی کاشت اور تھور باڑہ زمین کی اصلاح	10/-

دودھ کی کم پیداوار کی وجوہات اور تجاویز برائے سفید انقلاب

- دوھیل جانوروں میں زیادہ پیداوار لینے کے لئے اچھے چارے کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ معیاری سبز چارہ خوراک پر اخراجات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سبز چارہ سارا سال موجود نہ ہونے کے باعث اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جانوروں کی خوراک میں سبز چارے کی کمی آ جاتی ہے جانوروں کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اور کسانوں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جانوروں میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت موجود ہے لیکن بہت سے عوامل اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان میں ایک چارے کی سارا سال فراہمی کا نہ ہونا ہے۔ دوھیل جانوروں میں تقریباً ستر فیصد سے زیادہ اخراجات خوراک پر ہوتے ہیں۔ جانوروں کی خوراک میں چارہ نہایت سستا ذریعہ ہے جس سے خوراک پر آنے والے اخراجات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں مئی جون اور نومبر دسمبر خوراک کی کمی کے مہینے ہوتے ہیں اس عرصے میں سبز چارے کی فراہمی کم ہوتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہر دس سال بعد تقریباً دو فیصد رقبہ جہاں پر چارہ اگایا جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جانوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے جس سے صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ پرانے روایتی انداز میں کاشتکاری کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار کم ہے۔ اب ایک نیا رجحان یہ پیدا ہوا ہے کہ ایسی فصلیں اگائی جائیں جس سے کاشتکار کو موقع پر نقد ادائیگی ہو اس رجحان کی وجہ سے بھی سبز چارے کا رقبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے زیادہ تر کسان اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ چارے کو کس وقت کاٹا جائے جس کی وجہ سے جانوروں کو ایسا چارہ ملتا ہے جس میں لحمیات کی مقدار کم اور فائبر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور اس چارے کی ہضم ہونے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔

جانور تقریباً 51، 38، 3 اور 2 فیصد غذائی اجزاء سبز چارہ، چرائی، کاٹی ہوئی گھاس، اجناس کی باقیات اور ونڈے سے حاصل کرتے ہیں۔

بہت سے کسان کھل بنولہ کو ایک مکمل ونڈا کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ونڈے کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل خوراک نہیں ہے۔ صرف کھل بنولہ کھلانے سے ایک طرف جانوروں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور دوسری طرف پیداواری اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھل بنولہ ہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ اس

جانور کی ہیٹ گزر چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ڈوز رکھ دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جانور کا بھن نہیں ہوگا اور فارمر کا اعتماد مصنوعی نسل کشی پر ختم ہو جائے گا۔ یہی صورتحال اس وقت ملکی سطح پر ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی سہیوال گائے کو خالص نہیں رکھ سکے، فارمر نے اس میں کراس بریڈنگ شروع کر دی تھی لیکن اب توجہ دی جا رہی ہے کہ اس نسل کو محفوظ کیا جائے۔ درج بالا مسائل کو حل کرنے کے لئے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔



انعام شامسا

مصنف: ڈاکٹر محمد قمر بلال

انٹینیوٹ آف انٹیل ایڈز بری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- i- مصنوعی نسل کشی کے طریقے کو اس کے معیار کے مطابق کر لیا جائے اور تربیت یافتہ باصلاحیت لوگ اس کام کو سرانجام دیں۔
- ii- وہ سانڈ جس کا ریکارڈ معلوم ہو اور اس کی کارکردگی اچھی ہو صرف اسی کو استعمال کریں۔
- iii- ایک مربوط نظام جس کے تحت سانڈ کی تیاری معیار کے مطابق ہو۔
- iv- دوغلی نسل کشی کو صرف عام دیسی گائے تک محدود کیا جائے تاکہ خالص نسلوں کو بچایا جاسکے۔

2- جانوروں کی وراثی صلاحیت سے مکمل طور پر استفادہ نہ کرنا
یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ جانور اپنی اہلیت کے مطابق پیداوار نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کی خوراک کا معیار اور مقدار صحیح نہیں ہے اسے خوراک کم مقدار میں ملتی ہے اور پیداوار پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت زیادہ خطرناک شکل اختیار کر جاتی ہے جب چارے کی قلت ہو۔ جو چارہ جانور کو دیا جاتا ہے وہ صحیح عمر پر نہیں کاٹا جاتا جس کی وجہ سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے اور وہ ونڈا جو جانوروں کو دیا جاتا ہے اس میں مختلف غذائی اجزاء جانور کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے

پاکستان میں جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے دودھ کی پیداوار نہیں بڑھ رہی۔ ہماری عوام کو سفارش کردہ معیار اور مقدار کے مطابق دودھ دستیاب نہیں ہے اور اس صورت حال کی سنگینی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مضمون کا مقصد ملکی سطح پر دودھ کی کم پیداوار کی وجوہات اور ان کے حل پر روشنی ڈالنا ہے۔

1- گائے بھینسوں کی کم وراثی صلاحیت

پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دودھ دینے والی نسلوں سے نوازا ہے لیکن غلط بریڈنگ پالیسیوں کی وجہ سے ان کی وراثی صلاحیت دن بدن کم ہو رہی ہے۔ چھوٹے کسان کی سطح پر مصنوعی نسل کشی کی سہولت موجود نہیں ہے جب ایک مادہ گرمی میں آتی ہے تو اسے کسی بھی نر کے ساتھ بریڈ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک اس کا ریکارڈ جیسا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فارمر کے پاس بالکل خالص 100 فیصد نیلی راوی بھینس ہے جس کو ایسے سانڈ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جو 80 فیصد خالص ہے تو پیدا ہونے والے بچے میں 90 فیصد خالص پن ہوگا اور اس کی جھوٹی (Heifer) کو جوان ہونے کے بعد اگر پھر ایسے ہی سانڈ سے ملا دیا جائے تو خالص پن 85 فیصد ہوگا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعد میں پیدا ہونے والے بچوں میں اپنی ماں کی نسبت زیادہ دودھ دینے کی موروثی صلاحیت کم ہوئی۔ یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ دوسری اہم وجہ مصنوعی نسل کشی کی شرح اختیار کی کم ہونا ہے جو اس وقت ملکی سطح پر صرف 16 سے 17 فیصد ہے۔ ایک طرف تو فارمر کو مصنوعی نسل کشی کی سہولت کی دستیابی کم ہے دوسری طرف مصنوعی نسل کشی سے جانوروں کے گابھن ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں مثلاً ختم کی غلط طریقے سے کوئیکشن۔ اس کی سٹوریج اور ٹیکنیشن کی لا پرواہی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی ٹیکنیشن سٹور سے سیمن ڈوزز لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو سٹور والی حالت میں نہیں رکھتے۔ ایسی ڈوز نا کارہ ہو جاتی ہے لیکن ٹیکنیشن صرف پیسے کے لالچ میں وہی سیمن مادہ جانور میں رکھ دیتے ہیں اور کئی دفعہ

جڑی بوٹیوں کے فصلات پر نقصانات، ان کی گروہ بندی اور روک تھام کے طریقے

نذر حسین، ڈاکٹر محمود احمد رندھاوا، ڈاکٹر وقاص وکیل، ڈاکٹر اطہر خان اشرف، عبدالرحمن شہزاد..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جڑی بوٹی کیا ہے؟

ویسے تو پہاڑوں، قبرستانوں، سڑکوں کے ارد گرد اور غیر آباد زمینوں میں اگنے والے جھاڑی نما پودے اور گھاس پھوس کو جڑی بوٹی کہا جاتا ہے لیکن زرعی اصطلاح میں ہر وہ پودا جو ایسی جگہ اُگ آئے جہاں اس کو نہیں اُگنا چاہیے تھا۔ جڑی بوٹی کہلاتا ہے مثلاً چنے کے کھیت میں اُگنے والا گندم کا پودا بھی جڑی بوٹی کہلائے گا حالانکہ گندم کا پودا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عرض یہ کہ کسی موسم میں کاشتکار آمدن فصل میں، بے محل، غیر ضروری نقصان دہ اور خوردوار اگنے والے سب کے سب پودے جڑی بوٹی کہلائیں گے۔

جڑی بوٹی کا پھیلاؤ

- چراگا ہوں میں چرنے والے جانور جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور کاشتکاران کا گو بر کھیت میں بطور کھاد استعمال کرتا ہے تو گو بر کے ساتھ جڑی بوٹیوں کے بیج بھی کھیت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔
- بہت سی فصلوں کے بیجوں میں جڑی بوٹیوں کے بیج بھی ملے ہوتے ہیں جو ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پہنچ جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ دُمی سٹی کا بیج میکسیکو سے درآ مد شدہ گندم کے بیج کے ساتھ پاکستان میں آیا۔
- جڑی بوٹیاں زیادہ تر غیر آباد زمینوں اور جنگلوں میں اُگتی ہیں اور آدھی وغیرہ کے ساتھ اس کا بیج دوسرے کھیتوں اور علاقوں میں پہنچ جاتا ہے۔

جڑی بوٹیوں سے پہنچنے والا نقصان

i۔ خوراک کا ضیاع

جڑی بوٹیاں فصلوں کے ساتھ غذائی اجزاء، نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش وغیرہ کے حصول میں بڑا سخت مقابلہ کرتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں فصل کے پودوں سے دو تین گنا خوراک کا حصہ زمین سے حاصل کرتی ہیں۔ اس طرح زمین میں موجود کھاد کی صورت میں ڈالے گئے غذائی اجزاء جڑی بوٹی کی نذر ہو جاتے ہیں۔

ii۔ پانی کا نقصان

جڑی بوٹیوں کی جڑیں فصلوں کی جڑوں سے لمبی ہوتی ہیں اور زمین کی گہرائی سے پانی چوس لیتی ہیں جس سے فصل کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور پیداوار پر برا اثر پڑتا ہے۔

iii۔ جگہ پر قبضہ

جڑی بوٹیاں فصل کے مقابلے میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں اور تھوڑے وقت میں تمام جگہ پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ جس سے فصل کی بڑھوتری اور پھیلاؤ بری طرح متاثر ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات کھیت میں فصل کی بجائے ہر طرف جڑی بوٹیاں ہی نظر آتی ہیں۔

iv۔ روشنی میں رکاوٹ

جڑی بوٹیاں فصل سے قد میں بڑی ہوں تو ان کا سایہ فصل پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی صحیح طور پر فصل پر نہیں آسکتی۔ ضیائی تالیف (Photosynthesis) کا عمل متاثر ہوتا ہے اور فصل کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔

v۔ بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کا پھیلاؤ

بہت سی جڑی بوٹیاں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو متبادل پناہ فراہم کرتی ہیں اور بہت سی بیماریاں پھیلانے والی پھپھوندی کی پناہ گاہ کا کام دیتی ہیں اسی وجہ سے وہ فصلوں پر بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کا باعث بنتی ہیں۔

پیداواری اخراجات میں اضافہ

جڑی بوٹیاں فصلوں کی کاشت سے لے کر مختلف کاشی امور کی انجام دہی میں رکاوٹ بنتی ہیں جس کی وجہ سے فصلوں کے پیداواری اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مثلاً دُمی سٹی اور کیلیم گندم کو گرا دیتی ہیں اور فصل کی کٹائی میں دشواری ہوتی ہے نیز گری ہوئی فصل کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

معیار میں کمی

جڑی بوٹیاں فصل کی پیداوار کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ معیار کو بھی خراب کرتی ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں فصل کی مناسب قیمت نہیں ملتی اور زمیندار کا بہت معاشی نقصان ہوتا ہے۔

جڑی بوٹیوں کے زہریلے اثرات

بعض جڑی بوٹیاں زہریلے اثرات کی حامل ہوتی ہیں جو اپنے مختلف حصوں میں سے مخصوص مرکبات خارج کرتی ہیں جو فصلوں کے اگاؤ اور بڑھوتری پر اثر انداز ہوتے ہیں بعض جڑی بوٹیاں زہریلے پن کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کے لئے بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔

انسانی سرگرمیوں میں مشکلات

جڑی بوٹیاں نہ صرف کھیت میں نقصان دہ ہوتی ہیں بلکہ یہ جہاں بھی موجود ہوں بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں مثلاً جڑی بوٹیاں باغات، جنگلات، چراگا ہوں، مچھلیوں کے تالابوں، نرسریوں اور صنعتی علاقوں میں اُگ کر انسانی سرگرمیوں میں رکاوٹ اور مشکلات پیدا کرتی ہیں۔

جڑی بوٹیوں کی گروہ بندی

جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لئے ان کی ساخت کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مناسب جڑی بوٹی مارز ہر استعمال کیا جاسکے۔ جڑی بوٹیوں کی پہچان اور ان کی تلفی کے نکتہ نظر سے انہیں عام طور پر چار گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

1۔ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں

2۔ نو کیلے پتوں والی یا گھاس خاندان کی جڑی بوٹیاں

3۔ تلوئے پتے والی یا ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں

4۔ طفیلی جڑی بوٹیاں

1۔ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں

اس قسم کی جڑی بوٹیوں کے پتے چوڑے ہوتے ہیں اور پتوں میں رگیں جال کی طرح پھیلی ہوتی ہیں۔ تنہا (Stem) نرم و نازک ہوتا ہے۔ اگر خوراک، پانی اور جگہ وافر ملے تو ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے ان جڑی بوٹیوں کے پتوں کی حفاظتی تہہ بہت باریک ہوتی ہے اس

نباتاتی نام	انگریزی نام	نام جڑی بوٹی
Cuscuta reflexa	Dodder	آکاش نیل (درختوں والی)
Cuscuta campestris	Dodder	آکاش نیل (باریک تاروں والی)
Striga species	Witch weed	انگاری بوری

جڑی بوٹیوں کے تدارک کے طریقے

جڑی بوٹیوں کا کسی کھیت سے مکمل طور پر خاتمہ تقریباً ناممکن ہے لیکن ان کی تعداد کو اس حد تک کم کرنا ضروری ہے جس سے فصلوں کی پیداوار متاثر نہ ہو۔ درج ذیل طریقوں سے جڑی بوٹیوں کو نقصان دہ معاشی حد سے نیچے رکھا جاسکتا ہے۔

1- فصلوں سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے غیر کیمیائی طریقے

جڑی بوٹیوں کو غیر کیمیائی طریقہ تدارک کے ذریعے تلف کر کے فصل کو معاشی حد کے نقصان سے بچایا جاسکتا ہے۔ غیر کیمیائی طریقے درج ذیل ہیں۔

i- داب کا طریقہ

فصل کی بوائی سے پہلے کھیت کو پانی لگادیا جائے۔ وتر آنے پر پھل چلا کر سہاگہ پھیر دیا جائے اس طرح جڑی بوٹیوں کے بیج کو اگنے کا موقع مل جائے گا۔ جب جڑی بوٹیاں اچھی طرح اُگ آئیں تو پھل چلا کر ان کو تلف کر دیا جائے۔

ii- فصلوں کا ادل بدل (Crop rotation)

اگر کسی کھیت میں ایک ہی فصل بار بار کاشت کی جائے تو وہاں جڑی بوٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی تلفی مسئلہ بن جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کا زور توڑنے کے لئے فصلوں کا ادل بدل بہت ضروری ہے مثلاً اگر ایک سال کھیت میں گندم کاشت کی جائے تو اگلے سال کھیت میں برسم کاشت کریں۔ اس طرح جڑی بوٹیاں خود بخود کٹ کر تلف ہو جائیں گی اگر پورے رقبے پر برسم کاشت نہیں کی جاسکتی تو ہر سال تھوڑے رقبے پر گندم اور برسم کے ادل بدل سے جڑی بوٹیوں کا موثر تدارک کیا جاسکتا ہے۔

iii- مناسب طریقہ کاشت اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد

بوائی کے وقت عام سفارش کردہ بیج کی مقدار سے زائد بیج ڈال کر فی ایکڑ پودوں کی تعداد اتنی بڑھائی جائے کہ جڑی بوٹیوں کے اگنے کی جگہ ہی نہ رہے۔ اس کے علاوہ فصل کو تنگ لائنوں میں کاشت کر کے بھی جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکا جاسکتا ہے۔

iv- قطاروں میں کاشت

فصلوں کو چھٹے کی بجائے قطاروں میں کاشت کریں۔ لائنوں میں کاشت ہوئی فصل سے دستی یا مشینی طریقے سے جڑی بوٹیوں کا تدارک آسانی سے کیا جاسکتا ہے جبکہ چھٹے کے ذریعے کاشتہ فصل سے دستی یا مشینی طریقے سے جڑی بوٹیوں کی تلفی مشکل ہو جاتی ہے۔

v- گوڈی کا طریقہ

اگر رقبہ کم اور افراد زیادہ ہوں تو کھرپہ، کسولہ یا گئی سے جڑی بوٹیوں کا تدارک ایک بہت موثر طریقہ ہے۔ گوڈی مناسب وقت پر کی جائے۔ گوڈی کرنے سے نہ صرف جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں بلکہ زمین میں وتر بھی دیر تک قائم رہتا ہے۔ زمین نرم اور بھر بھری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فصل کی نشوونما اچھی ہوتی ہے اور پیداوار بڑھتی ہے۔ (باقی صفحہ 45 پر)

لئے بوٹی مارز ہریں (Weedicides) آسانی کے ساتھ ان کے پتوں میں جذب ہو جاتی ہیں اور زہریلی تھوڑی سی مقدار بھی ان کو آسانی سے تلف کر دیتی ہیں۔ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں بے شمار ہیں جن میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں مثلاً

نباتاتی نام	انگریزی نام	نام جڑی بوٹی
Trianthema Protulacastrum	Horse Purslane	اٹ سٹ
Chenopodium album	Common goosefoot	باتھو
Tribulus terrestris	Puncture clover	بھلھرا
Rumex dentatus	Broadleaf dock	جنگلی پاک
Coronopus didymus	Swine cress	جنگلی بالوں
Portulaca oleracea	Common purslane	قلفہ
Chenopodium murale	Fathen	گرٹ
Euphoriba granulata	Garen spurge	ہزار دانہ

2- نوکیلے پتوں والی یا گھاس خاندان کی جڑی بوٹیاں

نوکیلے پتوں یا گھاس خاندان کی جڑی بوٹیوں کے پتے لمبے، باریک اور کم چوڑے ہوتے ہیں۔ پتوں میں رگیں متوازی ہوتی ہیں۔ تنگ گول سخت اور کھوکھلا ہوتا ہے اور کئی ٹنگوں سے بنا ہوتا ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کی حفاظتی تہہ موٹی ہوتی ہے اس لئے یہ جڑی بوٹیاں بہت کم مقدار میں زہر جذب کرتی ہیں۔ یہ جڑی بوٹیاں جوں جوں بڑی ہوتی ہیں ان کی تلفی مشکل ہو جاتی ہے اس لئے ان کو شروع سے ہی تلف کرنا چاہیے۔ چند ایک کے نام درج ذیل ہیں۔

نباتاتی نام	انگریزی نام	نام جڑی بوٹی
Avena fatua	Wild oats	جنگلی جوی
Echinochloa colona	jungle rice	جنگلی سوایک
Phalaris minor	Bird's seed grass	دیمی شی
Saccharum benghalense	Tiger grass	سرکنڈا
Cynodon dactylon	Bermuda grss	کھیل

3- ٹکونے پتوں والی یا ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں

اس قسم کی جڑی بوٹیوں کے پتے ٹکونے اور بعض کی افزائش بیجوں (Seeds) کے ساتھ ساتھ زیر زمین گانٹھوں (Tubers) سے بھی ہوتی ہے۔ ان کی تلفی کے لئے خصوصی زہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹکونے پتوں والی چند معروف جڑی بوٹیاں درج ذیل ہیں۔

نباتاتی نام	انگریزی نام	نام جڑی بوٹی
Cyperus rotundus	Purple nutesedge	مورک یا ڈیلا
Scripus martitimus	Bulrush	ڈیلا (چاول میں اگنے والا بڑا ڈیلا)
Cyperus difformis	Umberlla plant	گھونٹیں

4- طفیلی جڑی بوٹیاں

یہ دوسری فصل کے پودوں کی شاخوں، جڑوں پر چلتی بڑھتی ہیں اور وہ اپنی خوراک کی ضروریات پودوں سے حاصل کرتی ہیں جس سے میزبان پودوں کی نشوونما رک جاتی ہے۔ اس طرح ان فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ چند ایک طفیلی جڑی بوٹیاں درج ذیل ہیں۔

دھان سے جڑی بوٹیوں کی تلفی

ڈاکٹر عبدالخالق..... شعبہ ایگرا نومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

جڑی بوٹیاں نہ صرف پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں بلکہ پیداوار کے معیار کو بھی خراب کرتی ہیں۔

اگاؤ کے بعد

گرین ستن: بوائی کے بعد دو ہفتے کے اندر اندر گرین سن بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اگے ہوئے گھوڑا گھاس کو تلف کیا جاسکتا ہے۔

نوٹل کیئر: بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ کے سپرے سے زہری سے گھوڑا گھاس، ڈیلا اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاسکتا ہے۔

منتقل شدہ موچی سے جڑی بوٹیوں کی تلفی

دھان کے روایتی علاقہ میں بیوٹاکلور یا ٹیچنی 800 ملی لیٹر کے حساب سے استعمال کی جائے تو بیشتر جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں۔

ڈیلا کو کنٹرول کرنے کیلئے کیلیوں 60 تا 80 گرام کے حساب سے استعمال کی جائے تو ڈیلا سمیت تمام جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں۔

گھوڑا گھاس اور مدھانہ کا کنٹرول

ان دونوں میں جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کیلئے گرین سن بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کی جائے۔

براہ راست کاشتہ موچی سے جڑی بوٹیوں کی تلفی

کونسل ایکٹو

موچی سے ڈیلا، گھوڑا گھاس، سواکی، اٹ سٹ اور دیگر تمام جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کیلئے آبپاشی کر کے 75 گرام کونسل ایکٹو پیکر بوتل کے طریقے سے استعمال کر دی جائے۔

شامپ: بحساب ایک لیٹر فی ایکڑ

اگر وتر حالت میں بوائی کی جائے تو بوائی کے فوراً بعد سپرے کر دیں اور پہلا پانی 6 دن بعد لگائیں۔

اگر خشک زمین میں بوائی کی ہو تو بوائی کے 72 گھنٹے کے اندر اندر آبپاشی کے بعد سپرے کریں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

غیر کیمیائی طریقہ انسداد

1- فصل کی کاشت کیلئے صحت مند اور جڑی بوٹیوں سے پاک بیج استعمال کریں۔

2- کھالوں اور دھوئیں وغیرہ کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں۔

3- گوڈی سے نہ صرف جڑی بوٹیوں کی تلفی ہوئی بلکہ زمین بھی نرم ہوتی ہے۔ جس سے فصل کی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے۔

4- موچی سے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کیلئے کاشتی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہے۔

4.1 خشک زمین تیار کرنا

4.2 منتقلی سے دو ہفتے قبل بار بار ہل چلا کر کھیل اور زکو خشک کرنا

4.3 ٹھہرے پانی میں 3 تا 2 مرتبہ (کدو) کر کے جڑی بوٹیوں کو گلاتا

4.4 کدو کر کے ڈیلے کی گھٹیاں اکٹھی کر کے تلف کرنا

4.5 منتقلی کے بعد کھیت میں مسلسل تین چار ہفتے تک پانی کھڑا رکھنا

کیمیائی طریقہ

زہری سے جڑی بوٹیوں کی تلفی

دھان کی زہری سے ڈیلا، گھاس نما اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے اگاؤ سے پہلے

1- کونسل ایکٹو بحساب 75 گرام فی ایکڑ

کھڑے پانی میں چھڑکاؤ کی جائے تو اٹ سٹ، ڈیلا، سواکی اور گھوڑا گھاس سمیت شیشہ جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔

2- ٹاپ سٹار

زہری کا بیج چھڑ کرنے کے بعد پانی میں ٹاپ سٹار بحساب 40 گرام فی ایکڑ کے حساب سے چھڑکاؤ کیا جائے

دعا کے قبول ہونے کی علامت

دعا مانگنے کے وقت خوف طاری ہو اور بے اختیار روٹنا آجائے اور بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں بعض اوقات بے ہوش طاری ہو جاتی ہے اور تن بدن کی کچھ خبر نہیں رہتی اور بعد اس کے اطمینان قلب اور ایک قسم کی رقت ہوتی ہے اور بدن ہلکا معلوم ہونے لگتا ہے گویا کندھوں سے بوجھ کسی نے اتار لیا جب ایسی حالت پیدا ہو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے دلی توجہ کو نہ ہٹائے بلکہ اس کی حمد و ثناء کرے اور جو کچھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

کو تا ہیوں اور غفلتوں کی معافی کی دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

وَ اَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (۱۴۷)

اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔

(آل عمران: 147)

درجہ حرارت بڑھنے کے فصلوں پر برے اثرات اور اجزائے خوراک کی ذریعے برے اثرات کو کم کرنا

* محمد فرخ سلیم، * محمد سرور، ** محمد شاہد..... * شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ** ایگری انومک ریسرچ اسٹیشن، بہاولپور

اہمیت

زیادہ درجہ حرارت کے برے اثرات کو کم کرنا

کسان زیادہ درجہ حرارت کے برے اثرات کو مختلف طریقوں سے کم کر سکتے ہیں۔ ان میں فصل کی مناسب وقت پر بوائی، فصل کو مناسب وقت پر کھاد اور پانی دینا اور زیادہ درجہ حرارت کے خلاف مدافعت رکھنے والی اقسام کا چناؤ ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کے اجزائے خوراک کا سپرے بھی زیادہ درجہ حرارت کے اثرات کو کم کرنے کے لئے خاصا مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اجزائے خوراک کا سپرے پودے کی زیادہ درجہ حرارت میں خوراک بنانے کا عمل جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے اور پودے کے پتوں کو جھلساؤ سے بچاتا ہے نتیجہ کے طور پر پودوں میں خوراک بنانے اور ترسیل کا عمل جاری رہتا ہے۔

اس کے علاوہ پودوں کے اجزائے خوراک کی زیادہ درجہ حرارت پر بننے والے نقصان آکسیجن سے پیدا شدہ زہریلے مادے کو کم کر دیتے ہیں اور پودا زیادہ درجہ حرارت کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اجزائے خوراک کا سپرے اس لئے بھی ضروری ہے کہ زیادہ درجہ حرارت پر پودوں کے زمین سے اجزائے خوراک جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جو کہ سپرے کے ذریعے پوری کی جاسکتی ہے۔ کچھ اجزائے خوراک پودے کو زیادہ درجہ حرارت پر اپنے اندر پانی کو قائم رکھنے کی صلاحیت بڑھاتے ہیں اس طرح سے پودوں کے سکرٹنے اور جھلساؤ کا عمل سست ہو جاتا ہے اور زیادہ درجہ حرارت کے خلاف مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔

(a) زیادہ درجہ حرارت پر نائٹروجن (N) کا سپرے تیز روشنی کے برے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی کو جذب کرکے پودے کو تیز کرتا ہے جبکہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر فصل میں نائٹروجن کی کمی واقع ہو جائے تو پودے کی سورج کی روشنی کو خوراک بنانے کے عمل میں استعمال کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نائٹروجن کی کمی میں زیادہ درجہ حرارت پر نقصان دہ آکسیجن سے پیدا شدہ زہریلے مادے کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے اور پودے میں خوراک کی ترسیل کا عمل متاثر ہوتا ہے۔

(b) اسی طرح فاسفورس (P) کا مناسب استعمال پودے کو زمین سے پانی جذب کرنے کی صلاحیت اور جڑوں کی بڑھوتری کو بہتر کرتا ہے جبکہ فاسفورس کی کمی زیادہ درجہ حرارت پر پودے میں انرجی (ATP) بننے کے عمل کو سست کر دیتی ہے اس طرح پتے سے پھل کی طرف خوراک کی ترسیل سست ہو جاتی ہے جو کہ پھل کی کوالٹی اور وزن میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔

(c) پوٹاشیم (K) زیادہ درجہ حرارت پر پودے کی پانی کو خلیوں کے اندر قائم رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم کا سپرے پتوں سے پھل کی خوراک کی ترسیل کو یقینی بنا کر زیادہ درجہ حرارت کے منفی اثرات کو کم کرتا ہے جبکہ پوٹاشیم کی عدم دستیابی فصلوں کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خوراک بنانے میں استعمال کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے اس طرح پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم کا سپرے بھی پودے کے خلیوں میں پانی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے۔ مزید پوٹاشیم پتے میں موجود سوراخ کے بند ہونے اور کھلنے کے عمل کو بہتر کرتا ہے اور ہوا سے

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنا دو حاضرا کا اہم ترین مسئلہ ہے ایک تخمینے کے مطابق سال 2050ء تک دنیا کی آبادی تقریباً دس ملین تک بڑھ جائے گی۔ مسلسل بدلتی ہوئی آب و ہوا اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت فصلوں کے لئے ایک مستقل خطرہ ہے۔ زیادہ درجہ حرارت نہ صرف فصلوں کی پیداواری ٹیکنالوجی کو بدل دیتا ہے بلکہ پیداوار کو بھی کم کر دیتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت فصلوں کے زردانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت پر فصلوں میں آکسیجن کے ریڈیکل پودے کی خوراک بنانے کے عمل کو کم کرتے ہیں اور خوراک کی پھل کی طرف منتقلی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف پھل کا وزن بلکہ تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت فصل کا دورانیہ بھی کم کرتا ہے جس کی وجہ سے پیداوار کا بڑھانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

خشک سالی پاکستان سمیت دنیا بھر میں زرعی پیداوار کے کلیدی نقصانات میں سے ایک ہے۔ پانی کی کمی سے پودوں میں بہت سے فعلیات متاثر ہوتے ہیں۔ من میں زمین سے نمکیات کو جذب کرنا، غذائیت کی ترسیل اور غذائی نمکیات کا پودوں میں جمع ہونا شامل ہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے پودوں کی نشوونما بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان میں سیراب زدہ رقبے کا تناسب تقریباً 75 فیصد ہے لیکن زیادہ تر ممالک میں یہ حصہ 10 فیصد سے بھی کم ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے ہر سال دنیا بھر میں فصلوں کی پیداوار میں 10 فیصد کمی واقع ہوتی ہے جو کہ 120 ملین ٹن اناج کے برابر ہے۔

موجودہ صورت حال میں آبپاشی کے لئے پانی کی عدم دستیابی نہ صرف فصل کے مرجھانے کا سبب بنتی ہے بلکہ فصلوں کی آبپاشی کی ضروریات کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ جو کہ پتوں کے سکرٹنے اور جھلساؤ کا سبب بنتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر فصل کا خوراک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ درجہ حرارت گنے کی مٹھاس کو کم کرتا ہے اور گنے کی لمبائی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ گندم اور چاول کا دانہ سائز میں چھوٹا رہتا ہے اور وزن میں کمی بھی کی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ درجہ حرارت سے گندم اور چاول میں سٹے کی لمبائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھلی میں دانوں کی تعداد کم ہونا اور وزن میں کمی کی ایک بڑی وجہ درجہ حرارت کا زیادہ ہونا بھی ہے۔ مٹی میں زیادہ درجہ حرارت سے پھلی پر دانوں کی تعداد میں نمایاں کمی کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ زیادہ درجہ حرارت نہ صرف فصلوں کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے بلکہ ان کی کوالٹی کو بھی خراب کرتا ہے۔ کپاس میں زیادہ درجہ حرارت پھول کے گرنے کا سبب بنتا ہے اس طرح پودے پر لگنے والے ٹینڈوں کی تعداد کم ہو جاتی اور نتیجہ کے طور پر پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت پوری دنیا اور پاکستان میں فصلوں کی بوائی کا وقت، کٹائی کا وقت اور پیداواری ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرتا ہے۔

فصلوں کی کوالٹی خراب ہوتی ہے تو کسان کو منافع بھی کم ملتا ہے۔ مثلاً گندم کے آٹے کی روٹی بنانے کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ دانے پچک جاتے ہیں اور سائز میں چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کپاس کے ریشے کی لمبائی بھی کم ہوتی ہے۔

دنیا بھر میں بوران (B) کی کمی زنگ کے بعد فصلوں میں دوسرا سب سے ضروری اجزاء صغیرہ ہے۔ بوران (B) پھول کے زردانوں کی نالی کی حفاظت کا کام کرتا ہے زیادہ درجہ حرارت پر یہ زردانوں کی ٹیوب کو محفوظ رکھ کر پودے میں زیرہ پوشی کے عمل کو تیز کرتا ہے نتیجہ کے طور پر زیادہ درجہ حرارت پر دانوں اور پھل کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بوران بھی پودے میں کیمیائی خامرے بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے جو کہ زیادہ درجہ حرارت کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ بوران کا سپرے نہ صرف پھل اور دانوں کی تعداد میں اہم عمل ادا کرتا ہے بلکہ خوراک کی ترسیل کو یقینی بنا کر دانوں میں پھل کے وزن کو بھی بہتر کرتا ہے۔

(g) اسی طرح میگنیز (Mn) کا سپرے پودے میں نائٹروجن کے استعمال کو بہتر کرتا ہے اور جھلساؤ کو بھی کرتا ہے میگنیز پودے میں کیمیائی خامرے بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔

(h) زنگ (Zn) کا سپرے پودے میں پروٹین کے عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور کوالٹی کو بہتر کرتا ہے جبکہ آکسیجن کے ذریعے مادوں کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

نتیجہ

زیادہ درجہ حرارت تمام فصلوں کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے جن میں خوراک بنانے کا عمل، خوراک کی ترسیل کا عمل، آکسیجن سے پیدا شدہ زہریلے مادے کا زیادہ مقدار میں بننا اور جھلساؤ اہم ہیں جو کہ پیداوار میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ ان نقصانات کو پودے کے اجزاء خوراک کی بروقت سپرے سے کم کیا جاسکتا ہے اور درجہ حرارت بڑھنے کے باوجود پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔

کم پانی یا شدید گرمی میں کپاس، گندم، مکئی اور مونگ بین پر پوٹاشیم، زنگ، بوران، سیلیکان اور سیلیسیم کا سپرے کرنے سے پیداوار میں 15-20 فیصد اضافہ ہوتا ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے

پودوں کے خوراک کی اجزاء کا سپرے (Foliar Spray of Nutrients)	گرمی / کم پانی کا دباؤ (Heat/Drought Stress)	فصل کی حالت (Stage of Crop)	فصل (Crop)
سیلیسیم بحساب 150 ملی گرام فی لیٹر	شدید گرمی	ڈوڈی اور پھول آوری	کپاس
زنگ + بوران بحساب 2:1 گرام فی لیٹر	شدید گرمی	پھول آوری	کپاس
پوٹاشیم بحساب 1.5 فیصد، زنگ 0.2 فیصد اور بوران 0.1 فیصد	شدید گرمی	ڈوڈی، پھول آوری اور ٹینڈے	کپاس
سیلیکان بحساب 100 ملی گرام فی لیٹر	شدید گرمی	ڈوڈی، پھول آوری اور ٹینڈے	کپاس
پوٹاشیم بحساب 1.5 فیصد	پانی کی کمی	بالیاں اور دانہ بننے	گندم
سیلیکان بحساب 150 ملی گرام فی لیٹر	شدید گرمی	پھول آوری اور دانہ بننے	گندم
پوٹاشیم بحساب 60 گرام فی لیٹر اور سیلیسیم 75 ملی گرام فی لیٹر	شدید گرمی	i- سٹہ بننے سے پھول آنے تک ii- پھول بننے سے دانہ بننے تک	گندم
سیلیکان بحساب 60 ملی گرام فی لیٹر	پانی کی کمی	چھ پتے نکلنے پر	مکئی
سیلیسیم بحساب 40 ملی گرام فی لیٹر + بوران بحساب 4 ملی گرام فی لیٹر	شدید گرمی	پھول آوری	مکئی
زنگ آکسائیڈ نینوپارٹیکل بحساب 20 ملی گرام فی لیٹر	شدید گرمی	پھول آوری	مونگ بین

گیسوں کے تبادلے میں مدد کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پوٹاشیم کا سپرے زیادہ درجہ حرارت پر پودے کی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنے اور خوراک بنانے کی صلاحیت کو زیادہ کرتا ہے۔

زیادہ درجہ حرارت پر پوٹاشیم کا سپرے پودے میں کیمیائی خامرے (انزائمز) بننے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے یہ کیمیائی خامرے آکسیجن سے پیدا شدہ زہریلے مادے کو کم کرتے ہیں اور پودے کو جھلساؤ سے بچاتے ہیں۔ مزید یہ کہ پوٹاشیم کا سپرے پودے کے خلیوں کی جھلیوں کے لئے بھی ایک حفاظتی اجزاء خوراک کی طور پر کام کرتا ہے۔ پودے کے خلیوں کی محفوظ جھلیاں پودے میں پانی کو قائم رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔

(d) زیادہ درجہ حرارت پر کلسیم (Ca) کا سپرے پودے میں بروقت بچاؤ کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ کلسیم (Ca) پودے میں پیغام رسانی میں اہم ثانوی رسد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ کہ سیل کی دیوار اور حیاتیاتی جھلیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے نقصان دہ ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے پودوں کے اندر کلسیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ بہت سے مسائل جیسا کہ خشک سالی، درجہ حرارت اور نمکیات کی زیادتی سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ خشک سالی کی صورت میں پودوں سے بخارات نکلنے کا عمل کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلسیم کی مناسب مقدار کو زمین سے لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی اور الکی کی زیادتی کی وجہ سے بھی بوران اور کلسیم کی فراہمی متاثر ہوتی ہے لہذا ایسے حالات میں پتوں کے ذریعے ان غذائی عناصر کی فراہمی پودوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

(e) میگنیشیم (Mg) پودے کے پتے میں موجود سبز مادہ کلروفیل کے بننے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اور اس طرح سے خوراک بنانے کا عمل بھی جاری رہتی ہے۔ میگنیشیم کی دستیابی زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے جھلساؤ کو مست کرتی ہے اور فصل زیادہ دیر تک سبز رہتی ہے۔

(f) نیشنل فریٹلائزر ڈیولپمنٹ سنٹر (NFDC) کے مطابق 40 فیصد مکئی کا زیرکاشت رقبہ بوران کی

کمی سے متاثرہ ہے۔ بوران جیسا کہ سیل توسیع اور تفرق، حیاتیاتی جھلیوں کی دیکھ بھال اور شکر کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خشک سالی سے متاثرہ پودوں میں بوران کو پتوں کے ذریعے سے مہیا کرنا جڑوں کی نشوونما میں اضافے کا باعث ہے اور اس سے پانی کو استعمال کرنے کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ خوراک بنانے کی شرح میں اضافے کے ساتھ اناج کی پیداوار کو بھی بڑھا دیتا ہے۔

دھان کی براہ راست کاشت کی پیداواری ٹیکنالوجی

ڈاکٹر ندیم اکبر..... شعبہ ایگرونومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ب) بذریعہ ڈرل

وتر زمین میں کاشت بذریعہ ڈرل کریں خشک بیج کو پھپھوندی کش زہر لگانے کے بعد وتر زمین میں بذریعہ ڈرل کاشت کریں۔ بیج اور کھاد کو ایک ساتھ ڈرل کیا جاسکتا ہے لیکن خیال رہے کہ لائن کا لائن سے فاصلہ 15 انچ اور بیج زمین میں 1.5 انچ سے زیادہ گہرا نہ جائے۔ جب زمین میں بیج سے شگوفے نکل آئیں تو وتر کا پانی ایک ماہ تک لگاتے رہیں اور بعد ازاں وتر کا پانی لگائیں کھیت میں ڈرل چلاتے وقت مشین سے بیج گرانے والے پائپوں کو چیک کرتے رہیں تاکہ کوئی پورٹھلی کے پھسنے سے بند نہ ہو جائے۔

جزی بوٹیوں کی تلفی

بیج سے براہ راست کاشت میں جزی بوٹیوں کی وجہ سے پیداوار میں نقصان عام کاشت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جزی بوٹیاں دھان کی پیداوار میں عام طور پر 25-50 فیصد تک نقصان کرتی ہیں لہذا ان کے کنٹرول کے لئے زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے۔

جزی بوٹیوں کے مربوط انسداد کے اہم طریقے

مٹی کے مینے میں دوہری Rouni کرنے اور بل چلانے سے کافی جزی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ محکمہ زراعت کے مقامی عملے کے مشورے سے سفارش کردہ جزی بوٹی مارز ہروں کا استعمال کریں۔ اگر دھان کی کاشت وتر حالت میں کی ہو تو کاشت کے فوراً بعد قبل از اگاؤ استعمال ہونے والی جزی بوٹی ادویات کا سپرے کریں۔ اگر دھان کی کاشت خشک وتر حالت میں کی گئی ہو تو کاشت کے فوراً بعد کھیت کو پانی لگائیں اور اس کے اگلے دن قبل از اگاؤ استعمال ہونے والی جزی بوٹی سپرے کا استعمال کریں۔ اُگی ہوئی جزی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لئے بیجائی کے 18 دن بعد وتر حالت میں بعد از اگاؤ استعمال ہونے والی جزی بوٹی سپرے کا استعمال کریں سپرے کرنے کے باوجود اگر جزی بوٹیاں دوبارہ اُگ آئیں تو 40 دن کے دوران دوبارہ سپرے کریں۔ سپرے کھڑے پانی کی بجائے تر وتر حالت میں کریں۔ سپرے کے 24 سے 36 گھنٹے بعد کھیت کو پانی ضرور لگائیں تاکہ زہرا جھی طرح اثر کر سکے۔ دوران سپرے قطرے جزی بوٹیوں کے پتوں پر گرنا ضروری ہیں سپرے کے لئے T-jet نوزل استعمال کریں۔ سپرے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کھیت میں کوئی جگہ سپرے کے بغیر نہ رہے۔

آپاشی

پانی کا استعمال موسم، زمین کی قسم اور مناسب طریقے سے کریں۔ براہ راست کاشت میں عام کاشت کے طریقے کی نسبت 5-6 پانی کی بچت ہوتی ہے۔ پہلا پانی فصل کی بوائی کے 5-7 دن بعد لگائیں اور فصل کو اگاؤ کے بعد 30 دن تک تر وتر کا پانی لگائیں اور بعد ازاں وتر کا پانی لگاتے رہیں۔ دانہ دار زہریں ڈالتے وقت 3-4 دن کھیت میں پانی کھڑا رکھیں تاکہ زہرا پنا اثر پورا کرے۔ سٹے میں دانے بننے کی حالت کے وقت فصل کو سوسا نہ لگنے دیں ورنہ پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ فصل کی

پاکستان میں دھان کی کاشت عام طور پر پینیری کے ذریعے کی جاتی ہے جبکہ بیج سے براہ راست بذریعہ ڈرل یا پھٹے کے ذریعے بھی کاشت کی جاسکتی ہے۔ دیگر ممالک میں دھان کی کاشت کا کل رقبہ تقریباً 30 فیصد بیج سے براہ راست کاشت کیا جاتا ہے۔ دھان کی بیج براہ راست کاشت سے کھیت میں پودوں کی مطلوبہ تعداد پوری ہونے کے علاوہ عام کاشت کی نسبت 4 سے 5 من فی ایکڑ اضافہ کے ساتھ مزدوری کے اخراجات میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ دھان کی یہ ٹیکنالوجی مشینیں اور روایتی کاشت کی نسبت سستی ہے جبکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے روایتی کاشت کی نسبت کم وقت میں زیادہ رقبہ کاشت کیا جاسکتا ہے۔ بیج کی براہ راست کاشت سے پانی کی بھی 20-15 فیصد بچت کی جاسکتی ہے۔ کدو والی زمین کی نسبت بیج کو براہ راست کاشت سے دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد گندم کی بروقت کاشت ہونے سے گندم کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔

زمین کی تیاری

زمین کی تیاری کے لئے مٹی کے تیسرے ہفتے میں دو مرتبہ خشک بل چلا کر اور کراہ لگا کر زمین ہموار کرنے کے بعد کھیت کو پانی لگائیں وتر آنے پر کھیت کو تیار کریں دھان کی براہ راست کاشت کے لئے ضروری ہے کہ جس زمین میں گزشتہ سال جو قسم تیار کی گئی ہو دوبارہ کاشت کی جائے۔ اس لئے کہ گزشتہ سال کے بیج جو زمین میں گر جاتے ہیں وہ اگلے سال دوبارہ اُگ آتے ہیں ایسے کھیت جہاں کلر گھاس یا جنگلی گھاس اور دیگر جزی بوٹیاں زیادہ اُگتی ہوں دھان کی براہ راست کاشت کے لئے موزوں نہیں۔ کھراڑی زمین بھی دھان کی براہ راست کاشت کے لئے موزوں نہیں ہے۔

شرح بیج

بাসمتی اقسام کے لئے 10-12 جبکہ موٹی اقسام کے لئے 12-15 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں۔ خشک بیج کو کاشت سے پہلے محکمہ زراعت کے مقامی عملے کے مشورے سے سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگائیں۔ دھان میں کی بیماریاں مثلاً بکائی اور پتوں کے دھبے وغیرہ زیادہ تر بیج سے پھیلتے ہیں اور ان کے تدارک کے لئے بیج کو زہر لگانا بہت ضروری ہے۔

وقت کاشت

باسمتی اقسام کا وقت کاشت یکم سے تیس جون تک جبکہ موٹی اقسام کے لئے کاشت کا موزوں وقت 20 مئی سے 7 جون تک کا ہے۔

طریقہ کاشت

الف) بذریعہ چھٹا

24 گھنٹے بگوائے بیج کی وتر زمین میں بذریعہ چھٹا کاشت پانی میں پھپھوندی کش زہر ملا کر اس میں بیج کو 24 گھنٹے کے لئے بھگونے کے بعد بیج کو خشک کر لیں۔ تر وتر والی زمین میں بل چلانے اور زمین کو تیار کرنے کے بعد چھٹا کر کے اوپر سے ہلکا سا گہرا کر دیں۔ جب شگوفے زمین سے باہر نکل آئیں تو ہلکا پانی لگادیں۔ پہلا پانی بوائی کے 5-7 دن بعد لگائیں اور اس کے بعد وتر کا پانی لگاتے رہیں۔

دوران ذخیرہ مکئی کے بیج کے اُگاؤ کو متاثر کرنے والے عوامل اور بیج کو ذخیرہ کرنے کے بہترین طریقے

محمد عامر بختاور، ڈاکٹر عرفان افضل..... شعبہ ایگرونامی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

(Aflatoxin) پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ Aflatoxin سے متاثرہ اناج کو استعمال کرنے سے کیفر اور دیگر معدہ کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔

بیج کو ذخیرہ کرنے کے لئے Dry Chain کا اصول

تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیج کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ عمل دخل نمی اور درجہ حرارت کا ہے۔ دوران ذخیرہ گوداموں کا درجہ حرارت کم کر کے بیج کی جرمینیشن میں واقع ہونے والی کمی کی رفتار کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اگر اپنی ملکی توانائی کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو درجہ حرارت کو کم کرنے کے لئے مطلوبہ توانائی بجلی کی شکل میں یا تو میسر نہیں یا پھر ہمارے کسانوں کے پاس ایسی کوئی سہولت موجود نہیں۔ ایسی صورت حال میں بیج کو خشک کر کے نمی کو کم کرنا ہمارے کسانوں کے لئے نہایت ہی آسان اور سستا ترین طریقہ ہے۔ زرعی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بیج کو ذخیرہ کرنے کے لئے Dry Chain ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے۔ Dry Chain ٹیکنالوجی کے اصول کی بنیاد اس عمل پر ہے کہ پہلے بیج کو مکمل طور پر خشک کیا جائے اور پھر اس کو کسی ایسی پیکنگ میں محفوظ رکھا جائے جس میں بیج دوبارہ فضا سے نمی جذب نہ کر سکے اور دوران ذخیرہ اس میں نمی کا تناسب بڑھنے نہ پائے۔ اس مقصد کے لئے بیج ذخیرہ کرنے والے پلاسٹک بیگ جن میں سپر بیگ شامل ہیں، استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ سپر بیگ خاص خصوصیات کے حامل پلاسٹک سے تیار کئے جاتے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان میں سے نہ ہوا اور نہ ہی نمی گزر سکتی ہے جو کہ ان میں موجود بیج کی نمی کو بڑھنے سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ تجربات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر ملکی بیج میں نمی کا تناسب 8-10 فیصد رکھا جائے اور ان کو نمی سے حفاظت دینے والے سپر بیگ میں محفوظ کر لیا جائے تو نہ صرف بیج کی کالٹی محفوظ رہتی ہے بلکہ بیج دوران ذخیرہ نقصان پہنچانے والے کیڑوں اور فنجائی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی بنیادی شرط بیج کا خشک حالت میں ہونا ہے۔ اگر بیج میں نمی کا تناسب زیادہ ہو تو اس کو ہرگز سپر بیگ میں ذخیرہ نہ کیا جائے کیونکہ زیادہ نمی کی وجہ سے بیج کے اندر Metabolism اور خستگی کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں بیج کا اگاؤ بھی متاثر ہوتا ہے اور فنجائی کا حملہ بھی شدید اختیار کر جاتا ہے۔ اگر کسان حضرات Dry Chain اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خشک بیج کا ذخیرہ کریں تو نا صرف بہترین اگاؤ کا حامل بیج بوائی کے لئے میسر ہوگا بلکہ دوران ذخیرہ گودام کے اندر نقصان دہ کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہونے والی زہروں کے استعمال میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔

<<<<<<<>>>>>>>>

مکئی کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لئے اچھی کوالٹی کے بیج کا استعمال نہایت ہی ضروری ہے۔ بیج کی کوالٹی میں سب سے اہم جزو اس کا اگاؤ یعنی جنرینیشن ہے۔ بیج کے اگاؤ کو انحصار بیج اور گودام کے اندر نمی کے تناسب، گودام کے درجہ حرارت، ذخیرہ شدہ اناج پر حملہ کرنے والے نقصان دہ کیڑوں، فنجائی یا پھپھوندی سے لگنے والی بیماریوں اور شور بیج کے دورانیہ پر ہوتا ہے۔ دورانِ ذخیرہ بیج کے اگاؤ پر درج ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں:

نمی اور درجہ حرارت

نئی اور درجہ حرارت بیج کی شیلیف لائف اور اگاؤ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہترین بیج کے ذخیرہ کرنے کے رہنما اصول کے مطابق بیج کی نمی کا تناسب ایک فیصد اور ذخیرہ شدہ بیج کے گودام کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ کم کر دیا جائے تو بیج کے سنسور بیج کے دورانیہ کو دو گنا کیا جاسکتا ہے۔ گوداموں کے اندر نمی کے تناسب کو مناسب حد تک برقرار رکھنا بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ اگر فضا میں نمی زیادہ ہو تو بیج کے اندر نمی کا تناسب بھی بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہوا کے اندر نمی کا تناسب کم ہو تو بیج کے اندر نمی کا تناسب بھی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمی اور درجہ حرارت بیج کی وجہ سے بیج کے اندر ری ایکٹو آکسیجن سپر سپر پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ بیج کی Deterioration کے عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔

ذخیرہ شدہ اناج کے کیڑے

دورانِ ذخیرہ مکئی کے اوپر مختلف قسم کے ضرر رساں کیڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ گوداموں کے اندر مکئی کے بیج پر حملہ آور ہونے والے کیڑوں میں دانوں کا پروانہ، سوٹھ والی سسری، کچھرا اور آٹے کی سسری شامل ہیں۔ گوداموں کے اندر مکئی کا تناسب اگر 35 فیصد سے کم ہو تو ان تمام ضرر رساں کیڑوں کو با آسانی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ نمی اور درجہ حرارت میں ضرر رساں کیڑوں کی افزائش اور بڑھوتری کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔

فخجائی

دورانِ ذخیرہ مائیکرو میٹیل انفیکشن اور فنجائی کا حملہ ذخیرہ شدہ بیج کے مکمل طور پر خشک نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر گودام میں ذخیرہ شدہ اجناس کو نقصان پہنچانے والے کیڑے موجود ہوں اور نمی کا تناسب 65 فیصد سے زیادہ ہو تو بیج پر فنجائی کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بیج کے دانے گٹنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں یہ بیج نہ تو بوائی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اور نہ بطور اناج استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ فنجائی کی وجہ سے اس میں زہریلے مرکبات

☆ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر جو کسی کا قرض اس کے ذمہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کو یا خدا داد کرے یا ادا کرنے کی وصیت کسی ذمہ دار فرد/دوست کو کر دے۔ (بخاری)

☆ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غازی کو جہاد کا سامان دے دیا، اس نے بھی جہاد کیا اور جو شخص کسی غازی کے گھروالوں کی نگرانی اور خبر گیری میں لگا رہا اس نے بھی جہاد کر لیا۔ (بخاری)

الحديث

کپاس کی صاف چنائی

ڈاکٹر محمد فرخ سلیم، ڈاکٹر محمد سرور، ڈاکٹر محمد اشفاق واحد..... شعبہ ایگروانومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- کپاس پاکستان کی معاشیات اور اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔

برآمدات کے ذریعے کمائے جانے والے ذریعہ معاش میں کپاس کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے کپاس پاکستان میں 2805.7 ہیکٹر پر کاشت کی جاتی ہے جبکہ اوسط پیداوار 12768.9 ٹن ہے

پاکستان میں تقریباً 15 ملین لوگ کپاس کی کاشت اور اس کی مصنوعات کے پیشہ سے وابستہ ہیں جو کہ پورے ملک میں موجود تمام پیشہ ور افراد کا 30 فیصد ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ قسم کی کپاس کی کاشت کی جاتی ہے مگر چنائی میں آلودگی اور غلط چنائی کی وجہ سے عالمی منڈی میں اس کی قیمت تین سے چار سینٹ فی پاؤنڈ کم لگتی ہے۔ منڈی میں کپاس کے حوالے سے قیمت میں اضافہ کے لئے ضروری ہے کہ صاف چنائی کو یقینی بنایا جائے اور ہر ممکن حد تک اس کے معیار میں آلودگی کے اسباب کو کم یا دور کیا جائے۔

صاف ستھری چنائی کی اہمیت

گلابی سنڈی جیسے عناصر کپاس کے معیار کو آلودہ کر دیتے ہیں رنگائی کے دوران ہزاروں میٹر کپڑا ریشوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یا اپنا رنگ تبدیل کر کے اپنے گریڈ کو کم کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ متاثرہ روئی کا بھاء کم لگتا ہے۔ اس وجہ سے ملک کو زرمبادلہ میں ہر سال کئی ہزار ڈالر زکات نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ چنائی کرنے والی خواتین چنائی کرتے وقت بے دھیانی کے سبب روئی کے ساتھ پتے بھی چن لیتی ہیں جیسے عوامل کے دوران آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر پاکستان میں کاشت کی جانے والی کپاس کو تیسرے درجے میں شمار کیا جا رہا ہے اور ہر سال تقریباً 12 بلین نقصان کا سامنا درپیش ہے۔

کپاس میں آلودگی کی وجوہات اور اس کے اسباب

ٹیکسٹائل صنعت رکھنے والے ممالک کی متحدہ بین الاقوامی تنظیم (آئی۔ ٹی۔ ایم۔ ایف) کے مطابق کپاس میں 16 آلود کار ہیں جن میں بشمول سوت، پتے، کاغذ، پرندوں کے پر، دیت مٹی، شاپر، تیل، گریس، دھات، زنگ، مہر کا رنگ، ربڑ اور پلاسٹک شامل ہے۔ ان اجزاء کی موجودگی کی بناء پر کپاس کا معیار متعین کیا جاتا ہے۔

کپاس میں آلودگی کے اسباب

☆ منتقلی کے دوران سوت کی چادروں یا پلاسٹک کی تھیلوں کا استعمال

☆ غیر تربیت یافتہ چنائی کرنے والے مزدور

☆ وزن کو معیار پر ترجیح

☆ بارش سے متاثرہ ٹھیلیوں کی چنائی

☆ سٹورج کے غیر معیاری اقدام

صاف ستھری چنائی کو یقینی بنانے کے اقدام

1- 50 فیصد ٹینڈوں کے کھل جانے پر چنائی کریں۔

2- سورج نکلنے کے 4 گھنٹے بعد چنائی عمل میں لائیں تاکہ رات کی پڑی شبہم ٹھٹی سے خشک ہو جائے۔

3- نچلے حصے پر موجود کھلے ہوئے ٹینڈوں کو چھڑیوں، اوپر کے پتوں اور دوسری نقصان آور چیزوں سے بچانے کے لئے نیچے سے اوپر کی جانب چنائی کریں۔

4- چنائی کسی ماہر کی زیر نگرانی کروائیں اور چنائی کرنے والوں کو چنائی کے رہنما اصول بتائیں۔

5- چنائی کے اجرت کو معیار کی بنیاد پر ترجیح دیں۔

6- گلابی سنڈی یا اس سے متعلقہ متاثرہ ٹینڈوں کی چنائی نہ کریں لیکن اگر کرنا مقصود ہو تو علیحدہ تھیلوں میں جمع کریں۔

7- بنولے کی کوائٹی کو کورے سے بچانے کے لئے شدید سردی سے پہلے ٹینڈوں کی چنائی یقینی بنائیں۔

8- غلط چنائی سے ریشہ کچارہ جانے سے عالمی منڈی میں کم قیمت ملتی ہے لہذا اس صورت حال سے بچنے کے لئے امریکن کپاس کی 15 سے 20 دن کے وقفہ پر اور دیسی کپاس کی 8 دن کے وقفہ سے چنائی کریں۔

9- چونیوں کے پاس روئی جمع کرنے کے لئے سوتی کپڑا مہیا کریں۔

10- چنائی سے پہلے چونیوں کو اپنے بال وغیرہ ڈھانپنے کی تلقین کریں تاکہ وہ ان سے متعلقہ بیرونی عناصر تھیلوں میں شامل نہ ہوں۔

<<<<<<<>>>>>>>>

☆ گلابی سنڈی کی وجہ سے پھٹی کا پیلا پڑ جانا

الحديث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت امام ائیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: حسن و حسین علیہما السلام کہیں گم ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو، راوی کہتے ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ لیا اور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے (دیکھا کہ) حسن اور حسین علیہما السلام ایک دوسرے کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں اور ایک اژدھا اپنی دم پر کھڑا تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں (شہزادوں پر پہرہ دے رہا تھا)۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ اژدھا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سڑ گیا پھر کھسک کر پتھروں میں چھپ گیا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسین کریمین علیہما السلام کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو پونچھا اور فرمایا: میرے ماں باپ تم یقربان، تم اللہ عز وجل کے ہاں کثرتی عزت والے ہو۔

بیج کوٹنگ اور پیلنگ ٹیکنالوجی

ڈاکٹر عرفان افضل..... شعبہ انگریزی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

بیج کی کوالٹی کو بڑھانے کا جدید اور موثر طریقہ

اور پانی سمیت بائینڈر استعمال ہوتے ہیں۔

کوٹنگ اور پیلنگ میں استعمال ہونے والے اجزاء

☆ فلر (ٹھانی مواد)

یہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ بیج کے حجم، وزن اور شکل کو بڑھاتا ہے۔

☆ کیڑے مار دویات

یہ مختلف قسم کے حفاظتی مواد ہوتے ہیں جو کہ بیج کو مختلف قسم کی مٹی سے لگنے والی بیماریوں سے

محفوظ رکھتا ہے۔

☆ ہارمونز

یہ مختلف نباتاتی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ بیج کی پیداوار اور اُگاؤ کو بڑھاتی ہے اور بیج کو ماحولیاتی

تبدیلیوں سے بچاتے ہیں۔

حفاظتی پولیمرز

یہ مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں جو کہ بیج کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور یہ ایک بیج کو

دوسرے بیج سے نمایاں کرتے ہیں۔

☆ بائینڈر

یہ مائع شکل میں ہوتے ہیں جو کہ بیج کی ساخت کو برقرار رکھنے میں کام آتے ہیں۔

☆ اجزاء صغیرہ

طرح طرح کے ضروری عناصر جیسے کہ زنک، آئرن وغیرہ جو کہ بیج کی نشوونما کے لئے اہم

ہوتے ہیں۔

o بہتر اُگاؤ

o فصل کی یکساں کاشت

o فی ایکڑ بیج کی مقدار میں خاطر خواہ کمی

o پیداواری لاگت میں کمی

o بیج کو بہتر طریقہ سے محفوظ کرنے میں آسانی

o فی ایکڑ پودوں کی مناسب تعداد کے حصول میں آسانی

o بیج کی ترسیل میں آسانی

اچھا بیج، اچھی پیداوار فصل کے بہتر اُگاؤ اور منافع کی ضمانت ہوتا ہے۔ موجودہ وقت میں بیج

کی مناسب کاشت اور مقدار کا درست تعین انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں بیج کی کاشت کو

بہتر بنانے کے لئے سائنسی بنیادوں پر بہت کم کام کیا گیا ہے۔ موجودہ سائنسی دور میں بیج کی مناسب

کاشت اور مخصوص مقدار کا تعین انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں عام سطح پر نہ تو بیج کی کوالٹی کو مد نظر

رکھا جاتا ہے نہ ہی برداشت کے بعد اس کو صحیح طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ بیج کی کوالٹی کو بڑھانے اور

عام کسان کے لئے بہتر بیج کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لئے بیج کوٹنگ اور پیلنگ ٹیکنالوجی کو متعارف

کروایا گیا ہے۔ بیج کی کوٹنگ اور پیلنگ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی بیج کی کوالٹی ٹیکنالوجی میں

سب سے اہم اور وسیع پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہے۔

بیج کی کوٹنگ

بیج کی کوٹنگ میں بیج کے اوپر مختلف اشیاء کی ہلکی پرت چڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بیج کی شکل

یا حجم میں کوئی فرق رونما نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بیج کی کوالٹی میں اضافہ ہے۔ کوٹنگ میں

بڑے بیجوں کی کم لاگت کے ساتھ زیادہ پیداواری صلاحیت، بیماریوں کے خلاف مدافعت کو بڑھایا

جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بیج کو شور و غبار کے دوران کسی بھی قسم کی بیماری یا کیڑوں کے حملے سے بھی محفوظ

ہوتا ہے۔

بیج کی پیلنگ

اس ٹیکنالوجی میں چھوٹے حجم کے بیج جیسے کہ میتھی، پیاز اور گاجر وغیرہ کے حجم کو تبدیل کیا جاتا

ہے تاکہ ان کی کاشت کو آسان بنایا جاسکے۔ اس طریقہ کار میں بیج کی صورت گری کرنے کیلئے اگری

مواد کا اضافہ کر کے اس کی شکل اور حجم کو مخصوص حد تک بڑھایا جاتا ہے۔ پیلنگ کا بنیادی مقصد بیج کی

ترسیل کو آسان بنانا، مناسب فاصلے پر آسان کاشت اور بوائی کے وقت اس کی مناسب مقدار میں

مناسب مقام پر لگانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مختلف سائز کے بیج تجارتی طور پر بھی پیلٹ کئے

جاتے ہیں۔ بیج کی پیلنگ میں دو طرح کے عوامل شامل ہوتے ہیں جن میں پہلا مواد طبع کاری کے

کام آتا ہے جو کہ بیج کی سائز، شکل اور بیج کے وزن میں تبدیلی کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے بیج کا وزن

500-5000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا جو کوئی کثیر کثافتی مواد ہوتا ہے جو بیج پر لگائی جانے والے مواد

کی تہوں کو جوڑتا ہے۔ اس مقصد کے لئے نشاستہ جات، شکر، گم عربی، مٹی، سیلولوز، Vinyl کے پولیمر

حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین بن علیہما السلام کو اٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سواری بھی کیا خوب ہیں۔

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: (یا رسول اللہ ﷺ) یہ آپ کے بیٹے ہیں انہیں (اپنے فیضان نبوت میں سے) کچھ وراثت میں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسن کیلئے میری ثابت قدمی اور سرداری کی وراثت ہے اور حسین کیلئے میری طاقت و سخاوت کی وراثت ہے۔

الحديث

کھانے کی فصلوں میں بھاری دھاتیں: صحت کے خطرات اور تدارک

ڈاکٹر بشارت علی..... شعبہ ایگرونامی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

یازیدتی کا انحصار پودوں میں دو عوامل پر ہوتا ہے جس میں ایک نجات اور دوسرا برداشت ہوتا ہے۔ جڑوں کی دیواروں کا موٹا ہونا بھی بھاری دھاتوں کے جڑ میں اندراج کو روکتا ہے کیونکہ جڑ کی بیرونی جلد رکاوٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔

مٹی میں بھاری دھاتوں کا تدارک

خوراک کی حفاظت بہتر انسانی صحت کے لئے ایک عالمی ترجیح ہے لیکن آبپاشی کے لئے صنعتی یونٹوں سے نکلنے والے گندے پانی کا استعمال خوراک کی کوالٹی پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ مٹی میں بھاری دھاتوں کی آلودگی کو روک کر ہی ہم ان کو فصلوں میں جانے سے روک سکتے ہیں۔ بھاری دھاتوں کو کثرت کرنے کے لئے کئی طریقے استعمال کئے جا رہے ہیں۔ جن میں ہم فصلوں کو گندے پانی لگانے سے روکنا ہوگا کیونکہ مختلف کارخانوں سے نکلنے والے پانی میں بھاری دھاتیں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں اس لئے زرعی سائنسدان کسانوں کو نصیحت کرتے ہیں وہ فصلوں کو صاف ستھرا پانی لگائیں۔ گندے پانی کے استعمال کو روک کر ہم 85 فیصد بھاری دھاتوں کے فصلوں میں اندراج کو روک سکتے ہیں۔ نامیاتی مادے کو استعمال کر کے بھی ہم بھاری دھاتوں کے فصلوں میں اندراج کو روک سکتے ہیں کیونکہ نامیاتی مادے میں بھاری دھاتوں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس طرح یہ بھاری دھاتیں فصلوں کی جڑوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ زمین میں مٹی کے لئے فائدہ مند خوردبینی جانداروں کو استعمال کر کے بھی بھاری دھاتوں کے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ خوردبینی جاندار بڑی حد تک بھاری دھاتوں کی فصلوں میں منتقلی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پودوں کی پیداوار بڑھانے والے محلول (PGPR) بھاری دھاتوں کی جڑوں میں منتقلی کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ محلول جڑوں کی نشوونما اور زمین کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھاتے ہیں۔ نائٹرو فاس (NP) کا بھاری دھاتوں کے خلاف استعمال بھی آج کل ایک نئی تحقیق بن گئی ہے۔ نائٹرو فاس کا استعمال مہنگا ضرور ہے لیکن یہ بنیادی طور پر زراعت کی ترقی میں ایک اہم جزو بن چکا ہے۔

عالمی ادارہ صحت کی طرف سے دی گئی دھاتوں کی زمین کے اندر محفوظ حدود

بھاری دھاتیں	زمین کے اندر دھاتوں کی محفوظ حدود (mg/kg)
سیسہ (Pb)	<300
نیکل (Ni)	<75
کیڈمیم (Cd)	<3
زنک (Zn)	<300
آئرن (Fe)	<140
کرومیم (Cr)	<100
کاپر (Cu)	<36

(باقی صفحہ 19 پر)

بھاری دھاتوں کی آلودگی دن بدن پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور انسانی جسم کے لئے مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ اس آلودگی کی بنیادی وجوہات میں سر فہرست بڑھتی ہوئی صنعتی فیکٹریاں اور ان میں استعمال ہونے والا مادہ ہے۔ جب سے دنیا میں فیکٹریوں کی آبادکاریاں شروع ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھاری دھاتوں کی آلودگی میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اسی آلودگی کی وجہ سے پوری دنیا میں غذائی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ خطرناک قسم کی بھاری دھاتیں مثلاً مرکری (Hg)، کیڈمیم (Cd)، سیسہ (Pb) اور آرسینک (As) کو حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی افعال کے لئے غیر ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ مٹی فصلوں کی پیداوار کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بھاری دھاتوں کی آلودگی انسانی صحت کے ساتھ ساتھ مٹی کی زرخیزی کے لئے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ مٹی کے اندر رہنے والے خوردبینی جاندار بھی اس آلودگی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس آلودگی کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے تفہیم سے زمینوں میں مخصوص فصلوں کی منتقلی کا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لئے یہ آرٹیکل بھاری دھاتوں کی زمین میں ملاوٹ، ان کے انسانی جسم پر اثرات اور تدارک کے حوالے سے ہے۔

کھانے کی فصلوں میں بھاری دھاتوں کی وجہ سے انسانی صحت پر اثرات

زمین میں موجود بھاری دھاتوں کو سب سے زیادہ فصلیں اپنے اندر جمع کرتی ہیں اور پھر اس کو انسانی جسم میں منتقل کر دیتی ہیں۔ بھاری دھاتوں کی سبزیات اور کھانے والی فصلوں میں موجودگی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے جیسا کہ معدے کا کینسر، کمزور مدافعتی نظام، ذہنی بیماری اور غذائیت میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ انسانی صحت کا انحصار کھانے والی چیزوں کی پاکیزگی پر ہوتا ہے بھاری دھاتیں انسانی جسم کی ہڈیوں میں جمع ہوتی ہیں اور پھر اسی وجہ سے انسانی جسم میں غذائیت کی کمی کا باعث اور مدافعتی نظام کمزور ہو سکتا ہے۔ کچھ بھاری دھاتیں عورتوں میں بچے کی رحم میں نشوونما پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

سیسہ (Pb) کی غذا میں زیادتی انسانی جسم میں ذہنی بڑھوتری کو روک سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیسہ اور کیڈمیم انسانی جسم میں ہڈیوں کو کھوکھلا اور گردے بھی فیل کر سکتی ہیں۔ غذا میں آرسینک کی موجودگی کینسر اور سانس کی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔

بھاری دھاتیں زمین سے انسانی جسم میں کیسے داخل ہوتی ہیں؟

بھاری دھاتیں مٹی سے سانس کی شکل میں پودوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہر فصل کی بھاری دھاتوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ سبزیات جیسا کہ سلاڈ، پھلیاں، ٹماٹر بھاری دھاتوں کو زیادہ مقدار میں اپنے اندر جمع کر سکتی ہیں۔ بھاری دھاتوں کی فصلوں میں منتقلی میں پودوں کی جڑیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بھاری دھاتوں کی پودوں میں منتقلی کا انحصار جڑ کی اپنے اندرونی فنکشنز اور بیرونی ماحول پر ہوتا ہے۔ بھاری دھاتیں پانی کے ساتھ حل ہو کر پودوں کی جڑوں میں منتقل ہوتی ہیں اور اس کے بعد جڑ کی دیوار کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں۔ پودوں میں بھاری دھاتوں کی کمی

جڑی بوٹی مارز ہروں کے خلاف مدافعت کا تدارک

ڈاکٹر محمد ضیاء الحق..... شعبہ ایگرونامی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہیں۔

موجودہ سالوں میں جڑی بوٹی مارز ہر کے لگا تار استعمال کی وجہ سے روایتی طریقوں سے

جڑی بوٹیوں کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے۔

(v) بیج کا استعمال پانی کا ضیاع روکنے کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔

(vi) لمبے دورانیے کی ایسی فصل جس میں کھیلپوں کا فاصلہ زیادہ ہو، اس کے درمیان کو چھوٹے

دورانیے کی پھلی دار فصل کاشت کریں۔ اس سے نہ صرف زمین کی زرخیزی بڑھے گی بلکہ

جڑی بوٹیوں کو اگنے کے لئے کم جگہ ملے گی۔

جڑی بوٹیوں میں زہر کے خلاف مدافعت روکنے کے لئے ہدایات

3- جڑی بوٹی مارز ہروں کا ہیر پھیر اور ان کا تدارک

جڑی بوٹی مار پروگرام میں ایسی زہریں شامل کرنی چاہیں جن کا پودے کے اندر ہدف

مختلف ہو۔

جڑی بوٹی مارز ہر کے خلاف مدافعت کی روک تھام زیادہ آسان اور مستحکم انتخاب ہے

بہ نسبت اس کے کہ جب جڑی بوٹیوں میں زہر کے خلاف مدافعت کی تصدیق ہو جائے۔

جڑی بوٹیوں کے کیڑوں کا مربوط طریقہ کار

1- فصلوں کا ہیر پھیر

(i) ایک ہی جڑی بوٹی مارز ہر یا زہر جن کا پودے کے اندر ہدف ایک ہی ہو اس کے استعمال

سے بچنا چاہیے۔

فصلوں کے ہیر پھیر کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی کھیت میں لگانا ایک طرح کے اثر رکھنے والی

جڑی بوٹی مارز ہر استعمال نہ کی جائے۔

(ii) ایک فصل کے دورانیے میں بار بار ایک ہی زہر کا استعمال نہ کریں۔

(iii) اگر ممکن ہو تو ایسی زہروں کا استعمال کریں مختلف زہروں کا مرکب جو کہ پودوں کے اندر

مختلف ہدف رکھتی ہوں جبکہ ایک ہی طرح کی جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں۔

(i) جب ہم ایک کھیت میں مختلف طرح کی فصلیں اگائیں گے تو جڑی بوٹی مارز ہر بھی مختلف

اثر رکھنے والا استعمال ہوگا۔ نسبت اس کے کہ ہم ایک طرح کی فصل بار بار لگاتے رہیں۔

(ii) مختلف طرح کی فصلیں اگانے سے کھیت میں پہلے سے موجود جڑی بوٹیوں کے دورانیہ

حیات میں خلل پڑ جائے گا۔

(iv) اگر ضرورت ہو تو فصل کو بونے سے پہلے گاٹی نو سیٹ سے ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو مارا

جاسکتا ہے۔

عام ہدایات

2- کاشتکاری طریقہ کار سے تدارک

1- کسان اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے کس کھیت میں کوئی جڑی بوٹی اگتی ہے اور اس

کی کثافت کتنی ہے آیا کہ اس کی کثافت معاشی در سے اوپر ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے

کنٹرول کرنے کی تدابیر شروع کر دے۔

کاشتکاری طریقہ کار سے جڑی بوٹیوں کے تدارک کی وجہ سے زمین میں پہلے سے موجود

جڑی بوٹیوں کے بیج کا ذخیرہ کم ہوگا۔

(i) فصل اگانے سے پہلے کھیت میں موجود جڑی بوٹیوں کو ہل چلا کر کھیت میں دبا دینا

چاہیے۔

(ii) فصلوں کا تصدیق شدہ اور جڑی بوٹیوں سے پاک بیج استعمال کریں۔

(iii) کھیت کے نلے پر جالی لگا کر پانی کے ذریعے آنے والے بیجوں کو روکنا چاہیے۔

(iv) فصل کٹ جانے کے بعد کھیت میں موجود جڑی بوٹیاں جانوروں کو بطور چارہ ڈالی جاسکتی

2- جڑی بوٹی مارز ہر استعمال کرتے ہوئے پیکٹ پر موجود ہدایت سے زیادہ دوائی نہ ڈالی

جائے۔

3- زہر سپرے کرنے کے بعد تو اتر سے کھیت کا معائنہ کریں اور اس بات پر نظر رکھیں کہ کوئی

جڑی بوٹی سپرے کے بعد بھی زندہ تو نہیں رہ گئی۔

اس کی خوراک 3 فیصد خشک مادہ بلحاظ جسمانی وزن فراہم کریں۔ دودھ دینے والی گائے، بھینسوں کو

روزانہ 15 کلو سے 20 کلو تک سائیلج ہمراہ وٹدہ دیا جائے جس سے دودھ میں اضافہ ہوگا۔

سائیلج کی مانگ

وقت کے ساتھ ساتھ سائیلج کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کو تیار کرنے میں کم پیسے لگتے

ہیں اور جانوروں کو زیادہ انرجی ملتی ہے اور اس طریقے سے ہم جانوروں سے زیادہ دودھ حاصل کر سکتے

ہیں اور جانوروں کو بہتر وقت میں ہم بہتر خوراک مہیا کر سکتے ہیں۔

بقیہ: پاکستان میں سائیلج کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی مانگ

☆ مزدوری کے اخراجات میں کافی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔

سائیلج کا استعمال

جانور سائیلج کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن عین ممکن ہے کہ مویشی شروع میں ہچکچاہٹ کا

مظاہرہ کریں اسی صورت میں سبز چارے یا وٹدے سے ملا کر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں

پاکستان میں سائیلج کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی مانگ

سمیرا اکرم، بینش علی، زرینہ بتول، محمد اشفاق، ڈاکٹر شکیل انجم..... شعبہ ایگریکولٹی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

سائیلج کیا ہے؟

چارے کو اس کی غذائیت ضائع کئے بغیر دیر تک محفوظ رکھنے، اس کے معیار اور ذائقہ کو بہتر بنانے اور زود ہضم بنانے کے لئے ہوا بند پیک کیا جاتا ہے اس طریقہ سے بننے والی پراڈکٹ کو سائیلج کہتے ہیں۔

سائیلج بنانے کے لئے استعمال ہونے والی فصلیں

مکئی، گھاس، جو، گندم، باجرا، جوار، سہ شاخہ، لوسن، رائی اور پھلی دار پھودے سائیلج بنانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں لیکن پاکستان کی موجودہ صورت حال میں مکئی کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔

سائیلج بنانے میں مکئی کی اہمیت

زرعی اجناس میں سے مکئی دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار دینے والی فصل ہے اور پاکستان میں یہ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مکئی کا سائیلج جانوروں کے لئے بہترین فیڈ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں مکئی، گندم اور چاول کے بعد تیسری سب سے بڑی فصل ہوتی ہے یہاں مکئی کا رقبہ 1.3 ملین ہیکٹر ہے اور پیداوار 6.3 ملین ٹن ہے۔

مکئی کی غذائی اہمیت

غذائیت کے اعتبار سے مکئی میں سٹارچ (72 فیصد)، پروٹین 10 فیصد اور تیل 4.8 فیصد ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت سے اہم وٹامنز (وٹامن اے، بی، سی، پرو وٹامن) کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ مزید برآں مکئی ریشے کا بھی اچھا ذریعہ ہے۔

سائیلج بنانے کے لئے جگہ کا انتخاب

- ☆ سائیلج بنانے کے لئے جگہ کی رسائی ڈیری فارم اور کھیتوں دونوں تک ہونی چاہیے۔
- ☆ رہائشی علاقے سے دور ہونی چاہیے۔
- ☆ ٹریکٹر آسانی سے جگہ تک پہنچ سکے۔
- ☆ پانی کے تالاب سے اس جگہ کا فاصلہ 60 میٹر ہونا چاہیے۔
- ☆ اسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں درخت آس پاس نہ ہوں۔ باڑے کے نزدیک ہونی چاہیے۔

سائیلج بنانے کا عمل

سب سے پہلے مکئی میں نمی کی مقدار چیک کریں اس میں نمی کا تناسب 65-70 فیصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مکئی کو کھیت سے براہ راست کاٹنے کے لئے ٹوکا استعمال کریں تاہم ٹریکٹر کی شافٹ یا بجلی کا موٹر والا ٹوکا بھی کترائی کے عمل کو تیزی سے سرانجام دینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کترائی کے دوران چارے کا نقصان کم سے کم ہو۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو سائیلج بنانے والے گھڑوں میں دبائیں تاکہ ممکن حد تک ہوا کو دور کیا جاسکے۔ مکئی کو دبانے کے بعد اسے مضبوط واٹر پروف پلاسٹک سے ڈھانپ دیں تاکہ مکئی میں ہوا اور پانی کا داخل نہ ہو۔ سائیلج استعمال کے لئے تیار ہونے میں تقریباً 15 سے 20 دن لگتے ہیں۔

سائیلج کو سنور کرنے کے لئے گھڑے بنانے کا طریقہ

کترے ہوئے چارے کو نسبتاً کسی اونچی جگہ پر گڑھا کھود کر یا زمین کے اوپر دبا کر سنور کیا جاتا ہے تاہم بہتر یہ ہے کہ اس کے لئے مناسب اونچی جگہ پر پختہ بنکر بنالینا چاہیے تاکہ چارہ ضائع ہونے کا احتمال کم سے کم ہو۔ سنور تاج کی جگہ انتخاب کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جگہ باڑے کے نزدیک ہو، اونچی جگہ ہوتا کہ بارش کا پانی کھڑا نہ ہو سکے اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جگہ سبز نہ ہو۔ بنکر کے تین طرف پختہ مضبوط 18 انچ سے 27 انچ سے موٹی دیواریں ہوتی ہیں اور فرش کنکریٹ کی مدد سے تھوڑا عموماً بنایا جاتا ہے۔ ایک مکعب فٹ میں 25 سے 30 کلوگرام سائیلج سنور ہو سکتا ہے۔

سنور کرنے کے دوران احتیاطی تدابیر

- ☆ چارے کو چھوٹے سائز میں کاٹیں۔
- ☆ دبائے کے عمل کے دوران گرد و غبار اور ٹریکٹر کے ٹائروں کو مٹی پر جانے سے محفوظ رکھیں۔
- ☆ بنکر کی بھرائی تیزی سے کریں۔
- ☆ سائیلج کو اچھی طرح پیک کریں تاکہ ہوا اور پانی کا داخل نہ ہو۔
- ☆ چارے کو ہر 6 سے 9 انچ تہہ لگانے کے بعد اس کو ٹریکٹر کے ساتھ پیک کرنا چاہیے۔

سائیلج کو کھولنا

چالیس دنوں کے بعد سائیلج جانوروں کو کھلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سائیلج کھولنے کے لئے پلاسٹک شیٹ کو پیچھے ہٹائیں سائیلج کو اچھی طرح کاٹیں جیسے ایک کانکڑا اوپر سے نیچے کی طرف کاٹا جاتا ہے باقی ماندہ سائیلج کو کھلا مت چھوڑیں بلکہ حسب ضرورت نکالنے کے بعد فوراً ڈھانپ دیں۔

ناقص سائیلج کی وجوہات

اگر سائیلج بنانے کے دوران ایسڈ کافی مقدار میں پیدا نہیں ہوتا تو یہ تیزابیت (Fermentation) کے عمل کو روک دے گا اور ناپسندیدہ بیکٹیریا پروٹین خراب کرنے کا سبب بنیں گے جس کے نتیجے میں بد ذائقہ اور پتلا سائیلج بنے گا جس کو جانور کھانا پسند نہیں کریں گے اور اس طرح سے سائیلج کا ضیاع ہوگا۔

نمی کی مقدار

جب چارے میں نمی کی مقدار زیادہ ہوگی تو سائیلج کی بھرائی اچھی طرح نہیں ہوگی اور ساس میں ہوا کی مقدار بھی زیادہ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں سائیلج گل سڑ جائے گا البتہ نمی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے بھی تیزابیت کا عمل کم ہو جائے گا۔

سائیلج کے فوائد

- ☆ چارہ کی چھوٹی عمر کے وقت چارے کا ایک سستا متبادل ہے۔
- ☆ سائیلج چارے کو زود ہضم بناتا ہے۔
- ☆ اگلی فصل کے لئے تاخیر کے بغیر زمین دستیاب ہو جاتی ہے کیونکہ چارے کو کاٹ کر ایک ساتھ سنور کیا جاتا ہے۔

(باقی صفحہ 24 پر)

مرچ کی فصل پر حملہ کرنے والی بیماریاں اور ان کا تدارک

عامر گلزار، احمد نواز..... شعبہ حشریات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اہمیت

مرچ کی فصل کی ابتداء پیرو، برازیل اور ویسٹ انڈیز سے ہوئی۔ سترہویں صدی میں یہ ہندوستان میں متعارف کرائی گئی۔ یہ ایک مصلحہ دار سبزی ہے جس میں بڑی مقدار میں وٹامن سی جبکہ وٹامن اے، بی اور نمکیات کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ صوبہ پنجاب میں گرمیوں کی فصل ہے۔ پاکستان میں مرچ کی کل پیداوار 90 ہزار ٹن ہے۔ پنجاب میں مرچ 6842 ہیکٹر رقبے پر کاشت کی جاتی ہے جس کی پیداوار 11698 ٹن ہے۔ جبکہ سندھ میں مرچ 38 ہزار ہیکٹر رقبے پر کاشت ہوتی ہے۔ جس کی پیداوار 53 ہزار ٹن ہے۔

شرح بیج اور پنیری کا موزوں وقت

مرچ کی عام اقسام کے لئے 250 گرام بیج فی ایکڑ کے حساب سے درکار ہوتا ہے جبکہ باہرڈ اقسام کے لئے 120 تا 150 گرام بیج درکار ہوتا ہے۔

پنجاب میں نسری کی کا وقت اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ وقت کورانہ پڑنے والے علاقوں کے لئے موزوں ہے۔ سرد علاقوں میں نسری فروری اور مارچ میں کاشت کی جاتی ہے۔ اکتوبر کے آخر میں کاشت کی جانے والی پیڑی 10 تا 15 فروری تک کھیت میں منتقل کر دی جاتی ہے جس وقت پودے کا قد 10 تا 12 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔

چنائی

اس کی چنائی مئی کے آخر اور جون کے شروع میں ہوتی ہے۔

پیماریاں

مرچ کے تنے کا اکھیڑا (Collar Rot)

یہ بیماری collectotrichum پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں تناز مین کے قریب سے گل جاتا ہے۔ آخر میں سارا پودا سوکھ جاتا ہے۔

تدارک

☆ بیج کو پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔

☆ بیماری کی صورت میں سفارش کردہ زہروں آزوکسی سٹروبن (azoxystrobin) اور ڈائی فینا کونازول (difenacoazole) کا سپرے کریں۔

☆ زیادہ حملہ کی صورت میں تھائیوفینٹ میتھائل (thiophenate methyl) اور کوروفینٹل (chlorophenol) کا سپرے کریں۔

پتہ مروڑ وائرس (Leaf curl virus)

یہ بیماری جولائی اگست میں بارش میں نمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سفید کمی اس کا سبب ہے۔
یہ مزہڑ جاتا ہے اور پھل چھوٹا رہ جاتا ہے۔

<<<<<<<>>>>>>

- ☆ سفیدکھجی کا خاتمہ کریں۔
- ☆ متاثرہ پودے زمین میں دبا دیں۔
- ☆ زیادہ حملے کی صورت میں فلو نیکاڈ (flonicamid)، سپارو ٹیٹرا میٹ (spirotetramate) ایسٹامپریڈ (acetamprid) کا سپرے کریں۔

مرچ کا کوڑھ (Anthracnose of chilli)

یہ بیماری چھوٹے گہرے دھبوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دھبوں کے پھیلنے کی وجہ سے پھل کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ آخر میں سارا پھل سیاہ ہوجاتا ہے۔ یہ پھپھوندی کی بیماری ہے۔

تدارک

☆ پچھوندی کش زہروں کا استعمال کریں۔
☆ ٹیبو کونا زول (tebuconazole) اور فلاکسی سٹروبن (floxystrabin) اور تھیا فینٹ میتھائل (thiophenate methyl) کا سپرے کریں۔

مرچ کا مرجھاؤ (Wilt)

اس بیماری کا سبب *fussarium oxysporum* ہے۔ پتے پیلے ہو کر مر جھا جاتے ہیں اور تنے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔

تدارک

بیج کو پھینک دے گی۔ بیج زہر لگا کر کاشت کریں۔

درج ذیل زہروں کا سپرے کریں۔

تھائیو فیٹ میتھائل (thiophate methyl)، کلورو فیوئل
(chlorophenol) ایزوکسی سٹروبن (azoxystrobin)

Damping off

اس بیماری کا سبب pythium پھپھوندی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بیج اگتے نہیں اور گل سڑ جاتے ہیں۔ پودا زمین کے قریب سے سڑ جاتا ہے۔

تدارک

☆ بیچ کو پھینھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔

☆ گھنی بیجائی نہ کریں۔

☆ بیچ زیادہ گہرا نہ ہوئیں۔

☆ پھپھوندی کش زہروں کا سپرے کریں۔

ہلدی کی کاشت

ڈاکٹر چوہدری محمد ایوب، منور احمد نور..... شعبہ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف و اہمیت

کھرپے کی مدد سے 5 سینٹی میٹر گہرا دبا دیں اور کاشت کے بعد کھیت پر کما دی کھوری کی 2-3 سینٹی میٹر موٹی تہہ بچھا دیں۔ ہلدی کو 1/2 میٹر کے فاصلے پر بنائی ہوئی 12-15 سینٹی میٹر اونچی پٹریوں پر بھی کاشت کیا جاتا ہے۔

آب پاشی

پہلا پانی بوائی کے فوراً بعد لگائیں اور پھر اپریل سے جولائی تک ہر سات دن کے وقفے سے پانی لگاتے رہیں جبکہ موسم برسات میں یہ وقفہ بڑھا دیا جاتا ہے۔

گوڈی

فصل سے خود رو جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لئے 2-3 بار گوڈی کریں اور پودوں پر مٹی چڑھاتے رہیں۔

کھادوں کا استعمال

بوائی کے وقت دو تین بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور ایک بوری پوناش ڈالیں بعد میں جب جولائی میں بارشیں شروع ہو جائیں تو گوڈی کرنے کے بعد 50 کلوگرام پوریا کھاد فی ایکڑ ڈالیں اور آب پاشی کر دیں۔ اسی طرح بقیہ 50 کلوگرام پوریا بعد میں ڈالیں تو بہتر پیداوار لی جاسکتی ہے۔

برداشت اور سنبھال

دسمبر کے آخر میں جب پتے سوکھ جائیں تو فصل برداشت کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی برداشت بڑی احتیاط سے کسی یا کھرپے کی مدد سے کرنی چاہیے تاکہ گھٹیاں زخمی نہ ہوں بعد میں اس کو پانی سے دھولیں اور دھوپ میں ایک دن کے لئے خشک کریں اور پھر مختلف سائز کی درجہ بندی کے بعد بوریوں میں بند کر کے فروخت کریں۔

اقسام

زیادہ تر لوکل اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔

پیداوار

3.5-2.5 ٹن تک تازہ ہلدی فی ایکڑ آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

ہلدی موسم گرما کی مشہور نفع بخش فصل ہے اسے روزمرہ کھانوں میں رنگت اور ذائقے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ طبی کتبہ نگاہ سے اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ یہ مصفی خون ہے اور بہت سی ادویات میں استعمال ہوتی ہے۔ ذیابیطس جیسی مہلک بیماریوں کے لئے بے حد مفید ہے کچی ہلدی کو سو جی کے ساتھ ملا کر گھی میں بھون کر اس میں چینی کی مناسب مقدار ڈال کر مٹھائی بنائی جاتی ہے۔ اگر اس کو جنوری، فروری میں استعمال کیا جائے تو گرمیوں میں پھوڑے پھنسیاں اور پت وغیرہ نہیں نکلتی اقتصادی طور پر بھی ہلدی بہت سی فصلوں سے زیادہ نفع بخش ہے۔

موسم اور آب و ہوا

ہلدی معتدل مرطوب آب و ہوا میں اچھی فصل دیتی ہے۔

زمین اور اس کی تیاری

ہلدی کی کاشت کے لئے زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو بہتر رہتی ہے۔ کھیت کو ہر طرح سے ہموار کریں تاکہ بارش کا پانی کھڑا نہ ہو۔ کھیت میں نامیاتی مادہ کافی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لئے 20-25 ٹن گوبر کی کھاد فی ایکڑ ڈالی جاسکتی ہے۔ کاشت سے پہلے دو بوری کھاد ڈی اے پی ڈالنے سے خاطر خواہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

وقت کاشت

ہلدی کی کاشت کا بہترین وقت وسط مارچ سے وسط اپریل ہے جبکہ فصل اگلے سال ماہ جنوری میں برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔

شرح بچ

700-800 کلوگرام بیج کی فی ایکڑ ضرورت ہوتی ہے۔

طریقہ کاشت

ایک ایکڑ کاشت کرنے کے لئے ہلدی کے بچوں میں سے 600-700 کلوگرام ہلدی کی درمیان والی موٹی گھٹیاں چن لیں اور چاقو سے ان کے دو ٹکڑے کر لیں۔ ہموار زمین پر نصف میٹر پر قطاروں میں پودے سے پودے کا فاصلہ 15-20 سینٹی میٹر رکھ کر کاشت کریں۔ ہلدی کے بیج کو

احادیث

☆ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمانؓ سے روایت ہے کہ ان کا بعض لوگوں سے زمین کے بارے میں جھگڑا تھا تو یہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا: اے ابوسلمہ! زمین سے بچو کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے جو بالشت بھر زمین بھی ناجائز دباے گا تو قیامت کے روز اتنی زمین کا سات زمینوں سے طوق بنا کر اس کی گردن میں پہنایا جائیگا۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز میں مصروف شمار کیا جاتا ہے جب تک نماز اسے دوسرے کاموں سے روکے رکھے اور جب تک وہ نماز کی جگہ سے نہ اٹھ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے اس وقت تک فرشتے یوں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔

☆ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔

آلو، مرچ اور ٹماٹر کی اہم بیماریاں

صہیب سرفراز، ڈاکٹر شہباز طالب ساہی..... مالکیہ لٹریچر تحقیقاتی تجربہ گاہ برائے جراثیم شعبہ امراض نباتات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

5۔ سٹرپٹو مائیسین سلفیٹ کو کیمیائی تدارک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے نتائج 20 فیصد سے بھی کم ہیں۔

مرچ کا مرجھاؤ

مرچ کی فصل پاکستان میں معاشی لحاظ سے اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان میں مرچ کی کاشت تقریباً 63.6 ہزار ہیکٹر پر کی جاتی ہے جس سے تقریباً 1718 ہزار ٹن پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان، انڈیا، چائنا، میکسیکو کے بعد مرچ کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہے۔ چونکہ مرچ کی فصل کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن میں سے ایک مرچ کا مرجھاؤ ہے (Bacterial wilt) جو کہ ایک جراثیم (بیکٹیریا) *Ralstonia solanacearum* کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جراثیم بہت سے دوسرے پودوں جیسے کہ ٹماٹر، آلو، بیٹنگن وغیرہ میں بھی بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ جس بنا پر اسے آنے والے وقت میں خطرناک جراثیم (بیکٹیریا) قرار دیا گیا ہے۔

علامات

پودے کا مرجھاؤ نیچے والے پتوں اور ٹہنیوں سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک پھیل جاتا ہے مرجھائے ہوئے پتے پہلے اور ان کے کنارے سیاہ رنگ کے ہوجاتے ہیں اور آخر کار مکمل پودا مرجھا جاتا ہے اور مرجھائے ہوئے پودے کے تنے کو اگر کاٹا جائے تو اس میں سے جراثیم کا مادہ (Bacterial ooze) نکلتا ہے۔

جراثیم کا پھلاؤ

یہ جراثیم (بیکٹیریا) زمین بیمار پودوں اور پودوں کے باقیات وغیرہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے ایسی زمین جہاں یہ جراثیم موجود ہوں اسے دوبارہ مرچ یا ٹماٹر کیلئے استعمال کرنا موزوں نہیں کیونکہ یہ جراثیم مٹی میں زندہ رہتا ہے۔

جراثیم کا پھیلاؤ

یہ جراثیم کئی طریقوں سے پھیلتا ہے اور ایک بیمار پودے کی جڑ سے دوسرے صحت مند پودے کی جڑوں تک آرام سے پھیل سکتا ہے اسی طرح بیمار پودوں سے پانی کے ذریعے سے بھی یہ جراثیم دوسرے پودوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔

جراثیم کا بیماری پھیلانے کا عمل

یہ جراثیم قدرتی سوراخوں (Stomata) یا زخموں سے پودوں میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد یہ پورے پودے میں پانی اور خوراک کے ترسیل کے عمل کو روک دیتا ہے۔ جسے (Blockage) یعنی رکاوٹ کہتے ہیں اور توانائی نہ پہنچنے کی وجہ سے پورا پودا مرجھا جاتا ہے۔

تدارک

1۔ بہت سی کیمیائی ادویات (Pesticides) اس جراثیم (بیماری) کے خلاف بے اثر ثابت ہو چکی ہیں اور اب انہیں کنٹرول کیلئے تجویز بھی نہیں کیا جاتا۔
2۔ صحت مند اور سرٹیفائیڈ نرسری استعمال کرنے سے اس بیماری کا تدارک کسی حد تک ممکن ہے مگر

آلو کے تنے کا سڑاؤ

آلو ہمارے ملک کی اہم نقد آور فصلوں میں سے ایک ہے۔ ملکی اور غیر ملکی منڈیوں میں اس کی مانگ ہے۔ آلو غذائی اعتبار سے بھی نہایت اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ اس میں جیاتین، نشاستہ اور لحمیات عمدہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آلو کی سالانہ پیداوار تقریباً 3726.5 ہزار ٹن ہے رقبہ اور پیداوار کے لحاظ سے پنجاب پہلے اور خیبر پختونخواہ دوسرے نمبر پر ہے۔ دور حاضر میں کچھ ایسی بیماریاں کاشتکاروں کیلئے وبال جان بنی ہوئی ہیں جن میں آلو کے تنے کی سڑاؤ اور آلو کی نرم سڑاؤ شامل ہیں۔ ایک جو کہ زیر بحث ہے وہ آلو کے تنے کا سڑاؤ (بلیک لیگ) ہے۔ یہ بیماری بیکٹیریا (جراثیم) کی قسم (Pecto Bacteria) کی وجہ سے ہوتی ہے۔

علامت

اس بیماری کے باعث زمین سے اوپر کا تنہا رنگ ہوجاتا ہے اسی لئے اس کو سیاہ سڑاؤ بھی کہتے ہیں۔ تنے کو دبائے سے رنگ کا مواد بھی نکلتا ہے جو اس بیماری کی خاص علامت ہے۔ بیمار پودے کے نیچے لگے آلو بھی گل سڑ جاتے ہیں اور ان میں سے بد بو آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری کی وجہ سے پودا ذم میں چھوٹا، مرجھاؤ پتوں کا پیلا ہونا بھی شامل ہے۔ بیمار آلو جب Cold Storage میں رکھے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ آلوؤں کے گلنے سڑنے کے عمل کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی یہ بیماری کھیتوں سے لے کر Cold Storage تک آلو کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کھیتوں میں یہ بیماری پودوں کی آخری مرحلے میں نمودار ہوتی ہے نتیجتاً تانیے سے اوپر تک سیاہ ہوجاتا ہے اور کچھ دنوں میں اتنا گل سڑ جاتا ہے۔

بیماری اور جراثیم کا پھیلاؤ

1۔ یہ جراثیم سٹومیٹا، زخموں یا سٹولن کے ذریعے پودے میں داخل ہوتا ہے۔
2۔ بیمار آلو کے بونے سے بیماری ایک پودے سے آہستہ آہستہ پوری فصل میں پھیل جاتی ہے۔
3۔ کھیتوں میں جراثیم تندرست پودوں اور آلو ٹیوبر میں، زخموں، کیڑوں، ہوا اور بارش سے پورے کھیت میں پھیل جاتی ہے۔

(بیکٹیریا) جراثیم کا ماحول

ان جراثیم کو نمندار، ٹھنڈے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ 25 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک تیزی سے بیماری پھیلاتے ہیں۔ یہ جراثیم آلو (ٹیوبر) اور پودے پر اپنی نشوونما مکمل کرتا ہے۔

تدارک

1۔ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کی کاشت کی جائے۔
2۔ آلو کو کٹے اور برداشت کرتے وقت خراش اور زخموں سے اجتناب کیا جائے۔
3۔ گودام میں محفوظ کرتے وقت درجہ حرارت 12-15 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ نمی 90 فیصد سے تجاوز نہ کر لے۔
4۔ کاشت سے پہلے بیج کو مناسب وقت کیلئے زہر آلود ادویات میں بھگوایا جائے۔

بڑھوتری کے لئے مناسب درجہ حرارت 25-30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔

جراثیم کا پھیلاؤ

یہ جراثیم کئی طریقوں سے پھیلتا ہے اور ایک بیمار پودے کی جڑ سے دوسرے صحت مند پودے کی جڑوں تک آرام سے پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح بیمار پودوں سے پانی کے ذریعے سے بھی یہ جراثیم دوسرے پودوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔

جراثیم کے بیماری پھیلانے کا عمل

یہ جراثیم بیمار پودوں کی باقیات سے یا پودے کی سطح پر موجود زخموں سے پودے میں داخل ہوتا ہے اور ترسیلی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں پودا مرجھا جاتا ہے اور فصل تباہ ہو جاتی ہے۔

تدارک

- 1- بہت سی کیمیائی ادویات (Pesticides) اس جراثیم (بیماری) کے خلاف بے اثر ثابت ہو چکی ہیں اور اب انہیں کنٹرول کیلئے تجویز بھی ہے۔
- 2- صحت مند اور سرٹیفائیڈ نرسری استعمال کرنے سے اس بیماری کا تدارک کسی حد تک ممکن ہے مگر اس کیلئے (Resistant) ورائٹی کا ہونا ضروری ہے۔
- 3- فصلوں کا پھیراؤ کرنے سے بھی بیماری کو کم کرنا ممکن ہے۔

اس کیلئے (Resistant) ورائٹی کا ہونا ضروری ہے۔

3- فصلوں کا پھیراؤ کرنے سے بھی بیماری کو کم کرنا ممکن ہے۔

ٹماٹر کا مرجھاؤ

ٹماٹر دنیا کی اہم ترین سبزیوں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ یہ کم عرصے میں زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ پاکستان میں ٹماٹر کی مختلف ورائٹیز تقریباً 52,300 ہیکٹر پر کاشت کی جاتی ہے جو کہ سالانہ 530,000 ٹن پیداوار دیتی ہیں۔ پاکستان ٹماٹر کی پیداوار میں دنیا میں نویں نمبر پر موجود ہے۔ اہم ترین ورائٹیز میں مینی میکر، روما اور ریوگرنڈ شامل ہیں اور یہ یورپ سے درآمد شدہ ہیں ٹماٹر کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں ایک اہم ٹماٹر کا مرجھاؤ ہے اور یہ بیماری ایک بیکٹیریا یا *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* ہے۔

علامات

ابتدائی طور پر بیمار پودے کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پورا پودا مرجھا جاتا ہے۔ مرجھائے ہوئے پودے کے تنے کو کاٹ کر دیکھا جائے تو اس میں سے بدبودار جراثیمی مادہ نکلتا شروع ہو جاتا ہے۔

جراثیم کا پھیلاؤ

یہ بیکٹیریا بیمار پودوں یا زمین میں تلف شدہ باقیات میں محصور ہو جاتا ہے جبکہ اس بیکٹیریا کی

خطہ پٹھوہار میں گل کاغذ کی پیداوار

بقیہ:

قسم	رنگ	تفصیل
کریمنس جیول (Crimson Jewel)	گلابی یا نارنگی	چھوٹے قد کی حامل جھاڑی نما پودا جو گلوں میں اکاؤ کے لئے نہایت موزوں ہے۔
ڈبل پینک (Double Pink)	گلابی	اس قسم میں خوشنما پتیاں گچھوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔
الیزبیتھ انکس (Elizabeth Axcne)	بنفشی	صحتمند بڑھوتری جس کی وجہ چمکدار مگر گہرے سبز پتے ہوتے ہیں۔ گل کاغذ کی اس قسم میں پھول کا رنگ پیلا اور حجم میں بڑا ہوتا ہے۔ اس قسم میں کانٹے بڑے مگر اندر کی طرف جڑے ہوتے ہیں۔
گولڈن گلو (millaria gold queen, hawania gold)	تیز سبزی، سرخی مائل سنہری	اس قسم میں پودا صحتمند مگر کھڑا ہوتا ہے۔ اس قسم میں پتے گول اور بڑے حجم میں پائے جاتے ہیں۔
گولڈن سر (Golden Summer)	سفید	گل کاغذ کی تغیر یافتہ سنہری / پیلی قسم جس میں سبز گہرے رنگ کے پتے پائے جاتے ہیں۔ اس کی بریکٹس بڑی ہوتی ہیں۔ یہ قسم سال بھر پھول پیدا کرتی ہے۔ اس قسم میں کانٹے درمیانے حجم کے ہوتے ہیں تاہم یہ ہلکے سے مڑے ہوتے ہیں۔
جین سنوک (Jane Snook)	گلابی	گل کاغذ کی اس قسم میں پودا قدرے سخت، گھٹا اور سیدھا پایا جاتا ہے۔ اس میں بریکٹس لمبی اور بڑی ہوتی ہیں۔
لیڈی ہڈسن (Lady hudson)	گلابی مائل زرد	اس قسم کی شاخیں لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر جب پودا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس قسم کے پتوں کی اگلی سطح چوڑی اور سبز ہوتی ہیں۔ اس کی بریکٹس چھوٹی ہوتی ہیں۔

زیر نظر مضمون دراصل ایک انگریزی مضمون کا ترجمہ ہے جسے امریکہ کی "جامع ہوائی" نے کسانوں کے لئے شائع کیا تاہم زیر نظر مضمون کو ترجمہ کرتے وقت پاکستانی زرعی ماحول اور اس میں تنوع کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ مضمون میں چند جگہوں پر اپنی ذاتی تجربات بھی بیان کیے گئے ہیں جو کہ کسانوں کے لیے معاشی سطح پر سودمند ثابت ہو سکتے ہیں۔

اظہار تشکر: اس تحقیق اور اجراء مواد کے لئے میں دل کی گہرائیوں سے محمد ثاقب سہیل، تحقیقاتی ادارہ برائے گلابی وچن آرائی، راولپنڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے لوث ہو کر میری مدد کی۔

موسم گرما کی سبزیوں کی پیداواری شیکنا لوجی

ڈاکٹر چہدری محمد ایوب، منورا احمد نور، شعبہ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

نمبر شمار	نام سبزی	وقت کاشت	پودے کی تبدیلی	شرح	قطاروں اور پودوں کا فاصلہ	دیکھ کر کھاد	ٹائمر جن (کلگرام)	فائیو (کلگرام)	پیش (کلگرام)	وقت برداشت	اقسام
1	آلو	پنجاب کے میدانی علاقے ستمبر، اکتوبر	--	14000-12000	20x75	25-20	100	50	50	نمبر تا فروری اگست، ستمبر	السن-ایچ۔ 5-ڈیزرائزی، کارڈنیل، ڈرائمنٹ، فیصل آباد، پٹو، فیصل آباد، ڈائنٹ
2	منٹر	میدانی علاقے اپریل، مئی اگست، ستمبر، اکتوبر	--	40-35 30-25 25-20	5x75 8x100 8x125	10-8 10-8 10-8	30 30	35 40	25 25	نمبر تا دسمبر جنوری تا فروری فروری تا مارچ	شریناز، ڈیمیر، کھانگھوس، اچرو، ڈوڈ پٹی ایف۔ 400
3	ٹماٹر	اکتوبر تا نومبر	نمبر تا دسمبر، فروری	0.125 0.125	50x150 50x125	15-10 15-10	35 35	30 30	25 25	اپریل تا جون مئی، جون	رودا، گنبد، پاکٹ
4	پیاز	جولائی، اگست اکتوبر تا نومبر	ستمبر تا دسمبر، جنوری	5 3	10x70 10x70	15-10 15-10	45 45	30 30	25 25	دسمبر تا مارچ مئی	پھلکارا، پنجاب
5	مولی	جولائی، اگست ستمبر تا نومبر	--	5 3	5x75 5x75	12-10	25 25	20 20	25 25	اگست تا اکتوبر اکتوبر تا مارچ	
6	گاجر	ستمبر تا اکتوبر	--	8	5x75	15-10	40	25	25	دسمبر تا مارچ	
7	ٹماغم	اگست تا نومبر	--	1	8x75	15-10	25	20	25	اکتوبر تا مارچ	
8	پھول گھئی	مئی، جون، پہلی اگست جولائی، دوسری اگست اگست۔ درمیانی ستمبر، اکتوبر، مئی	جولائی، اگست، ستمبر، نومبر	1 0.5 0.5 0.5	30x75 45x75 45x75 30x75	20-15 20-15 20-15 20-15	45 45 45 45	35 35 35 35	25 25 25 25	اکتوبر تا نومبر نومبر تا دسمبر دسمبر، جنوری فروری تا مارچ	
9	ہند گھئی	ستمبر تا اکتوبر	اکتوبر تا نومبر	0.5	30x75	20-10	45	35	25	نومبر تا مئی	
10	لہسن	اکتوبر	--	350	10x20	25-20	55	25	50	اپریل	
11	سلاد	اکتوبر	نومبر	0.125	15x75	15-10	25	20	--	دسمبر تا مارچ	
12	پالک	جولائی، اگست	فروری، اپریل، اگست	15-20	3x75	15-10	50	25	--	اگست	
13	دھنیا	ستمبر تا اکتوبر	--	8	3x75	15-10	35	20	--	نومبر تا مارچ	
14	میٹھی	ستمبر تا اکتوبر	--	4.3	3x75	15-10	20	20	--	نومبر تا فروری	

ترشاوہ باغات کی جڑی بوٹیاں اور ان کا تدارک

متین ساجد، ڈاکٹر سعید احمد، ڈاکٹر محمد امجد..... انسٹیٹیوٹ آف بائیوٹیکنالوجی سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- ☆ جڑی بوٹیاں کامیاب ترشاوہ باغات کے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ جڑی بوٹیاں ناموافق موہی اور زمینی حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی جڑوں کا نظام بہت اچھی کارکردگی کا حامل ہوتا ہے جو کہ بہت مؤثر انداز سے ترشاوہ باغات سے مقابلہ کر کے ضروری غذائی عناصر، پانی، روشنی اور جگہ پر قابض ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ترشاوہ باغات کی صحیح نشوونما نہیں ہو پاتی اور پودے اچھی پیداوار نہیں دے پاتے۔ جڑی بوٹیاں بہت سے کیڑے مکوڑوں اور بیماریاں پھیلانے والے جراثیموں کی پناہ گاہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے ان میں چھپ جاتے ہیں اور مناسب حالات میں ترشاوہ باغات پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے حملے کی وجہ سے ترشاوہ باغات کی صحیح نشوونما نہیں ہو پاتی اور پودے اچھی پیداوار نہیں دے پاتے۔ جڑی بوٹیاں بہت سے کیڑے مکوڑوں اور بیماریاں پھیلانے والے جراثیموں کی پناہ گاہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے ان میں چھپ جاتے ہیں اور مناسب حالات میں ترشاوہ باغات پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے حملے کی وجہ سے ترشاوہ باغات بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور بہتر کوالٹی کا پھل اور اچھی پیداوار نہیں دے سکتے۔ جڑی بوٹیاں بہت سے کاشتکاری امور کی انجام دہی میں بھی رکاوٹ ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ تر جگہ پر جڑی بوٹیاں قابض ہوتی ہیں۔
- ☆ جڑی بوٹیاں ترشاوہ باغات کے ساتھ خوراک، پانی اور روشنی کے لئے مقابلہ کرتی ہیں۔ بعض اوقات سدا بہار جڑی بوٹیاں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ کاشتکاری امور کی انجام دہی ناممکن ہو جاتی ہے۔
- ☆ عام طور پر جڑی بوٹیوں کی وجہ سے 20-15 فیصد پیداوار میں نقصان ہوتا ہے۔
- ☆ جڑی بوٹیاں پھل کی کوالٹی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔
- ☆ کچھ جڑی بوٹیاں زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ مثلاً آئوہی بہت زیادہ خارش کا باعث بنتی ہیں اور بہت ساری جڑی بوٹیاں زردانے پیدا کرنے کی وجہ سے بخار کا باعث بنتی ہیں۔
- ☆ جڑی بوٹیاں بہت سے کیڑے مکوڑوں اور بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں کی آماجگاہ ہیں۔ اگر باغات میں جڑی بوٹیاں ہوں تو بہت سارے کیڑے اور بیماریاں باغ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔

جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کی تدابیر

بچاؤ کی تدابیر بہت اہم ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہوا، پانی، جنگلی جانور، پائو جانور اور انسان جڑی بوٹی کے بیج کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب جڑی بوٹیاں قدرتی ذریعہ سے پھیلتی ہیں تو ان کا کنٹرول بہت مشکل ہے۔

- ☆ صاف ستھرے آلات اور گاڑیاں استعمال کرنی چاہیے جو جڑی بوٹیوں کے بیج سے پاک ہوں۔
- ☆ جڑی بوٹیوں کے بیج سے بننے سے پہلے ان کو کنٹرول کر لینا چاہیے۔
- ☆ جانوروں کو گھاس چرانے سے پہلے ان کے بال اور پاؤں صاف کر لینے چاہیے تاکہ ان پر کوئی بیج نہ لگا ہو۔
- ☆ ہمیشہ گلی سڑی گوبر کی کھاد استعمال کریں۔
- ☆ باغات کو صاف ستھرا رکھا جائے، بیج سے پاک صاف پانی لگائیں۔

فزیکل حکمت عملی

- ☆ زمین میں ہل چلانے سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ ہل چلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ بیج نکلنے سے پہلے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر لیا جائے اور زمین میں بیج محفوظ نہ ہونے دیا جائے۔
- ☆ اس میں پہلے جڑی بوٹیوں کے بیج کو اگنے دیا جاتا ہے پھر ان پر بیج بننے سے پہلے ہل چلا دیا جاتا ہے۔
- ☆ سدا بہار جڑی بوٹیوں کے زمین کے اندر والے حصوں کو ختم کر کے یا بیج بننے سے پہلے ان پر ہل چلا کر کنٹرول کیا جاتا ہے۔
- ☆ ہل چلانے سے پودا زمین میں دفن ہو جاتا ہے اور اس طرح روشنی نہ ہونے کے باعث اپنی خوراک نہیں بنایا پاتا اور مر جاتا ہے۔

چند اہم جڑی بوٹیاں اور ان کے ٹیکنیکل نام

نام جڑی بوٹی	ٹیکنیکل نام
اٹ سٹ	Trianthema parchulacastrum
مندھانہ	Dectyloctenium aegyptium
ڈیلا	Cyprous rotendus
چولائی	Amaranthus viridus
سواکی	Echinochola colona

جڑی بوٹیوں کی درجہ بندی

جڑی بوٹیوں کی درجہ بندی عام طور پر ان کی زندگی کا دورانیہ سے کی جاتی ہے۔

سالانہ جڑی بوٹیاں

ایسی جڑی بوٹیاں جن کی زندگی کا دورانیہ ایک سال ہو ان کو سالانہ جڑی بوٹیاں کہتے ہیں۔ پہلے سیزن میں یہ اپنی خوراک نرم جڑوں میں ذخیرہ کرتی ہیں۔ اگلے سیزن میں پودا ذخیرہ شدہ خوراک لے کر تیزی سے نشوونما پاتا ہے۔ یہ گرمیوں میں یا موسم خزاں میں بیج بناتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں۔

سدا بہار جڑی بوٹیاں

سدا بہار جڑی بوٹیاں ایسے پودے ہوتے ہیں جو دو سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ پہلے سال میں کوئی بیج پیدا نہیں ہوتا لیکن اگلے سال بیج بنتے ہیں۔

جڑی بوٹیوں کے ترشاوہ پودوں پر اثرات

☆ جڑی بوٹیاں پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔

☆ ہل چلانے سے جڑی بوٹیوں کی زخیرہ شدہ خوراک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب بھی یہ مناسب لمبائی کی ہو جاتی ہیں تو ان پر ہل چلا دیا جاتا ہے۔

☆ ہل چلانے سے جڑی بوٹی کے اندرونی حصے باہر آ جاتے ہیں اور نا مناسب موسمی حالات کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔

گوڈی کرنا

اس طریقہ سے کھرپے کا استعمال کر کے جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً تب کیا جاتا ہے جب زمین میں نمی موجود ہو۔

کاٹنے سے

جب جڑی بوٹیاں اتنی زیادہ ہوں کہ وہ گوڈی کرنے سے یا ہل چلانے سے کنٹرول نہ ہو سکیں تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کاٹنے کا عمل تب بھی کیا جاتا ہے جب زمین ہل چلانے کے قابل نہ ہو۔ یہ عمل بیج بننے سے پہلے کیا جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کو زمین تک کاٹ دیا جاتا ہے۔

جانور چرانا

زمین کے اوپر والے حصوں کو اگر باقاعدگی سے جانوروں سے چرا دیا جائے تو جڑی بوٹیوں کے اندرونی حصے کو کمزور ہو جاتے ہیں اور آخر کار مر جاتے ہیں۔ چرانے والے جانوروں کو بہار کے شروع میں باغ میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب گھاس اچھی طرح اگ آئے اور بیج نہ بنے ہوں تو احتیاط سے جانوروں کو باغ میں چھوڑیں تاکہ یہ تر شاوہ باغات کو نقصان نہ پہنچائیں۔

جلادینا

جلانے کا عمل ایسی صورتحال میں کیا جاتا ہے جب بیج بن گئے ہوں۔ جلانے کے عمل سے بیج کافی حد تک تباہ کیے جاسکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کو جلانے کے بعد اگر ہل چلا دیا جائے تو اس جگہ پر

زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

ملچنگ

ملچنگ اس اصول پر کام کرتی ہے کہ پودے کیلئے ضروری روشنی رک جائے اور پودا اپنی خوراک نہ بنا سکے اور اس طرح پودے کے زیر زمین حصے کمزور ہو جاتے ہیں اور آخر کار مر جاتے ہیں۔ اس عمل میں زمین کی نمی بھی محفوظ کی جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کو مارنے کیلئے یہ طریقہ بہت موثر ہے۔

حیاتیاتی حکمت عملی

قدرتی ذریعہ مثلاً کیڑے مکوڑے، فنجائی، وائرس یا بیکٹیریا کا استعمال کر کے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی کا نام حیاتیاتی کنٹرول ہے۔ آجکل حیاتیاتی کنٹرول کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک دوسرے طریقوں کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی کنٹرول کے طریقہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتے جس کی وجہ سے نہ تو تر شاوہ باغات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور نہ ہی زمین پر کوئی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

کیمیکل کنٹرول

دنیا میں جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کیلئے بہت ساری زہریں استعمال ہو رہی ہیں جن میں گلائفوسفٹ ایک اہم اور وسیع الاثر زہر ہے جو ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو جن میں باریک اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں شامل ہیں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسکے علاوہ زہریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔

سلیکٹو: سلیکٹو زہریں صرف جڑی بوٹیوں کو ختم کرتی ہیں اور یہ تر شاوہ باغات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔

نان سلیکٹو: یہ زہریں جس پودے پر پڑیں اس کو ختم کر دیتی ہیں وہ چاہے جڑی بوٹی ہو یا تر شاوہ پھل۔

دودھ کی کم پیداوار کی وجوہات اور تجاویز برائے سفید انقلاب

بقیہ:

6- غیر منظم مارکیٹنگ سسٹم

موجودہ صورتحال میں کسان دودھ کی کوالٹی اور خرچے کے حساب سے منافع نہیں لے پاتے ہیں جبکہ مڈل مین زیادہ منافع لے جاتا ہے کیونکہ وہ فارمر سے خالص دودھ لے کر اس کی کریم نکالتا ہے۔ پھر اس میں پانی ڈالتا ہے اور گاڑھا کرنے کے لیے غیر معیاری خشک دودھ کا استعمال کرتا ہے۔ ایک منظم مارکیٹنگ سسٹم میں اچھے معیار کا دودھ آنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں ایسا دودھ مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے جس میں بہت ملاوٹ ہوتی ہے۔ دودھ کی اچھی مارکیٹنگ کے لئے درج ذیل اقدامات کرنے چاہئیں۔

☆ پرانے دودھی سسٹم کو ختم کرنے کے لئے دودھ پیدا کرنے والوں کو معیار پڑتی پکی فراہم کیا جانا چاہیے۔

☆ ہریوین کونسل میں دودھ اکٹھا کرنے کے لئے ایک سنٹر ہونا چاہیے جہاں پر دودھ نقد خرید جائے۔

☆ دودھ پیدا کرنے والے فارمر حضرات کو چاہیے کہ وہ ہر گاؤں میں ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنائیں جس کے ذریعے وہ دودھ خود مارکیٹ میں جا کر بیچیں اور مڈل مین یا دودھی کا خاتمہ کریں۔

☆ دودھ پر آپس کرنے والی کمپنیاں فارمر حضرات سے نقد کی بنیاد پر براہ راست دودھ اکٹھا کریں تاکہ زیادہ منافع فارمرز کو ملے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔

7- توسیعی خدمات کی کمی

نفع بخش ڈیری فارمنگ کے لئے کسانوں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے یہ سب کچھ توسیعی خدمات کے ذریعے ممکن ہے لیکن بد قسمتی سے یہ شعبہ اپنی خدمات صحیح طور پر سرانجام نہیں دے رہا تو توسیعی خدمات اگر نہ ہوں تو کسانوں کے مسئلہ حل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کسانوں کا تحقیق کرنے والوں اور توسیعی خدمات فراہم کرنے والوں کے ساتھ تعلق ہو۔ اس سلسلے میں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لئے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

☆ توسیعی خدمات سرانجام دینے والے مکمل طور پر تربیت یافتہ اور جدید ڈیری سے متعلقہ علوم سے آگاہ ہونے چاہئیں۔

☆ دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے کسانوں کو توسیعی پکی فراہم کئے جائیں جس میں صحت کی سہولیات، مصنوعی نسل کشی کا طریقہ کار، چارہ پیدا کرنے کے لئے مختلف طریقہ کار، راشن فارمولیشن وغیرہ شامل ہوں۔

☆ فارمر کی سطح پر تجربات کیے جائیں جن میں صرف روایتی طریقے کا سفارش کردہ طریقے سے موازنہ کیا جائے تاکہ فارمرز اپنی آنکھوں سے سفارش کردہ طریقے کے فوائد اور روایتی طریقے کے نقصان دیکھ سکے۔ اس طریقہ کار سے سفارش کردہ ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے کا رجحان عام ہو جائے گا۔

گل شبو کی بعد از برداشت نگہداشت

ڈاکٹر محمد آصف رائے، ڈاکٹر محسن بشیر، نوید احمد..... شعبہ گلابانی وچمن آرائی، انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کھل جائیں تو یہ برداشت کے لئے موزوں وقت ہے۔

2. **برداشت شدہ پھولوں میں حرارت کو کم کرنا:** کھیت سے برداشت کیے گئے پھولوں میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ان میں تنفس کے عمل کو تیز کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پھولوں سے اضافی حرارت کا اخراج ضروری ہے۔ اس کے لئے پھولوں کو برداشت کے فوراً بعد کم درجہ پر رکھا جاتا ہے۔ کم درجہ حرارت پر ٹھنڈی ہوا کے گزرنے کے ساتھ اضافی حرارت پھولوں سے نکل جاتی ہے۔ اس عمل سے پھول کی بعد از برداشت زندگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

3. **پلنگ کا عمل:** برداشت کے بعد تراشیدہ پھول کا پودے سے تعلق ختم ہو جاتا ہے جس سے اسے خوراک ملتی تھی۔ اب تراشیدہ پھول کی شاخ میں جو خوراک رہنے کے لئے اسی خوراک کو استعمال کرے گا۔ پلنگ کے عمل کے ذریعے پھول کی شاخ میں خوراک کی مقدار کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ پلنگ کے عمل کے لئے بالٹی میں سکروز کا محلول بنایا جاتا ہے اور اس محلول میں کاٹے گئے پھولوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ٹہنیوں کے نچلے حصے اس محلول میں ہوں۔ اس طرح یہ پھول اپنے اندر سکروز کی شکل میں کچھ اضافی خوراک جذب کر کے لیتے ہیں جو ان کی بعد از برداشت زندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ گل شبو کے لئے 20 فیصد سکروز کا محلول زیادہ بہتر ہے۔ بیس فیصد محلول کے ساتھ پلنگ کا دورانیہ کم از کم پانچ گھنٹے ہونا چاہیے۔ محلول کی تیاری کے لئے استعمال کیا گیا پانی جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ پانی میں جراثیم کی روک تھام کے لئے کسی بائیوسائیڈ کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ پلنگ کے ذریعے پھولوں کو زیادہ عرصہ کے لئے تروتازہ رکھا جاسکتا ہے۔

4. **سٹورج:** کم درجہ حرارت پر تنفس کا عمل سست ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے استھائی لین گیس بھی کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بیکٹیریا اور بیکیٹیریا بھی حملہ آور نہیں ہوتے۔ ٹیوب کو بعد از برداشت سٹور کرنے کے لئے موزوں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے جبکہ نمی کی مقدار 90 فیصد ہونی چاہیے۔ اگر سٹورج کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو بڑھا دیا جائے اور آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیا جائے تو اس سے تنفس کا عمل اور سست پڑ جاتا ہے اور پھول زیادہ عرصہ تروتازہ رہتے ہیں۔ اس عمل کو 'اسی اے سٹورج' کہتے ہیں۔ یہ پھولوں کی سٹورج کا جدید طریقہ ہے۔

5. **پیکجنگ:** مناسب پیکجنگ سے سے پھولوں کو بہتر انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ ٹیوب روز کے پھولوں کو گتے کے شکن دار ڈبوں میں پیک کیا جاسکتا ہے۔ ٹیوب روز کے درجہ اول کے پھولوں کی لمبائی 80 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس لئے ڈبے کی لمبائی کم از کم 82 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ اگر ڈبے کی چوڑائی 40 سینٹی میٹر ہو اور اونچائی 25 سینٹی میٹر ہو تو ایک ڈبے میں 200 کے قریب پھول پیک کیے جاسکتے ہیں۔ ڈبوں میں رکھنے سے پہلے پھولوں کے بنڈل بنائیں۔ ہر بنڈل میں بیس پھول ہونے چاہئیں۔ اس طرح ایک ڈبے میں دس بنڈل رکھے جائیں گے۔

6. **ترسیل:** پلنگ اور پیکجنگ کے عمل کے بعد ٹیوب روز کے پھولوں کی فاصلاتی منڈیوں تک ترسیل کی جاسکتی ہے۔ ریفریگیشن میں درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ ضرورت کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

گل شبو جیسے انگریزی زبان میں ٹیوب روز کہتے ہیں ایک اہم تراشیدہ پھول ہے جسے پاکستان میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کا آبائی علاقہ میکسیکو ہے۔ گلاب اور گلیڈی اولس کے بعد یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کاشت کیا جانے والا تراشیدہ پھول ہے۔ پنجاب میں اس کے زیر کاشت رقبہ ایک سو ایکڑ سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر پھولوں کی کاشت موسم سرما میں کی جاتی ہے جیسے کہ گلیڈی اولس، لیلیئم، سٹاک اور گل داؤدی وغیرہ۔ موسم گرما میں گلیڈی اولس اور لیلیئم کی کاشت پنجاب کے میدانی علاقوں میں ممکن نہیں ہے کیونکہ اس موسم میں درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے اس موسم میں ان پھولوں کی کاشت نہیں کی جاتی۔ اس لئے پنجاب میں گل شبو کی کاشت مارچ میں کی جاتی ہے جس کے پھول موسم گرما میں دستیاب ہوتے ہیں۔ گل شبو کی کاشت کے لئے فی ایکڑ پچاس من بج کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ریزومز کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہوائی سے تین چار سال تک پیداواری جاسکتی ہے۔ اس کے بعد اضافی بیج فروخت کیا جاسکتا ہے۔

پھول کی خصوصیات

ٹیوب روز کے پھولوں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اب پیلے اور ہلکے گلابی رنگ کی اقسام بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں لیکن ابھی تک ان کی تجارتی پیمانے پر کاشت شروع نہیں ہوئی۔ پھول سنگل اور ڈبل دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ڈبل پھول والی اقسام کے فلوریٹس سنگل اقسام کی نسبت بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ پھولوں میں خوشبو پائی جاتی ہے۔ فلورڈیکوریشن میں ان کے استعمال سے ہال یا کمرے کو خوشبو سے معطر کیا جاسکتا ہے۔ ایک ٹہنی پر فلوریٹس کی تعداد 15 سے زیادہ ہوتی ہے۔ فلوریٹس نیچے سے اوپر کی طرف کھلتے ہیں۔

پاکستان میں پھولوں کی بعد از برداشت دیکھ بھال کی موجودہ صورتحال

پاکستان میں پھولوں کی بعد از برداشت مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ اس لئے برداشت کے بعد پھولوں کے خراب ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق یہ شرح 20 سے 40 فیصد کے درمیان ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نقصان صرف پھولوں کی بعد از برداشت دیکھ بھال کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی کم کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں ہم گل شبو کی بعد از برداشت دیکھ بھال کے چند بنیادی اصول بیان کریں گے۔

1. **برداشت کے لئے موزوں وقت:** موسم گرما میں دن کے وقت درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے دن کے وقت پھولوں کو برداشت نہ کریں کیونکہ پھولوں سے نمی کا اخراج تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے اور تنفس کا عمل بھی تیز ہوتا ہے۔ اگر گھر کے باغچے سے پھول توڑ کر گلدستہ تیار کرنا ہو تو پھولوں کو صبح کے وقت برداشت کیا جانا چاہیے۔ منڈی میں پھول پہنچانے کے لئے شام کے وقت پھولوں کی برداشت مناسب ہے کیونکہ شام کے وقت درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور ہوا میں خشکی بڑھ جاتی ہے جس سے تراشیدہ پھولوں میں سے نمی کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ جب ایک تراشیدہ پھول پر موجود فلوریٹس میں سے کم از کم دو فلوریٹس کھل جائیں تو پھولوں کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اگر درجہ حرارت کم ہو تو فلوریٹس کے کھلنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لئے سرد موسم میں جب کم از کم پانچ فلوریٹس

سٹاک (Stock)۔ ایک نیا تراشیدہ پھول

ڈاکٹر افتخار احمد، حافظ کاشف علی، حافظ عطاء الرحمن سعید..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

دور حاضر میں تراشیدہ پھولوں کی صنعت بیشتر ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور جنوبی امریکہ اور افریقہ کے بعض ممالک مثلاً کولمبیا، ایکواڈور، کینیا، اتھوپیا وغیرہ میں تراشیدہ پھولوں کی کاشت اور یورپ و امریکہ اور کینیڈا میں ترسیل ایک مسلمہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ اگرچہ گلاب، گل داؤدی اور کارنیشن کے تراشیدہ پھولوں کی مانگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تاہم گزشتہ دو دہائیوں کے دوران مختلف انواع کے پھولوں نے دنیا بھر کے شوقین حضرات کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ جن کی کاشت نہ صرف آسان ہے بلکہ عمدہ کوالٹی پھول حاصل ہوتے ہیں جو اپنی متنوع اشکال اور شوخ رنگوں کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے ہیں انہی پھولوں میں سٹاک ایک نہایت ہر دلچیز پھول ہے جسے سائنسی زبان میں (*Matthiola incana*) کہتے ہیں۔ جو پودوں کے (*Brassicaceae*) خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے موسم سرما کے موسمی پھولوں میں خاص اہمیت حاصل ہے جس کی وجہ اس کے مختلف دلکش رنگ اور معیاری تنے ہیں۔ ماضی میں اسکی چند اقسام پاکستان میں صرف کیاریوں کی خوبصورتی کے لئے اگائی جاتی تھیں جبکہ پچھلے چند سالوں کے دوران زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کیے گئے تجربات کی روشنی میں اب اسکی نئی اقسام کو بطور تراشیدہ پھول بھی موزوں پایا گیا ہے اور انہیں تجارتی پیمانے پر کاشت کیا جا رہا ہے۔ اسکے زیادہ تر تراشیدہ پھول ڈبل پتیوں والے ہوتے ہیں اور پھولوں کی خوشبو لگ جیسی ہوتی ہے۔ موسم سرما کے دوران کاشت ہونے والے تراشیدہ پھولوں میں سے سٹاک کم وقت میں تیار ہونے کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ جب دن کا دورانیہ کم از کم 13 گھنٹے ہو تو 10 تا 12 ہفتوں میں فصل کٹائی کے قابل ہو جاتی ہے۔ موسم سرما کے تراشیدہ پھولوں میں سے یہ ایک اگیتی قسم کی فصل ہے جو انتہائی ٹھنڈے کم از کم منفی سات ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

زمین کا انتخاب

سٹاک کو عمدہ نکاسی والی زمین میں با آسانی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ ایسی زمین جس کا زمینی تعامل 6 سے 7 ہو، سٹاک کی نشوونما کے لئے بہترین تصور کی جاتی ہے زیادہ چینی یا ریتیلی زمینوں میں کاشت سے عمدہ کوالٹی پھولوں کا حصول دشوار ہو جاتا ہے۔

افزائش نسل

سٹاک کو براہ راست کاشت نہیں کیا جاتا۔ اس کے تراشیدہ پھول کاشت کرنے کے لئے آغاز میں اس کی نرسری تیار کی جاتی ہے بالخصوص جب آپ نے ڈبل پتیوں والے پھول حاصل کرنے ہوں۔ اسکی نرسری کاشت کرنے کا بہترین وقت ستمبر تا وسط اکتوبر ہے جبکہ اسکے پھول فروری کے دوران کٹائی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ لمبے عرصہ تک پھولوں کے حصول کے لئے سٹاک کو دس تا پندرہ دن کے وقفے سے کاشت کیا جانا چاہیے۔ موسم بہار کے شروع میں پھول حاصل کرنے کے لئے کوراپڑنے سے کم از کم 8 تا 10 ہفتے پہلے اسے بودینا چاہیے۔

زمین کی تیاری و لے آؤٹ

سٹاک کی عمدہ نشوونما کے لئے جڑی بوٹیوں اور پتھروں سے پاک زمین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ زمین کی تیاری کے لئے 3 تا 4 مرتبہ گہرا بل چلائیں اور پھر وٹا ویٹر کے ذریعے زمین کو اچھے طریقے سے نرم کر لیں۔ پھر پودوں کی اچھی نشوونما کے لئے چار تا پانچ فٹ چوڑے اور دس فٹ لمبے بیڈز (کیاریاں) بنالیں تاکہ پودوں کو حسب ضرورت پانی اور کھاد مہیا ہو سکے۔

وقت اور طریقہ کاشت

سٹاک کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں ستمبر تا نومبر کے دوران کاشت کیا جاسکتا ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین کی جدید تحقیق کے مطابق اگر سٹاک کو پنجاب کے میدانی علاقوں میں 15 ستمبر تا 1 اکتوبر کے درمیان لگایا جائے تو یہ زیادہ عمدہ کوالٹی پیداوار دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سٹاک کے بیج کو گملوں میں لگانے کی بجائے غلبوں والے پلاسٹک کے ٹرے میں لگایا جائے تو نہ صرف اگاؤ کی شرح بڑھ جاتی ہے بلکہ عمدہ کوالٹی نرسری بھی تیار ہوتی ہے اور پودوں کی زمین میں منتقلی کرتے وقت بھی آسانی سے ہر پودا الگ الگ جڑوں کو نقصان پہنچائے بغیر لگایا جاسکتا ہے جس سے تمام فصل بروقت تیار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بیج لگانے کے لئے ایک حصہ بھل، ایک حصہ گنے کی پریس ٹڈ اور ایک حصہ ناریل کا برادہ استعمال کرنا چاہیے جس جگہ ٹرے رکھے جائیں وہاں کا درجہ حرارت 20 تا 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور نمی کا تناسب 60 تا 70 فیصد رکھنا چاہیے۔ ٹرے کو نم رکھنا چاہیے اور زیادہ خشک ہونے سے بچانا چاہیے۔ جب پودے کے دو تا چار اصلی پتے نکل آئیں تو اسے کھیت میں منتقل کر دینا چاہیے۔

کاشت کے لئے موزوں اقسام

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کیے گئے تجربات کی روشنی میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مندرجہ ذیل اقسام کاشت کے لئے موزوں ہیں:

نمبر شمار اقسام	پھول کا رنگ	فصل کا دورانیہ
1	چیریفل (Cheerful)	سفید
2	کالم (Column)	سفید، پیلا، گلابی پیلا
3	آئرن (Iron)	گلابی، جاسنی سرخ، گلابی پیلا
4	کنینو (cannito)	سفید
		120 تا 190 دن

عمدہ کوالٹی بیج کا حصول

پنجاب کے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والی سٹاک کی مختلف اقسام کے بیج درج ذیل کمپنیوں سے منگوائے جاسکتے ہیں

ساکاتا (Sakata)	امریکن ٹاکی (American takii)	بنیری سیڈز (Benary seeds)
-----------------	------------------------------	---------------------------

انیمون۔ ایک دلکش گٹھے دار تراشیدہ پھول

ڈاکٹر افتخار احمد، محمد زین علی، کائنات فاطمہ..... شعبہ گلابانی وچمن آرانی، انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

دھوپ میں پھلنے پھولنے والا پودا ہے جس کے لئے 7 تا 8 گھنٹے مکمل سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لمبے دن (Long Day) اور سورج کی روشنی پھولوں کو کھلنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی بہترین نشوونما کے لئے 14 تا 18 ڈگری سینٹی گریڈ دن کا درجہ حرارت جبکہ 7 تا 10 ڈگری سینٹی گریڈ رات کا درجہ حرارت ہونا چاہیے تاکہ مناسب کوالٹی کے پھول حاصل ہو سکیں۔

انیمون کی اقسام

انیمون کے پھولوں میں رنگ، ساخت اور قد کے لحاظ سے بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں دراز قد (Long stem) اقسام کو تراشیدہ پھولوں (Cut flowers) کے طور پر کاشت کیا جاتا ہے جبکہ پست قد (Dwarf) اقسام گملوں اور باغیچوں کی تزین و آرائش کے لئے کاشت کی جاتی ہیں۔

نمبر شمار	اقسام	تنے کی لمبائی (انچ)	پھولوں کا رنگ
1	ڈی سین بائریڈ 'De Caen' hybrids	10 تا 12	سرخ گلابی، سفید، گلابی
2	سینٹ پیرین 'St. Prian' hybrids	9 تا 10	سفید
3	سینٹ بریڈ 'St. Brigid' hybrids	15 تا 12	سرخ گلابی، سفید اور گلابی
4	یلو گائین ٹیسما 'Elegan tissima'	5 تا 6	سرخ گلابی، سفید، گلابی اور جامنی
5	ایلیس 'Alice'	32	سرخ گلابی
6	البہ 'Alba'	24 تا 60	گلابی اور جامنی
7	جاپانی انیمون (Japanese anemone)	24 تا 50	سفید، گلابی اور جامنی

افزائش نسل

انیمون کی افزائش بذریعہ گٹھوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ کاشت سے قبل گٹھوں کو تقریباً 3 تا 4 گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیا جاتا ہے۔ بھگونے کے بعد گٹھوں کو یا تو براہ راست زمین میں لگا دیا جاتا ہے یا ان کو پہلے سے گنے (Presprouting) کے لئے زمین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق (Presprouting) کے عمل سے پودا کچھ ہفتے قبل ہی پھول دینے لگتا ہے۔ پری سپروٹنگ (Presprouting) کے لئے گٹھوں کو 48 غلیوں والے پلاسٹک کی ٹرے میں پھیلا کر میڈیا یا میٹی سے اچھی طرح ڈھانپ کر 10 تا 14 دنوں کے لئے ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ میٹی نم ہے یا نہیں کیونکہ زیادہ نمی گٹھوں کو لگا (rot) سکتی ہے۔ بھگونے کے بعد گٹھے اپنے اصل سائز سے دو گنا ہو جاتے ہیں اور چھوٹی سفید جڑیں اُگنا

پھول قدرت کا ایک انمول شاہکار ہیں جو دل فریب رنگوں اور خوشبودار ہونے کے باعث ہر کسی کے لئے ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے فصلوں کی مانند پھولوں کو بھی تجارتی پیمانہ پر کاشت کرنا شروع کر دیا جس سے نہ صرف بہتر منافع حاصل ہونے لگا بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہونے لگے جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئیں اور لوگوں کا طرز رہن بہن بھی تبدیل ہو گیا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پھولوں کی صنعت ترقی یافتہ ممالک سے ترقی پذیر ممالک میں منتقل ہو رہی ہے جہاں موافق موسمی حالات، زرخیز زمینیں اور سستی مزدوری ہونے کے باعث فصل پر آنے والے اخراجات میں نمایاں کمی ہوتی ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں جس سے بین الاقوامی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں مختلف انواع کے پھول کاشت کیے جاتے ہیں جن میں گلاب، گل داؤدی، گل شہو، کارنیشن، گل لیلی، گلائل وغیرہ سرفہرست ہیں جنہیں مختلف مذہبی و سماجی تقریبات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پھولوں کو بطور تراشیدہ پھول، پتیوں کے حصول اور عرق و تیل کشید کرنے کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ انہی تراشیدہ پھولوں میں انیمون (Anemone) بھی ایک دلکش تراشیدہ پھول (Cut flower) ہے جس کا تعلق رینکولوسیائی (Ranunculaceae) خاندان سے ہے۔ اسے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں دائمی یا کثیر سالہ (Perennial) پودے کے طور پر کاشت کیا جاسکتا ہے جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسم سرما کے دوران بطور ایک سالہ (Annual) پودا کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے پھول نہایت دیدہ زیب اور دلکش ہوتے ہیں جو کہ سفید، سرخ، پیلے، اور گلابی رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے پودے کا قد ایک تا تین فٹ تک ہو سکتا ہے جبکہ کچھ پست قد (Dwarf) اقسام کا قد صرف 8 تا 10 انچ ہوتا ہے۔ اس کے پھولوں کو گلدستوں، نمائشوں اور گلدانوں میں زیبائش کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ انیمون مختلف ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے یہ پھول افریقی منطقہ حار (Mediterranean sea) کے پہاڑی علاقوں میں صدیوں سے کاشت ہو رہا ہے جو کہ کچھ دہائیوں سے تراشیدہ پھول کے طور پر بھی دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسے موسم سرما کے دوران شمالی اور وسطی پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کے پھولوں کی کاشت سرد موسم کے آغاز میں کی جاتی ہے جس کے لئے میدانی علاقوں میں اکتوبر تا نومبر جبکہ پہاڑی علاقوں میں مارچ تا اپریل موزوں ترین ہیں۔

آب و ہوا

بنیادی طور پر انیمون ایک گٹھے دار فصل ہے جو معتدل اور نیم مرطوب آب و ہوا میں خوب پھلتی ہے۔ اسکی اچھی نشوونما اور بڑھوتری میں بہت حد تک موسمی حالات (درجہ حرارت، روشنی اور ہوا میں نمی کی مقدار) اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی اس فصل کیلئے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ انیمون کے تراشیدہ پھولوں کی کاشت کے لئے مناسب درجہ حرارت اور نمی کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے تاکہ عمدہ ماحول میں بہترین پیداوار اور کوالٹی کے پھول تیار ہو سکیں۔ انیمون

شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بار جب یہ جڑیں چوتھائی تا آدھا انچ ہو جائیں تو انہیں زمین میں لگا دیں۔

زمین کا انتخاب و تیاری

ترشیدہ پھولوں کی نرسری منتقل کرنے کے لئے ہمیشہ زرخیز اور میرا زمین کا انتخاب کریں جس میں نامیاتی مادہ وافر مقدار میں موجود ہو۔ پھول کاشت کرنے سے ڈیڑھ دو ماہ قبل زمین میں گوبر کی گلی سڑی کھاد بحساب 2 ٹری فی ایکڑ ڈالیں اور روٹاویٹر چلا کر زمین میں اچھی طرح ملا دیں۔ کھیت کو پانی لگائیں تاکہ زمین نرم ہو جائے اور جڑیں بوٹیاں آگ جائیں بعد ازاں زمین کو ترا آنے پر دو ہراہل سہاگہ چلا کر کھیت کو بھر بھرا کریں اور پانی کی یکساں فراہمی کے لئے کھیت کو ہموار کر لیں۔ زمین کی تیاری کے دوران سفارش کردہ کھادیں ڈال کر اچھی طرح ملا دیں اور کلوڑی کی چپٹی کی مدد سے پڑیوں یا یکپاریوں کو ہموار کر لیں۔ جڑی بوٹی مارز ہر ڈیوال گولڈ (Dual gold) بحساب 5 ملی لٹر فی لٹر پانی سپرے کریں اور پری سپر وڈنگھوں کو 9 تا 12 انچ کے فاصلے پر منتقل کر دیں۔ گرین ہاؤس میں پودوں کی منتقلی 6 تا 8 انچ کے فاصلے پر کریں۔

کھادیں

اینیمون کی فصل کو کھادیں اس کی اقسام، گٹھے کا سائز، موسمی حالات اور زمین کے مطابق مناسب وقفے سے استعمال کرنی چاہیے۔ اینیمون کے پھولوں کی کاشت کے دوران بھی روایتی فصلوں کی طرح باقاعدہ کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ عمدہ کوالٹی پھول حاصل ہو سکیں۔ زمین میں کھادوں کا استعمال باقاعدہ مٹی کے تجزیہ کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ ابتدائی طور پر زمین تیار کرتے وقت دو ٹری فی ایکڑ گوبر کی گلی سڑی کھاد زمین میں اچھی طرح ملا دیں۔ بعد ازاں پڑے یا کیارے بناتے وقت سفارش کردہ فاسفورس اور پوناش کھاد کی مکمل مقدار ڈالیں جبکہ نائٹروجن کھاد تین حصوں میں برابر تقسیم کر کے ہر پندرہ دن کے وقفے سے دیں جس سے کھاد کے ضیاع سے بچا جاسکتا ہے اور پودوں کی غذائی ضروریات بخوبی پوری کی جاسکتی ہیں۔ اینیمون کے پودوں کی قوت مدافعت بڑھانے اور اعلیٰ کوالٹی پھول حاصل کرنے کے لئے پھول آنے سے قبل اجزائے صغیرہ بھی مہیا کیے جاتے ہیں جبکہ ٹیکامن میکس کا ایک تا دو سپرے بھی کیا جاتا ہے۔

آب پاشی

پہلا پانی گٹھے کاشت کرنے کے فوری بعد دیں اور نمونک گٹھوں کو مناسب نمی مہیا کریں۔ بعد ازاں جب زمین خشک ہو تو دوبارہ آبپاشی کریں۔ اینیمون کی کاشت کے دوران آبپاشی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ آبپاشی کرنے سے نہ صرف گٹھوں کے گلنے سڑنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے بلکہ وہ مڑھما کر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پانی کی کمی یا عدم دستیابی سے کم کوالٹی پھول حاصل ہوتے ہیں اور بعض اوقات پھولوں کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اینیمون کو زمین کی قسم کو مد نظر رکھتے ہوئے آبپاشی کرنی چاہیے اور دوران کاشت گٹھوں کی جڑوں کے ارد گرد مٹی کو ہمیشہ وتر حالت میں رکھنا چاہیے۔ آب پاشی ہمیشہ موسمی حالات بالخصوص روشنی، درجہ حرارت، مٹی کی قسم اور پودوں کی ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے۔

گوڈی

زمین میں ہوا کی گردش کو برقرار رکھنے، جڑوں کی عمدہ نشوونما اور جڑی بوٹیوں کو قابو رکھنے کے لئے دو تا تین گوڈیاں کی جاتی ہیں۔ پودوں کی زمین میں منتقلی کے تین تا چار ہفتہ بعد پہلی گوڈی کریں۔

پھولوں کی برداشت و بعد از برداشت نگہداشت

اینیمون کے پھول تقریباً 90 تا 110 دنوں کے بعد کٹائی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن فصل کی کٹائی مطلوبہ مارکیٹ تک رسائی پر منحصر ہوتی ہے۔ پھولوں کو برداشت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دن کے ٹھنڈے اوقات میں برداشت کیا جائے، جس کے لئے پھول ہمیشہ صبح 10 بجے سے قبل جب اوس یا شبنم خشک ہو جائے تب برداشت کریں شام 4 بجے کے بعد برداشت کریں۔ پھولوں کی کٹائی کے لئے تیز دھار پھول کاٹنے والی قینچی کا استعمال کریں اور ہمیشہ تنوں کو ترچھا کاٹیں تاکہ پھول زیادہ سے زیادہ پانی جذب کر سکیں۔ پھولوں کو برداشت کرنے کے بعد پانی یا ایک فیصد چینی بمعہ 200 ملی گرام سٹرک ایسڈ کے غذائی محلول میں سیدھا رکھیں اور اس محلول میں چینی کا استعمال نہایت کم کریں۔ اینیمون کے پھول گلدان میں دس دن تک تروتازہ رہ سکتے ہیں۔ اگر انہیں ذخیرہ کرنا درکار ہو تو 2 تا 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانچ تا سات دن کے لئے ذخیرہ کریں اور بعد ازاں گتے کے سوراخ دار ڈبوں میں پیک کر کے ٹھنڈے ٹرکوں میں رکھ کر منڈیوں کو ترسیل کریں۔

نقصان دہ کیڑے مکوڑے و بیماریاں

اینیمون کی فصل پر عام طور پر نرسری کی تیاری کے دوران جڑوں اور تنوں پر حملہ آور ہونے والی پھپھوندی مثلاً پٹھیم (Phythium) اور رائزوکٹونیا (Rhizoctonia) حملہ آور ہوتی ہیں اور نرسری کے مرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب مقدار میں آبپاشی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوران کاشت نمی کی مقدار مسلسل بڑھنے سے سفونی پھپھوندی (Powdery mildew) اور خاکی سیاہی مائل پھپھوندی (Botrytis) کے حملہ کے نشان بھی دیکھے جاسکتے ہیں جنہیں نمی کو قابو کرنے اور مناسب پھپھوندی گش زہر مثلاً ٹاپس۔ ایم یا ایلٹ کے 2 تا 3 گرام فی لٹر پانی سپرے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ دوران کاشت تیلہ اور تھرپس بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں جنہیں بروقت پانی یا نیم کے پتوں کا کشیدہ سپرے کرنے سے باآسانی قابو کیا جاسکتا ہے۔ اگر حملہ شدید ہو تو پولو، کافینڈور یا امیڈاکلوپرڈ کا ایک تا دو ملی لٹر فی لٹر پانی 5 تا 7 دن کے وقفے سے سپرے کریں۔

تخمینہ لاگت و منافع

اینیمون کے ایک کنال کاشت کے لئے تقریباً 20,000 گٹھے استعمال ہوتے ہیں اور اگر انہیں مناسب طریقے سے کاشت کیا جائے تو ایک کنال سے ایک لاکھ روپے تک منافع حاصل کیا جاسکتا ہے تاہم اس کا سارا دار و مدار پھولوں کی کوالٹی، پیداوار کا وقت اور منڈیوں میں مانگ پر منحصر ہوتا ہے۔

مزید معلومات: فلوری کلچر لیبارٹری، انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد،

فون: 0334-7416664، میل: iftikharahmadhashmi@gmail.com

نعمان بن بشیرؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے آپس میں محبت کرنے اور باہم شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا کہ جب (جسم) ایک عضو کو کوئی شکایت (بیماری) لاحق ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (امام بخاری، امام مسلم)

خطہ پوٹوہار میں گل کاغذ کی پیداوار (Production of Bougainvillea in Potohar Region)

ڈاکٹر منس حسین شاہ، ڈاکٹر ریاض الرحمن، ڈاکٹر ملک عابد محمود، ڈاکٹر محمد عثمان، ڈاکٹر ساجدہ بی بی، بحر شمس، سمیعہ، سمیعہ اکرام، ضیاء اللہ..... تحقیقاتی ادارہ برائے گلابانی وچمن آرائی راولپنڈی، انٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، جامعہ زرعیہ فیصل آباد، نیوکلیر انٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بیالوجی، فیصل آباد

تعارف

گل کاغذ (Bougainvillea) ایک نہایت اہم اور ماحولیاتی لحاظ سے ایک سخت جان پھول / پودا ہے۔ یہ کئی رنگوں اور مختلف قسم کے حجم کے پھولوں میں پایا جاتا ہے۔ گل کاغذ سرخ، گلابی، بنفشی، سفید اور کرم / دودھیہ رنگ کے پھولوں میں پایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر گل کاغذ کا نام Bougainvillea ہے۔ جب کہ یہ پودوں کی Nyctinaginacea نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ گل کاغذ میدانی علاقوں کی لکڑی دار جھاڑی اور تیل ہے۔ اس کے بہت سے تنے بنتے ہیں۔ جب کہ اسے تراش خراش کے بعد ایک مخصوص شکل دی جاسکتی ہے۔ اس کا قد 20 فٹ تک بھی ہوتا ہے۔ عمودی اجسام مثلاً دیوار، بانس یا پھر درختوں کے تنے پر سوار ہونے کے لئے گل کاغذ کی تیل تیز کانٹوں کا استعمال کرتی ہے۔ عمودی اجسام پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد اس کی نرم شاخیں خاکی اور پھر سیاہ رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ لمبے خزاں کے موسم میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کی شوخ دار پتیاں دراصل عام پتوں کی وہ جدید شکل ہے جس میں رنگ بھرے ہوتے ہیں۔ گل کاغذ میں پھول نئی شاخوں پر برآمد ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے شاخ تراشی کا عمل زیادہ اہم اور ہمہ گیر ہے۔ ان کی ابتدائی بڑھوتری کے بعد شوخ دار پتیاں اپنا رنگ تبدیل کر لیتی ہیں۔ تبدیلی رنگ بنیادی طور پر شوخ دار پتوں کا کاغذ کی شکل اختیار کرتا ہے بعد ازاں یہ پتیاں گر جاتی ہیں۔ اس میں پتے سادہ اور مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ جن کا ناپ 2 سے 14 انچ تک کا ہوتا ہے۔ گل کاغذ کا خوبصورت اگاؤ اور شوخ دار پتیاں (Bracts) آرائشی طور پر اسے خاص الحاصل بناتی ہیں۔ اسے بڑے پیمانے پر زمین ڈھانپنے اور بطور جھاڑی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے باڑ رکاوٹ ڈھلان کو ڈھانپنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گل کاغذ میں ڈھلان پر اگاؤ اور بڑھوتری کی اتنی اچھی صلاحیت ہے کہ یہ پوری پہاڑی کو ڈھانپ سکتا ہے۔ اس کی کاٹ چھانٹ کے بعد اسے تنے پر کھڑے درخت کی شکل دی جاسکتی ہے۔ جسے دیوار، ستون اور پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ بہترین رنگوں کی ترتیب اور خوبصورتی کے لئے پودوں سے پودوں کا فاصلہ نہایت اہم ہے۔ عام طور پر یہ فاصلہ 6-9 فٹ تک رکھا جاتا ہے۔ جس سے تیل کے پھیلنے اور بعد لگائی دیکھ بھال میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ گل کاغذ کو نہایت عمدہ سطح پر زمینی چادر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر 4-6 پودوں کو اگر دائروں کی شکل میں لگایا جائے تو مجموعی طور پر یہ ایک خوبصورت انداز فراہم کرتے ہیں گہری جگہوں پر اس طرح لگایا گیا گل کاغذ نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بھارت میں ریاست راجستھان کے "امید محل" میں گل کاغذ کے 60 سے زیادہ رنگ جمع کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں قدرے بڑے کنکریٹ کے گمے گل کاغذ سے آراستہ کر کے چھتوں پر رکھے جاتے ہیں۔

گل کاغذ میں پتوں کی ساخت چھٹی، لمبوتری، بیضوی اور بیضوی لمبوتری ہوتی ہیں۔ گل کاغذ میں زیادہ مشہور اور قائم رہنے والا رنگ سفید اور سرخ ہے۔ گل کاغذ میں بہت چھوٹے چھوٹے پیرنیا

زیتون کے پھل نما پھل آتے ہیں جو بہت مضبوط اور در پر پا ہوتے ہیں۔ گل کاغذ تاریخی لحاظ سے جنوبی امریکہ کے علاقوں سے منظر عام پر آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ایک اندازے کے مطابق پہلے گل کاغذ کو Philibert Commersom نے 1760 میں برازیل کی شہر Rio de Janeiro میں دیکھا اور مطالعہ کیا۔ گل کاغذ کو Bougainvillea کا نام ایک فرانسیسی فوجی / کمانڈر جن کا نام Louis Antoine de Bougainvillea نے 1768 میں تجویز کیا۔ جب پہلی بار انہوں نے گل کاغذ کے پودوں کو باغوردیکھا۔ گل کاغذ کی چیدہ اقسام میں سب سے اہم اور قدیم پائی جانے والی قسم Bougainvillea Spectabilis ہے۔ یہ گل کاغذ کی پہلے پہل دریافت ہونے والی نوع ہے۔ جسے جرمن حیاتیات دان Carl Luwing Willdenow نے 1798 برازیل میں دریافت کیا۔ اس نوع کے پتے اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ اس نوع کا پودا خاصا گہرا اور قد میں بڑا ہوتا ہے۔ گل کاغذ کی اس نوع میں پھول شاخ پر اوپر سے نیچے ہوتے ہیں۔ اس نوع میں پتے عام طور پر بڑے ہوتے ہیں۔ شاخوں اور تنے پر بال اس نوع کا خاصا ہیں۔ گل کاغذ کی دوسری قابل ذکر نوع Bougainvillea glabera ہے۔ گل کاغذ کی اس قسم کو ایک سوئس حیاتیات دان نے پہچانا اور ڈھونڈا جن کا نام Jaques Densy Choisy تھا۔ اس نوع کے پتے سبز چمکدار مگر سطح پر دبیز بال رکھتے ہیں۔ اس نوع میں شوخ دار پتے مختلف حجم اور ساخت میں پائے جاتے ہیں۔ اس نوع میں شوخ دار پتے ٹکونی، بنفشی اور خاکی رنگ میں پائے جاتے ہیں۔ اس نوع میں پھول سفید یا دودھیہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس نوع کے کانٹے ٹھوڑے مگر اوپر سے کافی قسم کے ہوتے ہیں۔

یہ نوع سال میں بار بار پھول مہیا کرتی ہے۔ اس نوع کی یہی خصوصیت ایسے Bougainvillea Spectabilis سے جدا کرتی ہے۔ جس میں سال میں صرف ایک مرتبہ پھول نمودار ہوتے ہیں۔ گل کاغذ کی اس نوع کو خاص طور پر زہریلے اور انسانی ماحول کے لئے ناگوار پودوں کے امتحان سے گزار کر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ پودا انسان اور ماحول دوست ہے۔ گل کاغذ کی تیسری نوع Bougainvillea Peruviana سب سے پہلے جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں دریافت ہوئی اسے جرمن قدرتی عوامل کو مطالعہ کرنے والے الیگزینڈر وائون ہمبلٹ نے 1810 میں مطالعہ کیا اس نوع کے پتے پتلے مضبوط اور بیضوی ہوتے ہیں۔ گل کاغذ کی اس نوع میں کانٹے سیدھے اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ نوع زیادہ صحت مند نہیں ہے۔ زاندا اور صحت مند شاخوں کے اگاؤ کے لئے بار بار تراش خراش ضروری ہے۔ یہ گل کاغذ کی دو اقسام Bougainvillea Glabera اور Bougainvillea Peruviana کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔ اس ملاپ کی دوغلی اقسام کے نام جدا طرز پر ہیں۔ جیسا کہ Bougainvillea Buttiana وغیرہ۔ Bougainvillea Buttiana کے پتے بیضوی جب کے دونوں طرف (اوپر اور نیچے) مڑتے ہیں۔ اس کی شوخ پتیاں گول جب کہ رنگت میں سرخ اور گہرے گلابی رنگ کی ہوتی ہیں۔ اس نوع کے پھول قدرے

38 درجہ سینٹی گریڈ کو بخوبی برداشت کر سکتا ہے جب کہ پاکستان میں یہ 45 درجہ سینٹی گریڈ پر بہاولپور، سندھ، بلوچستان اور دیگر گرم علاقوں میں بخوبی پھول فراہم کرتا ہے۔ گل کاغذ کے لئے موزوں ترین درجہ حرارت 12-18 درجہ سینٹی گریڈ رات اور 32-35 درجہ دن کا ہے۔ گل کاغذ کی نوع جسے Bougainvillea Glabera کہا جاتا ہے قدرے کم درجہ حرارت کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ وسیع پیمانے پر ہونے والی بارشوں میں بہت بہتر انداز میں اپنا اگاؤ جاری رکھتی ہے۔ گل کاغذ 5.5-6 تک کی تیزابیت کو بخوبی برداشت کر سکتا ہے۔ تاہم اگر زمین کی تیزابیت 6 تک پہنچ جائے تو ایسے میں کم مقدار میں درکار معدنیات پودوں کو مہیا نہیں ہوتے۔ جن میں فولاد بھی شامل ہے۔ پس گل کاغذ کے لئے زرخیز زمین اور زمینی اساسیت 5.5 اور مٹی درجہ حرارت 28-30 درجہ حرارت سینٹی گریڈ بہتر اور بخوبی درکار ہوتا ہے۔

گل کاغذ میں روئیدگی

گل کاغذ میں روئیدگی کے لئے مختلف طور پر کام کیا جاتا ہے۔ جن میں سبز اور پتوں کا تراشہ لگانا، چشہ لگانا اور بیج وغیرہ شامل ہیں۔

سبز کا تراشہ لگانا

نرم لکڑی جو اوپری سطح پر ہوتی ہے جب کہ نوڈز کے درمیان کی لکڑی کو بھی بخوبی طور پر روئیدگی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سبز کی کٹنگ 1/8 انچ جس میں 3-4 چشے ہوں کا استعمال ضروری ہے۔

گل کاغذ میں روئیدگی درج ذیل دو طرح سے کی جاتی ہے۔

1- جنسی

2- غیر جنسی

1- جنسی طور پر روئیدگی

جنسی طریقہ میں بیج بخوبی طور پر اچھی شرح سے اگ جاتے ہیں اور انہیں کسی قسم کے قبل از وقت تعامل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

قلم کاری

نرم اوپری لکڑی، بڑھوتری کے عمل سے گزرتی ہوئی سبز لکڑی، اور درمیانہ درجہ کی لکڑی کو گل کاغذ میں روئیدگی کے لئے قلم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سبز کا تراشہ جو کہ روئیدگی کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں 1/8 انچ یا زائد چوڑے ہو تو روئیدگی کا عمل آسان تصور کیا جاتا ہے۔ روئیدگی کے وقت سبزے ان تینوں پر چھوڑے بھی جاسکتے ہیں اور ہٹائے بھی۔ تاہم جو حصہ زیر زمین ہو وہاں سے پتوں کو ہٹانا زیادہ سودمند ہے۔

روئیدگی کے لئے جو بھکاسی آب والی مٹی استعمال کی جانی چاہیے۔ ایک انتخاب کیمیا میں پتھر اور برابر مقدار میں بھوسہ (لکڑی کا براد) بھی ہو سکتا ہے۔ شاخوں کو ایک سے دوا انچ گہرائی میں لگانا چاہیے۔ نرم تراشوں کو کسی قسم کے جڑ پیداواری ہارمون کی ضرورت نہیں ہوتی جب کہ کچی لکڑی یا بڑھوتری کے عمل سے گزرتی ہوئی لکڑی کو 2000-6000 پی پی ایچ IBA کی ضرورت ہوتی ہے۔ گل کاغذ کی تراشیدہ شاخیں 4-12 ہفتوں میں جڑیں بنالیتی ہیں۔ پودوں کی فروخت کے لئے استعمال ہونے والے بڑے گلوں میں منتقلی کے لئے جڑوں کو ٹٹنے سے بچانا لازم ہے۔

چھوٹے مگر دودھیا رنگ کے ہوتے ہیں۔ گل کاغذ کی ایک اور دوغلی قسم Bougainvillea Spectopervious بھی ہے جو بہت عام ہے۔ اس نوع کے پتے گہرے سبز بیضوی مگر کھر درے ہوتے ہیں۔ اس کے کانٹے سیدھے مگر پھول دودھیا رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کی شوخ دار پتیاں بنفشی یا گلابی رنگ میں پائی جاتی ہیں۔ اس قسم میں کانٹے سیدھے ہوتے ہیں۔ اس نوع کی بڑھوتری بجانب پھیلاؤ ہے جب کہ یہ سال میں کئی بار پھول فراہم کرتی ہے۔ گل کاغذ کی دوغلی اقسام میں Bougainvillea Spectoglbra بھی ایک قسم ہے۔ اس قسم کے پتے چھوٹے مگر چمکدار ہوتے ہیں۔ اس نوع کی شوخ دار پتیاں گہرے اور ہلکے بنفشی رنگ کی ہوتی ہیں اس کی شاخیں بہتات کی صورت برآمد ہوتی ہیں۔ یہ سال میں کئی بار پھول فراہم کرتی ہیں۔

گل کاغذ کے اگاؤ کے لئے علاقہ جات

گل کاغذ سورج کی روشنی کو پسند کرنے والا پودا ہے۔ اسے جتنی زیادہ سورج کی روشنی فراہم ہو گی پھولوں کی تعداد اور رنگ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کم روشنی اور سایہ دار جگہیں گل کاغذ کے لئے غیر موزوں ہیں۔ جس سے شوخدار پتیاں گر جاتی ہیں۔ گل کاغذ ایک وسیع رقبہ پر لگایا جاسکتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 10 سے 2500 فٹ کی بلندی تک لگایا جاسکتا ہے۔ گل کاغذ خشک اور گرم ماحول کو برداشت کرنے کی بخوبی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک نہایت سخت جان پودا ہے جو سخت زمین اور گرم ماحول میں بڑھوتری کے عمل کو مکمل کرتا ہے اور بخوبی پھول فراہم کرتا ہے۔ یہ 45-48 درجہ سینٹی گریڈ کو برداشت کرتے ہوئے پھول فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں گل کاغذ سندھ کے ساحلی علاقوں سے لیکر اسلام آباد اور مری کی پہاڑیوں تک بخوبی پھول فراہم کرتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے جہاں موسم گرم یا میں درجہ حرارت 45-49 درجہ سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے وہاں بھی اس کے پھول دینے کی صلاحیت میں کمی نہیں آتی۔ اسلام آباد اور مری کے علاقوں میں یہ موسم گرم یا میں تا دیر 30-35 درجہ سینٹی گریڈ پر زائد شوخ رنگ کے پھول فراہم کرتا ہے۔ تاہم زیادہ خشندار کھر کے دوران اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ نیز موسم سرما میں یہ میدانی علاقوں میں مسلسل پھول فراہم کرتا ہے جن کا دورانیہ موسم گرم یا میں پیدا ہونے والے پھولوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ گل کاغذ میں پھول دینے کی صلاحیت گرم مرطوب ماحول میں بڑھ جاتی ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرم اور خشک موسم کے باعث پھول کا دورانیہ کم اور پھول جلد اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں۔

گل کاغذ کو زرخیز مٹی اور مٹی کی زائد تیزابیت درکار ہوتی ہے۔ جس میں اس کی ٹہنی اور شاخیں مسلسل برآمد ہوتی ہیں۔ یہ 5.5-6 تیزابیت پر نہایت بہتر طور پر اگایا جاتا ہے۔ مناسب تیزابیت ہونے کی صورت میں یہ زمین سے مطلوبہ مقدار میں خوراک اور خوراک کے اجزاء کا انجرب کر سکتا ہے۔ جس سے بڑھوتری آسان اور ہل ہو جاتی ہے۔ گل کاغذ کو اگر اساسی مٹی میں لگایا جائے تو کم مقدار میں مطلوب اجزاء مثلاً لوہا وغیرہ کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ گل کاغذ زمین کی اساسیت، پانی کی کمی اور تیز ہواؤں کے خلاف مدافعت رکھتا ہے تاہم اگر تیز ہوائیں پودوں کی جڑوں کو ہلانے میں کامیاب ہو جائیں تو پودا جلد سوکھ کر مر جاتا ہے تاہم اسے ایسی جگہ پر نہ لگائیں جہاں ہواؤں کی رفتار تیز ہو مگر پنجاب کے تمام علاقوں میں گل کاغذ بخوبی محفوظ رہتا ہے اور پھول بھی فراہم کرتا ہے۔

کاشت کے لئے موزوں ماحول

گل کاغذ میدانی علاقوں سے لیکر بلند و بالا پہاڑوں پر بخوبی پھول فراہم کرتا ہے۔ گل کاغذ

دب لگانا / چشمہ لگانا

پودوں کو پانی کی مناسب مقدار مناسب وقفوں کی صورت دی جانی چاہیے۔

کھاد کی ضرورت

گل کاغذ نہایت سخت جان پودا ہے۔ ایسے کسی خاص اور پتی ملی مقدار میں کھاد کی ضرورت نہیں تاہم خزاں کے آغاز پر شاخ تراشی کے وقت نامیاتی کھاد کا استعمال سودمند ہے۔

شاخ تراشی

مناسب وقفوں سے شاخ تراشی گل کاغذ کے لئے نہایت سودمند ہے۔ یہ پودوں کو خاص شکل دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مناسب وقفوں سے شاخ تراشی پودوں کی خاص شکل و صورت برقرار رکھنے میں سودمند ہے۔ شاخ تراشی کے لئے بغیر کسی سہارے کے گلے ہوئے پودوں کو تین فٹ بلندی سے کاٹا جاتا ہے تاکہ پودے کی جڑوں سے نئی شاخیں نکلیں اور پودا مضبوطی سے کھڑا ہو سکے۔

بڑھوتری کے لئے ہارمونز کا سپرے

گل کاغذ میں زیریں شاخوں کو بڑھانے کے لئے 50-100 پی پی ایم بنزائل ایڈینین (6-Benzyladenine) کا سپرے کیا جاتا ہے۔ یہ اسپرے پودے میں اس وقت کیا جاتا ہے جب چھوٹی شاخوں کو کاٹ دیا جائے۔

گل کاغذ میں چند ایسی اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن میں خوراک بنانے والے مادے کی کمی ہوتی ہے۔ اس مادے کو Chlorophyll کہا جاتا ہے۔ گل کاغذ کی ایسی اقسام کو قلم کاری کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تاہم ایسی اقسام کو بذریعہ دب / چشمہ کے بخوبی طور پر اگایا جاسکتا ہے۔ ایسی اقسام کو سبز پتوں والی اقسام پر بذریعہ چشمہ یا دب لگایا جاتا ہے۔ جن اقسام پر چشمہ لگایا جاتا ہے ان کو Rootstock کہا جاتا ہے۔ جن کا پیار یوں سے پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ نیز Rootstock زمین اور دیگر موسمی تغیرات کے خلاف بھی مدافعت رکھتا ہو۔ دب یا چشمہ لگاتے وقت Rootstock سے پتوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ دب یا چشمہ لگانے کے بعد اسے نمی والی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ پودوں کی بڑھوتری میں درکار پانی کی کمی پیش نہ ہو۔ چشمہ لگانے کے لئے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جن میں Wedge, Tongue اور دیگر طریقے شامل ہیں۔

گل کاغذ کی نگہداشت

گل کاغذ کو پانی کی ضرورت

گل کاغذ خشک ماحول کے خلاف مدافعت رکھتا ہے تاہم اسے خشک ہونے سے بچانا چاہیے۔ زائد نمی سے اس کی جڑیں گل جاتی ہیں۔ بعد از لگائی گل کاغذ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاہم بڑے

مسئلہ	تفصیل	علامات	اُسداد
تیلہ (Aphid)	چھوٹا، گول اور ناشپاتی نما نرم جسامت رکھنے والا کیڑا ہے۔ یہ تینے اور شاخوں پر گچھوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر پتی آنے والی شاخوں سے رس چوستا ہے۔	یہ پودے سے رس چوستا ہے۔ جس کی وجہ سے پتوں کا رنگ سیاح ہو جاتا ہے اور پتے اپنی شکل کھو بیٹھتے ہیں۔ نیز پتے گر جاتے ہیں۔	پانی کی تیز پھوار یا کسی بھی کیڑے مار دوا کا سپرے سودمند ہے۔
پیٹروڈ کیڑا (Bougain-villea loopers)	یہ سبز یا بھورے رنگ کی سنڈی ہے جو قریب ایک انچ تک لمبی ہوتی ہے۔	یہ پتوں کو کھا جاتی ہیں اور پتوں کی شکل مڑ کر خراب ہو جاتی ہے اور پتے گر جاتے ہیں۔	نیم کے پتوں سے کشید کیا گیا پانی اگر پودوں پر سپرے کر دیا جائے تو پیٹروڈ کیڑے کا حملہ روکا یا کم کیا جاسکتا ہے۔
مڈی دل (Grass Hoppee)	یہ قدرے بڑا اور پتوں کو کھانے والا کیڑا ہے۔ یہ فوج کی شکل میں پودوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔	یہ وقفہ وقفہ سے پودوں کے پتوں پتے کھاتے ہیں۔	اگر یہ بحفاظت میں ہوں تو ان کا انسداد مشکل ہے جب کہ اگر ایک دو ہوں تو ان کو پکڑ کر تلف بھی کیا جاسکتا ہے۔
جڑوں کا گلاؤ (Rod rot)	یہ پھپھوندی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جو پودے کی جڑوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ Phythophthora Phytinum ہے۔	اس کی وجہ سے پودا سوکھ جاتا ہے اور بڑھوتری متاثر ہوتی ہے اور پتے پیلے ہو جاتے ہیں۔	متاثرہ پودوں کا زمین سے تلف کرنا ہی اس بیماری کا واحد علاج ہے۔

عالمی سطح پر لگائی جانے والی گل کاغذ کی اقسام اور ان کے خواص

قسم	رنگ	تفصیل
آفٹر گلو (Afterglow)	زردی مائل، نارنگی	پتوں کی تعداد کم، زائد پھول اور پرانی پتی نما پتوں (لیبرکنس) رنگ گلابی مائل ہو جاتا ہے۔
باربرا کارسٹ (Barbara karst)	تیز سرخ	بہت معقول قسم جو ہر قسم کے ماحول میں بہتر نتائج مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں بڑھوتری درمیانے درجہ سے بڑھ کر ہے۔ اس کے پتے کم گہرے، چوڑے، اٹھہ نما اور نوکدار ہیں۔ جن پر لمبی سی لہر ہوتی ہے۔ اس میں پھول سرخ اور دودھیا ہوتے ہیں۔ اس قسم میں کانٹے درمیانے درجے کے لمبے اور سیدھے ہوتے ہیں۔
لوئس ڈی روز (Bois de rose)	سرخ مائل	بہت صحت مند بڑھوتری، گہرے سبز رنگ کے پتے مگر کانٹے نہایت تیز اور لمبے مگر اندر کی طرف ہلکے سے مڑے ہوتے ہیں۔
کیلیفورنیا گولڈ (California Gold)	سنہری / پیلا	یہ ایک خوبصورت بیل ہے۔ حجم میں بہت بڑی، لمبی اور پہلی سونے کے رنگ نما پتیاں پائی جاتی ہیں جو بعض اوقات ماحول کے تحت پہلی دکھائی دیتی ہیں۔ (باقی صفحہ 29 پر)

جانوروں کا روایتی طریقوں سے علاج

ڈاکٹر محمد قمر بلال..... انسٹیٹیوٹ آف اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ترکیب استعمال

تمام اجزاء کو کوٹ کر یکجا کر کے ان کی پٹیاں بنالیں اور جانور کو نصف گھنٹے کے وقفے سے دو دفعہ کھلائیں۔ پٹیاں کھلانے کے بعد نیم گرم پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار پلا دیں۔ افاقہ نہ ہونے کی صورت میں یہ نسخہ دو سے تین مرتبہ استعمال کریں۔

2- بدہضمی، جانور کا کھانا نہ کھانا، چارہ رغبت سے نہ کھانا، بھوک نہ لگنا (Indigestion)

بدہضمی کی صورت میں جانور نہ صرف چارہ کم کھاتا ہے بلکہ کھائے ہوئے چارے کو مکمل طور پر ہضم بھی نہیں کر پاتا اس صورت میں شکم پاؤڈر کا یہ نسخہ استعمال کروائیں۔

سوف	500 گرام	مرچ سیاہ	100 گرام
اجوان	250 گرام	میٹھا سوڈا	200 گرام
ریونڈ چینی	250 گرام	نمک سیاہ	250 گرام
چرائینہ	200 گرام	نمک سفید	500 گرام
زیرہ سفید	250 گرام	گڑ	حسب ضرورت
سونٹھ	150 گرام		

ترکیب استعمال

تمام اجزاء کو کوٹ کر باریک کر لیں اور 100 گرام فی خوراک ہفتہ میں دو تین بار استعمال کرائیں۔

3- کالک، پیٹ درد (Colic)

کالک کا درد گھوڑے میں شدید ہوتا ہے لیکن گائیں بھینسوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لئے کلورل ہائیڈریت 60 گرام کو ایک لٹر سرسوں کے تیل میں ملا کر دیں یا پھر یہ نسخہ استعمال کروائیں۔

مضہر	150 گرام
میٹھا سوڈا	125 گرام
نمک سیاہ	50 گرام
پرانا گڑ	500 گرام

تمام اجزاء اکٹھے کر کے 200 گرام وزن کی پٹیاں بنالیں۔ ایک پٹی دن میں دو مرتبہ نیم گرم پانی سے پلائیں۔ بعض حالات میں جانور کا انیما کرنا بھی موثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر جانور کو پیشاب کی رکاوٹ ہو تو پیشاب آور نسخہ استعمال کروائیں۔

پیشاب کی بندش (Urine retention)

پیشاب کی بندش کا مسئلہ زیادہ تر قربانی کے دنوں میں ان بکروں میں دیکھا گیا ہے جن کو ابتدائی عمر میں خنسی کر دیا جاتا ہے اس مسئلے کے لئے درج ذیل نسخہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔

وطن عزیز میں انسانی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جانوروں کی کثیر تعداد موجود ہے اور ہمارے جانور پال حضرات تندی سے ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں تاکہ دودھ اور گوشت کی پیداوار کو ملکی سطح پر بڑھایا جاسکے۔ ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر جانور بیمار ہو جائے تو بروقت ایلو پیتھک علاج (یکہ جات) کی سہولت میسر نہیں ہے اور ایسے فارمر حضرات بھی ہیں جو جزی بوٹیوں کو فوٹیت دیتے ہیں ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لئے زیر بحث مضمون میں عام بیماریوں، مسائل اور ان کے علاج کے بارے میں مفصل ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہمارے کاشتکار حضرات بروقت درپیش مسائل پر قابو پا سکیں اور بڑے نقصان سے بچ سکیں۔

1- گوبر کی بندش، فضلہ کے اخراج میں رکاوٹ، جھد در دق (Impaction)

علامات

جانور کا گوبر نہ کرنا، خوراک کھانا بند کر دینا۔ یہ مسئلہ زیادہ تر جانوروں کو صرف خشک چارہ چیسے بھوسہ وغیرہ ڈالنے سے ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے درج ذیل نسخہ استعمال کروایا جاسکتا ہے۔

سناکی	250 تا 300 گرام
ریونڈ حصارا	100 تا 150 گرام
سوڈیم ہائی کاربونیٹ	100 تا 150 گرام
میگنیشیم سلفیٹ	300 تا 600 گرام
سونٹھ	100 گرام
نمک سیاہ	150 گرام
پرانا گڑ	500 گرام

ترکیب استعمال

سناکی کو تقریباً چار کلو پانی میں پکائیں جب پانی نصف رہ جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے دیں اور دیگر اجزاء شامل کر کے جانور کو پلا دیں۔ اگر 8 سے 12 گھنٹے تک افاقہ نہ ہو تو تمام اجزاء کی نصف مقدار دوبارہ استعمال کریں۔ اگر پھر بھی فرق نہ پڑے تو بارہ بارہ گھنٹے کے وقفے سے دو تین مرتبہ مزید استعمال کروائیں بصورت دیگر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

سوف	250 گرام
رائی	200 گرام
گھیکوار (کوار گندل کا جوہر)	250 گرام
ٹھیکری نوشادر	100 گرام
میٹھا سوڈا	150 گرام
نمک سیاہ	150 گرام
پرانا گڑ	500 گرام

- i- ایک پاؤرائی باریک ٹیس کرلے میں حل کریں اور رات بھر پڑی رہنے دیں اگلی صبح اسے رٹک کر جانور کو پلا دیں۔ دودن کے وقفے سے دوسرے پلائیں۔
- ii- 250 گرام میگنیشیم سلفیٹ
20 گرام قلمی شورہ
15 گرام ہیکڑا مین
5 تا 10 گرام ٹیکر/ٹیکر ہائیوسائس
پانی حسب ضرورت
- گیلیوار (کوآرگنڈل) 150 گرام
ٹھیکری نوشادر 10 گرام
شیشہ نمک 15 گرام
سوڈیم سائٹریٹ 10 گرام
پانی یا گڑ حسب ضرورت
اوپر والا نسخہ روزانہ ایک ہفتہ صبح کے وقت دیں۔

5- ابھارہ (Tympy)

جگالی کرنے والے جانوروں کی بائیں کوکھ میں معدہ (Rumen) کے اندر اور گھوڑے کی دائیں کوکھ میں سیکم کے اندر گیس جمع ہو جانے کو ابھارہ کہتے ہیں۔ برسم کی فراوانی کے دنوں میں تھوڑا سا خشک بھوسہ ہر چارہ میں ڈالنے سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔

iii-

ہینگ 30 تا 50 گرام فی خوراک
سونٹھ 30 تا 50 گرام فی خوراک
ہلدی 250 گرام

ہینگ اور سونٹھ گڑ کے ساتھ ملا کر جبکہ ہلدی مکھن میں ملا کر استعمال کرائیں۔ شدید ابھارہ کی صورت میں ٹروکار کیونولہ یا نیڈل لگا کر بھی ہوا کو خارج کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل نسخہ بھی بڑا کارآمد ثابت ہوا ہے۔

تیل سرسوں 500 گرام
تارپین کا تیل 100 گرام
ہینگ 50 گرام

6- پیچش، واہ، موک، ڈائریا (Diarrhoea)

گائے، بھینس اور بیل وغیرہ میں موک کے تدارک کے لئے درج ذیل نسخہ استعمال کروائیں

بیل گری	250 گرام	چھلکا انار	150 گرام
کتھا	250 گرام	چاروں گوند	100 گرام
کیولین پاؤڈر	250 گرام		

ترکیب استعمال

مذکورہ ادویات کو باریک کر کے چار خوراکیں بنالیں اور ایک خوراک میں ڈیڑھ پاؤ چاولوں کی پیچھ ملا کر کھلائیں۔ موک/ڈائریا کے تدارک کے لئے ٹرائی کارب کا نسخہ بھی کارگر ثابت ہوا ہے۔

کیلشیم کاربونیٹ 15 گرام
میگنیشیم کاربونیٹ 15 گرام
ہسمتھ کاربونیٹ 10 گرام (تینوں کی ایک خوراک)

تقریباً ڈیڑھ پاؤ چاولوں کی پیچھ میں ملا کر یہ نسخہ چار تا پانچ دن تک استعمال کروائیں۔

7- سوزش حیوانہ (Mastitis)

انگاری یا سائڑ کا مرض مویشی پال حضرات کے لئے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر بوجہ سائڑ و تھن متورم ہو رہا ہو اور سوزش کے ساتھ ساتھ دودھ آنے میں رکاوٹ ہو تو درج ذیل اقدام عمل میں لائیں۔

10- جس جانور کا پیچھا نکل رہا ہو (Prolapse of uterus)

نیم کے پتے	10 گرام	مشک کا فور	15 ٹکلیاں
------------	---------	------------	-----------

اسکندھ	150 گرام	سوڈیم سیلی سیلیٹ	50 گرام
عشبہ	150 گرام	بعد فائج	120 گرام
چوپ چینی	150 گرام	جانفل	125 گرام
سورنجاں شیریں	150 گرام	جلوتری	125 گرام
سونٹھ	120 گرام	مالگنی	125 گرام
سنکلی	120 گرام	اجوائن خراسانی	150 گرام
گیر وہ	120 گرام	کچلہ مدد	125 گرام
اینتمون	150 گرام		

تمام اجزاء کو کوٹ کر باریک کر لیں اور ان کی چار پانچ خوراکیں بنالیں ہمراہ گڑ کھلائیں۔ دو تین دن کے وقفے سے دوبارہ کھلائیں اور اسی طرح تیسری بار استعمال کرائیں۔

تیل گری	10 گرام	جو	ایک پاؤ
پوسٹ ڈوڈا	10 گرام	شکر	250 گرام
چاروں گوند	15 گرام	پانی	حسب ضرورت

(ایک خوراک)

گائے بھینس 25 ملی لیٹر
چھوٹے جانور 5 ملی لیٹر
باتھو کے تیل میں ”اسکیری ڈول“ نامی جزو ہوتا ہے جو کہ گول کرموں کے تدارک میں کارگر ہے۔

14- ملک فیور (سوتک) (Milk Fever)

یہ مینا بولک مرض عام طور پر بچے کو جنم دینے سے لے کر 10 دن بعد تک لاحق ہوتا ہے۔ اس سے بچاؤ کیلئے ڈی سی پی 50 - 100 گرام روزانہ دیں۔ اس کے ساتھ کوڈ لیور آئل - 100 50 گرام روزانہ دیں۔ کوڈ لیور آئل سے جانور کو وٹامن سی ڈی ملتا ہے جو کہ ڈی سی پی کو انتزویوں میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔

15- زخموں کے لئے (Dry Powder)

رستے ہوئے زخموں کو خشک اور مندل کرنے کے لئے جانوروں میں درج ذیل ڈرائی پاؤڈر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

بورکس/سہاگہ ایک حصہ
بھٹکڑی ایک حصہ
گندھک ایک حصہ
سب کو پیس کر ملا لیں اور زخموں کے لئے استعمال کریں۔

16- بخار کا پاؤڈر (Fever Mixture)

کسی بھی قسم کے بخار کے تدارک کے لئے درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

سوڈیم سیلیسیلاس 30 گرام میگ سالٹ 200 گرام
قلمی شوره 15 گرام نوشادر 15 گرام
(ایک خوراک) ان سب کو پانی میں ملا کر پلا دیں۔

17- سیلین الیکچری (Saline Electuary)

قلمی شوره 30 گرام نوشادر 30 گرام
السی 60 گرام ملٹھی 30 گرام
بیلا ڈونا 4 گرام

سب ادویات کو پیس کر اتنا شیرہ ملائیں کہ گلقد کی سی شکل بن جائے خوراک 60 تا 100 گرام استعمال کرائیں۔

یا دی ڈیڑھ کلو گرام
تیل سرسوں آدھ لیٹر
شکر آدھ کلو گرام

ساری چیزیں رڈک کر جانور کو دیں۔ یہ ایک خوراک ہے۔ روزانہ 3 دن استعمال کرائیں۔ اس طرح کی ایک خوراک روزانہ سات آٹھ دن تک استعمال کروائیں۔ احتیاط کریں کہ جانور کے بیٹھے کی جگہ اس طرح ہو کہ پچھلا حصہ اونچا رہے۔ قبض سے بچانے کے لئے سبز چارہ استعمال کریں اور خشک چارہ بند کر دیں۔ بوقت ضرورت چھکا (Truss) ضرور چڑھائیں۔

11- خارش سے نجات (Etching)

اس کے لئے درج ذیل نسخہ بہت مفید ہے۔

چیر کا تیل 2 تولہ
لیموں کا رس 2 تولہ
چنبیلی 2 تولہ

تمام اجزا ملا کر جسم کے متاثرہ حصے پر مالش کریں اور صبح ڈیوٹل ملے پانی سے متاثرہ حصے کو دھو دیں۔

12- رت موثر ”سرنک“ (Post Parturent Haemoglobin Urea)

اس مرض کے علاج کے لئے سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ 60 گرام جانور کو کھلائیں/پلائیں اور اتنا ہی زیر جلد اور نس میں لگائیں۔ چارے کے حصول کے لئے استعمال ہونے والی زمین کا سائل ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس میں نمکیات کی کمی کا اندازہ ہو سکے۔ دو چھٹانک مولی کے بیج نہیں کر ملائیں اور آدھ کلو شکر ڈال کر لگا تار تین دن دینے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

13- گول کرم (Round Worm/Endoparasites)

ان کے تدارک کے لئے باتھو کا تیل درج ذیل مقدار کے حساب سے پلائیں۔

القرآن

تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے (خدا کے) منکروں (اور نافرمانوں) کا گھومنا پھرنا (دنیا کے) شہروں (اور ملکوں) میں (یہ چند روزہ زندگی کا) تھوڑا سا لطف ہے پھر تو ان کا ٹھکانا دوزخ (ہی) ہے اور کسی بری آرام گاہ ہے مگر جو لوگ اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچتے رہیں ان کے لئے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ (ہمیش) رہیں گے (یہ) سامان ضیافت ہوگا (ان کے لئے) اللہ کی طرف سے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے (دراصل) وہی بہتر ہے اور بیشک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو (ایمان رکھتے ہیں) جو تمہاری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا (اور) وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ دیتے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس (ضرور ملے) بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو! صبر سے کام لو اور بڑھ چڑھ کر پامردی دکھاؤ اور کمر بستہ رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو! امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ (سورۃ آل عمران آیات ۱۹۶-۲۰۰)

بھیڑ بکریوں کی مختلف ادوار میں دیکھ بھال

ڈاکٹر محمد قمر بلال..... انسٹیٹیوٹ آف اینیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

یہ خاص قسم کی خوراک تازہ اور عمدہ گھاس کی چراگاہ سے حاصل کی جاسکتی ہے تاہم اگر ایسی چراگاہ میسر نہ ہو سکے تو روزانہ تقریباً 400 سے 500 گرام غلہ جات مہیا کئے جائیں۔ اکیلی جٹی بہترین ہے یا جٹی اور کٹی کی برابر مقدار میں بھی تسلی بخش ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ عمر والے جانوروں میں فلشنگ کے اثرات کم عمر جانوروں کی نسبت نمایاں ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ فلشنگ کا فائدہ ملائی کے موسم کی ابتدا اور آخری دور میں زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت درمیان میں جب کہ پیٹے گرانے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چربی والی بھینٹ بکریوں کو فلشنگ سے فائدہ نہیں پہنچتا ان کے لئے ضروری ہے کہ ملائی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ان کو زیادہ موٹا نہ ہونے دیا جائے۔

زمانہ حمل میں خوراک

حمل کا ابتدائی دور جس میں بننے والا بچہ اپنی ماں سے زیادہ خوراک نہیں وصول کر رہا ہوتا حمل کے آخری دور کی نسبت کم اہمیت کا حامل ہے۔ اگر حمل کے آخری دور میں بھینٹ بکری کو اچھی خوراک نہ مہیا کی جائے تو نتیجتاً مرے ہوئے یا کمزور بچوں کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ آخری دور میں اچھی خوراک دینے کے نتائج درج ذیل ہیں:

- زندہ میمنوں/لیلوں کی تعداد میں اضافہ
- دودھ کی پیداوار میں اضافہ
- بچوں کی شرح بڑھوتری میں اضافہ
- اون کی مقدار اور کوالٹی میں بہتری

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حمل کے آخری دنوں میں جانور زیادہ چارہ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ بڑھے ہوئے بچے نے پیٹ کی اکثر جگہ گھیر رکھی ہوتی ہے ایسے حالات میں ان کو خصوصی طور پر ونڈا دینا چاہیے۔ کوئی بھی توانائی والی خوراک جس کو 300 سے 400 گرام روزانہ کھلایا جا رہا ہو 25 فیصد تک پروٹین اور 75 فیصد تک کل قابل ہضم اجزاء مہیا کرتی ہے۔ اگر ریوڑ میں حمل کے دوران کوئی بیماری پائی جانے کا امکان ہو تو 100 گرام شیرہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وزن میں 100 گرام فی دن کا اضافہ اس حالت میں بہتری کا اندازہ لگانے کا عمدہ ذریعہ ہے۔

بچہ پیدا ہونے سے تقریباً 6 ہفتے قبل بھینٹ بکریوں کو 400 سے 500 گرام روزانہ غلہ جات مہیا کئے جائیں۔ یہ مقدار موجود غلہ کی کوالٹی اور مادہ کی ظاہری حالت پر بھی منحصر ہوتی ہے اس وقت بچے کی افزائش بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ مائیں صحت مند اور مضبوط بچے پیدا کریں گی بلکہ دودھ بھی زیادہ پیدا کریں گی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے فارمرز حاملہ بھینٹ بکریوں کو ونڈا نہیں دیتے حالانکہ اس عرصے کے دوران ایک ایسی متوازن غذا مہیا کی جانی چاہیے جو اس کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ضروری وٹامنز اور نمکیات بھی درکار مقدار میں مہیا کر سکے۔ یہ نمکیات اور وٹامنز اون کی بڑھوتری اور بچے کی افزائش کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ موسم کے مطابق عمدہ پناہ گاہ مہیا کی جائے جہاں ان کو تازہ ہوا اور دھوپ کی

بھینٹ بکریوں کو اس کی ضروریات کے مطابق خوراک دینا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ان کو اکتھی خوراک دی جاتی ہے اس لئے

- عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ ہر جانور کو علیحدہ طور پر خوراک دی جائے۔
- ان کی دن بھر میں پروٹین اور توانائی کی ضروریات چرنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔
- ایک ہی وقت میں ان کی خوراک کی ضروریات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔
- البتہ خوراک کی ضروریات کو معلوم کرنا درج ذیل وجوہات کی بنا پر ضروری ہے تاکہ ہر قسم کی خوراک کی درکار مقدار کا اندازہ ہو سکے۔
- ریوڑ کی سالانہ خوراک کی مقدار معلوم کی جاسکے۔
- اگر خوراک فارم پر اُگائی جاتی ہو تو پوائی کے بارے میں فیصلہ ہو سکے۔
- اگر خوراک مارکیٹ سے خریدی ہو تو اس کے بارے میں ضروری اقدامات کئے جاسکیں۔
- خوراک کی ضروریات معلوم کرنے کے لئے درج ذیل فارمولا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
مطلوبہ مقدار = ایک دن میں دی گئی خوراک کی مقدار × راشن میں فیڈ کی فیصد مقدار × (دنوں میں) خوراک کا دورانیہ × جانوروں کی تعداد
- جانوروں کی خوراک کا نسل کشی سے گہرا تعلق ہے اس عرصے کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

- آرام کے دنوں میں خوراک
- زمانہ حمل کے دوران خوراک
- دودھ پلانے کے عرصے کے دوران خوراک

آرام کے دنوں میں خوراک

آرام کے دنوں میں ریوڑے کی ضروریات کم ہوتی ہیں اس عرصے کے دوران اس کو خوراک کے کم درجے پر رکھا جاتا ہے۔ ایسے اوقات میں ریوڑ کو غیر ضروری طور پر بڑھی ہوئی چراگاہوں یا جھاڑی دار پودے وغیرہ چرنے کے لئے بھیجا جاسکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا جانور اپنی ضروریات کے مطابق خوراک حاصل کر رہے ہیں وقفے وقفے سے ان کا وزن کر لیا جائے۔ اگر جانور اپنے وزن کو برقرار رکھیں یا 20 سے 30 گرام فی دن تک وزن حاصل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جانور اپنے وزن کے مطابق خوراک حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ان کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے تو ایسے اوقات میں انہیں اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا وزن برقرار رکھ سکیں جو نسل کشی کا موسم قریب آئے انہیں دوبارہ بہتر خوراک دینی شروع کر دینی چاہیے۔ ایسے مواقع پر فلشنگ کرتے ہیں۔ فلشنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مادہ کی خوراک کو بڑھا کر نہ صرف اس کے وزن میں اضافہ کیا جاتا ہے بلکہ جڑواں بچوں کی پیداوار کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا عموماً نسل کشی کے عرصے سے 3 ہفتے پہلے کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں بچوں کی پیداوار میں 10 سے 20 فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔

رسائی حاصل ہو۔

سوتیلی ماؤں کے حوالے کیا جاتا ہے یا گائے بھینس کا دودھ نیل کے ذریعے دینا چاہیے۔

☆ غذا میں پروٹین بچے کے وزن کے مطابق مہیا کی جائے۔

☆ زیادہ توانائی والی غذائیں دینے سے پہلے تمام بچوں کو آنتوں کے زہر اور پلورونموینا کے خلاف ویکسین کروائیں۔

☆ ایک غذا سے دوسری غذا میں تبدیلی آہستگی سے اور مرحلہ وار کرنی چاہیے۔

☆ خوراک صاف ستھری کھریوں میں دیں۔

☆ ایسے بچے جن کو یوڑ میں متبادل کے طور پر چنا گیا ہو ان کو شروع سے ہی اچھی غذا مہیا کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھا وزن حاصل کر سکیں۔

نرجانوروں کی خوراک

نرجانوروں کی خوراک ایسی ہونی چاہیے کہ وہ طاقتور اور چست رہ سکیں۔ عام طور پر سانڈ کو وہی خوراک کھلائی جاتی ہے جو کہ مادہ کو کھلائی جاتی ہے تاہم اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ دودھ چھڑانے کے بعد نرجانوروں کو مادہ کو کھلائی جاتی ہے لگ کر لیں۔ نسل کشی کے لئے استعمال کرنے والے بکروں چھتروں کو بروقت تیار کرنے کے لئے 150 سے 200 گرام ونڈہ لازمی دیں البتہ یہ ضروری ہے کہ اُن کو فربہ نہ ہونے دیں۔ ان کو ملائی کے موسم کے دوران عمدہ قسم کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرجانوروں کو ہلکی ورزش کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ چست رہیں اور زیادہ موٹے نہ ہوں۔ نسل کشی کے علاوہ باقی نرجانوروں کو فربہ کرنے والا راشن ڈالیں تاکہ وہ زیادہ وزن کریں اور مہنگے داموں فروخت ہو سکیں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

جب بھی بکریوں کو ملا دیا جائے تو انہیں چراگاہ میں چرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت مہیا کریں۔ اس مقصد کے لئے پھلی دار اجناس کا چارہ وافر مقدار میں مہیا کیا جائے تاکہ جانوروں کی پروٹین اور توانائی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ البتہ حمل کے آخری ایام میں چرائی کا انتظام باڑے کے قریب ہی کریں۔

دودھ پلانے کے دوران خوراک

بچے جننے کے بعد بھیڑ/بکری کو اچھی مقدار میں کم از کم تین ماہ تک دودھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچے کی آسانی سے پرورش کر سکیں۔ تھنوں کی ممکنہ خرابی سے بچنے کے لئے پہلے دس دن تک اناج یا غلہ کم مقدار میں دیں لیکن اس دوران پھلی دار خشک چارہ ضرور مہیا کریں۔ ایسے حالات میں خوراک میں پنے یا دوسرے غلے کو آہستہ آہستہ گندم کے چوکر میں 2:1 کی نسبت سے ملا کر دیں ساتھ ہی پھلی دار خشک چارہ 1 سے 2 کلوگرام دیں۔ جن علاقوں میں چراگاہوں کی حالت درست نہیں وہاں پر پروٹین اور دوسرے نمکیات خاص طور پر کاپرا اور کوبالٹ کو غذا میں دینا چاہیے۔ اضافی خوراک میں پروٹین 16 سے 18 فیصد تک ہونی چاہیے۔ دودھ پلانے کے عرصے کے دوران دو بچوں والی بھیڑوں کو ایک بچے والیوں سے الگ کر دینا چاہیے اور انہیں ان کی ضروریات کے مطابق خوراک دینی چاہیے۔

یتیم بچوں کو خوراک دینا

ایسے بچے جن کی مائیں پیدائش کے فوراً بعد مر جاتی ہیں یا بچے کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہیں یا جن کا دودھ بہت تھوڑا ہوتا ہے کو دوسری بھیڑ بکری کے ذریعے پالنا ضروری ہے۔ ایسے بچوں کو

بقیہ:

جڑی بوٹیوں کے فصلات پر نقصانات، ان کی گروہ بندی اور روک تھام کے طریقے

vi- جڑی بوٹیوں کی تلفی بذریعہ آبپاشی

بعض فصلوں مثلاً دھان میں اگر پہلے ایک ماہ تک پانی کھڑا رکھا جائے تو جڑی بوٹیاں نہیں اُگ سکتیں۔ اس طرح فصل کو اچھی طرح سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر بعد میں جڑی بوٹیاں اُگ بھی آئیں تو فصل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔

vii- کھاد اور پانی کا استعمال

اگر کھاد اور پانی کو مناسب مقدار اور صحیح وقت اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس سے بھی جڑی بوٹیوں کی روک تھام کی جاسکتی ہے مثلاً کھاد کو چھڑ دینے کی بجائے ڈرل کیا جائے تاکہ وہ صرف لائنوں میں ہی گرے ایسا کرنے سے خالی جگہوں پر اُگنے والی جڑی بوٹیوں کو کھاد نہیں ملے گی اور وہ نشوونما نہیں پاسکیں گی۔ اسی طرح اگر کھیت کو کھلا پانی لگانے کی بجائے صرف کھالیوں کے ذریعے پانی دیا جائے تو نہ صرف پانی کی بچت ہوگی بلکہ جڑی بوٹیوں کا تدارک بھی کیا جاسکتا ہے۔

2- جڑی بوٹیوں کی تلفی کے کیمیائی طریقے

مخصوص کیمیائی مرکبات سے جڑی بوٹیوں کا تدارک کیمیائی طریقہ کہلاتا ہے۔ جڑی بوٹیوں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف اور محبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم ہوں مثلاً مکھی کے سر برابر (یعنی ایک قطرہ کے بقدر) ہوں پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لئے حرام کر دے گا۔ (سنن ابن ماجہ)

برائکر کی خوراک میں کنوار گندل کی اہمیت و افادیت

ڈاکٹر محمد اشرف، ڈاکٹر فواد احمد، ڈاکٹر محمد شریف، محمد عمران..... انسٹیٹیوٹ آف انیمل اینڈ ڈیری سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کنوار گندل کی اہمیت

- 6- اس کے استعمال سے برائکر کے وزن میں بہتری ہوتی ہے۔
- 7- کنوار گندل کا استعمال مرغیوں کی آنتوں میں چوٹ یا سوزش کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
- 8- اس کا استعمال مرغیوں کے اندرونی نظام کو بہتر کرتا ہے۔
- 9- ایلو ویرا کے استعمال سے مرغیوں کے وزن کو بڑھایا جاسکتا ہے۔
- 10- ایلو پیٹھک ادویات میں اس کے استعمال سے برائکر کو ذہنی دباؤ سے بچایا جاسکتا ہے جس سے اسکی نشوونما بہتر ہو جاتی ہے۔
- 11- ایلو ویرا (Aloe Vera) کو اینٹی کولیسٹرول ادویات کے طور پر بھی برائکر کی خوراک میں شامل کیا جاتا ہے۔
- 12- آنتوں میں مائیکرو فلورا کی روک تھام کیلئے کنوار گندل کو برائکر میں استعمال کرتے ہیں۔
- 13- مرغیوں میں نظام انہضام کو بہتر کرنے کے لئے ایلو ویرا کو استعمال کیا جاتا ہے۔

کنوار گندل (ایلو ویرا) کے پتوں میں پائے جانے والے اجزاء

غذائی اجزاء (Nutrient)	فیصد (Percentage)
خام ریشہ (Crude fiber)	7.84 فیصد
خام چربی (Crude fat)	0.27 فیصد
خام پروٹین (Crude Protein)	4.73 فیصد
خشک مادہ (Dry Matter)	2.36 فیصد
راکھ (Ash)	2.2 گرام
فینول (Phenol)	0.23/100g

- 14- کنوار گندل خون کے غلیظ کو صاف کرنے کے لئے بے حد فائدہ مند ہے برائکر مرغیوں میں تلی (Spleen) کو مضبوط بناتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور جراثیم کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

ایلو ویرا کو عام طور پر کنوار گندل کہا جاتا ہے۔ کنوار گندل کو (Medicine) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کی بہت زیادہ افادیت ہے جس میں بے شمار وٹامن اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ جو انسانوں اور پرندوں کی صحت کے لئے بے حد فائدہ مند ہیں۔ کنوار گندل ایک ریشیلی نما نوکدار پتوں والا پودا ہے جو انڈیا، چین، افریقہ اور مصر میں پایا جاتا ہے۔ جس کی لمبائی 24 سے 39 انچ اور چوڑائی 60 سے 100 سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہے۔

کنوار گندل ایک اینٹی بائیوٹک اینٹی بائیوٹک کی شکل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کہ نقصان دہ بیکٹیریا کو مارنے کے لئے دیا جاتا ہے جو پرندوں کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سالوں سے یہ اینٹی بائیوٹک پرندوں کی خوراک میں استعمال کئے جاتے ہیں جو انکے اندرونی نظام کو نقصان دہ بیکٹیریا کے خلاف لڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ انکا خوراک کی مقدار میں زیادہ ہونا برائکر اور انسان دونوں کی صحت کے لئے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔

اس مقصد کے حصول کے لئے کنوار گندل ایک اینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے۔ جو قدرتی طور پر دنیا میں پایا جاتا ہے جو انکے انڈوں اور گوشت کی مقدار کو بڑھا سکے جس سے انکی صحت اور جسم کی نشوونما بہتر طریقے سے نمو پا سکے اور جراثیم کے خلاف قوت مدافعت کر بڑھا سکے۔ کنوار گندل ایک ایسا پودا ہے جس میں یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔

کنوار گندل کے فائدے برائکر پرندوں کے لئے

- 1- کنوار گندل کو برائکر کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے پرندوں کی پرورش بہتر ہوتی ہے۔
- 2- کنوار گندل برائکر میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔
- 3- کنوار گندل ایک شفا بخش ایجنٹ ہے جو جراثیموں کے خلاف لڑتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔
- 4- کنوار گندل کو خوراک میں دینے سے برائکر کے خونی سیل اور اسکے اندرونی اعضاء کے وزن کو مثلاً (دل، گیزرڈ اور جگر) کو بڑھاتا ہے۔
- 5- اس کے استعمال سے برائکر کی آنتوں میں کیڑے پیدا ہونے والی بیماری ختم ہوتی ہے۔

احادیث

- ☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتیا کسی جاندار کی تصویر ہو۔
- ☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیٹنگ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار سو (100) سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی طے نہیں کر سکے گا۔
- ☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہاری آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ آگ بھی کافی گرم ہے؟ فرمایا: وہ اس سے ستر حصہ زیادہ گرم ہے اور ہر حصہ میں اس کے برابر گرمی ہے۔

گیماریز کی تابکاری سے سٹرس کی پیداواری صلاحیت میں بہتری

محمد عثمان، ڈاکٹر بلقیس فاطمہ، ڈاکٹر محمد عثمان، ڈاکٹر اقرار احمد رانا..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہوئے مطلوبہ خصوصیات کو بدلنے میں تغیر پیدا کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین افزائش نسل اس تکنیک کو اپنی پسند کی خصوصیات کو حاصل کرنے اور پودوں میں مصنوعی میوٹیشن کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔ گریپ فروٹ میں گیماریز پھلوں کے معیار کو بڑھانے میں معاون ہے جیسے پلن کا بننا، پھلوں کے پکنے کے اوقات کو بہتر بنانے، پھولوں اور پھلوں کی اصلاح کا وقت، وزن، سائز اور پختگی کا دورانیہ، مختلف بائیو مالیکولز، خود مطابقت اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت وغیرہ شامل ہیں۔

میوٹیشن بریڈنگ کا عمل ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جس کو جراثیم سے پاک فصل تیار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ پلانٹ کی افزائش کے پروگراموں کے لئے مختلف کیمیکل عملی طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ مصنوعی میوٹیشن کو پودوں کی اقسام اور پھلوں کے معیار کو بہتر بنانے اور ان میں قوت مدافعت پیدا کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ایم اوز (GMOS) بھی انڈیوس میوٹیشن کا نتیجہ ہیں۔ بہت سارے کیمیکلز انڈیوس بریڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں لیکن گیماریز اور ایکس ریز سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔


گیماریز کی تابکاری اور جی، گریپ فروٹ، لیمون اور کنو مالے میں نئی اقسام اور بیجوں کے بغیر اقسام پیدا کرنے کی ایک بہترین تکنیک ہے۔ عموماً "گیماریز کی تابکاری پودے کے بڈوں پر کی جاتی ہے لیکن یہ بیج اور پلن پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح تابکاری کی مقدار عموماً "کم رکھی جاتی ہے۔ جو کہ پودے کی بھٹی اور قسم پر انحصار کرتی ہے۔ جس کی مقدار 40 سے 100 (Gy) ہوتی ہے۔ سٹار روہی وہ پہلی قسم ہے جو تھری نیوٹران کی مدد سے بنائی گئی۔ اسی طرح یوریکا (Eureka) بغیر بیج والی ایک قسم ہے جو گیماریز کی تابکاری سے بنائی گئی ہے۔

گیماریز سے جینز پر ایک مستقل اثر پیدا ہوتا ہے جس سے انزائم کے اینٹی آکسائیڈیٹو اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس سے نمایاں اور بہتر خصوصیات والے پودے پیدا ہوتے ہیں جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور اثرات سے لڑنے کی قوت مدافعت ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق، گیماریز کی تابکاری سے مختلف انزائم جیسے سوڈ (SOD)، پوڈ (POD)، کیٹ (CAT) وغیرہ کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔

چونکہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2050 میں موجودہ آبادی میں 34 فیصد اضافہ ہو جائے گا۔ تیزی سے شہری آباد کاری اور کالونیوں میں اضافہ قابل کاشت زمین کو اپنے اندر ضم کر رہا ہے۔ فوڈ سیوریٹی، معاشی اور خوراک میں پیدا ہونے والے مسائل خصوصی طور پر ترقی پزیر ممالک کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لئے گیماریز میوٹیشن سے انڈیوس میوٹیشن خوراک کے ان مسائل کو خاطر خواہ طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ جس میں اچھی اور بہتر نسل کے فصل سے پیداوار میں اضافہ اور بیماریوں کے خلاف بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

سٹرس صنعت پوری دنیا میں پھلوں کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ پاکستان میں یہ ایک اہم فصل بھی ہے۔ یہ تمام صوبوں میں کاشت کی جاتی ہے، تاہم صوبہ پنجاب کی شراکت 95 فیصد سے زیادہ ہے۔ جینس سٹرس میں اورنج، چکوترا، لیمون اور لیموں، پوملوں شامل ہیں چکوترا عام طور پر گننام پھل کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ غذائیت ہے۔ 2019ء میں، گریپ فروٹ کی عالمی پیداوار (پمیلوس کے ساتھ مل کر) 9.3 ملین ٹن تھی، جس میں سے 53 فیصد چین میں تھی۔ دیگر اہم پروڈیوسروں میں ریاستہائے متحدہ امریکہ، ویتنام اور میکسیکو شامل ہیں۔ نیچے دیے گئے اعداد و شمار میں گریپ فروٹ کی پیداوار میں سرفہرست ممالک شامل ہیں۔



گریپ فروٹ وٹامن، آئرن، کلسیم اور دیگر معدنیات کا اچھا ذریعہ ہے۔ گلابی اور سرخ رنگ کی اقسام میں بیٹا کیروٹینائڈز ہیں جو وٹامن اے کا اچھا ذریعہ ہیں گریپ فروٹ کا جوس کم کیلوری مہیا کرتا ہے اور موٹاپے پر قابو پانے میں مددگار ہوتا ہے۔ بائیوفلاوونائڈز اور دیگر کیمیکل جو پھل کے جوس میں موجود ہیں وہ جسم کو کینسر سے بچاتے ہیں اور دل سے متعلق بیماری سے بچنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اینٹی آکسائیڈنٹس جو پھلوں میں موجود ہیں نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف جسم کی قوت مدافعت کو بہتر بناتے ہیں۔

گریپ فروٹ قدرتی طور پر ایک پالیمریوٹک (Polyembryonic) ہے۔ یہ 19 ویں صدی کے شروع میں فلوریڈا میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس کی مختلف قسموں میں اہم سفید اور گلابی رنگ کی قسمیں ہیں۔ تمام اقسام میں سے، ڈکن (Duncan) سفید رنگ کی سب سے قدیم قسم ہے۔ ٹیکساس میں 70 فیصد سے زیادہ سرخ قسمیں اگائی جاتی ہیں۔ فلوریڈا میں تقریباً 59 فیصد گلابی اور سرخ رنگ کی اقسام تجارتی طور پر اگائی جاتی ہیں جبکہ ارجنٹائن میں 94 فیصد گلابی اور سرخ رنگ کی قسمیں کاشت کی جاتی ہیں۔

گیماریز میوٹیشن نے افزائش نسل کے شعبہ میں اور باغبانی کی فصلوں کے جرم پلازم کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے لئے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ نسل کو بہتر بنانے والی اس تکنیک کا استعمال کرتے

بے روزگاری۔ ایک عالمی مسئلہ

ڈاکٹر نانہ نواز، ڈاکٹر سائرہ اختر، ڈاکٹر اعجاز شرف، شبیر احمد..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

وقت بھی ملازمت سے ہٹا دیا جاتا ہے اب سرکاری دفاتروں میں سفارشی اور رشوتی لوگ ہی ملازمت کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے تعلیم یافتہ غیر تعلیم ہنرمند اور غیر ہنرمند تمام افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں ہنرمندوں کی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ ملازمتوں سے محروم ہیں۔ ملازمین کے لئے دفاتروں کے چکر لگاتے ہیں لیکن آسانی دستیاب نہیں ہوتی۔

صنعتی بے روزگاری بھی ایک مرحلہ ہے۔ جہاں بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے پرائیویٹ مشین لگائی ہے جہاں بہت کم ملازم رکھ کر بہت زیادہ تعداد میں پروڈکشن حاصل کی جاتی ہے۔ آئے دن ہڑتالوں کی وجہ سے تجارت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اب یہ کورونا کی وجہ سے لا تعداد لوگ بے روزگار ہو کر بیرون ملک سے واپس آ گئے ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری کا ریلہ مزید بڑھ رہا ہے۔

تجاویز

امپورٹ کی حوصلہ شکنی

غیر ممالک سے اشیاء درآمد کرنے پر زیادہ ٹیکس لگایا جائے صرف ضروری اشیاء پر درآمد کی اجازت دی جائے مثلاً مشینری، کیمیکلز، فنی و طبی کتب اور جدید سائنسی سامان وغیرہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ملک میں بنائی جائے اور لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ جگایا جائے۔

صنعتوں کو سوشلسٹ نظام پر چلایا جائے

صنعتوں میں ترقی کے لئے ہمارے ملک سے سرمایہ داری کا نظام ختم کر کے صنعتوں کو سوشلسٹ نظام پر چلایا جائے۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں بھی فنی اداروں کو سہولتیں دی جائیں تاکہ شہروں اور دیہاتوں کا فرق مٹ جائے۔ تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ کام کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ بے روزگاری کے لئے مؤثر اقدام اٹھائے تاکہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور غیر محنت مندانہ ماحول پیدا نہ ہو۔

بے روزگاری ایک عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے امیر اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ اس سے فائدہ طاری ہوتا ہے۔ بیماری پھیلتی ہے اور یہ انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ اس سے ملک کی سیاسی صورتحال بھی متاثر ہوتی ہے۔

بے روزگاری کے اثرات

- بے روزگاری اچھے شہریوں کو بھی مجرم اور ڈاکو بنادیتی ہے۔
- اس سے جھوٹ بڑھتا ہے۔
- بے روزگاری سے شرافت اور ایمانداری کی توقع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
- غربت اور بے روزگاری بہت بڑی کمزوری ہے۔
- اس سے معاشی بدحالی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔
- تعلیم میں کمی آئی ہے۔
- بے روزگاری سے کاشتکاری میں رکاوٹ اور آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔
- یونیورسٹی سے فارغ۔۔۔ گریجویٹ بھی کلرک کی جاب کر رہے ہیں اور کلرک کی آسانی ملک میں بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا نہیں کرتی۔
- ایک دوسرے سے مقابلے کی دوڑ میں ہر کوئی پریشان ہے۔
- ایک مرد در انسان اپنے بیوی بچوں کی دو وقت کی روٹی کے علاوہ دوائی تک میسر نہیں کر سکتا۔
- بے روزگاری سے بدعنوانی پھیلتی جا رہی ہے۔

پاکستان میں بے روزگاری

چند سالوں سے سرکاری دفاتر روزگار ختم کر دیئے گئے ہیں۔ اب تمام اداروں نے اخبارات کے ذریعے آسمانیاں پر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے سرکاری ملازمتوں کے لئے پہلے ہی گٹھ جوڑ کر لیا جاتا ہے اور پرائیویٹ ادارے مجبور امیدواروں کو کم تنخواہ پر رکھ لیتے ہیں۔ جہاں سے انہیں کسی

زندگی اور موت (اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے)

وہ اللہ ہی جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیئے۔ مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو ☆ وہ (اللہ) ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم (سب) اسی کے پاس اکٹھا کئے جاؤ گے ☆ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ رات اور دن کا بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی

☆ سورۃ المؤمنوں 23 ترجمہ آیات 78 تا 80

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علیؓ کا بوسہ لیا (چوما) اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرا ع حابس تھے۔ اقرا ع نے کہا کہ میرے دس بچے ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (امام بخاری، امام مسلم)

کرونا وائرس، قوت مدافعت اور ویکسین

ڈاکٹر نانہ نواز، ڈاکٹر اعجاز شرف، بشیر احمد، ماریہ بتول..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اوقات لمبے عرصہ تک موجود رہتی ہیں اگر ایک مخصوص عرصہ تک وائرس دوبارہ داخل نہ ہو تو جسم ان اینٹی باڈیز کو توڑ کر حسب ضرورت دوسری اینٹی باڈیز یا کیمیائی اجزاء جن کی اس وقت اشد ضرورت ہو بنا لیتا ہے انسانی جسم کے اس مدافعتی نظام کو سمجھنے کے بعد سائنسدانوں نے ویکسین ایجاد کی کسی بھی ویکسین میں بیماری پھیلانے والے جراثیم کا کوئی نگلہ مردہ جراثیم یا پھر زندہ مگر کمزور شدہ جراثیم موجود ہوتا ہے جو ایک صحت مند انسان جس کا مدافعتی نظام ٹھیک کام کر رہا ہو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے ایسا کرنے سے انسانی جسم کا مدافعتی نظام قدرتی طور پر جراثیم کے خلاف مدافعتی عمل شروع کر دیتا ہے اور اینٹی باڈیز کی تشکیل دے کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی جراثیم کے خلاف مدافعتی قوت پیدا کرنے کے عمل کو ایمنیٹی حاصل کرنا کہتے ہیں اس طریقے سے ایمنیٹی حاصل کرنے کے لئے انسان کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ویکسین کے انجیکشن کے بعد مدافعتی نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے قدرتی طور پر اینٹی باڈیز بنا سکے اگر انسان کے جسم میں ایسا کرنے کی بھرپور صلاحیت نہ ہو تو ممکن ہے کہ ویکسین لگنے کے باوجود بھی ایمنیٹی پیدا نہ ہو اور بیماری لگنے کا خطرہ لاحق ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ویکسین لگنے سے انسان الٹا شدید بیماری ہو جائے اسی لئے کسی بھی ویکسین کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کرنا بہت خطرناک ہے گویا اگر جسم ایک دفعہ کسی وائرل انفیکشن سے صحت یاب ہو جائے تو اصولاً ایک مخصوص عرصہ تک دوبارہ وہی وائرس اس پر حملہ وار نہیں ہو سکتا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلوار دیگر وائرل انفیکشن بار بار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ وائرس کے جینیاتی مرکب میں تبدیلی ہے جسے جینیاتی ارتقاء بھی کہہ سکتے ہیں جب جسم کے خلیہ وائرس کے زیر اثر مسلسل اور تیز رفتاری کے ساتھ افزائش نسل کرتے ہیں تو وہ وائرس دیتے ہیں جینیاتی مرکب میں یہ معمولی سی تبدیلی بعض اوقات اتنی معنی نہیں رکھتی مگر تبدیل شدہ مرکب کی مزید کاپی کر کے دوران یہ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے اور وائرس کی شکل میں واضح تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ مختلف بیکٹیریل انفیکشن کے لئے طرح طرح کی ادویات جن کو ہر حرف عام میں اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں دستیاب ہیں جو کافی مؤثر طریقے سے بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ کر کے صحت یابی بخشتی ہیں دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک جس کا نام پینسلین ہے اس کی دریافت الگونیڈز فلڈنگ نے 1928ء میں کی اس دریافت سے پہلے نسل انسانی بے تحاشہ بیکٹیریل انفیکشن سے پریشان تھی اور بیشتر وبائی بیماریوں نے ماضی میں انسانوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی کی۔ خیال ہے کہ اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریا کے خلاف ہی کام کرتی ہیں اور وائرس کے خلاف بالکل کام نہیں کرتیں اینٹی بائیوٹکس اور جسم کے مدافعتی نظام کی تباہ کردہ اینٹی باڈیز کے درمیان بہت فرق ہے یہ اینٹی باڈیز جسم کا مدافعتی نظام قدرتی طور پر تیار کرتا ہے اور یہ عام طور پر دواؤں کی شکل میں دستیاب نہیں ہوتیں وائرس کے خلاف عام طور پر دوا یا اس استعمال کی جاتی ہیں ان کو اینٹی وائرل کہا جاتا ہے اور سائنس نے اب تک کئی اینٹی وائرل میڈیسیں تیار کی ہیں جو مختلف وائرس کے خلاف افادیت رکھتی ہیں چونکہ بیکٹیریا کی طرح وائرس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا اس لئے وائرس کو اس طرح نہیں مارا جاسکتا جس طرح اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا کا خاتمہ کرتی ہیں ایسا ممکن نہیں کہ یہ دوائیں تمام وائرسوں کے خلاف یکساں مفید ہوں اس لئے بہت سی وائرل بیماریوں سے شفاء آج بھی انسانی جسم کے مدافعتی نظام کے مرہون منت ہے۔

”وائرس کی مثال بھی کچھ اس طرح ہے جس کا کوئی جسم نہیں اور یہ کسی جاندار خلیہ کے اندر داخل ہو کر اس کے نظام کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔“

ڈاکٹر فلموں میں اکثر آپ نے بدروحوں کی کہانی سنی ہوگی جو دنیا میں پھلتی رہتی ہیں اور کسی انسانی جسم میں پنہاں ہو کر اپنی تباہ کاریاں دکھاتی ہیں وائرس کی مثال بھی کچھ اسی طرح ہے جس کا جسم نہیں اور یہ کسی جاندار خلیہ کے اندر داخل ہو کر اس کے نظام کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے وائرس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ بیکٹیریا اور دیگر خوردبینی جاندار کا اپنا جسم یعنی خلیہ ہوتا ہے اور ان میں اپنی افزائش نسل کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اس کے برعکس وائرس اپنی افزائش نسل نہیں کر سکتے جب تک وہ کسی زندہ خلیہ میں داخل ہو کر اس کو اپنے حکم کے تابع بنادیں بنا لیتے۔ یوں تو بے تحاشہ وائرس اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں مگر بہت کم وائرس ہی کسی جاندار چیز کے خلیہ میں داخل ہو جاتے ہیں کچھ وائرس ایک قسم کے جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں دور حاضر میں بین الاقوامی طور پر تباہی پھیلانے والا کرونا وائرس بھی ان وائرس کی ایک قسم ہے جب کوئی بھی وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد افزائش نسل ہوتا ہے اس لئے وہ جاندار کے خلیہ کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اس کو افزائش پر مجبور کر دیتا ہے وہ خلیہ ایک سے دو خلیوں میں بٹ جاتا ہے اور پھر وہ دوسے چار پھر چار سے آٹھ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں اس خلیہ کی نسل بڑھنے لگتی ہے اسی طرح وائرس کی نسل بھی خلیہ کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور وہ جاندار کے جسم کے تمام وسائل اپنے مفاد میں بروئے کار لاتے ہوئے تیزی سے پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے۔ جب وائرس کسی متاثرہ شخص کے خلیوں کے اندر ہوتا ہے تو یہ بظاہر مدافعتی نظام کے خلیوں سے پوشیدہ ہوتا ہے تاہم متاثرہ خلیات اپنی بیرونی سطح پر اشارے کے طور پر نشانی ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح اگر کسی دروازے پر خطرہ کی علامت لگی ہو تو آپ چونکا ہو جاتے ہیں اسی طرح خلیہ کی بیرونی سطح پر اس علامت کو دیکھ کر جسم کے مدافعتی نظام کے خلیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کن خلیوں کے اندر وائرس موجود ہے نئی نسل نامی مدافعتی خلیوں کی ایک قسم ان اشاروں کی پہچان کو فوراً مخصوص دفاعی ہتھیار جنہیں اینٹی باڈی کہتے ہیں تیار کرتے ہیں جو وائرس ذرہ خلیوں سے چٹ جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں اس عمل میں جیت کا دار و مدار اسباب پر مبنی ہے کہ جسم کا مدافعتی نظام کتنی تیزی سے حرکت میں آتا ہے اور کتنی تیزی سے اینٹی باڈیز کی تشکیل دیتا ہے اگر وائرس کی افزائش تشکیل سے تیز ہو تو جسم وائرس کے بروقت پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام ہوتا ہے اور وائرس جسم کے مختلف اعضاء میں پھیلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہی وائرس جسم میں پہلے بھی کبھی داخل ہوا ہو تو جسم کے مدافعتی نظام میں اس کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اینٹی باڈی بنانے کا عمل بہت تیزی سے کر سکتا ہے مگر جب وائرس کسی مریض کو پہلی بار متاثر کرتا ہے تو وائرس کی شناخت اور اینٹی باڈی بنانے کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کمزوری اور بیماری کی علامتیں محسوس کرنے لگتا ہے لیکن جب مدافعتی نظام وائرس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عام طور پر بازیابی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حرف اینٹی باڈیز عام میں وائرس کے خلاف ایمنیٹی کا کام کرتی ہے اور بسا

لتھوپس (زندہ پتھر)

محمد عدیل اصغر، ڈاکٹر احسن اکرم، ڈاکٹر عدنان یونس..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

پراکھ وقت میں پتوں کا صرف ایک جوڑا ہی موجود ہوتا ہے۔ اس لئے نئے پتے آنے کے لئے پرانے پتے ختم ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ نئے پتوں کے آنے کا عمل پھول آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔

دیکھ بھال

یہ سورج کی چمکدار روشنی میں اچھی نشوونما پاتے ہیں۔ کم روشنی کی وجہ سے پتوں پر موجود پزائے ختم ہو جاتے ہیں، اور پتے لمبے ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے صبح کے وقت چار سے پانچ گھنٹے تک مناسب روشنی ملتی رہے، جبکہ شام کے وقت سایہ دار جگہ میں رکھیں۔ یہ زیادہ روشنی کو پسند نہ کرتا ہے، لیکن زیادہ گرمی پتوں کے جھلساؤ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کو اچھی نکاسی آب والی مٹی میں لگانا چاہیے۔ زیادہ تر ریت اور بجر کی کسی میڈیا میں ملائے جاتے ہیں۔ اس کو کیکٹس مکس یا تیزی سے نکاسی آب ہونے والے میڈیا میں لگایا جائے۔ چونکہ یہ صحرائی علاقے کا پودا ہے، اس لئے یہ خشک سالی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لئے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب نئے پتے بن رہے ہوں تو پانی کی فراہمی انتہائی کم کریں۔ گرمیوں میں تھوڑا پانی دیں اور سردیوں میں پانی کی فراہمی روک دیں۔ یہ زیادہ پانی کی نسبت کم پانی پر بہتر نشوونما کرتا ہے۔ گملے میں زیادہ پانی رہنے کی وجہ سے مختلف فنگس کی وجہ سے گلے سڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کم روشنی بھی فنگس اور گلے سڑھنے والی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔

افزایش نسل

اس کی افزائش نسل بیج کی مدد سے کی جاتی ہیں۔ تاہم یہ بہت کم تقسیم سے تیار کئے جاتے ہیں۔ اس کے بیج اُگانا آسان ہے، لیکن یہ پہلے دو سال بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔

مسائل

اس کے اوپر کیڑوں مکوڑوں کا زیادہ حملہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ سکیلز کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فنگس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی روک تھام کے لئے مناسب خیال رکھا جائے۔

استعمال

اس کو چھوٹے سے پیالے میں لگا کر کسی بھی مناسب جگہ پر موجود ٹیبل پر رکھا جاسکتا ہے، چونکہ یہ دوسرے پودوں کی طرح زیادہ بڑے نہیں ہوتے، اس لئے یہ زیادہ جگہ نہیں گھیر لیتے لیکن خوبصورتی اور دلکشی میں یہ اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ بیڈروم اور دفاتر میں ان کے خوبصورت رنگوں کی موجودگی چارچاند لگادیتی ہے۔

<<<<<<<>>>>>>>

پودوں میں اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کی شان کیا خوب نمایاں نظر آتی ہے۔ پودوں کی نوا لکھ سے زائد اقسام پیدا کر کے خالق کائنات نے اہل زمیں پر احسان فرمایا ہے۔ پودوں کے حسن اور کثرت انسانی عقل دگر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے انہیں خوبصورت پودوں میں سے پودوں کا ایک جیننس لٹھو پلس بھی ہے، جو کہ خوبصورتی میں نمایاں مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت کا باعث بھی ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ پودا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے، جیسے کوئی پتھر پڑا ہو، لیکن بغور جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں۔

لچھولپس جینس فیملی Aizoaceae سے تعلق رکھتا ہیں۔ جو کہ بنیادی طور پر جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کو Pebble Plants, Living Stones بھی کہا جاتا ہے۔

اقسام

اس کی مختلف انواع درج ذیل ہیں۔

L. franciscL.

Lithops karasmontan

pseudotruncatellai

L. olivaceae

L. schwantessi

L. Salicola

یودے کی ساخت اور نشوونما

ایک لٹھو پس ایک گودے دارد و بر عکس حصوں اور مکمل طور پر جڑے ہوئے پتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی تنا نہیں ہوتا۔ دونوں حصوں کے درمیان موجود دھاری میں میری سٹیم موجود ہوتا ہے۔ جس میں سے نئے پتے اور پھول نکلتے ہیں۔ اس کے اصل پتے یہاں ضیائی تالیف ہوتی ہیں۔ مٹی کے تقریباً نیچے ہوتے ہیں۔ جس کے اوپر ایک شفاف کھڑکی موجود ہوتی ہے، جس میں سے روشنی پتے تک پہنچتی ہے، اور ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے۔ یہ پتے مختلف انواع کے لحاظ سے مختلف رنگوں اور ڈیزائن کے ہو سکتے ہیں۔ جس میں سرخ، سبز، پیلے، بھورے یا گہرے رنگ کے پتے ہو سکتے ہیں۔ پتے جوان ہونے کے بعد ان میں سے پیلے یا سفید رنگ کے پھول نکلتے ہیں۔ جو کہ مختلف انواع میں مختلف وقت پر لگتے ہیں۔ پھول عام طور پر خوشبودار ہوتے ہیں۔ پھول ختم ہونے کے بعد پودا خوابیدگی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نئے پتوں کے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، نئے پتے پرانے پتوں سے غذائی اجزاء جذب کرتے ہیں، اور پرانے پتوں میں موجود سوراخ سے باہر نکل آتے ہیں۔ سردیوں میں پتوں کے درمیان سے ایک یا کبھی بکھارا ایک سے زیادہ پتوں کا جوڑا نکلتا ہے جبکہ بہار میں پرانے پتے سوکھنا اور ختم ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ لٹھو پس کا پودا ہر سال نئے پتے بناتا ہے، اور اس

فرقان عظیم

ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ (یعنی تو وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے جس کو خبر خدا کے نبی ﷺ تجھے دیتے رہے تھے) اس کا ساتھی (ہائیک کر لانے والا فرشتہ عدالت الٰہی میں پہنچ کر) عرض کرے گا کہ یہ (شخص) جو میری سپردگی میں تھا، حاضر ہے۔ حکم ہوگا ”ہر ناشکرے اور سرکش کا فر کو جہنم میں پھینک دو جو حق سے عناد کرنے والا اور احد سے تجاوز کرنے والا تھا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنانے بٹھاتا تھا۔ سو اسے سخت عذاب میں ڈال دو“۔ (سورۃ ق، آیت 22-26)

اکیسویں صدی کے زرعی اہداف اور ڈیجیٹل ایگری کلچر

ڈاکٹر رضوان مقبول، محمد طلحہ اسلم، ڈاکٹر عمران خان، ڈاکٹر عمر چٹھہ، محمد عزیز الحسن، محمد عیسیٰ حسن..... شعبہ ایگریکولٹی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اور انتظامات (Managment) جو کہ فصل کی پیداوار پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ مزید برآں یہ ٹیکنالوجی کسان کو اس کے کھیت میں لگی فصل کی پیداوری تغیرات اور گئے گئے انتظامات کے متعلق اہم معلومات برائے راست مہیا کرتی ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک عام کسان اپنے کھیت میں ضرورت کے عین مطابق کھاد کا درست جگہ پر استعمال کر کے اپنے اخراجات میں بھی نمایاں کمی لاسکتا ہے۔

متغیر شرح ٹیکنالوجی (VRT) اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی مدد میں ڈالے گئے تمام Inputs (کھادیں، پانی، سپرے) کھیت کے صرف اسی حصے میں مہیا کئے گئے ہیں جہاں فصل کو واقعاً ضرورت تھی اور یوں غیر ضروری Inputs کے استعمال میں کمی لاکر پیداوار کی لاگت کو کم جبکہ کھیت کے منافع کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ Digital Agriculture سے کاشتکاروں کو فصل کے بیج کی شرح کو اعتدال میں لانے، کھادوں کا بروقت اور تعین کردہ جگہ پر مناسب مقدار میں استعمال کرنے، کیڑے مارا دویات کو مخصوص کر کے ماحول پر ان کے منفی اثرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ پیداواری صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کیلئے خوراک مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق زراعت میں ٹیکنیکی ترقی کو ختم نہیں کیا جاسکتا ہے یہ پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ قانون سازی میں بھی موزوں ہے اس نے زراعت میں مزید تحقیق اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور جبکہ سرمایہ کاری نہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی ہے البتہ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کی شرح انتہائی سست ہے مزید یہ کہ حکومتی سطح پر عہدیداران کی طرف سے جدید ٹیکنالوجی تک کسانوں کی رسائی کو بہتر بنانے کا فقدان ہے جس وجہ سے تجارتی زراعت میں سرمایہ کاری محدود ہوتی جا رہی ہے بد قسمتی سے موجودہ حکومتی پالیسی ملکی زرعی اہداف کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔

زراعت میں تکنیکی ترقی کو چھوٹے کسانوں تک رسائی، زراعت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جدت کی حوصلہ افزائی کرنے اور تحقیق میں باعینی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لئے ملک میں نئی ٹیکنالوجی کو بروقت اپنانے کے لئے حکومتی سطح پر ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اس ٹیکنالوجی کے تحت کاشتکار بیک وقت دو طریقوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مناسب شرح بیج کے ساتھ معتدل مقدار میں کھادوں، پانی اور کیڑے مار دواؤں کو مقررہ مقدار میں تعین کردہ جگہوں پر مہیا کر کے فصل پر آنے والے اخراجات میں کمی لائی جاسکتی ہے اور دوسرا اس طریقے سے حاصل ہونے والی پیداوار عام کاشتکاروں کی فصل کی پیداوار سے زیادہ ہوتی ہے جو منافع کی شرح میں یقینی اضافہ کرتی ہے۔

زراعت کا شعبہ روز اول سے ذریعہ معاش ہے جس کے ذریعے انسان قدرتی وسائل سے عرصہ دراز سے منسلک ہے۔ دنیا کی آبادی میں 21 ویں صدی کے دوران 12 تا 12.85 بلین تک اضافہ ہوا ہے۔ اس بے انتہا آبادی میں اضافے کے پیش نظر دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں زرعی رقبہ میں کمی، شہری آبادی میں اضافہ اور زرعی پیداوار نمایاں ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہمیں مستقبل قریب میں خوراک کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

زمینی آبادی میں دن بدن اضافہ کے باعث تمام عوامل جو خوراک کی تیاری میں کارآمد ہوتے ہیں، ان میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے نتیجتاً اس جدید دور میں خوراک لوگوں کے بنیادی مسئلہ کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کثیر مقدار میں لوگوں کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لاکھوں اٹن اشیائے خورد و نوش کی پیداوار یعنی بنانی ہوگی جو کہ زراعت کے شعبے میں جدت کے بغیر ممکن نہیں۔ زرعی شعبے میں جدت کے علاوہ لوگوں کو Precision Agriculture کی طرف بھی قائل کرنا دور حاضر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ Precision Agriculture کسے کہتے ہیں؟ اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟

زراعت کے شعبہ میں آئی ٹی (IT) اور جدید آلات کو بروئے کار لاتے ہوئے (پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ) inputs کی بچت، کھادوں اور زرعی ادویات کا موثر استعمال کے ساتھ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کو Precision Agriculture کہتے ہیں۔ عالمی پوزیشننگ سسٹم (GPS)، جغرافیائی انفارمیشن سسٹم (GIS) اور ریورٹ سینسنگ (Remote Sensing) کی مدد سے Precision Agriculture کو ممکن بنایا جاسکتا ہے۔

عالمی پوزیشننگ سسٹم (GPS) اور جغرافیائی انفارمیشن سسٹم (GIS) کی مدد سے کھیت کی نقشہ سازی، مٹی کے نمونے لینا، inputs کی فراہمی، فصل کا معائنہ اور ٹریکٹر کی رہنمائی جیسے اہم کام کو با آسانی اور درست طریقے سے کیا جاسکتا ہے اس پروگرام کے تحت زمینی خواص کی جگہ کا تعین کرنے کے لئے ریڈیو اینوگیٹیشن سسٹم کا اطلاق بھی ممکن ہے۔ اس پروگرام کو GPS سسٹم کے تحت چار سیٹلائٹس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ سیٹلائٹس بلا تعطل سگنلز (Signals) کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں لیکن جب چیزیں حرکت میں ہوں تب غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے جس کے خاتمے کے لئے (DGPS) کو استعمال کیا جاتا ہے جو دف کی پوزیشن صحیح معلومات فراہم کرتا ہے۔

علاوہ ازیں Precession Agriculture جدید زراعت میں پیداوار کی نگرانی کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے جس کی مدد سے کھیت میں موجود کھڑی فصل سے ہی پیداوار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس ٹیکنالوجی کو 1980ء سے ہی پیداوار کے تعین اور کھیت کی نقشہ سازی جیسے اہم کاموں میں استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے ایک کھیت میں مختلف جگہوں پر مٹی کے تغیر

<<<<<<<>>>>>>

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قناعت اختیار کرو امیر بن جاؤ گے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا نا بند کر دو تو عزت دار بنو گے۔ رزق کی کشادگی کے لئے ہمیشہ با وضو رہو۔ دُعاؤں کی قبولیت کے لئے مال حرام سے پرہیز کرو۔ قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہو تو ظلم کرنا چھوڑ دو۔ بداخلاقی اور بخل سب سے بڑی برائیاں ہیں۔

شور کی آلودگی: وجوہات اور ان کا تدارک

نوید احمد، ڈاکٹر عدنان یونس..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہوتے ہیں۔

شور کی آلودگی کی سب سے بڑی سرکوں پر موجود ٹریفک، ریلوے اور ہوائی ٹریفک ہے۔ اس کے بعد تعمیراتی کام اور صنعتی کام میں استعمال ہونے والی مشینری ہے جو کہ شور کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے۔ بلا ضرورت لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی شور کی آلودگی میں اضافے کا باعث ہے۔ گاڑیوں پر لگے ہارن شور کی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں گلی کوچوں میں پھیری والے اشیاء بیچنے کے لئے لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ مساجد میں بلا ضرورت لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی عوام کے لئے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔

درختوں، جھاڑیوں، بیلوں اور نباتات کی دوسری اقسام سے شور کی آلودگی کو منوثر طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔ رہائشی علاقوں اور مصروف سڑکوں کے درمیان درختوں اور جھاڑیوں کی رکاوٹیں بنائی جاسکتی ہیں۔ اس کے لئے اسے درختوں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے جو گھنے ہوں اور عمودی سمت میں بہتر نشوونما پاتے ہوں۔ جب درخت بڑا ہوتا ہے تو سایہ ہونے کی وجہ سے اس کی پُٹلی شاخیں کم ہو جاتی ہیں اس لئے پُٹلی طرف سے شور گزر سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لئے درختوں کے ساتھ جھاڑیوں کی تظار لگائی جاسکتی ہے۔ رہائشی علاقوں میں شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لئے بید مجنوں کی باڑ تیار کی جاسکتی ہے۔ یہ شور کی روک تھام کے اتنی ہی منوثر ہے جتنی سیمنٹ سے تیار کی گئی دیوار۔ پتہ جھڑ والے پودوں کی نسبت سدا بہار پودے شور کو کم کرنے کے لئے زیادہ منوثر ہیں۔ علاوہ ازیں باریک پتوں والے پودوں کی نسبت بڑے پتوں والے پودے شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لئے زیادہ منوثر ہیں۔

کچھ عرصہ پہلے شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لئے سوئیک کرسٹلز (Sonic crystals) کا طریقہ وضع کیا گیا۔ سوئیک کرسٹلز کو شور کے خلاف ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے مواد سے بنے ہوتے ہیں اور خاص ترتیب سے لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے شور کو ان کرسٹلز سے گزرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے اس طرح شور ان میں سے گزر کر آگے نہیں جاسکتا۔

کوئی بھی چیز جو ماحول پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے آلودگی کہلاتی ہے۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں جن میں سے زیادہ اہم آبی، فضائی، زمینی اور شور کی آلودگی ہیں۔ آبی آلودگی کی بڑی وجہ صنعتی پانی ہے جو کہ صاف پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ فضائی آلودگی صنعتوں اور مواصلات کے لئے استعمال ہونے والی مشینری سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بڑھ رہی ہے۔ شور کی آلودگی کی بڑی وجوہات میں صنعتوں اور گاڑیوں سے پیدا ہونے والا دھواں ہے۔ آلودگی خواہ کسی قسم کی بھی ہو اس کی روک تھام ضروری ہے تاکہ ماحول پر اس کے بُرے اثرات کو کم کیا جاسکے۔

کوئی بھی بے ہنگم اور اونچی آواز جو جانداروں کے لئے موجب بے چینی ہو شور کہلاتی ہے۔ شور فضا میں ارتعاش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ارتعاش کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہریں ہوا میں دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ لہریں کسی جاندار کے کان سے ٹکراتی ہیں تو کان میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں جس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی آواز جو انسانی اعصاب کے لئے بے چینی کا سبب ہو شور کہلائے گی۔ شور کی آلودگی کو پریشر کی شکل میں پیمائش کیا جاتا ہے اور اس کی پیمائش کی کائی ”ڈیسی بل“ ہے۔ ڈیسی بل میٹر سے شور کی شدت کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ اگر آواز کی شدت 85 ڈیسی بل سے زیادہ ہو تو یہ کانوں کے لئے نقصان دہ ہے۔ اگر آواز کی شدت 65 ڈیسی بل سے کم ہو تو یہ نقصان دہ نہیں ہے اور اگر آواز کی شدت 140 ڈیسی بل سے اوپر ہو تو یہ تکلف دہ ہے۔ تاہم اگر آواز کی شدت 35 سے 40 کے درمیان ہو تو یہ انسانی کانوں کے لئے زیادہ آرام ہے۔

شور ماحولياتی آلودگی کی ایک قسم ہے۔ آلودگی کی دوسری اقسام کی طرح شور کی آلودگی بھی انسانی صحت کے لئے مضر ہے۔ گنجان آباد علاقوں میں بسنے والے کروڑوں افراد روزانہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ اور عدم توجہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیند جو کہ صحت مند زندگی کے لئے ضروری ہے شور سے اس میں خلل واقع ہوا ہے۔ کئی معتبر تحقیقات کے مطابق شور کی آلودگی کی وجہ سے فشارخون میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کے عارضے لاحق

باعث ہلاک: سات چیزیں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاکت کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سات چیزیں کونسی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمادیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا، (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

<<<<<<<<>>>>>>>>

الحديث

الحديث

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا۔ تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تیری ماں۔ اس نے عرض کیا۔ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ تیری ماں تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ پھر تیرا قریبی عزیز۔ تیرا قریبی عزیز۔ (امام بخاریؒ، امام مسلمؒ)

<<<<<<<>>>>>>

کراپ ماڈلنگ اور جدید زرعی اقدامات کا گندم کی پیداوار بڑھانے میں کردار

پی ایچ ڈی۔ کالر: شہزاد طاہر نگران: ڈاکٹر اشفاق احمد شعبہ: ایگرا نومی

ہمارے ملک میں گندم کی پیداوار کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے گندم جب پکنے پر ہوتی ہے تو بارشوں اور آندھیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے فصل گر جاتی ہے۔ اس سے گندم کی پیداوار کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں گندم کی کاشت کا موزوں وقت یکم نومبر سے 30 نومبر ہے۔ تحقیق کے مطابق 30 نومبر کے بعد کاشت کی گئی گندم کی فصل کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیماریوں سے پاک، صاف ستھرے اور صحت مند بیج اور کھادوں کا متوازن اور بروقت استعمال کرنا چاہیے۔ کھادوں کے استعمال سے پہلے زمین کی زرخیزی، اس کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ گندم پر موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لئے کراپ ماڈل کو کامیاب آلے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مختلف موسمی حالات کے تحت مختلف کراپ ماڈل استعمال کئے جا رہے ہیں۔ ایگرا نومک ریسرچ ایریا، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں مختلف ایگرا نومک طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے گندم کی بڑھوتری اور زیادہ پیداوار کو جانچنے کے لئے متواتر دو تجربہ بات 2015-16، 2016-17ء کو لگائے گئے۔ فیصل آباد کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے گندم کی اوسط پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تمام موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تحقیق سے جو نتائج اخذ کئے گئے ان کے مطابق 10 نومبر کو شرح بیج 125 کلوگرام فی ہیکٹر استعمال کرتے ہوئے اور نائٹروجنی کھاد 120 کلوگرام فی ہیکٹر بہتر پیداوار حاصل کی گئی۔ گندم میں خود کفیل ہونے کے لئے اور آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے۔ یہی صورت میں ممکن ہے جب ہم جدید زرعی عوامل پر عمل پیرا ہوں اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے مسلسل کوشاں رہیں۔

پاکستان میں بائیو انرجی کی پیداوار کیلئے جوار کی اقسام کا معائنہ

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد عمیر حسن نگران: ڈاکٹر محمد عمر چٹھہ شعبہ: ایگرا نومی

انرجی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور عوامی فلاح بہبود میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ روایتی انرجی کے ذرائع جیسا کہ پٹرولیم مصنوعات دنیا بھر میں انرجی کا اہم ذریعہ ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ذرائع دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ذرائع ہمارے ماحول کیلئے نقصان دہ ہیں۔ اس لئے ہمیں ایسے ذرائع ڈھونڈنے چاہیے جو نہ صرف ہمارے ماحول کیلئے فائدہ مند ہو بلکہ ہماری انرجی کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہوں۔ بائیو فیول جو کہ پودوں سے بنایا جاسکتا ہے ایک انرجی کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ہمارے ماحول پر بہت کم منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جوار ایک اہم فصل ہے۔ جو دنیا بھر میں بائیو فیول بنانے کیلئے استعمال ہو رہی ہے۔ اس لئے جوار کی مختلف اقسام (وائی ایس۔ 2016، جے ایس۔ 2002، جوار۔ 2011، جگاری، جے ایس۔ 263) کی بائیو انرجی پیداوار جاننے کیلئے 2016 اور 2017 میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تجربات کئے گئے۔ ان تجربات کی روشنی میں جوار کی مختلف اقسام میں بائیو ماس پیداوار، کیمیائی ساخت، اور میتھین کی پیداوار کے لحاظ سے فرق دیکھا گیا۔ جوار۔ 2011 نے سب اقسام میں سے اچھے نتائج دیئے اور سب سے زیادہ بائیو ماس پیداوار دی اور اس کے علاوہ جے ایس۔ 2002 نے سب سے کم بائیو ماس پیداوار دی۔ اس طرح سب سے زیادہ پروٹین اور فائبر جوار۔ 2011 میں ریکارڈ کئے گئے جبکہ سب سے کم جے ایس۔ 2002 میں کئے گئے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ مخصوص میتھین کی پیداوار جے ایس۔ 2002 میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے کم پیداوار جوار۔ 2011 میں ریکارڈ کی گئی۔ اس کے برعکس جوار۔ 2011 نے سب سے زیادہ میتھین کی پیداوار (ha) دی کیونکہ اس کی بائیو ماس کی پیداوار سب سے زیادہ تھی۔ جبکہ جے ایس۔ 2002 نے سب سے کم میتھین کی پیداوار (ha) دی جس کی بنیادی وجہ اس کی سب سے کم بائیو ماس پیداوار تھی۔ ان کی نتائج کے مطابق یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جوار۔ 2011 کامیابی کے ساتھ گرم علاقوں میں زیادہ سے زیادہ میتھین کی پیداوار حاصل کر کے لگائی جاسکتی ہے۔

کپاس میں پھول کھلنے پر زیادہ درجہ حرارت کے اثرات اور بوران / زک کے سپرے سے اس کا انسداد

پی ایچ ڈی۔ کالر: عبدالغفور نگران: ڈاکٹر محمد فرخ سلیم شعبہ: ایگرا نومی

گندم کی فصل کی کٹائی اور سنبھال کے بعد زمین کی تیاری اور کپاس کی بوائی میں تاخیر سے زیادہ درجہ حرارت کے پیداواری نقصانات کو بڑھانے کے خدشات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ کپاس کی فصل ڈوڈیاں بنانے اور پھول کھلنے کے مراحل میں زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت پودے کے افعال کو متاثر کرتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت کپاس میں سبز رنگ پیدا کرنے والے مادے کلوروفل کی توڑ پھوڑ کے عمل کو تیز کر دیتا ہے جبکہ نئے پتوں میں کلوروفل بننے کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت کے نقصانات کو مختلف طریقوں سے کم کیا جاسکتا ہے۔ جس میں سے ایک طریقہ مختلف قسم کے اجزائے خوراک کا سپرے ہے۔ بوران اور زک ایک اہم اور آسانی سے دستیاب شدہ اجزائے صغیرہ ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت میں بوران اور زک کی فوری دستیابی پودے میں خوراک بنانے کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے کے لئے ایک تجربہ زرعی یونیورسٹی میں شعبہ ایگرا نومی کے تحقیقی فارم پر مسلسل دو سال کیا گیا۔ جس میں کپاس کو پھول نکلنے وقت 4 دن اور 8 دن کے لئے زیادہ درجہ حرارت دیا گیا اور اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لئے بوران (1 گرام فی لیٹر)، زک (2 گرام فی لیٹر) اور بوران اور زک (1 گرام اور 2 گرام فی لیٹر بالترتیب) پانی میں حل کر کے سپرے کئے گئے۔ تحقیق سے یہ نتائج اخذ کئے گئے 8 دن کے لئے زیادہ درجہ حرارت 4 دن کے لئے زیادہ درجہ حرارت سے زیادہ نقصان دہ ہے جبکہ بوران اور زک کے اکٹھے استعمال / سپرے نے پیداوار میں اضافہ کیا۔ بوران اور زک نے خلیوں میں پانی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھایا اور پتے میں موجود سبز مادہ کلوروفل کے بننے کے عمل کو تیز کر دیا۔ نتیجہ کے طور پر کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ مزید برآں جہاں پر معمول کے مطابق درجہ حرارت دیا گیا وہاں پر بوران اور زک (بالترتیب 1 گرام اور 2 گرام) کے ملاپ کے سپرے سے اچھے نتائج سامنے آئے جبکہ جہاں پر درجہ حرارت

زیادہ تھا وہاں پر اکیلے زنگ (2 گرام) اور بوران اور زنگ کے (بالترتیب 1 گرام اور 2 گرام اکٹھے) سپرے نے بہتر نتائج فراہم کئے۔

پانی کی کمی کے تحت گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے آبپاشی کی حکمت عملی

پی ایچ ڈی سکالر: محمد فہد نگران: سید آفتاب واجد شعبہ: ایگری انومی

پانی کی کمی اور بڑھتی ہوئی لاگت کو صرف دستیاب وسائل کے اچھے انتظام کے ذریعے سے ہی پورا کیا جاسکتا ہے۔ پانی کے ضیاع کو کم اور اس کی کارکردگی میں اضافہ، بہتر علم اور تکنیکی مہارت سے کیا جاسکتا ہے۔ پانی کے بہتر استعمال میں ایک اہم اور کلیدی نقطہ آبپاشی کا شیڈول ہے جو کہ ہر کھیت کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور مخصوص وقفہ کے بعد آبپاشی کی جاتی ہے جس میں جڑ کی حدود میں مٹی سے پانی کی جانچ کی جاتی ہے اور پانی کے استعمال کی کارکردگی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ بہترین آبپاشی کی حکمت عملی کے لئے بدلتے ہوئے موسمی حالات کے تحت پانی کی قلت پر فصل کے گاؤ کی تفصیلی تفہیم کی ضرورت ہے۔ آبپاشی کے لئے پانی کی ضرورت کا تخمینہ ایک مؤثر فصلی پیداوار کے نظام کی منصوبہ بندی میں استعمال کیا جانا ایک بنیادی قدم ہے۔ آبی بخارات کی مقدار جاننا، آبپاشی کی بہتر منصوبہ بندی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پانی کی افادیت کو یقینی بنانے کے لئے کھیت میں پانی کے توازن کے ذریعے پانی کی ضرورت کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ آبی بخارات کو جانچنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ جو فصل کے پانی کے استعمال میں ایک لازمی عنصر ہے۔ Penman-Monteith کا طریقہ فصل کے آبی بخارات کا تعین کرنے کے لئے بہترین حکمت عملی ہے۔ ”کم پانی کے ساتھ زیادہ خوراک“ حاصل کرنے کے لئے فی یونٹ فی علاقے اور پانی کی پیداوار میں مزید اضافہ کے لئے فصلوں کی پیداوار کے لئے مخصوص ترین جگہ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ موجودہ مطالعہ فیصل آباد کے موسمی حالات کے تحت مختلف آبپاشی کی حکمت عملی کے لئے تین گندم کی ورائٹیوں کا جائزہ لینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس تجربے میں آبپاشی کی سچھوں کے تحت تین گندم نشئی (پنجاب-2011، آس-2011 اور گلکسی-2013) اضافہ ہوا۔ تجربے کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ گندم کی فصل میں سٹیم بڑھاؤ کا مرحلہ کم سنجیدہ جبکہ دانے کی دودھیا سٹج بہت زیادہ حساس ہوتی ہے۔ عام آبپاشی کے مقابلے میں 75 فیصد آبپاشی کا اطلاق کر کے اناج کی پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔ گندم کی ورائٹی پنجاب 2011 اور گلکسی-2013 کی پیداوار آس 2011 کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوئی ہے۔

کاربن سیکوٹریشن: موسمیاتی تغیر و تبدل کے اثرات کو کم کرنے کے لئے ایک مؤثر انتخاب

پی ایچ ڈی سکالر: محمد شوکت نگران: ڈاکٹر اشفاق احمد شعبہ: ایگری انومی

ہمیں اپنے کسانوں کو کثیر المقاصد زراعت کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے زمین کی تیاری کے وقت کھادوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ نامیاتی مرکبات کا استعمال جدید زراعت سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کو کم کرنے میں کافی حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دوسرا سالہ تحقیق کی گئی جس میں اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ چاول اور گندم کی پیداوار کے حوالے سے اجزائے کبیرہ اور صغیرہ کا زمین کے کاربن بائیوماس، زمینی نامیاتی مرکبات اور نائٹروجن کی مقدار پر conventional tillage اور reduced tillage جیسے طریق کار کے اندر کیا اثرات ہیں۔ اجزائے کبیرہ اور صغیرہ کے حوالے سے treatments ذیل میں دی گئی ہیں۔ (T1) کنٹرول، (T2) تجویز شدہ NPK، (T3) چانوروں کا فصلہ 20 ٹن فی ہیکٹر، (T4) سو فیصد فصلات کے باقیات، (T5) 50 NPK اور 50 M، (T6) 50 فیصد فصلات کے باقیات اور 50 NPK، (T7) 25 NPK کے ساتھ 25 فیصد M اور 50 فیصد فصلات کے باقیات، (T8) 25 NPK کے ساتھ 25 فیصد فصلات کے باقیات اور 50 M، (T9) 25 NPK کے ساتھ 25 فیصد فصلات کے باقیات اور 50 M کے استعمال سے زمین میں نائٹروجن کی مقدار 327.99 سے 963.47 کلونی ایکڑ ریکارڈ کی گئی۔ اجزائے کبیرہ اور نامیاتی مرکبات سے گندم کی نشوونما اور پیداوار میں درج ذیل مقدار میں معلوم کی گئیں۔ مجموعی خشک وزن 30.99-53.67 فیصد، فصل کی بڑھوتری 30.07-65.07 فیصد، پتے کا بڑھاؤ 43.78-57.28 فیصد، دانوں کی پیداوار 43.04-51.53 فیصد، پیداواری شاخیں 22.52-62.31 فیصد، حاصل ہوئیں۔ اجزائے کبیرہ اور نامیاتی مرکبات سے چاول کی نشوونما اور پیداوار میں درج ذیل مقدار میں معلوم کی گئیں۔ مجموعی خشک وزن 35.90 سے 54.83 فیصد پتے کا بڑھاؤ 21.14 سے 51.68 فیصد پیداواری شاخیں 11.11 سے 32.44 فیصد نتیجتاً اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ نامیاتی مرکبات اور اجزائے کبیرہ کا گندم اور چاول کی فصل میں یکجا استعمال سے کاربن بائیوماس بڑھایا جاسکتا ہے۔

پوشوہار کے انگور کا چینیاتی تنوع کا مطالعہ

پی ایچ ڈی سکالر: محمد طاہر اکرم نگران: ڈاکٹر راشد وسیم خاں قادری شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

صوبہ پنجاب میں مون سون کی بارشیں بھی انگور کی فصل کے لئے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں مون سون بارشوں کا سلسلہ تقریباً جولائی کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اسی موسم میں انگور کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے جب یہ بارشیں انگور کے کچھوں پر پڑتی ہیں تو انگور کی نازک جلد کو پھاڑ دیتی ہیں جسکی وجہ سے انگور کی پکی پکانی فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انگور کا پھل مٹھاس سے رس بھرا ہوتا ہے جب کوئی انگور کا دانہ پھٹتا ہے تو اس میں موجود مٹھاس پھپھوندی جیسی بیماری لگنے کا باعث بنتی ہے۔ جسکے نتیجے میں انگور کے پورے گچھے گل سڑ جاتے ہیں اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں چند تجربات کئے گئے تاکہ پوشوہار میں موجود تمام مقامی اور غیر ملکی اقسام کا آپس میں موازنہ کیا جائے۔ پہلے تجربہ میں انگوروں کی اقسام کو پیداوار کے اعتبار سے چیک کیا گیا اور انگور کے پھل کے مختلف پیرامیٹرز جیسا کہ انگور کا رنگ، ساخت، جسامت، گچھے کا وزن اور اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے جانچا گیا۔ ان تمام اعداد و شمار کے نتیجے کی بنا پر مقامی

اقسام جیسا کہ کشش، گولا، ہائید اور گول کو بہتر پایا گیا جبکہ غذائی اعتبار کے لحاظ سے غیر ملکی اقسام جیسا کہ ویٹر و بلیک، فلیم سیڈ لیس اور فلیم ٹو کے کو بہتر پایا گیا۔ پھوہار کے علاقے میں اگنے والی اقسام میں سے رچینیا، پرلٹ اور رلی وائٹ اگیتی اقسام ثابت ہوئیں جو کہ ماہ جون کے دوسرے ہفتے میں ہی پک کر تیار ہو گئیں اور مونسون کی بارشیں آنے سے پہلے کاشت ہو گئیں۔ ان اگیتی اقسام کو پنجاب میں کاشت کرنے کے ان سے اچھی پیداوار لی جاسکتی ہے۔ ان تجربات کے علاوہ 30 منتخب شدہ اقسام میں ان کا جینیاتی تنوع معلوم کرنے کے لئے جدید طریقہ کار کی بدولت ان کا ڈی این اے نکالا گیا اور ان پر مائیکرو سینالائٹ مارکر استعمال کئے گئے۔ اس تجربہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پھوہار میں کاشت ہونے والی اقسام ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ تجربات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ انگوڑ میں جینیاتی تنوع برقرار رکھنے کے لئے بریڈنگ پالیسی کے راہنما اصولوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اور عام کاشتکاروں کے لئے ایسی اقسام (Species) تیار کرنا ہوں گی جو کہ کوالٹی اور پیداوار کے اعتبار سے اچھی ہوں اور مختلف قسم کے انگوڑ کی بیماریوں کے خلاف قوت مداخلت کے صلاحیت رکھتی ہوں۔

پیاز کے بیجوں کی پیداواری بڑھوتری بذریعہ جبریلک ایسڈ

پی ایچ ڈی سکالر: سلمان مشتاق نگران: ڈاکٹر محمد شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

پیاز کا شمار دنیا میں استعمال کے لحاظ سے نمائندہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ سب سے پرانی سبزی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک اور بائبل میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 175 ممالک میں پیاز اگایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں 74 ملین ٹن پیاز اگایا جاتا ہے اور پاکستان کا شمار پیداوار کے لحاظ سے ساتویں نمبر پر ہے جو کہ دوسرے ممالک سے کافی کم ہے۔ پیاز کی پیداوار میں کمی کی وجوہات میں سے اچھی معیار کے بیجوں کا فقدان، علاقے کی مناسبت سے پیاز کی موزوں قسم کا چناؤ اور پیداواری تکنیک کا فقدان قابل ذکر ہیں۔ پیاز کے بیجوں کی پیداوار میں بڑھوتری اور معیاری حصول کے لئے جامع زرعی فیصل آباد میں ایک جامع تحقیق کی گئی، جس میں جبریلک ایسڈ کا سپرے 100 ملی گرام فی لیٹر پانی کی مقدار کے لحاظ سے پودے کی نشوونما کے مختلف ادوار میں کیا گیا۔ اس مقصد کے لئے پیاز کی دو اہم اقسام پھلکار اور ڈارک ریڈ کا انتخاب کیا گیا اور ان پر سپرے پودے کی دو سے تین پتی حالت سے لے کر پھول آنے کے مختلف ادوار میں کیا گیا۔ پودے کی بڑھوتری کے مختلف عوامل جیسا کہ پودے کا قد، جھاڑ کا حجم، پتوں کی تعداد، پھول آنے کا وقت، بیجوں کی مقدار اور معیار وغیرہ کے بغور تجزیہ سے درج بالا نتائج سامنے آئے۔ جبریلک ایسڈ کا دو سے تین پتی حالت پر سپرے، پودے کے قد، پتوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنا۔ پیاز کی پھلکار قسم میں ڈارک ریڈ کی نسبت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پھولوں کی اگیتی پیداوار کے لئے جبریلک ایسڈ کا چھ سے سات پتی حالت پر سپرے زیادہ منوثر رہا۔ پیاز کی پھلکار قسم میں ڈارک ریڈ کی نسبت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بیج کی پیداوار میں بھی اضافہ چھ سے سات پتی حالت پر جبریلک ایسڈ کے سپرے کے باعث رہا لیکن یہ اضافہ پیاز کی ڈارک ریڈ قسم میں پھلکار کی نسبت زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ بیجوں کے معیار میں خاطر خواہ اضافے کے لئے چھ سے سات پتی حالت اور پھول آنے کے بعد کا سپرے یکساں منوثر رہے لیکن یہ اضافہ بھی پیاز کی ڈارک ریڈ قسم میں پھلکار کی نسبت زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔

گاجر کے بیج کی پرائمنگ سے اس کے اگاؤ اور پیداوار میں اضافہ

پی ایچ ڈی سکالر: محمد محمود الرحمن نگران: ڈاکٹر محمد شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز

گاجر کی اگیتی کاشت کے وقت درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا اگاؤ متاثر ہوتا ہے جس سے اس کے معیار اور پیداوار میں کمی کی آتی ہے۔ اس مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لئے ویتھیل سیڈ لیبارٹری اینڈ ویتھیل ریسرچ ایریا، انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں ایک ریسرچ کی گئی۔ زیادہ درجہ حرارت کے بیج کے اگاؤ پر منفی اثرات کو کم کرنے کے لئے مختلف سیڈ پرائمنگ تدابیر (جو کہ غیر موافق حالات میں بیج کے اگاؤ کو بڑھاتی ہیں) اختیار کی گئی۔ اس مقصد کیلئے پنجاب گورنمنٹ کی گاجر کی واحد منظور شدہ ورائٹی (T-29) کے بیجوں کو مختلف سیڈ پرائمنگ کیمیکلز (GA3، جبرالک ایسڈ، Kinetin، Kinetin، IAA، انڈول ایسیڈک ایسڈ، SA، سیلی سیلیک ایسڈ، KNO3) پونا شیم ناٹریٹ اور ڈسولڈ (واٹر) کے ساتھ ٹریٹ کر کے لیبارٹری میں انکوہیٹر میں زیادہ درجہ حرارت (2+35) کے اندر رکھا گیا اور بغیر ٹریٹ شدہ بیجوں (کنٹرول) کے ساتھ اگاؤ کا موازنہ کیا گیا۔ سیڈ پرائمنگ ٹریٹ منٹس میں سے SA 0.1mM ساتھ میں GA3 0.05mM اور KNO3 50mM نے بیج کے اگاؤ میں واضح اضافہ کیا اور نئے پودے کی نشوونما پر بہت اچھے اثرات مرتب کئے۔ سیڈ پرائمنگ کے لئے استعمال ہونے والے ہر کیمیکل کے دو بہترین لیول سلیکٹ کئے گئے (لیبارٹری تجربے کی بنیاد پر) اور ان کا کھیت (Field) کے اندر دوبارہ ٹرائل کیا گیا۔ فیلڈ ٹرائل کے دوران سلیکٹ کئے گئے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ Azotobacter بیکٹیریا کا بھی بیجوں کے ساتھ تعامل کروایا گیا۔ فیلڈ تجزیات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ SA 0.1mM اور GA3 0.05mM پرائمنگ ٹریٹمنٹ نے گاجر کے اندر کے دفاعی نظام (Antioxidants enzymes) کو مربوط کیا، گاجر کا رنگ، شوگرز، ضیائی تالیف کا نظام اور پودے کی پانی کو استعمال کرنے کی کارکردگی بڑھی۔ ان پرائمنگ ٹریٹمنٹ کی بدولت بیج کا اگاؤ 33 فیصد تک بڑھ گیا جو کہ بغیر ٹریٹمنٹ (کنٹرول) کے بیجوں میں 15 فیصد تک ہی رہا۔ گاجر کو کھیت کے اندر چھوٹے چھوٹے پلاٹوں (12.5ft²) میں اگایا گیا تھا۔ SA 0.1mM ٹریٹمنٹ سے سب سے زیادہ گاجر کی پیداوار (2.82Kg/12.5ft²) نکلی جو کہ غیر ٹریٹ شدہ (کنٹرول) میں صرف (1.72kg/12.5ft²) تھی۔ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ گاجر کی بہترین اگیتی کاشت کے لئے بیج کی بوائی سے پہلے SA 0.1mM سے پرائمنگ کرنے سے نہ صرف اس کے اگاؤ میں بہتری آسکتی ہے بلکہ اس کی کوالٹی اور پیداوار میں بھی (درجہ حرارت زیادہ ہونے کے باوجود) اضافہ ہو سکتا ہے۔

سرسوں میں خشک سالی سے متعلق برداشت اور پیداواری اجزاء کا جینیاتی مطالعہ

پی ایچ ڈی سکالر: حمیرا جمیل نگران: ڈاکٹر فاروق احمد خان شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

فیصل آباد کے پودوں کی نسل پرستی اور جینیات کے تحقیقاتی علاقے میں ایک تحقیق کی گئی سرسوں کی 60 جینوٹائپس کی نئے پودوں کے مرحلے پولی ایٹھامیلین کلائیکول 6000 سے خشک سالی پیدا کر کے

اسکریننگ کی گئی تھی کہ لمبائی، جڑ کی لمبائی، تازہ تھن کا وزن اور جڑ کا وزن، خشک جڑ کا وزن اور تھن کے وزن کی بنیاد پر مواد اکٹھا کیا گیا 8 جینیوٹائپس جو کہ فیصلہ سروس، ڈنکلڈ، آر بی این، پنجاب سروس، ریٹیو، چکوال سروس، شیرالی اور لپچند تھیں ان کو مادہ کے طور پر اور 4 جینیوٹائپس جو کہ ڈی جی ایل، سائیکلون، زیڈ ایم 21 اور ایل بی این 8 ہیں۔ انہیں مادہ پودوں کی زرخیزی کے لئے استعمال کیا ان جینیوٹائپس کو لائن X ٹیسٹیشن میں کراس کروایا جن سے 32 جینیوٹائپس حاصل ہوئیں 32 کراس شدہ جینیوٹائپس اور ان کے والدین کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لئے ان کو چارٹرڈ منٹ میں آگیا۔ جن میں کنٹرول (T0) جس میں معمول کے مطابق پانی دیا (T1) جس میں پھول نکلنے کے مرحلے پر آبپاشی نہیں کی (T2) جس میں بیج بننے کے مرحلے پر آبپاشی نہیں کی گئی (T3) جس میں پودوں کی تمام بڑھوتری کے مرحلوں میں آبپاشی نہیں کی گئی۔ ہر ٹریٹمنٹ میں صوریاتی اور فعلیاتی علامات پر مواد اکٹھا کیا گیا جس میں پیداوار اور اس سے تعلق رکھنے والے اجزاء شامل تھے ان اجزاء میں پودے کی لمبائی، پھول نکلنے تک کے دن، پختگی تک کے دن، ہر پودے کی بنیادی شاخ، ہر پودے کی ثانوی شاخ، ہر پودے پر پھلیوں کی تعداد، پھلیوں کی لمبائی، پھلوں میں بیج کی تعداد، 1000 بیجوں کا وزن، ہر پودے کی پیداوار، بیج میں تیل کی مقدار اور پتوں میں پانی کی مقدار شامل تھے۔ محفوظ شدہ مواد پر کئی تجربے کئے گئے جن میں جینیاتی تغیر کے اثرات، وراثت کے اثرات اور علامات کے آپس میں تعلق کو جانچا گیا۔ تمام جینیوٹائپس کے نتائج معنی خیز مطالعے سے ثابت ہوا کہ ڈنکلڈ، لپچند، چکوال سروس، زیڈ ایم 21 اور ڈی جی ایل بیج کی پیداوار اور اس سے تعلق رکھنے والے اجزاء کے لئے اچھے ثابت ہوئے۔ چنانچہ ان پودوں کو خشک سالی سے مذمت والے ہائی بریڈ بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سروس کی کراس کی بنیاد پر چکوال سروس X زیڈ ایم 21، ریٹیو X ڈی جی ایل، شیرالی X ڈی جی ایل خشک سالی کی ہر ٹریٹمنٹ کی پیداوار کے لئے بہترین ثابت ہوئے۔ ان ہائی بریڈ کو بڑے پیمانے پر خشک سالی میں ان کے استعداد اور پائیداری کے لئے جانچا جاسکتا ہے۔ Heterosis کے مطالعے کی بنیاد پر پنجاب سروس X ڈی جی ایل اور ڈنکلڈ X زیڈ ایم 21 کی کارکردگی Mid Parent Heterosis اور Better Parent Heterosis کی بناء پر سب سے بہتر تھی جبکہ پنجاب سروس X ڈی جی ایل، پنجاب سروس X سائیکلون، چکوال سروس X سائیکلون، پنجاب سروس X زیڈ ایم 21، چکوال سروس X زیڈ ایم 21، LBN 8 X کی کارکردگی تمام ٹریٹمنٹ میں Mid Parent Heterosis کی بناء پر بہترین تھی۔ تمام ٹریٹمنٹ میں High Heritability نے پیداوار اور اس سے تعلق رکھنے والے اجزاء میں Additive gene action کی موجودگی کو ظاہر کیا پیداوار اور اس سے تعلق رکھنے والے اجزاء کا Correlation مثبت تھا۔ ابتدائی شاخوں، ثانوی شاخوں اور 1000 بیجوں کے وزن کا Correlation ہر ٹریٹمنٹ میں مثبت تھا۔

گندم کے فینولوجی اور پیداواری عوامل کا مختلف ماحول میں جینیاتی تجربہ

پی ایچ ڈی۔ سکالر: ہمایوں رضا نگران: عبدالسلام خاں شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

حال ہی میں منظور شدہ گندم کی اچھے اقسام کو ان کے وقت کاشت کے لحاظ سے منتخب کیا گیا اور ان کو جینیاتی طور پر پرکھا گیا۔ ان اچھے اقسام کو شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے منتخب شدہ رقبے پر جینیاتی تجربہ کیا گیا۔ پہلے ان اقسام کو ایک خاص جینیاتی طریقہ کار میں کراس کروایا گیا پھر ان کو کموزوں وقت کاشت اور پختگی میں پرکھا گیا تاکہ جو اقسام یا اس کی جزیئیں جینیاتی طور پر بہتر مظاہرہ کریں ان کو منتخب کیا جاسکے۔ اس تجربہ کے لئے جو اقسام منتخب کی گئی تھیں ان میں آس 2011، لائٹنی 2008، معراج 2008، پنجاب 2011، بھکر 2002 اور سحر 2006 شامل تھیں۔ نتائج سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پختگی کاشت میں معراج 2008 اور پنجاب 2011 کے کراس نے سب سے بہتر پر فارم کیا۔ جینیاتی تجربہ سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اپی سٹیک (Epistatic) اثرات کی وجہ سے پختگی کاشت میں بہت سارے جینز (Genes) مکمل طور پر یا کھل کر پر فارم نہیں کر سکتے۔ پندرہ مختلف عوامل (Character) مثلاً ہرٹے میں دانوں کی تعداد ہرٹے میں دانوں کا وزن، ہرٹے میں شگوفوں کی تعداد وغیرہ پرکھے گئے جن میں پیداوار (Grain Yield) میں سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔ گندم کی اقسام معراج 2008 اور پنجاب 2011 کو مستقبل میں کسی بریڈنگ پروگرام میں والدین (Parent) کے طور پر منتخب کر سکتے ہیں۔ چونکہ پیداوار اور پیداوار کے ساتھ منسلک عناصر میں پیچیدہ میراث پائی جاتی ہے۔ اس لئے ان کو بعد میں آنے والی نسلوں میں منتخب کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔

پنجاب میں دیسی اور کابلی چنے کی پیداوار بڑھانے کے لئے زک کا استعمال

پی ایچ ڈی۔ سکالر: امان اللہ نگران: ڈاکٹر محمد فاروق شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

زک کی کمی انسانوں میں مختلف مسائل جیسا کہ سیکھنے کی صلاحیت، قوت مدافعت اور انسانی نشو و نما میں کمی جیسی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ تاہم اس کے پیش نظر چنے کی فصل میں زک کے استعمال سے پیداوار اور معیار میں بہتری کے ساتھ ساتھ انسانوں میں غذائیت (Malnutrition) کو کافی حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔ یہ تجربہ بیج کے ذریعے زک کے استعمال سے پنجاب میں دیسی اور کابلی چنوں کی پیداوار اور معیار اور بیج میں زک کی مقدار کو بہتر بنانے کے لئے کیا گیا۔ اس تجربے میں پچھلے تجربے سے یہ بات سے تعین شدہ زک کی مختلف مقداریں بذریعہ 0.001 مولر زک کے محلول میں بھگو کر اور پانچ ملی گرام زک فی کلوگرام بیج پر تہہ لگا کر استعمال کی گئیں۔ جب کے صرف پانی میں بھگو کر اور بغیر بھگوئے ہوئے بیجوں کو موازنے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس تجربے کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ زک کا بذریعہ بیج استعمال چنے کی دونوں اقسام (نور-2013 اور نیاب-سی-ایچ-2016) میں لیگ ہیموگلوبن (Leg-hemoglobin)، نوڈولیشن (Nodulation)، بائیو ایویلیبل زک (Bioavailable-Zn)، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، بیج میں زک مقدار اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے۔ تاہم لیگ ہیموگلوبن، پیداوار اور بیج میں زک کی مقدار زک کے محلول میں بھگو کر استعمال کرنے کی بجائے بیج پر زک کی تہہ لگانے سے حاصل کی گئی۔ بیج کے ذریعے زک کا استعمال اچھا خاصا منافع بخش ثابت ہوا ہے۔ تاہم منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے دیسی چنوں کو زک کے محلول میں بھگو کر اور کابلی چنوں میں بیج پر زک کی تہہ لگا کر بوائی کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نتیجتاً زک کا بذریعہ بیج استعمال چنے کی پیداوار اور معیار اور منافع میں اضافہ کرتا ہے۔ زک کے اس طریقہ کار کو استعمال کر کے کسان چنے کی پیداوار اور معیار میں بہتری لاسکتا ہے۔

تمام کیڑوں کے خلاف قدرتی مدافعت رکھنے والی بھنڈی توری جیسے پتوں والی بی ٹی کپاس

پی ایچ ڈی۔ سکالر: محمد سجاد ندیر نگران: ڈاکٹر تنویر احمد ملک شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

بی ٹی کپاس صرف ٹینڈوں کے کیڑوں کے خلاف مدافعت فراہم کرتی ہے۔ پتے کا رس چوسنے والے کیڑے بی ٹی کپاس پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے کسانوں کو بہت زیادہ زہروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو نہ صرف دوست کیڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ ماحول کو بھی آلودہ کرتی ہیں۔ کپاس کے پودے میں قدرتی طور پر بہت ساری ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس کیڑوں کے خلاف مدافعت فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم میں کپاس کے پتے روائی کپاس کی نسبت چوڑائی میں کم اور بھنڈی توری کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان اقسام میں روشنی اور ہوا کا گزر پودے کے نچلے حصوں تک بہتر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کیڑے ان اقسام کو پسند نہیں کرتے۔ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ان اقسام پر سست تیل، ہبز تیل، تھریپس اور خاص طور پر سفید مکھی (جوزہ صرف پودے کا رس چوستی ہے بلکہ پتہ مروڑاؤٹرس کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنتی ہے) کا پتھرے کم حملہ دیکھا گیا ہے۔ ان اقسام میں ٹینڈوں کی سنڈیوں کے خلاف بھی مدافعت پائی جاتی ہے۔ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اگر کپاس کی ان اقسام کو بی ٹی اقسام بنا لیا جائے تو یہ اقسام ٹینڈوں کی سنڈیوں (گلابی سنڈی، چٹکبری سنڈی، امریکن سنڈی) اور رس چوسنے والے کیڑوں (سست تیل، ہبز تیل، تھریپس اور سفید مکھی) کے خلاف مدافعت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ان اقسام پر زہروں کا استعمال کم ہوتا ہے کیوں کہ ان اقسام میں زہر پودے کے نچلے حصوں تک بہتر طریقے سے پہنچتا ہے اور کیڑوں کے تدارک میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس طرح کے پتوں والے پودوں کی پیداوار پر کوئی منفی اثر و نمائش ہوتا اور نہ ہی ریشے کی مضبوطی پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ زرعی سائنس دانوں کو چاہیے کہ وہ ان اقسام کی تیاری اور کسانوں میں آگاہی پر خاص توجہ دیں۔

کلرزہ علاقوں کے لئے کپاس کی اقسام کی تیاری

پی ایچ ڈی۔ سکالر: محمد اویس فاروق نگران: ڈاکٹر عامر شکیل شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

پچھلے چند برسوں کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں موجود کپاس کی اقسام میں کسی حد تک کلر کے خلاف مدافعت موجود ہے۔ ان اقسام کو جینیاتی تغیر اور روائی بریڈنگ کے طریقوں کو استعمال کر کے کلرزہ علاقوں میں کاشت کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک نہایت موثر طریقہ ہے جس کے بناء پر نہ صرف کلرزہ علاقوں کو زیر کاشت لایا جاسکتا ہے بلکہ ان علاقوں میں سے کپاس کی اچھی پیداوار بھی لی جاسکتی ہے۔ اسی سلسلے میں شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تحقیقاتی کام کا آغاز کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد ایسی فصلوں کی دریافت تھا جن کو کلرزہ علاقوں میں کاشت کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں 50 بی ٹی کپاس کی اقسام کو گرین ہاؤس میں لگایا گیا اور نمکیات کا کپاس کی ابتدائی نشوونما پر اثر دیکھا گیا۔ اس کے نتیجے میں چند بی ٹی اقسام نے دوسروں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس مرحلہ میں کپاس کی FH-312، NIAB-824، MNH-992، CIM-612، Khekashan اور SB-149، BS-80، FH-118 اور FH-114 سے زیادہ موثر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے مرحلے میں منتخب شدہ اقسام کا جینیاتی سطح پر مشاہدہ کیا گیا۔ تحقیقاتی کاوشوں کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ جن اقسام میں کلر کے خلاف مدافعت موجود ہے، ان میں سے ایک خاص قسم کا جینیاتی ڈھانچہ ہے جو ان کو مدافعت فراہم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ان دریافت کردہ اقسام کو نہ صرف اسی طرح سے کاشت کیا جاسکتا ہے بلکہ ان کو علاقائی اعتبار سے دوسری اقسام سے بہتر افزائش نسل کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان اقسام کی دریافت نہ صرف کلرزہ علاقوں میں کپاس کی کاشت کو ممکن ثابت کریں گے بلکہ ملکی زرمبادلہ میں اضافہ کر کے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔

سورج مکھی میں باہر بڑھانے کیلئے جینیاتی مواد کا بیرونی اور مالکیو لریول پر تجزیہ

پی ایچ ڈی۔ سکالر: محمد رضوان نگران: ڈاکٹر حفیظ احمد صداقت شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

اس ریسرچ کا مقصد بہتر باہر بڑھانا جو زیادہ پیداوار اور زیادہ روغن والے ہوں گے، وہ باہر بڑھانے والے جاتے ہیں جو پہلے سے موجود کمرشل باہر بڑھانے سے بھی اچھا نتیجہ دیں۔ اس مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تیل کی مقدار اور قیمتی ایسڈز کے لئے چناؤ اچھی ثابت ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے پیرامیٹرز کے لئے باہر بڑھانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور پیداوار بڑھانی جاسکتی ہے L6xT1 باہر بڑھانے کی کچھ خصوصیات ہائی سن 33 سے بھی اچھی تھیں اور اس طرح انہیں اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ L6xT1 باہر بڑھانے کی مقدار میں دونوں موسموں، بہار اور خزاں کے لئے اچھا تھا۔ 100 سیڈ وزن ایک اہم پیرامیٹر ہے جن باہر بڑھانے کا یہ پیرامیٹر اچھا ہوتا ہے ان کی پیداوار اچھی آتی ہے لہذا اگر اس بنیاد پر باہر بڑھانے کا چناؤ کیا جائے تو ان کی پیداوار بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باہر بڑھانے کی جلد ہی پک کر تیار ہوجانے والی ہونی چاہیے اور اس میں تیل کی مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ مختلف سیڈ رجسٹریشن اینجینسٹس خالص ورائٹی کی پہچان میں ان کی بیرونی ساخت پر یہ کام کرتی ہیں جو کہ زیادہ وقت درکار والا کام ہے دور جلد میں بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس مطالعہ میں مالکیو لر مارکر استعمال کر کے باہر بڑھانے کی خالص ہونے کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ آنے والے دور میں باقی لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جینیاتی مواد تبدیل کیا گیا اور پروٹوکول بنایا گیا۔ ان طریقوں کو اپناتے ہوئے کسانوں کو خوشحال کیا جاسکتا ہے اور خوردنی تیل کی ضرورت کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

بہتر پیداوار اور اعلیٰ معیار کے لئے مٹر کی جینیاتی حالت کا مطالعہ

پی ایچ ڈی۔ سکالر: نوشی پروین نگران: ڈاکٹر عامر شکیل شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

پاکستان میں مٹر کی پیداوار دوسرے ممالک سے بہت کم ہے، پیداوار میں کمی کی بنیادی وجہ مٹر کی اقسام کے جینیاتی مادے میں تغیر کی کمی ہے، آئندہ سالوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خوراک کی کمی کو

پورا کرنے کے لئے مٹر کی ایسی اقسام تیار کرنا بہت ضروری ہیں جو اعلیٰ معیار اور زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مٹروں کی 99 مختلف اقسام کو جامع زرعیہ کے تحقیقاتی رقبے میں جینیاتی مادے کے تغیر کی جانچ کے لئے چیک کیا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مٹر کی جینیاتی مادے میں بہت زیادہ تغیر موجود ہے، تجربات کی بنیاد پر 99 اقسام میں سے 8 ایسی اقسام کا انتخاب کیا گیا جو کم اور زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، جن میں 20126، 26701، 19716، 19605، 20202، 26710، 20300، 20153 شامل ہیں۔ اگلے موسم میں ان منتخب اقسام کے بیج کو کھیت میں لگایا گیا اور ان کے کراس بنائے گئے اور ان کراس سے حاصل کئے گئے بیج کو اور ان کے والدین کو دوبارہ کھیت میں لگایا گیا اور پودوں کے آپس میں ملاپ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جن خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا ان میں پودے کی لمبائی 50 فیصد پھول کھلنے کا دورانیہ، فی پودے پر شاخیں، فی پودے پر پھلیاں، فی پودے پر پھلیوں میں بیج، پھلی کی لمبائی، پھلی کی چوڑائی، 100 تازہ دانوں کا وزن، 100 خشک دانوں کا وزن، پودے کے بیج کی پیداوار، پھلی کا وزن، جیاتنیاتی پیداوار، فصل کا انڈیکس، کلوروفل کی مقدار، کیروٹینائیڈ کی مقدار اور پروٹین کی مقدار شامل ہے، ان خصوصیات کی بنیاد پر ایسی باہر ڈاکا انتخاب کیا گیا جنہوں نے بیج کی پیداوار سے متعلقہ خوبیوں کا اچھا مظاہرہ کیا، ان باہر ڈاکوں میں 20202 x 19602 اور 20202 x 26710 شامل ہیں، درج بالا نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کو مستقبل کے بریڈنگ پروگرام میں استعمال کیا جائے گا۔ اور ان اقسام کے ملاپ سے حاصل شدہ باہر ڈاکوں کو اچھے معیار کا بیج حاصل کرنے کے لئے کاشت کرنے کی سفارش کی جائے گی۔

کلر اٹمی زمینوں پر حیلہ اراجناس کی پیداوار

پی ایچ ڈی سکالر: شمسہ کنول نگران: ڈاکٹر محمد حامد ندیم طاہر شعبہ: پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس

پاکستان میں 8.6 ملین ہیکٹر زمین کلر اٹمی ہے اگر اس کلر اٹمی زمین کو قابل کاشت بنایا جائے تو ان زمینوں سے تیلدار اراجناس کی پیداوار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسی تدبیر اپنانے کی اشد ضرورت ہے جو کہ ان خراب زمینوں کو قابل استعمال بناسکے جیسا کہ آبپاشی، اونچے زمینی بیڈ، نامیاتی کھادوں کا استعمال اور کلر اٹمی زمینوں پر اچھی پیداوار دینے والی تیلدار اراجناس کی تیاری ان تدبیروں میں شامل ہیں جو خراب زمینوں میں فصل کی بہتر پیداوار حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ براسیکا ایک روایتی تیلدار جنس ہے۔ ہمارے علاقے کے زمیندار صدیوں سے اس کی کاشت کر رہے ہیں اور اس کے پیداواری عوامل سے خوب واقفیت رکھتے ہیں۔ اولیک ایسڈ جو کہ طبی ماہرین کے مطابق انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہے کی مقدار زیتون کے تیل کے بعد سب سے زیادہ براسیکا آئل میں پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ براسیکا میں اچھی پیداوار اور زیادہ خوردنی تیل کی جز کی حامل اقسام کی تیاری پر کام کیا جائے۔ ہائیڈرو پونکس ایک ایسی تکنیک ہے جس میں مٹی کی بجائے فضلیں ایسے پانی میں لگائی جاتی ہیں جو پودے کی بہتر نشوونما کے لئے تمام ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں نمک کے محلول پر تجربات کئے گئے۔ اس تجربے میں براسیکا پیس کی 60 جینیاتی اقسام کو تین ہفتوں کے نمک ملے پانی کے محلول میں ہائیڈرو پونک تکنیک استعمال کرتے ہوئے اگایا گیا۔ اس میں نمک کی شرح 0mM، 120mM اور 150mM (NaCl) رکھی گئی۔ اس تجربے میں اچھی اگنے اور بڑھوتری رکھنے والی اقسام کو نمکیات برداشت کرنے والی اور مر جانے والی کم بڑھوتری والی اقسام کو نمکیات کے لئے حساس قرار دیا گیا۔ ریکارڈ کئے گئے ڈیٹا پر پرنسپل کمپونینٹ اینلیسز لگایا گیا اور اس کی بنیاد پر ثابت ہوا کہ 10 جینیاتی اقسام (1, BLBN-56, ZMR-96, B-8007, G-2, ZNR1, RBJ-5, ZMR-3, 23627, ZMM-R) نمکیات کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں اور ان اقسام کو کلر اٹمی زمینوں کے لئے بنائی جانے والی اقسام کے لئے کئے جانے والے تجربات میں خود اعتمادی سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

بوران اور فاسفورس سے کیٹولا کی پیداوار میں اضافہ

پی ایچ ڈی سکالر: طیبہ سمرین نگران: ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

بوران ایک غیر دھاتی مائیکرو نیوٹریٹ ہے جسے طویل عرصہ سے پودوں کی بڑھوتری کے لئے خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے جو کہ جانوروں اور پانی کی سیلولر یوکیروٹس کے لئے بھی مفید ہیں۔ تاہم بوران کو بیکٹیریا کے لئے لازمی غذائیت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ چند بیکٹیریا بوران exclusion کے عمل کی وجہ سے بوران کی زیادہ مقدار برداشت کر سکتے ہیں اس طرح کے جاندار جو کہ بوران کی زیادہ مقدار برداشت کر سکتے ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ 60 سال کے دوران 132 فصلوں اور 80 ممالک میں بوران کی کمی دیکھی گئی ہے پاکستان میں تقریباً 65 فیصد مٹی بوران کی کمی کا شکار ہو چکی ہے زمین کے بعد بوران دوسرا سپرے سے کم پایا جانے والا مائیکرو نیوٹریٹ ہے جو عالمی سطح پر فصلوں کی ترقی کو متاثر کرتا ہے۔ بوران کی کمی کو پورا کرنے سے ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ایسی مٹی جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو وہ بوران میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں فاسفورس کی فریٹلائزر یوز ایف ٹینسی 25-10 فیصد ہے اور آج کل زرعی صنعت کی طرف سے فاسفورس کو حل کرنے والے بیکٹیریا کو مٹی میں فاسفورس کی دستیابی کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جس سے فصلوں کی پیداوار اور مقاصد کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سروس (کیٹولا) کے پودوں کی ترقی میں فاسفورس اور بوران کے صحیح استعمال سے قابل اعتماد اضافہ کیا جاسکتا ہے جبکہ Bacillus sp (MN-54) کی موجودگی جو کہ بوران برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ فاسفورس کو حل کرنے والے بیکٹیریا کی حیثیت رکھتا ہے کیٹولا کی پیداوار میں اضافے کا باعث ہے۔

پودوں اور نامیاتی مادوں کی موجودگی میں خوردبینی جانداروں (بیکٹیریا) کے ذریعے کرومیم (vi) کی کرومیم (iii) میں تبدیلی

پی ایچ ڈی سکالر: محمد عثمان سلیم نگران: ڈاکٹر حافظ نعیم اصغر شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

موجودہ تحقیق میں پاکستان کے تین بڑے صنعتی شہروں (قصور، لاہور اور سیالکوٹ) کی زرعی زمینوں کے مٹی کے نمونے لئے گئے اور ان میں کرومیم (vi) کی موجودگی اور مقدار کا تجزیہ کیا گیا جس سے

پتہ چلا کہ کرومیم (vi) کی مقدار سب سے زیادہ قصور کے مٹی کے نمونوں میں پائی گئی اور سب سے کم لاہور کے نمونوں میں پائی گئی۔ پھر انہی نمونوں سے اُن بیکٹیریا کو علیحدہ کیا گیا جن میں کرومیم (vi) کو کرومیم (iii) میں تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ تقریباً ایک سو چالیس بیکٹیریا کو مٹی کے نمونوں سے علیحدہ کیا گیا۔ جن میں سے بیکٹیریا کو قصور چوالیس سیالکوٹ اور چھتیس لاہور کے مٹی کے نمونوں سے علیحدہ کئے گئے۔ ان میں سے اُنہتر بیکٹیریا میں کرومیم (vi) کو کرومیم (iii) میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت موجود تھی جب ان بیکٹیریا کو مزید ایسے مادوں کی پیداوار کے لئے جانچا گیا جو مشکل حالات میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت صرف چھتیس بیکٹیریا میں موجود تھی۔ ان میں سے پندرہ بیکٹیریا چھپنے گئے جو کہ زیادہ کرومیم کی کمی اور برداشت کے حامل تھے۔ اور ان پندرہ بیکٹیریا کو پودے کی نشوونما کی خصوصیات کے لئے عام مٹی اور کرومیم سے آلودہ مٹی پر جانچا گیا۔ ان بیکٹیریا کو مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ ان مراحل میں ان کی ضروری خصوصیات (کرومیم کی کمی اور اس کی برداشت، پودے کی نشوونما اور قوت مدافعت) کو جانچا گیا۔ اور تحقیق کے لئے وہ بیکٹیریا چھپنے گئے جن میں کرومیم کو کم کرنے اور پودے کی نشوونما کو بڑھانے والی خصوصیات اکٹھی پائی گئیں۔ لیبارٹری اور گروتھ روم کے تجربات کے بعد تین بیکٹیریا کو کارکردگی کی بنیاد پر چن کر ان کی شناخت کروائی گئی۔ جس سے پتہ چلا کہ دو بیکٹیریا کا تعلق سوڈومونا نسٹل سے ہے اور ایک کا تعلق بیکٹیریا ہی کی نسل الکی جنز سے ہے۔ پھر ان بیکٹیریا کو گلوٹامک اور کھیتوں کے تجربات میں آزمایا گیا گلوٹامک والا تجربہ انٹروائزمنٹل سائنسز زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سکریٹ ہاؤس میں کئے گئے۔ تجربے سے پہلے مٹی میں فاسفورس، پوٹاش، نامیاتی مادہ اور کرومیم (vi) کی مقدار اور سیر شدگی کا تجربہ کیا گیا اور پھر مٹی کو مصنوعی طور پر پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ سے آلودہ کیا گیا اور تجربہ کے لئے دو فصلوں (سورج مکھی اور لوسن) کا چناؤ کیا گیا جبکہ کھیتوں کے تجربات قصور میں کسان کے کھیت پر کیا گیا۔ نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ پودے جن کو بیکٹیریا کے محلول میں ڈبو کر کاشت کیا گیا ان میں کرومیم (vi) کی ریکشن/کمی کا عمل زیادہ تھا اور پودوں کی نشوونما بھی زیادہ تھی ان پودوں میں نشوونما کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت بڑھانے والے عناصر (ایکسائیڈنٹ) بھی زیادہ مقدار میں پیدا ہوئے۔ یہ تمام عمل نامیاتی مادوں کی موجودگی میں اور بھی زیادہ تیز ہو گئے۔ نتائج سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سورج مکھی کے گلوٹامک کے تجربے میں 52 فیصد اور کھیت کے تجربے میں 26 فیصد تک کرومیم (vi) کی کمی ہوئی۔ دوسری طرف لوسن کے گلوٹامک کے تجربے میں بیکٹیریا نے 56 فیصد تک کرومیم (vi) کی کمی اور کھیت کے تجربے میں بیکٹیریا نے 23 فیصد کرومیم (vi) کی کمی کی لہذا اس سارے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان بیکٹیریا میں کرومیم (vi) کو کرومیم (iii) میں تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور نامیاتی مادوں کی موجودگی کی صورت میں یہ عمل اور بھی تیز ہو جاتا ہے لہذا ہم ان بیکٹیریا کو استعمال کر کے مستقبل میں مفید نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔

اساسی زمین میں پی کی فراہمی کی بڑھوتری بذریعہ نامیاتی طریقہ سے تیار کردہ تیزابی ترمیم

پی ایچ ڈی سکالر: شائلہ نورین نگران: ڈاکٹر محمد خالد شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

موجودہ تحقیق میں سب سے پہلے سلفر کے جرثوموں کے لیبارٹری میں افزائش کروائی گئی اور ان میں سے سب سے مفید اور زیادہ تیزاب پیدا کرنے والے فاسفورس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اور فائدہ مند ہارمونز پیدا کرنے والے جرثوموں کو مزید تحقیق کے لئے چنا گیا۔ باپتوٹھیس کے مطابق تیزابی کھاد اساسی زمینوں میں پی کی حل پذیری اور فراہمی بڑھا سکتی ہے۔ چنانچہ یہ تحقیق لیبارٹری، گرین ہاؤس اور فیلڈ کے تجربوں پر مشتمل تھی۔ سلفر کے جرثوموں کی افزائش کے بعد اگلا کام تیزابی کھاد بنانے کا تھا۔ جو کہ براہ راست سلفر کے جرثوموں کی موجودگی میں بنائی گئی۔ پھر ان جرثوموں کو گوبر میں شامل کر کے اس میں ایٹمی سلفر ڈالا گیا۔ تاکہ ایٹمی سلفر تیزاب میں تبدیل ہو سکے اور گوبر اس کے لئے خوراک کا کام کر سکے۔ کھاد کو مختلف حالات میں بنایا اور پرکھا گیا اور آخر میں سب سے کم پی ایچ (2.1) کی کھاد بنائی گئی۔ پھر اس کھاد کی کامیابی کو پرکھنے کے لئے اسے لیبارٹری کے اندر چھوٹے پیمانے پر زمین میں ڈالا گیا تاکہ پی کی حل پذیری دیکھی جاسکے۔ اس کو سستا بنانے کے لئے اس مرحلے پر یہ تجربہ گلوٹامک میں کیا تاکہ بڑے پیمانے پر اسے پرکھنے سے پہلے چھوٹے پیمانے پر نتائج دیکھ لئے جائیں۔ گملے میں مختلف کھادوں ڈی اے پی، اے پی، اے پی اور اے پی کو سفیٹ کو سفارشات کی بنیاد پر زمین میں ڈالا گیا۔ ان کھادوں کو تیزابی کھاد کی موجودگی میں پرکھا گیا۔ تیزابی کھاد کو سولیفیٹ کیلکس کے لحاظ سے پودے کی پیداوار کے چار ضروری مرحلوں پر ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ یہ کھادیں آدھی مقدار میں بھی ڈالی گئیں۔ نتائج کے مطابق وہ گملے جہاں تیزابی کھاد کو دوسری کھادوں کے ساتھ ڈالا گیا تھا۔ وہاں زیادہ پیداوار حاصل کی گئی۔ وہاں نتائج مثبت تھے اور زمین کی صحت بھی اچھی تھی۔ حیرت انگیز طور پر راک فاسفیٹ جو کہ نائل پذیر کھاد ہے۔ اس تیزابی کھاد کی موجودگی میں حل پذیر بھی ہوئی اور پی کی فراہمی بھی بڑھی اور نتائج اکیلی ڈی اے پی اور ایس ایس پی سے اچھے تھے۔ اس تجربے کو جب بڑے پیمانے پر لگایا گیا تو نتائج شاندار تھے۔ تیزابی کھاد نے نہ صرف پودے کی افزائش بلکہ پیداواری صحت پر بھی اچھے اثرات ڈالے۔ یہ نامیاتی کھاد جو کہ جرثوموں کی مدد سے بنائی گئی ہے نہ صرف زمین کی پی ایچ کو کم کر کے عناصر کبیرہ کو حل کر سکے گی بلکہ عناصر صغیرہ کو بھی حل کرے گی۔ ان پودوں کو پی کی فراہمی میں مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ حکمت عملی پیداوار میں مدد کرتے ہوئے خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں اچھی کوشش ثابت ہو سکتی ہے۔

پانی کی کمی برداشت کرنے والے جرثوموں کا ضیائی تالیف اور فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں کردار

پی ایچ ڈی سکالر: رانا اسلم نگران: ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

ماہرین کے مطابق فصلوں کی اچھی اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لئے خوردبینی جرثوموں کا استعمال آسان اور مناسب طریقہ ہے۔ یہ جرثومے زیر زمین اور سطح زمین پر پودوں کے مختلف حصوں میں نشوونما پاتے ہیں اور پودوں کو نقصان پہنچانے بغیر اُن کے ساتھ طویل مدت کے لئے تعلق (Symbiotic relation) قائم کر لیتے ہیں۔ یہ جرثومے مختلف طریقوں جن میں نامیاتی مادوں کی پیداوار، نائٹروجن فیکسیشن (Fixation) اور غذائی اجزاء کی فراہمی شامل ہیں، سے پودے کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جرثومے ایک مرکب (Enzyme) کاربوئک انہیڈراز (Carbonic Anhydrase) رکھتے ہیں جو کہ ضیائی تالیف میں اہم کردار ادا کرتا ہے لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے جرثوموں کو فروغ دیا جائے جو پانی کی کمی اور مناسب پانی کی موجودگی میں ضیائی تالیف بڑھانے اور فصلات کی پیداوار بہتر کرنے میں مدد دیں تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تحقیق انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی کی گئی تحقیق کے پہلے مرحلے میں گندم اور مکئی کے پودے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے مختلف کھیتوں سے لئے گئے اور دھونے کے بعد مختلف حصوں میں کاٹ دیئے گئے۔ پھر ان حصوں کو جراثیم کش دوا سے صاف کر کے 150 مختلف اقسام کے جراثیم الگ کئے گئے اور ان کی پانی کی قلت برداشت کرنے اور کاربوئک اینہائیڈریز (Carbonic Anhydrase) پیدا کرنے کی صلاحیت جانچی گئی۔ ان میں سے 10 جراثیموں کو جو دونوں صلاحیتوں میں بہتر تھے تحقیق کے اگلے مرحلے کے لئے منتخب کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں ان جراثیموں کا پانی کی کمی اور مناسب پانی کی موجودگی میں پودوں کی بڑھوتری پر اثرات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے گندم کی اقسام Uqab-2000 اور Fsd-2008 اور مکئی کی دو (H1, H2) اقسام کو پانی کی کمی اور مناسب پانی کی موجودگی میں جانچا گیا۔ ابتدائی نتائج سے پتہ چلا کہ منتخب شدہ جراثیموں نے گندم اور مکئی کی دونوں اقسام میں شرح ضیائی تالیف اور پودوں کی بڑھوتری میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ تاہم اضافہ H2 اور Uqab-2000 اقسام میں H1 اور Fsd-2008 کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ تیسرے مرحلے میں گندم اور مکئی کے لئے منتخب شدہ جراثیموں کو خاص مہارت (GUS Labelling) سے گلوں میں مکئی اور گندم کی بڑھوتری کے لئے پانی کے مختلف پیمائشوں (FC 100%, 70%, 40%) پر چیک کیا۔ نتائج سے پتہ چلا کہ منتخب شدہ جراثیموں کی موجودگی نے نہ صرف ضیائی تالیف بلکہ فسلوں کی پیداوار کو بھی بڑھایا۔ تحقیق کے چوتھے مرحلے میں منتخب شدہ جراثیموں کو گندم اور مکئی کے کھیت میں جہاں آبپاشی کو شگونی بننے پر، پھول آنے پر، دانہ بننے پر روکا گیا، جانچا گیا۔ نتائج سے پتہ چلا کہ جراثیموں کی موجودگی سے شرح ضیائی تالیف اور انانج کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ پانچویں تجربے میں منتخب شدہ جراثیموں کی الگ الگ خصوصیات اور شناخت کا مطالعہ کیا گیا یہ جراثیم Auxin پیدا کرنے اور فاسفورس کو کھل کرنے میں موثر ثابت ہوئے۔ چھٹے تجربے کے نتائج سے پتہ چلا کہ جراثیم پانی کی کمی سے تعلق رکھنے والے جین (Gene) کو پانی کی کمی اور مناسب پانی کی موجودگی میں متاثر کرتے ہیں۔ درج بالا تمام تجربات سے ثابت ہوا کہ پانی کی قلت برداشت کرنے اور کاربوئک اینہائیڈریز (Carbonic Anhydrase) پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جراثیم پانی کی کمی اور مناسب پانی کی موجودگی میں شرح ضیائی تالیف اور پیداوار میں بہتری کا باعث بنتے ہیں۔

نوٹ: درج بالا تحقیق کے لئے کمیشن برائے اعلیٰ تعلیم (HEC) حکومت پاکستان نے مالی معاونت کی لہذا پی ایچ ڈی سکالر حکومت پاکستان کی تہ دل سے مشکور ہے جنہوں نے تحقیق کے دوران بھرپور مدد اور تعاون کیا۔

سلیمیم کی فائینورمیڈیشن کے لئے مکئی کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: منیرہ نسیم نگران: ڈاکٹر محمد انوار الحق شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

سلیمیم زندگی کے لئے ایک اہم اجزائے صغیرہ ہے۔ یہ انسانوں جانوروں اور کچھ پودوں کے لئے تھوڑی مقدار میں ضروری ہے۔ جبکہ اس کی 10 ملی گرام / کلوگرام مقدار نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ قدرتی اور مصنوعی ذرائع سے ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ سلیمیم کی آلودگی ماحول میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اس آلودگی کو کم کرنے کے لئے پودوں کا استعمال ایک ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے۔ وہ پودے جو زیادہ مقدار میں سلیمیم کو اپنے مختلف حصوں میں سٹور رکھتے ہیں وہ جانوروں میں سلیمیم کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مکئی ان چند پودوں کی ایک مثال ہے۔ مکئی بڑے پیمانے پر کاشت کی جانے والی فصل ہے۔ پاکستان میں مکئی مختلف کھانوں میں اور جانوروں کے لئے چارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں جہاں فنڈز محدود ہوتے ہیں وہاں قدرتی بحالی کے لئے مکئی کی فصل کی کاشت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس تحقیقی کام میں سلیمیم کی مختلف مقداروں کے اثرات کو جاننے کے لئے ابتدا میں مکئی کی آٹھ اقسام منتخب کی گئیں۔ مزید پھر ان میں سے دو اقسام کا انتخاب کیا گیا۔ 33H15 اور Cargill 6142 میں سب سے زیادہ قوت مدافعت دیکھی گئی اس کے برعکس Syngenta 8441 میں سب سے کم قوت مدافعت دیکھی گئی تھی۔ سیلیلیک ایسڈ اور سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ کا سپرے بھی کیا گیا تھا تاکہ سلیمیم کی زیادہ مقدار کی موجودگی میں ان کا اثر مکئی کے بڑھوتری پر دیکھا جاسکے۔ اس تحقیقی کام میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ سلیمیم کی زیادہ مقدار نے پودوں میں بڑھوتری کے عمل کو کم کیا۔ اور پانی کے اخراج کے عمل کو اور غلوی جھلی کو بھی متاثر کیا جبکہ 100uM سیلیلیک ایسڈ اور سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ کے سپرے نے سلیمیم کے منفی اثرات کو کم کیا اور ساتھ ہی پودوں میں بڑھوتری کے عمل کو اور خامروں کی مقدار کو بہتر کیا۔ حاصل کردہ نتائج کے مطابق مکئی کی تمام اقسام میں سے 33H15 Pioneer میں سب سے زیادہ بہتری اور مدافعت دیکھی گئی تھی۔

سبز یوں میں کرومیم دھات کی مقدار کو کم کرنے کے لئے نباتاتی اور غیر نباتاتی ذرائع کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: حنا ستار نگران: ڈاکٹر محمد انوار الحق شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

پاکستان میں شہر فیصل آباد اس حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے جہاں ٹیکسٹائل کی بے شمار صنعتیں ہیں جن میں دھاگہ کپڑا اور کپڑا رنگنے اور گارمنٹس کی صنعتیں شامل ہیں۔ جہاں یہ صنعتیں کپڑے کی پیداوار میں مصروف عمل ہیں۔ وہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ان صنعتوں سے خارج ہونے والا پانی ہے۔ بالخصوص ٹیکسٹائل ڈائینگ انڈسٹری سے خارج ہونے والا پانی بغیر صفائی (Treatment) کے ندی، نالوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ فیصل آباد شہر سے ملحقہ آبادی زیادہ تر دیہات پر مشتمل ہے جس کا روزگار زراعت سے منسلک ہے۔ اکثر کاشتکار حضرات اسی خارج شدہ پانی کو نہری اور زمینی پانی کے متبادل کے طور پر اپنی فصلوں کے لئے استعمال کر لیتے ہیں قطع نظر اس کے کہ اس پانی میں Pb, Cr, Cd اور Cu جیسے زہریلے مادے پائے جاتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے خارج ہونے والا پانی جب ماحول کا حصہ بنتا ہے۔ تو یہ نہ صرف انسانی صحت کے لئے خطرے کا باعث ہے بلکہ پودوں کی جڑوں اور تنوں میں زہریلے مادوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے Food Chain کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے تین تحقیقات کی گئیں۔ پہلے مرحلے میں فیصل آباد میں ملحقہ مختلف ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے خارج شدہ پانی کے نمونے اکٹھے کئے گئے اور مختلف طبعی اور کیمیائی طریقوں سے ان میں موجود زہریلے مادوں کا جائزہ لیا گیا لہذا اس پانی کے نمونے کو دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تحقیقات کے لئے استعمال کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں اس پانی سے گوبھی اور پالک کے پودے اگائے گئے اور ان پودوں کی جڑوں اور تنوں میں کرومیم

(Cr) کے اثرات کا مشاہدہ کیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں اس پانی کے ساتھ Poultry manure اور چھپم مٹی میں شامل کی گئی اور دوبارہ پودوں کی جڑوں اور تنوں میں کرومیم کے اثرات کا تقابلی جائزہ لیا گیا۔ Poultry manure اور چھپم مٹی اور صنعتی پانی سے اگائے گئے پودوں کی پیداوار کا بغور مشاہدہ کیا گیا اور پتہ لگایا گیا کہ نباتاتی اور غیر نباتاتی مادے کس حد تک کارگر ثابت ہوئے اور انہوں نے کس حد تک کرومیم Immoibize (Cr) کیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ پودوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ کرومیم (Cr) کے اجزاء میں خاطر خواہ کی واقع ہوئی۔ مزید مٹی کو بھی مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کیا گیا۔ ان تجربات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے استعمال شدہ پانی کے ساتھ آدھی مقدار میں مٹی پانی کی رکھتے ہوئے Poultry Munure اور چھپم جیسے سستے اور کارآمد نباتاتی اور غیر نباتاتی مادوں کو بروئے کار لار سبزیوں کی بہتر پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے اور زرعیلے مادوں کے اثرات ازل کیا جاسکتا ہے۔

کلرزہ زمین میں فاسفورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہیومیٹ کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: محمد امین نگران: ڈاکٹر جاوید اختر شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز

انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز میں ایک تحقیقاتی پراجیکٹ لگایا گیا۔ مٹی کی ہاؤسڈ قسم 30Y87 کو کلرزہ زمین میں استعمال کیا گیا۔ فاسفورس تیزاب اور پوٹاشیم ہیومیٹ کو علیحدہ علیحدہ اور اکٹھے مختلف گلوں میں ڈالا گیا۔ مٹی کے دانوں کو پکنے پر فصل کو کاٹ لیا گیا۔ نتائج نے ظاہر کیا کہ فاسفورس تیزاب اور پوٹاشیم ہیومیٹ کے اکٹھا استعمال کرنے سے نہ صرف فاسفورس پودوں کے مختلف حصوں میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوتا ہے بلکہ ضیائی تالیف کا عمل بھی بڑھ جاتا ہے اجزائے کبیرہ و صغیرہ کی وافر مقدار پودے کو مہیا ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور تجربہ مٹی میں لگایا گیا۔ پہلے تجربے کو ہارویٹ کرنے کے بعد دوسرا تجربہ انہی گلوں میں لگایا گیا۔ پنجاب ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کی مقرر کردہ خوراک کے مطابق نائٹروجن، فاسفورس، اور پوٹاشیم کا استعمال کیا گیا۔ یہ استعمال اس نظریے کے مطابق تھا کہ فاسفورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہیومیٹ ایک یا دو فصلوں کے موسم میں غذائی اجزاء فراہم کر سکتے ہیں گندم کی قسم گلکسی-2013 کو کلرزہ زمین میں چیک کیا گیا۔ اس تجربے کے نتائج سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پوٹاشیم کی حل پذیری کی وجہ سے اجزائے کبیرہ و صغیرہ آپس میں مل کر پودوں کی پیداوار اور ضیائی تالیف میں اضافہ کرتے ہیں۔ تحقیقاتی تجربات کے تناظر میں یہ بات بہت اہم تھی کہ فاسفورس تیزاب کے استعمال سے زمین کی ساخت پر ہونے والے اثرات کو چیک کیا جائے لہذا پلاسٹک کے پائپ (Lysimeter) میں مٹی پر ایک اور تجربہ کیا گیا جس کا مقصد صرف کلر میں کی اور نمکیات کی مقدار میں زیادتی کو چیک کرنا تھا۔ لائیسیمیٹر میں بیج لگانے کے بعد پانی کے اخراج کا مطالعہ کرنے کے لئے 20، 40 اور 60 دن کے وقفے سے پانی کے نمونوں کو ایک لیٹر صلاحیت کی بوتل میں ذخیرہ کیا گیا۔ مٹی کے پودوں کو اگنے کے 65 دن کے بعد براؤن بیگز میں سکھایا گیا اور جانچ کے نتائج سے پتہ چلا کہ زمین کے کلروالے نمکیات فاسفورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہیومیٹ کے استعمال سے کم ہو گئے۔ نائٹروجن کی مقدار ہر نمونے میں زیادہ پائی گئی۔ فصل کی مٹی کا تجزیہ کرنے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ فاسفورس کم مقدار میں روٹ زون سے باہر گئی۔ نتائج سے مزید واضح ہوا کہ اجزاء صغیرہ فاسفورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہیومیٹ کے اکٹھا استعمال سے مٹی کے اندر موجود رستے ہیں جسے پودا اپنی پوری زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ حاصل کردہ نتائج کو پرکھنے کے لئے ایک تجربہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے فارم پروکا-2 پر لگایا گیا دو کینال رقبہ پر محیط اس تجربہ میں گندم پر تمام حالات وہی رکھے گئے جو پہلے تھے۔ حاصل کردہ نتائج سے پتہ چلا کہ فاسفورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہیومیٹ کا اکٹھا استعمال نہ صرف فصل کی بڑھوتری اور پیداوار کو بڑھاتا ہے بلکہ مٹی کی برقی موصلیت اور قابل تبادلہ سوڈیم میں بھی خاطر خواہ کی لاتا ہے۔ لہذا تمام تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فاسفورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہیومیٹ کا اکٹھا استعمال زمین کی صحت کو بڑھاتا ہے۔

بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ، گوشت کی ضمنی پیداوار اور اکی علاج کرنے کی صلاحیت

پی ایچ ڈی سکالر: منزہ سعید نگران: ڈاکٹر محمد علی خان شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

دائمی اور متعددی بیماریوں کو مؤثر طور پر روکنے اور قدرتی اجزاء کے طور پر بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ کو علاج کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے جو کہ مختلف قسم کی بائیو کینیوٹیر جیسا کہ انٹی بائیوٹینسیو، انٹی اکیڈانت، انٹی تھارومیک، سوزش کے خلاف کینسر کے خلاف ایکٹیوٹس اور کینسر کے خلیوں کی روک تھام کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کیتوتوزیک اثرات بھی رکھتا ہے۔ گوشت کے بائیو ایکٹیو پیپٹائڈس کی اہمیت پر غور کرتے ہوئے اور ان کے ذریعے علاج کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے موجودہ منصوبے میں المیجینج، ایزیمینک ہائیڈرولائزس اور گوشت کی فرمینیشن کے ذریعے گوشت اور گوشت کی مصنوعات سے گوشت کے بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہترین طریقہ ہائیڈرولائزس کے اعلیٰ ڈگری کے ساتھ منتخب کیا گیا ہے جو مزید مقدار میں اضافہ کریگا۔ RP-HPLC کا استعمال کرتے ہوئے اور پیپٹائڈس کی بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ کا مطالعہ وٹو تجربے میں استعمال کرتے ہوئے ان کے علاج کی صلاحیت کے لئے مزید جائزہ لیا گیا ہے۔ موجودہ مطالعہ کی نیاپن المیجینج، ایزیمینک ہائیڈرولائزس اور گوشت کی فرمینیشن کے ذریعے گوشت اور گوشت کی مصنوعات سے گوشت کے بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ پیدا کرتا ہے۔ بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ سے تیار شدہ غذائی اجزاء پیداوار کو فروغ دینا اور بچوں، بزرگوں اور مدافعوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جانا چاہیے۔ ناول پروسیسنگ پروڈکٹوں جیسے ممبرین پروسیسنگ اور کرومیٹوگرافک تکنیک کو اپنایا جانا چاہیے۔ یہ بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ خالص حالت میں مختلف جسمانی امراض کا علاج کرنے کے لئے دواؤں کی تیاری میں استعمال کرنا چاہیے۔ پیپٹائڈس کی پیداوار میں اضافے اور شناخت پر منعقد کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کو بائیو ایکٹیو پیپٹائڈ کی صلاحیت سے آگاہ کرنے کے لئے بہترین اقدامات اٹھانے چاہیے اور انڈسٹریز بائیو پیپٹائڈ کی بیماریوں کے خلاف صلاحیت پر تحقیق ہونی چاہیے۔

پاکستان میں زمینوں کی کاشت کے لئے سفارشات

پی ایچ ڈی سکالر: فخرہ خانم نگران: ڈاکٹر طاہر ظہور شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

زمینوں قدیم زمانے سے کاشت کی جانے والی فصل ہے۔ جسے اس کے پتوں، بیج، تیل اور بھل کے لئے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کی کاشت بحیرہ روم کے ممالک مثلاً اٹلی، یونان، چین، پرتگال، ترکی

اور اردن میں تجارتی پیمانے پر کی جاتی ہے۔ زیتون کی کامیاب کاشت کے لئے معقول گرم اور خشک ہوا اور سردی کے موسم میں بارشیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھول کو بننے کے لئے سخت سردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی کاشت بارانی، پہاڑی اور آبپاش علاقوں میں بہت کامیابی سے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے، سوات، دیر، مالاکنڈ اور صوبہ بلوچستان میں نورالائی اور خضدار کے علاقے اس کی کاشت کے لئے موزوں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں زیتون کے بہت سے خود روپودے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی زمین قدرتی طور پر زیتون کے پھلنے، پھولنے کے لئے مناسب ہے۔ زیتون کا درخت نباتاتی، اقتصادی، مذہبی اور طبی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ طبی لحاظ سے اس کا پھل، بیج، تیل یہاں تک کہ پتے بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایسے کییمیائی عناصر پائے جاتے ہیں جو امراض قلب کے لئے نہایت مفید اس کے علاوہ یہ معدہ کی جھلی کو مضبوط بناتے ہیں اور معدے کی تیزابیت کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں روغنی اجزاء اکثر سے پائے جاتے ہیں۔ جس کو گھی اور چربی کے نعم البدل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ زیتون کے کییمیائی اجزاء امراض جگر کے لئے بھی نہایت مفید ہیں جس کی وجہ سے اس کا تیل امراض قلب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا عرق جراثیم کش (Antimicrobial) اور آنتی آکسید (Antioxidant) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین نے زیتون کے پھل اور پتوں کے کییمیائی اجزاء پر تحقیق کی۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ پاکستانی زیتون کے پتوں سے مفید کییمیائی مرکبات کے حصول کے لئے صنعتی پیمانے پر 75 فیصد استھانول بہترین ہے۔ زیتون کی جن پاکستانی اقسام پر تحقیق کی گئی تھی ان میں گیملک کے کییمیائی اجزاء مفید ترین نظر آئے۔ کیونکہ اس میں جراثیم کش اور آنتی آکسید مرکبات کی مقدار زیتون کی دوسری پاکستانی اقسام سے زیادہ ہے۔ ماہرین نے اپنی اس تحقیق کی روشنی میں سفارش کی ہے کہ ملک میں زیتون کی کاشت بڑھانے کے لئے جب بھی اقدامات کئے جائیں تو کسانوں کو گیملک کی کاشت کی ترغیب اور تجویز دی جائے تاکہ صنعتی پیمانے پر زیتون کے مفید ترین مرکبات حاصل ہو سکیں۔

ٹماٹروں کے بعد از کاشت معیار کو بہتر بنانے میں کنوار گندل سے بنی غذائی تہہ کا کردار

پی ایچ ڈی سکالر: ندافردوس نگران: ڈاکٹر معظم رفیق خاں شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

موجودہ تحقیق میں نباتات کے ذریعے ایک ماحولیاتی طور پر سازگار تہہ بنائی گئی جس میں ایلو ویرا (کنوار گندل) کے اندر موجود جیل کو استعمال میں لایا گیا۔ جو آسانی سے میسر ہونے کے ساتھ ساتھ معجزاتی طور پر بھی بہت سی خصوصیات کا حامل ہے جن میں کینسر کے خلاف انسان کے مدافعتی نظام کو مدد کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں ان خصوصیات کے علاوہ یہ پودا نظام انہضام اور دل کی بیماریوں کے لئے بھی مفید ہے۔ ایلو ویرا کا استعمال بڑے پیمانے پر دوائی ساز کمپنیاں کر رہی ہیں۔ فوڈ سائنس کے شعبے میں بھی اس کا استعمال جاری و ساری ہے کیونکہ یہ بہت مفید خصوصیات کا حامل ہے۔ موجودہ تحقیق سے یہ بات علم میں آئی ہے کہ اس پودے میں موجود اجزاء جن میں انزائمز، معدنیات اور فائینو کیمیکلز قابل ذکر ہیں کی وجہ سے اس کی اینٹی مائیکروبیئل اور اینٹی آکسیدنٹ خصوصیات ہیں۔ اس کو ٹنگ میں جیلو ویرا جیل استعمال کی گئی ہے۔ اس کے نکلے اور کوٹنگ سلوشن بنانے کا عمل بہت ہی سادہ بلکہ سستا بھی ہے۔ اس میں شامل کئے جانے والے باقی اجزاء بھی انتہائی آسانی سے میسر اور حل پذیر ہونے والے ہیں جو مختلف خصوصیات رکھتے ہیں کوٹنگ بنانے کے عمل میں ایلو ویرا جیل کی مختلف فیصد کو استعمال کیا گیا جو کہ 0 فیصد سے لیکر 80 فیصد تک تھیں۔ کوٹنگ سلوشن بنانے کا عمل نہایت آسان تھا۔ کوٹنگ میں وٹامن سی، CCM اور Glycerol کو بھی شامل کیا گیا۔ کوٹنگ بنانے کے بعد اس کی موٹائی، Viscosity Wettability اور Homogeneity کا مطالعہ کیا گیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ جس کوٹنگ سلوشن میں 60 فیصد ایلو ویرا جیل وہ بہترین خصوصیات کی حامل تھی۔ کوٹنگ کو ٹماٹروں پر لگانے کے لئے ڈوبنے (Dipping) والے طریقے کا انتخاب کیا گیا تہہ پذیر پھلوں کے نتائج غیر تہہ پذیر پھلوں سے بہت بہتر آئے تہہ پذیر پھلوں میں گلنے سڑنے کا عمل اور سانس لینے کا عمل بہت سست ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے وزن اور جسامت میں بہت کم کمی دیکھنے میں آئی۔ غیر تہہ پذیر پھلوں میں نرم پڑنے کا عمل بہت تیز تھا جبکہ ان میں 20 دن کے بعد پھپھوندی لگنے کا عمل شروع ہو گیا تھا جبکہ تہہ پذیر پھل 40 دن تک بھی پھپھوندی سے صاف تھے اور اپنی اصل حالت میں تھے۔ مجموعی طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ایلو ویرا جیل کی زیادہ مقدار ٹماٹروں کی Shelf-life بڑھانے کے لئے کارگر ثابت ہوئی۔ اور ایلو ویرا جیل کو کسی بھی پھل یا سبزی کی بعد از کاشت زندگی بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف آسان بلکہ موثر بھی ہے۔ اس طریقے کو استعمال میں لاکر غذائی بحران پر قابو پایا جاسکتا ہے اور ٹماٹروں کی قیمتوں پر بھی اس کا خاطر خواہ فرق پرکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مزید تحقیق کے ذریعے اس طریقے کو استعمال میں لایا جائے۔ اس مطالعے کے ذریعے ایلو ویرا پڑنی غذائی تہہ کے موثر ہونے کا انکشاف ہوا۔ زیر نظر مطالعے کے نتیجے میں تہہ چڑھانے والے مواد کی صلاحیت کا بھی اظہار ہوا نیز یہ سائنسی انکشافات ایلو ویرا جیل سے تہہ بنانے کے عمل میں معاون ثابت ہوں گے۔

لوگ اور اس کے فوائد

پی ایچ ڈی سکالر: محمد صدیق رضا نگران: ڈاکٹر محمد سعید شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

اللہ پاک نے انسان کو مختلف اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ زمین پر طرح طرح کے پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں اور مصالحہ جات آگائے جو کہ نہ صرف بنیادی غذائیت فراہم کرتے ہیں بلکہ انسان کو خطرناک بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ لوگ میں ایک خاص قسم کا بائیو ایکٹیو جزو پایا جاتا ہے جو کو پوجینول کہتے ہیں اس کی مقدار لوگ میں 70 فیصد سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ میں مختلف قسم کے وٹامنز اور معدنیات پائی جاتی ہیں۔ وٹامنز میں وٹامن اے، بی اور کے اہم ہیں جبکہ معدنیات میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، زنک اور آئرن اہم ہیں۔ یہ تمام جس کی بڑھوتری اور نشوونما کیلئے اہم ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف ایلو پیٹھک ادویات موثر ہوتی ہیں لیکن ان کا جسم کو نقصان بھی کافی ہوتا ہے۔ لوگ جیسے پودے بغیر نقصان کے بیماریوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ لوگ عالمی ایجنسی برائے خوراک، ادویات اور ایگریکلچر سے منظور شدہ ہے کہ اس کے استعمال کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مختلف سائنسی تحقیقات کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ لوگ دل کے امراض کے لئے نہایت مفید ہے۔ یہ جسم میں کو لیسٹرول کو

کنٹرول کرتا ہے جسم میں دو اقسام کا کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ایک جسم کیلئے فائدہ مند ہوتا ہے اور دوسرا نقصان دہ۔ لوگ میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرنے اور نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لوگ شوگر کے مریضوں کیلئے بھی نہایت مفید ہے۔ یہ جسم میں شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ انسولین کے لیول کو بڑھاتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق لوگ کینسر کے علاج کیلئے بھی اہم ہے۔ یہ جسم میں موجود فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتا ہے۔ دنیا بھر کی مارکیٹوں میں سارا سال ثابت لوگ، اس کا پاؤڈر اور تیل دستیاب رہتا ہے۔ ہم لوگ کا استعمال کر کے مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔

سویا دودھ کی فرمیشن غذا بیت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ

پی ایچ ڈی سکالر: سمیرا حسن نگران: ڈاکٹر طاہر ظہور شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

سویا دودھ میں بائیو ایکٹو عناصر گلائیٹکوز کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی آنت میں جذب نہیں ہو سکتے تاہم تخریب کاری کا عمل نہیں ایگلائیٹکوز میں بدل دیتا ہے جو کہ باآسانی جذب ہو سکتے ہیں۔ فرمیشن کے عمل کے لئے لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کا استعمال خوراک کے کارخانوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بیکٹیریا میٹابولک ایسڈز خارج کرتے ہیں جن میں لیکٹک اور ایسٹک ایسڈ نمایاں ہیں۔ یہ ایسڈز نہ صرف سویا دودھ کے ذائقہ کو بڑھاتے ہیں بلکہ اس میں قدرتی محفوظ کنندہ کے طور پر بھی اہم ہے ان بیکٹیریا میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ بیکٹیریا پانی کو باندھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے سویا دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ سویا دودھ میں لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کا استعمال صحت کے لئے بھی مفید ہے۔ یہ جسم میں کولیسٹرول کے تناسب کو کم کرتا ہے، ڈائیٹریا سے نجات دلاتا ہے، آنتوں کی سوزش اور کئی دوسرے انفیکشن کو کم کرتا ہے جس میں معدے کا السر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں، پیٹ کے امراض، آنت کے سرطان اور نمکیات کے انجذاب میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا سویا دودھ میں موجود کاربوہائیڈریٹ کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کو توانائی کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ لہذا سویا دودھ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کی بڑھوتری کے لئے اہم ذریعہ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ سویا دودھ کو اس لئے استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں سویا پروٹین سے الرجی ہے تاہم دودھ میں فرمیشن کا عمل ان پروٹین کو توڑ کر ڈائی، ٹرائی اور اولیگو پیپٹائیڈز میں بدل دیتا ہے جو کہ الرجی کا باعث نہیں بنتے اور سویا دودھ کو بائیو ایکٹو پیپٹائیڈز کا اہم ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ فرمیشن کا عمل اینٹی آکسائیڈنٹ کی مقدار کو بڑھانے کے ساتھ جسم میں قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ سویا بین ایک شاندار فصل ہے جو کہ ان غذائی اجزاء سے بھرپور ہے جو جسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لئے معاون ثابت ہوتی ہے لہذا اس فصل کے گاؤں کے لئے پوری دنیا میں تشہیر کرنی چاہیے جو کہ مکمل پروٹین کا اہم ذریعہ ہے اور بہت سے پراڈکٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کے ساتھ فرمیشن کا عمل نہ صرف اس کے ذائقہ کو بڑھاتا ہے بلکہ بہت سے غذائی اجزاء کو بھی بڑھاتا ہے۔

لہسن کے عمومی اور جراثیم خواص

پی ایچ ڈی سکالر: عاطف لیاقت نگران: ڈاکٹر طاہر ظہور شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی

زمانہ قدیم سے ہی انسان پودوں اور جانوروں اور جراثیم سے مختلف غذائیں حاصل کرتا آ رہا ہے۔ ان غذاؤں کو مکمل حالت کے ساتھ ساتھ ان سے حاصل کردہ نچوڑ بھی مختلف مقاصد کے لئے استعمال کئے جاتے رہے ہیں۔ جدید دور میں ان نچوڑوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے جہاں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان میں مصنوعی ادویات کے مقابلے میں مزاحمت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ لہسن جسے سائنسی زبان میں ایلینیم سیٹوم کہا جاتا ہے ایک عام استعمال کی سبزی ہے جو کہ پیاز کے ساتھ لٹی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اپنے اندر ایک مخصوص بوکے سمونے ہوتا ہے جو انسانی نام میں چھپنے والا احساس پیدا کرتی ہے۔ لٹی خاندان میں لہسن کو بہت سی خوبیوں کی بنا پر ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں لہسن کی دو عام اقسام کاشت کی جاتی ہیں جو بازار میں باآسانی دستیاب ہیں۔ سفید اور گلابی رنگ سے باآسانی قابل شناخت یہ اقسام کیمیائی طور پر بھی حیاتیاتی طور پر فعال مرکبات کی مختلف مقدار رکھتی ہیں۔ مختلف تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حیاتیاتی طور پر فعال مرکبات سفید لہسن کی نسبت گلابی لہسن میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کیمیائی طور پر لہسن کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن میں نشاستہ (قابل ہضم اور ناقابل ہضم)، لحمیات، چکنائی، راکھ یا معدنیات، حیاتین اور مختلف اقسام کے حیاتیاتی طور پر فعال مرکبات کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ 100 گرام لہسن میں تقریباً 60-68 گرام پانی، 25-30 گرام نشاستہ، 7-12 گرام لحمیات، 1500-300 ملی گرام چکنائی، 1500-1000 ملی گرام معدنیات اور 1-2 گرام خوشبودار تیل پایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر لہسن میں پائے جانے والے جازاؤں کو گندھک یا سلفر کے حامل اور گندھک کے غیر حامل اجزاء میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ گندھک کے حامل اجزاء میں کم از کم 33 مختلف اقسام کے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ حیاتیاتی طور پر فعال مرکبات میں فنالک ایسڈز جیسے کورسٹین، گلیک ایسڈ، کیفیک ایسڈ، وینیلک ایسڈ، ہینزونک ایسڈ، کلورجینک ایسڈ، سائیرنک ایسڈ، پیراکو میرک ایسڈ (P-coumeric acid)، میٹاکو میرک ایسڈ (M-coumeric acid)، سائیرنک ایسڈ (Syringic acid) وغیرہ وغیرہ اوگندھک رکھنے والے مرکبات جن میں ایلان (Alliin)، ڈائی ایلانک سلفائیڈ (Diallyl sulfide)، ڈائی ایلانک ڈائی سلفائیڈ (Diallyl disulfide)، ڈائی ایلانک ٹرائی سلفائیڈ (Diallyl trisulfide)، ڈائی ایلانک ٹیٹراسلفائیڈ (Diallyl tetrasulfide) اور خاص طور پر قابل ذکر ایلینیم (Allicin) جو کہ ایک خامرے (Enzyme) ایلانیز (Allinase) کے ایلانک پر عمل کے نتیجے میں بنتا ہے، شامل ہیں۔ قدرتی طور پر ایلان اور ایلانیز علیحدہ علیحدہ خانوں میں موجود ہوتے ہیں جیسے ہی لہسن کو مسلا یا کاٹا جاتا ہے تو یہ آپس میں مل جاتے ہیں اور ان کے عمل کے نتیجے میں ایلینیم وجود میں آتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ مرکبات اپنے اندر جراثیم کش (Antimicrobial)، ضد میکیدی (Antioxidant) اور سوزش ختم کرنے والے (anti-inflammatory) اثرات رکھتے ہیں۔ لہسن کے بیماریوں سے بچاؤ (Prevention)، علاج (Cure) اور صحت افزاء (Healthful) فوائد کو انہی مرکبات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لہسن کو قدیم زمانہ ہی سے مختلف بیماریوں سے تحفظ اور علاج کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے مثال کے طور پر قدیم مصری (Egyptians) اسے ہیضہ (Diarrhea) اور قدیم یونانی (Greeks) آنتوں اور دیگر امراض کے علاج میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ قدیم چینی اور جاپانی اسے زکام، گلے اور سر کے درد کے علاوہ بخار کے علاج کے لئے استعمال کرتے رہے ہیں۔ افریقہ، خاص طور پر نائجر یا میں لوگ اسے ہیضہ، پیٹ کے امراض، نظام تنفس کے چھوٹی امراض اور درمیانی

کان کی سوزش کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ لہسن کے عمومی فوائد میں بلند فشارخون، کولیسٹرول، ذیابیطس کو قابو میں رکھنا اور دیگر امراض سے تحفظ یا علاج شامل ہیں۔ ان کے علاوہ لہسن کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن میں سرفہرست مختلف اقسام کے بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم (Pathogens) کو ختم کرنا (Kill) اور ان کی افزائش کو روکنا (Inhibition) شامل ہیں۔ جدید تحقیق میں لہسن کے مختلف محلولات (Solvents) جیسے پانی، الکحل کے ذریعے سے حاصل ہونے والے نچوڑوں کو مختلف فائدہ مند مقاصد کے لئے استعمال کرنا شامل ہے۔ لہسن کا نچوڑ حاصل کرنے کے لئے اسے کوٹ کر کسی محلول کے ساتھ حل کیا جاتا ہے اور اسے مسلسل ہلانے کے بعد محلول کو مصنوعی خلاء (Vacuum) پیدا کر کے بخارات بنا کر اڑا دیا جاتا ہے اس طریقے سے حاصل ہونے والا نچوڑ عموماً خام حالت میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ 100 گرام لہسن سے تقریباً 20-25 گرام خام نچوڑ (Crude extract) حاصل ہوتا ہے۔ ان نچوڑوں کو اعلیٰ تجزیاتی طریقوں (Analytical techniques) سے شناخت کیا گیا ہے اور حیاتیاتی طور پر فعال مرکبات خاص طور پر فائوکلک ایسڈز اور پلیٹینین کی مقدار کو ماپا گیا ہے۔ یہ نچوڑ اپنے اندر بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں کو مارنے کی یا ان کی افزائش کو روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور ان خصوصیات کی بنا پر انہیں خوراک کو محفوظ کرنے (Preservation) اور متعدی امراض کے علاج میں استعمال کرنا شامل ہے۔ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم جن کے خلاف لہسن کے نچوڑ کمبوٹریا پائیگیا ہے ان میں ایسکریشیا کولائی (Escherichia coli)، سٹیفائیلاکوکس اور لیس (Staphylococcus aureus)، سالمونلا (Salmonella)، لیسٹیریا (Listeria) وغیرہ جو کہ انسانی خوراک میں شامل ہو کر ہیضہ اور پیٹ کے دیگر امراض کا باعث بنتے ہیں، شامل ہیں۔ ان جراثیم میں وہ بھی شامل ہیں جو مصنوعی ادویات کے مقابلہ میں قوت مدافعت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نچوڑ ان جراثیم سے بننے والی حیاتیاتی تھوں (Biofilms) جو کہ خوراک کو محفوظ کرنے کے عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، انکو روکنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں۔ حیاتیاتی ذریعے سے تحفظ (Bio-preservation) ایک ایسا عمل ہے جس سے خوراک کو مختلف اقسام کے قدرتی مرکبات، جنہیں پودوں، جانوروں یا جراثیم سے حاصل کیا جاتا ہے، کے ساتھ محفوظ کرنا شامل ہے۔ چونکہ مصنوعی مرکبات کے بکثرت اور تادیر استعمال سے ان سے پیدا ہونے والے نقصان دہ اثرات میں اضافہ ہو رہا ہے اس لئے خوراک کو محفوظ کرنے کے ماہرین اپنی تحقیق کا رخ قدرتی اشیاء کے استعمال کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اس ضمن میں لہسن کو جراثیم کش، ضد تکسید خواص اور اپنی مخصوص بو کی بنا پر گوشت اور اس سے بننے والی مصنوعات میں نقصان دہ جراثیم کو ختم کرنا، اس کی مدت استعمال کو بڑھانا اور مختلف کھانوں میں ڈالنے کے طور پر استعمال کرنا شامل ہے۔

غذائی قلت اور اس کے ادراک کے لئے فائدہ مند بیکٹیریا کا استعمال

پی ایچ ڈی سکالر: زینب اکبر نگران: ڈاکٹر طاہر ظہور شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

شدید سخت غذائیت (SAM) عالمی سطح پر بچوں میں اہم صحت کے مسائل میں سے ایک ہے۔ بچے کی مدد سے کئی وجوہات کی وجہ سے غذائیت پیدا ہوتی ہے جیسے غریب سماجی، اقتصادی حالت، غریب معیار کی غذا، انفیکشن، غذا کی عادات، ثقافتی نمونوں اور غذائی اجزاء کے جذب میں اضافہ ہوتا ہے جس میں غذائیت کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح، غذائیت کا انتظام ضروری ہے کہ کلینیکل اور عوامی صحت کے درمیان ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ غذائیت سے بچنے والے بچوں کو نظر ثانی شدہ یا افزودہ خوراک کی فراہمی کی طرف سے لڑائی کی جاسکتی ہے۔ پروبائیوٹکس دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دوستانہ بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ میزبان کریں جو غذائی اجزاء کے جذب کو بڑھانے اور غذائیت پر قابو پانے کے لئے ایک اہم کردار ادا کرے۔ اس وقت، نرسری کا انتظام ڈبلیو ایچ او کی سفارشات کے مطابق علاج کے علاج پر مبنی ہے لہذا، موجودہ مطالعہ کے ساتھ ساتھ پروپوزل کی گزارش کے بغیر اور بغیر مختلف علاج فارمولوں کا اندازہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لئے، پورے مطالعہ کو تین مختلف مطالعات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا مطالعہ منعقد ہونے والے ریڈیمڈ میڈیکل ملز (ایف - 75 اور ایف 100)، فیصل آباد میں ایک عام ہسپتال اور معیاری اور ڈبلیو ایچ او کی سفارشات کردہ مقامی تریکسین (LF-75 اور LF-100) کے طور پر، پھر جامع تجزیات کیا ہوا جامع تجزیہ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ F-75 اور F-100 میں مقامی فارمولا LF-75 اور LF-100 کے مقابلے میں چربی، پروٹین، راہ، کیشیم، آئرن، تانبے اور زنک کی اعلیٰ موافقتی۔ تانبہ، پی ایچ، عدم، نمی اور لیپکوز مواد کے درمیان ایک غیر اہم اثر پایا گیا تھا۔ یہ پایا گیا تھا کہ F-75 اور F-100 ایک پی ایچ 6.53-6.56، اسٹنی 0.14-0.13 فیصد، نمی 81.97-84.62 فیصد، چربی 2.64-2.64 فیصد، پروٹین 5.80-5.80 فیصد، لیپکوز 1.3-1.3 فیصد، راہ 0.71-0.5 فیصد، کیشیم 579.20-50.34 فیصد، لیپکوز 1.3-1.3 فیصد، راہ 0.71-0.5 فیصد، کیشیم 579.20-50.34 فیصد، آئرن 2.3-3.11 ملی میٹر، تانبے 0.22-2.7 ملی گرام اور زنک 1.9 اور 20.3 ایم جی۔ جبکہ، فارمولیشنوں کے جامع تجزیات LF-75 اور LF-100 نے ظاہر کیا کہ پی ایچ 6.51-6.58، اسٹنی 0.13-0.14 فیصد، نمی 83.43-85.86 فیصد، فیٹ 2.94-6.08 فیصد، پروٹین 0.84-2.57 فیصد، لیپکوز 1.31-4.12 تھی۔ فیصد، راش 0.35-0.53 فیصد، سی 35.50-306.2 ملی گرام، نی 1.33-2.33 ملی میٹر، Cu 0.19-1.2 ملی گرام اور Zn 1.13-15.02 ایم جی۔ دوسرا مطالعہ کے دوران، پروبائیوٹکس کی بچت کی اہلیت کا اندازہ لگایا گیا تھا جس میں پروبائیوٹکس کا قابل اعتبار شمار ظاہر ہوا۔ پروبائیوٹکس پر مشتمل دونوں قسم کے ساکس 108 سی ایف یو کے حامل فائدہ مند اثرات کو میزبان بنی کرنے کے لئے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان پروبائیوٹکس فارمولوں میں شامل کیا گیا تھا تا کہ ان ڈیوٹ اور پروبائیوٹکس کے علاج کے امکانات کو چربی پر ڈالیں Acclimatization۔ غذائیت کے بعد حوصلہ افزا کیا گیا تھا۔ غذائیت کے بعد، چوہوں نے گلوکوز، ہیموگلوبین، لیمین، ڈبلیو بی سی کے وزن کی سطح میں کمی کی اور اس کی جگہ اور گردے کی ہسٹپٹولوجی کو تبدیل کیا۔ پھر مرحلے میں F-75 کے دوران دو تجارتی دستیاب پروبائیوٹکس کے ساتھ دیا گیا تھا۔ مقامی اور یونیسیف فارمولا دونوں کو فراہم کیا گیا تھا۔ ہر حیاتیاتی پیرامیٹر میں ایک اضافی رجحان کا مشاہدہ کیا گیا تھا جس میں ہسٹپٹولوجی اشارے بھی شامل ہیں تاہم پروبائیوٹکس کا اثر بہت اہم نہیں تھا۔ پھر مرحلے II اور LF-100 انفرادی طور پر ہر گردہ کو مقامی اور یونیسیف فارمولا دونوں چوہوں پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اعلیٰ وزن، عام ہیموگلوبین، ڈبلیو بی بی، لیمین اور اعلیٰ گلوکوز کی سطحوں میں جانوروں کی عام فزیولوجی کے نتیجے میں حیاتیاتی مطالعہ نے عام جگہ اور گردے کی وضاحت کی۔ مقامی تیار شدہ فارمولا کے اثر مساوات کے لئے معدنی پلیسمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروبائیوٹکس کی طویل عرصے سے نمونہ SAM سے بہتر

وصولی کے نتیجے میں ہے۔ پروفیکٹس پر مشتمل علاج فارمولان کے مجوزہ کردار ادا کرتے ہیں۔ پروبائیوٹکس پر مشتمل الیکٹروسیون ریشوں نے استحکام کو بڑھادیا اور ان کی کارکردگی کو ایک ہفتے تک برقرار رکھا۔

پنیر اور مکھن کو خوردنی کوٹنگ کے استعمال سے محفوظ کرنا

پی ایچ ڈی۔ کالر: رضوان ارشد نگران: ڈاکٹر عائشہ سہیل شعبہ: نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

ڈیری مصنوعات کے شیلیف استحکام کو بڑھانے فنگس کے حملے اور آکسیدیشن کے عمل کو روکنے کے لئے صنعتیں کیمیائی یا مصنوعی حفاظتی عناصر استعمال کر رہی ہیں۔ زندگی کے بدلتے ہوئے رجحان اور صارفین کو شعور ہونے کی وجہ سے آجکل ڈیری انڈسٹریز کو کیمیائی یا مصنوعی حفاظتی عناصر کے مضر صحت اثرات کی وجہ سے ان کے استعمال میں دشواری کا سامان ہے۔ کیونکہ صارفین کیمیائی یا مصنوعی حفاظتی عناصر سے بنی ہوئی مصنوعات کی خریداری سے گریز کرتے ہیں اور اس کے برعکس قدرتی حفاظتی عناصر سے بنی ہوئی مصنوعات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس نقطہ نظر میں خوردنی کوٹنگ (Edible coating) نرم پنیر اور مکھن کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لئے ایک ناول ٹیکنالوجی ہے۔ خوردنی کوٹنگ مادہ کی ایک پتلی سی تہہ ہوتی ہے جسے خوراک کی سطح کے اوپر کئی طریقوں سے کیا جاسکتا ہے مثلاً کوٹنگ کے محلول کو نرم پنیر اور مکھن پر برش کو استعمال کر کے کرنے سے یا ان مصنوعات کو کوٹنگ کے محلول میں ڈبو کر کرنا وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ خوردنی کوٹنگ کو ان مصنوعات کے حصے کے طور پر بھی کھایا جاسکتا ہے۔ سٹوریج کے دوران یہ نرم پنیر اور مکھن کی آکسیدیشن، فنگس کے حملے، نمی کے نقصان، پی ایچ (pH)، تیزابیت، رنگ اور ذائقے وغیرہ میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کر کے محفوظ بناتی ہے۔ مزید برآں خوردنی کوٹنگ کی کارکردگی کو زیادہ فعال بنانے کے لئے اس میں انزائمز، وٹامنز، منرلز، رنگ، مختلف ذائقے، پروبائیوٹکس، نیوٹراسیٹکس اور ضروری تیل (Essential oils) وغیرہ کو شامل کیا جاسکتا ہے جو سٹوریج کے دوران ان مصنوعات میں طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ خوردنی کوٹنگ میں لوگ اور پودینہ کا تیل شامل کر کے نرم پنیر پر کریں تو یہ غذائی قیمت میں اضافے کے علاوہ سٹوریج کے دوران آکسیدیشن کے عمل کو روکنے اور فنگس سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح خوردنی کوٹنگ میں ادراک اور کلونجی کا تیل شامل کر کے مکھن پر کریں تو یہ سٹوریج کے دوران فنگس کے حملے، ذائقے میں تبدیلی اور آکسیدیشن کے عمل کو روکنے کے ساتھ ساتھ ذائقے کو بھی بہتر بناتی ہے اور مکھن کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔

دھاتوں کے مچھلی کے جسم میں جمع پذیر، جینیاتی مادہ میں ہونے والی تباہ کاری اور آکسید بیوتائڈ کی صورت میں ہونے والے دائمی اثرات

پی ایچ ڈی۔ کالر: فریہ لطیف نگران: محمد جاوید شعبہ: زوالوجی

دھاتوں کے مچھلی کے جسم میں جمع پذیر، جینیاتی مادہ میں ہونے والی تباہ کاری اور آکسید بیوتائڈ کی صورت میں ہونے والے دائمی اثرات کو جانچنے کے لئے ایک منصوبہ بنایا گیا جو کہ چار مراحل پر مشتمل تھا۔ 1۔ دھاتوں کا مچھلی کیلئے شدید زہر یلا پین جانچنا۔ 2۔ دھاتوں کے دائمی اثرات مچھلی کے جسم میں جمع پذیر کی صورت میں۔ 3۔ دھاتوں کے دائمی اثرات مچھلی کے جینیاتی مادہ کی تباہ کاری پر۔ 4۔ دھاتوں کے دائمی اثرات مچھلی میں آکسید بیوتائڈ کی صورت میں۔ پہلے مرحلے میں 120 دن عمر کی تین اقسام کی مچھلیوں *Catla catla*, *Cirrhina mrigala*, *Labeo rohita* کو، *Lead*, *Copper*, *Chromium*, *Cadmium* اور ان کے آمیزے (Cd+Cr+Cu+Pb) سے سامنا کروایا گیا تاکہ ان کا شدید زہر یلا پین (LC50 96hr) اور مہلک مقدار کی صورت میں معلوم ہو سکے۔ تمام دھاتوں کی LC50 96-hr معلوم کرنے کے بعد تینوں اقسام کی مچھلیوں کو ان کی متعلقہ LC50 96-hr کے دو تہائی (2/3)، ایک تہائی (1/3)، ایک چوتھائی (1/4) اور پانچویں حصے (1/5) سے، 70، 56، 42، 28، 14 دنوں کے لئے الگ الگ سامنا کروایا گیا اور 14 دن بعد دھاتوں کی جمع پذیر، خون کے سرخ خلیات کے جینیاتی مادہ کی تباہ کاری کی حد اور آکسید بیوتائڈ جو کہ *catalase*, *Superoxide dismutase*، *peroxidase* کی سرگرمیوں کی صورت میں جانچا گیا۔ تمام انفرادی دھاتوں اور ان کے آمیزے کے زہر یلے پین کی LC50 96-hr کے حوالے سے *C. mrigala* سب سے کم حساس پائی گئی جبکہ دھاتوں کے آمیزے نے انفرادی دھاتوں کے نسبت زیادہ زہر یلا پین ظاہر کیا جبکہ انفرادی دھاتوں میں $Pb > Cu > Cd > Cr$ تناظر رہا۔ مچھلیوں کے جسم میں دھاتوں کی جمع پذیر کی کا وقت اور مقدار کے ساتھ مثبت تعلق رہا۔ دھاتوں کی جمع پذیر سب سے زیادہ *C. mrigala* کی میں پائی گئی جبکہ سب سے کم دھاتیں *C. catla* میں جمع ہوئیں۔ انفرادی دھاتوں کا جمع پذیر کی لحاظ سے کچھ اس طرح کا تناظر رہا۔ $Cr > Cd > Cu > Pb$ ۔ ان تینوں اقسام کی مچھلیوں کے اعضاء میں دھاتوں کی جمع پذیر کی ترتیب یہ رہی۔ جگر > گردے > دماغ > عضلات۔ تمام انفرادی دھاتوں اور ان کے آمیزے کے دائمی سامنے نے تینوں مچھلیوں کے سرخ خلیات کے جینیاتی مادے میں خاطر خواہ تباہ کاری کی۔ تاہم *C. mrigala* نے سب سے زیادہ تباہ کاری ظاہر کی جبکہ *C. catla* اور *L. rohita* نے سب سے کم جبکہ دھاتوں کا *catla* کے Genetic damage Index کے لحاظ سے *C. mrigala* اور *L. rohita* نے *C. catla* کی نسبت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ جبکہ دھاتوں میں Cd نے سب سے کم جبکہ دھاتوں کا آمیزہ سب سے زیادہ GDI کی وجہ بنا۔ مجموعی طور پر Nuclear damage Index کے لحاظ سے دھاتوں کی ترتیب کچھ یوں رہی $MM > Cu > Pb > Cr > Cd$ ۔ *Commulative tail length* میں سب سے زیادہ *C. mrigala* میں دیکھی گئی جبکہ *C. catla* میں سب سے کم چھوٹی Comet tail ظاہر ہوئی۔ دھاتوں اور ان کے آمیزے میں دائمی سامنے نے تینوں اقسام کی مچھلیوں کے اعضاء میں آکسید بیوتائڈ پیدا کیا جو کہ تین خامروں *catalase*, *Superoxide dismutase* اور *Peroxide* کی صورت میں جانچا گیا۔ تینوں خامروں میں SOD کی سرگرمی سب سے زیادہ *C. mrigala* میں پائی گئی جبکہ *L. rohita* اور *C. catla* میں کم سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ جبکہ CAT کی حساسیت کے لحاظ سے *C. mrigala* باقی دو اقسام کی نسبت زیادہ حساس پائی گئی۔ مجموعی طور پر SOD کی سرگرمی دھاتوں کے لحاظ سے کچھ اس طرح رہی $MM > Pb > Cu > Cr > Pb$ جبکہ POD کی سرگرمی کا تناسب کچھ یوں رہا $MM > Pb > Cu > Cd > Pb$ ۔ CAT، *MM* کی سرگرمی دھاتوں کی مقدار اور وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج

بڑھتی گئی۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ خامروں کی سرگرمی کو دھاتوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو جانچنے کے لئے Biomarker کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کلرگھاس سم اور تھورزدہ زمینوں کے لئے قدرتی اور معجزاتی تھہ

پی ایچ ڈی۔ سکارلہ: قراۃ العین راحت نگران: ڈاکٹر منصور حمید شعبہ: بائی

زمین میں نمک کی موجودگی ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں سرفہرست ہے جہاں سم اور تھور نے قابل کاشت زمینوں کو خیر بنا دیا ہے۔ موجودہ ریسرچ میں کلرگھاس پر کام کیا گیا جو کہ سم اور تھور زدہ علاقوں میں قدرتی طور پر آگتا ہے اور جہاں دوسرے پودے نہیں اگ پاتے یہ آسانی سے جھیل جاتا ہے۔ کلرگھاس عمومی طور پر چارے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور نمکین پانی کو استعمال کر کے بھی آسانی سے کلرگھاس کو اگایا جاسکتا ہے۔ اس کو آسان زبان میں کلرگھاس اور انگریزی میں سالٹ گراس کہا جاتا ہے۔ پانچ مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا گیا جن کے نام ہیں پگا انا، ساہیاں والا، کلرگھار، رحیم یار خان اور تربیوں۔ کلرگھاس کو ان علاقوں سے لانے کے بعد زرعی یونیورسٹی کے نباتاتی باغ میں کچھ عرصہ کے لئے نارل مٹی میں اگایا گیا جس کے بعد کلرگھاس کی مٹی میں مختلف درجوں میں نمک شامل کیا گیا۔ مقررہ وقت کے عرصے کے بعد پودے کو زمین سے اکھاڑ لیا گیا اور مختلف تجربے کئے گئے کہ نمک کی زیادتی کی وجہ سے کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ مختلف تجربوں میں اناٹومی، فزیالوجی اور مورفولوجی کے ذریعے کلرگھاس کے اندر کے غلے اور باہر کی ساخت کا پتہ لگایا گیا۔ پودے میں ہونے والی تبدیلیوں سے نتائج اخذ کئے گئے۔ پگا انا سے اکٹھی کی گئی کلرگھاس نے زیادہ اچھے طریقے سے نمک کی زیادتی کو برداشت کیا اور ایسی تبدیلیاں کی جس کی وجہ سے وہ اپنی افزائش کو جاری رکھ سکے۔ جیسے کے پگا انا کی کلرگھاس نے پانی کی کمی سے بچنے کے لئے اپنے خلیوں میں پانی کا ذخیرہ کیا، پانی کو زیادہ اچھے طریقے سے پودے کے تمام حصوں تک پہنچایا اور پودے کے جو حصے ہوا میں تھے ان کو مضبوط بنایا۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ نمک کی زیادتی سہل کرنے والی ساہیاں والا ٹھہری اور سب سے کم برداشت کرنے والی تربیوں کی کلرگھاس ٹھہری۔ نمک کی زیادتی برداشت کرنے کے حساب سے پگا انا، ساہیاں والا، کلرگھار، رحیم یار خان، تربیوں ٹھہری۔ نتائج سے یہ اخذ کیا گیا کہ کلرگھاس نمک کی زیادتی کو نہ صرف آسانی سے برداشت کر سکتی ہے بلکہ سم اور تھور زدہ زمین کو صاف کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے جیسا کہ یہ مٹی میں سے نمک لے کر اپنے بیرونی حدود میں سے نکالنے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین نمک اور دوسرے نقصان دہ معدنیات سے صاف ہو جاتی ہے اور زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پودے اور فصلیں اس مٹی میں اگائی جاسکیں اور اس طریقے سے خیر زمینوں کو استعمال کے قابل بنایا جاسکتا ہے۔

دریائی اور فاری تھیلا مچھلی میں وراثتی تنوع

پی ایچ ڈی۔ سکارلہ: تنویر احمد نگران: ڈاکٹر خالد عباس شعبہ: حیوانیات، جنگلی حیاتیات و ماہی پروری

وراثتی تغیرات جانداروں کو ماحول میں آنے والی تبدیلیوں اور بیماریوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ وراثتی تغیرات جانداروں میں ارتقاء کے عمل کے لئے بھی ضروری ہیں۔ اس مطالعہ میں دریائی اور فاری مچھلی میں وراثتی تغیرات کو دیکھا گیا اور ان کا آپس میں تقابل کیا گیا۔ اس مقصد کے لئے کل پندرہ تھیلا مچھلی کی آبادیوں (جن میں پانچ دریائی اور دس فاری آبادیاں شامل ہیں) کا انتخاب کیا گیا۔ ہر آبادی سے پچاس افراد کو لیا گیا۔ تھیلا مچھلی کی فاری آبادیاں لاہور، بہاول پور، چھٹاواں، مظفر گڑھ، میان چنوں، فیصل آباد، راولپنڈی، مرید کے، ستیانہ اور شاہ کوٹ کے مقام پر واقع مچھلی فارموں سے لی گئیں جبکہ قدرتی آبادیاں دریائے راوی پر موجود بلوکی ہیڈورکس، دریائے چناب پر موجود تربیوں ہیڈورکس، دریائے ستلج پر موجود سلیمان کی ہیڈورکس، دریائے جہلم پر موجود رسول پیراج اور دریائے سندھ پر موجود چشمہ پیراج کے مقامات سے پکڑی گئیں۔ جینیاتی (وراثتی) تغیرات معلوم کرنے کے لئے وراثتی مواد (ڈی این اے) پر موجود پندرہ مائیکروسیٹلائٹ جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ وراثتی مواد پر موجود موروثہ (جین) کی بدلی ہوئی شکلوں (الیلز) کی تعداد کو منتخب مائیکروسیٹلائٹ جگہوں پر لکھا گیا۔ تمام اکٹھی ہونے والی معلومات پر شماریاتی تجزیہ کرنے کے لئے مختلف وراثتی پروگراموں کا استعمال کیا گیا۔ شماریاتی تجزیے کے نتائج سے پتا چلا کہ دریائی تھیلا مچھلی کی آبادیوں میں وراثتی تغیرات کی مقدار فاری تھیلا مچھلی کی آبادیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس مطالعہ کے نتائج سے پتا چلا کہ فاری مچھلی کی وہ آبادیاں جو راولپنڈی اور بہاول پور سے لی گئیں ان میں باقی فاری آبادیوں کی نسبت وراثتی تغیر کی مقدار زیادہ ہے۔ جبکہ سب سے کم وراثتی تنوع تھیلا مچھلی کی آبادی جو مرید کے سے لی گئی میں دیکھا گیا۔ دریائی تھیلا مچھلی کی وہ آبادی جو دریائے سندھ کے مقام چشمہ پیراج سے لی گئی میں وراثتی تنوع زیادہ دیکھا گیا جبکہ دریائے راوی کے مقام بلوکی ہیڈورکس سے پکڑی گئی آبادی میں سب سے کم۔ فاری تھیلا مچھلی میں جنسی تنوع کی کمی مصنوعی نسل کشی سے حاصل ہونے والے بچوں کو جب پالا جاتا ہے تو یہ معیاری پیداوار نہیں دے پاتے چونکہ ان میں موروثی تنوع کم ہوتا ہے۔ موروثی تنوع کم ہونے سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف مدافعت بھی کم ہوتی ہے۔ مچھلی کو پالنے اور نسل کشی کرنے کے لئے بنیادی موروثی علم سے آگاہی ضروری ہے۔ اس مطالعہ سے حاصل ہونے والی معلومات تھیلا مچھلی کو درپیش موروثی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں گے۔ جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔

اومگا تھری اور ٹائٹل کے استعمال سے کارپ مچھلیوں (تھیلا، رہو، موری) کی غذائیت کے معیار میں اضافہ

پی ایچ ڈی۔ سکارلہ: طارق محمود نگران: ڈاکٹر عبدالستین شعبہ: حیوانیات، جنگلی حیات و ماہی پروری

مچھلی کے گوشت کی اعلیٰ کوالٹی اس کو ملنے والے غذائی اجزاء پر منحصر ہوتی ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دریا میں پائی جانے والی مچھلی کی غذائیت کا معیار، ذائقہ، رنگت اور ظاہری بناوٹ تالاب میں پالی جانے والی کارپ مچھلیوں کے مقابلے میں بہتر تصور کی جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ دوسرا حل میں کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں دریائی اور فارم میں پالی جانے والی مچھلیوں کا موازنہ / تقابل کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لئے کل پچاس تھیلا، پچاس موری پچاس رہو مچھلیاں دریائے چناب پر موجود تربیوں ہیڈورکس ضلع جھنگ اور گورنمنٹ کٹش فارم زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے پکڑی گئیں۔ تمام پکڑی گئی مچھلیوں کا کیمیکل، بائیو

کیمیکیل، مائیکرو بائیولوجیکل اور آرگینو لپٹک تجزیہ کیا گیا۔ تمام اکٹھی ہونے والی معلومات پر شماراتی تجزیہ کرنے کے لئے مختلف شماراتی پروگراموں کا استعمال کیا گیا۔ ہر شماراتی تجزیہ کے نتائج سے پتا چلا کہ دریائی مچھلیاں تالاب میں پالی جانے والی مچھلیوں کے مقابلے میں زیادہ غذائیت، بہتر ذائقہ اور اچھی خرابی بناوٹ کی حامل ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ دریائی مچھلی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے مراحل میں کارپ مچھلیوں (رہو۔ موری۔ تھیلا) کو تالاب میں پالا گیا۔ اور ان کو اضافی خوراک کے طور پر اومیگا تھری اور ڈیٹا 25 فیصد پروٹین والی خوراک کے ساتھ ملا کر بحساب 5 فیصد باڈی کے وزن کے حساب سے دیئے گئے۔ اومیگا تھری اور ڈیٹا 25 فیصد پروٹین والی خوراک مچھلی کو آٹھ ماہ کے لئے دی گئی۔ آٹھ ماہ کے بعد تالاب میں پالی جانے والی مچھلیوں کا کیمیکیل۔ بائیو کیمیکیل۔ مائیکرو بائیولوجیکل اور آرگینو لپٹک تجزیہ کیا گیا۔ پتا چلا کہ اومیگا تھری اور ڈیٹا 25 فیصد پروٹین والی خوراک مچھلی کی پیداوار میں اضافہ، اچھی صحت والی مچھلی اور زیادہ غذائیت والی مچھلی پیدا کرنے کا سبب بنی۔

آبی تناؤ کے تحت ازکرو اور سوان گھاس کی مختلف آب دیات میں ہونیوالی موافقتی تبدیلیوں کا مطالعہ

پی ایچ ڈی۔ رکالر: فائزہ مصطفیٰ نگران: ڈاکٹر فاروق احمد شعبہ: نباتیات

یہ تحقیق کم پانی والے علاقوں میں گھاس دو مخصوص اقسام ازکرو اور سوان گھاس کی افزائش اور پانی کی کمی کے تحت ہونیوالی فعلیاتی تبدیلیوں کے متعلق ہے اس تحقیق کے لئے پنجاب سے خشک اور گرم مرطوب علاقوں میں چولستان، قنصل لکھار اور چنیوٹ کا علاقہ شامل ہے یہ علاقہ جات اپنے مخصوص جغرافیائی اور ماحولیاتی تنوع کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ازکرو اور سوان گھاس ان علاقوں میں پانی جانیوالی مشہور اقسام ہیں۔ یہ دونوں اقسام مختلف مثلاً ماحولیاتی دباؤ درجہ حرارت میں اضافے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ازکرو اور سوان گھاس ان علاقوں میں بطور چارہ اور کھاد استعمال کی جاتی ہیں اور غذائی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ زیر مطالعہ تحقیق میں ان تمام علاقہ جات سے ازکرو اور سوان گھاس کی مختلف آب دیات کو لیا گیا اور ان کو زری یونیورسٹی کی اولڈ بٹینیئل گارڈن کے گرین ہاؤس میں افزائش کی گئی۔ پھر ان کے چار سیٹ بنائے گئے ان کو پلاسٹک کے لفافوں میں آگایا گیا۔ ایک سیٹ کو معمول کے مطابق پانی دیا گیا۔ دوسرے سیٹ کو معمول سے 20 فیصد کم پانی دیا گیا اور تیسرے سیٹ کو 80 فیصد کم پانی دیا گیا۔ چوتھے سیٹ کے پودوں کو چار ہفتوں بعد نکال کر ان کی جسمانی نشوونما مثلاً جڑ اور تنے کی لمبائی تازہ حالت میں وزن پتوں اور پھولوں کی تعداد کی پڑتال کی گئی ان خصوصیات میں ماحولیاتی تنوع کی بنیاد پر ان آب دیات کی کم آب پوشیدگی کے لئے ازکرو اور سوان گھاس کی موافقت کا جائزہ لیا گیا۔ جانچ کے اگلے مرحلے میں ان آب دیات کے پودوں سے جڑتے اور پتوں کے نمونے لئے گئے ان نمونوں میں سے دوسہ میٹر کی لمبائی کے ٹکڑے کاٹ کر ان کو مخصوص طریقے سے الکوحل میں محفوظ کیا گیا تاکہ ان میں ہونیوالی اندرونی جسمانی تبدیلیوں کی جانچ کی جاسکے اس کے علاوہ کیمیائی اور فعلیاتی تبدیلیوں کی جانچ کے لئے بھی نمونے لئے گئے ازکرو اور سوان گھاس دونوں نے کم آب پاشی کے تحت ہونیوالی تبدیلیوں میں اچھی موافقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان تبدیلیوں میں ظاہری منفی، اندرونی جسمانی اور فعلیاتی تبدیلیاں شامل ہیں گھاس کی دونوں اقسام میں پانی کی کمی کی موافقت کے تحت ہونیوالی تبدیلیوں میں پتوں کا گر جانا اور ان کی تعداد میں کمی اور پودے کی لمبائی میں مرحلہ وار کمی دیکھی گئی۔ البتہ جڑ کی لمبائی میں اضافہ 60 فیصد آب پاشی تک پایا گیا۔ لیکن 40 فیصد آب پاشی پر کچھ آب دیات میں کمی بھی دیکھی گئی فعلیاتی تبدیلیوں میں کلوروفل کی مقدار میں کمی نکمیاں مثلاً پوٹاشیم، سوڈیم اور کیلشیم کی مقدار میں مرحلہ وار کمی پیش کار جان دیکھا گیا۔ اندرونی ساختی تبدیلیوں کی مطالعہ کیا گیا۔ جس میں جڑتے اور تنے کی اندرونی ساخت کی جانچ کی گئی اہم اندرونی ساختی تبدیلیوں میں مینازا، ٹیلم اور فلوئیم کی تعداد میں کمی اور ان کے سائز میں اضافہ پایا گیا۔ پتے اور تنے میں اپنی ڈرل اور سکیرین فائبر کی جسامت میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ یہ ساختی اور فعلیاتی تبدیلیاں ازکرو اور سوان گھاس کم آب پاشی کے لئے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ گھاس کی دونوں اقسام ازکرو اور سوان گھاس کم آب پاشی کے لئے ان کی موافقت کا تقابل کیا گیا جس میں سوان گھاس کم آب پاشی کے لئے زیادہ موافقت ثابت ہوئی اس تحقیق میں دونوں اقسام کو اچھی موافقت کا مظاہر کرنے کی بنیاد پر آبی تناؤ اور اس کے تحت ہونیوالی وراثتی تبدیلیوں کے مطالعہ میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور ان موسمی حالات والے علاقوں میں نئی اقسام کے طور پر بھی متعارف کروایا جاسکتا ہے۔ تاکہ ان علاقوں میں آبائی تناؤ کی تحت ہونیوالی نباتات کی کمی کو پورا کیا جاسکے۔ جو اچھے ماحولیاتی اثرات مرتب کرنے اور معاشی لحاظ سے بھی سودمند ثابت ہوگا۔

بلیو بینڈ مارجرین کا استعمال مضر صحت

پی ایچ ڈی۔ رکالر: عائشہ محمود نگران: ڈاکٹر محمد نعیم فیصل شعبہ: فزیالوجی اینڈ فارماکالوجی

موجودہ تحقیق میں روزمرہ خوراک میں چکنائی کے زیادہ استعمال خاص طور پر مارجرین کو استعمال کرنے سے صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ بلیو بینڈ مارجرین کے نام سے ملنے والی پروڈکٹ عموماً مکھن کے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے لیکن درحقیقت مارجرین نہ تو مکھن ہے اور نہ ہی مکھن کا متبادل کیونکہ مارجرین vegetable fat سے بنائی جاتی ہے جس میں ٹرانس فیٹس (Trans fats) بکثرت پائے جاتے ہیں جو جسمانی نشوونما پر کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں کرتے بلکہ صحت کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ موجودہ تجزیے میں مارجرین کے استعمال سے مرتب ہونے والے اثرات کو پرکھنے کے لئے چوہوں کو خوراک میں 15 فیصد اور 30 فیصد اضافی مارجرین مسلسل 42 دن تک دی گئی اس تجربے میں ایک گروپ (کنٹرول) کو خوراک بغیر کسی اضافی غذائی جزو کے دی گئی تاکہ باقی گروپس کا کنٹرول گروپ کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔ یہ تحقیق اس لحاظ سے منفرد ہے کیونکہ اس سے پہلے خوراک میں مارجرین کی اضافی مقدار کے استعمال کو کبھی پرکھا نہیں گیا۔ نتائج نے ثابت کیا کہ خوراک میں مارجرین کی اضافی مقدار شامل کرنے سے چوہوں کے وزن میں نمایاں اضافہ ہوا۔ خون میں گلوکوز اور انسولین کی مقدار میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مزید برآں خون میں چکنائی کی مختلف اقسام (کولیٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈز) کے تناسب میں بھی نمایاں زیادتی واقع ہوئی۔ نظام انہضام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے اور یہ مشاہدہ دیکھنے میں آیا کہ مارجرین کے مسلسل استعمال سے مینابولک اور تکسیدی دباؤ (metabolic & oxidative stress) میں نمایاں اضافہ ہوا جو آنتوں کی سوزش کا باعث بنا۔ چنانچہ اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ خوراک میں مارجرین کا مسلسل استعمال مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وزن میں اضافے اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں مینابولک اور تکسیدی دباؤ (metabolic & oxidative stress) میں اضافے اور آنتوں میں سوزش کی وجہ سے مختلف

میٹابولک بیماریوں کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے صحت اور جسمانی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ لہذا صحت مند اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے روزمرہ خوراک میں پکنتائی کے زیادہ استعمال خاص طور پر مارجین کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

خوراک میں پروٹین کا استعمال ذیابیطس سے بچاؤ کے لئے مفید

پی ایچ ڈی اسکالر: حمیرا مظفر نگران: ڈاکٹر محمد نعیم فیصل شعبہ: فزیالوجی اینڈ فارما کالوجی

موجودہ تحقیق میں خوراک میں پروٹین کی اضافی مقدار شامل کرنے سے ذیابیطس پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس مقصد کے لئے تجرباتی طور پر چوبیسوں میں ذیابیطس کروانے کے لئے الاسکن (Alloxan) کا انجکشن استعمال کیا گیا۔ ذیابیطس میں مبتلا چوبیسوں کو خوراک میں 55-45 فیصد اضافی پروٹین مسلسل 28 دن تک دی گئی۔ نتائج نے ثابت کیا کہ خوراک میں پروٹین کی اضافی مقدار شامل کرنے سے ذیابیطس میں مبتلا چوبیسوں کے وزن میں کمی پر قابو پانے میں مدد ملی۔ خون میں گلوکوز کی بڑھی ہوئی مقدار میں بھی واضح کمی دیکھی گئی جبکہ خون میں انسولین کی مقدار میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مزید برآں خون میں پکنتائی کی مختلف اقسام (کولیٹریول اور ٹرائی گلیسرائیڈز) کے تناسب میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی۔ موجودہ تجربے میں خوراک میں پروٹین کے اضافے سے گردوں اور جگر کی کارکردگی پر مرتب ہونے والے اثرات کو پرکھنے کے لئے خون میں موجود یوریا، یورک ایسڈ اور جگر سے پیدا ہونے والے انزائمز AST اور ALT کی مقدار کو بھی جانچا گیا اور یہ مشاہدہ دیکھنے میں آیا کہ خون میں موجود یوریا، یورک ایسڈ، ALT اور AST کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوئی چنانچہ نتائج سے ثابت ہوا کہ خوراک میں پروٹین کے استعمال سے ذیابیطس سے متاثرہ گردوں اور جگر کی کارکردگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذیابیطس پر کامیابی سے قابو پانے کے لئے علاج کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے ورزش اور مناسب غذا کا انتخاب نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ تحقیق میں خوراک میں پروٹین کی اضافی مقدار شامل کرنے سے ذیابیطس پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ روزمرہ کی خوراک میں پروٹین کا زیادہ استعمال خون میں گلوکوز کی مقدار کو مناسب سطح پر رکھنے میں مدد دیتا ہے اور ذیابیطس میں مبتلا افراد کے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

موٹ ایمپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ای ایم ایس تغیر پذیر (Mutant) چاول کی جینیاتی خصوصیات پر مطالعہ

پی ایچ ڈی اسکالر: کرن حمید نگران: فیصل سعید اعوان شعبہ: سنٹر آف ایگریکلچرل بائیوٹیکنالوجی (کیب)

موجودہ مطالعہ بیماریوں کے مختلف حراستی (Concentration) کے متنبک اثرات (Genomic effects) کی تحقیقات کے لئے منعقد کیا گیا تھا جس میں سپر بستی KSK-133 اور KSK-133 کے علاوہ علامات موجود تھیں اور سپر بستی کے بیج 0.25 فیصد کے فرق کے ساتھ بیماریوں کے 0-2 فیصد سے مختلف خوراک کے ساتھ مہلک خوراک 50 کا تعین کرنے کے لئے تبدیل تھے۔ متغیر ٹیکنالوجی (Mutant technology) کا اصول پہلی نسل کے بیج کی بوائی سے پورا کیا گیا تھا اور دوسری نسل کو پہلی نسل Species کی خود مختاری کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ چاول کے متغیر جینٹائپ کے درمیان جینیاتی تنوع تک رسائی کے لئے 25 ہائی پولیمرائس ایس آر مارکر منتخب کیا گیا تھا۔ پی آئی سی کی قیمت 0.039 (5MR) سے 0.87 (44RM) سپر بستی کے جینٹائپز میں 0.439 مرکزی قیمت کے ساتھ تھی۔ سپر بستی کی جینٹائپز میں ایس آر کے اعداد و شمار کی بنیاد پر سب سے زیادہ پی آئی سی کی قیمت 44RM (0.86) اس کے بعد 154RM (0.86)، 1RM (0.78)، 252RM (0.70)، 334RM (0.63)، 487RM (0.62) اور 110RM (0.58) 257RM (0.58) میں تھی KSK-133 کے معاملے میں، زیادہ پی آئی سی کی حد 0.07-0.8 بالترتیب 103RM کے ساتھ ساتھ 252RM میں تھی۔ مرکزی پی آئی سی کی قیمت KSK-133 کے متعدد اور جنگلی میں 0.384 تھی۔ ایس آر مارکرز (1RM، 334RM، 252RM) بالترتیب 152RM، 487RM اور 110RM) پی آئی سی کی قیمت کے ساتھ بالترتیب KSK-133 کے متعدد اور جنگلی کے درمیان جینیاتی تنوع کا اندازہ کرنے میں مؤثر ثابت ہوا۔ کچھ متنوع دیگر جینٹائپز کے مقابلے میں ایک یا ایک سے زائد مائکروسافٹ سیٹ میں غیر متنوع بیڈز کی موجودگی یا عدم موجودگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تمام مارکرز اکثر بارہ کروموزوم چاول پر تقسیم کئے گئے تھے۔ فینٹپوس میٹینٹس نے ان کی جینٹائپک تبدیلی کو مارکر کے سلسلے کے مخصوص بنیاد جوڑوں میں ظاہر کیا جو چاول کے ان کروموزوم سے پیدا ہوئے تھے۔ نیوی کی فاصلے پر مبنی Phylogenetic تجزیہ کا پتہ چلتا ہے کہ ایک جوڑی وار مساوات کی حد 96-40 فیصد اور 100-40 فیصد بالترتیب سپر بستی اور KSK-133 کے جینٹائپز میں تھی۔ موجودہ مطالعہ میں، موٹ ایمپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جینیاتی فعال تجزیہ کے لئے چاول بیماریوں کے متغیر لائنوں کو تیار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وابستہ SNPs کی متغیر لائنوں میں جنگلی اور متعدد کی جغرافیائی ترتیب اس کے بعد چار تغیر پذیر کے قطع نظر متعلقہ حوالہ ترتیب کے ساتھ شناخت کی گئی تھی۔ تمام متغیر (mutants) کے اعداد و شمار کا اندازہ بیان کیا گیا ہے کہ SNP انڈیکس کا تناسب ڈالنے والی لنک SNP خاص فیمنٹائپ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وابستہ SNPs کا استعمال کیا گیا تھا کہ یہ SNPs پی سی آر اسکریننگ کے ذریعہ قدرتی یا حوصلہ افزائی کی اصلاح کے مطابق ہیں۔ مستقبل میں پی سی آر کی اسکریننگ کا استعمال کیا جاسکتا ہے کہ کیا ان کی وجہ سے SNPs متعدد فیمنٹائپ سے منسلک ہیں یا نہیں۔ موجودہ معلومات جینیاتی نسل کے پروگرام میں چاول متغیر جینٹائپز کی ترقی کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ مقدار اور متحرک اعداد و شمار دونوں کے موجودہ نتائج کے مطابق سپر بستی اور KSK-133 کے متغیر لائنوں میں کیمیائی اور مفاہمت کی متنوع تنوع کیمیائی عمل کا آغاز کیا جاسکتا ہے۔

شمسی توانائی اور نیو شعلی عمل انگیزی کے ذریعے آبی آلودگی کا خاتمہ

پی ایچ ڈی اسکالر: عمرین رفیق نگران: ڈاکٹر اعجاز احمد بھٹی شعبہ: کیمسٹری

اس ریسرچ میں ایسے جزوی موصل (Semi-conductor) دھاتی آکسائیڈ تیار کئے گئے ہیں جو شعلی عمل انگیزی کے طور پر تعاملات کے اہل ہیں ان مرکبات کو بہت چھوٹے سائز نیونوسکیل میں

مختلف ساختی خصوصیات کے عمل انگیز کے طور پر تعاملات کے اہل ہیں۔ ان مرکبات کو بہت ہی چھوٹے سائز نیوسکیل میں مختلف ساختی خصوصیات کے عمل انگیز کے طور پر تعاملات کے اہل ہیں ان مرکبات کو بہت ہی چھوٹے سائز نیوسکیل میں مختلف ساختی خصوصیات کے ساتھ تیار کیا گیا نیوسائز کی وجہ سے یہ بہت پاؤڈر کی شکل میں وسیع سطحی رقبے کے حامل پائے گئے نتیجتاً ان کی سطح پر بے شمار تعامل گاہیں Active sites پائی گئیں جو کہ انکی بطور عمل انگیز کارکردگی کی ضامن ہیں یہ دھاتی آکسائیڈز کی توانائی کے انجذاب پر باکمال طریقے سے RB5 ڈائی کے مالکیول کی تکسیدی تقریب کے اہل پائے گئے ہیں ان مرکبات کے کرٹل میں تبدیلیوں کے ذریعے ان کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے ان کی تعاملات میں شمشئی توانائی کا استعمال کیا گیا جو کہ ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے پاؤڈر کے علاوہ یہ شعاعی عمل انگیز موصل اور غیر موصل فیبرکس مثلاً پولی ایسٹر اور کاربن فیبرک پر گرافٹ کئے گئے۔ یہ سارٹ فیبرکس پاؤڈر کی نسبت کہیں زیادہ سرعت سے متعال پائے گئے۔ تحقیق کے دوران ٹیکسٹائل انڈسٹری کے رنگدار آلودہ پانی کو سارٹ فیبرکس کے اوپر سے شمشئی توانائی کی موجودگی میں گزرا کر ایک اور پاؤڈر سے دو گھنٹے میں اس آلودہ پانی کو بے رنگ اور آلودگی سے پاک کیا گیا ہے۔ ان سارٹ فیبرکس کی تخریبی تکسیدی عوامل کو انجام دینے کی صلاحیت متعدد مرتبہ استعمال کے بعد بھی تقریباً یکساں پائی گئی۔ سوان سارٹ فیبرکس کو 20-25 سائیکل تک اعلیٰ کارکردگی کا مظہر پایا گیا ہے۔ لیبارٹری تجربات کی کامیابی کے بعد منتخب شدہ سارٹ فیبرک (پولی ایسٹر اور دھاتی آکسائیڈ) کو پائلٹ سکیل پر 4x6 کے تغیر شدہ شمشئی ری ایکٹور پر پھیلا کر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آبی فضلات کو رنگ اور دیگر آلودہ کاندہ کان سے پاک کیا گیا ہے۔ صاف شدہ پانی کو آبپاشی اور انڈسٹری میں دوبارہ استعمال کے قابل بنایا گیا ہے شمشئی توانائی کی مسلسل فری فراہمی اور تکسیدی تعاملات پر مبنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو آبی آلودگی سے نجات کے لئے بے حد سودمند قرار دیا گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سارٹ فیبرکس کمرشلائزیشن کے بعد ہماری صنعتوں کو آبی فضلے سے نجات حاصل کرنے کے لئے ارزاں نرخوں پر فراہم ہوں گے۔

سلور این ہیفرو سائیکلک کاربن اور نکل کے پیچیدہ مرکبات کی کیمیائی اور حیاتیاتی مطالعہ کے لئے تیاری

پی ایچ ڈی۔ کالر: اقصیٰ حبیب نگران: ڈاکٹر حفصہ نواز بھٹی شعبہ: کیمسٹری

سلور کے مرکبات کا استعمال بطور اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی کینسر ایجنٹ زمانہ حال میں محققین کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں جبکہ نکل کے سائیکلک مرکبات کی تیاری اور ان کے کیمیائی خواص کا مطالعہ بھی جاری ہے۔ اس تحقیقی کام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ اول میں سلور کے مرکبات جو کہ پیچیدہ ساخت رکھتے ہیں (الف تاج) اور ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انکی تیاری طبعی، کیمیائی، الیکٹروکیمیکل اور حیاتیاتی خواص کا مطالعہ کیا گیا۔ تمام پیچیدہ مرکبات سفوف کی شکل میں حاصل ہوئے جسکے خواص کے مطالعے کیلئے جی سی ایم ایس، ایف ٹی آئی آر۔ ای ایس آئی ایم ایس۔ این ایم آر اور سٹنگل کرٹل ایکس آر ڈی ٹیکنیکس استعمال کی گئیں۔ ایروہم اور سلور کے نمکیات کے حیاتیاتی مطالعے کیلئے دو بیکٹیریل سٹریٹس اور کینسر کی دوسل لائن کا انتخاب کیا گیا مشاہدے کے مطابق تمام مرکبات میں بیکٹیریا اور کینسر سٹریٹس کو ختم کرنے کی قابل ذکر صلاحیت موجود تھی لیکن مخصوص مرکبات میں یہ صلاحیت سٹینڈرڈ رگزر سے بھی زیادہ تھی۔ کیونکہ انکی ٹریٹل چین کی لمبائی باقی مرکبات سے نسبتاً زیادہ تھی جسکی وجہ سے انکی لپوفیلی سٹی زیادہ ہو گئی اور یہ مرکبات ممبرین سے آسانی سے گزر گئے۔ حصہ دوم میں یونیورسٹی دی مائٹریال کینڈا میں بنائے گئے ان مرکبات کا مطالعہ کیا گیا جو کہ نکل پر مشتمل تھے۔ یہ تمام کام نانروجن اینوائرنمنٹ میں سرانجام دیا گیا۔ ان مرکبات کی فضائی اور آبی حساسیت کی وجہ سے انکی کامیابی تیاری کے بعد انکی کیمیائی خواص کا مطالعہ کیلئے مختلف سلوٹس میں انکے ری ایکشن مختلف کیمیکل کے ساتھ کروائے گئے۔ مشاہدے کے مطابق این۔ ایم آر کے ابتدائی سٹل میں تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ گارٹ پراڈکٹ بن گیا ہے لیکن اسکی حساسیت کیوجہ سے اس کی شناخت مشکل تھی اس لئے اس پراڈکٹ کی تیاری کے لئے ایک اور طریقہ استعمال کیا گیا جس میں مخصوص لگند کی تیاری کے بعد انکے نکل کے ساتھ ری ایکشن کروائے گئے جسکے نتیجے میں ٹارگٹ پراڈکٹ کی تیاری ممکن ہو گئی لیکن ان کی حساسیت کی وجہ سے مزید مطالعے کیلئے الگ کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ مجموعی طور پر یہ تحقیق ڈرگ ڈیزائننگ اور کیمیکل ٹرانسفریشن کیلئے بہت مفید ثابت ہوئی۔

حیاتیاتی سرگرمی کی رہنمائی سے علیحدگی کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے تھوجا (سرو) اور ساہیچس (مور بکھ) میں سے حیاتیاتی سرگرم مرکبات کی تیز اور موثر پہچان

پی ایچ ڈی۔ کالر: رافعہ رحمن نگران: ڈاکٹر محمد آصف حنیف شعبہ: کیمسٹری

تھوجا اور ساہیچس دو اہم نسل در نسل ادویات کے طور پر استعمال ہونے والے پودے ہیں جو کہ کپہر سببیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پودوں کے نباتاتی نام ”تھوجا اور نٹیلس“ اور ”کپہر سبیس سمپر وازنز“ ہیں۔ اس تحقیق میں یہ پودے پنجاب کے مختلف زرعی، موسمیاتی علاقوں سے اکٹھے کئے گئے۔ ان علاقوں (زوز) میں چاول، گندم والا پنجاب کا علاقہ، ملی جلی فصلوں والا پنجاب کا علاقہ اور بارانی پنجاب کا علاقہ شامل تھے۔ ان تمام علاقوں سے اکٹھے کئے گئے تھوجا اور ساہیچس کے پتوں سے آبی عرق کشیدگی اور بھاپی عرق کشیدگی کے ذریعے خوشبودار تیل کشید کیا گیا۔ ہماری ریسرچ سے یہ واضح ہوا ہے کہ ان پودوں کے خوشبودار تیلوں کی پیداوار کشیدگی کے طریقوں کے ساتھ ساتھ علاقائی تبدیلیوں سے بھی نمایاں طور پر متاثر ہوتی ہے۔ ان حاصل ہونے والے تیلوں کے معیار کو جانچنے کے لئے ٹی۔ ایل۔ سی طریقہ استعمال کیا گیا۔ اس جانچ سے پتہ چلا کہ یہ تیل مختلف پولیریٹی رکھنے والے گروہوں پر مشتمل تھے۔ ان تمام خوشبودار تیلوں کا کیمیائی تجزیہ جی سی۔ ایم ایس ٹکنیک کے ذریعے کیا گیا۔ جس نے مختلف تیلوں میں مختلف قسم کے اہم مرکبات اور کیمیائی اجزاء کی موجودگی کے بارے میں بتایا جو کہ علاقائی تبدیلیوں اور عرق کشیدگی کے طریقے پر منحصر تھا۔ ان خوشبودار تیلوں کو ویکویم اجزائی کشیدگی اور ہائی سپیڈ کاؤنٹر کرٹ کرومینگرافٹی (ایچ۔ پی۔ سی۔ سی۔ سی) کی ٹکنیکوں کے ذریعے مختلف حصوں اور اجزاء میں تقسیم کیا گیا۔ تحقیق کے اگلے مرحلے میں تمام خوشبودار تیلوں اور ان سے حاصل کردہ حصوں اور اجزاء کی مکندہ حیاتیاتی سرگرمیاں مختلف طریقوں سے جانچی گئیں، جن میں اینٹی آکسیڈنٹ جانچ، اینٹی بیکٹیریل جانچ اور اینٹی بائیوفلم جانچ کے طریقے شامل تھے۔ اس تحقیق میں اینٹی آکسیڈنٹ جانچ کے لئے مائیکرو سکیل طریقہ جب کہ اینٹی بیکٹیریل جانچ کے لئے ویل ڈیفیوژن طریقہ استعمال کیا گیا۔ ان حیاتیاتی جانچوں کے نتائج نے یہ واضح کیا کہ تمام خوشبودار تیل اور ان سے الگ کئے گئے حصے اور اجزاء اہم اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی بائیوفلم سرگرمیاں رکھتے تھے۔ ان تھوجا اور ساہیچس کے خوشبودار تیلوں میں سے الگ کئے گئے حصے اور مرکبات میں سے سب سے زیادہ حیاتیاتی سرگرمیاں رکھنے والے حصے اور اجزاء کو چنا گیا اور

ان کو جی سی ایم ایس کے ذریعے جانچا گیا۔ اس جانچ کے نتائج نے بتایا کہ یہ حصے اور اجزاء جن کی کیمیائی مرکبات پر مشتمل تھے۔ ان میں ایلفا پائینین، ایلفا سٹرول، ڈیٹا کیرین، میٹا پائینین، ایلفا۔ ٹریپینائل ایسیٹٹ، ایلفا۔ ہیومولین، سرلیومین آکسائیڈ اور آکسائیڈز اور ماڈیفائیڈ رین ایپڈ کسائیڈز شامل تھے۔ یہ تحقیق نباتاتی قدرتی اجزاء پر کام کرنے والی صنعتوں کے لئے اہم رہنمائی ہے۔

کپاس کے بنے کپڑے پر روایاتی تعامل چھپائی کے طریقہ کار میں تبدیلی

پی ایچ ڈی سکالر: حماد مجید نگران: ڈاکٹر حق نواز بھٹی شعبہ: کیمسٹری

کپاس دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پودا ہے اس کے بنے ہوئے کپڑے کو رنگائی یا چھپائی کے بعد قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اس سے مرد و عورت کے پہننے کے لئے بہت سی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ چھپائی کے لئے تعامل رنگ استعمال کیا جاتا ہے یہ رنگ عموماً دو اقسام کا ہوتا ہے ایک قسم اکلوتا کلورین ایٹم ٹرائی ازیں والے مالکیول پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسری قسم وٹائل سلفون والے مالکیول پر مشتمل ہوتا ہے اس تحقیق میں دو سے چار فیصد، پانچ عدد اکلوتا کلورین ایٹم والے تعامل رنگ اور ایک عدد وٹائل سلفون والے تعامل رنگ کا استعمال کیا گیا ہے رنگ کے علاوہ اس طریقہ کار میں سوڈیم الٹی نیٹ، میٹھا سوڈا اور یوریا کا استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم الٹی نیٹ چھپائی کی لمبی کواٹھا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تاکہ رنگ با آسانی کپڑے کے اوپر لگ جائے، چھپائی کا نمونہ اچھا بنے، نمونے کے کنارے واضح ہوں اور رنگ نمونہ سے باہر نہ نکلے تاکہ لمبی کواٹھا کر کے اور کپڑے پر رنگ کی منتقلی کے بعد دھلائی میں با آسانی نکل جاتا ہے۔ اسکی قیمت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس تحقیقی عمل میں اسکوا ملی سے نکلنے والے نشاستہ سے تبدیل کیا گیا ہے۔ تاہم ملی کے نشاستہ میں ابتدائی ہائیڈروکسل آئین موجود ہوتا ہے اس آئن کو کاربوکسی میتھائل کے عمل سے متبادل ایسی ٹائل گروپ لگایا گیا۔ اسکا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سوڈیم الٹی نیٹ کی جگہ قابل استعمال ہو گیا۔ البتہ یہ بہت سستا نشاستہ ہے اور چھ فیصد ملی کے وزن کے حساب سے استعمال ہوا جبکہ سوڈیم الٹی نیٹ دو فیصد استعمال ہوتا ہے۔ اسکے باوجود کافی سستا پڑتا ہے۔ رنگ اور لباس کے ساتھ کیمیائی تعامل بھی نہیں کرتا اور دھلائی کے عمل کے دوران کپڑے سے با آسانی نکل بھی گیا۔ میٹھا سوڈا تعامل کے رنگ کو لباس کے ساتھ جوڑنے کیلئے انتہائی اہم ہے لیکن اسکی وجہ سے بہت سارے ہائیڈرولائز ہو کے ضائع ہو جاتا ہے جو پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ اس لئے اس کی جگہ تین کلورین والا سر کے کا تیزاب استعمال کیا گیا ہے۔ جو چھپائی کے دوران اساس نہیں بنتا۔ یوریا رنگ کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو کپڑے کو چھپائی کے دوران اور رنگ کو خراب ہونے سے بچاتا ہے البتہ یوریا آبی حیات کے لئے نقصان دہ ہے اس میں موجود نائٹروجن پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ پانی میں کافی کی پیداوار میں مدد کرتا ہے اس لئے اس کو نائٹروجن سے پاک پولی استھائی لین 400 سے تبدیل کیا گیا یہ کیمیکل دو فیصد استعمال ہوا اور یوریا پندرہ فیصد استعمال ہوا۔ یہ سارے عمل میں کپڑے کی چھپائی اور اس سے نکلنے والا خراب پانی ماحول نقصان سے بھی بچاتا ہے اور کپڑا بھی جسم کے لئے نقصان دہ نہیں رہتا۔ چھپائی کے بعد کپڑے کی مختلف خصوصیات کو جانچا گیا اسکے رنگ کی گہرائی اور فرق کو پرکھا گیا دھلائی، رگڑ، روشنی، پسینہ (تیزابی اور اساسی) کی وجہ سے رنگ کی خرابی کو پرکھا گیا رنگ کے دوران چھپائی رنگ کی کناروں کی واضح لائن کو پرکھا گیا دھلائی کے بعد کپڑے کی نرمی کو پرکھا گیا رنگ کی کپڑے کے اندر تک رسائی کو جانچا گیا اور دوران چھپائی کپڑے کی سفید زمین پر رنگ کے اثر کو بھی دیکھا گیا۔ اس سارے تجربے کے بعد نتیجہ اخذ کیا گیا کہ معیار اور قیمت کے تناسب سے ملی کا نشاستہ (6 فیصد)، تین کلورین والا سر کے کا تیزاب (4 فیصد) اور پولی استھائی لین گلائی کول 400 (1 فیصد) بالترتیب روایاتی تعامل چھپائی میں استعمال ہونے والے سوڈیم الٹی نیٹ (2 فیصد)، میٹھا سوڈا (2.5 فیصد) اور یوریا (15 فیصد) کا بہترین نعم البدل ثابت ہوئے۔

رقیق دھاتوں کی بنیادی اور ثانوی ذرائع سے بازیابی

پی ایچ ڈی سکالر: رابعہ ستار نگران: ڈاکٹر سعدیہ الیاس شعبہ: کیمسٹری

رقیق دھاتوں کی دو مختلف ذرائع (الف) بنیادی لیٹرانٹ اور (ب) ثانوی استعمال شدہ لیٹھیم آئن بیٹریز سے بازیابی کے لئے تحقیقات کی گئی۔ لیٹرانٹ اورز سے رقیق دھاتوں کو نکالنے کے لئے ریڈکشن روشنگ کے بعد امونیکل لیچنگ کا طلاق کیا گیا مقامی کوئلے کو استعمال کرتے ہوئے نکل اور کوبالٹ کی میٹالائزیشن کے لئے استعمال ہونے والے پیرامیٹرز (Parameters) مثلاً درجہ حرارت اور دوران روشنگ استعمال ہونے والے ایڈیٹوز (Additives) تبدیل ہوتے رہتے ہیں نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر سوڈیم سلفٹ Na_2SO_4 کو بطور ایڈیٹوز استعمال کرتے ہوئے لیٹرانٹ فیڈ کو بڑی مقدار میں Ni-Fe میٹالائزیشن فیڈ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ریڈیوسٹیمپل (Reduced sample) کی دوماصل میں امونیا لیچنگ (ایک گھنٹہ ہوا کی غیر موجودگی میں دو گھنٹہ ہوا کی موجودگی میں) کے دوران $\text{CO}_3(\text{NH}_4)_2$ کے بعد دوران سلوشن سے نکل (94 فیصد) اور کوبالٹ (88 فیصد) کی خاطر خواہ مقدار حاصل کی جاسکتی ہے۔ دوسری طرف رقیق کو استعمال شدہ لیٹھیم آئن بیٹریوں کے کھیتوڈ میٹریل $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ سے نکالنے کے لئے ریڈیوسنگ ایجنٹ کی غیر موجودگی میں سلفیورک ایسڈ لیچنگ کا طلاق کیا گیا۔ دوران لیچنگ دھاتوں کی زیادہ مقدار حاصل کرنے استعمال ہونے والے پیرامیٹرز مثلاً سلفیورک ایسڈ کی کنسرٹریشن کو متعین کیا گیا جو کہ 2M H_2SO_4 ، 70°C ڈگری سینٹی گریڈ اور 150 منٹ ہے لیچ لیکور سے مزید $\text{Ni}(\text{CuH}_7\text{N}_2\text{O}_2)_2$ کی شکل میں نکل نکالنے کے لئے ڈائی میتھائل اور گرائم کی Stoichiometric مقدار 1:2 کی نسبت سے استعمال کی گئی۔ اس کے بعد Na-Cyanex272 کے ساتھ سلونٹ ایکسٹرکشن ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ایکو پلیمریم pH-5 پر آرگینگ سے ایکوس فیڈر 2:3 پر کوبالٹ کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کوبالٹ لوڈنگ آکرینگ فیڈر $2\text{Mn}_2\text{SO}_4$ کے ساتھ 8:1 O/A پر سٹرپنگ کی مدد سے CoSO_4 سلوشن حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی کرٹلازیشن سے $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ کے کرٹل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ آخر میں رقیق دھاتوں کی بنیادی اور ثانوی دونوں ذرائع سے حصولی کے لئے علیحدہ فلو شیٹ تجویز کی گئی ہیں۔

کلینکو-اوپڈیولوجیکل مشاہدات اور ملٹی ڈریگ مزاحم اسٹیفیلوکوکس اور سیڈوموناس ایروکیبوسا انفیکشن آئی ڈی این کے مریضوں کے لئے تریاق

پی ایچ ڈی۔ کالر: عابد رشید نگران: ڈاکٹر محمد ثاقب شعبہ: کلینیکل میڈیسن اینڈ سرجری

جلے ہوئے مریض سرجری میں داخل ہونے والے مریض کا دس فیصد ہیں اور یہ انسانی صحت کے لئے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ WHO کے مطابق پاکستان میں جلے ہوئے مریضوں کی شرح پوری دنیا میں جلے ہوئے مریضوں سے زیادہ ہے۔ جلے ہوئے مریضوں میں انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جلے ہوئے مریضوں کے زخموں کا معائنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں جس میں خاص طور پر سٹیف اوریس (*Staphylococcus aureus*) اور سوڈوموناس (*Pseudomonas*) کی مقدار سب سے زیادہ ہے۔ جلے ہوئے مریض میں احتیاطی تدابیر، اچھی دوائیوں کا استعمال اور بروقت تشخیص کے باوجود پوری دنیا میں خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں زخموں کا انفیکشن موت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زیر بحث تحقیق کا مقصد تھا کہ جلے ہوئے مریضوں کی مختلف علاقوں، موسموں اور عمر میں کیا شرح ہے۔ وقت کے ساتھ یہ جراثیم بطور خاص سٹیف اوریس اور سوڈوموناس کیسے ان ادویات سے بچ پارہے ہیں اور کونسی موجودہ ادویات ہیں جو خاص طور پر سٹیف اوریس (*Staphylococcus aureus*) اور سوڈوموناس (*Pseudomonas*) کے خلاف موثر ہیں۔ پہلے مرحلے میں برن یونٹ ٹرشری کینرالا اینڈ ہسپتال سے مریضوں کے اعداد و شمار جمع کئے گئے اور انکے زخموں میں پائے جانے والے جراثیم الگ کئے گئے اور ان پر ادویات کے اثرات دیکھے گئے دوسرے حصے میں ٹیکوپلینن (Teicoplanin) اور میروپنم (Meropenem) کا لیبارٹری میں خرگوشوں پر تجربہ کیا گیا۔ برن یونٹ ٹرشری کینرالا اینڈ ہسپتال سے 939 مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ان میں عمر، جنس، شدت، جسم کے حصوں کی تقسیم، جلنے کی وجوہات کے حوالے سے اور اس کے نتائج، بہتری اور اموات کی شرح کا مطالعہ کیا گیا۔ جس میں ٹیکوپلینن (Teicoplanin) اور میروپنم (Meropenem) کو تیسری ڈگری میں جلے ہوئے مریضوں پر چیک کیا گیا مزید یہ کہ دس جلے ہوئے خرگوشوں پر ان دونوں اینٹی بائیوٹک کا اثر دیکھا گیا دونوں اینٹی بائیوٹک کی مقدار 7.5mg/kg مریضوں اور خرگوشوں کو صبح شام دی گئی۔ اس علاج سے زخموں میں جراثیم کی مقدار، زخم ٹھیک ہونے کی شرح، زخم پر اثرات، اور زخم میں دوا کی باقی مقدار اور زخم ٹھیک ہونے کا وقت ریکارڈ کیا اور کائی سکوائر (Chi square) سے شمار کیا گیا۔ جلے ہوئے مریضوں میں عورتوں کی شرح مردوں سے زیادہ پائی گئی (14.5 فیصد) ہنسبت مردوں کے (12.3 فیصد)۔ عمر کے لحاظ سے 12-84 سال کے لوگ پائے گئے جن میں زیادہ تر 41 سال کے لوگ تھے۔ وجہ کے حوالے سے شعلے سے جلنے والے افراد زیادہ تھے جب کہ بجلی، کیمیکل اور تیزاب سے جلنے کی شرح کم تھی۔ سب سے زیادہ جلنے والے حصے بازو فیصد 32.4، جسم کے نچلے حصے 30 فیصد، گردن 24 فیصد، ایکسٹرمیٹیز 32 فیصد اور جسم کے نچلے حصے میں 13 فیصد شامل ہیں۔ عورتوں میں نچلے حصے کا جلنا زیادہ ہے بازو اور ٹانگوں پر دوسرے درجے کا جلنا زیادہ ہے، تیسرے درجے کا جلنا سر اور گردن پر دیکھا گیا۔ جسم کے مکمل جلے ہوئے حصے میں 70 فیصد میں سے 30-15 فیصد جلا ہوا دیکھا گیا 15 فیصد میں خودکشی کا عنصر دیکھا گیا جو مردوں میں زیادہ تھا۔ جلنے کی شرح سردیوں میں زیادہ تھی زخموں میں زیادہ سوڈوموناس (*Pseudomonas*)، کلبسیلا (*Klebsiella*) اور ای کولائی (*E. coli*) جیسے جراثیم دیکھے گئے۔ ہماری تحقیق میں خرگوش میں سوڈوموناس (*Pseudomonas*) اور سٹیف اوریس (*Staphylococcus aureus*) پر تجربہ کیا گیا جس میں ٹیکوپلینن (Teicoplanin) اور میروپنم (Meropenem) نے جلد زخم مندمل کئے ان کی نسبت جن میں ان ادویات کا استعمال نہ کیا گیا۔ اس معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ مریضوں کے بروقت معائنے اور اینٹی بائیوٹک کی فراہمی سے جان لیوا خطرات کو دور کیا جاسکتا ہے اور ملکی سطح پر اس کا بوجھ کم کیا جاسکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو بروقت علاج کی معلومات فراہم کی جائیں تاکہ مریض وقت ضائع کئے بنا علاج کروائیں جس سے مریض میں جلنے سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اور شرح اموات کو کنٹرول کیا جاسکے۔

جانوروں میں سوزش حیوانہ (Mastitis) کا خودزاد (Autogenous) حفاظتی ٹیکہ سے علاج

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد طاہر محی الدین نگران: ڈاکٹر غلام محمد شعبہ: کلینیکل میڈیسن اینڈ سرجری

دودھیل جانوروں میں مختلف مسائل میں سے سوزش حیوانہ (Mastitis) سب سے بڑا مسئلہ مانا جاتا ہے جو بہت زیادہ معاشی نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ علاج پر خرچہ، دودھ کی پیداواری صلاحیت میں کمی اور متاثرہ دودھ کو ضائع کرنا ان نقصانات کی چند مثالیں ہیں۔ سوزش حیوانہ کے وقوع پذیر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں *Streptococcus agalactiae* اور *Staphylococcus aureus* سوزش حیوانہ کی سب سے بڑی وجہ جانے جاتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کے خلاف ضد حیوی (Antibiotics) ادویات کا بے دریغ استعمال، بیکٹیریا میں قوت مدافعت پیدا کرنے کا موجب ہے۔ مزید برآں ایک سے زیادہ وجوہات ہونے کی وجہ سے کوئی ایک ضد حیوی دوائی ہر قسم کی سوزش حیوانہ کے خلاف موثر نہ ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوزش حیوانہ کا علاج خودزاد حفاظتی ٹیکہ جات (Autogenous vaccines) کے ذریعے کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ ریسرچ میں ایک ایسی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ متاثرہ گلو (Herd) یا جانور کے دودھ میں پائے جانے والے جراثیم (Bacteria) کو ہی استعمال میں لائے۔ جب درج بالا حفاظتی ٹیکہ جات کو اکیلے یا معمول کے سوزش حیوانہ کے علاج کے ساتھ ملا کر استعمال کیا گیا تو نہ صرف متاثرہ جانوروں میں سوزش حیوانہ میں کمی آئی بلکہ جانوروں میں پیداواری صلاحیت بھی بحال ہو گئی۔ درج بالا طریقہ علاج کو وسیع پیمانے پر استعمال لانے کے لئے کسان کی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے۔

پاکستان میں بیرونی ممالک کی طرف سے زرعی زمینوں کا حصول

پی ایچ ڈی۔ سکالر: سلمان عطاء نگران: ڈاکٹر بارشہ باز شعبہ: توسیع زراعت ودہی ترقی

یہ تحقیق اسی خلا کو پُر کرنے کے لئے ترتیب دی گئی تھی۔ یہ تحقیق پاکستان میں ایسے دو کبیر کا لوگوں کے پائیدار ذریعہ معاش ودہی ترقی پر اثر اور اس کی پولیٹیکل اکانومی کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ دو کبیر متحدہ عرب امارات کی طرف سے تلور کے شکار کے لئے جنوبی پنجاب کے رودھ کو بی کے کچھ علاقوں کا کنٹرول اور میر پور خاص، سندھ میں ”رود زگراس“ (Rhodes grass) کی کاشت کی غرض سے لی جانے والی زمین پر مشتمل ہیں۔ ان دو کبیر کا تجزیہ تین فریم ورکز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ پائیدار ذریعہ معاش کا فریم ورک (Sustainable livelihood framework)، سوشل ایکسکلوژن (Social Exclusion) اور پولیٹیکل اکانومی۔ اس مقصد کے لئے ذاتی مشاہدے اور سرکاری وغیرہ سرکاری دستاویزات کا جائزہ لینے کے علاوہ 420 مقامی لوگوں کے انٹرویوز، 33 فوکس گروپ ڈسکشن اور 32 ماہرہ انٹرویوز لئے گئے۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر (نہ کہ تمام) زمینوں کا انتقال یالیز کارپوریٹ ایگریکلچر آرڈینینس کے تحت دیا گیا جس میں مقامی آبادی سے نہ ہی کوئی مشاورت کی گئی اور نہ ہی ان بعد از انتقال الیز کی جانب والی کاروائیوں میں کوئی شمولیت دی گئی۔ عرب شامی افرا کو شکار کے لئے خصوصی پرمٹ کو پاکستانی حکومت خلیجی ممالک سے متعلق خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار دیتی ہے۔ شکار کے عرصہ میں تحصیل اور دیہہ کی سطح پر شامی خاندان کو مقامی سرداروں و جاگیرداروں، متعلقہ سرکاری اداروں کے اہلکاروں، پولیس، بارڈر ملٹری پولیس، چند مقامی پرائیویٹ شاف ممبرز اور رینجرز کا مکمل تعاون حاصل ہوتا ہے اور بدلے میں یہی گروپ معاشی طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ عربوں نے پچھلے 45 سال میں ایک بل (رحیم یار خان، رجھان)، چند رہائشی کالونیاں اور چند ہسپتال بنائے جن میں سے زیادہ تر کام متعلقہ دیہی آبادی سے دور کیا گیا۔ میر پور خاص میں ایسا کوئی انفراسٹرکچر تعمیر نہیں کیا گیا۔ دونوں کبیر کے مقامی آبادی پر منفی اثرات بالکل واضح تھے۔ خواتین چرواہے، بے زمین افراد اور زرعی مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ میر پور خاص میں وہ گھرانے جو پہلے ”بٹائی رواج“ کے تحت کام کرتے تھے، زمین سے نکالے جانے کے بعد دیہاتی و مزدور یا چھوٹے کاروباری بن گئے۔ لگ بھگ تمام مقامی آبادی غیر ملکیوں کو زمین دینے کے فیصلے کے خلاف تھی۔ جنوبی پنجاب میں اس ”قبضے“ کے خلاف وقفے وقفے سے احتجاج (اکا دکا پُرتشد) کئے گئے جن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا جس کی اہم وجوہات میں بالترتیب باقاعدہ حقوق اراضی کا نہ ہونا، عدالتی نظام سے ناواقفیت، ”طاقتور“ مخالفین کا خوف اور مطلوبہ ذرائع کا فقدان شامل ہیں۔

پاکستان میں زراعت کی معلومات کی رسائی کے لئے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی) کے استعمال میں بڑھتے ہوئے رجحانات اور مسائل

پی ایچ ڈی۔ سکالر: محمد حماد رضا نگران: ڈاکٹر غضنفر علی خاں شعبہ: توسیع زراعت ودہی ترقی

آئی سی ٹی سے مراد ایکٹرائٹ (کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ) کے وہ تمام ذرائع ہیں جن سے کسانوں کو زرعی معلومات فراہم کی جاسکتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر مصدقہ معلومات کی فراوانی ہے اور کم خرچ ہونے کی وجہ سے کسانوں میں مقبول بھی ہو رہی ہے تاہم تعلیم اور آئی سی ٹی کے بارے میں شعور کی کمی کی وجہ سے کسان اس ٹیکنالوجی کو اپنانے میں بہت پیچھے ہیں اس تناظر میں کسانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لئے ایک تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق کے مطابق زیادہ تر کسان اپنے ساتھی کسانوں سے اور موبائل فون سے زراعت کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے جبکہ زرعی ویب سائٹس زرعی ہیلپ لائن اور اخبارات بہت کم کسانوں کے لئے ذرائع معلومات تھے۔ دوران تحقیق یہ بات بھی سامنے آئی کہ تقریباً ہر کسان کے پاس اپنا ذاتی موبائل فون موجود تھا جبکہ باقی ذرائع جیسے زرعی ہیلپ لائن، زرعی ویب سائٹس اور کمپیوٹر کے متعلق آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان جدید ذرائع معلومات سے مستفید نہیں ہو رہے تھے بلکہ زرعی معلومات کے لئے موبائل فون پر انحصار کر رہے تھے علاوہ ازیں کسان چاہتے تھے کہ ان کو فصلوں کی پیداواری منصوبہ بندی، فصلوں کے کیڑوں اور بیماریوں سے حفاظت، فصلوں کی خرید و فروخت اور موسمی حالات کے بارے میں بروقت آگاہی ملے اور ایسا ہی صورت میں ممکن ہے کہ وہ باقاعدگی سے آئی سی ٹی کے آلات استعمال کریں۔ کسان موبائل کو اچھا ذریعہ معلومات گردانتے تھے کیونکہ یہ استعمال کرنے میں آسان اور بروقت زرعی معلومات پہنچانے میں بھی مدد گار تھا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر یہ کیا جاسکتا ہے کہ کسانوں کو ان جدید معلومات اور ان کے بہتر استعمال کے بارے میں آگاہی اور مہارت دی جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ جدید معلومات کے ذرائع جیسے کمپیوٹر، زرعی ویب سائٹس وغیرہ کو استعمال کریں تاکہ ان ذرائع معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔

صوبہ پنجاب میں شہری پھیلاؤ کے نتیجے میں کسانوں کے ذرائع آمدن میں تبدیلی

پی ایچ ڈی۔ سکالر: نوید فرح نگران: ڈاکٹر اظہار احمد خاں شعبہ: رورل سوشیالوجی

شہروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے زرعی زمینوں کے استعمال میں تبدیلی اور نتیجتاً کسانوں کے ذریعہ معاش میں آنے والی تبدیلیوں کے مطالعہ کے لئے صوبہ پنجاب کے دو متنوع شہروں کا انتخاب کیا گیا۔ ان میں سے ایک شہر فیصل آباد (جو کہ پہلے سے ہی پھیلاؤ کا شکار ہے) اور ایک ساہیوال (جو کہ شہر کاری کے ابتدائی مرحلے پر ہے) شامل ہیں۔ ان دونوں شہروں کی بیرونی حدود میں واقع 12 دیہاتوں میں کسانوں کے ذریعہ معاش میں تبدیلی کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک تحقیق کی گئی جس میں ریوٹ سسٹم اور سروے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ 2001-2016ء تک کے عرصہ میں فیصل آباد کے شہری رقبے میں 24 فیصد اضافہ ہو چکا ہے جس میں 23 فیصد زرعی رقبہ اس شہر کاری کی نذر ہو چکا ہے۔ جبکہ ساہیوال میں شہر 21 فیصد پھیل چکا ہے اور اس پھیلاؤ کی زد میں 13 فیصد زرعی رقبہ اور 8 فیصد بھجڑ میں آئی ہیں۔ زرعی زمینوں کے استعمال میں یہ تبدیلی زیادہ تر معاشی عوامل کی وجہ سے آئی ہے جن میں ایک جانب تو زرعی زمینوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور دوسری جانب کم منافع اور زرعی پیداوار کسانوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اپنی زرعی زمینیں فروخت کر دیں جو کہ نہروں کے نواح میں واقع ہیں۔ دیہاتوں میں زرعی زمین میں استعمال تبدیلی کی بڑی وجہ بن چکا ہے۔ شہروں کے نواح میں واقع دیہاتوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا

انحصار زمین پر ہے لیکن اس سروے کے دوران نتیجہ اخذ کیا کہ ان علاقوں کے کسانوں کی گزر بسر کے طریقوں میں بہت تبدیلی آچکی ہے۔ زرعی زمین میں کمی کے نتیجے میں زیادہ تر کسانوں نے روایتی کاشت کاری کے طریقوں کو ترک کر کے جدید طریقے اپنالے ہیں۔ تاکہ کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکے۔ تاہم یہ پیداوار بھی صرف ان کسانوں کی گھریلو ضروریات ہی پوری کر رہی ہے۔ جس کی وجہ سے کسانوں کی اکثریت میں زراعت کے ساتھ ساتھ غیر زراعت کو متبادل معیشت کی حکمت عملی کے طور پر اپنایا ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ شہروں اور نواحی دیہاتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطوں کی وجہ سے شہروں کی طرف لوگوں کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ شہروں سے زرعی مشنری اور فوڈ انٹیم جبکہ دیہاتوں سے اناج غلہ بنزیوں اور دودھ جیسی اشیاء کے تبادلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسکے علاوہ سڑکوں اور مارکیٹوں تک رسائی نے ان علاقوں کی زرعی پیداوار خاص طور پر سبزیوں کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی ہے جس سے کسانوں کی زرعی پیداوار با آسانی اور جلد شہروں کی مارکیٹ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس سروے سے یہ نتائج اخذ کیا گیا ہے کہ شہروں کی توسیع اور کسانوں کی معیشت کا دار و مدار اس حقیقت پر نہیں ہے کہ شہر شہر کی کس مرحلے پر ہیں۔ تمام شہر ایک طرف تو پھیلاؤ کی طرف گامزن ہیں اور ساتھ ہی کسانوں کی زندگیوں اور ذرائع گزر بسر میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ تاہم فیصل آباد میں شہری پھیلاؤ کی رفتار نسبتاً زیادہ ہے۔ دونوں شہروں میں ملتے جلتے عوامل ہی اس پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں جن میں کم منافع بخش زراعت اور زرعی زمین کی قدر میں اضافہ شامل ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں کسانوں کے انسانی، طبعی اور مالی وسائل میں ابتری آتی ہے۔ سماجی وسائل اور رابطے میں کوئی تبدیلی نہیں جبکہ قدرتی وسائل جیسے کہ زرعی زمین اور پانی تک رسائی میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تحقیق کے نتائج کا تجزیہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ زرعی ملکیت میں کمی کی وجہ سے کسان اپنی غذائی اور مالی ضروریات پوری نہیں کر پارہے جو ان کو آمدن کے دوسرے غیر زرعی ذرائع کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس لئے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ کسانوں کے لئے ایسی منافع بخش غیر زرعی آمدن کے ذرائع مہیا کئے جائیں جن سے ان کو اپنی معیشت بہتر بنانے کا موقع مل سکے۔

حیاتیاتی طریقہ کار سے ذخیرہ شدہ اجناس کے نقصان دہ کیڑوں کا تدارک

پی ایچ ڈی۔ کالر: توقیر انور نگران: ڈاکٹر منصور الحسن شعبہ: انٹومالوجی

ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کے کنٹرول کے لئے عام طور پر روایتی طریقہ زرعی ادوات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان سے ذخیرہ شدہ اناج کے کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملی ہے لیکن ان کے استعمال کو اب چند وجوہات کی بنا پر ترک کیا جا رہا ہے۔ ان ادویات کے زیادہ اور بے دریغ استعمال سے ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں نے اپنے اندر ان روایتی زرعی ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی ہے۔ ان زرعی ادوات کے باقیات اجناس میں پائے گئے ہیں۔ ایسی خوراک کے استعمال سے انسانوں میں ان زرعی زہروں کے باقیات اور ان کے اثرات نوٹ کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول پر ان زرعی ادویات کے خطرناک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی اس تحقیق میں چند حیاتیاتی حشرات کش چیزوں جیسا کہ حشرات خور پھپھوندی (Entomopathogenic fungi)، بیکٹیریا سے موخوڑ ادویات اور عرق نباتات کو پہلے علیحدہ علیحدہ اور پھر یکجا کر کے درج بالا کیڑوں کے مربوط انسداد کے لئے استعمال میں لایا گیا۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ان سب کا مشترکہ استعمال ان ذخیرہ شدہ اجناس کے کنٹرول میں مؤثر ہیں۔ اسکے علاوہ میری تحقیق کے نتائج درج ذیل ہیں:

- ۱۔ تمام قدرتی ادویات؛ حشرات خور پھپھوندی (میشریزم امیپوسولولی)، بیکٹیریل (اسپینڈورم) اور نباتاتی عرق (نیم کا عرق) حشرات کے کنٹرول میں مؤثر پائے گئے ہیں۔
- ۲۔ بیوٹ کیا گیا ہے کہ درجہ حرارت اور قدرتی زہر کی مقدار دونوں عوامل حشرات خور پھپھوندی اور نباتاتی عرقیات کے مؤثر ہونے میں معاون پائے گئے جبکہ بیکٹیریا سے موخوڑ ادویاتی پر درجہ حرارت کا کوئی خطر خواہ اثر نہیں دیکھا گیا۔ ہاں البتہ ادویاتی کی مقدار ضرور اثر انداز ہوئی۔
- ۳۔ بیکٹیریا سے موخوڑ ادویاتی کم درجہ حرارت پر زیادہ حشرات کو تلف کیا۔
- ۴۔ حشرات خور پھپھوندی کو دانوں کا کھچرا کے خلاف نسبتاً زیادہ مؤثر پایا گیا۔
- ۵۔ تمام قدرتی ادویات میں بیکٹیریا سے حاصل کردہ زہر نے زیادہ بہتر نتائج دیئے ہیں۔
- ۶۔ تینوں حشرات میں دانوں میں بے ڈنگے سوراخ کرنے والا کیڑا (Lesser grain borer)، دانوں کا کھچرا (Khapra beetle) اور چاول کی لمبی تھوٹنی والی میٹل (Rice weevil) نسبتاً زیادہ حساس پایا گیا۔
- ۷۔ تمام قدرتی ادویات کے ملاپ نے ان کے علیحدہ علیحدہ استعمال کی نسبت بہتر نتائج دیئے۔

درج بالا نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے حشرات کا ایک مربوط طریقہ انسداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ گھریلو اور حکومتی سطح پر ان حیاتیاتی ادویات کی تحقیق اور انکی صنعتی پیمانے پر تیاری کے لئے کثیر رقم مختص کرے تاکہ ان ادویات کو کسانوں تک رسائی دی جائے اور روایتی زہروں کے استعمال کو کم کر کے ماحول کی آلودگی پر بھی قابو پایا جاسکے۔

حیاتیاتی طریقہ کار سے ذخیرہ شدہ اجناس کے نقصان دہ کیڑوں کا تدارک

پی ایچ ڈی۔ کالر: شاہ زمان نگران: ڈاکٹر منصور الحسن شعبہ: انٹومالوجی

ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں کے کنٹرول کے لئے عام طور پر روایتی طریقہ زرعی ادوات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان ادویات کے زیادہ اور بے دریغ استعمال سے ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں نے اپنے اندر ان روایتی زرعی ادوات کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی ہے۔ ان زرعی ادویات کے باقیات اجناس میں پائے گئے ہیں۔ ایسی خوراک کے استعمال سے انسانوں میں ان زرعی زہروں کے باقیات اور ان کے اثرات نوٹ کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول پر ان زرعی ادویات کے خطرناک اثرات مرتب ہوئے ہیں ہم نے اپنی اس تحقیق میں چند حیاتیاتی حشرات کش چیزوں جیسا کہ حشرات خور پھپھوندی

نا صرف کسان توانائی کے حصول کا ایک مواد ضائع کر لیتے ہیں بلکہ فضا میں آلودگی بھی پیدا کرتے ہیں جس کے مسمیٰ اثرات ہمارے ماحول کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسانوں کو ایسی مشینری فراہم کی جائے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے کسان فصلوں کی باقیات اور فاضل فصلہ جات وغیرہ کا استعمال توانائی کے حصول کے لئے کر سکیں جس سے ماحول میں آلودگی سے بھی بچا جاسکے گا اور توانائی کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافے کا حصول بھی ممکن ہوگا۔ انہی ضروریات اور مسائل کے پیش نظر جامع زرعیہ کے انجینئر نے ایک مشین تیار کی ہے جس کے ذریعے باقیات میں زیادہ حجم رکھنے والی فصلوں کی باقیات کو دباؤ کی تکنیک کے ذریعے بریکس میں ڈھال لیا جاتا ہے جس سے ان کا حجم تقریباً دس گنا کم ہو جاتا ہے اور جلانے کے عمل میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ بریکس کی مخصوص شکل اسے استعمال کرنے، ذخیرہ کرنے اور اسکی مختلف مقامات پر ترسیل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اسے بجلی بنائیوالے کارخانوں، بوائروں اور بھٹیوں وغیرہ میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بریکس دوسرے ایندھن مثلاً تیل، قدرتی گیس، کوئلہ وغیرہ کے مقابلے میں ماحول دوست ہے۔

سلمو نیلا ٹائمیوریم کے مہلک انفیکشن کے خلاف ایک ممکنہ براہ راست زبانی ویکسین کے طور پر مینٹی گٹ سے الگ تھلگ سالو نیلا ٹائڈ کا اندازہ

پی ایچ ڈی۔ کالر: حسن ظفر نگران: ڈاکٹر سجاد الرحمن شعبہ: مائیکرو بیالوجی

موجودہ ریسرچ پروجیکٹ کو انسان، جانوروں اور کیڑے سے سلمو ٹائپ جاتیوں کو الگ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اس کے بعد ان کے حیاتیاتی اور آلودگی کی خصوصیت اور ان کی سنجیدہ کراس رد عمل کی جانچ داخلی ذرائع سے جمع کردہ 90 نمونوں میں سے دس نمونے معالج اور حیاتیاتی خصوصیات کی طرف سے سلمو ٹائپ الگ الگ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ مزید ٹیوکیٹیکل تصدیق جیو کیمیاٹیکل کٹس ریپڈ (ریپید) استعمال کیا گیا تھا کٹ سے اسکو کرنے کے بعد مائیکرو کوڈ پیداساف ویز ایریک کی طرف سے تجزیہ کیا گیا تھا اس میں کشیدگی کی نشاندہی کی گئی تھی ایس ٹائی، ایس ٹائیٹوریم اور ایس گلیکزیوم ایس ٹائی ڈی بیج کے ذریعہ مزید پروٹین کی پروفیشنل پروٹین پروفائل کی بنیاد پر ٹینوں کے درمیان اسی طرح کے فرق اور اختلافات کا تعین کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ دس حلقوں میں کوئی عام بینڈ نہیں دیکھا گیا تھا لیکن 107.5 کلو ایک بینڈ SP6 اور CT7 کے 8 کینیٹروں میں عام تھا۔ تاہم سلمو نیلا کی سلیم ٹائلیٹھ علیحدہ علیحدہ کی آلودگی کے بعد پولیمر ایس چین رد عمل (پی سی آر) کی طرف سے 16S آر آر این جین کی پیروی کرنے والی پی سی آر کی مصنوعات کی ترتیب کے بعد مزید کیا گیا تھا۔ نتیجے میں تمام الگ الگ الگ ہونے والے نمونہ سلمو ٹائپسٹین بن جاتے ہیں اور این سی بی کے تمام برتنوں کے لئے رسائی نمبر حاصل کی گئی۔ سلمو ٹائپ کے چٹانوں کا تعین کرنے کے لئے وہ پلیٹ اکٹھائیٹ کے تابع ہوتے ہیں اس ٹیسٹ میں، ایچ بی 1 کے antiserum بہترین سمندری طوفان کے ٹائٹریٹس کی جب سب سلمو ٹائپ antigens کے درمیان کراس رد عمل کیا تاہم حفاظتی امتحان کے لئے زندہ HB1 زندہ زبانی HB1 ٹیکسن (CFU 1010 / ملی) کی مختلف خوراکوں کے ساتھ خرگوش میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، کوئی جغرافیائی اثرات نہیں دیکھا جاسکتا تھا جس نے ایچ بی 1 ٹیکسن کے آلودگی کا اشارہ ظاہر کیا تھا۔ جانوروں کے مقدمے کی سماعت میں خرگوش کے تین گروپوں میں ایچ بی 1 ٹیکسن تین خوراک (واحد، ڈبل ٹریپل) میں دیا گیا تھا۔ مجموعی مطلب کے عنوان 33، 49.7 اور 43 تھے تجرباتی خرگوش پھر LD50 کے ایس ٹائیٹوریم (14028 ATCC) کے ساتھ چیلنج کی گئیں۔ ایچ بی 1 لائیو زبانی مائیکس (دوہری خوراک) خرگوش میں مضبوط مدافعتی رد عمل کو قابو پانے اور ایس ڈی ٹائٹیمیروم (ای سی سی 14028) کے ایل ڈی 50 کے خلاف نمایاں ($0.0001P$) تحفظ فراہم کی۔ یہ ایچ بی 1 لائیو مائیکرو سافٹ ایک ممکنہ ویکسین کے طور پر اچھا امیدوار لگ رہا ہے، تاہم، دیگر جانوروں کے ماڈل (چوہوں، انسانیت چوہوں، گنی سوز) میں دیگر مطالعات کو دوسرے سلمو نیلا پر جاتیوں کے خلاف اپنی صلیب کی حفاظت کی تصدیق کرنے کے لئے کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایچ بی 1 کے کشیدگی کے مزید جینومیکس اور پروٹو ڈک تجزیہ بھی اس کی کراس رد عمل کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔

ہائیزرو جیولوجیکل ماڈلنگ کیڈریے زمینی پانی کا معیار اور اس میں تبدیلی کا فاصلاتی اور وقتی جائزہ: پاکستان کی لوئر چناب کینال پر ایک تحقیق

پی ایچ ڈی۔ کالر: محمد الیس نگران: ڈاکٹر محمد رشید شعبہ: اگیکیشن اینڈ ڈرنج

پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 70 فیصد سے زائد کسانوں کا بلواسطہ یا بلا واسطہ انحصار زمینی پانی پر ہے۔ زمینی پانی کا زیادہ استعمال اس میں خرابی اور نمکیات میں اضافہ ہونے کا سبب ہے۔ انہی مسائل کو حل کرنے کے لئے پنجاب کے لئے لوئر چناب کینال (ایل سی سی) میں ایک تفصیلی تحقیق کی گئی۔ 2005ء سے 2013ء تک موجودہ زمینی پانی کی سطح اور معیار کا تجزیہ فیلڈ انویسٹری اور جی آئی ایس نقشہ سازی کے ذریعے کیا گیا۔ 2033ء تک زمینی سطح پانی کی سطح کی موجودہ اور مستقبل کی پیش گوئی یو ایس جی ایس کوڈ (MODFLOW) کے ذریعے کی گئی اور MT3DMS ماڈل کے ذریعے زمینی پانی کا معیار جانچا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ ماڈل مینپولی کیلی بریٹ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر سال 2006 کے زمینی پانی کی سطح کو استعمال کیا گیا اور ہائیزرو لک کنڈکٹیوٹی کی ویلیوز کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ 2006ء سے 2011ء کی ٹرانزیٹ سٹیٹ کیلی بریشن کیلئے PEST ماڈل استعمال کیا گیا اس ماڈل کی مزید تصدیق سال 2011ء سے 2013ء کے ڈیٹا کے ذریعے بھی کی گئی۔ ماڈل کے نتائج کے پیش نظر زمینی پانی پر پمپا راج اور پمپنگ کے مستقبل کے لئے مختلف سناریو بنائے گئے۔ زمینی پانی کے بہاؤ کا ہائیزرو ڈائنامک مطالعہ دو ہائیو کیلئے کیا گیا۔ اس مطالعہ کے پیش نظر مستقبل میں پانی کی سطح اوپری حصے پر زیادہ ہوگی جبکہ درمیانی اور نیچے حصوں پر پانی کی سطح میں کمی ہوگی۔ ایل سی سی میں پانی کی سطح میں زیادہ سے زیادہ 5.17 میٹر اور 5 میٹر کا اضافہ ہوگا۔ ایل سی سی میں معیاری پانی میں کمی کا تناسب 1 فیصد جبکہ 25 فیصد کی مارجنل لیول پر ہوگی جبکہ غیر معیاری پانی میں اضافہ 24.8 سے 26.6 فیصد تک دیکھا گیا۔ سناریو-II کے نتائج نے ظاہر کیا کہ زیادہ پمپنگ سے مکمل LCC میں پانی کی سطح کم ہوگی۔ سب سے زیادہ کمی سب ڈویشن بھاگت میں دیکھی گئی۔ معیاری پانی میں کمی کا تناسب 49 فیصد سے 7 فیصد ہو گیا۔ مارجنل لیول 41 فیصد سے 55 فیصد اور غیر معیاری پانی کا تناسب بھی 10 فیصد سے 38 فیصد تک بڑھ گیا۔ سناریو-III میں پیڑ میٹرنے مجموعی طور پر اوپری چار سب ڈویشن میں پانی کی کمی دکھائی۔ ترکانی سب ڈویشن میں سب سے زیادہ کمی 4.77 میٹر متوقع ہے۔ ایل سی سی میں مجموعی طور پر پانی کے معیار میں کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ صرف 19.7 فیصد حصہ معیاری پانی پر مشتمل ہوگا، 49.3 فیصل مارجنل لیول جبکہ 31 فیصد حصہ غیر معیاری پانی پر مشتمل ہوگا۔

نیلی راوی بھینسے میں لیپٹن جین پولی مارفیزم اور اس کے نژولیدی خواص پر اثرات

پی ایچ ڈی۔ کارل: غلام حسین دلبر نگران: ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی شعبہ: تھری جینالوجی

موجودہ تحقیق میں لیپٹن جین پولی مارفیزم کی تشخیص اور اس کے نژولیدی خواص پر اثرات کی جانچ کرنا بنیادی مقصد تھا۔ اس تحقیق میں نیلی راوی نسل کے بھینسے استعمال کئے گئے۔ جو سین پروڈکشن یونٹ قادر آباد ضلع ساہیوال اور کرانی والا ضلع بہاولپور پر رکھے گئے تھے۔ نژولیدی خواص میں خصبوں کا محیط اور لمبائی، ری ایکشن ٹائم اور سین دیتے وقت ماؤٹنگ کی تعدادنی سپل شامل تھے۔ اسی طرح سین دینے کی استطاعت، ماس موٹیلیٹی، سپرم کی انفرادی موٹیلیٹی، سپرم کی تعداد، ڈائلوشن اور فریڈنگ کے بعد کی سپرم موٹیلیٹی، زندہ اور مردہ سپرم کے تناسب کو معلوم کرنے کے لئے ہر بھینسے کے سین سپل کی لیبارٹری میں جانچ کی گئی۔ ڈی این اے سینڈرڈ آرگینک طریقہ کار کے ذریعے سے نکالا گیا اور پرائمر ڈیزائن کر کے پی سی آر کے ذریعے سے مطلوبہ جینز کی تعداد کو بڑھا یا گیا۔ سیکوینسنگ کر کے جینو ٹائپ فریکوئنسی معلوم کی گئی اور دریافت کی گئی پولی مارفیزم کے نژولیدی خواص کے ساتھ منسلک ہونے کو پیرسن کوریلیشن کے ذریعے سے جانچا گیا۔ ٹوٹل 12 پولی مارک سٹکل نیوکلیوٹائیڈ پولی مارفیزم (SNPs) دریافت کی گئیں۔ جن میں سے تین C.284، C.22 اور C.523 تیسری ایگزون میں پائی گئیں۔ جبکہ 9 SNPs C.191+19، C.191+30، C.191+41، C.191+51، C.191+99 (C.191+99، C.191+51، C.191+41، C.191+30، C.191+19، SNPs 9، C.20-21، C.20-27، C.20-41، C.20-91) اینٹرون حدود میں پائی گئیں۔ ہماری معلومات کے مطابق C.191+99، C.191+51، C.191+41، C.191+30، C.191+19، SNPs 9، C.20-27، C.20-41، C.20-91 پہلے لٹرچر میں کہیں رپورٹ نہیں ہوئیں۔ پوزیشن C.523 پر $G > A$ پولی مارفیزم کی وجہ سے آر جینین امانو ایسڈ گلوٹامین میں تبدیل ہوا۔ کائی سکیز ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا کہ تمام 12 SNPs ہارڈی وین برگ کے اصول کی پیروی کر رہی تھیں۔ موجودہ تحقیق کے نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پوزیشن C.20-91 پر پولی مارفیزم کا نمایاں طور پر مردہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ مثبت ربط پایا گیا۔ جبکہ یہ پولی مارفیزم سپرم کی انفرادی موٹیلیٹی اور زندہ سپرم کی فیصد تعداد پر نمایاں طور پر منفی طریقہ سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ پوزیشن C.20-41 پر SNP خصبوں کے محیط اور مردہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ مثبت طور پر منسلک تھی جبکہ یہ پولی مارفیزم سپرم کی کل تعداد اور زندہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ منفی طور پر منسلک پائی گئی۔ پوزیشن C.20-27 پر SNP کا خصبوں کے محیط اور خصبوں کی لمبائی کے ساتھ منفی تعلق پایا گیا جبکہ پوزیشن C.20-21 پر SNP کسی نژولیدی خواص کے ساتھ منسلک نہ پائی گئی۔ پوزیشن C.191+19 پر $C > T$ تبدیلی مثبت طور پر خصبوں کے محیط اور ری ایکشن ٹائم کے ساتھ منسلک پائی گئی۔ اسی طرح C.191+30 پولی مارفیزم کاری ایکشن ٹائم کے ساتھ مثبت ربط دیکھنے میں آیا۔ پوزیشن C.191+41 پر SNP مثبت طور پر زندہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ منسلک تھی جبکہ یہ پولی مارفیزم مردہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ منفی طور پر منسلک پائی گئی۔ اسی طرح پوزیشن C.191+51 پر پائی گئی جینیاتی تبدیلی ری ایکشن ٹائم کے ساتھ مثبت طور پر منسلک تھی۔ پولی مارفیزم C.191+99 کا زندہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ مثبت تعلق تھا جبکہ اس کے برعکس اس کا مردہ سپرم کی فیصد تعداد کے ساتھ منفی تعلق پایا گیا۔ پولی مارفیزم جو تیسری ایگزون کی حدود میں پائی گئیں ان میں سے C.284 فریڈنگ کے بعد سپرم موٹیلیٹی کے ساتھ منفی طور پر منسلک تھی۔ اسی طرح پولی مارفیزم C.422 نے خصبوں کے محیط اور ان کی لمبائی پر اپنے مثبت اثر کو ظاہر کیا۔ تاہم پوزیشن C.523 پر پائی گئی جینیاتی تبدیلی فریڈنگ کے بعد سپرم موٹیلیٹی پر منفی طریقے سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ بالا خلاصہ! موجودہ تحقیق کے نتائج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیپٹن جین بہت زیادہ پولی مارک ہے اور یہ نمایاں طور پر نیلی راوی بھینسے کے مختلف نژولیدی خواص پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ان سٹکل نیوکلیوٹائیڈ پولی مارفیزمز (SNPs) کو جینیاتی مارکرز کے طور پر استعمال میں لایا جاسکتا ہے جو کہ اعلیٰ نسل کے جانوروں کے انتخاب میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔

نمکیات سے متاثر اینٹوں اور نامیاتی ماحول دوست اینٹوں کی حرارتی و مادی خصوصیات کا جائزہ

پی ایچ ڈی۔ کارل: فرح انجم نگران: ڈاکٹر عبدالغفار شعبہ: فزکس

پاکستان میں تعمیراتی مواد میں زمینی مٹی سے تیار کردہ اینٹیں تجارتی طور پر تعمیرات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اینٹیں انتہائی مسام دار ہونے کے باعث زمینی نمکیات اور نمی سے متاثر ہو جاتی ہیں جو عمارتوں میں سلبن اور کھراک کا باعث بنتی ہیں۔ اس سے نہ صرف عمارت کی پائیداری متاثر ہوتی ہے بلکہ حرارتی موصلیت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تجارتی اینٹوں کو معدنی نمک (سوڈیم کلورائیڈ) کے مختلف تناسب (0-5 M) کے محلولوں میں (7-10) دن تک بھگونے کے بعد کئے گئے حرارتی و مادی تجزیے سے معلوم ہوا کہ حرارتی موصلیت 100 فیصد سے زیادہ متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سوڈیم کلورائیڈ محلول کی حرارتی خصوصیات، اینٹوں میں محلول کا پھیلاؤ اور محلول میں بھگونے کا دورانیہ تھا۔ ان اینٹوں کو منجمد خشک کرنے کے بعد کئے گئے حرارتی اور مادی تجزیے سے معلوم ہوا کہ ان اینٹوں میں حرارت کی ایصالیت، وسعت اور حرارت خصوصیت کی صلاحیت کے بڑھنے کا رجحان سوڈیم کلورائیڈ کی مقدار کے تناسب پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان اینٹوں کی پیداوار میں ایشیاء میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اینٹوں کی تیاری میں عام طور پر کوئلے کا استعمال ہوتا ہے جو فضائی آلودگی کا باعث ہے۔ اینٹوں کی تیاری کو ماحول دوست اور بہتر حرارتی موصلیت کا حامل بنانے کا ایک ذریعہ اینٹیں بناتے وقت نامیاتی فضلہ کو مٹی کے ساتھ شامل کرنا ہو سکتا ہے۔ جس سے ان میں مسام داری کے بڑھنے سے نہ صرف انکی حرارتی موصلیت بہتر ہوگی بلکہ اینٹوں کو بھٹوں میں جلاتے وقت کوئلے کا استعمال بھی کم ہوگا۔ اس تناظر میں بہتر حرارتی موصلیت کی حامل اور ماحول دوست اینٹیں لیبارٹری میں تیار کی گئیں جن میں نامیاتی فضلہ کے طور پر استعمال شدہ چائے کی پتی، لکڑی کا برادہ اور گندم کا بھوسہ (توڑی) کو الگ الگ خاص تناسب میں مٹی کے ساتھ شامل کیا گیا۔ ان اینٹوں کے حرارتی و مادی تجزیہ سے پتا چلا کہ نامیاتی فضلہ کی آتش گیر خصوصیت کی بناء پر مسام داری میں اضافہ اور انکشافت میں کمی کی وجہ سے ان اینٹوں کی حرارت کی ایصالیت، وسعت اور حرارت خصوصیت کی صلاحیت میں واضح کمی واقع ہوئی۔ مگر ان کی میکانیکی طاقت میں کمی کا رجحان نظر آیا لیکن اینٹوں کی میکانیکی طاقت پاکستان میں عمارات کے معیار کی حد (5 MPa) میں تھی۔ بہتر حرارتی موصلیت اور میکانیکی طاقت کی حامل ماحول دوست اینٹیں 2-4 فیصد استعمال شدہ چائے کی پتی، 2-6 فیصد لکڑی کا برادہ اور 2-1 فیصد گندم کا بھوسہ مٹی کے تناسب کے لحاظ سے شامل کرنے اور 980 ڈگری سینٹی گریڈ پر پکانے سے حاصل ہوئیں۔

Indigenous Liquid Fertilizer Machine

Authors: Dr. Junaid Nawaz Chauhdary, Mr. Umar Draz

Introduction:

Water soluble fertilizer has higher uptake efficiency than conventional fertilizers and are recommended for better crop production. Most of the water soluble fertilizers are being imported from foreign countries to Pakistan; that's why, their market price is too high. To reduce the cost of liquid fertilizer, there is need to manufacture these fertilizers indigenously. Some local industry personnel are manufacturing liquid fertilizer by using improper machinery without any safety measures that is very dangerous and can cause serious accidents. The proper fertilizer machines of imported brands are expensive because these machines are not available in local market. To promote the use of liquid fertilizer, there is need to manufacture these fertilizers on large scale by local investors by using cheap fertilizer machines. To address this problem, an indigenous liquid fertilizer machine has been developed by WMRC for efficient production of liquid fertilizer products.

Indigenous Liquid Fertilizer Machine:

The Indigenous Liquid Fertilizer Machine has been developed by reverse engineering of Imported Liquid Fertilizer Machine to reduce the cost of fertilizer unit. The price of indigenously developed machine is less than the half price of imported machine of same specifications.

Features:

- Simple in structure
- Simple feeding and collection mechanism
- Mixing amount is large and product can be manufactured on large scale
- Easy to operate and easy to maintain
- Reduce the requirement of manpower
- Low cost as compare to imported machines
- Low energy consumption
- After reverse engineering, the machine can be manufactured in variety of sizes as per demand of manufacturing product

Specifications:

The specifications of Fertilizer machine, installed at Water Management Research Centre, University of Agriculture, Faisalabad are as: Total capacity: 1.2 m³, Effective capacity: 1 m³, Storage tanks for product and raw material: 4 Nos (1 m³ each), Reactor agitator: 70-100 RPM, Construction material: SS316L, Cooling System: Out site coil with 5 Lpm water flow, Metering pump: 500-1000 L/hr



Fruits and vegetables the potential source of probiotic bacteria

Alia Sultan, Dr. Muhammad Ashraf (Institute of microbiology, UAF)

Probiotics are live health promoting beneficial microorganisms which boost up the immune system of the host when consumed in appropriate amount. People mostly think that bacteria and other microorganisms are harmful, but many are actually beneficial. These beneficial microbes help in the digestion of food, destroy cancer-causing cells, suppress the serum cholesterol level, produce vitamins, stabilize the gut micro flora, stimulate the immune system and reduce the gastrointestinal and urogenital tract infection. *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* are the most common genus of bacteria found in a variety of fruit and vegetables. *Lactobacillus* isolated from fruits and vegetables involve in the treatment of diarrhea, urinary tract infections and immune system modulations. Probiotic bacteria involve in immune system modulation and ultimately improve resistance to allergies, stimulate innate immunity and prevent respiratory diseases. They also produce some anti-carcinogens, which suppress the growth of tumor cells and cause the destruction of carcinogens released by pathogenic bacteria. Enzymes produced by *Lactobacillus* involve in the reduction of lactose in milk and allow the consumption of milk by lactose intolerant people. These probiotic bacteria produce some compounds (lactic acid, acetic acid, and bacteriocin) which inhibit the growth of harmful bacteria. The important property of probiotic bacteria is that, they maintain the microbial balance in body, which is disturbed by taking antibiotics. Antibiotics kill the beneficial bacteria along with harmful ones and leading cramping, gas and diarrhea. Protein and fat in the digestive tract is breakdown by probiotics bacteria, which is very helpful for infants and patients to build strength after illness. Although milk is good source of probiotic bacteria, but it is necessary to have some alternatives that do not contain milk to meet the need of those who are lactose intolerant. So, fruits and vegetables are good source of these beneficial microbes. These probiotic bacteria enter into fruits and vegetables through pores and cracks. They are present in banana, apple, orange, mango, peach, cucumber, tomato, sweet potato, cabbage, garlic and ginger etc. Minerals, sugar and vitamin present in fruits and vegetables promote the growth of these bacteria. To reduce the risk of heart diseases and hypertension many scientific studies suggest the consumption of fruits and vegetables. Almost 90 probiotic products are available worldwide.

Food borne illness: A major threat

Jannat Khalid, Dr. Muhammad Ashraf (Institute of microbiology, UAF)

Introduction:

People getting sick of something they eat. Now a days, food poisoning is a major threat, also known as food borne illness that occurs due to consumption of food. Many different disease causing microbes or pathogen can contaminate foods. Most of the food borne infections or illness caused by bacteria, viruses, and parasites. The People which included pregnant women, young childrens, older adults and the people who have a weaker immune system are at high risk. *Bacillus cereus* is one of the bacteria that are involved in foodborne illness. It is commonly present in the environment, so it is easily spread to many types of fresh and processed food products.

When it comes to foodborne illness most of us think about undercooked meat and eggs but raw fruits and vegetables, contaminated water, sea food, unpasteurized dairy products, canned food, ready to eat food can also cause foodborne illness. Unhygienic food handling and improper storage is the main cause of food borne illness. Symptoms often include fever, vomiting, aches, stomach cramps, and may include diarrhea. In any household, their first priority is to keeping the family safe. Food borne illness is entirely preventable, so by following some precautionary measures we can protect our family from food borne illness.

Good hygienic practice must adopt before and after food preparation, it can minimize the chances of getting an illness. Washing hands with warm/ cold water or soap for 20sec, is one of the effective protection method against food borne illness. Ready to eat food must be store separately from raw food. Keep hot foods above 57 °C and cold foods below 5 °C to prevent the contamination of *B. cereus* in the food. Cooked food should not be left at room temperature for more than 2 hours. Wash fruits and vegetables thoroughly before cutting and cooking. The simplest way to avoid the *B. cereus* food borne illness is that foods should be cooked thoroughly and cooled rapidly. By following these preventive measures, we can keep the food safe and protect ourselves from food borne illness.

If you become ill and the symptoms of illness are severe then you should have to consult the doctor immediately.

Gamma Irradiation: A Tool to Improve Citrus Genome

Muhammad Usman, Dr Bilquees Fatima, Dr. Muhammad Usman, Dr Iqar Ahmad Rana

Citrus industry is the major fruit industry all over the world. In Pakistan, citrus is also one of the major fruit crop. It is grown in all provinces, however the contribution of Punjab province is more than 95% for producing good quality citrus. Genus Citrus includes oranges, grapefruit, lime and lemons, pomelos.

Grapefruit is commonly known as forbidden crop has great nutritional value. In 2019, world production of grapefruits (combined with pomelos) was 9.3 million tonnes, of which 53% was in China. Other significant producers include United States, Vietnam, and Mexico. Figure below shows the world leading grapefruit courting.

Grapefruit is good source of vitamins, iron, calcium and other minerals. Pink and red flesh varieties have beta carotenoids which are the good precursor of vitamin A. Juice of grapefruit provides less calories and helpful to overcome obesity. Bioflavonoids and other plant chemicals are also present in juice of fruit which protect the body against cancer and prevents heart related disease. Antioxidants which are present in fruit improve the immunity of body against harmful bacteria and viruses.

Grapefruit is a polyembryonic by nature. It was introduced in early 19th century to Florida. Grapefruit comprises number of varieties which are white and pink fleshed varieties. Among all the varieties, Duncan is said to be the oldest white fleshed variety. Above 70% pigmented varieties are grown in Texas. Almost 59% pink and red varieties are commercially propagated in Florida whereas in Argentina 94% grapefruits are pink and red fleshed varieties.

Application of gamma irradiation in the field of breeding has opened new gateway for enhancing and improving the germplasm of agronomic as well horticultural crops. Breeders are using this technique to cause mutation to get the desired characteristics. This technique is used to induce different biological phenomenon for inhibiting the morphological traits. It is widely

used in citrus fruit to get seedless plants like kinnow and mandarin. Gamma irradiation in grapefruit helps to enhance fruit quality such as pollen germination, improving bearing habit of fruits, blooming and fruit repining time, weight, size and maturity index, bio-molecules, self-incompatibility, and resistivity against pathogens etc.




Fig. 1: World leading grapefruit countries.

Mutation breeding is a great tool used for enhancing the germplasm. Mutation may be spontaneous or induced. Different mutagens are being in practice for plant breeding programs. This induced mutation is used for improving tolerance of plant varieties and quality of fruits. On large scales, genetically modified organisms (GMOs) are the results of these induced breeding programs. A variety of chemicals are available which are used as mutagens but gamma rays and X- rays are more frequently used for inducing mutation as compared to chemical mutagens

Application of gamma irradiation is successful technique for obtaining new and seedless varieties like oranges, grapefruits lemon and mandarin. Gamma irradiation is mostly applied on budwood, but it is also adopted in seeds and pollens. The dose will definitely reduce as the nature plant cell/tissue organ. So depending on the species and varieties, acute range of radio sensitivity (LD_{50}) is mostly used from 40-100 Gy. Star Ruby was first released as the result of exposure of *Citrus paradise* cv Hudson with thermal neutron. Similarly complete seedless variety Eureka was also obtained with the exposure of gamma radiation.

Gamma rays can create permanent gene expression of anti-oxidative enzymes against oxidative stress. This provides superior plant varieties having tolerance against biotic and abiotic stresses. According to literature, increased application of gamma irradiation may induce different enzymes like SOD, POD, APX and CAT. Defense mechanism of plant also change which produce qualitative and quantitative plant proteins of irradiated plant species.

As the world population is increasing so fast since last five decades and it is estimated that it's population would be more 34% as today, in 2050. Urbanization and colonial development has limited the agricultural land area. Food security, economical and easily accessible to food would be the main issue of under developed countries. Induced mutation through gamma irradiation has played important and vital role for increasing world food security with new more tolerant and better yielding and good quality varieties. Production of reactive oxygen species (ROS) also help to increase plant cells which may cause oxidative stresses.