


ترجمان زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

زرعی سہ ماہی

اکتوبر تا دسمبر 2023ء



صدر پاکستان کی جانب سے تعلیمی و تحقیقی خدمات کے اعتراف میں
رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) کے لیے
پاکستان کے سول ایوارڈ ”ہلال امتیاز“ کا اعلان



گندم، سویا بین اور مکا کی تیار کردہ نئی اقسام زرعی یونیورسٹی کا قابل تحسین عمل ہے
وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی

شعبہ تصنیف و تالیف ، جامعہ زرعیہ فیصل آباد



جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں اور چینی وفد کے سربراہ، چین کے نوکرئی وفد اور یونیورسٹی کے ڈین ڈائریکٹر کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں



اسلامک آرگنائزیشن برائے نوڈسکیورٹی ڈائریکٹر جنرل پرلان اے بیدولت، رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، پاکستان افغانستان جیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے کومدرخان جان الوقاضی، ڈاکٹر خالد مشتاق، ڈاکٹر آصف کامران، ڈاکٹر عبدالغفور، ڈاکٹر جعفر جہاگانی و دیگر زرعی یونیورسٹی میں منعقدہ افغانستان انگریز فورم سے خطاب کر رہے ہیں



سابق وفاقی وزیر برائے داخلہ رانا ثناء اللہ، رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈاکٹر محمد احسن خاں پرانئم منسٹر یوتھ لیب ٹاپ سکیم کے تحت لیب ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں اور امریکی قونصل جنرل کرسٹن کے باکنز انگلش آکسیس مائیکروسکلر شپ پروگرام کے معاہدے پر دستخط کے بعد گروپ فوٹو



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کنیوشن انسٹی ٹیوٹ میں پودا لگا رہے ہیں



کنیوشن ہائی کشنر لیم نیامبر اکاما یو کار زری یونیورسٹی فیصل آباد کے دورہ میں یونیورسٹی کے عمائدین کے ساتھ گروپ فوٹو



رجسٹرڈ ایل نمبر 7793 جلد نمبر 58 شمارہ نمبر 4

نور محمد شاہ

ISSN 2521-0416

اکتوبر تا دسمبر 2023ء

سرپرست اعلیٰ
پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز)
وائس چانسلر

ڈاکٹر شوکت علی ایسوسی ایٹ پروفیسر مدیر/ انچارج شعبہ تصنیف و تالیف

ممبران
پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال ڈاکٹر محمد دلدار گوگی ڈاکٹر محمد ثاقب
ڈاکٹر محمد سہیل ساجد ڈاکٹر شازیہ رمضان ڈاکٹر شکیل احمد انجم
ڈاکٹر محمد عیسیٰ خاں ڈاکٹر افتخار احمد ڈاکٹر عرفان احمد
ڈاکٹر فواد احمد ڈاکٹر محمد عرفان اشرف ڈاکٹر عرفہ طاہر

ترتیب و تدوین
مظفر حسین ساکت ریسرچ آفیسر مظفر حسین ساکت ریسرچ آفیسر
محمد آصف یونیورسٹی آرٹس/ گراؤنگ ڈیپارٹمنٹ محمد آصف یونیورسٹی آرٹس/ گراؤنگ ڈیپارٹمنٹ
عظمت علی آرٹس عظمت علی آرٹس
محمد اسماعیل آفس اسٹنٹ محمد اسماعیل آفس اسٹنٹ
محمد امین، آصف محمود اردو ٹائپسٹ محمد امین، آصف محمود اردو ٹائپسٹ
قیصر محمود معاون قیصر محمود معاون

پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف پرنسپل آفیسر، پی آر پی
ممتاز علی اسسٹنٹ رجسٹرار، انچارج یونیورسٹی پریس
احمد شہریار پبلک ریلیشنز آفیسر، پی آر پی
ڈاکٹر شازیہ رمضان انتخاب آیات و احادیث
سیف اللہ زاہد عکاسی

لائسنس نام نمبر شپ 5000 روپے
سالانہ نمبر شپ 300 روپے
سنوڈنٹ نمبر شپ 200 روپے

Contact:
041-9200161-69 Ext. 3405, 041-9201820
email: oubmuaf@gmail.com www.uaf.edu.pk

شعبہ تصنیف و تالیف
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد



فہرست

ہارٹیکلچر	29	مولی اور گاجر کی کاشت.....	ڈاکٹر فریحہ شیریں
	31	بروکولی کی کاشت.....	واجدہ منیر
	33	پھولوں و زینائی پودوں کی قدر و قیمت میں قابل قدر اضافے کا طریقہ کار.....	تزکیہ حسین
	35	اہم اُمور گلابانی برائے اکتوبر تا دسمبر.....	ڈاکٹر افتخار احمد
	37	موسم بہار کے لیے نرسری کی تیاری.....	محمد سہیل
حیوانیات	39	برسم کھلانے جانے والے موسم میں جانوروں کی دیکھ بھال.....	ڈاکٹر محمد قمر بلال
	41	زیتون کے تیل کو بیکری کے خوراک میں استعمال کرنے کے فوائد.....	ڈاکٹر محمد اشرف
	42	مچھلی کھائیں، دھوکا نہیں.....	ڈاکٹر عرفہ بن طاہر
متفرقات	44	زراعت پیشہ بھی اور عبادت بھی.....	ڈاکٹر شازیہ رمضان
	45	انڈوں کی غذائیت.....	ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان
	46	مکس سبزیوں کا اچار.....	سارہ اشتیاق
	48	گاجر کا مربہ.....	کنزہ جاوید اقبال
	50	نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اثرات.....	ڈاکٹر فرخندہ انجم
	51	لچ بکس سے بچوں کی نشوونما.....	مومنہ نوال
	52	آرتھر و پوڈس اور متعلقہ بیماریوں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات.....	حنانہ الزہرہ
	54	چائے کے پودے کی بیماریاں اور ان کا تدارک.....	ڈاکٹر ہما عباس
	55	زراعت میں، کسان دوست کیڑوں پر کیڑے مار ادویات کے مضر اثرات.....	ڈاکٹر حماد الرحمن
	57	گندم کی جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے اہم سفارشات.....	عمارہ سحر رانا
	59	مرچ کی جڑ کا گلاؤ اور اس کا مربوط تدارک.....	محمد عثمان علی
	60	سبزی چولہا: توانائی بچانے کے لئے کھانا پکانے کا متبادل طریقہ.....	ڈاکٹر نوید فرح

زرعی ریسرچ کارنر (بی ایچ ڈی سکلر کی تحقیق کے اہم نتائج و سفارشات)

فوڈ ٹیکنالوجی	63	دل کے عضلات کی حفاظت کے لیے بھنڈی کے اثرات کی دریافت اور.....	
		ان کے اختتامی تناظر.....	بشری اشفاق
فارمی اینڈ	63	کلونجی اور گل منڈی کے ذریعہ ذیابیطس کا غیر روایتی طریقہ.....	
فارما کالوجی		علاج.....	فائزہ حسن
ایکسٹینشن	64	سبزیوں کی غذائی اہمیت.....	شفیق الرحمن ضیاء

اداریہ	03	اپنی بات: وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی نئی وراثتیں.....	مدیر
جامعہ نامہ	04	صدر پاکستان کی جانب سے رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کے لیے سول ایوارڈ ”ہلال امتیاز“ کا اعلان.....	ادارتی بورڈ
	05	وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ.....	ادارتی بورڈ
	06	محمد یلیغ الرحمان گورنر پنجاب/چانسلر جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے زیر صدارت سینٹ کے 50 ویں اجلاس کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	07	زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ پرائم منسٹریو تھ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب.....	ادارتی بورڈ
	08	جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں یوم دفاع کے حوالے سے ”افکار اقبال اور دفاع پاکستان“ کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	09	جامعہ زرعیہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ حکومت پاکستان کے 37 ویں منڈیکریٹ مینجمنٹ کورس کے شرکاء کی آمد.....	ادارتی بورڈ
	10	چائینہ کی اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز اور شعبہ انٹو مالوجی، جامعہ زرعیہ کے مابین معاہدے پر دستخط.....	ادارتی بورڈ
	11	جامعہ میں پاکستان کے 76 ویں جشن آزادی کی رنگ رنگ تقریبات.....	ادارتی بورڈ
	12	زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں یوم شجرکاری کی تقریب.....	ادارتی بورڈ
	12	جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں سٹرس کی بحالی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	13	جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں افغانستان ایگری بزنس فورم کا انعقاد.....	ادارتی بورڈ
	14	امریکی قونصل جنرل لاہور کرسٹن کے ہانز کا جامعہ زرعیہ فیصل آباد کا دورہ.....	ادارتی بورڈ
	15	پاکستان میں بیج کی صنعت: بحران اور بحالی.....	ڈاکٹر اقرار احمد خاں
ٹیکنالوجی	17	گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی، گندم کی 60 من پیداوار کا طریقہ.....	ڈاکٹر شکیل احمد انجم
برائے	23	ہائپر ڈگندم: غذائی استحکام اور خود کفالت کی طرف اہم قدم.....	عمارہ سحر رانا
فصلات	25	گنے کا پائیدار طریقہ کاشت: ضرورت و اہمیت.....	ڈاکٹر رانا محمد عامر
	26	کپاس کی سفید مکی کے نقصانات اور کیمیائی تدارک.....	ڈاکٹر دلدار گوگی

پبلشر ڈاکٹر شوکت علی نے زرعی یونیورسٹی پریس فیصل آباد سے چھپوا کر شعبہ تصنیف و تالیف، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے شائع کیا

وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی نئی ورائٹیاں

گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن نقوی صاحب نے زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے جامعہ کی تیار کردہ سویا بین، گنے اور گندم کی نئی ورائٹیوں کا معائنہ کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز) نے وزیر اعلیٰ کو نئی ورائٹیوں بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے ان ورائٹیوں کا معائنہ کرتے ہوئے خوش گوار حیرت کا اظہار کیا اور زرعی یونیورسٹی کے اس قابل قدر کارنامے پر داد و تحسین فرمائی۔ چونکہ یہ خبر میڈیا پر عام چکی ہے اور عام قارئین میں بھی نئی ورائٹیوں کی جانکاری بارے تجسس پایا جا رہا ہے لہذا ان ورائٹیوں کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

سویا بین کے حوالے سے بات کی جائے تو زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد نے سویا بین کی ایسی ورائٹیاں تیار کر لی ہیں جو کمکی کی طرح موسم خزاں اور موسم بہار دونوں موسموں میں کامیابی سے کاشت کی جاسکتی ہیں اور ان کی پیداوار بھی پہلے سے موجود ورائٹیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے کی سویا بین کی اقسام موجود تھیں لیکن ایک تو وہ موسم بہار میں کاشت نہیں ہو سکتی تھیں اور دوسرے ان کی پیداوار کم تھی اور یہ دونوں باتیں کاشتکاروں کی سطح پر سویا بین کی کاشت میں ایک بڑی رکاوٹ تھیں۔ ماہرین کا خیال تھا کہ جب تک موسم بہار میں کاشت ہونے والی ترقی دادہ ورائٹی سامنے نہیں آئے گی پاکستان میں سویا بین کی کاشت کو رواج دینا مشکل ہے۔ نئی ورائٹیوں کے سامنے آنے کے بعد بہاریہ سویا بین کی بہاریہ مکئی میں کامیاب مخلوط کاشت کی جاسکے گی جس سے پاکستان کی زرعی معیشت میں نہ صرف انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے بلکہ تین سو ارب سے زائد کے سویا بین درآمدی بل میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی جو بالآخر صفر کیا جاسکے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پہلے سے موجود سویا بین کی ورائٹیوں کی حد پیداوار 25 من فی ایکڑ تک ہے جب کہ یونیورسٹی کی تیار کردہ نئی ورائٹیوں کی حد پیداوار 40 من سے بھی زائد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ورائٹیوں کو تحسین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ مذکورہ ورائٹیاں منظوری کے آخری مراحل میں ہیں جو اگلے چند ماہ تک منظور ہو جائیں گی۔ رواں سیزن میں 170 سے زائد کاشتکار، ان ورائٹیوں کی آزمائشی کاشت کر رہے ہیں اور منظوری کے بعد ان ورائٹیوں کو عام کر دیا جائے گا۔

سویا بین کے بعد وزیر اعلیٰ نے گنے کی نئی ورائٹیوں کا تذکرہ کیا۔ گنے کی ان نئی ورائٹیوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں تیار کی جانے والی اولین مقامی جی ایم ورائٹیاں ہیں جنہیں نیشنل سیفٹی کمیٹی نے کاشت کے لئے منظور کیا ہے۔ اولین ورائٹی ہونے کا اعزاز اپنی جگہ لیکن گنے کی ان ورائٹیوں کی سب سے انقلابی خوبی یہ ہے کہ یہ 12 ماہ میں پکنے والی گنے کی عام اقسام کے مقابلے میں محض 7 ماہ میں پک کر تیار ہو جائیں گی۔ محض 7 ماہ میں پک کر تیار ہونے کے باوجود ان کی پیداواری صلاحیت عام ورائٹیوں کے مقابلے میں دو گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ گنے کی نئی تیار کردہ ورائٹیوں کی خوبی یہ ہے کہ چوٹی کا گڑواں جو گنے کا ایک بڑا دشمن کیڑا ہے وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ مزید یہ کہ اس ورائٹی میں جڑی بوٹی کش زہروں کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے اور ایک ہی بارز ہرپاشی کرنے سے ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کا صفایا تو ہوگا لیکن گنے کی فصل بھی ہری بھری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی ورائٹیوں میں جھاڑ مارنے کی صلاحیت عام ورائٹیوں کے مقابلے میں دو گنا ہے لہذا اس کی کاشت کے لئے عام ورائٹیوں کے مقابلے میں نصف بیج استعمال کرنا پڑے گا جس سے لاگت میں بچت آئے گی۔ ماحصل یہ کہ نئی ورائٹیوں کی کم دورانیہ سمیت دیگر خوبیوں کو سامنے رکھیں تو کاشتکار کو عام ورائٹی کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ منافع حاصل ہونے کی امید ہے۔ یہ ورائٹیاں بھی منظوری کے مراحل میں ہیں اور منظوری کے بعد انہیں عام کاشتکاروں کے لئے مہیا کر دیا جائے گا۔

گندم کے حوالے سے بات کی جائے تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، واشنگٹن سٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایسی ورائٹیاں تیار کر رہی ہے جو فروری، مارچ میں آنے والی گرمی کو لہر کو برداشت کر سکیں گی۔ کئی کئی سالوں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ فروری مارچ میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے گندم کی پیداوار میں 10 سے 15 فیصد کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا زرعی یونیورسٹی توقع کر رہی ہے کہ نئی تیار ہونے والی ورائٹیاں فروری، مارچ والی گرمی کی لہر کو برداشت کر سکیں گی جس سے پیداوار میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں ان ورائٹیوں کی پیداواری صلاحیت بھی عام ورائٹیوں سے زیادہ ہوگی۔ ان حوالے سے تحقیق کے نہایت حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور یہ منظوری کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ لہذا امید ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی یہ نئی ورائٹیاں زرعی خوشحالی کی ایک نئی بنیاد فراہم کریں گی اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد مستقبل میں بھی زرعی ترقی و خوشحالی کے لئے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔

صدر پاکستان کی جانب سے تعلیم، تحقیق اور انتظامیہ میں طویل اور ہمہ جہتی خدمات کے اعتراف میں


رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز) کے لیے

پاکستان کے سول ایوارڈ ”ہلال امتیاز“ کا اعلان

انجینئرنگ، توانائی، دیہی ترقی، تعلیم اور ڈیٹا سائنسز جیسے پروگرام شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 100 سے زائد حکومتی کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں اور حکومتی سطح پر تجاویز دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سول سوسائٹی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں کی سربراہی میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، کیوالیس ریسٹنگ کے تحت دنیا کی 66 ویں بہترین یونیورسٹی کے طور پر ابھری ہے۔ ان کی سربراہی میں زرعی یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ 1 ارب سے بڑھ کر 13 ارب تک جا پہنچا ہے جبکہ 23 ارب روپے کے ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔

ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے زرعی یونیورسٹی میں جدت کو فروغ دینے کے لئے اہم اقدامات کئے ہیں۔ 100 سے زائد اختراعات پر مشتمل کیٹلاگ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ بزنس انکوبیشن سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ سال 2022ء میں نیشنل انکوبیشن سنٹر قائم کیا گیا جو انٹر پرائیور شپ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ڈاکٹر اقرار صاحب کی کاوشوں سے زرعی یونیورسٹی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زون کا درجہ دیا گیا جس سے جس سے جدید ٹیکنالوجی کی ڈویلپمنٹ اور پروموشن کو وسعت ملے گی۔ نیشنل سنٹر فار پگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیونگ کے تحت پرسیٹن ایگریکلچرل بک کو بھی قائم کیا جو پاکستان میں پرسیٹن ایگریکلچر کے فروغ میں ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔

ڈاکٹر خان یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، ریور سائیڈ اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر، فیصل آباد سے گریجویٹ ہیں۔ بحیثیت محقق، انہوں نے آلو کی ایک ورائٹی پارس-70 متعارف کروائی۔ اسی طرح آم کی دس نئی اقسام متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے بغیر بیج کے کیٹو کی افزائش پر بھی پائیر تحقیق کی ہے۔ گندم کی نئی نباتاتی اقسام دریافت کرنے کے علاوہ وہ پاکستان میں ترشادہ پھلوں کی بیماری سٹرس گریٹنگ اور عمان میں لیموں اور آم کی بیماریوں سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی منصوبوں کی قیادت کر چکے ہیں۔ ان کے 348 تحقیقی مقالہ جات اور کتابیں/ابواب شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پنجاب ایگریکلچرل کمیشن کے لیے زرعی پالیسی کا مسودہ تیار کیا۔ وہ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز فار ایگریکلچر پالیسی ریویو کے ساتھ منسلک ہیں اور زراعت سے متعلق وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے رکن ہیں۔ عالمی سطح پر ان کے تحقیقاتی کام کا 3319 مرتبہ حوالہ دیا جا چکا ہے۔



پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز) یونیورسٹی آف ایگریکلچر، فیصل آباد کے وائس چانسلر ہیں۔ قبل ازیں وہ 9 سال تک دو یونیورسٹیوں میں بطور وائس چانسلر خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں، غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان، ایم این ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آزاد جموں و کشمیر اور کمالیہ یونیورسٹی کے بانی رکن رہے ہیں۔ انہوں نے 100 سے زائد گریجویٹ ریسرچرز کے تحقیقاتی کاموں کی نگرانی کی اور کئی ایک اعلیٰ سطح کے تحقیقاتی مراکز قائم کئے۔ ان مراکز میں انٹرنیشنل سینٹر فار ڈیٹا اینڈ ڈویلپمنٹ، سینٹر آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی، فرنچ لرننگ سینٹر، چائنیز کنفیو شس انسٹی ٹیوٹ اور پاک کوریائیونیورسٹی سینٹر شامل ہیں۔ ان کی کوششوں سے، سینٹر آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی کو ڈی ایٹ ممالک کے بین الاقوامی تحقیقاتی سینٹر کا درجہ دیا جا چکا ہے۔

ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے زرعی یونیورسٹی کے بین الاقوامی روابط بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جن میں کینیڈا کی ڈلہوزی یونیورسٹی کے ساتھ 2+2 ڈگری پروگرام کے علاوہ امریکہ، فرانس، جرمنی، چائینہ اور کوریا سمیت ڈی ایٹ ممالک کے ساتھ منصوبہ جات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے جدید تعلیم کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے متعدد نئے ڈگری پروگرامز کا اجرا کیا جن میں مائیکرو بیالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، ماحولیاتی سائنسز، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، کلائمیٹ چینج،

Ordre des Palmes académiques جیسا اعزاز قابل ذکر ہے۔ یہ اعزاز حکومت فرانس کا اولین اعزاز ہے جو شعبہ تعلیم میں غیر معمولی خدمات سرانجام دینے والی ملکی و غیر ملکی شخصیات کو عطا کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر اقرار احمد خاں کی تمام تر تعلیمی، تحقیقی اور انتظامی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے رواں سال انہیں ہلال امتیاز کے لئے نامزد کیا ہے۔ یہ اعزاز 23 مارچ 2024ء کو صدر پاکستان ڈاکٹر اقرار احمد خاں کو عطا فرمائیں گے۔

ڈاکٹر اقرار احمد خاں ایک ممتاز قومی پروفیسر، پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے فیلو اور کئی پیشہ ورانہ ایسوسی ایشنز اور سوسائٹیوں کے رکن ہیں۔ انہیں دو سال کے لیے ایچ ای سی کی وائس چانسلر کمیٹی کا چیئر مین منتخب کیا گیا ہے۔ زراعت اور فوڈ سکیورٹی کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں 2012 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ملکی سطح پر ان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ انہیں سرحد پار بھی کئی اعزازات سے نوازا گیا جن میں حکومت فرانس کی طرف سے 2014ء میں عطا کئے جانے والا

وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ



سراہتے ہوئے کہا کہ زرعی یونیورسٹی میں واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے تعاون سے گندم کی زیادہ پیداوار دینے والی گندم کی نئی اقسام تیار کی جا رہی ہیں جس کو اگلے سال کاشتکاروں تک پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں سویا بین کی پیداوار گزشتہ پندرہ سالوں سے حاصل کی جا رہی ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے ملک میں سویا بین کی فروغ کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی کا سویا بین کی نئی اقسام تیار کرنے کا عمل قابل تحسین ہے جس کو کاشتکار تک پہنچا کر اربوں روپے کی سویا بین کی درآمد سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امسال ملک نے کپاس اور گندم کی بہترین پیداوار حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ کابینہ کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ

وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا۔ دورہ کے دوران سائنسدانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ زرعی ترقی ملکی خوشحالی کی ضامن ہے جس کے لیے زرعی سائنسدانوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والے زیادہ پیداوار کی حامل اقسام تیار کرنا ہونگی تاکہ زرعی پیداواریت کو بڑھاتے ہوئے غذائی استحکام کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب امین ایم تنویر، سیکرٹری زراعت ناوڑ چٹھہ، پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ پنجاب چیئر مین افتخار علی سہو، آئی جی پنجاب و دیگر بھی موجود تھے۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز) نے یونیورسٹی کی تاریخ، جاری تعلیمی و تحقیقی منصوبہ جات و زرعی مسائل کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے کردار کو

کو رواج دیا جائے تو اس سے نہ صرف غذائیت کی کمی کے جملہ مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گندم کی درآمد کو بھی ختم کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکئی قیمت کے اعتبار سے نسبتاً سستی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی حاصل ہے اور یہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی میں یو ایس ایڈ کے تعاون سے مرکز برائے اعلیٰ تعلیم، پاک کوریا نیوٹریشن سنٹر، انٹرنیشنل سیڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری، چائے کنفیوژیشن سنٹر، ڈی ایٹ سنٹر قائم کر دیئے گئے ہیں۔

صوبہ بھر میں تحقیقی ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ انڈسٹری اور معاشرے کو درپیش مسائل کا سائنسی بنیادوں پر حل تلاش کیا جاسکے۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی پنجاب حکومت کے تعاون سے گزشتہ چند سالوں سے گندم بڑھاؤ مہم میں دس روز کے لیے فیکٹی و طلبہ کو کھیت کھلیان کھلیان بھیجتی ہے تاکہ کاشتکاروں کو زرعی سائنسدانوں کی سفارشات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی کسانوں کے مسائل سے آگاہی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ زرعیہ میں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے داخلوں کا منظم نظام موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گندم میں بیس فیصد تک مکئی کی آمیزش سے آٹے

محمد بلخ الرحمان گورنر پنجاب / چانسلر جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے زیر صدارت سینٹ کے 50 ویں اجلاس کا انعقاد



کا حصول ممکن بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیاری تعلیم اور علم کی بنیاد پر معیشت کے خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی نہ صرف تعلیم و تحقیق میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ طلبہ کی خداداد صلاحیتیں نکھارنے کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین انسان بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ معاشرے میں عدم برداشت کی فضا پیدا ہو گئی ہے جس کے لیے ہمیں برداشت، محبت اور اختلاف رائے کے احترام کے ماحول کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2013-14 میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ انڈسٹری کو ان کے مسائل کا مقامی حل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جدت کو بھی فروغ دیا جائے جو کہ علم پر مبنی معیشت کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے شہداء کی

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں سینٹ کے 50 ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت محمد بلخ الرحمان گورنر پنجاب / چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے کی۔ اجلاس میں زرعی یونیورسٹی کا بیس ارب سے زائد مالی سال 2023-24 کا بجٹ منظور کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کے ہمراہ یونیورسٹی میں وسیع و عریض ووبین سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر کیا۔ پنجاب حکومت کے زیر اہتمام پراجیکٹ پر 31 کروڑ روپے لاگت سے 55296 مربع فٹ پر قائم ووبین سپورٹس کمپلیکس میں کثیر المقاصد ہال، اولمپک معیار کا سویمنگ پول، سکوائش کورٹ، فٹنس سنٹر و دیگر سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین نے کھیلوں کے میدان میں بھی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں۔ مزید برآں یونیورسٹی کی سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جنہیں ہنرمند بنا کر ہی بہترین مستقبل

43 ویں بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ زرعی یونیورسٹی نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی تعلیم و تحقیقی امور پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے تعاون سے زیادہ پیداواریت کی حامل اور موسمیاتی تغیرات کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی گندم کی نئی اقسام متعارف کروا رہی ہے جبکہ پانچ گنا زیادہ چنے کی پیداوار حاصل کرنے والی اقسام پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی یونیورسٹی نے سویا بین کی نئی وراثی کے سو مقامات پر نمائش کھیت لگائے ہیں تاکہ زیادہ پیداوار کی حامل وراثت کو کاشتکاروں تک پہنچایا جاسکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زرعی یونیورسٹی میں بین الاقوامی فنڈنگ سے مرکز برائے اعلیٰ تعلیم، چائنیز کنفیوشس سنٹر، بین الاقوامی سٹیڈیٹنگ لیب، پاک کوریائیونیٹریشن سنٹر قائم کیے گئے ہیں جو کہ ملک میں غذائی استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔

قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی نے سات ہزار سے زائد طلبہ کو سکالرشپس فراہم کیے جا رہے ہیں جبکہ مالی مشکلات رکھنے والے طلبہ کے لیے ٹیچنگ اسسٹنٹس، فی گھنٹہ ورکنگ و دیگر سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی میں کوئی بھی طالب علم مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم نہیں چھوڑتا اس کے لیے تعلیمی وظائف کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی یونیورسٹی زراعت کے مسائل کا مقامی حل تلاش کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات عمل میں لا رہی ہے۔ زرعی یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا شمار دنیا کی سو بہترین جامعات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یو ایس رینٹنگ کے مطابق زرعی یونیورسٹی ایگریکلچر سائنسز میں دنیا کی 66 ویں بہترین جامعہ ہے جبکہ نیشنل تائیوان یونیورسٹی رینٹنگ کے مطابق اس کا شمار دنیا

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ پرائم منسٹر یوتھ لپ ٹاپ سکیم کے تحت طلبہ میں لپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب



ٹاپ دیے گئے۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لپ ٹاپ سکیم کا آغاز 2008 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف کے دور حکومت میں کیا گیا تھا جس میں اب تک دس لاکھ سے زائد مستحق اور ذہین طلبہ میں لپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکیم کے اس تیسرے فیڑ میں ملک بھر میں ایک لاکھ لپ ٹاپ طلبہ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے تعلیمی سفر کو احسن انداز میں جاری و ساری رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ لپ ٹاپ سکیم کی وجہ سے ملک کی آئی ٹی انڈسٹری تربیت یافتہ افرادی قوت کی وجہ سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لپ ٹاپ سکیم کی بدولت طلبہ فری لانسنگ کے ذریعے ہر سال ملک لاکھوں ڈالر کا

جامعہ زریعہ فیصل آباد میں پرائم منسٹر یوتھ لپ ٹاپ سکیم کے تحت طلبہ میں لپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے داخلہ رانا ثناء اللہ تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کروانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین مستقبل کے حصول کو ممکن بنا سکیں۔ تقریب میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی چار جامعات بشمول زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ کو میریٹ کی بنیاد پر لپ

زرمبادلہ کمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2008 میں دوا رب کی مالیت سے مستحق طلبہ کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا تھا جس کو 2018 میں بیس ارب تک پہنچا دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آنے والے سالوں میں اسے سوارب تک لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہترین تعلیمی سہولتوں سے آراستہ مستحق طلبہ کے لیے دانش سکول کا اجرا کیا گیا تھا اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو دانش سکول کو ہر تحصیل میں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے صرف فیس کی وجہ سے محروم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈاکٹر اور انجینئر پوری دنیا میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ساٹھ ہزار نو جوانوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے ہیں تاکہ وہ انٹر پرائیور بننے ہوئے نوکری تلاش کرنے کی بجائے نوکری دینے والے بنیں۔ اس موقع پر زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد

خاں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی نے 2014 میں مرکز برائے اعلیٰ تعلیم کے تحت آئی ٹی بیسڈ پریسین ایگریکلچر پر کام شروع کیا تھا اور اب اس کو ملکی سطح پر پزیرائی حاصل ہوئی ہے جس سے ناصرف پیداواریت میں اضافہ ممکن ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ چائنہ میں اس وقت پینتیس ہزار پاکستانی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ کی تعداد تمام پاکستانی جامعات کے طلبہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ سکیم سے اب تک اٹھائیس ہزار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ مستفید ہو چکے ہیں اور سکیم کے تیسرے مرحلے میں زرعی یونیورسٹی کے چھیس سو طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری میں ترقی کی وجہ سے پاکستان ہر سال اربوں روپے زرمبادلہ کماتا ہے۔ وفاقی وزیر نے زرعی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سیڈ ٹیسٹنگ لیب کا افتتاح کیا۔ انہوں نے زرعی یونیورسٹی میں جاری سویا بین پراجیکٹ کے تحت سونمائی پلاٹ لگانے پر کاشتکاروں میں چیکس بھی تقسیم کیے۔

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں یوم دفاع کے حوالے سے ”افکار اقبال اور دفاع پاکستان“ کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد



اقبال کا شاہین بن کر معاشرے میں پھیلی تاریکیوں کو اجالوں میں تبدیل کر سکیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ نو جوانوں نے ملکی دفاع کے لیے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نو جوان نسل کو افکار اقبال سے روشناس کروانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری ہیں تاکہ وہ معاشرے پر فعال شہری بن کر ترقی کی نئی راہیں ہموار کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شاعر مشرق نے جس طرح مسلمانوں کے حالات اور اس نبرد آزما ہونے کے لیے لائحہ عمل اپنی شاعری میں پیش کیا اگر عوامی سطح پر اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو ہم تیزی سے ترقی کریں گے۔ شاعر مشرق کے پوتے سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ اداروں میں تمام صوبوں اور طبقتوں کی نمائندگی ترقی کے لیے ناگزیر ہے تاکہ تمام طبقات یکجا ہو کر ملک کو درپیش مسائل

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں یوم دفاع کے حوالے سے افکار اقبال اور دفاع پاکستان کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز) نے کی جبکہ صوبائی وزیر برائے قانون کنور محمد دلشاد مہمان خصوصی تھے۔ سیمینار میں علامہ محمد اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال نے بھی شرکت کی۔ سیمینار کا انعقاد مجلس رومی اقبال اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اشتراک سے اقبال آڈیٹوریم میں کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کنور محمد دلشاد نے کہا کہ پاکستان کو بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم قربانی کے جذبے سے سرشار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نو جوان نسل میں افکار اقبال کو عام کرنا ہوگا تاکہ افکار شاعر مشرق سے روشناس ہوتے ہوئے

ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل آباد عابد کمالوی، سینئر یوٹر ڈاکٹر شوکت علی، شاہد محمود بٹ، قیوم نظامی، ڈاکٹر وحید الزمان طارق، زکی سید، طارق مرزا، محمد اعجاز شیخ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔

کاحل تلاش کرکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت نوجوان نسل میں اقبال کا شاہین کی خصوصیات پیدا کرنا ہوگی۔ انہوں نے اس موقع پر اقبال کے اشعار بھی پیش کیے۔ اس موقع پر پرنسپل آفیسر پی آر پی پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف، سابق

جامعہ زریعہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ حکومت پاکستان کے 37 ویں مڈکیریر مینجمنٹ کورس کے شرکاء کی آمد



خاں نے کہا کہ یونیورسٹی گئے، سویا بین، چیا سیڈ اور کینولا کی نئی اقسام کے ساتھ ساتھ امریکی واشنگٹن سٹیٹ یونیورسٹی کے تعاون سے گندم کے بیج پر بھی پیش رفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دس ارب ڈالر سے زائد سالانہ خوردنی تیل و دیگر زرعی اجناس کی درآمد پر خرچ کیے جا رہے ہیں جسے مقامی سطح پر ان فصلات کی پیداوار میں اضافے کی صورت میں کم سے کم سطح پر لایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی پولٹری انڈسٹری کامیابی کی ایک ایسی داستان ہے جسکی وجہ سے غذائیت کی کمی اور پروٹین کی وافر فراہمی میں بھرپور مدد ملی ہے۔ سویا بین کو فروغ دے کر پولٹری فیڈ کے ساتھ ساتھ خوردنی تیل کا درآمدی بل محدود کیا جاسکتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور کے فیکلٹی ممبر اور گروپ لیڈر ڈاکٹر محمد فاروق نے یونیورسٹی کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس دانشگاه نے ملکی زرعی منظر نامے کو سبز بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے اس کے تناظر میں توقع کی جاسکتی ہے کہ نئے سبز انقلاب کا سہرا بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے سائنسدانوں اور ماہرین کے سر پر سبے گا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ہونے والی تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کی تعریف کرتے ہوئے اسے دیگر جامعات تک فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد 1960 کی دہائی میں زرعی انقلاب کی طرح حال ہی میں شروع کیا جانے والا سرسبز پاکستان منصوبہ کی کامیابیوں کے لیے صف اول کا کردار ادا کرے گی۔ اس مقصد کے لیے جینیاتی تنوع اور نئی جدتوں کی حامل ٹیکنالوجی پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے سنڈیکیٹ ہال میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ حکومت پاکستان کے 37 ویں مڈکیریر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی برآمدات میں اضافے اور درآمدی بل میں کمی لانے کے لیے ہمیں نئی جدتوں کی حامل ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کپاس کی پیداوار میں بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگی کے لیے ہمیں پریسین ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں بیج کی تیاری اور کسان تک رسائی کے لیے سامان کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھنگ کے ریشے سے پارچات کی تیاری کے ذریعے بین الاقوامی منڈی میں ہم اپنا حصہ ڈالتے ہوئے خطرے زرمبادلہ کما سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایم اوفصلات پیداواریت میں اضافے کے لیے اہمیت کی حامل ہیں اس مقصد کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات بروئے کار لا کر مثبت نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقرار احمد

چائے کی اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز اور شعبہ انٹومالوجی، جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے مابین معاہدے پر دستخط



ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ لیبارٹری کا قیام زرعی ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چائے کی اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کے ساتھ مشترکہ تحقیقی منصوبہ جات شروع کیے جائیں گے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کے لیے مشترکہ کوششیں کی جاسکیں۔ انہوں نے کہا کہ چائے زراعت کے میدان میں بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جلال عارف نے کہا کہ وائٹ فلائی، گلابی سنڈی، آرمی وارم ودیگر پر چائے کے ساتھ مل کر تحقیقی منصوبہ جات پر کام کیا جائے گا تاکہ ان مسائل پر قابو پا کر غذائی خود کفالت کو یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اقرار احمد خاں کے زیر قیادت زرعی یونیورسٹی ترقی کی نئی منازل طے کر رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جعفر جسکانی نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی کو نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائے کے ساتھ تعاون زرعی ترقی کے نئے ابواب مرتب کرے گا۔ ڈاکٹر محمد ثاقب نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی چائے کے زرعی اداروں کیساتھ بہترین تعلقات استوار کیے ہوئے ہے۔ کیان یونے کہا کہ مشترکہ لیبارٹری کے قیام سے زرعی ترقی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو بھی فروغ ملے گا۔ وانگ یانگ کنگ نے کہا کہ سنجیا گروپ کی جانب سے مشترکہ لیبارٹری کے قیام کے لیے تمام ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ڈاکٹر گوگلفی اور ڈاکٹر عابد علی نے مشترکہ لیبارٹری کے اہداف کے بارے میں بریفنگ دی۔

چائے کی اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروڈکشن اور شعبہ انٹومالوجی، جامعہ زرعیہ فیصل آباد کے مابین پاک چائے مشترکہ لیبارٹری برائے کراپ پیسٹ مینجمنٹ کے قیام کے لیے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ بیجنگ میں منعقدہ تقریب میں معاہدے پر دستخط چین کے انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے ڈائریکٹر جنرل لوہوئی اور زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کیے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ادارے پاکستان اور چائے میں کراپ پیسٹ پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کاوشیں عمل لائیں گے اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کے زیر اہتمام تجربات، تحقیقات اور ٹریننگ کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر زرعی یونیورسٹی کے چیئرمین شعبہ انٹومالوجی پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف، ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر جعفر جسکانی، ڈائریکٹر بیرونی تعلقات پروفیسر ڈاکٹر محمد ثاقب، ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد علی اور چائے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شعبہ بیرونی تعلقات چائیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کیان یو، ڈپٹی ڈائریکٹر دوطرفہ تعلقات ڈویژن چائیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز یانگ شوا، ایگزیکٹو آفیسر سنجیا گروپ چائے وانگ یانگ کنگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروڈکشن لیو ونڈ بھی موجود تھے۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیپارٹمنٹ آف ریسرچ اور بیرونی تعلقات انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروڈکشن ٹیان فانگ نے کی۔ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ پاکستان میں کراپ پیسٹ مینجمنٹ اور غذائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مربوط کاوشیں کرنا

جامعہ میں پاکستان کے 76 ویں جشن آزادی کی رنگارنگ تقریبات



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز مرکزی جامعہ مسجد میں ملکی ترقی و سلیمیت کی دعاؤں سے کیا گیا۔ مرکزی تقریب اقبال آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں اور ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر مہمان

ترقی کا نیا باب مرتب کریں گے۔ پروفیسر وائس چانسلر / ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خاں نے کہا کہ نوجوانوں کی خداوند صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی تمام ممکنہ اقدامات عمل میں لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ سے نوجوان نسل کو روشناس کروانا ضروری ہے تاکہ وہ اس ملک کو حاصل کرنے میں قربانیاں سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔ پرنسپل آفیسر تعلقات عامہ و مطبوعات پروفیسر ڈاکٹر جلال عارف نے کہا کہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کی ولولہ انگیز قیادت میں جامعہ زریعیہ غذائی استحکام کے حصول کے لیے زرعی مسائل کے حل اور کاشتکاروں کو جدید رجحانات سے روشناس کرانے کے تمام کاوشیں بروئے کار لا رہی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی

خصوصی تھے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رئیس جامعہ ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ آزادی کی قدر و منزلت محکوم قوموں سے بہتر کوئی نہیں جانتا جو کہ ظلم و بربریت کی شکار اور غلامی کی چکی میں پسی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملکی ترقی اور وطن عزیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پیغامات کو نئی نسل میں عام کر کے ترقی کے سفر کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برصغیر کی پہلی زرعی دانش گاہ جامعہ زریعیہ فوڈ سیورٹی اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ چلی سطح پر غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وافر خوراک پیدا کی جا



غذائی جزییات احسن انداز میں پوری کی جاسکیں۔ سینئر ٹیوٹر آفس اور لیبارٹری سکولز اینڈ کالج سسٹم کے تحت طلبہ نے ملی نغمے اور وطن کی محبت سے سرشار خاکے پیش کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اقرار احمد خاں اور ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر سینئر ٹیوٹر ڈاکٹر شوکت علی، ڈاکٹر رابعہ فریدی، طیبہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔

سکے۔ علی عنان قمر نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے تاہم یہ نوجوان نسل پر پوری محنت کے ساتھ تعلیم اور اپنے شعبوں میں تربیت حاصل کرے تاکہ مستقبل میں پاکستان کو درپیش چیلنجز کا احسن انداز میں مقابلہ کیا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی نوجوان نسل میں سے ہی مستقبل کے ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس، سائنسدان اور دیگر شعبہ جات کے ماہرین دستیاب ہونگے جو کہ ملکی

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں یوم شجرکاری کی تقریب



ہے اور یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کا درجہ حرارت باقی شہر کی نسبت ایک سے دو درجے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ یونیورسٹی میں تین ہزار پودے لگائے گئے ہیں جس میں مین کیپس، پارس کیپس اور چکیر فارم شامل ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹر فارم کو ہدایات کی ہیں کہ چوکیرہ فارم کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے تمام ممکنہ کاوشیں عمل میں لائی جائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خاں نے کہا کہ ہمیں عوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے اس موقع پر گرین یوتھ موومنٹ کے پراجیکٹ کے تحت زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں مخصوص سٹائل والی چھ عدد ڈسٹ بین بھی تقسیم کیں۔ اس موقع پر ڈیپارٹمنٹ آف فارسٹری اور ڈیپارٹمنٹ آف رورل سوشیالوجی کے تعاون سے واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ واک کے اختتام پر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نوید فرح، ڈاکٹر محمد آصف اور طلبہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں یوم شجرکاری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جس کی صدارت رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز) نے کی۔ اس موقع پر پرووائس چانسلر / ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خاں چیئرمین فارسٹری ڈاکٹر عرفان احمد، چیئرمین رورل سوشیالوجی ڈاکٹر اظہار احمد خاں، ٹریٹر عمر سعید قادری، ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد، ڈائریکٹر فارم ڈاکٹر صفدر علی، ڈاکٹر ہارون و دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب کا انعقاد ڈیپارٹمنٹ آف فارسٹری اور ڈیپارٹمنٹ آف رورل سوشیالوجی کے باہمی تعاون سے کیا گیا۔ ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے جس کی وجہ سے زراعت کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف گرین نیٹ بڑھانا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آلودگی پر بھی قابو پانے کے لیے موثر اقدامات عمل میں لانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی کا شمار دنیا کی اولین گرین جامعات میں ہوتا

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں سٹرس کی بحالی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں کی سربراہی میں سٹرس کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ اس کی پیداوار میں اضافے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معیارات کو بھی یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی ترقی کا انحصار زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ماہرین اکیڈمی، انڈسٹری اور پالیسی سازوں کو فوڈ سیکورٹی کے حصول کے لیے مشترکہ کاوشیں عمل میں لانا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے زرعی ادارے بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی

صوبائی وزیر برائے زراعت، انرجی، انڈسٹری، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ سکل ڈیولپمنٹ ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ حکومت سٹرس کی پیداوار کو بڑھانے اور کاشتکاروں کی درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں جس کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے تاکہ سٹرس کو درپیش چیلنجز بشمول زہری، بیماریوں کی روک تھام اور تصدیق شدہ بیج کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جاسکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ سٹرس کی بحالی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی



اور 2021 میں 27.1 ہے۔ انہوں نے ملک میں کم بیجوں والے سٹرس کی اقسام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا جس کی بین الاقوامی سطح پر مانگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈسٹری پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ جدید زراعتی میکنزم تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے موجودہ سٹرس باغات کی بحالی وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے زیادہ تر باغات غذائی اجزاء کی کمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باغات میں باقاعدگی سے مٹی، پانی اور پتوں کا تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ ڈی جی ایکسٹینشن پنجاب اشتیاق حسن، چیف سائنسٹ ایوب ریسرچ ڈاکٹر محمد اختر، پرو وائس چانسلر/ ڈین زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خاں، سابق ڈی جی ایکسٹینشن ڈاکٹر انجم علی، ڈاکٹر محمد نواز میکن، زرعی یونیورسٹی کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال، پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ رضوی، پروفیسر ڈاکٹر اعظم خاں، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، پروفیسر ڈاکٹر خالد مشتاق، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز بھٹی؛ 13 پرنسپل آفیسر پی آر پی پروفیسر ڈاکٹر جلال عارف، پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک، ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر جعفر جکانی، پروفیسر ڈاکٹر آصف کامران، پروفیسر ڈاکٹر ریاض ورک، ڈاکٹر عامر مقصود گل، ڈاکٹر محمد دلدار خاں گوگی، ڈاکٹر محمد طیب، ڈائریکٹر ایکسٹینشن فیصل آباد چوہدری عبدالحمید، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن قوی ارشاد اور دیگر نے شرکت کی۔

ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کاوشیں عمل میں لارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار زرعی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ دنیا بھر میں کم بیجوں والے سٹرس کو پسند کیا جاتا ہے۔ زرعی یونیورسٹی نے کیلوفورنیا یونیورسٹی کے تعاون سے پاکستان میں کیو کو متعارف کروایا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ سٹرس کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا جس سے ہماری سٹرس کی پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سٹرس کی بحالی کے لیے تصدیق شدہ بیج کی زرخیز یوں کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی سی پیک کے تحت چائینہ کے تعاون سے ہارٹیکلچر پارک کے قیام کے لیے اقدامات کر رہی ہے جس سے زرعی ترقی کو نئے ابواب کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی نے یونیورسٹی آف کیلوفورنیا کے تعاون سے سٹرس سلائیڈز پر پراجیکٹ مکمل کیا ہے جس میں ڈاکٹر مارکو ڈول اور چیئر مین شعبہ انٹو مالوجی پروفیسر ڈاکٹر جلال عارف و دیگر نے کاوشیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف اے او کی رپورٹ کے مطابق ملک میں سٹرس کی پیداوار 1970 میں 10.2 ٹن فی ہیکٹر تھی جو کہ اب 2021 میں 11.6 ٹن فی ہیکٹر ہو گئی ہے جبکہ چین میں 1970 میں سٹرس کی پیداوار 2.29 ٹن فی ہیکٹر تھی۔ جو کہ اب 2021 میں 15.3 ٹن فی ہیکٹر، برازیل میں 1970 میں 15 ٹن فی ہیکٹر

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں افغانستان ایگری بزنس فورم کا انعقاد

لیے مشترکہ حکمت عملی اور کاوشیں کرنا ہوگی تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان بالخصوص خوراک کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ پوری دنیا کو غذائی عدم استحکام کے چیلنجز نے اپنی پلیٹ میں لیا ہوا ہے۔ افغانستان میں

امعہ زرعیہ فیصل آباد میں افغانستان ایگری بزنس فورم کا انعقاد کیا گیا۔ بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سلاک آرگنائزیشن فار فوڈ سکیورٹی (IOFS) کے ڈائریکٹر جنرل یرلان اے بیدولت نے کہا ہے کہ غذائی عدم استحکام اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے رکن ممالک کو متاثر کر رہا ہے جس کے



الوکازی نے کہا کہ افغانستان میں زراعت کے شعبے میں بہت مواقع ہیں۔ افغانستان میں روایتی زراعت کو جدید زراعت کی طرف منتقل کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے زرعی یونیورسٹی کو معاونت کرنا ہوگی۔ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر خالد مشتاق نے کہا کہ زراعت کا شعبہ غربت کے خاتمے سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختراعی سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر آصف کامران نے کہا کہ ترقی کے لیے کھیت سے کھانے کی میز تک زراعت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہونگے۔ انچارج برنس مینجمنٹ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر عبدالغفور نے آئی سی کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ زرعی شعبے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ ڈاکٹر حماد بدر نے کہا کہ فورم مشترکہ زرعی مسائل کے حل پر مبنی راستہ وضع کرے گا۔ آئی سی آئی اے کے برنس ڈیولپمنٹ سربراہ سید سعد علی پاشا اور ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر جعفر جسکانی دیگر نے بھی خطاب کیا۔

فوڈ سیکورٹی پروگرام کے تحت دیہی علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی سمیت زراعت کے حوالے سے مختلف منصوبہ جات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے افغانستان میں کوئیک امپیکٹ پراجیکٹس کے تحت زرعی میکائنائزیشن اور بہتر زرعی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ معیاری بیج، کھاد، زرعی مشینری اور کٹائی کے بعد کی ٹیکنالوجی جیسے اقدامات کیے ہیں۔ افغانستان کی تقریباً 58 فیصد اراضی قابل کاشت ہے جو کہ کل تقریباً 37,910 ہیکٹر ہے تقریباً 76 فیصد افغان باشندے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہے اور بڑھتی ہوئی دنیا کے لیے فوڈ سیکورٹی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششیں کرنا ہونگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو کر زرعی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زمین اور پانی کے وسائل پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی کا شمار برصغیر کی اولین زرعی جامعات میں ہوتا ہے اور اس نے سمرات انقلاب اور بھوک کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان افغانستان چیئرمین آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے کو صدر خان جان

امریکی قونصل جنرل لاہور کرسٹن کے ہانز کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد امریکہ کی مختلف جامعات بشمول یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور واشنگٹن سٹیٹ یونیورسٹی اور دیگر جامعات کے ساتھ تعلیمی و تحقیقی میدان میں بہترین تعلقات استوار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے امریکی قونصل جنرل کو زرعی یونیورسٹی میں جاری تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں اور یونیورسٹی کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلیمی و تحقیقی میدان میں ہابریڈ پروگرام شروع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ زرعی چیلنجز سے احسن انداز میں نمٹنے میں مدد ملے گی۔

امریکی قونصل جنرل لاہور کرسٹن کے ہانز نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز) سے ملاقات کے دوران تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وائس چانسلر نے 200 طلباء کے لیے USD 131,898.91 کے تیسرے انگلش ایکسیس مائیکرو اسکالرشپ پروگرام کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکی قونصل جنرل لاہور نے امریکی محکمہ خارجہ کے تعاون سے انگریزی زبان کے پروگرام چلانے پر زرعی یونیورسٹی کے تعاون کو سراہا۔ انگلش ایکسیس مائیکرو اسکالرشپ پروگرام کا مقصد پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو انگریزی زبان اور مختلف صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔

پاکستان میں بیج کی صنعت: بحران اور بحالی

پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں (ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز)

رئیس جامعہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کے اندر اندر کپاس کی پیداوار 3 ملین سے بڑھ کر 12 ملین گانٹھ سالانہ تک جا پہنچی۔ جس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو وسعت ملی اور ملکی معیشت پھلی پھولی۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی زیادہ تر زمینوں پر وہی مزارعین کام کرتے تھے جو کبھی رابرٹس سیڈ ایسوسی ایشن کے ساتھ وابستہ تھے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر سرکاری اداروں کا معاملہ ہے، مزارعین کے مظاہروں کے بعد، پنجاب سیڈ کارپوریشن زیادہ تر زمینی وسائل سے محروم ہوتی چلی گئی اور آج یہ ادارہ بیج کے کاروبار میں اپنی غیر معمولی شناخت کھو چکا ہے۔

آج جبکہ دنیا بھر میں بیج کے انقلاب نے زراعت کو تبدیل کر دیا ہے، پاکستان میں بیج کا بحران گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبز انقلاب کے ابتدائی دنوں میں، چھوٹے قد اور زیادہ پیداوار دینے والی گندم کی میکسی پاک ورائٹی کو متعارف کروانے میں ہمارا اہم کردار تھا۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں کپاس کی پیداوار میں بھی ترقی دادہ اقسام کی بدولت تبدیلی آئی۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران مکئی کی پیداوار میں تقریباً دس گنا (ہائبرڈ بیجوں کے متعارف ہونے کی وجہ سے) اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح بہتر بیجوں کی وجہ سے چاول کی پیداوار بھی چار گنا بڑھ چکی ہے۔

یہ سب کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی درست ہے کہ 100 سال پہلے سرولیم رابرٹس کا لکھا گیا وائٹ پیپر، گندم اور کپاس کے معیاری بیج کے حوالے سے آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ دیکھا جائے تو گندم کی پیداوار جود کا شکار ہے۔ کپاس کی فصل ہمارے ہاں بار بار ناکام ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ معیاری بیج کی عدم دستیابی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جی ایم فصلوں کو ریگولٹ کرنے کے لیے 2005 کا بائیو سیفٹی قانون، 2015 کے سیڈ ایکٹ میں ترامیم اور 2016 کا پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ گندم اور کپاس کے بیجوں کے معیار کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود محض 39 فیصد بیج تصدیق شدہ ہیں۔ ان تصدیق شدہ بیجوں میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے فراہم کردہ ہائبرڈ بیج کا ایک بڑا حصہ شامل ہے۔

گندم، ہماری ایک اہم فصل ہے جو سب سے زیادہ 22 ملین ایکڑ رقبہ پر

سرولیم رابرٹس 1917 سے 1925 کے دوران پنجاب ایگریکلچر کالج اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، لائل پور (حالیہ زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد) کے پرنسپل رہے۔ تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے پنجاب کی دو بڑی فصلوں، کپاس اور گندم کے بیج کے بحران کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر لکھا تھا۔ اُس وقت کی حکومت نے گندم اور کپاس کے معیاری بیج کی پیداوار شروع کرنے کے لیے پیرووال (خانیوال) میں سر رابرٹس کولیز پر زمین فراہم کی۔ سر رابرٹس نے اپنی کالج کی نوکری چھوڑ کر رابرٹس سیڈ ایسوسی ایشن اور رابرٹس جنگ ملز جیسا ادارہ قائم کیا۔ کاروبار میں تیزی آئی تو نواب آف بہاولپور نے بھی انہیں رحیم یار خان میں ایک قطعہ زمین فراہم کر دیا۔ ایک زمانے میں، رابرٹس خاندان، 13 جنگ فیکٹریوں کے ساتھ اس علاقے میں بیج کے کاروبار کی قیادت کر رہا تھا۔

سرولیم نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی۔ اس فاؤنڈیشن کے تحت، لائل پور (حالیہ فیصل آباد) اور بنگور، ویلز۔ پو کے (جہاں سر رابرٹس کا سکول تھا) کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی امیدواروں کے لیے اسکالرشپ فنڈ قائم کیا گیا۔ میں لائل پور میں ماسٹر ڈگری اور پھر یونیورسٹی آف ویلز میں پی ایچ ڈی کے لیے سرولیم رابرٹس اسکالرشپ حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ایک تھا۔ البتہ بعد ازاں میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، ریور سائڈ، امریکہ چلا گیا اور مجھے اس اسکالرشپ کی ضرورت نہیں رہی۔ پیرووال اسٹیٹ 1970 کی دہائی میں لیز کی میعاد ختم ہونے پر زوال کا شکار ہو گئی۔ یہی کچھ رحیم یار خان میں ہوا اور رفتہ رفتہ یہ فاؤنڈیشن، بیج کی صنعت اور وظائف سب کچھ ختم ہو گیا۔

بعد ازاں پیرووال اسٹیٹ کو ایک نئے وجود میں آنے والے ادارے، پنجاب سیڈ کارپوریشن کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری طرف طاقتور اثرافیہ نے رحیم یار خان اسٹیٹ پر قبضہ کر لیا۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن نے 1970 کی دہائی کے آخر میں ایک اچھی شروعات کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گرمی برداشت کرنے والی کپاس کی نئی اقسام نیاب 78 اور ایس 12 متعارف ہو چکی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب 1976 کا سیڈ ایکٹ نافذ ہوا۔ 70 کی دہائی میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کو تصدیق شدہ بیج فراہم کرنے والے اہم ادارے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ لہذا ایک دہائی



نئی شعبہ بھی برائیوں سے مبرا نہیں ہے۔ پاکستان میں تقریباً 900 رجسٹرڈ سیڈ کمپنیاں ہیں جنہیں شائد ہی رابرٹس کے معیار پر پرکھا جاسکے۔ کھبیوں کی طرح اگنے والی ان کمپنیوں کی طرف سے جعلی بیجوں کی سپلائی ایک اہم شکایت ہے۔ تقریباً پانچ ملٹی نیشنل کمپنیاں بہتر کام کر رہی ہیں البتہ یہ بھی مثالی نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ کمپنیاں پاکستان میں بیج پیدا نہیں کرتیں اور دوسرے ممالک میں تیار کردہ بیج یہاں فروخت کر رہی ہیں۔

ہم نے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے تعاون سے، معیاری بیج کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے 4.4 ارب روپے کا پبلک سیکٹر منصوبہ شروع کیا ہے جس میں نئی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس اسکیم میں تمام مروجہ قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بین الاقوامی معیار کا بیج پیدا کیا جائے گا۔ ہمارا مقصد ایسا بیج تیار کرنا ہے جو انٹرنیشنل سیڈ ٹیسٹنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے مقرر کیے گئے معیار پر پورا اتر سکے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ان معیارات پر عمل پیرا ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان معیارات پر پورا اترنے کے لیے مقامی کمپنیوں کی استعداد اور صلاحیت میں اضافہ کریں اور یہی ہم اس منصوبے میں کرنے جارہے ہیں۔

اس منصوبے کے تحت فیصل آباد میں انٹرنیشنل سیڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کی جائے گی جس میں دو آؤٹ ریج سینٹر ہوں گے، ایک کوئٹہ اور دوسرا نارووال میں۔ تربیت اور صلاحیت بڑھانے کا کام چاروں صوبوں میں زرعی یونیورسٹیوں کے تعاون سے کیا جائے گا۔ موجودہ سائنس اور کاروباری طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ بیجوں کے بارے میں 100 سال پہلے سروہم رابرٹس کے لکھے ہوئے وائٹ پیر کی روح کو زندہ کرنے کے لیے حقیقی کاوشیں کریں۔

کاشت کی جاتی ہے۔ وسطی پنجاب میں کیے گئے ہمارے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ کسان ایک ہی بیج مسلسل دس سال تک استعمال کرتا رہتا ہے۔ جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مارکیٹ میں ہر سال 0.5 ملین ٹن سے زیادہ تصدیق شدہ گندم کا بیج دستیاب ہوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر 50 فیصد کاشتکاروں کو ہر سال نیا بیج استعمال کرنا چاہئے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان اعداد و شمار کو مشکوک سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال نومبر میں سروے کیا جائے تاکہ تصدیق شدہ بیج کی دستیابی کے حوالے سے حقائق سامنے آسکیں۔

سبز انقلاب اور بعد ازاں 1980 کی دہائی میں کپاس کی انقلابی پیداوار والا وقت اب نہیں رہا جب پنجاب سیڈ کارپوریشن سمیت سرکاری محکموں کا طوطی بولتا تھا۔ آج سرکاری محکموں کے پاس صرف کامیابی کی کہانیاں رہ گئی ہیں جبکہ پرائیویٹ سیکٹر سرکاری اداروں کی جگہ لیتا چلا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رابرٹس فارمز بھی نئی شعبے کی ہی ایک تنظیم تھی۔ وقت آگیا ہے کہ بیج کے شعبے کو آزاد کیا جائے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اجازت دی جائے۔ گورنمنٹ بریڈرز اور یونیورسٹیوں کو جرم پلازم پر توجہ دینی چاہیے جبکہ ورائٹیوں کی تیاری اور مارکیٹنگ کو نئی شعبے پر چھوڑ دیا جانا چاہئے۔

تین وفاقی قوانین، 18 ویں ترمیم کے نتیجے میں بے اثر ہو چکے ہیں کیونکہ ان قوانین کو نافذ کرنے کی صلاحیت صوبوں کے پاس نہیں ہے۔ سیڈ ایکٹ کے دو بنیادی کام ہیں: ایک نئے جرم پلازم کو رجسٹر کرنا اور دوسرا قابل کاشت بیج کی تصدیق کرنا۔ پہلا فنکشن قابل عمل ہے، اسے برقرار رکھا جانا چاہیے جبکہ دوسرے فنکشن میں الجھنے کی بجائے اسے نئی شعبے پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی رکاوٹ، حکومت کے زیر کنٹرول، صوبائی بیج کنسل کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے، جو کہ 1970 کی دہائی کی یادگار ہے جب پرائیویٹ سیکٹر موجود نہیں تھا۔

پلانٹ بریڈرز ایس ایکٹ کا مقصد بیج کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور حقوق دانش کا تحفظ ہے۔ ایک بار پھر، نئی شعبے کو بیج کے کاروبار میں شامل کرنے کے لیے مناسب سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ایم فصلات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بائیوسیفٹی قانون ایک لازمی امر ہے۔ یہ قانون بی ٹی کپاس کو ریگولیٹ کرنے میں مسلسل ناکام رہا ہے جبکہ ملکی اور سویا بین کے حوالے سے یہ قانون ایک غیر ضروری رکاوٹ ثابت ہوا ہے۔ یہ قوانین مختلف وزارتوں (سیڈ ایکٹ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، بائیوسیفٹی ایکٹ) - وزارت موسمیاتی تبدیلی کے دائرہ کار میں ہیں، جو کہ ایک ناقابل عمل نظام ہے۔

گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی، گندم کی 60 من پیداوار کا طریقہ

ڈاکٹر شکیل احمد انجم..... شعبہ ایگرونی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

بیج کو زہر لگانے کا طریقہ

بیج کو زہر دینے کے لیے گھومنے والا ڈرم استعمال کرنا بہتر ہے لیکن اگر یہ دستیاب نہ ہو تو پلاسٹک کے تھیلے میں تول کر بیج اور تجویز کردہ زہر ڈال کر تھیلے کے منہ کو باندھ کر دونوں طرف سے چکڑ کر اچھی طرح ملائیں۔ تاکہ بیج کا ہر دانہ زہر آلود ہو جائے۔

بیج کی دستیابی

گندم کی بہتر اقسام کا بیج پنجاب سید کارپوریشن کے ڈپو اور ڈیلرز اور پرائیویٹ سیڈ کمپنیوں سے دستیاب ہے۔ کسان اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور بیماری سے پاک، تصدیق شدہ بیج استعمال کریں۔ مناسب وفاقی بیج سرٹیفیکیشن ٹیگ کو یقینی بنائیں۔

سفارش کردہ اقسام

عروج۔ 22	نشان	اجالا۔ 16	اکبر۔ 19
صادق۔ 21	زنکول۔ 16	دلکش۔ 20	نواب۔ 21
بورلاگ۔ 16	سجانی۔ 21	رہبر۔ 21	فخر بھکر
ایم ایچ۔ 21	اناج۔ 17	بھکر سار، فیصل آباد 2008	

- 1۔ سیم تھور والی زمین پر فیصل آباد 2008، اکبر 19 کاشت کریں۔
- 2۔ زنکول 16 اور صادق 21 زنک سے بھر پور اقسام ہیں۔
- 3۔ نواب 21 اور صادق 21 جنوبی پنجاب میں بہترین مقدار دیتی ہیں۔
- 4۔ چھوٹے دانوں والی اقسام زیادہ شوگنے بناتی ہیں۔ اس لیے 5 کلو گرام کم بیج استعمال کریں۔
- 5۔ عروج۔ 22، اکبر۔ 19 اور دلکش۔ 20 پورے پنجاب میں بہترین پیداوار کی حامل ہیں۔

زمین کی تیاری اور طریقہ کاشت

گندم کی بھر پور پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین اچھی طرح تیار کریں۔ کھیتوں میں دو تا تین مرتبہ وقفہ وقفہ سے ہل چلائیں تاکہ جڑی بوئیاں تلف ہو جائیں اور زمین میں موجود غذائی عناصر پودے کے لیے قابل حصول حالت میں تبدیل ہو جائیں۔ راؤنی سے پہلے کھیتوں کو چھوٹے چھوٹے کھاروں میں تقسیم کریں تاکہ کم پانی یکساں اور مطلوبہ مقدار میں دیا جاسکے۔ راؤنی کے بعد وتر آنے پر ہوائی سے کچھ دن پہلے صبح ہل چلائیں اور سہاگہ دیں۔

پاکستان کی معیشت میں گندم کا کردار بہت اہم ہے اور یہ کسانوں کے لیے بنیادی معاشی ذریعہ بھی ہے۔ گندم پاکستان کی محصولات کی فہرست میں سب سے اہم ہے۔ پاکستان میں گندم کی کاشتکاری کا رو بار ملک کی معیشت کا سب سے بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ گندم کی اہمیت کا ایک اور پہلو ہے کہ یہ ایک بنیادی خوراک کی مدد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی عوام کے لیے گندم سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اہم غذائی مادہ ہے اور یہ ان کی روزمرہ کی بنیاد ہے۔

وقت کاشت، شرح بیج اور اقسام

اگیتی کاشت: 20 اکتوبر۔ 31 اکتوبر

درمیانی کاشت: یکم نومبر۔ 30 نومبر

چمکھیتی کاشت: یکم دسمبر۔ 20 دسمبر

- ☆ آب پاش علاقوں میں گندم کا موزوں ترین وقت کاشت یکم تا 20 نومبر ہے۔ تاہم 30 نومبر تک گندم کی کاشت کی جاسکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 20 نومبر کے بعد کاشت کی گئی فصل کی پیداوار میں روزانہ کی بنیاد پر بتدریج کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
- ☆ بارانی علاقوں میں گندم کا وقت کاشت 20 اکتوبر تا 20 نومبر ہے۔

شرح بیج

گندم کے لیے بہترین بیج کی شرح کئی عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ بشمول گندم کی قسم، بوائی کا طریقہ، مقامی اگانے کے حالات، وقت کاشت اور زمین کی قسم

بیج کی مقدار

اگیتی کاشت: 40 کلو فی ایکڑ

درمیانی کاشت: 45 کلو فی ایکڑ

چمکھیتی کاشت: 50 کلو فی ایکڑ

بیج کو زہر لگانا

گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگاری، کرنال بنٹ، گندم کا بلاسٹ اور اکھیرا وغیرہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور پیداوار میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے علاج کے لیے بیج بونے سے پہلے 2 سے 2.5 گرام تھیفونیلٹ میتھائل یا امیڈاکلو پرائڈ + ٹیپونزول 2 ملی لیٹر فی کلو بیج کے حساب سے لگائیں۔

دوسری فصل کی برداشت کے بعد بغیر زمین تیار کئے اس کے ساتھ گندم کی بوائی کریں۔ اس سے نہ صرف زمین کی تیاری والے اخراجات کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کی بروقت کاشت کو بھی یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ کاشت کو اختیار کرتے ہوئے یہ طریقہ کاشت ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا موجب ہے۔

4- پٹر یوں پر کاشت

گندم کو پٹر یوں پر کاشت کرنے کا طریقہ بھی رواج پارہا ہے جس کے لیے مارکیٹ میں بیڈ پلانٹر مشین بھی میسر ہے۔ پٹر یوں پر کاشت کے درج ذیل فوائد ہیں۔

- ☆ 30 سے 50 فیصد تک پانی کی بچت ہوتی ہے۔
- ☆ پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
- ☆ کلر اٹھی زمینوں میں نمکین پانی کے استعمال سے بھی فصل زیادہ متاثر نہیں ہوتی ہے۔
- ☆ زیادہ بارش یا پہلے پانی کے بعد پہلی نہیں ہوتی اور روایتی طریقہ کی نسبت اچھی پیداوار دیتی ہے۔

5- کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت

بعض اوقات کپاس کی فصل دیر سے کٹنے کی صورت میں گندم کی بوائی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ بروقت بوائی کے لیے کھڑی کپاس میں کاشت کے طریقے کو اپنایا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے کھلی ہوئی کپاس کی چٹائی مکمل کر لیں اور پھر کھیت کو پانی سے بھر دیں اور بیج کا دہرا چھڑے دیں۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کے حوالہ سے دوسری تمام سفارشات کے ساتھ درج ذیل نکات کا بھی خیال رکھیں۔ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کا بہترین وقت یکم تا 20 نومبر ہے۔ شرح 55-60 کلو گرام فی ایکڑ رکھیں۔ زمین کی بافت کے مطابق شرح بیج میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ سفارش کردہ کھادیں، کپاس کی چھڑیاں کاٹنے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نائٹروجنی کھاد کی دوسری قسط دوسرے پانی کے ساتھ نہیں۔ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں یعنی بوائی کے 30 تا 40 دن بعد کپاس کی چھڑیوں کو کاٹ لیں اور ان پر لگے ہوئے ٹینڈوں کو توڑ لیں۔ چھڑیاں زمین کی سطح سے تقریباً 2 انچ گہری کاٹیں اور کھیت سے فوراً باہر نکال لیں۔

گندم میں کھادوں، مائیکرو اور میکرو نیوٹریٹس کی اہمیت اور سفارشات

فصل کی پیداوار میں اضافہ

کھادیں گندم کے پودوں کو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتی ہیں۔ یہ غذائی اجزاء اکثر مٹی میں کم ہوتے ہیں، اور کھادوں کے استعمال

یہ عمل دو تین بار دہرانے سے جڑی بوئیاں تلف ہو جاتی ہیں اور زمین کی نیچے کی نمی اوپر آ جاتی ہے جو گندم کے اچھے اگاؤ کی ضامن ہے۔ یہ داب کا طریقہ ہے اور یہ اگیتی اور درمیانی کاشت میں با آسانی اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن پکھیتی کاشت میں وقت کی کمی کے پیش نظر موزوں نہیں ہے۔ بوائی سے پہلے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کے نمونے حاصل کریں اور تجربہ گاہ بھیجیں اور ان میں معدنیاتی مواد کی ایچ لیول اور دیگر خصوصیات کا تعین کریں۔

1- کپاس مکئی اور کھاد کے بعد گندم کی کاشت

وتر کا طریقہ

سابقہ فصل کے کاٹنے سے 15 تا 20 یوم قبل کھیت کو پانی دیں تاکہ چھڑیاں وغیرہ کاٹنے وقت زمین وتر حالت میں ہو اور کم سے کم وقت میں اچھی تیاری ہو سکے اور بروقت گندم کاشت کی جاسکے۔ چھڑیاں وغیرہ کاٹنے کے فوراً بعد دومرتبہ ہل اور ایک مرتبہ روناویٹر چلائیں۔ اگر روناویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگہ دیں۔ اس کے بعد بوائی بذریعہ ڈل کریں تاکہ بیج یکساں اور مناسب گہرائی پر جائے اور اگاؤ بہتر ہو۔

خشک طریقہ

سابقہ فصل کی برداشت کے بعد اگر زمین میں بہتر نہ ہو تو اس میں دومرتبہ عام ہل اور ایک مرتبہ روناویٹر یا ڈسک ہیرو چلائیں۔ بوائی بذریعہ ڈل کریں اور مناسب کھاد بن کر کھیت کو پانی لگا دیں۔ خیال رہے کہ ڈل کر دو بیج کی گہرائی ایک انچ سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح وقت کی بچت ہوتی ہے اور اگاؤ بھی جلدی ہوتا ہے۔

گپ چھٹ کا طریقہ

پچھلی فصل کی برداشت کے بعد دومرتبہ عام ہل چلائیں اور بھاری سہاگہ دیں۔ بعد ازاں کھادوں کے لیے وٹیں بنائیں اور کھیت کو پانی لگا دیں اور پھر 4 تا 6 گھنٹے کے لیے بھگوئے ہوئے بیج کا چھڑے دیں۔ یہ طریقہ کلر اٹھی زمینوں میں گندم کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔

2- دھان کے بعد گندم کی کاشت

زمین کی نوعیت کے مطابق دھان کی فصل کو برداشت سے 15 تا 25 روز قبل پانی دینا بند کر دیں تاکہ فصل برداشت ہونے تک زمین وتر حالت میں آجائے اور بغیر انتظار کے زمین تیار کر کے گندم کاشت کی جاسکے۔ یاد رہے، دھان کی کٹائی کے بعد دھان کی باقیات کو آگ نہ لگائیں کیونکہ یہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کا باعث ہے۔

3- زیرو ٹیلج کاشت

اگر زیرو ٹیلج ڈل یا پاک سیڈر (Pak Seeder) میسر ہو تو دھان یا کسی بھی

مختلف زمینوں میں کھادوں کی سفارشات

زمین کی زرخیزی	ناٹروجن	فاسفورس	پوٹاش	بوری فی ایکڑ
کم زرخیز زمین	64	46	25	دو بوری ڈی اے پی + دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی
اوسط زرخیز زمین	54	34	25	ڈیڑھ بوری ڈی اے پی + پونے دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی
زرخیز زمین	46	30	25	سوا بوری ڈی اے پی + ڈیڑھ بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی

اور مزید برآں $ZnSO_4$ 33 فیصد بحساب 6 کلو گرام اور بورک ایسڈ 17 فیصد بحساب 5.2 کلو گرام فی ایکڑ بوائی کے وقت استعمال کریں۔ گوبر کی کھاد 3-4 ٹری فی ایکڑ استعمال کریں۔ سبز کھاد کو بھی یقینی بنائیں۔

4- گندم میں آب پاشی کی اہمیت

گندم میں آب پاشی کی اہمیت بڑی ہے، اور یہ کاشت کی کامیابی اور حاصلات کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

گندم میں آب پاشی سے متعلق ہدایات

گندم کی کاشت میں آب پاشی کرتے وقت درج ذیل ہدایات کو مد نظر رکھنا بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے:

آب پاشی کی مناسب ترتیب

گندم کی کاشت میں آب پاشی کی مناسب ترتیب اہم ہے۔ آب پاشی کا وقت اور فراہمی کو پودوں کی ضروریات کے مطابق ترتیب دینا چاہیے۔

پہلا پانی	20-25 دن	شگوفے نکلنے کے وقت	یہ مرحلہ انتہائی اہم ہے۔ پانی دیر سے لگانے یا چھوڑ دینے کی صورت میں پودا کم شگوفے بناتا ہے اور فی پودا سٹوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ فی ایکڑ پودوں کی تعداد 10 لاکھ سے کم ہونے کی صورت میں پیداوار پر منفی اثر پڑتا ہے۔
-----------	----------	--------------------	--

اسے اس غذائیت کے فرق کو پُر کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کے نتیجے میں گندم کی زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر پنجاب جیسے خطے میں بہت ضروری ہے۔

خلاصہ یہ کہ گندم کی نشوونما اور اناج کے معیار کے لیے میکرو اور مائیکرو نیوٹریئنٹ دونوں ضروری ہیں۔ گندم کی اعلیٰ پیداوار حاصل کرنے، اناج کے معیار کو بہتر بنانے اور گندم کے پودوں کی مجموعی صحت اور پک کو یقینی بنانے کے لیے ان غذائی اجزاء کی متوازن فراہمی بہت ضروری ہے۔ گندم کی غذائیت کی ضروریات کو پورا کرنے اور پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے مٹی کی جانچ اور مناسب کھاد کا استعمال ضروری ہے۔

کھادوں کا متناسب استعمال: بہترین پیداوار کی ضمانت

1- فاسفورس اور پوٹاش بوائی کے وقت ڈال کریں۔

2- ناٹروجن 3 اقساط یعنی بوائی، پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ ڈالیں۔

3- DAP کی عدم دستیابی کی صورت میں پہلے پانی کے ساتھ ڈالیں۔

4- کچھ کاشت کی صورت میں کھادوں کی پوری مقدار بوائی کے وقت ڈال دیں۔

5- 70 من پیداوار کے لیے ترقی پسند کاشتکار 2 بوری یوریا اور 2 بوری DAP استعمال کریں۔

صحیح کھاد کا انتخاب کریں

ایسی کھادوں کا انتخاب کریں جو آپ کی گندم کی فصل کی غذائیت کی ضروریات کے مطابق ہوں۔ عام کھادوں میں یوریا (ناٹروجن کے لیے)، ڈائموئم فاسفیٹ (ڈی اے پی) یا ٹریپل سپر فاسفیٹ (ٹی اے پی) (فاسفورس کے لیے) اور موریت آف پوٹاش (ایم او پی) یا سلیٹ آف پوٹاش (ایس او پی) (پوٹاشیم کے لیے) شامل ہیں۔

نامیاتی مادے کو شامل کریں

فصلوں کی باقیات، کور کراپنگ، اور نامیاتی ترمیم جیسے طریقوں کے ذریعے نامیاتی مادے کو شامل کر کے مٹی کی صحت کو بہتر بنائیں۔ نامیاتی مادہ غذائی اجزاء کو برقرار رکھتا ہے اور مٹی کی ساخت کو بہتر بناتا ہے۔

فصل کی نشوونما کی نگرانی کریں

اپنی گندم کی فصل کی نشوونما اور ظاہری شکل کی باقاعدگی سے نگرانی کریں۔ غذائی اجزاء کی کمی یا زیادتی کی علامات میدان میں ظاہر ہو سکتی ہیں، جس سے آپ ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔

دوسرا پانی	80-90 دن	سٹ نکلتے وقت	اس وقت سٹ نکل رہا ہوتا ہے۔ پانی کی عدم موجودگی میں سٹ چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ فی سٹ دانے کم ہو جاتے ہیں۔
تیسرا پانی	100-110 دن	دودھیا حالت	اس وقت سٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تاخیر سے پانی لگانے کی صورت میں دانہ بھرنے کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے۔
چوتھا پانی	120-130 دن	دانہ بنتے وقت	یہ دانہ بھرنے کا آخری مرحلہ ہے۔ اس وقت پانی کی عدم موجودگی دانے کا سائز اور وزن کم کر سکتی ہے اور پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔

5- جڑی بوٹیوں کا کنٹرول

گندم کی اعلیٰ اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کے مؤثر خاتمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

حیاتیاتی انمداد

بعض صورتوں میں، حیاتیاتی کنٹرول کے طریقے جیسے گھاس کھانے والے کیڑوں یا نیماٹوڈس کو متعارف کروانے سے جڑی بوٹیوں کی مخصوص انواع کے انتظام میں مدد مل سکتی ہے۔

ملچ

نامیاتی ملچس، جیسے بھوسے یا فصل کی باقیات، گندم کے پودوں کے گرد گھاس کی افزائش کو دبانے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں۔

کیمیائی انمداد

محکمہ زراعت تو سبغ یا پیسٹ وارتنگ کے مقامی عملہ کے مشورہ سے سفارش کردہ جڑی بوٹی مارز ہروں کا استعمال کریں اور درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔

☆ زہر کے چھڑکاؤ کے بعد گوڈی یا باربیرو کے استعمال سے پرہیز کریں اور جڑی بوٹیوں کو چارہ کے طور پر ہرگز استعمال نہ کریں۔ سپرے ہمیشہ مشین کی کمپلی بریشن کر کے کریں، پانی کی مقدار 100 تا 120 لیٹر فی ایکڑ رکھیں۔ کسی جگہ دوہری سپرے نہ

کریں اور نہ ہی کوئی جگہ خالی رہنے دیں۔

☆ سپرے کے لیے مخصوص نوزل (Flat Fan یا T. Jet) استعمال کریں، تیز ہوا، دھند یا بارش میں سپرے نہ کریں۔ تریجھا سپرے دھوپ میں کریں۔

☆ ایسے علاقے جہاں پہلے پانی کے بعد زمین دیر سے وتر آتی ہے وہاں پانی لگانے کے بعد جب کھیت میں کچھ ہو تو جڑی بوٹی مارز ہروں یوریا کھاد یا ریت میں ملا کر بذریعہ چھٹہ بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

☆ ریتلے اور کلراٹھے علاقوں میں جڑی بوٹی مارز ہروں کا استعمال احتیاط سے کریں۔

غیر کیمیائی انمداد

فصلوں کا اول بدل کریں اور گندم والے کھیتوں میں دو تا تین سال بعد چارہ برسیم وغیرہ کاشت کریں۔ اگر ممکن ہو تو پہلے پانی کے بعد وتر آنے پر دوہری بارہیر و چلائی جائے۔ اس سے جڑی بوٹیاں بہت حد تک تلف ہو جاتی ہیں اور زمین میں وتر دیر تک قائم رہتا ہے۔

6- گندم کے نقصان دہ کیڑے

گندم پاکستان کی اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے، اور کسی بھی زرعی فصل کی طرح اسے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا مؤثر طریقے سے انتظام نہ کرنے کی صورت میں پیداوار اور معیار کو کم کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں گندم کے کچھ عام کیڑوں میں شامل ہیں:

ایفڈس (گرین بگ اور براؤن وہیٹ مائٹ)

APHIDS ایفڈز چھوٹے، رس جو سنے والے کیڑے ہیں جو پودوں کے وائرس کو منتقل کر سکتے ہیں اور پودوں کو کمزور کر کے گندم کی پیداوار کو کم کر سکتے ہیں۔ گرین بگ اور بھوری گندم کے ذرات گندم کے کھیتوں میں پائے جانے والے دو عام انواع ہیں۔

آرمی کیوے Army Worms

آرمی کیڑے کیڈر پلر کیڑوں کا ایک گروپ ہے جو پتوں کو کھانا کھانے اور کانوں کی نشوونما سے گندم کی فصلوں کو نمایاں نقصان پہنچا سکتا ہے۔

کٹ کیڑے Cut Worms

کٹ کیڑے رات کے کیڈر پلر ہیں جو مٹی کی سطح کے قریب گندم کے جوان پودوں کو کاٹ دیتے ہیں، جس سے پودے مر جھاجاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔

سفید مکھیاں White Flies

سفید مکھی چھوٹے، رس کھانے والے کیڑے ہیں جو وائرس منتقل کر سکتے ہیں اور گندم کی پیداوار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

تھرپس Thrips

تھرپس چھوٹے کیڑے ہیں جو پتوں کی سطح کو کھرچ کر گندم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور چاندی کی شکل کا باعث بنتے ہیں۔

Hessian Fly

یہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں گندم کا ایک اہم کیڑا ہے۔ یہ تنے پر حملہ کرتا ہے اور اگر مناسب طریقے سے انتظام نہ کیا جائے تو پیداوار کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔

Wheat Stem Sawfly

پاکستان کے گندم اگانے والے علاقوں میں گندم کے تنے کی آرا عام ہیں اور تنوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس سے رہائش اور پیداوار میں نقصان ہوتا ہے۔

دیمک Termites

دیمک گندم کے کھیتوں کو متاثر کر سکتی ہے اور جڑوں اور تنے کے نچلے حصوں دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے پودے کمزور اور گر جاتے ہیں۔

تار کیڑے Wire Worms

تار کیڑے فلک بیٹل کے لاروا ہیں اور جڑوں اور تنے کے نچلے حصوں کو کھانا

کھانے سے گندم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

ٹریاں (Grass hoppers and Locusts)

کبھی کبھار، ٹریاں گندم کے کھیتوں میں ہجرت کر سکتی ہیں، جو بڑی مقدار میں پودوں کو کھا کر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتی ہیں۔

پاکستان میں کسان ان کیڑے مکوڑوں پر قابو پانے کے لیے کیڑوں کے انتظام کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں کیڑے مارا دیات کا استعمال، انٹیگرٹڈ پیسٹ مینجمنٹ (IPM) کی حکمت عملی، فصل کی گردش، اور کیڑوں سے مزاحم گندم کی اقسام کی کاشت شامل ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، موثر کیڑوں پر قابو پانے کے لیے کیڑوں کی آبادی کی نگرانی اور جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کیڑے مکوڑوں کا پھیلاؤ اور شدت ہر سال اور پاکستان کے اندر خطے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے کیڑوں پر قابو پانے کے اقدامات پر عمل درآمد کرتے وقت مقامی حالات اور سفارشات پر غور کیا جانا چاہیے۔

7- گندم کی بیماریاں، علامات اور ان کا انداد

نام بیماری	وجہ بیماری	علامات	انداد
کنگی (Rust)	اس بیماری کی وجہ ایک پھپھوندی ہے۔ پاکستان میں کنگی کی بیماری کی تین اقسام ہیں۔ زرد کنگی (Yellow Rust) بھوری کنگی (Brown Leaf Rust) سیاہ کنگی (Stem Rust)	موسم سرما کی بارشیں اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتی ہیں۔ زرد کنگی میں زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے متوازی لائنوں میں صف بستہ ہوتے ہیں۔ بھوری کنگی میں بھورے رنگ کے دھبے گول شکل کے بجائے بے ترتیب پھیلے ہوئے ہیں۔ سیاہ کنگی میں پتوں اور تنوں پر کنگی کے گہرے بھورے رنگ کے دھبے ظاہر ہوتے ہیں۔	☆ ہر قسم کی کنگی کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سفارش کردہ گندم کی اقسام کاشت کی جائیں۔ ☆ زیادہ رقبہ پر ایک کے بجائے تین چار اقسام کاشت کریں۔ ☆ نومبر میں فصل کی کاشت کریں کیونکہ اس پر کنگی کا حملہ دیر سے کاشت کی گئی فصل کی نسبت کم ہوتا ہے۔ ☆ غیر ضروری آبپاشی سے اجتناب کیا جائے۔ ☆ فصل کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوناش کی کھاد کا استعمال کیا جائے۔
گندم کی جدید یا جزوی کانگیاری کرنال بنٹ (Kernal Bunt)	یہ بیماری پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کا نام (Tilletia indica) ہے	یہ بیماری پودے کے چند شوکوفوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چند سٹے اور ہر سٹے میں چند دانے بھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ سٹوں کے نمودار ہوتے ہیں۔ ہر اس بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بیج کا کچھ حصہ پھپھوندی سے متاثر ہوتا ہے اور باقی حصہ میں سٹارچ محفوظ رہتا ہے۔	☆ قوت مدافعت رکھنے والی سفارش کردہ تمام اقسام کو کاشت کیا جائے۔ ☆ بیج کو پھپھوندی کش زہر لگا کر استعمال کیا جائے۔ ☆ بیماری سے متاثرہ فصل کا بیج کاشت کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ ☆ فصلوں کا ادل بدل کیا جائے۔

نام بیماری	وجہ بیماری	علامات	انمداد
گندم کی کھلی کانگیاری (Loose Smut)	یہ بیماری پھپھوندی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ جس کا نام <i>Ustilago tritici</i> ہے۔	یہ بیماری سیاہ سفوفی خوشوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ کا یہ سفوف بیمار خوشوں میں نظر آتا ہے۔ یہ دراصل بیماری پیدا کرنے والی پھپھوندی کی علامات ہیں۔ یہ ہوا کے ذریعے ایک پودے سے دوسرے پودے تک پھیل جاتے ہیں۔ دانے کے اندر بیماری موجود ہونے سے اگلے سال کی فصل میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ پنجاب خصوصاً بارش والے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے۔	☆ صحت مند فصل سے بیج لیں۔ ☆ مٹی، جون میں بیج کو 4 سے 6 گھنٹے پانی میں جگو کر خشک کر کے اگلی فصل کے لیے رکھ لیں۔ ☆ سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگا کر بیج کو کاشت کیا جائے۔ ☆ متاثرہ پودے فصل سے الگ کر جلا دیں۔
گندم کا کیڑا (Foot Rot)	یہ بیماری بھی پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ہے <i>Fusarium sp.</i>	یہ بیماری متاثرہ بیج یا زمین میں پھپھوندی کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا حملہ پر دومر اعلیٰ ہوتا ہے۔ پہلا حملہ پودے کی حالت میں اور دوسرا جوان پودوں پر۔ پہلی صورت میں بیماری کا اثر کم ہوتا ہے۔ دوسرا حملہ فوری سے مارج میں ہوتا ہے۔ جس سے شگوفوں میں دانے نہیں بنتے۔	☆ فصل کی باقیات کو تفت کر دیں۔ ☆ بیماری سے پاک بیج کا استعمال کریں۔ ☆ سفارش کردہ قوت مدافعت رکھنے والی تمام اقسام کاشت کریں۔ ☆ پھپھوندی کش زہر لگا کر بیج کا استعمال کریں۔ ☆ جہاں بیماری کا اندیشہ ہو وہاں پھپھوندی کش کی کاشت کی جائے۔ ☆ خشک زمین میں بوائی کر کے فوری پانی لگانے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
گندم کی سفوفی پھپھوندی (Powdery Mildew)	<i>Dryis phe</i> یہ بیماری کی وجہ سے <i>graminis</i> ہوتی ہے جو کہ پھپھوندی کی ایک قسم ہے۔	یہ بیماری پودے کے باہر والے حصہ پر حملہ آور ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر پتے کے اوپر والی سطح پر سفید سفوفی دھبے ظاہر ہوتے ہیں۔ پتے کی دوسری جانب گہرا بھورا یا بھورا ہوتا ہے۔ اگر اس بیماری کا حملہ فصل کے آغاز میں ہی ہو جائے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ دانے کا سائز چھوٹا رہنے کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔	☆ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے سفارش کردہ اقسام کاشت کریں۔

8- گندم کی برداشت
جدید تحقیق کے مطابق کٹائی کے بعد گندم کی پیداوار کا تقریباً 10 فیصد حصہ مختلف وجوہات کی بناء پر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گندم کی کٹائی سے قبل مؤثر منصوبہ بندی کی جائے۔ گندم کی برداشت کے وقت موسمی تغیرات کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہے ان موسمی تبدیلیوں میں معمول سے زیادہ اور وقت سے پہلے بارشیں جبکہ درجہ حرارت میں

اچانک اضافہ بھی اہم ہیں۔ اپنی فصل کی برداشت موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق کریں۔
فصل کی کٹائی اور گہائی کا موزوں وقت وہ ہے جب فصل اچھی طرح پک کر تیار ہو جائے اور اس وقت دانوں میں نمی کا تناسب 10 سے 12 فیصد ہو۔
(باقی صفحہ 56 پر)

ہائبرڈ گندم: غذائی استحکام اور خود کفالت کی طرف اہم قدم

عمارہ سحر رانا، ہما سلیم، جمشید علی جنید..... شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

وقت درجہ حرارت تین سے چار ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے تو یہ گندم کی پیداوار کو 10 سے 50 فیصد تک کم کر سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور طویل خشک سالی عالمی سطح پر فوڈ سکیورٹی کی صورتحال کو ابتر کر رہی ہیں۔ لہذا بڑھتی ہوئی آبادی کے مستقبل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 2050 میں 18 ملین ٹن کی اضافی پیداوار درکار ہوگی جو ترقی پزیر ممالک میں اوسط پیداوار کو بڑھا کر حاصل کی جاسکتی ہے۔

پاکستان ایک ترقی پزیر ملک ہے جس کے 9 ملین ہیکٹر رقبہ پر گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ گندم زرعی ویلیو ایڈیشن میں 7.8 فیصد اور مجموعی ملکی پیداوار میں 1.8 فیصد حصہ رکھنے کی بنا پر ملکی غذائی تحفظ کا اہم جزو ہے۔ اس کی سالانہ کھیت 124.4 کلو گرام فی کس ہے۔ پاکستان کو اپنے غذائی استحکام کے لیے سالانہ 27 ملین ٹن گندم کی پیداوار درکار ہے۔ سال 2021 میں گندم کا رقبہ 2.1 فیصد کمی کے بعد 8.97 ملین ہیکٹر رہ گیا اور گندم کی پیداوار 3.9 فیصد کمی کے بعد 26.5 ملین ٹن ہے۔ گندم کے رقبہ اور پیداواری صلاحیت میں کمی کی چند وجوہات میں ناکافی آبپاشی، کسانوں کو گندم کے بجائے کینولہ کی کاشت کو ترجیح، خشک سالی کھاد کی کمی اور مارچ اپریل میں گرمی کی لہر سرفہرست ہے۔ اگر ہم نے گندم کی سالانہ پیداوار کا مطلوبہ ہدف حاصل نہ کیا تو آٹے کی درآمدی بل اور مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے ملک میں عجیب صورتحال اور بے چینی پیدا ہوگی اگرچہ گندم پورے پاکستان میں کاشت کی جاتی ہے لیکن اس میں پنجاب 77 فیصد، سندھ 15 فیصد، کے پی کے 5 فیصد اور بلوچستان 3.5 فیصد رکھتے ہیں۔ اگست 2021 میں آئیو اے بدترین سیلاب نے سندھ میں گندم کی بوائی کو نمایاں طور پر متاثر کیا جس سے ملکی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پنجاب پر انحصار بہت بڑھ گیا ہے سال 2022-23ء میں گندم کے آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے سبب پاکستان گندم کے بحران کا شکار ہوا۔ گندم کی پیداوار میں خود کفالت ہر سیاسی حکومت کے بنیادی مقاصد میں سب سے اہم مقصد ہے لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور گندم کی پیداوار میں جمود شدید اور موسمیاتی تغیر کے باعث غذائی خود کفالت کے ہدف کو حاصل کرنا بے حد مشکل ہے جس کی وجہ سے پاکستان گندم کی پیداوار بڑھانے پر توجہ دینے کے بجائے گندم کی درآمد پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ مقامی گندم کی وراثیٹیز لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہیں ملک کو غذائی عدم تحفظ سے بچانے کے لیے واحد طریقہ قومی اوسط پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ حال ہی میں دیگر

گندم کمپنی کے بعد دوسری سب سے زیادہ پیدا ہونے والی اناج کی فصل ہے اور تقریباً ہر شخص کے روزمرہ تھا اور کیا ہے۔ روٹی سے لیکر بریڈ، پاستا، علوہ جات، پیڑی، بسکٹ اور میدہ گندم کے آٹے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ گندم فصلوں کی عالمی تجارت میں بھی سب سے زیادہ حصہ رکھتی ہے۔ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جو اتنی گندم پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ گندم کو برآمد کر سکیں۔ ان ممالک میں چین، بھارت اور روس گندم کی عالمی پیداوار میں تقریباً 41 فیصد حصہ رکھتے ہیں جبکہ امریکہ گندم کی پیداوار کے حوالے سے چوتھا بڑا ملک ہے۔ اگرچہ چین گندم کی پیداوار میں سرفہرست ہے لیکن اسے اپنی 1.4 ارب آبادی کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کو درآمد کرنا پڑتا ہے۔ لہذا روس، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور یوکرین گندم کے برآمدات کیلئے دنیا کے طاقتور زرعی ملک سمجھے جاتے ہیں۔

حالیہ برس میں اناج کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے متعدد اسباب میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف ممالک کی معیشتوں کی خرابی، عالمی کھاد کی قیمتوں میں اضافہ وغیرہ شامل ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اختتام پر مصنوعات کی مانگ میں اچانک تیزی سے اضافہ ہوا اور طلب اور رسد میں فرق کی وجہ سے گندم کی عالمی ترسیل کافی متاثر ہوئی۔ جنگ سے پہلے یوکرین اور روس گندم کی برآمد میں 30 فیصد حصہ رکھتے تھے لیکن دونوں ممالک کے مابین جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا میں گندم کا شدید بحران پیدا ہوا۔ اقوام متحدہ کے ادارے (ایف اے او) کے مطابق 30 سے زائد ممالک اپنی گندم کی درآمدات کے لیے روس اور یوکرین پر انحصار کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین تنازعہ کے عالمی اثرات میں مصنوعات کی کمی اور بڑھتے ہوئے اخراجات سے سب سے زیادہ ترقی پزیر ممالک متاثر ہوئے ہیں۔

دوسری طرف ناموافق ماحولیاتی تبدیلیاں عالمی غذائی تحفظ کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہیں۔ دنیا بھر میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت گندم اور دیگر فصلوں کی پیداواری صلاحیت کو بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ سال 2021-22 میں آسٹریلیا اور ارجینٹینا میں خشک سالی اور گرمی کی لہر کی وجہ سے گندم کی پیداوار ریکارڈ سطح سے کافی کم تھی اور اس کے علاوہ کینیڈا اور یورپی یونین کی زرعی پیداوار بھی گرمی کی لہر کے سبب متاثر ہوئی۔ مثال کے طور پر گندم کو اپنی دانہ بھرائی کی عمل میں ایک موافق سے درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس

فصلوں مثلاً پاول اور مکئی میں ہائبرڈ بیج نے پیداواری استحکام دے کر انقلاب پیدا کیا ہے۔ لہذا زرعی اجناس میں ترسیل کی کمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بیج تیار کرنے والی دنیا کی بڑی کمپنیاں گندم کا ہائبرڈ بیج تیار کرنے میں مصروف ہیں تاکہ کم رقبے پر گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکے۔

اگرچہ ہائبرڈ خود زیر پوشی (Self Pollinated) فصلوں میں شاز و نادر ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ انسانی مداخلت کے نتیجے میں زیر پوشی غیر قدرتی انداز میں کرنے کی بنا پر تمام مادہ پودوں کی پینشن نہیں ہو پاتی تاہم ماضی میں ناکامیوں کے باوجود حالیہ برسوں میں یورپی ممالک نے مطلوبہ خصوصیات کے حامل گندم کے نئے ہائبرڈ تیار کیے ہیں جو نہ صرف ناموافق ماحولیاتی تغیر کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ پیداوار اور ہدف بھی اڑھائی گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ چین کی ملکیتی کمپنی Syngenta دنیا کی بیج تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنی میں شمار ہوتی ہے اس کمپنی کا ہدف حالیہ آنیوالے سالوں میں 5 ہزار سے 7 ہزار ایکڑ رقبے پر ہائبرڈ گندم کاشت کرنا ہے۔

زرعی ماہرین تحقیق ہائبرڈ گندم اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ عام گندم کے پودوں کی Pollination یا خود زیر پوشی کرنے کی قدرتی صلاحیت ختم کر کے مادہ پودوں کی Pollination ایک دوسری قسم کے ز پودوں سے کرتے ہیں اور اس طرح گندم کا نیا اور منفرد بیج تیار ہوتا ہے جو مختلف انواع کے اختلاط کی بنا پر ہائبرڈ کہلاتا ہے۔ ہائبرڈ بیج گندم کی دو مختلف اقسام کی مثبت خصوصیات کے یکجا ہونے کے باعث نہ صرف پیداوار بڑھاتے ہیں بلکہ ان میں اپنی پچھلی نباتاتی نسل کے مقابلے میں ناموافق ماحولیاتی تغیر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ چھپیتی کاشت میں مقامی گندم کی نسبت

زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔

ہائبرڈ گندم کی تیاری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پودوں میں کوئی جینیاتی تبدیلی نہیں کی جاتی بلکہ جینیاتی تبدیلیوں والا جاندار GMO کے لیبل سے بچنے کے لیے اور پیداوار میں اضافے کے لیے ہائبرڈ تیار کیے گئے ہیں اس کے برعکس جینیاتی تبدیلیوں والی گندم کو استعمال کرنے کے حوالے سے صارفین میں بھی طرح کے طبی مسائل کے حوالے سے غمگینیاں پائے جاتے ہیں جسکے مقابلے میں ہائبرڈ گندم کو زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے مقامی سائنسدان چینی اور آسٹریلوی تحقیقاتی اداروں کے ساتھ مل کر گندم کے مقامی ہائبرڈ تیار کرنے میں بہت محنت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کئی نجی کمپنیاں بھی ملک میں گندم کے ہائبرڈ کے کاروبار میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ہائبرڈ گندم کی کاشت پاکستان کے بارانی اور نیم بارانی علاقہ جات میں زیادہ بانیو ماس اور پیداوار کا باعث بن سکتی ہے۔ اگرچہ ہائبرڈ گندم کی تیاری بہت پیچیدہ اور کافی مہنگا عمل ہے تاہم پاکستان میں درج ذیل قومی ادارے ہائبرڈ گندم کی تحقیق اور ترقی پر کام کر رہے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، آسٹریلیا اور ICI پاکستان کے تعاون سے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان، آسٹریلیا کے تعاون سے اور زرعی یونیورسٹی پشاور چین کے تعاون سے پاکستان میں ہائبرڈ گندم تیار کر رہی ہیں۔ زرعی سائنسدان مستقبل قریب کے حوالے سے کافی پرامید ہیں کہ گندم کے پیداواری جمود کو توڑنے اور غذائی خود کفالت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بشمول ہائبرڈ گندم کا اپنا وقت کی اہم ضرورت ہے اگرچہ ہائبرڈ فصلوں کی تیاری پیچیدہ عمل ہے تاہم جینیاتی سائنس اور بریڈنگ کے شعبہ میں ترقی کا باعث ان چیلنجز پر بھی قابو پانا ممکن ہوگا۔

زراعت میں، کسان دوست کیڑوں پر کیڑے مارا دویات کے مضر اثرات

بقیہ:

فوڈ چین میں بھی غل ڈال کر فائدہ مند کیڑوں کو بالواسطہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر کیڑے مارا دویات ان کیڑوں کو ختم کر دیتی ہیں جو فائدہ مند کیڑوں کے لیے خوراک کا موجب ہیں تو کسان دوست کیڑے خوراک نہ ملنے کے صورت کی وجہ سے مر جائے گے ہیں یا دوسرے علاقوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، فائدہ مند کیڑوں اور دیگر غیر ہدف والے جانداروں پر ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کیڑے مارا دویات کو ذمہ دارانہ اور ہدف کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس میں کیڑوں پر قابو پانے کے متبادل طریقوں کا استعمال، مناسب وقت پر اور صحیح مقدار میں استعمال کرنا جو فائدہ مند کیڑوں کے لیے کم نقصان دہ ہیں

فائدہ مند کیڑوں کو براہ راست موت کی وجہ بن سکتی ہیں اگر وہ کیمیکل کے ساتھ رابطے میں آئیں۔ شہد کی مکھیاں اور تنمیاں جب وہ نیکٹر جمع کرتے وقت کیڑے مارا دویات کھالیں، اس طرح یہ فائدہ مند کیڑوں کی آبادی کو کم کر کے انہیں ہلاک کر سکتی ہیں یا ان کے رہائش گاہ کو ناگوار بنا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، پنبہ دوز اور عصبی بردار کیڑا جو کہ بہت سے حشرات الارض کا قدرتی شکاری ہیں، ان ادویات کے ذریعے خطرہ لاحق ہے۔ نیز یہ ادویات فائدہ مند کیڑوں کے رویے اور تولید میں خلل کا اسباب بن کر بالآخر ان کی آبادی میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثلاً کچھ کیڑے مارا دویات شہد کی مکھیوں کے ملاپ کے رویے میں مداخلت کر کے ان کی دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہیں۔ کیڑے مارا دویات

گنے کا پائیدار طریقہ کاشت: ضرورت و اہمیت

ڈاکٹر رانا محمد عامر، ڈاکٹر بابر شہباز، ڈاکٹر شوکت علی، ڈاکٹر حافظ علی رضا..... انسٹیٹیوٹ آف ایگری انجینئرنگ، ایجوکیشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

فصل کی پیداوار میں اضافہ

پائیدار طریقہ کاشت جیسے سگل بڈ چپس، فصل کی بہتر پیداواری تکنیک جیسے زسری، اور مناسب غذائیت کے انتظام کو فروغ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں گنے کی زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ پائیدار طریقوں کو نافذ کرنے سے، کسان مددگاری کے استعمال کو بہتر بناتے ہوئے فصل کی مجموعی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کسانوں کو معاشی طور پر فائدہ ہوتا ہے بلکہ گنے کی پیداوار میں اضافہ ہونے سے غذائی تحفظ میں بھی مدد ملتی ہے۔

سماجی اور اقتصادی فوائد

یہ طریقہ کار گنے کے کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے اور ان کی روزی روٹی میں بہتری لاتا ہے۔ مزید برآں ان کی بہتر سماجی شمولیت کو فروغ دے کر ان کی فلاح و بہبود پر زور دیتا ہے۔ پائیدار طریقوں کو اپنانے سے کسان زرعی مددگاری کی لاگت کو کم کر سکتے ہیں اور فصلوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایسی پیمائشوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو پائیدار طور پر پیدا ہونے والے گنے کی قدر کرتی ہیں۔ الغرض یہ ان کی معاشی حالت کو بہتر بناتا ہے اور کاشتکار برادریوں میں سماجی مساوات کو فروغ دیتا ہے۔

پائیدار پہلائی چین

پیداوار طریقہ کاشت ذمہ دار سورنگ اور پائیدار پہلائی چین مینجمنٹ کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ پائیدار طریقوں کو لاگو کر کے، گنے کے کاشتکار باشعور صارفین اور سماجی طور پر ذمہ دار کمپنیوں کی طرف سے پیداوار کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے گنے کے شعبے میں مارکیٹ تک رسائی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں جو طویل مدتی اقتصادی ترقی اور استحکام کا باعث بنتے ہیں۔

مختصر یہ کہ جدید اور پائیدار طریقے سے گنے کی کاشت کی شروعات بہت اہم ہے کیونکہ اس طریقے سے ہونے والی گنے کی کاشت، ماحولیاتی پائیداری، پانی کے انتظام، موسمیاتی تبدیلیوں میں تخفیف، بہتر پیداواری صلاحیت، سماجی بہبود اور پائیدار پہلائی چین کے طریقوں کے لیے ایک جامع نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ پیداوار طریقہ کاشت کو اپنانے سے گنے کے کاشتکار، پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ماحولیاتی اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح گنے کے کاشتکار اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا خوشحال مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں۔

پائیدار طریقہ کاشت، گنے کی کاشت کا ایک جدید طریقہ ہے جو پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دیتا ہے اور مختلف ماحولیاتی، سماجی اور اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طریقہ کار کو اپنانا گنے کے کاشتکاروں کے لیے درج ذیل چند وجوہات کی بناء پر زیادہ اہم گردانا جاتا ہے۔

ماحولیاتی تحفظ

پائیدار طریقہ کاشت کے ذریعے گنے کی کاشت ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے وسائل کے استعمال کے لحاظ سے موثر طریقوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ طریقہ نامیاتی کھادوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ قدرتی طریقے سے کیڑوں پر قابو پانے کے طرز عمل کو فروغ دیتا ہے۔ مزید برآں مصنوعی کیمیکلز پر انحصار کو کم کرتے ہوئے ایک طرف فضائی اور آبی آلودگی کو کم کرتا ہے تو دوسری طرف ماحول دوست طریقے سے زمین کی زرخیزی کو بھی کم ہونے سے روکتا ہے۔

پانی کا موثر انتظام

گنے کی فصل کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت سے خطوں میں پانی کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ پائیدار طریقہ کاشت کسانوں کو پانی کی بچت کے جدید طریقہ کار کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جس سے فصل کی پیداواری صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ یہ آبپاشی کے روایتی طریقوں کے مقابلے میں پانی کی کھپت کو کم کرنے، ڈپ آبپاشی اور مائیکرو اسپرنگلر آبپاشی جیسے اقدامات کے ذریعے پانی کے موثر استعمال پر زور دیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس طریقے کے ذریعے 30 سے 40 فیصد پانی کم استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جدید طریقہ آبپاشی کے موثر طریقوں کو فروغ دے کر پانی کی کمی پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کی تخفیف

گنے کی کاشت مختلف عوامل جیسے کھیت کی باقیات کو جلانے، مصنوعی کھاد کا استعمال اور فضلہ کسی بد انتظامی کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے۔ پائیدار طریقہ کاشت آب و ہوا کے سمارٹ طریقوں کی وکالت کرتا ہے جیسا کہ یہ طریقہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے خلاف ہے جس کی وجہ سے فضائی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مزید برآں یہ طریقہ نامیاتی کھادوں کے استعمال اور مٹی کے بہتر انتظام کے ذریعے مٹی کی ساخت کو بہتر بناتا ہے۔

کپاس کی سفید مکھی کے نقصانات اور کیمیائی تدارک

ڈاکٹر محمد دلدار خاں گوگی، ڈاکٹر محمد جلال عارف، ڈاکٹر احمد نواز، ڈاکٹر حامد بشیر، ڈاکٹر محمد سفیان، رابعہ رمضان..... شعبہ حشرات، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کپاس اور سفید مکھی کی موجودہ صورت حال

پاکستان میں کپاس ریشہ دار اور تیل دار فصلوں میں بڑی اہمیت کی حامل فصل ہے جو کہ ناصرف پاکستانی ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے بلکہ یہ پاکستانی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن پچھلی ایک آدھ دہائیوں سے پاکستان میں کپاس کی پیداوار مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ 2014-15ء میں کپاس کی پیداوار 13.96 ملین گانٹھیں تھی جو کہ گونا گوجوہات کے سبب کم ہو کر 2019-20ء میں صرف 9.17 ملین گانٹھیں رہ گئی۔ یہ پیداوار مزید کم ہو کر 2020-21ء میں 3.7 ملین گانٹھیں جبکہ 2021-22ء میں 4.6 ملین گانٹھیں رہ گئی۔ ان ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں کپاس کی پیداوار کو پچھلے پانچ سالوں میں اوسطاً 49-34 فیصد کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں تیسرے نمبر سے گرا پانچویں نمبر پر آ گیا ہے۔

پاکستان میں کپاس کی پیداوار کو جن بڑے مسائل کا سامنا ہے ان میں کپاس کا غیر معیاری بیج، موسم میں غیر یقینی تبدیلیاں، رس چوس کیڑوں کا شدید حملہ، کیڑوں، بیماریوں اور شدید موسم کے خلاف کم قوت مدافعت رکھنے والی کپاس کی اقسام، کپاس کی بچھی کی غیر متحکم اور غیر یقینی قیمتیں وغیرہ کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی عوامل پاکستان میں کپاس کی بحالی و بقا دیکار ہے تو ان تمام عوامل کا مناسب دائمی اور دیر پامل تلاش کرنا ہوگا اور ان مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہوگا۔

درج بالا نقصانات دہ عوامل میں سفید مکھی، سبز تیلہ اور تھرپس کپاس کی پیداوار کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ان رس چوس کیڑوں میں سفید مکھی سب سے بڑا اور اہم خطرہ ہے جو کہ ہر سال کپاس کی پیداوار میں نمایاں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سفید مکھی کا حملہ کپاس کی نشوونما کے ابتدائی مرحلہ سے شروع ہو جاتا ہے اور کپاس کی برداشت تک جاری رہتا ہے۔ اگر سفید مکھی کا بروقت اور مسلسل سد باب نہ کیا جائے تو یہ کیڑا تقریباً 2.5 لاکھ گانٹھوں کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ملک میں کپاس کی شدید بد حالی کی کمی کے عناصر میں سفید مکھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ سفید مکھی کپاس کے علاوہ بہت سی سبزیات، پھلی دار اجناس، نمائی/زیبائی پودوں وغیرہ پر بھی حملہ آور ہوتی ہے اور نمایاں نقصانات کا باعث بنتی ہے۔

سفید مکھی کپاس کو درج ذیل تین طریقوں سے نقصان پہنچاتی ہے۔

- 1۔ پتوں سے رس چوس کر سفید مکھی کے بالغ اور بچے (نمٹ) دونوں پتوں سے رس چوس کر پودوں کی بڑھوتری اور پھول/ٹینڈے پیدا کرنے کی صلاحیت کو شدید حد تک کم کر دیتے ہیں جس سے فصل کی پیداوار بڑی طرح متاثر ہوتی ہے۔
- 2۔ لیس دار میٹھا مادہ خارج کرنے سے

رس چوسنے کے دوران بالغ اور بچے دونوں مسلسل جسم سے لیڈر میٹھا مادہ خارج کرتے ہیں جو کہ پتوں پر گرنا اور چپکنا رہتا ہے اس لیڈر مادہ پر سیاہ پھوہندی نشوونما پاتا جاتی ہے جس سے کپاس کے پتے بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں اور ان میں ضیائی تالیف کا عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے سیاہ پتے رکھنے والے پودے پر لگے پھل گڈی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پودے پر ٹینڈے کم لگتے ہیں اور لگے ہوئے ٹینڈے مناسب شکل و جسامت حاصل نہیں کر پاتے اور پودے سے گر جاتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے کپاس کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

3۔ پتہ مروڑ وائرس پھیلانے سے

سفید مکھی کپاس میں پتہ مروڑ وائرس پھیلانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اب تک ایک رپورٹ کے مطابق سفید مکھی کی پانچ مختلف اقسام رپورٹ کی گئی ہیں جن میں ایٹیا II-I (Asia, II-1)، ایٹیا II-5، ایٹیا II-7، ایٹیا II-8 اور میام (MEAM-I) شامل ہیں۔ اگر فصل پر سفید مکھی کے پھیلائے ہوئے وائرس کا حملہ ہو جائے اور فصل میں پتہ مروڑ وائرس کی بیماری پھیل جائے تو حملے کی شدت کے حساب سے فصل میں 70-15 فیصد پیداوار کا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

سفید مکھی کی پیٹ سکاؤٹنگ اور معاش نقصان دہ

کپاس میں سفید مکھی کے حملے کی شدت اور صورت حال کو جانچنے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار پیٹ سکاؤٹنگ کرنے چاہیے۔ دیئے گئے طریقے اور نقشے کے مطابق سفید مکھی کی پیٹ سکاؤٹنگ کرنی چاہیے۔ نقشے کے مطابق چلتے ہوئے پہلے پودے کا اوپر والا پتہ، دوسرے پودے کا درمیانی پتہ، تیسرے پودے کا نچلے والا پتہ دیکھیں اور پتہ پر موجود سفید مکھی کے بالغ اور بچے لیں یہی عمل نقشے کے مطابق چلے ہوئے جاری رکھیں

4۔ سفید مکھی کا تدارک دو صورت میں مشکل ہو جاتا ہے ایک اگر فصل میں جڑی بوٹیوں (خاص طور پر سوانچی اور کمبل گھاس) کی بہتات ہو اور دوسرا گرم موسم میں اگر کمپاس کو سوکھا لگ جائے۔ جس فصل میں جڑی بوٹیاں (سوانچی اور کمبل گھاس) زیادہ موجود ہوں وہاں سفید مکھی بچنے جا کر چھپتی رہتی ہے اور زہروں کے اثر سے بچ کر اپنی نسل بڑھاتی رہتی ہے۔ فصل میں اس کی کئی نسلیں (Over Lapping generations) پروان چڑھتی ہیں۔ اس صورت میں سفید مکھی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

5۔ اگر بارش کے موسم میں سوانچی اور کمبل گھاس موجود ہیں تو بارش کے موسم میں اس کا تدارک ضرور کریں کیونکہ بارش میں یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور کمپاس سے بڑی ہو جاتی ہے یہ دونوں جڑی بوٹیاں ناصرف فصل کی بڑھوتری کو متاثر کرتی ہیں بلکہ مؤثر کیڑے مار زہروں کے فائدہ مند و نتائج بھی نہیں آتے اور سفید مکھی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔

6۔ کمپاس کو گرم موسم میں پانی کا سوکانہ آنے دیں۔ اگر گرم موسم میں کمپاس کو پانی کا سوکا لگ جاتا ہے تو کمپاس پر سفید مکھی کا حملہ اور نقصان بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے۔

7۔ اگر کمپاس پر حملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کسان سمجھتا ہے کہ اب سفید مکھی کا تدارک ممکن نہیں تو پیلا سپرے متونی (پائیری فلو کیونازون) اور دوسرا سپرے مونٹو (سپائیر وٹھرامیٹ) کا کرنے سے سفید مکھی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔

بارش کے موسم میں سفید مکھی کا کیمیائی تدارک

کمپاس پر اگر بارش کے موسم میں سفید مکھی کا حملہ معاش نقصان دہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو سپائیر وٹھرامیٹ کا ایک سپرے انڈول اور بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کریں جبکہ دوسرا سپرے بالغ سفید مکھی کو مارنے کے لیے فلو نیکا میڈ کا کریں۔ سپائیر وٹھرامیٹ اور فلو نیکا میڈ کو ملا کر بھی پہلا سپرے کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں دوسرا سپرے سات دن کے وقفے سے ہائپریت اور سپائیر وٹھرامیٹ کا ملا کر کریں۔ ان کیڑے مار زہروں کی مقدار فی ایکڑ سفارش کردہ مقدار کے مطابق کریں۔

سفید مکھی کا دوسرے دس چوس کیڑوں کے ساتھ کیمیائی تدارک

اگر سفید مکھی کے ساتھ ساتھ سبز تیل کا حملہ بھی معاش نقصان دہ حد سے بڑھ گیا ہے تو پہلا سپرے فلو نیکا میڈ اور سپائیر وٹھرامیٹ کے مکچر کا کریں جبکہ سات دن کے وقفے سے دوسرا سپرے فلو نیکا میڈ اور سپائیر وٹھرامیٹ کے مکچر کا کریں۔ اگر ان کا حملہ بہت زیادہ ہو جو کہ فلو نیکا میڈ سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو فلو نیکا میڈ کے ساتھ پائیر پھاسکسین یا پیر و فیزن کا مکچر یا

اور جہاں تک بیس پودوں کو ڈیٹا مکمل ہو جائے۔ بیس پودوں پر سے لیے گئے بالغ اور بچوں کا ڈیٹا کا اوسط نکال لیں اور سفید مکھی کے بالغ بچے کی پتہ معلوم کر لیں اگر سفید مکھی کے بالغ یا بچے کی تعداد فی پتہ اس کے معاشی نقصان دہ حد (5 بالغ / بچے / دونوں 5 فی پتہ) کے برابر یا زیادہ ہوں تو کیڑے مار زہروں کا سپرے ضرور کریں لیکن اگر سفید مکھی کی آبادی معاشی نقصان دہ حد سے کم ہو تو کیڑے مار زہروں کے سپرے سے اجتناب کریں۔

سفید مکھی کے مؤثر کیمیائی تدارک کے چند سنہری اصول

- 1۔ موسم اور بارشوں کی نوعیت کے حساب سے زہروں کا انتخاب کریں۔ بارشوں کے موسم میں صرف ان زہروں کا استعمال کریں جن کا اثر بارش کے بعد جلدی زائل نہیں ہوتا۔ بارشوں کے موسم میں سپائیر وٹھرامیٹ ایک اچھا پڑاؤ کٹ ہے جو کہ سفید مکھی کے بچوں کو مارتا ہے اور بارش سے بالغ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فلو نیکا میڈ بھی بارش کے موسم میں اچھا کنٹرول دیتا ہے۔ بارش کے موسم میں اگر سفید مکھی اور سبز تیل کا کٹھا حملہ ہو گیا ہے تو سپائیر وٹھرامیٹ اور فلو نیکا میڈ کو ملا کر بھی سپرے کیا جاسکتا ہے۔
- 2۔ فصل پر سپرے کا انتخاب موسم کی شدت اور مہینے کے حساب سے کریں۔ جون کے مہینے میں موسم شدید گرم ہوتا ہے جبکہ جولائی اور اگست کے مہینے بارشوں کے مہینے سمجھے جاتے ہیں اور نسبتاً گرم ہوتے ہیں جبکہ ستمبر کا مہینہ درجہ حرارت کے حساب سے نسبتاً کم گرم سمجھا جاتا ہے۔ ان مہینوں اور درجہ حرارت کے حساب سے مناسب اور موزوں سپرے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جون یا جولائی کے مہینوں میں جب درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور پودہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے تو پائیری پھاسکسین اور پیر و فیزن مناسب پڑاؤ کٹ ہیں۔ جب اگست کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت سفید مکھی کے تدارک کے لیے فلو نیکا میڈ یا فلو نیکا میڈ کے ساتھ پائیری پھاسکسین یا پیر و فیزن بھی ملائی جاسکتی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں جب موسم نسبتاً ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ڈائیٹا فیتھوران ایک اچھا پڑاؤ کٹ سمجھا جاتا ہے۔
- 3۔ سفید مکھی کے تدارک کے لیے ایسے سپرے کا انتخاب کریں جو کہ سفید مکھی کے بالغ اور بچوں دونوں کو مارتا ہو کبھی بھی ایک یا ایک سے زیادہ ایسی زہروں کا انتخاب نہ کریں جو کہ صرف بالغ کو مارتی ہوں یا صرف انڈول / بچوں کو مارتی ہوں کیونکہ اگر آپ ایسی زہروں کا انتخاب کریں گے تو سفید مکھی کا کنٹرول ناممکن ہو جائے گا۔ ہمیشہ ایک یا ایک سے زیادہ ایسی زہروں کا انتخاب کریں جو کہ بالغ اور بچوں دونوں کو مارتی ہوں۔ ایسی زہروں کو آپ یکے بعد دیگرے یا ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

پانی مٹرو زین اور ڈائی نوٹی فیوران کا مکچر 60 ڈبلیو ڈی جی	سفید مکھی کے بالغ اور بچوں دونوں کے ایک موثر کیڑے مار مکچر ہے	100 گرام فی ایکڑ
پائیری پراسکین 10.8 ای سی	سفید مکھی کے انڈوں اور بچوں کے لیے مناسب کیڑے مار زہر ہے۔ اس کا استعمال اس وقت کریں جب موسم گرما (جون، جولائی) ہو اور پودہ ابھی چھوٹا ہو۔ فصل پر ابھی سفید مکھی کی کالونی نہ بنی ہو	500 ملی لیٹر فی ایکڑ
پیروفیزین 25 ڈبلیو پی	سفید مکھی کے انڈوں اور بچوں کے لیے مناسب کیڑے مار زہر ہے۔ اس کا استعمال اس وقت کریں جب پودہ ابھی چھوٹا ہو اور درجہ حرارت زیادہ (جون، جولائی) ہو اور فصل پر ابھی سفید مکھی کی کالونی نہ بنی ہو	600-800 گرام فی ایکڑ
ڈائیا فنتھیوران 150 ای سی	اس کا استعمال اس وقت کریں جب موسم قدر ٹھنڈا (ستمبر) ہو جائے اور فصل پر کنوپی بن جائے۔ یہ زہر اڑتی ہوئی سفید مکھی (بالغ) کے لیے اس موسم میں بہترین کیڑے مار زہر ہے۔	200 ملی لیٹر فی ایکڑ
تھائیو سائیڈکلام ہائیڈروجن آکسالیٹ اور اسٹامپس ہائیڈ مکچر 28 فی صد ڈبلیو پی	یہ بھی بالغ سفید مکھی کے لیے ایک موثر کیڑے مار مکچر ہے	200 گرام فی ایکڑ
سپائیرو پیڈیون + اسٹینا مپرڈ مکچر 54 ڈبلیو جی	سفید مکھی کے لیے ایک موثر کیڑے مار مکچر ہے	100 گرام مکچر + 250 ملی لیٹر ایڈجوائنٹ فی ایکڑ
ڈائی نوٹی فیوران + سپائیروٹھرامیٹ (20 ای سی)	سفید مکھی کے بالغ اور بچوں دونوں کے لیے ایک موثر کیڑے مار مکچر ہے	250 ملی لیٹر فی ایکڑ
اسبا میکٹن + سپائیرو ٹھرامیٹ 12 ای سی	سفید مکھی کے بالغ اور بچوں دونوں کے لیے موثر کیڑے مار مکچر ہے	300 ملی لیٹر فی ایکڑ

(باقی صفحہ 49 پر)

نائیٹن پائیرام اور فلونیکا میڈ کا مکچر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان زہروں کی سفارش کردہ
مقدار فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر سفید مکھی کے ساتھ تھرپس کا حملہ بھی معاشی نقصان دہ حد
سے بڑھ گیا ہے تو سپائیروٹھرامیٹ اور ایبیا میکٹن کا مکچر یا فلونیکا میڈ اور ایبیا میکٹن کا مکچر
سفارش کردہ مقدار کے مطابق پرے کریں۔

☆ اگر فلونیکا میڈ، سپائیروٹھرامیٹ کے پرے کے باوجود مکھی بہت بڑھ گئی ہے
کنٹرول سے باہر ہوتی جاری ہے اور کپاس کو بہت زیادہ کالا کر رہی ہے تو فلونیکا میڈ، اسٹینا
مپرڈ اور پائیری پراسکین کے مکچر کے دو پرے 6-7 دن کے وقفے سے دہرائیں یا
پھر پائیری فلونیکونازون کے دو پرے 6-7 دن کے وقفے سے دہرائیں۔ اس سے سفید
مکھی سے کافی حد تک چھٹکارا مل جائے گا۔

کیڑے مار زہر	خصوصیات	سفارش کردہ مقدار
فلونیکا میڈ (50 ڈبلیو ڈی جی یا 50 ڈی ایف)	یہ سبز تیلے اور اڑتی ہوئی سفید مکھی (بالغ) کے تدارک کے لیے بہت موثر کیڑے مار زہر ہے۔ اس کا اثر بارش کے بعد بھی 15-20 دن تک رہتا ہے۔	100-80 گرام فی ایکڑ
سپائیروٹھرامیٹ (240 ای سی)	سفید مکھی کے انڈے اور بچوں کے لیے نہایت موثر کیڑے مار زہر ہے۔ اس کا اثر بارش کے بعد بھی رہتا ہے۔ اس کا استعمال اس وقت کریں جب سفید مکھی کی کالونی ابھی نہ بنی ہو۔	160 ملی لیٹر فی ایکڑ
فلونیکا میڈ اور سپائیروٹھرامیٹ کا مکچر	سفید مکھی کے بالغ، انڈوں اور بچوں کے لیے موثر ہے اور اس مکچر کا اثر بارش کے بعد بھی رہتا ہے۔	200 گرام فی ایکڑ
پائیری فلونیکونازون (متونی) (20 ڈبلیو جی)	بالغ اور بچوں دونوں کے لیے موثر زہر ہے	200 گرام فی ایکڑ
ایفیڈو پائیرو پیٹن (سیفیٹا) 5 ڈی سی	سفید مکھی کے بالغ اور بچوں دونوں کے لیے موثر کیڑے مار زہر ہے یہ سفید مکھی کے کھانے کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔	400 ملی لیٹر فی ایکڑ
ڈائی نوٹی فیوران 20 فیصد ای سی جی	سفید مکھی کے بالغ اور بچوں دونوں کے لیے ایک موثر کیڑے مار زہر ہے	100-125 گرام فی ایکڑ

مولی اور گاجر کی کاشت

ڈاکٹر فریحہ شیریں، ڈاکٹر خرم ضیاف، ڈاکٹر محمد اویس غنی، ڈاکٹر محمد عرفان اشرف..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد

1- مولی

طریقہ کاشت

کھیت میں 75 سینٹی میٹر کے فاصلے پر کھیلیاں بنالیں۔ پٹریوں کی دونوں جانب بیج کیرا کر لیں۔ بیج ڈالنے کے بعد ہاتھ سے زمین ہلکی ہموار کر لیں۔ بصورت دیگر 10 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پٹریوں کے کناروں پر 2 سے 3 بیجوں کا چوپا کریں۔ کیرے کی صورت میں جب پودے 5 سے 8 سینٹی میٹر اونچے ہو جائیں تو 10 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک پودا چھوڑ کر چھدرائی کریں۔ چھدرائی نہ کرنے کی صورت میں پودے کمزور اور مولی کا سائز چھوٹا رہتا ہے۔ اگر وقت پر چھدرائی نہ کی جائے تو بعد میں پودے کمزور رہ جاتے ہیں۔

آپاشی

مولی کی بہترین پیداوار کے لیے زمین میں نمی کے تناسب کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مولی کو بوائی کے فوراً بعد پانی لگائیں۔ اگست میں کاشت کی گئی فصل کو پہلا پانی 5 دن بعد جبکہ اکتوبر اور بعد ازاں کاشت کی گئی فصل کو پہلے دو پانی ایک ہفتے کے وقفے سے جبکہ اس کے بعد 15 دن کے وقفے سے لگائیں۔

جڑی بوٹیوں کا انداد

جڑی بوٹیوں کے انداد کے لیے کاشت سے 15 دن بعد اور پھر وقتاً فوقتاً گوڈی کریں۔ وسیع پیمانے پر کاشت کی گئی فصل میں جڑی بوٹیوں کی روک تھام کے لیے ایس میٹالاکلو ربحساب 650 سے 700 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔

کیرڈوں اور بیماریوں سے بچاؤ

مولی میں مولی بگ، چت تیلے اور ہڈا بھونڈی کے انداد کے لیے حملہ شدہ کھیتوں میں متاثرہ پتوں، انڈوں، سڈیوں اور بھونڈیوں کو تلف کر دیں۔ مولی بگ اور چت تیلے کے شدید حملے کی صورت میں امیڈا کلو پرڈ 250 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔ مولی کی بیماریوں میں پودے کا مرجھاؤ اور پھپھوندی اہم ہیں۔ پودوں کے مرجھاؤ کے تدارک کے لیے بوئی سے پہلے بیج کو 2 گرام فی کلو گرام بیج کے حساب سے تھائیوفینیٹ میتھائل لگا کر پھر بوئی کریں۔ پتوں پر پھپھوندی کی صورت میں ڈایا تھین ایم کا سپرے کریں۔

برداشت اور پیداوار

مولی کی اگیتی اقسام 40 دنوں میں برداشت کے قابل ہو جاتی ہیں۔ برداشت کے وقت پتوں کا رنگ گہرے سبز سے ہلکا سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ برداشت سے دو سے تین

مولی پاکستان میں کاشت کی جانے والی موسم سرما کی مشہور سبزی ہے۔ مولی کا آبائی وطن ایران ہے۔ اسے سلاد اور سالن دونوں صورتوں میں کھایا جاتا ہے۔ مولی کو کاشت کے بعد 3 سے 6 ہفتوں کے اندر برداشت کیا جاسکتا ہے لہذا یہ بچن گاڑ تنگ کے لیے بے حد موزوں ہے۔ مولی میں پروٹین، شوگر، وٹامن اور نمکیات وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مولی تلی، پرقان، بوا سیر اور جگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ علاوہ ازیں مولی کے پتوں میں وٹامن اے کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ پنجاب میں مولی کو شیخوپورہ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اوکاڑہ، رحیم یار خان، جبکہ سندھ میں ٹنڈوالہ یار میں کامیابی سے بڑے پیمانے پر کاشت کیا جا رہا ہے۔

وقت کاشت

مولی کی کاشت میں موسم خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مولی کو جولائی سے جنوری تک کاشت کیا جاسکتا ہے۔ دوران کاشت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے بعد ازاں پتوں کا سائز چھوٹا رہتا ہے اور جڑ سخت ہو جاتی ہے۔ میدانی علاقوں میں مولی کی دیسی اقسام کو وسط اگست اور جاپانی اقسام کو اکتوبر تا نومبر کاشت کیا جاسکتا ہے۔

زمین کی تیاری اور کھادوں کا استعمال

مولی کو ہر قسم کی زمین میں کاشت کیا جاسکتا ہے لیکن یہ بہترین نکاس والی زرخیز میرا زمین میں اچھی پیداوار دیتی ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے کاشت سے ڈیڑھ ماہ قبل 12 سے 15 ٹن گوبر کی کھاد کو زمین میں ڈال کر بل چلائیں اور آپاشی کر دیں۔ وتر آنے پر دو سے تین مرتبہ بل چلا کر سہاگہ دیں۔ بوقت کاشت آدھی بوری یوریا، ایک بوری ڈی اے پی، اور ایک بوری پوناش ڈالیں۔ اگست کاشتہ فصل میں بوئی کے 20 دن بعد آدھی بوری یوریا جبکہ اکتوبر اور پچھیمیتی کاشتہ فصل میں 30 سے 40 دن بعد آدھی بوری یوریا استعمال کریں۔

اقسام اور شرح بیج

اگست میں کاشت کے لیے مینو اور شاؤ مائی، اکتوبر میں مینو اور گرین نیک جبکہ نومبر کاشتہ فصل کے لیے آل سیزن بہترین اقسام ہیں۔ مولی کی کاشت کے لیے تین سے ساڑھے چار کلو گرام بیج فی ایکڑ کافی ہے۔

روز قبل کھیت میں پانی لگائیں تاکہ برداشت کے وقت زمین کی نرمی کی وجہ سے مولیاں کم سے کم ٹوٹیں۔ مولیوں کی مختلف اقسام سے تقریباً 7 سے 8 ٹن پیداوار لی جاسکتی ہے۔

ج.ک -2

2- گاجر
گاجر سلاڈ کے طور پر استعمال ہونے والی سبزیوں میں مقبول ہے۔ اس کو پکا کر اور اچار کی شکل میں بھی کھایا جاتا ہے۔ پنجاب میں گاجر کی مشہور سوغات گاجر کا حلوہ ہے جو کہ منفرد ذائقے کی وجہ سے پہچان رکھتا ہے۔ گاجر کا قدیمی آبائی وطن افغانستان ہے۔ بعد میں اسے براعظم ایشیا اور یورپ میں وسیع پیمانے پر کاشت کیا گیا۔ اب گاجر کو پوری دنیا میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ پائیز کھانوں میں گاجر کو بہت استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آج کل کے نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں۔ گاجر میں وٹامن اے، پوٹاشیم اور کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ آنکھوں کی بینائی، دل کی دھڑکن اور ہڈیوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ گاجر میں قدرتی طور پر لائیوینجین نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ قوت مدافعت پیدا کر کے کینسر سے بچاتا ہے۔ اس کا استعمال خون صاف کرنے اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔

آب و ہوا اور وقت کاشت

گاجر موسم سرما کی فصل ہے۔ اس کی نشوونما کے لیے کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سرخ اور زرد دونوں رنگ کی گاجریں کاشت کی جاتی ہیں۔ جو کی نشوونما اور مناسب رنگت کے لیے سرخ قسم کی گاجروں کو زرد کی نسبت زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً سرخ گاجروں کے لیے درجہ حرارت 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زرد اقسام کے لیے 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ موزوں درجہ حرارت ہے۔ پنجاب میں گاجر کی کاشت ماہ ستمبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ بہترین پیداوار اور عمدہ کوالٹی کی گاجروں کے لیے ماہ اکتوبر میں بوائی موزوں ہے۔

زمین کی تیاری اور کھادوں کا استعمال

گاجر کی کاشت کے لیے نرم میرا زمین بہترین ہے۔ ایسی زمینیں جن کا کیمیائی تعادل 7 سے کم ہو گاجر کی کاشت کے لیے موزوں تصور کی جاتی ہیں۔ کلر اٹھی زمینوں میں کاشت کرنے سے بچ کا گاؤ اور جڑ کی نشوونما دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ ایسی زمینوں میں گاجر سخت اور چھوٹی رہ جاتی ہے۔

گاجر کی کاشت میں زمین کی تیاری خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اسکی وجہ جوڑ کا گہرائی میں بننا اور بیج کا سائر چھوٹا ہونا ہے۔ بوائی سے قبل زمین میں گہرا اہل چلائیں تاکہ زمین نرم اور بھر بھری ہو جائے۔ بعد میں سہاگہ دیں۔ لیزر لیول سے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ زمین کی تیاری کے وقت دو بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش فی ایکڑ

گاجر کے بیج کی بوائی کے فوراً بعد آبپاشی کریں۔ بیج کی اگائی اور جڑ کے پینے کے لیے زمین میں 20 سے 30 فی صد نمی کا ہونا لازم ہے۔ زیادہ نمی کی صورت میں گاجریں چھائی یا موٹی رہ جاتی ہیں اور انکی رنگت متاثر ہوتی ہے۔ ستمبر کا شیشہ فصل کو 5 سے 7 جبکہ اکتوبر کا شیشہ فصل کو 2 سے 3 مرتبہ آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مسلسل سوکے کے بعد آبپاشی کی جائے تو گاجر پھٹ جاتی ہے لہذا مناسب وقفے سے آبپاشی کرتے رہیں۔

بیماریوں اور کیڑوں کا کنٹرول

گاجر کی بیماریوں میں گاجر کا ہر ایشمی گلاؤ، کراؤن کا گلاؤ، اگیتا اور پچھینتا جھلساؤ، اور سفوفی پچھوندی شامل ہیں جبکہ کیڑوں میں گاجر کی مکھی اور سست تیلہ شامل ہیں۔ گاجر کی مکھی کے لیے کانفیڈور بحساب 250 ملی لٹر فی ایکڑ جبکہ سست تیلہ کے لیے اسیتا مپھر ڈ 250 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔

برداشت

ٹی-29 گاجر کی بہترین کواٹٹی اور عمدہ پیداوار دینے والی ترقی دادہ قسم ہے۔ گاجر کی مختلف اقسام بشمول ٹی-29 عموماً 100 سے 120 دن میں برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ برداشت سے پہلے زمین میں مناسب و تر موجود ہونا چاہیے تاکہ گاجریں نکالنے میں آسانی ہو۔ عموماً برداشت سے دو ہفتے پہلے آبپاشی بند کر دیں۔

<<<<<<<>>>>>>>>

بروکولی کی کاشت

واجد نذیر، خرم ضیاف، محمد مزمل، جہانگیر، محمد ہارون..... انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف اور اہمیت

بروکولی (Broccoli) موسم سرما میں لگائی جانے والی سبزی ہے۔ یہ براسیکا خاندان کی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ اس گروہ کی اہم فصلیں پھول گو بھی، بند گو بھی، گانٹھ گو بھی اور چائینیز گو بھی ہیں۔ اس کے پھول، پھول گو بھی کے مشابہہ ہوتے ہیں تاہم ان کی رنگت سبز ہوتی ہے۔ بروکولی غذائی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو سبزی کے طور پر آلو کے ساتھ پکا کے اور سلاڈ کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ بروکولی میں حیاتین سی، حیاتین کے، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹ، فائبر اور پروٹین پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے معدنیات، پولیفینول اور اینٹی آکسائیڈنٹ کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے جو کہ انسان کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فی الوقت بروکولی بہت کم رقبہ پر کاشت کی جا رہی ہے تاہم لوگوں میں اس کی افادیت کا چرچا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کسان بھائی اس کی کاشت کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔

آب و ہوا

براسیکا خاندان کی تمام فصلوں کے لیے سرد مہربان آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ سرد موسم میں بروکولی کے پھول متوازن شکل اور بڑے سائز کے بننے میں۔ اس کی کاشت کے لیے مناسب درجہ حرارت 12 ڈگری سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ لیکن اگر اس فصل کو طویل وقت تک کم درجہ حرارت (1.7 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ) کا سامنا کرنا پڑے تو یہ بٹنگ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر پھول بننے کے دوران درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو پھول ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی گھل (loose) جاتے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت کرنے کے قابل نہیں رہتے لہذا بروکولی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت پر پینیری لگائی جائے اور کھیت میں منتقل کی جائے۔

شرح بیج

پاکستان میں بروکولی کی کوئی لوکل وراثتی موجود نہیں ہے تاہم دوسرے ممالک سے آئی ہوئی وراثتی لگائی جاتی ہیں جن میں میراتھن (Marathon) وراثتی قابل ذکر ہے۔ ایک ایکڑ کے لیے بروکولی کا 100 سے 150 گرام ہائبرڈ وراثتی کا بیج کافی ہوتا ہے۔ اگر پودوں اور قطاروں کا فاصلہ 75×45 سینٹی میٹر ہو تو تقریباً 18 ہزار پودے ایک ایکڑ زمین کے لیے درکار ہوتے ہیں۔

پینیری تیار کرنے کا طریقہ

پاکستان میں بروکولی کی کاشت کے لیے ہائبرڈ وراثتی کا بیج استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عمدہ کوالٹی کا ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی پینیری 72 خانوں والی سیڈلنگ ٹری (seedling tray) میں تیار کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ٹری کے عام مٹی کی بجائے پریسڈ مکڈ کو کوٹ کو آئر اور اس ہبک ایش سے 1+1+1 کے تناسب سے تیار کیے ہوئے میڈیا سے یا پیٹ ماس سے اچھی طرح بھرا جاتا ہے۔ پھر ہر خانہ میں ایک ایک بیج لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم زمین پر بھی بروکولی کی پینیری لگا سکتے ہیں۔ پینیری کے لیے زیادہ تر بھل یا اتھتھ نکاس والی زرخیز میراز مین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھل یا مٹی کی اونچی کھاریاں (بیڈ) بنائیں جو کہ زمین سے تقریباً 15 سینٹی میٹر بلند ہوں۔ پھر لکڑی کی مدد سے ایک یا دو سینٹی میٹر گہری لائنیں لگائیں۔ قطاروں کے مابین فاصلہ تقریباً آٹھ سے دس سینٹی میٹر رکھیں۔ ان لائنوں کے اندر بیج لگا دیں۔ پھر ریت کی مدد سے یا باریک مٹی کی مدد سے بیجوں کو ڈھانپ دیں۔ بیڈ کو خشک پرالی سے ڈھانپ دیں۔ فوراً سے پانی لگائیں۔ جب آکاؤ شروع ہو جائے تو پرالی ہٹا دیں۔ پینیری کے پانی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ضرورت سے زیادہ نمی ہونے سے پینیری کو ڈیمپنگ آف (Damping off) کی بیماری لگ سکتی ہے۔ عموماً پانچ ہفتے میں پینیری کھیت میں منتقلی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور جس دن پودوں کو کھیت میں منتقل کرنا ہو تو صبح کے وقت آبپاشی کریں اور منتقلی شام کے وقت کرنا بہتر ہے۔

زمین کا انتخاب اور تیاری

زرخیز میراز مین، جس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہو، بروکولی کی اچھی پیداوار کے لیے موضوع ہے۔ اس کے لیے زمین کا کیمیائی تعامل 6 سے 6.5 تک ہونا چاہیے لیکن بروکولی 5.5 سے 5.7 تک کی pH بھی برداشت کر سکتی ہے۔ مٹی پلٹنے والا ہل چلانے کے بعد روایتی ہل (Tine tiller) چلائیں اور کھیلیاں بنائیں۔ جب پینیری چار سے پانچ ہفتوں کی ہو جائے تو کھیت کے اندر 75 سینٹی میٹر کے فاصلے پر کھیلیاں بنائیں اور 45 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پودوں کو منتقل کر دیں کیونکہ بروکولی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے 75×45 سینٹی میٹر فاصلہ موزوں ہے۔ کھیلیوں کا رخ شرقاً مغرباً رکھیں اور پودے کھیلیوں کی جنوبی جانب لگائیں۔

کھادوں کا استعمال

سے گوڈی کر کے یا پھرے مٹین کی نوزل پر شیلڈ لگا کر پیراکوٹ کی پیرے سے تلفت کیا جا سکتا ہے۔

گوڈی اور مٹی چڑھانا

پنیری کھیت میں منتقل کرنے کے دو سے ڈھائی ماہ بعد بروکولی کے پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پودے وزنی ہونے کی وجہ سے کھیت میں گر سکتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا پودوں کو گرنے سے روکنے کے لیے کسی کی مدد سے پودوں کے گرد مٹی چڑھانی چاہیے۔ اس کے لیے پہلے گوڈی کر کے نرم کر لیں یا ہر کھیلی (Ridge) کی شمالی جانب، جہاں پودے نہیں لگائے گئے تھے، وہاں سے مٹی لے کر پودوں کے ساتھ لگائیں۔ اس دوران پودوں کو نقصان سے بچائیں۔

طریقہ برداشت

بروکولی کے پھول تین سے چار انچ ٹنڈل (stem) کے ساتھ کاٹنے چاہیے اور اس کے ساتھ لگے پتوں کو اتار دینا چاہیے۔ کیونکہ برداشت کے بعد بروکولی کے پھول کچھ گھنٹوں کے بعد ڈھیلے (loose) ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کو جلد از جلد کم درجہ حرارت والی جگہ پر منتقل کرنا چاہیے۔ بروکولی کے بڑے پھولوں کے ساتھ ساتھ، پودوں کے اطراف والی شاخوں پر بھی چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ اگر فصل کے پانی اور کھاد کا خیال رکھا جائے اور ضرورت پڑنے پر امائنو ایسڈ سپرے کی جائے تو ثانوی پھولوں (Secondary curds) کی بھی اچھی پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی فروخت کر کے کسان پیسے کما سکتا ہے۔

ضرر رساں کیڑے، بیماریاں اور ان کا کنٹرول

تیتا اوگو بھی کی سندی بروکولی پر حملہ آور ہو کر فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے امیڈا کلو پریڈ (تیلے کے لیے) اور ایما میکٹن (سندی کے لیے) کو استعمال کرنا چاہیے۔ سپرے کا استعمال سپرے کی بوتل کے اوپر لگے ہوئے لیبل کے مطابق کرنا چاہیے۔ جبکہ پاؤڈری ملٹڈ یو اور ڈاؤنی ملٹڈ یو کے کنٹرول کے لیے ٹاپس-ایم کی مناسب مقدار پودوں پر سپرے کرنی چاہیے۔

بروکولی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے نائٹروجن کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے لیکن اگر ضرورت سے زیادہ نائٹروجن زمین میں ڈالی جائے تو اس سے پودے کی نشوونما تو تیز ہو جاتی ہے لیکن بروکولی کے پھول اچھی کوالٹی کے نہیں بنتے اور اگر اسی دوران درجہ حرارت بھی زیادہ ہو جائے تو پتوں کے کنارے جل جاتے ہیں۔ بروکولی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے بوران اور مولیبڈینم بھی درکار ہوتی ہے۔ بوران کی کمی نئے بننے والے پتوں کے لیے سیلین پن کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے زمین کی تیاری کے وقت ایک کلو بوران فی ایکڑ کے حساب سے شامل کرنی چاہیے۔ بروکولی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے 200 کلو گرام نائٹروجن، 150 کلو گرام پوٹاشیم اور 150 کلو گرام فاسفورس فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔ کھادوں کا یہ تناسب اوسط درجے کی ریتی میرا زمین کے لیے موزوں ہے۔

آپاشی

عام طور پر بروکولی کی بہتر پیداوار کے لیے ہر ہفتے ہلکے (1.5-1 انچ) پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودوں کو کھیت میں منتقل کرنے کے بعد اگر مناسب مقدار میں کھیت کو پانی نہ دیا جائے تو اس سے پودوں کی نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے اور بروکولی کے پھول ایک وقت میں تیار نہیں ہوتے۔ تاہم ضرورت سے زیادہ پانی سے بروکولی کے پھول دیر سے بنتے ہیں اور پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ خیال رکھیں کہ کھیت کو پانی دوپہر کے وقت نہ لگایا جائے۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی

چونکہ فصل کے ابتدائی دور میں جڑی بوٹیاں مثلاً ڈیلا گھاس کی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اچھی نشوونما اور پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو تلفت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پنیری کو کھیت میں منتقل کرتے وقت یا اس سے پہلے ڈوآل گوڈ جڑی بوٹی کش زہر کی سپرے کریں۔ جس سے تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ گوڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر جڑی بوٹیوں کو دستی طریقہ بذریعہ ہاتھ

احادیث مبارکہ

الحمدیث: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جناب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا: تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو۔ پہلے تو تم انہیں اللہ کی توحید اور میری رسالت کا درس دینا اگر وہ اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو ان کے عمدہ مال سے صرف نظر کرنا اور مظلوم کی دعا (بد) سے ڈرتے کیونکہ مظلوم اور رب کریم کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے اور چاندی کا مالک اگر اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا کر گرم کر کے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کو داغنا جائے گا اور اس عمل کی اس دن سزا کی جائے گی جس کی مدت پچاس ہزار سال ہوگی پھر بندوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھیں گے۔ (مسلم)

پھولوں و زیبائشی پودوں کی قدر و قیمت میں قابل قدر اضافے کا طریقہ کار

ترجمہ حسین، افتخار احمد، عیثا رمضان..... انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

پھولوں کی ویلیو ایڈیشن سے مراد لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے طریقوں کو اپناتے ہوئے پھولوں کی کوٹنگ کو بڑھانا یا ان سے مختلف کارآمد اشیاء بنانا بھی ویلیو ایڈیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ پھولوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ تجارت میں اس طریقہ کار کو اپنانے سے بہت سا زرمبادلہ کمایا جاسکتا ہے۔ چونکہ پھول بہت نازک ہوتے ہیں جو برداشت کے بعد بہت جلد مر جھکا جاتے ہیں لہذا پیداوار کو کاشت کے بعد ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس طریقہ کار کے ذریعے کارآمد اشیاء میں تبدیل کر کے نہ صرف محفوظ کیا جاسکتا ہے بلکہ لمبے عرصے تک استعمال میں بھی لایا جاسکتا ہے۔ تروتازہ پھولوں کو محفوظ کرنا اور غیر استعمال شدہ اشیاء سے کارآمد اشیاء بنا کر ان کو استعمال میں لانا بھی ویلیو ایڈیشن کے زمرے میں آتا ہے۔

2- تراشیدہ پھولوں کی سجاوٹ میں استعمال کے لیے تراشیدہ پھولوں کی بعد از برداشت کے بعد، مناسب دیکھ بھال اور عمدہ کوٹنگ پیکنگ کے ذریعے نہ صرف انکی تروتازگی لمبے عرصے تک برقرار رکھی جاسکتی ہے بلکہ انکی قدر و قیمت میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

3- خشک پھولوں سے سجاوٹ، پھولوں کو ڈنڈی کے بغیر کاٹنے کو Loose Flowers کہتے ہیں۔ مختلف پھولوں مثلاً گلاب، چنبل، گیندے اور گل شبو وغیرہ کی پتیوں کو استعمال میں لا کر کارآمد اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ جن سے کاشت کار زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں

ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال ہونے والے نمایاں پھول

1- گلاب گلاب جسے پھولوں کی ملکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو خوبصورتی محبت اور خوشبو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خوشبودار گلاب کی کاشت عام طور پر پاکستان، ترکی، ایران اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ گلاب کو تراشیدہ پھول کے طور پر اگانے کے علاوہ بانجیوں اور گملوں میں سجاوٹ کے لیے بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ اس پھول کی دلکش مہک کی بناء پر گلاب کی پتیوں کو مختلف اشیاء کی تیاری کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے باعث دنیا بھر میں بے پناہ معاشی اہمیت کا حامل ہے۔ گلاب کی پتیاں، جن کی بعد از برداشت تروتازگی کم ہوتی ہے، اگر بروقت استعمال میں نہ لائی جائیں تو کاشتکاروں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں گلاب کے مختلف فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وسیع پیمانے پر درآمد اور برآمد کیا جانے والا پھول ہے۔ گلاب کی منفرد خوشبو کی بناء پر مختلف صنعتیں اس پھول کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جن میں ادویات کی تیاری، عطر، کاسمیٹکس اور دیگر مختلف اشیاء شامل ہیں۔

گلاب کی پتیوں سے عطر بھی کشید کیا جاتا ہے جو کہ ایک نہایت مفید کاروبار ہے۔ گلاب کی پتیاں مختلف سماجی مواقع مثلاً شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ایک لٹر گلاب کا عطر کشید کرنے کے لیے 4 تا 5 ٹن پتیاں درکار ہوتی ہیں۔ جس کو ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف منڈیوں میں مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ عرق گلاب کو منہ

پوری دنیا میں پھولوں کی صنعت کو زرعی کاروبار میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ پھول انسانی زندگی میں احساسات و جذبات کی ترجمانی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں پھولوں سے تیاری کی جانی والی اشیاء میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جو پھولوں کے جمالیاتی حسن، متنوع، رنگوں، خوشبو، پھولوں کی بناوٹ اور وسیع اقسام کی بنیاد پر ہے۔

تراشیدہ پھولوں (Cut Flower) کی بعد از برداشت تروتازگی کو لمبے عرصے تک بڑھانے کے لیے مختلف طریقوں کے ذریعے کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ پھول انتہائی نازک ہونے کی بناء پر جلدی مر جھکا جاتے ہیں لہذا انہیں مختلف طریقوں سے مفید اور کارآمد اشیاء میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ پھولوں کی پیداوار کے شعبے میں ناصرف پتیاں بلکہ تراشیدہ پھولوں اور زیبائشی پودوں کے علاوہ پھولوں سے بنائی جانے والی قیمت افزا اشیاء بھی شامل ہیں۔ قدر و قیمت بڑھانے کا عمل پھولوں کی پیداواری صنعت میں مالیاتی قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔

درج ذیل طریقوں سے پھولوں کی قدر و قیمت کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

1- تازہ پتیاں کو گجروں، رنگولی، پھولوں کی آرائش، گلدستوں، ٹوکریوں، (Floral Wreath)، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں آرائش کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جنہیں عمدہ پیکنگ میٹریل میں منڈیوں میں ترسیل کرنے سے ان کی قدر و

(Carotenoids) اور (Flavonoids) کے باعث اس کو مختلف ادویات اور کپڑے مارپیرے کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صنعتی شعبے میں گیندے سے کشید کیے جانے والے عطر کو صابن، جراثیم کش، مچھر مارا دویات اور سجاوٹی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں اسے پھولوں سے تیار شدہ زیورات، خشک سجاوٹی گلدستوں کے علاوہ مرغیوں (پولٹری) کی خوراک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کئی ممالک میں اسے کپڑا رنگنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

زیبائشی ادویاتی پودے اور ان سے تیار کردہ اشیاء

1۔ کوارگنڈل

کوارگنڈل جسے انگریزی زبان میں Aloe vera کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک نہایت اہم زیبائشی ادویاتی پودا ہے جس سے نکلنے والے گودے کو استعمال میں لا کر اس سے مختلف کارآمد اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ان اشیاء میں صابن، شیمپو، لوشن اور جلد کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی کریم کے علاوہ شوگر کے علاج کے لیے ادویات بھی تیاری کی جاتی ہیں۔ جوڑوں کے درد اور زخموں کے مندمل ہونے میں بھی کوارگنڈل اہمیت کی حامل ہے۔ غذائی اجزاء بہتر ہونے کے باعث اس کو مختلف مشروبات اور کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھولوں اور سبزیوں کو بعد از برداشت محفوظ کرنے کے لیے اس کے گودے کا استعمال کیا جاتا ہے۔

2۔ تلسی

تلسی ایک نہایت اہم زیبائشی ادویاتی پودا ہے، جسے ہلکے سبز رنگ کی بدولت کھانے میں سلا دے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں سے کشید کیے جانے والا تیل کانوں کے درد سے نجات دلانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تلسی کا استعمال چائے میں بھی ہوتا ہے جو خون میں شوگر کی مقدار کو قابو کرتا ہے۔ اس کے پتوں سے نکلنے والا عرق گردے کی پتھری کے علاج کے لیے نہایت مفید ہے۔ پھرے کے کیل مہاسوں کو دور کرنے کے لیے تلسی کو مختلف ادویات، کریم، لوشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تلسی کا تیل صابن، عطر، شیمپو اور کنڈیشنر کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

3۔ لیمن گراس

لیمن گراس سے بنائی جانے والی اشیاء میں چائے، کشید شدہ تیل، صابن وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے پتوں سے کشید کیے جانے والا عطر بخار اور درد کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

(باقی صفحہ 56 پر)

کے چھالوں اور سر کی بیماری کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب کی پتیوں سے کشید کیا جانے والا عطر پرفیوم کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گلاب کی ڈوڈیاں، جیم، جیلی، سوپ، چائے اور وٹامن (C) سی کے حصول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ گلاب کی خشک پتیوں کو بطور ذائقہ آوار اجزاء میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پتیوں کو (Pot Pourri) اور جمالیاتی حسن کی بناء پر قبروں، مندروں، رگولیوں، گجروں اور خشک پھولوں سے سجاوٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک پتیوں کو گلقتہ، چائے اور پولٹری کی صنعت میں کو مرغیوں کی خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب کی ویلیو ایڈیشن اور بہتر پیداوار کے لیے اس وقت زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی متعارف کروائی گئی قسم سیٹی فولیا گلاب جو کہ وفاقی بیج سرٹیفیکیشن کے ادارے سے تصدیق شدہ ہے، کسان ناصر قنبریا مارا سال پھول حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ویلیو ایڈیشن کے ذریعے اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

2۔ گل شبو (Tuberose)

گل شبو کو عام طور پر تڑا شدہ پھول کے ساتھ ساتھ پتیوں کی شکل میں گجرے بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ خوشبو اور موسم گرما میں پھولوں کی دستیابی کے باعث یہ پھول خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم رنگوں کی کمی کی وجہ سے یہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے۔ اس پھول کی پتیاں لمبے عرصہ تک تروتازہ رہ سکتی ہیں۔ اس کے پھولوں سے بنائی جانے والی قیمتی اشیاء میں عطر (Essential Oils) شادی بیاہ و دیگر تقریبات میں سجاوٹ، گجروں، چوڑیوں، بالیوں اور مختلف زیبائشی زیورات بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کی پتیوں کو خشک کر کے مختلف سجاوٹی کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھول کو مختلف رنگوں میں رنگنے سے اس کے جمالیاتی حسن میں بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے پھولوں سے کشید کیا جانے والا عطر پرفیوم اور مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

3۔ موتیا (Jasmine)

موتیا پاکستان میں بکثرت کاشت کیا جانے والا ایک ہر دلعزیز پودا ہے، سجاوٹی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھولوں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ اس پھول کی پتیاں تیل کشید کرنے کے عمل میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے پھولوں کو مختلف بیماریوں مثلاً یرقان، السر، آنکھوں اور جلد کی بیماریوں میں بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔ خوشگوار مہک کے باعث اسے گجروں اور پھولوں کے تاج بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

4۔ گیندا (Marigold)

گیندے کے پھولوں میں پائے جانے والے مختلف اجزاء مثلاً (Terpenoids)

اہم امور گلابانی برائے اکتوبر تا دسمبر

ڈاکٹر افتخار احمد، نوید احمد..... کمرشل فلوریگلر لیبارٹری، انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

- ☆ اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینے گلابانی کے حوالے سے نہایت اہم ہیں کیونکہ ان مہینوں میں کئی اہم امور سرانجام دیئے جاتے ہیں جیسا کہ ان مہینوں میں موسم سرما کے پھولوں کی پیری کی جاتی ہے اور کھار یوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ اہم بصلے دار تراشیدہ پھولوں جن میں گلیڈی اولس اور لیلی شامل ہیں، کی بوائی کی جاتی ہے۔ ذیل میں ان مہینوں میں سرانجام دیئے جانے والے اہم امور کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔
- اکتوبر**
- ☆ موسم سرما کے پھولوں کی تیار پیری یوں کو کھار یوں یا گملوں میں منتقل کریں۔
- ☆ اکتوبر کے اواخر تک پیٹونا، سنپ ڈریگن، ناسٹریٹیم، فلاکس، سزیریا، آرکٹوٹس، ہولی ہوک وغیرہ موسم سرما کے پھولوں کی بوائی کریں۔ زسری کی تیاری کے لیے نامیاتی میڈیا مثلاً 'یو اے ایف گرو' اور پلاسٹک ٹرے استعمال کریں۔
- ☆ گیندے کی تیار پیری کو کھیتوں/کھار یوں میں منتقل کریں۔
- ☆ ماہ ستمبر میں کھیت میں منتقل کیے گئے موسمی پھولوں کی پیچنگ کا عمل مکمل کریں۔
- ☆ گل داؤدی کی سٹینڈرڈ اقسام کی ڈسبنگ کریں اور پودوں کو سہارے (Staking) مہیا کریں۔
- ☆ گلاٹل کے لیے زمین تیار کریں اور ایک ہفتے تا دس دن کے وقفے سے اس کی بوائی جاری رکھیں۔
- ☆ موسمی تراشیدہ پھول ٹاک کی تیار پیری کو جلد از جلد کھیت میں منتقل کریں۔
- ☆ گل لیلی کی ایل اے ہائیر ڈ اقسام کی بوائی وسط اکتوبر کے بعد کی جاسکتی ہے لہذا موسمی حالات اور گٹھوں کی فراہمی کے مطابق بوائی کریں۔
- ☆ اکتوبر کے آخری ہفتے سے بصلے دار پودوں مثلاً اینی مون، فریزیا، ہائیناسنٹھ، آئرس وغیرہ کی بوائی شروع کریں۔
- ☆ قلمکاری اور بیج سے افزائش کیے گئے پودوں کو زمین سے تھیلیوں اور گملوں میں منتقل کریں۔
- ☆ موسمی پھولوں کی پیری یوں کو گھونگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دانے دار زہر (ٹاسک) جس میں کیمیائی مرکب میٹیلڈی ہائیڈ (Metaldehyde) ہوتا ہے، کا استعمال کریں۔
- ☆ ضرر رساں کیڑوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نومبر کے دوران گلاب اور دوسرے زیبائشی پودوں پر تیلے کا حملہ ہوتا ہے جسے ابتداء میں پانی سے پرے یا کونفیڈر کے پرے سے قابو کریں۔
- ☆ گل داؤدی کے پودوں کو پھپھوندی سے بچاؤ کے لیے پھپھوندی کش زہر مغللاً ایلٹ کا پرے کریں۔
- ☆ کنگھی پام کی نئی پھوٹ پر سائیکلڈ بلیو (Cycad blue) کے حملے کو روکنے کے لیے پولی ٹرن سی کا پرے کریں۔
- ☆ ماہ اکتوبر میں زیبائشی گھاس کو پوناش کی کھاد ڈالیں۔ یہ کھاد کم درجہ حرارت کے خلاف گھاس کو مدافعت مہیا کرتی ہے۔
- ☆ پارکوں اور باغیچوں میں موجود ایور گرین زیبائشی درختوں کی ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی شاخوں کی کٹائی کریں تاکہ موسمی پھولوں اور دوسرے پودوں کو مناسب طور پر روشنی میسر آسکے۔
- ☆ بلیک نیٹ لگا کر دن کو دورانے کو صبح اور شام کے وقت کم کریں تاکہ جلد تراشیدہ گل داؤدی کے پھول حاصل کیے جاسکیں اور انہیں منڈیوں میں ترسیل کیا جاسکے۔
- ☆ پیوند کیے گئے گلاب کے پودوں کی پھوٹ/سکرز وغیرہ توڑیں، پودوں کو کھاد دیں اور گوڈی کریں۔
- ☆ گھریلو زیبائشی پودوں کو مہینہ میں پانچ تا سات دن کے لیے برآمدے میں رکھیں تاکہ انکی روشنی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔
- نومبر**
- ☆ موسم سرما کے پھولوں کی تیار پیری یوں کو کھار یوں میں منتقل کریں اور جو پیریالیں اکتوبر میں کھار یوں یا کھیت میں منتقل کی جا چکی ہیں ان کی گوڈی کریں اور ضرورت کے تحت چنگی کاٹیں۔
- ☆ پیٹونا، سنپ ڈریگن، ناسٹریٹیم، فلاکس، سزیریا، آرکٹوٹس، ہولی ہوک وغیرہ موسم سرما کے پھولوں کی پیری یوں کو منتقل جگہوں پر منتقل کریں اور اگر ابھی تک بیجوں کی بوائی نہیں کی تو وسط نومبر سے قبل بوائی کا عمل مکمل کریں۔
- ☆ گلاٹل کی ایک ہفتے یا دس دن کے وقفے سے بوائی جاری رکھیں اور نومبر کے اواخر

- ☆ تک میدانی علاقوں بوائی کا عمل مکمل کر لیں۔
- ☆ دسمبر میں تراشیدہ گلاب، سینٹی فولیا اور سرخا گلاب کے پودوں کو کھیت میں منتقل کر لیں۔
- ☆ رینین کولس کی بوائی کا عمل جاری رکھیں۔
- ☆ وسط نومبر کے بعد سرخا گلاب، سینٹی فولیا اور سچا گلاب کی قلیں تیار کریں اور انہیں
- ☆ بنڈل بنا کر کیلیڈنگ (Callusing) کے لیے زمین میں دبائیں۔ اگر وقت کی کمی ہو تو جڑیں بنانے والا پاؤڈر آئی بی اے (IBA) ایک گرام فی لٹر پانی محلول میں ڈبو کر لگائیں۔
- ☆ ایسے زینانشی پھول جن کی افزائش بذریعہ بلب کی جاتی ہے ان کی بوائی مکمل کر لیں۔
- ☆ تراشیدہ گل داؤدی کی برداشت نومبر میں شروع ہو جاتی ہے لہذا بروقت برداشت کا عمل شروع کریں اور مناسب نگہداشت اور پیکنگ کے ساتھ منڈیوں کو ترسیل کریں۔
- ☆ ضرر رساں کیڑوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
- ☆ گل کلف اور سلوشیا کے بیجوں کو اکٹھا کریں، سایہ دار جگہ پر خشک کریں اور آئندہ سیزن میں کاشت کے لیے ذخیرہ کریں۔
- ☆ مصنوعی روشنی کے ذریعے دن کے دوران نئے کوڑا کرگل داؤدی کی فلاورنگ کو موخر کریں تاکہ بعد ازاں منڈیوں میں پھول زیادہ قیمت پر فروخت کیے جاسکیں۔
- ☆ دسمبر
- ☆ روٹ سٹاک کی تیاری کے لیے ایڈورڈ گلاب کی قلموں کی بوائی کریں تاکہ ماہ اگست میں پیوند کاری کے لیے پودے تیار ہو چکے ہوں۔
- ☆ ماہ نومبر میں کیلس (Callus) کی گئی سرخا، سینٹی فولیا اور سچا گلاب کی قلموں کی بوائی کریں۔
- ☆ ایسے زینانشی پودے جو کورے سے متاثر ہوتے ہیں انہیں کورے سے بچانے کے لیے پرالی ڈالیں یا زمینی ملچ کا استعمال کریں یا گرین ہاؤس/شیڈ میں رکھیں۔
- ☆ اگر تمبر میں گلاب کی کانٹ چھانٹ نہیں کی تو یہ عمل ماہ دسمبر میں مکمل کریں۔
- ☆ کورے سے بچانے کے لیے اس مہینے میں پودوں کی زہریوں کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپ دیں۔
- ☆ دھند اور ابر آلود موسم کی صورت میں گلاب کے کھیتوں کی کم سے کم آبپاشی کریں اور پھپھوندی کے حملے کی روک تھام کے لیے پھپھوندی کش زہروں کا سپرے کریں۔
- ☆ گلاب اور للی کے کھیتوں کا معائنہ کریں اور بیماریوں سے متاثرہ پودوں کو کھیتوں سے نکال کر تفت کریں تاکہ یہ مزید بیماریوں کے پھیلنے کا سبب نہ بن سکیں۔
- ☆ پارکوں اور باغیچوں میں لگے گھاس کو کورے کے اثرات سے بچانے کے لیے آبپاشی کریں اور آئرن کا سپرے کریں۔
- ☆ وٹرم کرنے کے لیے گلاب اور للی کے کھیت میں گوڈی کریں۔
- ☆ ٹیولپ کے بصلوں (bulbs) کی بوائی کریں۔
- ☆ موسمی پھولوں کی بیماریوں اور تراشیدہ پھولوں کے کھیت میں موجود جڑی بوٹیوں کا بروقت خاتمہ کریں اور گوڈی کر کے تھکادیں۔
- ☆ پت جھڑ والے پودوں مثلاً گل فانوس، جڑ و فاکس، پین بکلی کارپا اور پونسینڈیا کی قلیں تیار کریں اور ان کی بوائی کریں۔
- ☆ باغیچوں اور پارکوں میں موجود درختوں اور جھاڑیوں کے نیچے گوڈی کریں تاکہ گدھیرے کے انڈوں کو تلف کیا جاسکے علاوہ انہیں درختوں کے تنوں کے ساتھ پلاسٹک کے بینڈ بنا کر لگائیں۔
- ☆ تراشیدہ گلاب، سرخا گلاب، گیندے، موسمی گل داؤدی کی برداشت کریں، مناسب نگہداشت اور پیکنگ کے ساتھ انہیں منڈیوں میں ترسیل کریں۔
- ☆ مصنوعی روشنی کے ذریعے دن کے دوران نئے کوڑا کرگل داؤدی کی فلاورنگ کو موخر کریں تاکہ بعد ازاں منڈیوں میں پھول زیادہ قیمت پر فروخت کیے جاسکیں۔

الحديث

سرکار سے دریافت کیا گیا کہ گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے تو سرکار نے فرمایا: گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو انسان کے لیے گناہ اور وبال کا سبب ہوتی ہے۔ دوسری قسم اس کی پردہ دای کرتی ہے اور تیسری قسم انسان کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہوتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کو انسان ریاکاری نمود و نمائش اور اسلام دشمنی کے لیے پالتا ہے اور جو قسم پردہ پوشی کرتی ہے اس کا تعلق ان گھوڑوں سے ہے جن کو راہ خدا میں باندھا اور ان کی گردنوں اور کمر میں اللہ کا حق نہیں بھولا تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ پوش ہیں اور اجر و ثواب دلوانے والے وہ گھوڑے ہیں جو انسان چراگاہ یا سبزہ زار میں جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اسی طرح ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے مطابق نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح یہ گھوڑے اگر رسول کو توڑ کر ایک میدان سے دوسرے میدان تک دوڑ لگاتے ہیں تو ان کے قدموں کی مقدار اور ان کے لید اور پیشاب کی مقدار کے مطابق اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان گھوڑوں کا مالک اگر ان کو نہر پر پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہے اور وہ اس جگہ پانی پیتے ہیں تو پانی کی مقدار کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (مسلم)

موسم بہار کے لیے زسری کی تیاری

محمد سہیل، ڈاکٹر عرفان احمد، ڈاکٹر محمد آصف، ڈاکٹر محمد ہارون الرشید..... شعبہ جنگلات و امور چرگاہ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

چھوٹی زسریوں کا انتظام مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ تاہم موسم بہار میں ان زسریوں کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔

مستقل زسری

زسری کا قیام عام طور پر وسیع رقبے پر کیا جاتا ہے جیسا کہ موسم بہاراں کے لیے چھوٹی چھوٹی اور عارضی زسریوں کے قیام کو ترجیح دی جاتی ہے تاہم اس کے مقابلے میں مستقل زسریوں کا انتظامی ڈھانچہ زیادہ منظم ہوتا ہے۔ ان زسریوں کا انتظام کئی سال تک جاری رہتا ہے۔ مستقل زسری کے قیام میں مزدوروں کی آسان دستیابی اور ذرائع آمد و رفت کی سہولیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایسی زسریاں کم بلندی پر قائم کی جاتی ہیں تاکہ پودے سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ کم وقت میں اور کم لاگت میں دیر پاہ فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پودوں کے حصول کے لیے مستقل زسری کا قیام ایک بہترین قدم ہے۔

زسری تیار کرنے کی اقسام

زسری تیار کرنے کے لیے دو اہم اور خاص طریقے درج ذیل ہیں۔

1۔ بیڈ زسری 2۔ پاٹل زسری

بیڈ زسری (Bed Nursery)

بیڈ زسری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

اونچے بیڈ کی زسری

اس قسم کی زسری اس وقت تیار کی جاتی ہے جب زیادہ مقدار میں پودے درکار نہ ہوں، البتہ دس ہزار کی تعداد تک یہ زسری مفید ثابت ہوتی ہے۔ موٹی پھل اور پھول اور درخت جن میں شیشم، پاپلر، کینو اور گیندے کے پھول وغیرہ کو اگانے کے لیے بیڈ زسری کو ترجیح دی جاتی ہے۔

ٹرنچ بزم زسری (Trench Berm Naurser)

عام طور پر اس قسم کی زسری کو فروغ نہری ذخیروں کے قریب دیا جاتا ہے۔ یہ زسری سرکاری جنگلات میں پودے اگانے، پھل دار پودے تیار کرنے اور عوام میں پودے تقسیم کرنے کے لیے اگائی جاتی ہیں عموماً اس قسم کی زسریاں نہروں، سڑکوں کے کنارے، شجرکاری مہم اور گاؤں کے متصل علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شیشم، توت، دھریک، سرس اور سمبل اس قسم کی زسری میں اگائے جاتی ہیں۔

زسری کا لفظ فرانسیسی زبان سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی دیکھ بھال اور پرورش کے ہیں۔ زسری ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پودوں کی پیری کو بہت دیکھ بھال اور احتیاط سے اگایا جاتا ہے۔ جس کا عملی مقصد معیاری اور صحت مند پودوں کا حصول ہے تاکہ مستقبل میں ان پودوں کو جنگل، کھیتوں، لینڈ سکپنگ اور باغبانی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ پاکستان کے جغرافیائی اور موسمی صورت حال کے پیش نظر بہار کے موسم میں پودے لگانا بہترین کامیابی کا حامل ہے۔ بہار کی زسری درختوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ پھل، پھول اور سایہ دار پودوں کی افزائش، جن زمین اور جمالیاتی منظر ناموں میں ایک پختہ وجود رکھتی ہے۔

بہار کے موسم میں زسری کی ضرورت و اہمیت

بڑے پیمانے پر درخت اگانے کے لیے ہمیں موسم بہار کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہ واحد ایسا موسم ہے جس میں ہر طرح کا پودا بہت ہی جوں سے اپنی کو مپلیں، شاخیں اور پتے نکالتا ہے۔ بڑے پیمانے پر شجرکاری اور باغبانی کرنے کے لیے زسری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ کچھ درختوں کی اقسام کو براہ راست اگایا نہیں جاسکتا اس لیے زسری نایاب یا خطرے سے دوچار پودوں کے انواع کے تحفظ اور ان کی افزائش کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زسری کے کنٹرول شدہ ماحول میں تیار پودوں کو ہم مرے ہوئے یا بیماری لگے پودوں کی جگہ فوری طور پر اگا کر جنگل اور باغیچوں کی افزائش اور ماحولیاتی توازن کو قائم رکھ سکتے ہیں۔

زسری کی اقسام

1۔ عارضی زسری

یہ زسری ایک خاص مدت یا خاص پروجیکٹ کے لیے اگائی جاتی ہے یعنی ICPEC و شجرکاری مہم کے لیے اس قسم کی زسریوں کا قیام کیا جاتا ہے۔ عارضی زسری کا قیام وقت کے بچاؤ اور اس علاقے میں نقل و حمل کی صورت حال کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ رقبے اور جگہ کے لحاظ سے یہ زسریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں خاص کر پہاڑی علاقوں میں جنگلات اگانے کے لیے اور موسم بہار میں شجرکاری یا باغبانی مہم کے لیے نہیں اگایا جاتا ہے۔ بہاری فینٹیول کے انعقاد کے لیے خوب صورت نمائشی پودوں اور درختوں کے فروغ میں اس قسم کی زسری میں کم خرچ ہوتا ہے البتہ وسیع علاقے یا کسی بڑے جنگل پر پھیلی ان چھوٹی

(Potted Nursery) پائڈ نرسری

مٹی کے گملوں اور پلاسٹک کٹی تھیلیوں میں لگائی گئی نرسری پلانٹ نرسری کہلاتی ہے۔ عموماً بہار یہ موسم کے پھول اور نمائشی پودے جن میں گل اشتری اور پھولوں میں آم، کینو، موسی، امرود اور بیری، سایہ دار درختوں میں سرس، سفیدہ، لکیدر، جند، چبڑھ، دیودار کو لگایا جاتا ہے۔ آج سے دودہائی پہلے پودے مٹی کے گملوں میں لگانے کا رجحان دیکھنے کو ملتا تھا پر آج کے دور میں مٹی کے گملوں کی بجگہ پالیٹھین ٹیوب کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس P-Bay Nursery بھی کہا جاتا ہے۔

پلاننگ سٹاک یا پلاننگ میٹریل

ایسے پودا جات جو فیلڈ میں اگانے کے لیے تیار ہوں۔ پلاننگ سٹاک کہلاتے ہیں۔ پلاننگ سٹاک کی دو اہم قسمیں ہیں۔

- 1۔ ننگی جڑوں والا سٹاک 2۔ پاٹھ سٹاک

درختوں کی بعض اقسام پھلی یا گملوں کے بجائے براہ راست زمین میں اگائی جاتی ہیں۔ ایسے پودوں کو موسم آنے پر زمری سے اکھاڑ کر بغیر گاچی کے برہنہ جڑ لگایا جاتا ہے۔ اس قسم کی زمری کو اگانے یا لگانے پر کھم خرج آتا ہے اور ان پودوں کی نقل و حمل آسان اور جلدی ہوتی ہے۔ اس زمری میں اگائے پودے زمین میں زیادہ دیر رہتے ہیں عام طور پر زمری میں پاپلر، شیشم وغیرہ کے پودے تیار کیے جاتے ہیں۔

2۔ پانڈنرسری

ایسے پودے جو عموماً پلاسٹک میں اگائے جاتے ہیں۔ یہ زسری میں کم رقبہ گھیرتے

چائے کے پودے کی بیماریاں اور ان کا تدارک

بقیہ:

تدارک: ایک بار جب پودے متاثر ہو جائیں تو بیماری پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے پودوں کی دیکھ بھال پر توجہ دینی چاہیے۔ پودوں کو ہمیشہ اچھی نکاسی والی زمین پر لگائیں۔ مناسب ادویات کے استعمال سے پودوں کو بیماری سے بچایا جاسکتا ہے۔

6- جڑوں پر گائٹھے بنانے والے طفیلی خطے (Root knot nematodes)

جڑوں پر گانٹھے بنانے والے طفیلی خبیثے بھی چائے کے پودے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ خبیثے زمین سے پودے کی جڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر گانٹھیں بنا

میں چونکہ ان پودوں کی جڑیں محفوظ رہتی ہیں اس لیے فیلڈ میں ان کی کامیابی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غیر موزوں زمین پر کبھی پائڈ پودے نگی جڑوں والے پودوں سے بہتر کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم پائڈ پودوں کی تیاری اور نقل و حمل زیادہ مہنگی ہوتی اور انہیں برہنہ جڑ والے پودوں کی نسبت زیادہ نگہداشت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

کامیاب نرسری کے گریا کامیاب نرسری کے کلیدی نقطے
کامیاب نرسری اگانے کے لیے درج ذیل گ

- 1- نرسری کے لیے موزوں ترین جگہ کا انتخاب کریں۔
- 2- نرسری کی جگہ کو انتظامی اور فنی لحاظ سے بہتر بنائیں۔
- 3- موسم اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے پیدا کاری کے بہترین طریقے اپنائیں۔
- 4- پودوں کی برداشت، ذخیرہ کرنے اور نقل و حمل کے لیے بہترین طریقہ اپنائیں۔
- 5- نرسری کی دیکھ بھال اور نگہداشت کو بہتر بنائیں۔
- 6- قابل تدارک عوامل کی روک تھام کر کے پودوں کو نقصان سے بچائیں۔

موسم بہار کے درخت

شیشتم، بیری، سرس، سفیدہ، یاپلر وغیرہ

موسم بہار کے پھول

گیندا، پیپر فلاور، Bells of Iveland، ڈیہلیا، ونکا، گل اشرفی وغیرہ

موسم بہار کے پھل

امروء، کینو، موسمی، فالسہ، لیمن، جامن، انگور وغیرہ

<<<<<<<>>>>>>>>>>

برسیم کھلاتے جانے والے موسم میں جانوروں کی دیکھ بھال

ڈاکٹر محمد قمر بلال، ڈاکٹر عزیز الرحمن، ڈاکٹر وسیم..... انسٹیٹیوٹ آف ڈیری سائنس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

محفوظ رہیں۔ شیرہ منزل بلاک بنانے کا طریقہ وہی ہے جس طرح شیرہ یوریا بلاک تیار کیے جاتے ہیں لیکن سردیوں میں یوریا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ونڈے میں جو اجزاء استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اُلی وغیرہ سے پاک ہوں۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی فارمز روٹیوں کے ٹکڑے ونڈے میں استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں یہ ٹکڑے کیونکہ صحیح طریقے سے خشک نہیں ہو پاتے اُلی سے بھرے ہوتے ہیں تو ان کا استعمال جانوروں کے لیے کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو اچھی طرح خشک کرنے کے بعد استعمال کریں اور احتیاطاً ان ٹکڑوں کو الگ کسی برتن میں ڈال کر پانی ڈالیں ایک اور دومنٹ بلانے کے بعد پانی ضائع کر دیں پھر ان روٹیوں کو ونڈے میں ڈالیں۔ بہتر ہے ونڈے میں ٹاکسن بائینڈر استعمال کریں۔

جس طرح جانوروں کو گرمی کی شدت متاثر کرتی ہے اس طرح سردی بھی پیداوار میں کمی کی وجہ بن سکتی ہے لیکن اگر جانوروں کو ضرورت کے مطابق معیاری خوراک دی جا رہی ہے تو وہ کم سردی محسوس کریں گے البتہ سردیوں میں چند ایک باتیں قابل ذکر ہیں۔

- ☆ جانوروں کو بارش اور ٹھنڈی ہوا سے بچائیں۔
- ☆ جانوروں کا باندھنے کی جگہ خشک رکھیں۔ روزانہ صفائی کریں۔ فرش کو نرم رکھنے کے لیے ریت یا پیرالی وغیرہ ڈالیں۔
- ☆ دوپہر کے وقت اگر ٹھنڈی ہوا نہیں چل رہی تو دھوپ میں باندھیں۔
- ☆ رات کو جس کمرے یا شیڈ میں جانوروں کو رکھنا مقصود ہو اس کو بالکل ہوا بند نہ کریں بلکہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے روشندان کھلے رکھیں ورنہ جانوروں کی صحت اور پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔

☆ اگر کمرے یا شیڈ کو بالکل بند کرنے کی بجائے ایک طرف سے کھلا رکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی جانور اندر بیٹھے کی بجائے باہر کھلی جگہ پر آسمان تلے سکون سے بیٹھنا پسند کریں گے۔ کیونکہ برسیم میں فاسفورس نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے جانوروں کو پائیکا سے بچاؤ کے لیے معیاری ہڈیوں کا چورا بحساب 25 سے 50 گرام چھوٹے جانوروں کو اور 50 سے 100 گرام بڑے جانوروں کو دیں۔ جانوروں کو رت موتا سے بچانے کے لیے معیاری منزل مکچر مثلاً میکس گرو وغیرہ بحساب

چارہ جات جانوروں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا مستند ذریعہ ہے۔ پھلی دار چاروں (برسیم، لوسرن، ارواں، گوارہ وغیرہ) میں پروٹین کی مقدار 18 سے 20 فیصد جبکہ غیر پھلی دار چاروں میں (مکئی، جوار، باجرا وغیرہ) میں 8 سے 10 فیصد ہوتی ہے لیکن چند ایک عوامل ان کی غذائیت پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً چارے کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہاضمیت اور پروٹین کی مقدار میں کمی اور ریشہ دار اجزاء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی بروقت کٹائی ضروری ہے۔ ہمارے فارم حضرات تقریباً 5 سے 6 ماہ تک برسیم کو بطور چارہ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ اس عرصے میں جانوروں کو غذائیت سے بھرپور چارہ میسر ہوتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس عرصے کے دوران چند ایک بیماریوں کی شرح وقوع پذیری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیر نظر مضمون کا مقصد برسیم کھلاتے جانے والے موسم میں جانوروں کی بہتر پرورش و نگہداشت سے متعلق اہم امور کے بارے میں جانور پال حضرات کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔

خوراک

جانوروں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے ضروری ہے کہ برسیم کی پہلی کٹائی 60 سے 70 دن بعد، باقی کٹائیاں 40 سے 45 دن بعد اور آخری کٹائیاں 25 سے 30 دن کے وقفہ سے کریں۔ اس ضمن میں بروقت بوائی اور برسیم کے ساتھ جتنی یارائی گھاس کی کاشت کریں۔ جانوروں کو تازہ پانی پلائیں اور گیلا برسیم (یعنی اوس پڑا برسیم) ہرگز نہ کھلائیں۔ بہتر ہے کہ شدید سردی کے موسم میں برسیم دوپہر کے وقت جب اوس وغیرہ خشک ہوگئی ہو کاٹ کر لائیں۔ اچھارے کی روک تھام کے لیے برسیم کتر کر دیں اور اس کے ساتھ خشک چارہ بھی دیں۔ اگر برسیم کی چرائی کروانی ہو تو چرائی پر لے جانے سے پہلے خشک چارہ لازمی کھلائیں۔

اگر برسیم کے ساتھ خشک چارہ یعنی توڑی وغیرہ نہ دی گئی تو جانور کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی اور موک کا شکار ہونے اور پیداوار کم ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ونڈے میں 15 سے 20 فیصد شیرہ لازمی ڈالیں تاکہ جانور کی انرجی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں شیرہ منزل بلاک جانوروں کی کھریوں میں رکھیں تاکہ جانوروں کی غذائی ضروریات احسن طریقے سے پوری ہوں اور سردی کی شدت سے بھی

ہے۔ سانس لینے کی نالی اور اس کے ساتھ منسلک چھوٹی نالیوں میں سوزش کے باعث کھانسی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات مثلاً شیڈ میں ہوائی نکاسی کا نامناسب انتظام، دوائی یا کوئی مائع چیز (کاڑھا وغیرہ) دیتے وقت بے احتیاطی اور طفیلی کرموں کے علاوہ ایک اہم وجہ جانور کو سردی کا لگ جانا ہے خصوصاً موسم سرما میں اگر جانور بارش میں بھیگ جائے۔ شدید حالت میں جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے، تیزی سے سانس لیتا ہے، سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اور نتھنوں سے کاڑھا مواد خارج ہوتا ہے۔ کسان حضرات اس کو گل گھوٹو سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ نمونے کا مرض ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ جانوروں کو سردی سے بچائیں۔ اگر بیماری کے شروع ہی میں سیلان الیکچری گز میں ملا کر تین دن دے دی جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

اچھارے کی وجہ سے جانور کے معدے میں گئیں بھر جاتی ہیں جس سے اس کے معدے کا پہلا حصہ پھیل جاتا ہے اگر ان گیسوں کے اخراج کے لیے کوئی موثر تدبیر نہ کی جائے تو جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس مرض کی بڑی وجوہات میں برسیم بغیر کترے یا توڑی / خشک چارا ملائے بغیر جانوروں کو کھلانا شامل ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں پیچھا مارنے کی کئی وجوہات ہیں لیکن ایسٹروجن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جانور اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ برسیم کے پھولوں میں ایسٹروجن پایا جاتا ہے۔ حاملہ جانوروں کے جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی مقدار بڑھ جانے سے تولیدی اعضا میں قبل از وقت حرکات بڑھ جاتی ہیں جو پرولیپس کا سبب بنتی ہیں۔ کئی جانور پال حضرات اپنے جانوروں کو روٹی کے ٹکڑے، چھان بورا بطور ونڈا دیتے ہیں۔ اگر ان کو اُلی لگی ہوئی ہے اور حاملہ جانوروں میں استعمال کروائے جا رہے ہیں تو یہ جانور پرولیپس کی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔

جانوروں کو پروٹینس سے بچانے کے لیے حاملہ جانوروں کو پھولوں والا برسیم نہ کھلائیں یا پھول الگ کر دیں۔ اُلی لگی روٹی کے ٹکڑے چھان بورا وغیرہ ہرگز نہ کھلائیں۔ جب برسیم کی پیداوار زیادہ ہو تو اسے کھیت میں ضائع نہ ہونے دیں بلکہ کاٹ کر خشک کر لیں اس طرح برسیم کی اضافی کٹائی ممکن ہے اور خشک کیا ہوا برسیم چارے کی قلت کے وقت چری وغیرہ کے ساتھ ملا کر جانوروں کو دیں تاکہ جانوروں کی پیداوار پر منفی اثر نہ پڑے۔ بصورت دیگر جب جانور برسیم ختم ہونے کے بعد چری کھانا شروع کرتا ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برسیم میں پروٹین تقریباً 18 فیصد اور چری میں صرف 7 سے 8 فیصد ہے۔

<<<<<<<>>>>>>>>

100 گرام روزانہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی ماں کو دینا شروع کر دیں۔ اس سے جانور متوتا کے مرض سے محفوظ رہے گا اور پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔

جانوروں کو صحتمند رکھنے کے لیے پائیدار موتی انجینیا اور اچھا رہ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ اس ضمن میں درج ذیل سفارشات پر عمل کریں۔

☆ معیاری ڈی سی پی یا سپر جوس خوراک میں دیں اور کھریوں میں نمک کے ڈھیلے رکھیں۔

☆ فاسفورس جانوروں کی خوراک میں سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہم فاسفورس کا

موازنہ دوسرے نمکیات سے کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاسفورس کا جانوروں کے جسم میں دوسرے نمکیات کی نسبت ہر لحاظ سے اہم کردار ہے۔ اس کی کمی ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ فاسفورس جانوروں کی ہڈیوں، ان کی بڑھوتری، دودھ کی پیداوار اور ان کو تندرست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جانور مٹی، کچرے، پتھر، اینٹیں وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پائیکا کا مسئلہ ہے جو فاسفورس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس سے جانور اندرونی کمروں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ شدید بیماری کی حالت میں بہت سے چھوٹے جانور مر جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں ان میں شرح بڑھوتری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سن بلوغت کو بہت دیر سے پہنچتے ہیں اور اپنی پیداواری زندگی کا آغاز زیادہ عمر میں کرتے ہیں۔

دوسرا اہم مسئلہ جو برسیم کھلائے جانے والے موسم میں ہوتا ہے وہ رت موتر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مرض کی وقوع پذیری کی شرح مجموعی طور پر کم ہے لیکن شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اس بیماری میں جانور شروع میں سرخ، پھر گہرا سرخ اور بھورا اور بیماری کی شدت میں سیاہ رنگ کا پیشاب کرتا ہے۔ جانور شدید قبض ظاہر کرتا ہے۔ موثر علاج نہ کروایا جائے تو جانور مر جاتا ہے۔ اس مرض کی شرح وقوع پذیری بچہ دینے سے لے کر 45 دن تک زیادہ ہے۔ یہ بیماری صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب جانور کے خون میں فاسفورس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب جانور کو لگا کر کم فاسفورس والی خوراک مثلاً برسیم وغیرہ کھلائی جائے۔ برسیم کھلائے جانے والے جانوروں میں نمونیا کی شرح بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔

نمونیا سے بچاؤ کے لیے جانوروں کو ٹھنڈی ہوا سے بچائیں۔ ٹھنڈا پانی پلانے کی بجائے تازہ مانی پیلائیں وگرنہ جانوروں میں کھانسی اور نمونے کا حملہ بھی اس موسم میں ہو سکتا

زیتون کے تیل کو بیٹر کی خوراک میں استعمال کرنے کے فوائد

* ڈاکٹر محمد اشرف، ** عرب کنزہ، * ڈاکٹر فواد احمد، * ڈاکٹر محمد شریف * انسٹیٹیوٹ آف انیمل اینڈ ڈیری سائنسز، ** شعبہ زوالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

پالمیک ایڈ 13 فیصد اور لنولیک ایڈ 7 فیصد)۔ اس میں کافی مقدار میں پروٹین، امینو ایڈ، کلسیم، کاپر، کوبالٹ جن کے ساتھ ساتھ مینگیز اور زنک موجود ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل میں 22-3 فیصد پولی انسچور ایڈ فیٹی ایڈز جبکہ 26-8 فیصد پیچور ایڈ فیٹی ایڈز اور لنولیک ایڈ موجود ہوتا ہے۔ زیتون کا گودا براہیل مرغیوں کی خوراک میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اس کا انجی افزائش پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔

زیتون کے تیل کی کچھ قسمیں ہیں۔ جیسے کہ: ورجن اولیو آئل، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، ریفائنڈ اولیو آئل، اولیو پولیس آئل اور لیمپینٹ اولیو آئل ہیں۔ مونو انسچور ایڈز مدافعتی رد عمل کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ قوت مدافعت کے عمومی ضابطے اور مخصوص آٹو امیون بیماریوں کے علاج میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مونو انسچور ایڈ فیٹی ایڈ جیسے کہ اولیک ایڈ اور n-3 فیٹی ایڈز کا استعمال خون میں ٹریگلیسر ایڈز کو کم کر کے جانوروں کی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ کچھ خصوصیات زیتون کے تیل کے پولی فینول کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں جن میں ہائپو ٹینسکس، اینٹی ایٹھرو جینک، اینٹی ٹیومر، اینٹی انفلامیٹری، امیونو موڈولیٹری اور اینٹی وائرل خصوصیات ہیں جو جزوی طور پر ان مصنوعات کے اینٹی آکسائیڈنٹ کے نتیجے میں شامل ہیں۔ برائلر میں زیتون کے تیل سے افزائش کی شرح بہتر ہوتی ہے۔ پودوں سے نکلنے والے مواد میں پائے جانے والے بہت سے پولی فینولک مواد موجود ہوتے ہیں اور پولٹری کی ترقی کی کارکردگی ان مواد سے مثبت طور پر متاثر ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے مرغی کا انانچ پر انحصار کم کیا جاسکتا ہے اور انانچ کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کے درمیان غلا کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مزید یہ کہ، خون میں کو لیٹرول، ٹریگلیسر ایڈز اور لو ڈینسٹی لیپو پروٹین کو زیتون کے تیل سے واضح طور پر کم کیا جاتا ہے لیکن چکن میں ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ زیتون کا تیل کھلانے سے چکن میں اینٹی انفلیمیٹری کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جسمانی وزن میں اضافے کے ساتھ ساتھ فید کی تبدیلی کے تناسب کو بڑھانے کے لیے برائلر کو زیتون کا تیل دیا جاتا ہے۔ زیتون اور کینولا کے تیل کے آمیزے سے پرندوں کی خوراک کی کارکردگی اور وزن میں بہتری آتی ہے۔ لیٹر مرغی کے انڈے کی زردی کارنگ زیتون کے پتے کے پاؤڈر سے بہتر ہوتا ہے۔

(باقی صفحہ 43 پر)

مقامی جاپانی بیٹر جس کو عام بیٹر سے الگ قسم سمجھا جاتا ہے جو کہ چکر پرندے سے تعلق رکھتا ہے۔ بھورے رنگ کے جاپانی بیٹر گوشت کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ بہت جلدی بڑھتے ہیں اس لیے لوگ انہیں شوق سے پالتے ہیں۔ بیٹر سائنسی تحقیق کے لیے بھی اہم ہیں۔ بیٹر کا گوشت مختلف طریقے کے کھانے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بیٹر کا گوشت اور انڈے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اس کے گوشت میں انسچور ایڈ فیٹی ایڈز، پروٹین، اہم ٹریس منرلز اور فیٹس کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بیٹر کے انڈے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹین، امینو ایڈز، وٹامن اور منرلز سے بھرپور ہوتے ہیں۔ غذائیت میں مرغی کے انڈوں سے ملتے جلتے ہیں جیسے کہ ان کے انڈوں میں وٹامن بی 12، پیچور ایڈ اور انسچور ایڈ فیٹی ایڈز، پروٹین اور کلسیم جیسے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ لوگ بیٹر کے انڈے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مادہ بیٹری کی چھاتی چوڑی جو کہ بھورے اور سیاہ نقطوں والے پدوں سے بھری ہوتی ہے اور ز بیٹری کی چھوٹی چھاتی سفید اور بھورے نقطوں والے پدوں سے بھری ہوتی ہے۔ بیٹریوں کا انکیوبیشن مدت 18 دن کی ہوتی ہے اور یہ سالانہ چار نسلیں بڑھا سکتے ہیں۔ چوزے نکلنے کے فوراً بعد سے ان کا بروڈنگ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور 2 ہفتے تک چلتا ہے۔ انڈے دینے والی بیٹری کے لیے ایک دن میں 16 گھنٹے روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ بیٹر کے انڈوں کا وزن تقریباً 10 گرام ہوتا ہے۔ بچوں کے پر 4-3 ہفتے تک آجاتے ہیں۔ بیٹریوں کا وزن تقریباً 120-160 گرام ہوتا ہے اور بیٹریوں کا وزن 100-130 گرام وزن ہوتا ہے۔ 1-3 ہفتے تک چوزے کی خوراک 3.8-9.8 گرام 4-6 ہفتے کے چوزے کی خوراک 14-18 گرام اور 7 ہفتے کے چوزے کی خوراک 20 گرام تک ہوتی ہے۔ مرغیوں کی نسبت بیٹریوں کا مدافعت نظام وبائی بیماریوں کے لیے طاقتور ہوتا ہے۔

بیج والے پودوں کے تیل کے ایکٹیو مالیکیولز ڈائجسٹو انزائمز کے اخراج کو بڑھا دیتے ہیں اور مدافعت کے نظام کو بھی چلا سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل کی انڈسٹری میں زیتون کا تیل نکالنے کے عمل میں زیتون کے گودے کی بھی اضافی پیداوار ہوتی ہے۔ زیتون کے گودے میں بھی آئل کچی فیصد (جیسے کہ 18-25 فیصد) موجود ہوتا ہے اور اس میں اہم فیٹی ایڈز بھی کئی مقدار میں موجود ہوتے ہیں (جیسے کہ اولیک ایڈ 73 فیصد،

مچھلی کھائیں، دھوکا نہیں

ڈاکٹر عرفہ بن طاہر، طارق جمیل، محمد شہروز سرفراز..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

بروئے کار لاتے ہوئے متعارف کرایا گیا ہے۔۔۔ اسی طرح کارپ کو مٹی کے تالابوں میں پالا جاتا ہے جس میں بہت کم محنت کے ساتھ وسیع پولی کلچر فارمنگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی مچھلیوں کو تیار شدہ خوراک پر پالا جاتا ہے جو چند روز میں استعمال کے قابل ہوتی ہیں اس کے برعکس دریائی مچھلی کو قدرتی خوراک ملتی ہے۔ دریائی مچھلیوں کا سائز مختلف ہوتا ہے، جبکہ فارمی مچھلیوں کا سائز تقریباً یکساں ہوتا ہے۔ فارمی اور دریائی مچھلی کو بھی اگر دیکھیں تو جو دریائی مچھلی ہے اس نے ایک قدرتی خوراک پر نشوونما پائی ہے اس نے دریا کے تازے پانی میں رہنا ہے اس نے ہر طرح کی خوراک لینے کی وجہ سے اس کا سائز فارمی مچھلی سے کم ہے لیکن دریائی مچھلی چونکہ کافی کم ہے اور اس کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لیے مجھیرے فارمی مچھلی کو دریائی مچھلی بتا کر بیچتے ہیں اور زیادہ قیمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ روہو کی مقامی مارکیٹ حوصلہ افزا ہے۔ اچھی مچھلی کا سائز عام طور پر 2 کلو سے لے کر زیادہ سے زیادہ 3 کلو تک ہوتا ہے۔ جب مچھلی کا وزن 3 کلو سے زیادہ ہو تو قیمتیں کم



ہو جاتی ہیں۔ دیگر عوامل میں مچھلی کی تازگی اور مارکیٹ میں طلب/رشد کی صورتحال شامل ہے۔ لہذا یہ فرق کرنے کیلئے کہ یہ دریائی مچھلی ہے یا فارمی مچھلی ہے اس کا ایک ہی سادہ نسخہ ہے کہ جب آپ مچھلی فروش کے پاس جائیں تو آپ

مچھلیوں کا سائز دیکھیں اگر وہاں پہ مختلف سائز کی مچھلیاں پڑی ہوتی ہیں یعنی کوئی بہت بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی لمبی ہے کوئی پتلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں پہ دریائی مچھلی موجود ہے لیکن اگر وہاں پہ آپ کو تقریباً ایک ہی سائز کی ساری مچھلیاں نظر آرہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارمی مچھلیاں ہیں۔

اسی طرح سے اگر آپ کسی مشہور فیش پوائنٹ پہ جاتے ہیں جہاں کی مچھلی کا ذائقہ آپ کو پسند ہے آپ نے چند عوامل کو مد نظر رکھنا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جن کڑاہیوں میں مچھلی تلی جا رہی ہے ان میں تیل کو نسا استعمال ہو رہا ہے اس میں کھلا کلنگ آئل ہے اور یہ کھلا کلنگ آئل مارکیٹ میں اس وقت موجود 550 روپے سے 600

مچھلی ایک صحت بخش اور لذیذ غذا ہے۔ اس مضمون میں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی خریدتے اور کھاتے وقت کن نکات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

تازہ مچھلی کی پہچان

مچھلی کی تازگی کا اندازہ لگانے کے لیے ایک دفعہ اپنی انگلی سے یا انگوٹھے سے اس کی جلد کو دبائیں اگر اسے دباتے ہی اس پہ گڑھا پڑ جائے اور انگلی اٹھاتے ہی جلد اپنی جگہ پر واپس آجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی تازہ ہے۔ اگر آپ انگلی سے دباتے ہیں اور گڑھا وہیں موجود رہتا ہے تو مچھلی باسی ہے اور اس میں جراثیموں کی نشوونما ہو چکی ہے۔ اسی طرح مچھلی کی تازگی کا اندازہ لگانے کے لیے دوسری نشانی مچھلی کی آنکھوں کی چمک ہے اگر مچھلی کی آنکھوں میں آپ کو چمک نظر آرہی ہے اور اس کا ریتینا شیشے کی طرح چمکدار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی تازہ ہے اگر اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی ہے اور آنکھیں دھندلا چکی ہے تو وہ مچھلی باسی ہو چکی ہے اور ایسی مچھلی کا استعمال مضر صحت ہے۔

تازہ مچھلی کی پہچان کرنے کے لیے آپ اس کی رنگت، اس کی آنکھوں کی چمک، کے علاوہ مچھلی کی بو کا جائزہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ اس کی بو خوشگوار اور تازہ ہونی چاہیے۔ اگر مچھلی کی رنگت دھندلی یا اس کی بو بدبودار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استعمال کے لیے غیر موزوں ہے۔



دریائی اور فارمی مچھلی میں فرق

ماضی میں، زیادہ تر مچھلی کا شکار اپنے تالابوں کو صرف مقامی انواع جیسے تھیلا، روہو، مریگال اور کامن کارپ کے ساتھ ذخیرہ کرتے تھے۔ ابھی حال ہی میں، دو تیزی سے بڑھتی ہوئی انواع، گر اس کارپ اور سلور کارپ، کو جدید پولی کلچر پیداواری صلاحیتوں کو

تازہ یا ذخیرہ خشک مچھلی

تازہ یا ذخیرہ مچھلی دونوں ہی صحت بخش ہے۔ ذخیرہ شدہ مچھلی کو نمک اور دیگر عرقات کی مدد سے خشک کر کے تازہ مچھلی کے مقابلے میں زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جاتا ہے اور خشک مچھلی کو اچھی جگہ پر رکھنے سے اس کی غذائیت برقرار رہتی ہے۔ جبکہ تازہ مچھلی کو فریج میں رکھنے سے اس کی تازگی 4-3 دن تک برقرار رہتی ہے۔

اعتیاطی تدابیر

مچھلی خریدنے کے دوران مندرجہ ذیل اہم باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں

- ☆ مچھلی کو کسی قابل اعتماد دکان سے خریدیں۔
- ☆ مچھلی کی رنگت، چمک، اور بو کا جائزہ لیں۔
- ☆ مچھلی کے سائز پر غور کریں۔
- ☆ خشک یا تازہ مچھلی خریدنے کا فیصلہ کریں۔
- ☆ مچھلی کو صحیح طریقے سے صاف کریں۔
- ☆ مچھلی کو صحیح طریقے سے پکائیں۔
- ☆ مچھلی کو صحیح طریقے سے ذخیرہ کریں۔

ان تجاویز پر عمل کر کے آپ صحت مند اور مزیدار مچھلی خرید اور پکا سکتے ہیں۔

روپے لٹر والے برانڈ اور اچھی کوالٹی کے کوکنگ ائل کی نسبت سوا سو سے ڈیڑھ سو روپے لٹر میں مل جاتا ہے۔ ائل میں یہ پام ائل ہے اور پام ائل کی بھی سستی ترین اور گھٹیا ترین قسم ہے یعنی یہ سوفٹ گریڈ ائل ہے جو کہ صابن بنانے کے نام پر امپورٹ کیا جاتا ہے جس کا میلنگ پوائنٹ 60 سے 65 ڈگری ہے جبکہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری ہے تو ہم جب اس تلی ہوئی مچھلی کو کھائیں گے تو یہ ائل ہمارے نظام انہدام میں جا کر 37 ڈگری پہنچل نہیں سکے گا اور یہ ہماری انٹریوں میں جم جائے گا جب یہ ہماری انٹریوں میں جم جائے گا تو دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنے گا تو خدارا ایسی جگہوں سے مچھلی نہ خریدیں۔ لہذا ایسی جگہوں سے مچھلی خریدتے وقت تیل کے معیار کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔



زیتون کے تیل کو بیٹری خوراک میں استعمال کرنے کے فوائد

بقیہ:

وزن 212.80 گرام رہا جبکہ پروں کے بغیر صرف گوشت کا وزن 135.35 گرام، ران کا وزن 52.08 گرام، چھاتی کا وزن 56.14 گرام رہا۔ سب سے زیادہ دل کا وزن 1.69 گرام، پوٹے کا وزن 4.23 گرام اور جگر کا وزن 3.55 گرام رہا۔ سب سے اچھی پنی ایچ اور واٹر ہولڈنگ کیمپسٹی ٹریٹمنٹ نمبر 3 کی ریبی جو کہ 6.09 پی ایچ اور 74.26 فیصد واٹر ہولڈنگ کیمپسٹی ریبی۔ گروپ نمبر 3 کی بیٹریوں کے انڈول کا وزن سب سے زیادہ رہا جو کہ 16.97 گرام اور انڈے کی شیل کی موٹائی 0.27 ملی میٹر، زردی کا انڈیکس 47.75 فیصد، زردی 37.97 جبکہ سفیدی کی فیصد 63.33 فیصد رہی۔ تولیدی پیرامیٹرز میں سب سے لمبی اوویڈکٹ 19.56 سینٹی میٹر، اور فوولیکلز کے سب سے زیادہ نمبر 12 جو کہ گروپ نمبر 3 کی بیٹری کے رہے۔ اس تجربے کے ذریعے ثابت ہوا کہ زیتون کا تیل 1.5 فیصد (60 ملی لٹر) بیٹریوں کو خوراک میں دینے سے پرندوں کا وزن بڑھتا ہے، ایف سی آر سب سے بہتر ہے اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے اعضاء کا وزن اور انڈول کا وزن بہت اچھا ہوتا ہے۔

بیٹری خوراک میں زیتون کا تیل شامل کر کے دو مہینے دیا گیا۔ پہلا ایک ماہ بروڈنگ اور ایڈجسٹمنٹ پر دیا گیا جبکہ تیسرے ہفتے سے زیتون کا تیل دینا شروع کیا۔ 160 بیٹری پرندوں کو 4 لگ ٹریٹمنٹ میں رکھا گیا جن میں سے ٹریٹمنٹ نمبر 1 کے 40 چوزوں کو 0.5 فیصد تیل (20 ملی لٹر) خوراک میں ملا کر دیا گیا۔ ٹریٹمنٹ نمبر 2 کے 40 چوزوں کو 1 فیصد تیل (40 ملی لٹر) خوراک میں ملا کر دیا گیا۔ ٹریٹمنٹ نمبر 3 کے 40 چوزوں کو 1.5 فیصد تیل (60 ملی لٹر) خوراک میں ملا کر دیا جبکہ ٹریٹمنٹ نمبر 4 کے 40 چوزوں کو بغیر تیل کے خوراک دی گئی جسے کنٹرول گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ نمبر 3 (1.5 فیصد زیتون کا تیل) نے پورے تجربے میں سب سے زیادہ خوراک کھائی اور ٹریٹمنٹ نمبر 3 (1.5 فیصد زیتون کے تیل) کے پرندوں کا 2 سے 6 ماہ میں سب سے زیادہ وزن بڑھا۔ زیتون کے تیل سے ایف سی آر بہت متاثر ہوئی۔ 1 سے 8 ہفتوں میں اچھا اثر ہا پرندوں پر سوائے دوسرے ہفتے کے۔ ٹریٹمنٹ نمبر 3 میں سب سے اچھا نتیجہ رہا۔ پرندوں کو ذبح کرنے سے پہلے گروپ نمبر 3 (1.5 فیصد تیل) کے ایک زندہ پرندے کا سب سے زیادہ

زراعت پیشہ بھی اور عبادت بھی

ڈاکٹر شازیہ رمضان (ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد)، عینی رباب (لیکچرر اسلامک اسٹڈیز، ایرڈ اینگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی)

نعمتوں میں شمار کیا ہے اور سورہ الرحمن میں ان نعمتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں مٹھاس، کھٹاس، کڑواہٹ، نمکیات اور دیگر خواص شامل ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بڑی تعداد میں کھیتی باڑی اور گلہ بانی جیسے متبرک پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اس لیے اس پیشہ کی اہمیت و افادیت نہ صرف مسلمہ ہے بلکہ یہ ہر لحاظ سے برکت کا حامل بھی ہے۔

قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی زراعت کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے: کسان اپنے رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ رسول اکرم؟ کا فرمان پاک ہے کہ ”جس کسی کے پاس زمین ہے تو وہ اس میں زراعت کا بندوبست کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے۔ اگر وہ بھائی اسے لینے میں لیت و لعل سے کام لے تو وہ اس زمین کو روکے رکھے۔“

نبی آخر الزماں نے زرعی پیشے کی اہمیت و افادیت اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ جو مسلمان بھی کاشت کاری کرتا ہے، پودے لگاتا ہے، اس سے پرندے اور انسان یا جانور خوراک حاصل کرتے ہیں تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں کوئی پیڑ یا پودا ہو، اگر تم اس پودے کو لگا سکتے ہو تو لگا دو، اس سے تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی؟ کا فرمان ہے ”جو شخص کوئی پودا لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پودے سے نمودار ہونے اور برآمد ہونے والے پھل کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔“

الغرض زراعت کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آفات انہی و سماوی، بارش، آندھی، نامساعد موسموں اور کیڑے مکوڑوں سے اگر کسی مسلمان کاشتکار کی فصل کو نقصان پہنچ جائے تو اس کے لیے اللہ کریم کی طرف سے اجر کی خوشخبری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ جملہ فضیلتیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے صرف کسانوں اور کاشتکاروں تک محدود نہیں بلکہ یہ برکتیں زراعت سے وابستہ جملہ فریقین بشمول زرعی تاجر، زرعی سائنسدانوں، علوم زراعت سے وابستہ اساتذہ و طلبہ و طالبات کے لیے بھی ہیں۔ یہ تمام فریقین ایک پیغمبرانہ پیشے سے جوڑے ہوئے ہیں اور اپنی توانائیاں زراعت کی بڑھوتری اور ترقی کے لیے وقت کھتے ہوئے ہیں جس سے انسانیت اور دیگر مخلوقات کے لیے غذا کا بندوبست کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ زیر نظر مضمون دراصل ان لوگوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے جو زراعت کو فرسودہ اور متردّد شعبہ سمجھ کر اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری پیغمبر کی ان بشارتوں کے تناظر میں زراعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منسلک رہنے پر توجہ دینا ہوگی۔

زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ زراعت سے وابستہ کسان مخلوق خدا کے لیے اناج اور دیگر اجناس اگاتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ زمین کا سینہ چیر کر اس سے قیمتی ریشہ (کمپاس) اگا کر لباس کی فراہمی کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کا انتظام کرنا کھیتی باڑی اور عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے زمین و آسمان اور کائنات تخلیق فرمائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

”اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے سو وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔“

اور ایک جگہ زراعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد باری عزوجل ہے:

”اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس میں پینے کا پانی ہے اور اس کے ذریعے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم پراتے ہو، وہ تمہارے لیے اس کے ذریعہ کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔“

زراعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے:

”اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ ہر قسم کی اگنے والی چیزیں نکالیں، پھر ہم نے اس سے سبزہ والی چیزوں کو نکالا۔ ہم نکالتے ہیں اس سے دانے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور کھجور کے درخت یعنی اس کے کھپوں سے خوشے نکالے جو جھکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون کے باغ نکالے اور انار جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس کے پھلوں کی طرف دیکھ لو اور اس کے پکنے کی طرف۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کیں۔ یعنی اموال، املاک، زمین اور اس میں دستیاب جملہ نعمتیں و معدنی وسائل پروردگار عالم کی ملکیت ہیں اور انسان اس میں اللہ کے نمائندہ کے طور پر ان نعمتوں کے حصول کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے حاصل کی جانے والی تمام اشیاء کو

انڈوں کی غذائیت

ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان، حافظ محمد جنید ثاقب، کنزہ جاوید اقبال، اقصیٰ ستار، محمد ارحم رؤف نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

ہے۔ انڈے میں تقریباً پانچ گرام چکنائی ہوتی ہے انڈے کے لیڈ بڑی مقدار میں غیر سیر شدہ فیٹی ایسڈز اور فاسفولیڈز فراہم کرتے ہیں۔ انڈے میں تقریباً 207 ملی گرام کو لیٹرول ہے۔ ماہر غذائیت کے مطابق انڈے میں موجود صحت بخش چربی اور کو لیٹرول کا دل کی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ انڈے کی زردی میں چربی میں حل پذیر وٹامنز (D, E, K اور وٹامن کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ انڈوں میں موجود وٹامن A آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں اور انہیں macular degeneration جیسے عارضوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ وٹامن E ایک اینٹی آکسڈنٹ ہے جو جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکلز سے بچاتا ہے۔ انڈے وٹامن ڈی کا قدرتی ذریعہ ہیں جو ہڈیوں کی صحت اور مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن K خون کے جمنے اور ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔ انڈے میں موجود وٹامن بی-12 اعصابی کام اور خون کے سرخ خلیوں کی ساخت کے لیے ضروری ہے۔ رائبوفلاون تو انائی کے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انڈے بائیوٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ میٹابولزم، جلد، بالوں اور ناخنوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔ انڈے میں موجود فولیٹ سیل کی تقسیم اور ڈی این اے کی تشکیل کے لیے اہم ہے۔ پینوٹھینک ایسڈ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائی کے میٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انڈا فاسفورس، کیکشیم، پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں معتدل مقدار میں سوڈیم ہوتا ہے (142 ملی گرام فی 100 گرام)۔ اس کے علاوہ تمام ضروری ٹریس عناصر بھی شامل ہیں جن میں تانبا، آئرن، م، میگنیشیم، سلینیم اور زنک شامل ہیں۔ انڈے میں 24.1 ملی گرام کیکشیم ہے۔ کیکشیم صحت مند ہڈیوں اور دانتوں کے لیے ضروری ہے۔ انڈوں میں آئرن کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے جو خون میں آکسیجن لے جانے کے لیے اہم ہے۔ انڈے میں موجود سلینیم ایک اینٹی آکسڈنٹ ہے جو جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکلز سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھائزانیڈ کے کام میں بھی مدد کرتا ہے۔ زنک مدافعتی نظام اور زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے۔ انڈے کو لین کی کے بہترین غذائی ذرائع میں سے ایک ہیں جو میٹابولزم دماغ کی صحت اور گلیٹیو فیکشن کے لیے ضروری ہے۔ انڈے فاسفورس کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو ہڈیوں کی صحت اور خلیوں کی ساخت کے لیے ضروری ہے۔

انڈے صدیوں سے انسانی غذا کا اہم حصہ رہے ہیں۔ انڈہ دنیا بھر میں نہ صرف لذیذ بلکہ صحت بخش غذا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے غذائی اجزاء میں توازن، معتدل کیلوریز، زود ہضم اور سستی قیمت نے انڈے کو انسانوں کے لیے بنیادی خوراک کے طور پر روشناس کروایا ہے۔ اچھی غذائیت زندگی کے ہر مرحلے پر ضروری ہے لیکن زندگی کے پہلے ہزار (1000) دنوں میں (حمل اور پہلے دو سالوں کے دوران) سب سے زیادہ مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انڈے پہلے 1000 دنوں کے تینوں مراحل میں غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک مثالی خوراک ہیں۔ دیسی مرغی کے انڈے انسان کے لیے زیادہ صحت مند ہیں کیونکہ دیسی مرغیوں کو قدرتی ماحول میں پالا جاتا ہے جس سے اینٹی بائیوٹکس اور ہارمونز کی ضرورت کم ہوتی ہے اور انڈوں میں بھی ان مادوں کے باقیات کا امکان کم ہوتا ہے۔ دیسی مرغیوں کے انڈوں میں وٹامنز، معدنیات زیادہ جبکہ کو لیٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کچھ مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ دیسی انڈوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ دیسی انڈوں کا خول موٹا اور انڈے زیادہ ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ انڈوں کو پکانا بہت آسان ہے جس سے وہ مصروف افراد اور خاندانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ علاوہ ازیں انڈے کمزور افراد (حاملہ خواتین، بچے، بوڑھے اور بیمار افراد) کے لیے انتہائی موزوں خوراک ہیں۔

انڈا میکرو نیوٹریئنٹس اور مائیکرو نیوٹریئنٹس کا ذخیرہ ہے جو نشوونما میں مدد کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ انڈے غذائیت کا پورا ہاؤس ہیں جو پروٹین، وٹامنز اور معدنیات جیسے ضروری غذائی اجزاء ایک ساتھ فراہم کرتے ہیں۔ انڈے کی زردی وٹامنز سے بھرپور ہے جس میں وٹامن بی (ایلیکٹریک ایسڈ) کے علاوہ تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق روزانہ دو انڈے کھانے سے وٹامن کی ضروریات کا 10 سے 30 فیصد پورا ہوتا ہے۔

ایک بڑے انڈے (تقریباً 50 گرام) میں پائے جانے والے اہم غذائی اجزاء درج ذیل ہیں۔ ایک انڈے میں ایک گرام سے کم کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ انڈے میں فائبر یعنی غذائی ریشہ نہیں ہوتا۔ انڈے میں تقریباً 68-72 کیلوریز ہوتی ہیں۔ انڈے اعلیٰ قسم کی پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ ایک انڈے میں تقریباً چھ گرام (6g) پروٹین ہوتے ہیں۔ پروٹین جسم کے نئے ٹشوز بنانے اور مرمت کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارے مدافعتی نظام، ہارمونز، اور ہاضمے کے لیے بھی ضروری

مکس سبزیوں کا اچار

سارہ اشتیاق، بکنزہ جاوید اقبال،..... نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی سرکہ کی اقسام میں سفید سرکہ، سیب کا سرکہ یا مالٹ سرکہ شامل ہیں۔ سرکہ کا انتخاب اچار کے مکمل ذائقہ کو اثر انداز کرتا ہے۔ سرکہ کی مقدار ترکیب اور ذاتی ذائقے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ چچوں سے لے کر ایک کپ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔

سبزیوں کے اچار کے فوائد

فری ریڈیکل سے تحفظ

اچار بنانے کے لیے سبزیوں کو بنا پکائے استعمال کیا جاتا ہے جس سے سبزیوں میں موجود غذائی اجزاء (نیوٹریٹس) ختم نہیں ہوتے۔ یہ سبزیاں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں اور فری ریڈیکل سے تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو دائمی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

بہتر ہاضمہ

خمیر شدہ کھانوں میں پرو بائیوٹکس پائے جاتے ہیں جو ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔ اچار میں موجود سبزیوں میں پائے جانے والا غذائی ریشہ بھی ہاضمے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آنتوں کی صحت میں مدد کرتا ہے۔ غذائی ریشہ جسم میں موجود کو لیئرول کو کم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

بلڈ شوگر کو مستحکم کرنے میں مددگار: اچار میں سرکہ پر مبنی نمکین پانی خون میں گلوکوز کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور: سبزیوں کا اچار وٹامن کے، وٹامن سی، وٹامن اے سے بھرپور ہے۔ وٹامن کے خون کے جمنے اور ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن سی قوت مدافعت اور جلد کی صحت کے لیے اہم ہے۔ وٹامن اے آنکھوں کے لیے مفید اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ کھیرے اور چندر جیسی سبزیاں پوٹاشیم کی معدنیات کی مواصلت کر سکتی ہیں جو خون کے دباؤ کو منظم رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے۔

اچار میں مزید کچھ معدنیات جو پائی جاتی ہیں اس میں کالمشیم، فاسفورس، سوڈیم اور میگنیشیم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ چندر میں وٹامن اے اور بی، قدرتی شکر اور فولاد کا کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پکندر جگر کو درست رکھتا ہے اور جسم میں خون کی پیدائش میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ شلجم میں وٹامن سی کی کافی مقدار موجود ہے۔ یہ سبزی آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کمزور ہاضمے کے افراد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔

مکس سبزیوں کا اچار ذائقوں کا ایک سمافتی ہے اور سبزیوں اور مصالحوں کا ایک مرکب ہے جو کسی بھی کھانے میں ذائقے کو بڑھا دیتا ہے۔ اچار صدیوں سے ہندوستانی کھانوں کا ایک حصہ رہا ہے جس کی جڑیں روایت اور ثقافتی اہمیت کی گہرائی میں ہیں۔ لفظ "اچار" سنسکرت کے لفظ "اکار" سے ماخوذ ہے جس کا مطلب رواج یا روایت ہے۔ اچار خوراک کی پریزرویشن، سبزیوں کی شلیفٹ لائف کو بڑھانے کی حکمت عملیوں میں سے ایک رہا ہے۔ اچار نہ صرف موسمی سبزیوں کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تھا بلکہ ان کے ذائقے کو بڑھانے کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اچار بنانے کا رواج 4000 سال پرانا ہے جو اسے ہندوستان کے پاک ثقافتی ورثے کا ایک لازمی حصہ بناتا ہے۔

اجزاء کی اہمیت

سبزیوں کا اچار مختلف اجزاء کا ایک ذائقے دار امتزاج ہے اور ہر جز ایک منفرد ذائقہ فراہم کرتا ہے۔

سبزیاں

سبزیوں کا انتخاب وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن عام انتخاب میں گاجر، گوبھی، سبز چلیاں، مرچ اور شلجم شامل ہیں۔ یہ سبزیاں عام طور پر چھوٹے پیمانے کے ٹکڑوں میں کاٹی جاتی ہیں۔

سرسوں کا تیل

سرسوں کا تیل مکس سبزیوں کا اچار بنانے کے لیے ترجیحی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تیل ایک مخصوص ذائقہ اور مہک لاتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو اکثر سمونگ پوائنٹ پر گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تپش کو کم کرنے کے لیے اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔

مصالحے

مصالحوں کا امتزاج اچار میں ایک خاص ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ سرسوں کے بیج، میتھی کے بیج، سونف کے بیج، کلونجی کے بیج، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور ہنگ عام طور پر استعمال ہونے والے مصالحوں میں شامل ہے۔

نمک: نمک اچار کو محفوظ رکھنے اور اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔

سرکہ

سرکہ اچار کو تیز ذائقہ فراہم کرتا ہے اور طبعی لحاظ سے بھی سرکہ اچار کی شلیفٹ لائف دراز

سبزیوں کو محفوظ کرنے میں مددگار

ہلاکاسائیں لیں۔

- اچار کے ذریعے سبزیوں کو تجارتی طور پر یا گھر میں استعمال کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔
- مغربی ممالک میں تجارتی طور پر اچار کی جانے والی سبزیوں میں کھیرے، بندگو بھی اور سبز زیتون کی سب سے زیادہ مقدار ہے۔ اس کے علاوہ لہسن، پیاز، گاجر، پھلیاں اور دیگر سبزیاں کم مقدار میں اچار کے ذریعے محفوظ کی جاتی ہیں اور ٹیلف لائف بڑھائی جاتی ہے۔
- مکس سبزیوں کا اچار بنانے کے اجزاء اور ترکیب
- سبزیوں کا اچار مختلف طریقوں سے تیار کیا جاسکتا ہے جس میں سروسوں کا تیل یا سرکہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- سروسوں کے تیل سے تیار کردہ اچار

اجزاء

سرکہ سے تیار کردہ اچار کی ترکیب

گاجر	: 250 گرام	اجزاء
بندگو بھی	: 250 گرام	سرکہ
سبز مرچ	: 250 گرام	: 250 ملی لیٹر
لہسن	: 250 گرام	چینی
ادرک	: 100 گرام	: دو چمچ
سبز پھلیاں	: 250 گرام	نمک
سروسوں کا تیل	: آدھا کلو	: دو چمچ
لال مرچ پاؤڈر	: چار چمچ	پانی
ہلدی	: دو چمچ	: دو کپ
نمک	: پانچ چمچ	سبزیاں
میٹھی دانہ	: تین چمچ	: ایک کلو
سونف	: پانچ چمچ	تیز پات
کلو بنجی	: دو چمچ	: دو پتے
زیرہ	: تین چمچ	ترکیب
سٹرک ایڈ	: چار چمچ	• ایک پین میں سرکہ شامل کریں اور دو کپ پانی ڈالیں۔

ترکیب

- اب اس میں دو تیز پات شامل کریں۔ اس کے ساتھ دو کھانے کے چمچ چینی اور دو کھانے کے چمچ نمک شامل کریں اور ان سب کو ڈھیمی آنچ پر اُبال لیں۔
- اُبال آنے پر آنچ بند کر دیں۔ اب اس کو ایک برتن میں موجود سبزیوں پر ڈال دیں۔
- اب اچار کو ایک مرتبان میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔
- اچار میں نمک، سروسوں کا تیل اور سرکہ کا استعمال سبزیوں کو خراب کرنے والی مائیکرو بیل سرگرمی کو دباتا ہے اور اچار کو محفوظ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
- ایک پین میں ہلکی آنچ پر سونف، میٹھی دانہ، سفید زیرہ اور کلو بنجی کو بھون کر رکھ لیں اور

الحديث

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کا خزانہ قیامت کے دن گننے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور مالدار اس سے بھاگے گا اور سانپ اس کا پیچھا کرے گا اور وہ شخص اس وقت فرط خوف سے اپنی انگلیاں منہ میں لے گا۔ (احمد)

گاجر کا مربہ

کنزہ جاوید اقبال، سارہ اشتیاق، اقصی ستار..... نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

(Hydrate) رکھنے میں مدد دے سکتی ہے، خاص طور پر جب اسے متوازن غذا کے طور

پر کھایا جائے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں غذائیت کی کمی ایک تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے، گاجر آبادی کی مجموعی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔

کھانسی استعمال (Culinary Uses)

پاکستان میں گاجر کو ذائقہ، غذائیت اور رنگ بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جن میں گاجر کا حلوا، سلاد، اچار، گاجر کا جام اور مربہ وغیرہ شامل ہیں۔

گاجر کا مربہ

گاجر کا مربہ گاجروں سے بنایا جانے والا ایک لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ذخیرہ ہے۔ اس کو عموماً خصوصی مواقع پر جیسے تہوارات اور خوش آمدید کے مواقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ گاجر کا مربہ ایشیائی ممالک میں مقبول ہے۔

گاجر کا مربہ بنانے کے اجزاء اور ترکیب

اجزاء:	گاجر :	دو کلو
	چینی :	ڈیڑھ کلو
	پانی :	تین کپ
	لیمونس کارس :	دو کھانے کے چمچ
	سبز الائچی :	حسب ضرورت
	بادام :	حسب ضرورت

ترکیب

درمیانے سائز کی سرخ تنازہ گاجریں دھو کر چھیل لیں اور دو حصوں میں کاٹ لیں۔ اب کاٹنے کی مدد سے اس میں نشان لگالیں کسی ٹین لیس سٹیل کے برتن میں پانی اور آدھی چینی بنا کر گرم کریں۔ جب چینی اچھی طرح حل ہو جائے تو شیرے کو مکمل کے کپڑے میں سے چھان لیں تاکہ چینی کی شفافیت دور ہو جائیں۔ شیرے کو دوبارہ آگ پر پکانا شروع کریں۔ جب دو بال آبائیں تو گاجر کے تیار شدہ ٹکڑے ڈال کر دو سے تین منٹ پکائیں اور جب درجہ حرارت 105 سینٹی گریڈ ہو جائے یا شیرہ گرانے پر موتی بنے تو گاجر کے ٹکڑے ڈال کر دو منٹ پکانے کے بعد اتار لیں۔ تیسرے دن یہی عمل بقایا چینی کے ساتھ

گاجر جسے سائنسی طور پر *Daucus carota* کہا جاتا ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں سب سے پسندیدہ اور بڑے پیمانے پر کھائی جانے والی سبزیوں میں سے ایک ہے اور اپنے متحرک نارنجی رنگ اور میٹھے ذائقے کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ گاجر کی کاشت گرم خطوں اور ذیلی گرم خطوں میں ستمبر سے نومبر کے مہینوں میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ گاجر پاکستان کے مختلف علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ بنیادی گاجر پیدا کرنے والے صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان شامل ہیں۔ گاجر پاکستان کی زراعت میں اہم مقام رکھتی ہے جو کسانوں کی روزی روٹی اور ملکی معیشت دونوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گاجر کی کاشت نہ صرف دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے بلکہ غذائی تحفظ میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ گاجر اپنی اقتصادی اہمیت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ثقافتی اہمیت رکھتی ہے۔ گاجر بہت سے روایتی پکوانوں میں ایک اہم جزو ہے جیسے کہ "گاجر کا حلوا" جو کہ مکش گاجر، دودھ اور شکر سے تیار کیا جاتا ہے۔

گاجر کی غذائی اہمیت

گاجر اپنے غذائی فوائد کی وجہ سے بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ گاجر ضروری وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ خاص طور پر وٹامن اے جو صحت مند بینائی جلد اور مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے گاجر میں الفا کیریوٹین اور لیوٹین جیسے اینٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جسم کو آکسیڈیٹو تناؤ سے بچانے میں مدد دیتے ہیں اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ گاجر میں غذائی ریشہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہاضمہ اور آنتوں کی صحت میں مدد کرتی ہے۔ اس میں کیلورین نسبتاً کم ہوتی ہیں جو اسے وزن کے انتظام کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتی ہیں۔ گاجر پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ پوٹاشیم ایک ضروری معدنیات ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور پٹھوں اور اعصاب کے مناسب کام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

وٹامن اے کے علاوہ گاجر دیگر وٹامنز اور معدنیات فراہم کرتی ہے۔ بشمول وٹامن کے، وٹامن سی، وٹامن بی-6، کپکیم اور میگنیشیم۔ یہ غذائی اجزاء مجموعی صحت اور تندرستی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ گاجر میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو آپ کو ہائیڈریٹ

دہرائیں تاکہ مربہ تیار ہو جائے۔ جب مربہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے ہوابند برتن میں نکال کر محفوظ کر لیں۔

گاجر کے مربے کے فوائد 3۔ فائبر کی بھرمار

گاجر کے مربہ میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کے کو لیٹرول کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے اور آپ کو قبض جیسے صحت کے مسائل سے بچاتا ہے اور ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔

1۔ وٹامن اے کا خزانہ گاجر کا مربہ وٹامن اے سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں موجود کیروٹینائڈز اچھی بینائی کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہیں۔

2۔ توانائی کی فراہمی گاجر کے مربے میں گھر کار بولہائیڈریٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو اسے

<<<<<<<<>>>>>>>>

انڈوں کی غذائیت

بقیہ:

انڈے متوازن غذائی اجزاء فراہم کرنے کے علاوہ دیگر افعال اجزاء بھی فراہم کرتا ہے۔ انڈے میں لیوٹین اور ڈی زینٹھین اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان کے علاوہ انڈوں میں دیگر کیروٹینائڈز کی بھی کچھ مقدار موجود ہے جو امینٹی آکسیڈنٹس کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انڈہ ان کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ انڈے معتدل کیلوریز کے ساتھ ساتھ غذائی ترکیبیں بھی فراہم کرتے ہیں۔ ممکنہ طور پر مجموعی کیلوری کی مقدار کو کم کرتے ہیں اور وزن کم

<<<<<<<<>>>>>>>>

کپاس کی سفید مکی کے نقصانات اور کیمیائی تدارک

بقیہ:

کیڑے مار دھار	خصوصیات	سفارش کردہ مقدار
فلوئیکا میڈ+ پائیری پرائیڈ 15 ایل سی ای	سفید مکی کے بالغ اور بچوں دونوں کے لیے موثر کیڑے مار مگر ہے	50 ملی لیٹر فی ایکڑ
فلوئیکا میڈ+ اسپینا پیرٹ 35 ڈیلیو جی	بالغ سفید مکی کے لیے موثر کیڑے مار مگر ہے	200 گرام فی ایکڑ
نائلن پائیرام+ پائیٹریٹ 80 ڈیلیو ڈی جی	سفید مکی کے بالغ اور بچوں دونوں کے لیے موثر کیڑے مار مگر ہے	100-130 گرام فی ایکڑ
پائیری پرائیڈ 25 ایل سی ای	کپاس کے ابتدائی مراحل پر سفید مکی کے ابتدائی حملے کی صورت میں انڈوں/بچوں کے موثر کنٹرول کے لیے ایک موثر مگر ہے۔	محکمہ کی سفارش کردہ مقدار فی ایکڑ
پائیری پرائیڈ 25 ایل سی ای	کپاس کے ابتدائی مراحل پر سفید مکی کے ابتدائی حملے کی صورت میں انڈوں/بچوں کے موثر کنٹرول کے لیے ایک موثر مگر ہے۔	200 ملی لیٹر فی ایکڑ
پائیری پرائیڈ 25 ایل سی ای	کپاس کے ابتدائی مراحل پر سفید مکی کے ابتدائی حملے کی صورت میں انڈوں/بچوں کے موثر کنٹرول کے لیے ایک موثر مگر ہے۔	200 ملی لیٹر فی ایکڑ

نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اثرات

ڈاکٹر فرخندہ انجم، مہک مصور، ندر حسین..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

مختلف ویب سائٹس صارفین کو لوگوں کے ایک بڑے اور متنوع گروہ سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتی ہیں جس سے انہیں عالمی خدشات کے بارے میں بہتر معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ بچوں کے سماجی مہارتوں کو بہتر بنا سکتا ہے اور سوشل میڈیا سائٹس کے ساتھ ان کے تجربات عام طور پر اچھے ہوتے ہیں۔ متنوع میڈیا انٹرفین کے ذریعے تعلیم کو مختلف طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر طالب علم خود ہدایت شدہ مطالعہ میں مشغول ہو سکتے ہیں، گروپ پروجیکٹس میں تعاون کر سکتے ہیں یا اسائنمنٹس پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اس بات کے شواہد بھی ملے ہیں کہ نوجوانوں کو معلومات کی ڈیجیٹل ترسیل کے ساتھ مشغول ہونے کی اجازت دینے سے انہیں تقریباً لاکھودو موضوعات پر سیکھنے کو پڑھانے اور مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے نوجوان اپنا روزگار بھی بنا رہے ہیں جیسے کہ Covid-19 کے دورانیہ تمام انٹرنیٹ ٹیوٹ اور کاروباری نظام بند ہو کر رہ گیا تھا تب بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے نہ صرف بچوں کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مدد کی بلکہ کاروباری عوام کو بھی بہت حد تک مدد کی اسی دوران بہت سارے نوجوانوں نے Online کام بھی شروع کر دیا جس میں ای کامرس Amazon، ebay وغیرہ شامل ہے۔ وہاڑی ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کے جدید ٹیکنالوجی کے اثرات میں جسمانی، جذباتی، ذہنی اور معاشی جس میں آنکھوں کا خشک ہو جانا، نیند کا نہ آنا، سرد در رہنا، موٹاپا اور ذہنی دباؤ وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ فائدہ مند ان اثرات میں تعلیمی، کاروباری، تحقیقی، شخصیت میں نکھار، معمول وضع ہونا اور رابطے میں آسانی وغیرہ شامل ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق نوجوان اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سوشل نیٹ ورک پر مشغول رہتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر نوجوانوں کی نشوونما پر اثرات ہونے کے حوالے سے خدشات اور اختلاف رائے پائے جاتے ہیں۔ ان متعلقہ اثرات کو دیکھتے ہوئے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو متوقع اثرات اور اس کے حل کے لیے مناسب تعلیم و تربیت دی جائے تاکہ وہ اس کے بڑھتے ہوئے استعمال سے مستفید ہو کر ملک و قوم اور اپنے مستقبل کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔

<<<<<<<>>>>>>>>>

دور جدید کی ترقی میں سب سے اہم کردار ٹیکنالوجی نے ادا کیا ہے مستقبل میں بھی اسی کو اہمیت حاصل ہے۔ سوشل میڈیا اور ای کامرس کے اشتراک سے انسان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور جہاں فلاح و بہبود کی بات کی جائے تو کسی شخص یا عوام الناس کی مجموعی حالت یا اچھی صحت کو فلاح و بہبود کہا جاتا ہے، ایک صحت مند معاشرہ جسمانی، جذباتی، معاشرتی اور سماجی بہبود کے متعدد پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا یعنی لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، موبائل اور دوسرے تمام نیٹ ورکنگ کے عمل کو نئی شکل دے رہا ہے۔ عالمی نیٹ ورکنگ اور ابلاغ کی تیز رفتار ترسیل سے انسان کی روزمرہ زندگی پر شدید مثبت اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو کہ نہ صرف نوجوانوں کی صحت اور ان کے کام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ کے بکثرت استعمال کی وجہ سے آنکھوں کا خشک ہو جانا، موٹاپا، کم خوابی اور دیگر نفسیاتی مسائل شامل ہیں۔ ایک بڑی اکثریت اس بات سے بھی متفق ہے کہ ٹیکنالوجی باہمی رابطے کو خراب کر رہی ہے اور خاندان پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے آج کے معاشرے پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ہر صنعت، بشمول مالیات اہداف، روزگار کے امکانات اور مسابقت ڈیجیٹلائزیشن سے متاثر ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کوئی حالیہ واقعہ نہیں ہے کچھ سالوں سے اس تصویریں بڑی تکنیکی ترقی شامل ہے۔ خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کچھ پہلے سے منسلک خدمات اور سامان، بشمول ٹریول سسٹم، موسیقی تبدیلیاں اور میڈیا تیزی سے ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی قوم کا وسیع مستقبل ہے جو کہ بہت پہلے سے موجود ہے اور ہماری آنے والی نسلوں تک چلے گا اس کا استعمال اور اس پر کی جانے والی تحقیقات پر جس قدر روشنی ڈالی جائے گی یہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے نوجوانوں کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال پر کی گئی تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ بچے اور نوجوان اس کے بہت سے فائدہ مند عناصر سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے نوجوانوں کی تعلیمی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا رد و بدل آتا ہے جس کی مدد سے گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جاسکتی ہے۔ Online مشقیں بھی

لنچ باکس سے بچوں کی نشوونما

مومنہ نوال، حر، افتخار..... شعبہ ہوم سائنسز، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اگر معاشی حالات کو مد نظر رکھ کر بھی بات کی جائے تو ایک چپس کا بیسٹ 20 سے 30 روپے کا ہے جب کہ اس کے برعکس کوئی بھی موسمی پھل لے لیا جائے تو وہ 10 سے 15 روپے کا ہوگا۔ جیسا کہ کیلا اس مہنگائی میں بھی 100 سے 120 روپے درجن ہے یعنی کہ ایک کیلا 10 سے 12 روپے کا ہوا۔ اب آپ اپنے بچے کے لیے ایک کیلا جو کہ فائبر، پوٹاشیم، وٹامن B6، وٹامن C، آئی آکسائیڈنٹ اور فائٹونیوٹرینٹ فراہم کر رہا ہے اس کا انتخاب کریں گے یا چپس کے بیسٹ کا جو قیمت میں بھی زیادہ ہے اور آپ کے بچے کی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔

پروٹینڈ فوڈ کی وجہ سے آج کل نوجوان اور بچوں میں ذیابیطس عام ہے۔ اچھی خوراک بچوں کے دماغ کے لیے ایندھن ہے؟ اگر بچے اچھی خوراک نہیں لیں گے تو سستی، کمزوری، تھکاوٹ اور ایسے ہی دوسرے مسائل سے دوچار رہے گے اور جماعت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔

اکثر مائیں روزانہ اپنے بچوں کو بیسکٹ، چاکلیٹ یا کپ کیک رکھ دیتیں ہیں البتہ بچے خوش ہو کر کھالیں گے جب کہ یہ چیزیں دانتوں کے مسائل کی بڑی وجہ ہیں۔ اسی طرح خوراک چبانے میں جب درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بچے ٹھیک سے کھا نہیں پاتے اور نہ صرف صحت خراب ہوتی ہے بلکہ بچے کی ظاہری شخصیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔

فاسٹ فوڈ کاسب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے فائبر کو دور کر دیا ہے۔ پیزا، پائتا، بریڈ، برگر، شورامسب میں ہی ریفائنڈ آٹا استعمال ہوتا ہے جو کہ معدے اور انٹریوں میں مسئلہ کاسب بنتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال اعتدال سے کیا جائے تو ان مسائل سے بچا جاسکتا ہے۔

پروسیڈیڈ مشروبات اور سوڈا ڈرنکس آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ ہے۔ بچوں کی ہڈیوں سے کیمیشم اور فاسفورس کو نکال کر ان کو کھوکھلا کرتی ہیں۔ ان کے بجائے بچوں کو تازہ پھلوں کا رس یا ملک شیک دینے جابئیں جو کہ ان کو طاقت بھی دے گا اور اس میں موجود کیمیشم ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط کرے گا اور بچے قدرتی ذائقوں سے بھی متعارف ہو گے۔

آبادی پاکستان میں ہر تین میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ غلظت کا انتخاب ہے۔ بچے غلظت کا انتخاب تب کرتے ہیں جب ان کو گھر سے لےج باکس دے کر نہ بھیجا جائے۔ ایک ہی کڑابی میں بار بار تیل گرم کر کے سکولوں میں پیئیں، سمو سے اور رول تلے جاتے ہیں جس سے بچے بریک ٹائم میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس تیل میں بار بار گرم ہونے کی وجہ سے ٹرانس فیٹ کی مقدار ایک خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ٹرانس فیٹ جسم میں غیر ضروری چربی اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہیں اپنا وقت بچانے کے لیے انسٹنٹ فوڈ (instant food) کا استعمال کرتی ہیں جس میں نوڈلز پاکستان میں سب سے عام مثال ہے نوڈلز کے ایک پیک میں تقریباً 1630 ملی گرام سوڈیم موجود ہوتا ہے جب کہ 9 سے 13 سال کے بچوں کے لیے 1200 ملی گرام سے زیادہ سوڈیم استعمال کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے چھوٹے بچوں کو اسے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ سوڈیم مستقبل میں نہ صرف بلڈ پریشر کے مسائل پیدا کر سکتا ہے بلکہ دل کی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مزید برآں یہ ہڈیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر بچے دوسرے بچوں کو دیکھ کر فاسٹ فوڈ کی ضد کرتے ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے تو سکول انتظامیہ کو نظم و ضبط اختیار کرنا چاہیے۔ اور ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کا لےج باکس اتنا تخلیقی اور رنگ برنگ ہو کہ وہ خوشی سے کھائیں۔ لےج باکس پیک کرنے اور بنانے میں بچوں کو ضرور شریک کریں۔ ان سے ان کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا جائے۔ انھیں ان کے پسندیدہ پھل سبزیاں اور سنیکس انتخاب کرنے کا موقع دیں۔ اس سے ان کی دلچسپی بڑھے گی اور وہ خوش محسوس کریں گے کہ جب ان کی رائے اور پسندیدگی کا احترام کیا جائے گا۔ لےج باکس میں پھل، سبزیاں، گوشت، دودھ، دالیں سب شامل کریں۔ لےج باکس کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتل بھی ضرور دیں تاکہ پانی کی کمی سے بچا جاسکے۔

پچھلے بیس سالوں کی تحقیقات کے مد نظر بچوں میں موٹاپے کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جس کے باعث بچے دوسری بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار بچوں کی خوراک کا بھی ہے۔

<<<<<<>>>>>>

حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: زکوٰۃ دینے والوں کو آبادی سے باہر نہ بلاؤ اور نہ زکوٰۃ دینے والا اپنی بیٹی سے جائے اور صدقات نہ وصول کیے جائیں مگر ان کی جگہوں پر۔ (البوداؤد)

الحديث

آرتھرو پوڈس اور متعلقہ بیماریوں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات

حناۃ الزہرہ، ڈاکٹر محمد سہیل ساجد..... زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بادشاہتیلیوں کا ہجرت کرنے والا رویہ فوٹوپیریڈ اور درجہ حرارت کے اشارے سے شروع ہوتا ہے اور ان اشاروں میں تبدیلی ان کی نقل مکانی کے انداز اور آبادی کے سائز کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے افزائش کے طرز عمل کے وقت اور دورانیے میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ انواع میں تولیدی کامیابی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ گرم درجہ حرارت آرتھرو پوڈس کے مینا بولم کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جو ان کی خوراک اور خوراک میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، گرم درجہ حرارت آرتھرو پوڈس اور ان کے میزبان پودوں کے درمیان تعاملات کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جڑی بوٹیوں اور جگن کی شرح میں تبدیلی آتی ہے۔

آرتھرو پوڈس پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کی کوششوں کے لیے کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے جس میں گرین ہاؤس گیٹوں کے اخراج کو کم کرنا اور انتظامی حکمت عملیوں کو نافذ کرنا شامل ہے۔ مثال کے طور پر، گرین ہاؤس گیٹوں کے اخراج کو کم کرنا موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار کو کم کر سکتا ہے اور آرتھرو پوڈس کی آبادی کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے زیادہ وقت فراہم کر سکتا ہے۔ آرتھرو پوڈس پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ماحولیاتی نظام کے لیے اہم مضمرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آرتھرو پوڈس پر جاتیوں کی کثرت اور تقسیم میں تبدیلیاں غذائی اجزاء کی سائیکلنگ کے کام کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، پولینیٹرز کی کثرت میں تبدیلیاں پودوں کی نسلوں کی افزائش پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، جس کے پورے ماحولیاتی نظام پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، آرتھرو پوڈس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ میں تبدیلیاں انسانی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں اور اہم اقتصادی اخراجات کا باعث بن سکتی ہیں۔

آب و ہوائی تبدیلی آرتھرو پوڈس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے ہوسٹ اور ذخائر کی آبادی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، درجہ حرارت اور بارش میں تبدیلیاں پیچیدہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں، جیسے ہرن اور چوہے کے لیے جنگلی حیات کے ہوسٹ کی کثرت اور تقسیم کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بدلے میں، پیچیدہ کی آبادی کو متاثر کر سکتی ہیں اور ان کا سامنا کرنے اور پیچیدہ کو منتقل کرنے کے امکانات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ مزید

موسمیاتی تبدیلی قدرتی دنیا کو تیزی سے تبدیل کر رہی ہے لہذا آرتھرو پوڈس پر اس کا نمایاں اثر پڑتا ہے۔ آرتھرو پوڈس غیر فقاری جانوروں کا ایک متنوع گروہ ہے جس میں کیڑے مکوڑے، مکڑیاں اور کریشین شامل ہیں، اور وہ مختلف ماحولیاتی نظاموں میں پولینیٹرز کے طور پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آرتھرو پوڈس پر موسمیاتی تبدیلی کے بنیادی اثرات میں سے ایک ان کی تقسیم اور کثرت ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھنڈے آب و ہوا کے مطابق رہنے والے آرتھرو پوڈس بے گھر ہو سکتے ہیں یا زندہ رہنے کے لیے نئی جگہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، گرم آب و ہوا کے مطابق رہنے والے آرتھرو پوڈس آبادی میں اضافہ اور ممکنہ طور پر ماحولیاتی عدم توازن کا باعث بنتے ہیں۔ آبادی میں اس تبدیلی کے نتیجے میں نئی ناگوار انواع کے ظہور کا سبب بھی بن سکتا ہے جو اہم معاشی اور ماحولیاتی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایشیائی ٹائگر مچھر، جو اب دنیا کے کئی حصوں میں قائم ہو چکا ہے، چکن گونیا اور زیکا وائرس جیسی بیماریاں لا سکتا ہے۔ کچھ انواع خشک سالی کے لیے زیادہ حساس ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر نمی کے حالات میں ترقی کر سکتی ہیں۔ بارشوں میں تبدیلی آرتھرو پوڈس کے لیے خوراک کے وسائل کی دستیابی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، جس کے پورے ماحولیاتی نظام پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، بارشوں میں تبدیلی پودوں کی نشوونما پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جو پھر سبزی خور آرتھرو پوڈس کو متاثر کر سکتی ہے جو ان پر کھانا کھاتے ہیں، اور بعد ازاں ان حشرات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو ان سبزی خوروں کو کھاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، آرتھرو پوڈس جو مخصوص پودوں کی انواع پر انحصار کرتے ہیں بے گھر ہو سکتے ہیں یا اپنے پسندیدہ رہائش گاہوں میں تبدیلی کی وجہ سے معدوم ہو سکتے ہیں۔

مزید برآں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسمی وقت میں ہونے والی تبدیلیاں بھی آرتھرو پوڈس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر موسم بہار معمول سے پہلے آجاتا ہے، تو آرتھرو پوڈس جو اپنے موسم سرما کے ہائبرنیشن سے نکلنے کے لیے مخصوص درجہ حرارت کے اشارے پر انحصار کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ملنے یا کھانا کھلانے کا موقع کھو سکتے ہیں۔ یہ آبادی کے سائز کو متاثر کر سکتا ہے اور بالآخر ماحولیاتی نظام کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح، آرتھرو پوڈس جو اپنے لائف سائیکل کو متحرک کرنے کے لیے مخصوص فوٹو پیریڈز پر انحصار کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بدلتے دن کی لمبائی سے متاثر ہو

چائے کے پودے کی بیماریاں اور ان کا تدارک

* ڈاکٹر ہما عباس، * عائشہ جاوید، * ڈاکٹر محمد کامران، * ڈاکٹر ساجد علیم خان..... * شعبہ امراض نباتات، * ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ، فیصل آباد

یہ پودا بھاڑی نما ہوتا ہے جیسے اسکے پتوں کے لیے اگایا جاتا ہے۔ جو مشروبات بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چائے کی پتیوں کو عام طور پر ابلتے ہوئے پانی میں ملایا جاتا ہے۔ چائے گرم اور مرطوب آب و ہوا میں بہترین اگتی ہے۔ چائے کو ہر سال 1600 ملی میٹر کی اوسط سالانہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے جو بڑھتے ہوئے موسم میں یکساں طور پر تقسیم ہوتی ہے۔ چائے کے باغبات کو عام طور پر سال میں 2.3 بار کھاد دی جاتی ہے۔ مٹی کی جانچ کے مطابق کھاد فراہم کرنی چاہیے تاکہ پودے کی بڑھوتری پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ چائے کے پودے پر بہت سی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ جو اسکی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہیں۔

1- الگل لیٹ سپاٹ (Algal leaf spot)

اس کی علامات میں پتوں پر سبز حاشیے کے ساتھ سرمئی، سبز یا تین کے ابھرنے ہوئے دھبے رونما ہوتے ہیں۔ یہ بیماری بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور نمی کے سبب پھیلتی ہے۔

تدارک

اور ہیڈ آبپاشی سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے بیماری پھیلتی ہے۔ پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ پودوں کے گرد ہوائی گردش کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔ پودوں کو زخمی ہونے سے بچائیں۔ بیماری والی شاخوں کو 6 انچ نیچے تک کاٹ دیں۔ بہار کے موسم میں جب پرانے پتے جھڑ جائیں تو پودوں پر حفاظتی ادویات کا چھڑکاؤ کریں۔

2- براؤن پلائٹ گری بلائیٹ (Brown blight Grey blight)

یہ پھپھوندی پتوں پر تب حملہ آور ہوتی ہے۔ جب وہ کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ نا مناسب دیکھ بھال یا منفی ماحولیاتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ بیماری پورے پودوں میں نامناسب ہوائی گردش، زیادہ درجہ حرارت اور پتوں میں زیادہ نمی موجود ہونے کی صورت میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کے حملہ آور ہونے کے نتیجے میں چھوٹے، بیضوی، ہلکے پیلے سبز دھبے سب سے پہلے پتوں پر رونما ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ دھبے جھمورے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور آخر کار سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کسی بھی عمر کے پتے اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

تدارک

پودوں کو تناؤ سے بچائیں۔ ہوائی گردش اور پتوں میں نمی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پودوں کو لگاتے وقت انکے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں اور پتوں کے سطح کو زیادہ دیر تک نم رہنے سے بچائیں۔

3- گھوڑے کے بالوں سے مثالیٹ (Horse hair blight)

اس بیماری میں پھپھوندی کے کالے دھاگے رونما ہوتے ہیں جو گھوڑے کے بالوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بیماری کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ یہ دھاگے اوپر والی شاخوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پھپھوندی شاخوں کے ذریعے اندر جا کر پودے کو متاثر کرتی ہے اور ایسے مادے پیدا کرتی ہے جو پتوں کے گرنے کا سبب بنتے ہیں۔

تدارک

پودوں کے آس پاس سے متاثرہ گرے ہوئے پتوں کو وہاں سے ہٹا دیں۔ پودوں کے اوپر لگی ہوئی تمام متاثرہ شاخوں اور پتوں کو کاٹ دیں۔

4- جوئی بیماری (Poria root disease)

اس بیماری کے نتیجے میں پتے پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے کچھ حصے اچانک مرجھا جاتے ہیں۔ سوکھے پتے کئی دن تک پودے سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر جھاڑی کو اکھاڑ کر دیکھا جائے تو وہ جڑوں کی سفیدی اور سرخ رنگت کو ظاہر کرتا ہے۔

تدارک

کسی بھی بظاہر متاثرہ جھاڑیوں اور ملحقہ پودوں کو ہٹا دیں جن کے اندر پیلے رنگ کے آثار موجود ہوں۔ جو بھی متاثرہ شاخیں ہو انکو کاٹ دیں۔ جو بھی متاثرہ شاخیں یا پتے ہوں انکو جلا دیں۔ متاثرہ پودوں کے ساتھ کے صحت مند پودوں پر مناسب ادویات کا استعمال کریں۔ جن علاقوں میں بیماری کا خدشہ ہو وہاں پر دو سال تک چائے کے پودے لگانے سے اجتناب کریں۔

5- جوئی سر (Root Rot)

اس بیماری کے علامات میں پتوں کا پھلنا، پودے کی ناقص نشوونما، پورے پودے مرجھا جانا، جڑوں کا بے رنگ ہو جانا شامل ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر ناقص نکاسی والے علاقوں میں حملہ آور ہوتی ہے۔ (باقی صفحہ 38 پر)

زراعت میں، کسان دوست کیڑوں پر کیڑے مار ادویات کے مضر اثرات

ڈاکٹر حماد الرحمن، ڈاکٹر حفیظ الرحمن، ڈاکٹر محمد شہباز نعیم..... شعبہ ایگری انومی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

تعارف

کے بارے میں اصل خطرہ یہ ہے کہ کسانوں کو ان ادویات کے خطرناک اور دیرپا نتائج کے بارے میں کم آگاہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسانوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کیڑے مار ادویات انسانوں اور ماحولیاتی نظام دونوں کے لیے نقصان دہ کیمیکلز کے اخراج سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ انہیں کیڑوں کے کنٹرول کے لیے مربوط پیسٹ میئنمنٹ اپروچ پر غور کرنا چاہیے، جس میں کیمیکلز کا استعمال آخری آپشن ہے۔ یہ ادویات کئی وجوہات کی بناء پر مضر ہیں۔ یہ زہریلی ادویات نقصان دہ کیڑوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن وہ انسانوں اور دیگر غیر ہدف والے جانداروں، جیسے جنگلی حیات، پالتو جانور اور فائدہ مند کیڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جلد کی جلن اور سانس کی دشواریوں سے لے کر کینسر، تولیدی مسائل اور اعصابی امراض جیسے صحت کے زیادہ سنگین مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت سے کیڑے مار ادویات کو ماحول میں مستقل رہنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹی، پانی اور ہوا میں طویل عرصے تک پائی جاتی ہیں۔ کیڑے وقت کے ساتھ ساتھ کیڑے مار ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیڑے مار ادویاتی مقدار کیڑوں پر قابو پانے میں کم اثر ہو جاتی ہے۔ اس سے ادویات کے استعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو ماحول کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے اور انسانوں اور کسان دوست کیڑوں کے لیے نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ کیڑے مار ادویات اپنے مطلوبہ ہدف سے ہٹ کر کام کر سکتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ ہوا کے دوران یا غیر ہدف والے علاقوں کے بہت قریب اسپرے کی جائیں۔ اس کے نتیجے میں انسانوں، جنگلی حیات اور کسان دوست کیڑوں کے لیے غیر ارادی طور پر تصادم ہو سکتا ہے۔ مزید یہ ادویات پانی کے ذرائع کو بھی آلودہ کرتی ہیں، جو آبی حیاتیات کو نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتی ہیں اور اگر پینے کے پانی یا آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے تو انسانی صحت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، ان ادویات سے وابستہ خطرات ان کیمیکلز کو ذمہ دارانہ اور ہدفی انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرنے اور کیڑوں پر قابو پانے کے متبادل طریقوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسانوں اور ماحول کے لیے کم نقصان دہ ہوں۔ کیڑے مار ادویات کئی طریقوں سے فائدہ مند کیڑوں پر نقصان دہ اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ مثلاً یہ دوائیں (باقی صفحہ 24 پر)

کیڑے مار ادویات فصلوں کے تحفظ کے حصول میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ یہ کیڑوں میں زیادہ مزاحمت کا باعث بنتی ہیں اور ان کیڑوں کی بڑھوتری کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی صورتوں میں کسانوں کو یا تو ان مزاحم کیڑوں کو مارنے کے لیے کیڑے مار ادویات کی طاقت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے یا ان کیمیکلز کے استعمال کی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ ادویات مصنوعات کی ذخیرہ ادوار کو بڑھا سکتی ہیں۔ نیز یہ کہ کیڑے مار ادویات کے استعمال کے بغیر اتنی بڑی آبادی میں خوراک کی فراہمی کا انتظام مشکل ہوگا۔

کیڑے مار ادویات کے منفی اثرات

کیڑے مار ادویات کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، خاص طور پر فائدہ مند کیڑوں یعنی تنبیوں اور شہد کی مکھیوں وغیرہ جن کو کسان دوست کیڑے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور ماحولیاتی نظام کی بہترین کارکردگی کے لیے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ عالمی سطح پر شہد کی مکھیاں تقریباً 107 اقسام کی فصلوں کا دورہ کر سکتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی 12 اقسام ہیں جو عام طور پر فصلوں کی پولینیشن کے لیے سرگرم رہتی ہیں۔ تقریباً 75 فیصد فصلوں کی اقسام کی پیداوار اور معیار کا انحصار کیڑوں اور جانوروں پر ہوتا ہے۔ بہت ساری فائدہ مند مصنوعات ہیں جو ہم کیڑوں سے لے سکتے ہیں مثلاً شہد کی مکھی سے موم کی پیداوار، ریشم کے کیڑوں سے ریشم کی پیداوار، سلک کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن اب ہم ان سونے کے انڈے دینے والی مرغیوں کو زیادہ پیداوار کے لالچ میں ذبح کر رہے ہیں۔ کیڑے مار ادویات کے مضر اثرات کے باوجود کاشتکار پیداوار کے نقصان سے بچنے کے لیے ان کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں کو ان ادویات سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے ان کا کم سے کم اور درست استعمال کرنا چاہیے۔

کیڑے مار ادویات کیوں خطرناک ہیں

کینسر کے تقریباً 98 فیصد مریضوں اور دیگر بیماریوں کے 94 فیصد مریضوں میں بنیادی وجہ کیمیکل آرگنوکلو رین ہوتا ہے۔ یہ ادویات کا پانی کی سطح سے بخارات کی صورت میں فضا میں شامل ہو کر مضر صحت ثابت ہوتی ہیں۔ انسانوں پر مضر اثرات کے باوجود، ان ادویات کا فائدہ مند کیڑوں پر بھی شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیڑے مار ادویات

بقیہ:

گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی، گندم کی 60 من پیداوار کا طریقہ

موزوں وقت سے پہلے کھٹائی کی صورت میں دانے سکڑ جاتے ہیں جبکہ کھٹائی میں غیر ضروری تاخیر سے دانے کھیت میں جھڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ موزوں موسمی حالات میں کھٹائی اور گہائی کا عمل ایک ساتھ جاری رکھا جائے تا کہ کم وقت میں کام ختم کیا جاسکے۔ گہائی کے بعد اناج کو کھیت سے گھر، گودام یا منڈی منتقل کرنا ایک اہم مرحلہ ہے، چھوٹے کاشتکار جن کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ اناج کو بوریوں میں بھر کر بیل گاڑیوں اور اونٹ کی پیٹھ پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں لیکن بڑے کاشتکار اس مقصد کے لیے ٹریلر اور ٹرک استعمال کرتے ہیں۔

گندم کو ذخیرہ کرنا

گندم کو ذخیرہ کرنا

جب اناج کو گوداموں میں محفوظ کر لیا جائے تو مختلف نوعیت کے نقصانات اناج کے معیار اور وزن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرندے حشرات اور دیگر کھترنے والے جانداروں کے علاوہ درجہ حرارت میں زیادتی، کچی اور آب و ہوا بھی اناج کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ گودام کا درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو اناج میں عمل تنفس تیز ہو جاتا ہے جس سے اناج کے گلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گودام میں نمی کا تناسب

اس کے علاوہ بھڑولوں اور بوریوں میں دانے ڈالنے سے پہلے نیچے اور اوپر نیم کے پتے رکھے جاسکتے ہیں جو بیماریوں اور حشرات کے نقصانات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہر پندرہ دن بعد سٹور کا معائنہ کرتے رہیں۔ اگر کاشتکار ان عوامل پر اچھی طرح سے عمل کریں تو وہ گندم کی کٹائی، گہائی اور ذخیرگی کے دوران ہونیوالے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

بقیہ:

پھولوں و زیبائشی پودوں کی قدر و قیمت میں قابل قدر اضافے کا طریقہ کار

4۔ پودینہ

پودینے کے پتوں سے کشید کیا جانے والا تیل خوشبودار ہونے کے باعث کا سمینک کی صنعت مثلاً صابن، عطر، پاؤڈر اور کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

پودینے کی تازہ پتوں کو سلا د کے علاوہ چائے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھولوں اور زیبائشی ادویاتی پودوں کی قدر و قیمت میں اضافے کے عمل کو بروئے کار لانے کے لیے مناسب علم، تربیت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس عمل سے بے روزگاری اور غربت کو کم کرنے میں خاصی معاونت حاصل کی جاسکتی ہے۔ پھولوں سے سجاوٹ کے علاوہ

ان کی قدر و قیمت بڑھانے کے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے اور مناسب تربیت کی فراہمی سے اس شعبے کو مزید بہتر اور منافع بخش بنایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فلوری کلچر میں پنجاب زرعی ریسرچ بورڈ لاہور کے تعاون سے ایک پائیلٹ پروجیکٹ پر تحقیق کا عمل جاری ہے۔ اور کسانوں کو پھولوں، زیبائشی ادویاتی پودوں کی قدر و قیمت بڑھانے کے جدید طریقوں سے آگاہی کی تربیت بھی دی جارہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے راقم الحروف سے 0334-7416664 بھی رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

احادیث مبارکہ: اے لوگو! اللہ پاک ہے اور پاک کمانی ہی قبول کرتا ہے، اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپؐ نے سورۃ مومنوں کی دو آیات تلاوت کیں۔ پھر ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے اور غبار آلود کپڑوں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آتا ہے اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یارب، یارب کہہ کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام کا، پہناوا حرام کا اور سارا جسم ہی حرام سے پلا ہوا ہے تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں مشرکین قریش رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تقدیر کے بارے میں جھگڑنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یوم یسعون فی النار علی وجھہم ذوقوا مس سقرنا کل شی خلتنا بہ بقدر جس دن دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو بے شک، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔

گندم کی جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے اہم سفارشات

عمارہ سحر رانا، جمشید علی جنید، ہما سلیم..... شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

اختصار کے پیش نظر یہاں زیادہ نقصان دہ جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے گندم کی جڑی بوٹیوں کو عموماً تین گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے گروپ میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں شامل ہیں ان جڑی بوٹیوں کے پتے چوڑے اور ریگیں جال کی طرح پھیلی ہوتی ہیں۔ بھاتھو، پوٹی، پیازی، جنگلی پالک، جنگلی مٹر، جنگلی ہالوں، رپوڑی، کرنڈ، شاہترہ، کاسنی، مینا، مینی پٹلی، بلی بوٹی، وری بوٹی اور دراتک ریوڑی نقصان دہ اور معروف چوڑے پتوں والی قسم ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کے دوسرے گروپ میں گھاس کے خاندان یا باریک پتوں والی جڑی بوٹیاں شامل ہیں ان کے پتے لمبے اور ریگیں متوازی ہوتی ہیں۔ جنگلی گھاس، دمب گھاس، ہوا گھاس یا پیٹی گھاس، جنگلی کنگ اس گروپ کی مشہور جڑی بوٹیاں ہیں۔ ان کے چٹوں پر گریسی مادہ اور باریک بال ہوتے ہیں۔ باریک پتے ہونے کی بنا پر جڑی بوٹی مارز ہر کی افادیت دیر پا نہیں ہوتی۔ ان کی تلفی کے لیے مخصوص زہریلی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ تیسرے گروپ میں نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں شامل ہیں ان کے پتے نوکدار اور ٹکونے اور تاسخت ہوتا ہے۔ جنگلی جینی اور دھجی سٹی اس گروپ کے نقصان دہ بوٹیاں ہیں ان کے زیر زمین گانٹھیں ان کی افزائش میں مددگار ہوتی ہیں اسی بنا پر یہ سخت جان ہوتی ہیں اور ان کی تلفی کافی مشکل ہوتی ہے۔

جڑی بوٹیوں کو عموماً دو طریقوں سے تلف کیا جاتا ہے جس میں غیر کیمیائی اور کیمیائی طریقہ کار شامل ہیں کسی بھی طریقہ کا انتخاب فصل کے مرحلے، طریقہ کاشت اور جڑی بوٹیوں کی شدت کو مدنظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ غیر کیمیائی طریقہ کار تک موثر ہے جب تک جڑی بوٹیوں کے نقصان کی معاشی حد کم ہے اگر یہ معاشی حد سے بڑھ جائیں تو ماہرین زراعت کے مشوروں سے زہر پاشی کر کے بیشتر جڑی بوٹیوں کا یقینی خاتمہ ممکن ہے۔ غیر کیمیائی طریقہ کار میں جڑی بوٹی کش ادویات استعمال نہیں کی جاتیں۔ بلکہ اس طریقہ میں بہت سے عوامل کاشت کے وقت ہی کر لیے جاتے ہیں۔ اس طریقہ میں کاشت کے وقت زمین کی اچھی طرح تیاری کرنے سے خاص طور پر گہرا ایل چلانے سے جڑی بوٹیوں کے بیج گہرے دب جاتے ہیں اور مناسب روشنی، ہوا نہ ملنے کی بنا پر انہیں اگنے کا موقع نہیں ملتا اور جڑی بوٹیوں کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں فصلوں کی اعلیٰ اقسام کا یا بیج استعمال کیا جائے جو جڑی بوٹیوں کے بیج سے ہو۔ برداشت سے پہلے فصل سے غیر ضروری پودوں کو نکال دینا بہت ضروری ہے تاکہ پیداوار میں جڑی بوٹیوں کا بیج شامل نہ ہو۔ اگر فی ایکڑ سفارش کردہ

زراعت کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور گندم کو زراعت میں نقد آور فصل ہونے کی بنا پر اہم مقام حاصل ہے یہ ہمارے ملک کی بڑی اہم غذائی فصل ہونے کی بنا پر 75 فیصد سے زائد ملکی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اگرچہ گندم کی پیداوار پہلے کی نسبت بڑھی ہے لیکن اس میں ابھی بھی فی ایکڑ اضافے کی گنجائش ہے ہمارے ہاں گندم کی اوسط پیداوار دیگر ترقی یافتہ ممالک کی اوسط پیداوار سے خاصی کم ہے۔ اس پیداواری فرق کی کمی اہم وجوہات میں گندم کی پھیلتی کاشت، منظور شدہ اقسام کے بیج کا استعمال نہ کرنا، کھادوں کا غیر متوازن استعمال، ناکافی آبپاشی، حالیہ سیلاب کی وجہ سے زمینوں کی زرخیزی میں کمی، گندم کی بیماریاں اور جڑی بوٹیوں کی بہتات سرفہرست ہے۔ گندم کی پیداوار کو متاثر کرنے میں ان میں اگنے والی خود رو جڑی بوٹیوں کا بڑا عمل دخل ہے یہ جڑی بوٹیاں گندم کو ملنے والی خوراک اور پانی کا ایک کثیر حصہ چراہتی ہیں اور کسان کی لاعلمی، غفلت اور عدم توجہی کے سبب بظاہر معمولی نظر آنے والی یہ فصل دشمن عناصر 15 سے 50 فیصد تک پیداواری نقصان کا باعث بنتی ہیں۔

جڑی بوٹیاں فصل کی کاشت سے لیکر بڑھوتری، بھائی، گہائی حتیٰ کہ منڈی پہنچنے تک ہر مرحلے پر مختلف طریقوں سے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ فصل کے اگاؤ میں رکاوٹ بنتی ہیں پھر روشنی، ہوا، پانی اور زمین سے غذائی اجزاء کے حصول میں فصل کا مقابلہ کر کے اس کی افزائش اور بڑھوتری کے عمل کو متاثر کرتی ہیں کیونکہ جڑی بوٹیوں میں پھلنے پھولنے کی رفتار اور موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فصل کی نسبت زیادہ ہے، جڑی بوٹیوں کی موجودگی میں فصل پر کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کا متبادل خوراک اور پناہ گاہیں فراہم کرتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی فصل میں بہتات کے باعث بھائی کا عمل بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ فصل کے بیج کے معیار کو متاثر کرنے کے ساتھ جھاڑ میں کمی کا موجب بنتی ہیں۔ گہائی کے عمل کے دوران اگر جڑی بوٹیوں کا بیج فصل کے بیج میں شامل ہو جائے تو منڈی میں فصل کی قیمت گر جاتی ہے۔ اس بنا پر ان کو کسان اور ملک کے مشترکہ دشمن کہا جاسکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ گندم میں جڑی بوٹیوں کو پھول اور بیج بننے سے پہلے تلف کیا جائے ان کی بروقت تلفی 5 سے 7 من فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔

یوں تو گندم کی فصل میں پچاس سے زائد اقسام کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں لیکن

سفر اش کردہ تدابیر کے مطابق کیا جائے۔ کھیت میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لیے پہلے پانی کے ساتھ زہریلی ادویات کا سپرے ہمیشہ دھوپ میں کی جائے جب اس جڑوی طور پر کم ہو، ابرا آلود موسم یا تیز ہوا چلنے کی صورت میں زیر پاشی کا عمل موخر کر دیں۔ چوڑے پتوں اور نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے لیے الگ الگ مخصوص زہروں کا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے اور نہ کہیں دوہرا سپرے ہو۔ سپرے کرتے وقت مخصوص ٹی جیٹ نوزل یا پھر فلیٹ فین پینٹل کی نوزل کا استعمال کریں وتری صورت میں سپرے کرتے وقت 120 لیٹر فی ایکڑ پانی استعمال کریں اور خشک وتر میں 150 لیٹر فی ایکڑ پانی استعمال کریں۔ سپرے کے بعد دس سے پندرہ دن تک کھیت میں پانی لگایا جائے نہ ہی گودڑی کی جائے۔

سپرے کے وقت رفتار ایک سی ہو۔ زہر ہمیشہ با احتیاط ڈیلر سے خریدیں جو پرانا اور ملاوٹ شدہ نہ ہو۔ زہر ہمیشہ مجوزہ مقدار فی ایکٹر استعمال کیا جائے اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ مثلی اور کلر اٹھے رقبوں پر جڑی بوٹی کش سپرے سے پرہیز کیا جائے۔ زہریلی ادویات سپرے کرتے وقت تمام احتیاطی تجاوز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ورنہ ذرا سی بے احتیاطی سے انسانی صحت اور فصل کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ قد آور جڑی بوٹیوں کو کیمیائی یا غیر کیمیائی طریقہ کار کا استعمال کر کے بروقت انسداد کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ان کا بالغ حالت میں کنٹرول مشکل اور غیر موثر ہو جاتا ہے۔

اس سال پنجاب بھر میں دو کروڑ ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مطلوبہ پیداواری ہدف کے حصول کے لیے فصل کی مناسب نگہداشت کا عمل تیز تر کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں متحرک جعلی اور غیر رجسٹرڈ زرعی ادویات کو فروخت کرنے والے سماج دشمن عناصر کی نشاندہی اور تیکہ کی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے گندم کے بحران کا حل محنت، مثبت سرگرمیوں کے فروغ اور محتاط اقدامات سے ہی ممکن ہے۔

<<<<<<<>>>>>>>>

شرح بیج میں 5 فیصد اضافہ کر لیا جائے تو فصل کے فی ایکڑ پودوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کو اگنے اور پھلنے پھولنے کے لیے کم جگہ اور غذائی اجزاء ملتے ہیں ربیع کی فصلوں کے زیر کاشت کھیتوں میں فصلیں ادل بدل کر کاشت کرنے سے جڑی بوٹیوں کی موثر انسداد ہو جاتی ہے۔

جس کھیت میں جڑی بوٹیاں زیادہ اگنے کا اندیشہ ہو وہاں ایک دفعہ کوئی چارہ مثلا برسیم کاشت کر کے جڑی بوٹیوں کا زور توڑا جاسکتا ہے برسیم کی ہر کٹائی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کے پورے کٹ جائیں گے اور یہ پھول اور بیج بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ فصلوں کی کاشت کی ترتیب میں پھلی دار فصلوں کو بھی شامل کر لیں تو جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے ساتھ زمین کی زرخیزی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غیر کیمیائی طریقہ کاریں داب کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کم خرچ اور موثر ہے اس میں فصل کاشت کرنے سے پہلے بارش ہونے کی صورت میں یارونی کے بعد تر حالت میں آنے پر زہر مارنے کے بعد کم از کم ایک یا دو دفعہ ہل چلا کر دو ہرا سہاگہ دے دیں اس کے بعد زمین کو ہفتہ دس دن ایسے ہی پڑا رہنے دیں اس دوران کھیت میں موجود جڑی بوٹیوں کو زمین کی آخری تیاری کے دوران تلف کر دیا جائے یہ نہ صرف زمین میں نامیاتی مادے میں اضافے کا باعث بنیں گی بلکہ اس طریقہ سے 25 سے 30 فیصد جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جاتی ہیں اور فصل کی پیداوار میں 20 فیصد تک اضافہ ممکن ہوتا ہے یہ طریقہ اگیتی کاشت کے لیے تو مناسب ہے لیکن کچھ کھیتی کاشت کے لیے یہ استعمال نہ کیا جائے تاکہ فصل کی کاشت مزید لیٹ نہ ہو۔ اگر رقبہ تھوڑا اور لیبر موجود ہو تو گوڈی کر کے بھی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے گوڈی کھرپے کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے نہایت مفید طریقہ کار ہے۔

جڑی بوٹیوں کے انداد کے لیے دوسرا طریقہ کیمیائی زہروں کا استعمال ہے۔ اگر جڑی بوٹیاں غیر کیمیائی طریقوں سے کنٹرول نہ ہو تو کیمیائی جڑی بوٹی مارا دویات کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اگرچہ بہت کارآمد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی احتیاط طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ زہریلی ادویات کا استعمال محکمہ زراعت کی

احادیث مبارکہ: ☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا (حضرت انس فرماتے ہیں پھر بھی) جب صحابہ کرام آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ اسے پسند نہیں فرماتے۔ ☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے بکری کا پالیا تحفہ دیا جائے تو میں قبول کر لوں اور اگر کسی کی دعوت (بھی) دی جائے تو (پھر) بھی قبول کر لوں۔ ☆ حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے حضرت یوسف رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے میرا نام یوسف رکھا اور مجھے اپنی گود میں گھما کر میرے سر پر دست اقدس پھیرا۔ ☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آنحضرت ﷺ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے ٹریڈ (روٹی اور گوشت) جس میں کدو (بھی) لاکر رکھے (حضرت انسؓ فرماتے ہیں) رسول اللہ ﷺ کدو لے کر کھاتے کیونکہ آپ کدو پسند فرماتے تھے۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں میں نے حضرت انسؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد جب بھی میرے لیے کھانا تیار کیا جائے تو میں جہاں تک ممکن ہو تا اس میں کدو ڈالتا ہوں۔

مرچ کی جڑ کا گلاؤ اور اس کا مربوط تدارک

محمد عثمان علی (پی ایچ ڈی سکالر)، ناصر احمد راجپوت، محمد عقیق..... شعبہ پلانٹ پتھالوجی، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

مرچ کی اہمیت

حفاظتی تدابیر

- 1- مرچ کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں بہت وسیع ہے۔ مرچ وٹامن اے وٹامن سی اور فولک ایسڈ سے بھرپور سبزی ہے۔ جو کہ انسانی جسم کو مضبوط بنا کر بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ مرچ اکثر سبز، لال، سرخ رنگ میں پائی جاتی ہے اور اس کا استعمال مصالحہ جات کے طور پر کھانے کی لذت بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مرچ کی اہمیت کا اندازہ اس کے روزمرہ کے استعمال یعنی لذیذ کھانوں کے پکانے، ادویات کے بنانے اور اقتصادی/حجارتی رابطے کو مضبوط بنانے سے لگایا جاسکتا ہے۔ مرچ کی بوائی سے کٹائی تک مختلف قسم کی بیماریاں اور کیڑے اس فصل پر حملہ آور ہوتے ہیں جو کہ مرچ کی پیداوار میں نمایاں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ مرچ کی فصل کو نقصان پہنچانے اور پیداوار میں نمایاں کمی کا باعث بننے والی بیماریوں میں سے جڑ کا گلاؤ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
- 2- اس بیماری سے بچنے کے لیے قوت مزاحمت رکھنے والی مرچ کی اقسام کاشت کریں۔ پہلے سے متاثرہ کھیت میں مرچ کی بوائی نہ کریں۔
- 3- پنیرو کوڑے (Tray) کے اندر گائیں اور کھیت میں منتقل کرنے سے پہلے ہچھوندش محلول میں 10-5 سیکنڈ کے لیے ڈبوئیں۔
- 4- کھیت میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہتے ہیں۔ اور نکاسی آب کا مناسب انتظام کریں۔
- 5- متاثرہ پودوں کو کھیت سے نکال کر جلادیں۔

پودوں کے عرق کی اہمیت

پودوں میں بیماریوں کے کنٹرول کے لیے نئے طریقوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بیماریاں پھیلانے والے ہچھوند اور جراثیم کی مصنوعی کیمیائی ادویات کے خلاف بڑھتی ہوئی مزاحمت ہے اور دوسری بڑی وجہ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ان کیمیکل زہروں کا استعمال کم کرنا اور ماحول دوست طریقے استعمال کرنا ہے۔ اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ پلانٹ پتھالوجی میں ایک تحقیق کا آغاز کیا گیا۔ جس کا بنیادی مقصد مرچ کی فصل میں جڑ کے گلنے کی بیماری کے کنٹرول کے لیے ایک متبادل ماحول دوست طریقہ تلاش کرنا تھا۔ لہذا اس تحقیق کے نتیجے میں صحرائی پودوں سے ایک ایسا محلول دریافت کیا گیا جو اس بیماری کے کنٹرول کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوا۔

صحرائی پودوں سے محلول بنانے اور اس کا طریقہ استعمال

☆	صحرائی تہ	پھل اور پتے (پھل کو چار برابر حصوں میں کاٹ کر استعمال کریں)
☆	بوئیں/صحرائی کپاس	پتے اور باریک ٹہنیاں (3 کلو)
☆	اک	پتے، پھول اور پھل (کل مقدار 3 کلو)

درج بالا پودوں کو اوپر بتائی گئی مقدار کے مطابق لیں اور انہیں صاف پانی سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہہ صاف کی جاسکے۔ پھر ان تمام کو ایک بڑے (باقی صفحہ 62 پر)

جڑ کا گلاؤ (Rot Root)

یہ بیماری ایک ہچھوند فائوفٹھوراکی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مٹی میں پیدا ہونے والا ہچھوند ہے جو پودے کی جڑ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ ہچھوند بیماری والے کھیت سے صحت مند کھیت میں پانی، متاثرہ مٹی اور زرعی آلات کی نقل و حرکت کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ جب کھیت سے اس فصل کو کاٹ لیا جائے تو یہ ہچھوند اپنے آپ کو زمین کی تہہ میں محفوظ کر لیتا ہے اور اگلے سال اسی کھیت میں مرچ کی فصل لگانے پر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس بیماری کے پھیلاؤ کے لیے موزوں درجہ حرارت 28-35 سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور کھیت میں نمی کا زیادہ دیر تک رہنا اس بیماری کے پھیلاؤ میں تیزی کا باعث بنتا ہے۔

بیماری کی علامات

- 1- پودے کی جڑ کمزور اور گل سرز جاتی ہیں۔
- 2- پودے کی نشوونما کا عمل رک جاتا ہے اور پتے پہلے ہو کر گرنے لگتے ہیں اور دو سے تین دن میں پودے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
- 3- بیمار پودوں کو آسانی سے زمین سے باہر نکالا جاسکتا ہے۔
- 4- پودے کی جڑ کو توڑ کر دیکھنے سے اندر موجود خوراک اور پانی کی ترسیل والی نالیوں میں گہرے بھورے رنگ کی رکاوٹ نظر آتی ہے۔

شمسی چولہا: توانائی بچانے کے لیے کھانا پکانے کا متبادل طریقہ

ڈاکٹر نوید فرح..... شعبہ رورل سوشیالوجی، جامعہ زرعیہ فیصل آباد

شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن کھانا پکانے کے لیے شمسی توانائی کے استعمال کے بارے میں آگاہی ہی بہت کم ہے۔ حالانکہ متبادل توانائی کے یہ طریقے نہ صرف ان کی صحت کے لیے مفید ہیں بلکہ بہت سارے ماحولیاتی اثرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جو کہ لکڑیاں اور ابلے وغیرہ جلانے کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں۔

شمسی چولہا کیا ہے؟

کھانا پکانے کی ضرورت ہر کسی کو پیش آتی ہے۔ شمسی چولہا پیسے بچانے اور کم لکڑی کے استعمال کا آرام دہ سہل طریقہ ہے۔ شمسی چولہا سادہ اور بے ضرر آگ ہے۔ جو صرف سورج کی روشنی میں پانی ابلانے اور کھانا پکانے کے کام آتا ہے۔ شمسی چولے پر کھانا پکانے کا طریقہ روایتی کھانا پکانے کے طریقوں کو تبدیل نہیں کر پائے گا۔ لیکن اس کا استعمال ایندھن کے بنیادی اخراجات کو کم کر سکتا ہے۔

شمسی چولے کی درج ذیل تین اقسام ہیں جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں اور عام دستیاب ہیں۔

۱۔ ڈبہ نما چولہا (Box Cooker)

ڈبہ نما چولہا ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دنیا میں بڑے پیمانے پر دستیاب چولہا ہے۔ اس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں انتہائی پائیدار ہونے کی وجہ سے عموماً اس کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

۲۔ Panel Cooker

پینل کوکر یا باہم مربوط کوکر، یہ Box-cooker ڈبہ نما چولے اور دھاتی پتروں کا مرکب ہے۔ یہ بنانے اور استعمال کے لیے سب سے آسان اور سب سے سستا چولہا ہے ڈبہ نما چولے کی طرح ان میں (روشن کی حفاظتی تہہ) ڈھکن کی ضرورت نہیں ہوتی اسے آسانی سے سمیٹا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ ڈبہ نما چولے کی طرح پائیدار نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک وقت میں زیادہ کھانا تیار کر سکتا ہے۔

3۔ Parabolic Cooker

یہ چولے انتہائی / سخت تپش میں ہی کام کرتے ہیں مگر ان کو مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عموماً بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ سکول وغیرہ میں لیکن ان چولہوں کو بنانا اور استعمال کرنا انتہائی مشکل ہے۔

دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ملکوں میں ایسے چولہوں پر کھانا پکایا جاتا ہے جن میں لکڑی جلائی جاتی ہے۔ لکڑی یا تو مہنگی ہے یا بہت محنت سے جن جن کر اکٹھی کرنی پڑتی ہے خواہ تین کچی کھی گھٹنے لگا کر لکڑی جمع کرتی ہیں اور جہاں قدیم جنگلات کا 97 فیصد حصہ صفحہ ہستی سے غائب ہو چکا ہے۔ چنانچہ شمسی توانائی سے چلنے والے چولے مقبول ہو رہے ہیں۔ شمسی چولے نہ صرف کروڑوں غریب انسانوں کا معیار زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ تحفظ ماحول کے سلسلے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں فضاء میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا سترہ فیصد گھروں میں استعمال ہونے والے اُن چولہوں سے آتا ہے، جن میں سوکھا گوشت، گھاس پھوس اور خاص طور پر لکڑی جلائی جاتی ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں تین ارب انسان کھلی آگ پر کھانا پکاتے ہیں۔ مطلوبہ لکڑی کے حصول کے لیے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں۔ جس سے زمین بکھڑاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر لکڑی اکٹھے کرنے میں بہت سا قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ کھلی آگ کا دھواں فضا کو بھی آلودہ کرتا ہے۔

سوڈن کے ایک ادارے کے مطابق ہر سال موسم سرما میں جنوبی ایشیا میں فضا پر چھا جانے والے دھوئیں کے بادلوں کی بڑی وجہ چلنے والی لکڑی ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 1.5 ملین انسان سانس کی نالی کی ایسی بیماریوں کے سبب موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ جو لکڑی کی آگ سے نکلنے والے دھوئیں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آفت زدہ علاقوں یا بجلی سے محروم دیہاتوں میں یہ سولر گر بہت مفید خیال کیا جاتا ہے۔ توانائی کی کمی اور اس کے بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے اب پاکستانی لوگوں کو بدلتے حالات کے مطابق توانائی کے حصول کے متبادل طریقوں کو اختیار کرنا ہو گا۔

قدرت پاکستان پر بہت مہربان ہے جہاں سورج سارا سال پوری آب و تاب سے چمکتا ہے جو رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ زحمت اس لحاظ سے کہ انسان کے لیے شدید گرمی برداشت کرنا اور اس گرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر اسی زحمت کو کام میں لایا جائے تو یہ ہمارے لیے رحمت بن سکتی ہے۔

پاکستان کے دیہی علاقوں میں لوگ شمسی توانائی سے تو آگاہ ہیں اور اس کا استعمال زراعت میں آب پاشی کے لیے اور گھریلو سطح پر بجلی کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا

نتیجہ زمین کی پیداواری صلاحیت میں کمی کی صورت نکلتا ہے جو زراعت کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ لکڑی کے استعمال میں کمی کا باعث بنتا ہے اور ایک شمسی چولہا سالانہ تقریباً 1 ٹن لکڑی کی بچت کا باعث بنتا ہے۔

چکدار ماحول دوست

شمسی چولہا کئی طرح کے خام مال مختلف شکلوں اور اجسام میں بنایا جاسکتا ہے یہ طرح طرح کے کھانے مختلف طریقوں سے بنا سکتا ہے مثلاً پکانا، ابلانا، میکانا وغیرہ یہ پانی کو صاف کرنے کے بھی کام آتا ہے۔


المختصر، شمسی چولہا روایتی کھانا پکانے کے طریقوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔

مسائل

- ☆ اسے تیز دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ☆ شمسی چولہا مکمل طور پر روایتی چولہوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔
- ☆ یہ صرف سورج کی روشنی میں ہی کام کرتا ہے لہذا آپ صبح کے وقت یا شام کے وقت اسکو استعمال نہیں کر سکتے۔
- ☆ یہ کھانے کو تڑکا یا فراہمی نہیں کر سکتا لہذا وہ معاشرے جہاں کھانے کو تڑکا لگانے کا رواج کام ہے ان کے لیے شمسی چولہا مستحکم ہوگا۔ لیکن تڑکا لگانے سے محروم بھی ہوگا۔


ہدایات برائے استعمال

- 1: کھانا پکانے سے تقریباً اک گھنٹہ قبل بھی چولہے کو حرارت جذب کرنے کے لیے سورج کی روشنی میں رکھ دیں تاکہ اسکا درجہ حرارت 100 درجہ یا اس سے زیادہ ہو جائے۔
- 2: کھانا پکانے کے لیے پتلی دیواروں والے ہلکے برتن کا استعمال کریں۔ ایلو مینیم کے برتن اس کے لیے بہترین ہیں۔
- 3: برتن کو رنگ کرنے کے لیے ہمیشہ صحت بخش اور حرارت سے محفوظ رنگ استعمال کریں۔ جیسے کہ بلیک وائش یا دوسرے خاص رنگ یاد رہے کہ عام رنگ زہریلے ہو سکتے ہیں۔
- 4: شمسی چولہے میں نرم غذا یا چاول پکانے کے لیے یہ نسبت عام چولہے کے تقریباً تین گنا پانی کم استعمال کریں۔
- 5: کھانا پکاتے وقت کوشش کریں کہ برتن کا ڈھکن کم اتارنا پڑے۔ ہر دفعہ جب آپ ڈھکن کھولیں گے حرارت کم ہو جائیگی۔



یہ کیسے کام کرتا ہے؟

سورج کی روشنی وہ واحد ایندھن ہے جو کہ شمسی چولہے کے لیے ضروری ہے۔ یہ سورج سے آنیوالی روشنی کو فوراً شمسی تمازت میں بدل دیتا ہے سورج کی روشنی تک مکمل رسائی اور تیز (ٹھنڈی) ہواؤں سے بچاؤ ہی وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کئی بخش نتائج کے لیے ضروری ہیں۔



شمسی چولہے کے فوائد

وقت اور پیسے کی بچت

سورج کی روشنی بالکل مفت ہے لکڑیوں کی تلاش اور ان کو لانے میں بہت کم وقت صرف ہوتا ہے۔ جس میں پہلے بھی پورا کھیہ شامل بچے اور خواتین محنت کرتی تھیں۔

آرام دہ محفوظ اور صحت مندانہ

ان میں آگ کا استعمال نہیں ہوتا اس لیے آگ بھڑک اٹھنے کا بھی غدشہ نہیں ہوتا اس طرح یہ دھوئیں سے بھی پاک ہے۔ یعنی آنکھوں اور سانس کی بیماریوں سے بالکل محفوظ ان کی مدد سے پینے کے لیے پانی بھی ابالا جاسکتا ہے۔ اور کھانا بھی جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی غذائیت برقرار رہتی ہے۔ اور پھر ان میں سے زیادہ تر چولہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاسکتے ہیں۔

ماحولیاتی تحفظ

آگ جلانے کے لیے درختوں اور جنگلوں کی بے دریغ کٹائی عالمی مسئلہ ہے جہاں

کن حالات میں یہ بہتر رہے گا	کن حالات میں یہ بہتر نہیں رہے گا
جب ہوا نہ ہو	جب ہوا تیز ہو
بادل نہ ہوں	ہلکے ہلکے بادل ہوں (مطلع ابر آلود ہو)
برتن ڈھکن والا ہو اور کالے رنگ کا ہو	سفید یا چمکیلے رنگ کا ہو اور بغیر ڈھکن کے ہو
زیادہ سے زیادہ 5 لیٹر پانی ہو اور برتن وزن میں ہلکا ہو	پانی کی مقدار زیادہ ہو اور برتن کا وزن بھی زیادہ ہو
جب پانی تھوڑا کم ہو	جب پانی زیادہ ہو
خوراک کی مقدار کم ہو خوراک چھوٹے	خوراک کی مقدار زیادہ ہو اور خوراک بڑے
چھوٹے حصوں میں منقسم ہو	بڑے حصوں میں منقسم ہو

تحفظ ماحول کے لیے ان چولہوں کے فائدے بھی سب کو معلوم ہیں لیکن پھر بھی لوگوں میں انہیں استعمال کرنے کے حوالے سے پچکچاہٹ پاتی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چولہوں کی اچھی طرح سے مائیکنگ کی جائے اور ایسے ادارے موجود ہوں جو فاضل پُر زہ جات فراہم کر سکیں اور لوگوں کی یہ چولہے استعمال کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کر سکیں۔

طریقہ استعمال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کا استعمال بہت کم ہے اور ابھی تک یہ ایک اجنبی ایجاد ہے ہمیں لوگوں کو اسکے استعمال کی جانب راغب کرنا ہے۔ تاکہ وہ اسکے ذریعے وقت اور پیسے کی بچت کر سکیں اور ماحول کی حفاظت کے ساتھ ساتھ توانائی کو بچا یا جاسکے۔

6۔ شمس چولہے میں کھانا پکنے میں دوسرے چولہوں کی بہ نسبت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔

ہدایات برائے صفائی و تھرائی:

- ☆ شمس چولہے کی کھڑکی کو صاف رکھیں۔
- ☆ شمس چولہے کو بارش سے بچا کر رکھیں یا اسے پلاسٹک کے کورسے ڈھانپ دیں یا گھر کے کسی حصہ میں محفوظ کر لیں۔
- ☆ شمس چولہے کی اندرونی پرت واٹر پروف بنائی گئی ہے۔ لیکن اگر اسکے اندر پانی گر جائے یا کوئی مائع چیز ابلنے سے باہر آگے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اسے کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں۔
- ☆ کالے روغن کی تہ کو کھرچے جانے سے محفوظ رکھیں۔
- ☆ شمس چولہے کو استعمال کرنے کے ٹپس (گھر)
- ☆ خوراک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔
- ☆ سبزیاں، گوشت، مچھلی اور پھل بغیر پانی کے پکائیں۔
- ☆ زیادہ پانی کھانا کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔
- درج ذیل خوراک شمس چولہے پر بہتر طریقے سے پکائی جاسکتی ہے۔

☆ سبزیوں اور اناج کی تمام اقسام

☆ آلود لیں، اناج وغیرہ

☆ بیکری کا سامان

☆ روٹی اور پراٹھا

مرج کی جو کا گلاؤ اور اس کا مربوط تدارک

بقیہ:

آپ نے پچھلے سال کھیت میں اس بیماری کی علامات دیکھیں تھیں تو اس اگلے سال کوئی بھی فصل اگانے سے پہلے اس محلول کو کھیت میں فلڈ کریں اور یہ عمل ہر پانی کے ساتھ دہرائیں کیونکہ اس بیماری کا پھپھوند زمین کے اندر لمبے عرصہ تک اپنی باقیات کو محفوظ رکھتا۔ اس لیے اس سے چھنکارا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کھیت میں ہر پانی کے ساتھ فلڈ کریں۔

نوٹ

صحرائی پودوں سے تیار کردہ یہ محلول نہ صرف زمین میں موجود پھپھوند کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ پودوں کی نشوونما کو بھی بہتر بناتا ہے۔

کھلے برتن میں ڈال دیں اور 15 لیٹر صاف پانی بھی اسی برتن میں ڈال کر اسے اچھی طرح ابالیں۔ یہاں تک کہ پانی آدھا یا اس سے بھی کم رہ جائے (5-7 لیٹر) اس پانی کو کسی برتن میں الگ کر لیں اور خالی بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیں بنائے گئے محلول کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیں اور جسے ہی بیماری کی علامات کھیت میں نظر آئیں تو 5-3 لیٹر محلول کو پانی کے ساتھ کھیت میں فلڈ کریں اور 10-8 دن کے وقفے سے دوبارہ سے فلڈ کریں۔ اگر یہ بیماری کھیت کے کسی خاص حصے میں ہے تو ایک لیٹر محلول/ عرق کو 19 لیٹر پانی میں مل کر کھیت میں فلڈ کر دیں اور 4-3 دن کے وقفے سے 3-2 بار اس عمل کو دہرائیں۔ اگر

الحديث: ☆ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس بستر پر آنحضرت ﷺ آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی مونجھ بھری ہوئی تھی۔

دل کے عضلات کی حفاظت کے لیے بھنڈی کے اثرات کی دریافت اور ان کے اختتامی تناظر

پنی ایچ ڈی سکالر: بشری اشفاق نگران: ڈاکٹر عائشہ شمیں شعبہ: فوڈ ٹیکنالوجی

طریقوں سے پکایا گیا۔ اور اس کی مختلف مقدار کو خوراک میں شامل کر کے چوہوں کو کھلایا گیا۔ تیسرے طریقے میں بھنڈی کو پانی میں ابال کر اس کا لیس دار مواد نکال کر خوراک میں شامل کر کے چوہوں کو کھلایا گیا۔ کچر چوہوں کو بغیر بھنڈی (کچی، پکائی ہوئی یا اس کا لیس دار مواد) کے صرف سادہ خوراک دی گئی۔ اور تمام چوہوں کی خوراک میں دل کے عضلات کو متاثر یا نقصان دینے والی ادویات (کولک ایڈ اور کولیٹروول) بھی ملائی گئیں۔ اس کے بعد تجربات میں شامل تمام چوہوں کا پیٹ کاٹ کر ان کے دل کے عضلات کا ظاہری مشاہدہ کیا گیا اور خون کے نمونے لے کر ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جن چوہوں کی خوراک میں بھنڈی کا لیس دار مواد شامل تھا۔ ان کے دل کے عضلات سب سے زیادہ صحت مند اور مضبوط تھے اور دل کو متاثر یا بیمار کرنے والی ادویات کے اثرات سب سے کم تھے۔ دوسرے نمبر پر جن چوہوں کی خوراک میں کے ایک خاص طریقے سے 80 سے 100 درجہ حرارت پر دس منٹ کے لیے بھونی گئی بھنڈی شامل تھی مفید ثابت ہوئی جبکہ تیسرے نمبر پر کچی بھنڈی والی خوراک کی افادیت سامنے آئی مگر جن چوہوں کی خوراک میں کسی بھی طریقے سے بھنڈی شامل نہیں کی گئی تھی۔ ان کے دل کے عضلات بیمار اور کمزور تھے اور دل کے عضلات کو بیمار کرنے والی ادویات کے اثرات واضح تھے۔ اس تحقیق سے یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ بھنڈی کے اندر پایا جانے والا لیس دار مواد دل کے عضلات کو مضبوط بنانے اور دل کی بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیس دار مواد میں زیادہ شرح مختلف قسم کے ریٹوں کی ہوتی ہے۔ جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس موضوع پر مزید تفصیل جامیہ زرعیہ فیصل آباد کی سنٹرل لائبریری میں موجود محترمہ بشری اشفاق کے انگریزی میں لکھے گئے تحقیقی مقالہ میں موجود ہے اور بائو بیو کیمیشن کیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

<<<<<<<<>>>>>>>>

بھنڈی پاکستان کی قومی سبزی کے طور پر جانی جاتی ہے جو پنجاب میں لودھراں، ملتان، مظفر گڑھ، اوکاڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، جھنگ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، راولپنڈی اور جیم یارغان کے اضلاع میں کثرت سے کاشت کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ دنیا کے گرم معتدل آب و ہوا رکھنے والے بھی ممالک (افریقہ، امریکہ، ایشیا اور آسٹریلیا وغیرہ) میں کاشت کی جاتی ہے۔ دنیا کی ستر فیصد بھنڈی صرف بھارت میں پیدا کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھارت بھنڈی پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اور پاکستان بھنڈی کی پیداوار کے حوالے سے چھٹے نمبر پر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ سترہ فیصد لوگ صرف امراض قلب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور پاکستان سمیت دیگر ترقی پزیر ممالک میں دل کے امراض کی شرح خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کی بنیادی وجوہات میں شامل فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی زہروں کا اندھا دھند استعمال، پکٹائی دار اور غیر متوازن غذا، گاڑیوں، موٹر سائیکل، انٹرنیٹ اور سمارٹ موبائل فون کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے جسمانی مشقت میں نمایاں کمی ہے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دل کے امراض کو روکنے کے لیے باقی مسائل پر قابو پانا خاصا مشکل کام ہے۔ لہذا دل کے امراض کی روک تھام کے لیے بھنڈی کے کردار کو سامنے لانے کے لیے جامیہ زرعیہ فیصل آباد میں کچر تجربات کیے گئے۔ جن میں بھنڈی کو تین مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا اور دل کے امراض کو روکنے کے لیے اس کی افادیت کو جانچا گیا۔ یہ تجربات سفید چوہوں پر کئے گئے۔ بھنڈی کو تین طریقوں سے تیار کر کے اسے چوہوں کی خوراک میں مختلف مقداروں میں شامل کر کے ایک خاص مدت تک چوہوں کو کھلایا گیا۔ ایک طریقے میں کچی بھنڈی کی مختلف شرح مقدار خوراک میں ملا کر چوہوں کو کھلانی گئی۔ کیونکہ اکثر ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شائد کچی بھنڈی کھانا صحت کے لیے زیادہ مفید ہو۔ اور اس کو پکانے سے اس کی افادیت میں کمی نہ آجاتی ہو۔ دوسرے طریقے میں بھنڈی کو مختلف

کلو نجی اور گل منڈی کے ذریعہ ذیابیطس کا غیر روایتی طریقہ علاج

پنی ایچ ڈی سکالر: فائزہ حسن نگران: ڈاکٹر بلال اسلم شعبہ: ٹسٹوٹ فارمیسی اینڈ فارما کالوجی

مؤثر اور کئی پیچیدگیوں کا باعث بن رہا ہے موجودہ طریقہ علاج میں خون میں گلو کو ز کو کم کرنے والی ادویات یا انسولین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کا کم اثر ہونا اور

ذیابیطس انسانوں میں دور حاضر کی سب سے زیادہ شرح اموات رکھنے والی بیماریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس بیماری کا طریقہ علاج مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ غیر

گروہ نمبر 1 کے چوہوں کو سادہ خوراک دی گئی۔ گروہ نمبر 2 کے چوہوں میں Alloxan کے ذریعے ذیابیطس پیدا کی گئی مگر ان کو کسی قسم کا علاج نہیں دیا گیا۔ تیسرے گروہ کے چوہوں میں ذیابیطس پیدا کر کے انگریزی دو Metformin کے ذریعے علاج کیا گیا جبکہ گروہ نمبر 4، 5 اور 6 کے جانوروں میں ذیابیطس پیدا کر کے گل منڈی، کلو نجی علیحدہ علیحدہ اور ان کے مجموعہ کے ذریعے علاج کیا گیا۔

طریقہ علاج کی افادیت کو جاننے کے لیے جسمانی وزن، خوراک اور پانی کا استعمال، خون میں گلوکوز کی مقدار، خون میں انسولین کی مقدار، مجموعی لحمیات، یورک ایسڈ، یوریا، کریٹینین، ALT، AST اور Lipid Profile ٹیسٹ کیے گئے۔

درج بالا تمام ٹیسٹ علاج شروع کرنے کے بعد پہلے ہفتے، چوتھے ہفتے اور آٹھویں ہفتے پر کیے گئے۔ درج بالا ٹیسٹ کے نتائج نے یہ ثابت کیا ہے کہ کلو نجی اور گل منڈی کے مجموعہ نے چوہوں میں ذیابیطس کے خاتمہ میں روایتی طریقہ علاج کے برابر نتائج دیے۔ اس بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ تجربہ میں شامل دونوں پودوں کے ذریعے ذیابیطس کا ایک موثر اور کم پیچیدگیوں والا علاج کا طریقہ بنایا جاسکتا ہے۔

حفظان صحت کے لیے بہت سے پیچیدگیاں پیدا کرنا انسانی صحت کے لیے مزید خطرات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ کسی نئے طریقہ علاج کو ڈھونڈا جائے جو کہ موثر بھی ہو اور جس کے استعمال سے صحت کو کوئی نقصان یا جسم میں کوئی اور پیچیدگی پیدا نہ ہو۔

نباتی ادویات سے بہت ساری بیماریوں کا علاج عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے۔ انگریزی ادویات کے غیر متوقع ضمنی اثرات کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے دور حاضر میں نباتاتی ادویات کے استعمال میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیابیطس کے علاج کے لیے بھی نباتاتی ادویات کے استعمال پر بہت سارے تجربات ہو رہے ہیں۔ اس تجرباتی مطالعہ میں کلو نجی اور گل منڈی کے ذریعے ذیابیطس کے علاج کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے مندرجہ بالا دونوں پودوں کی کیمیائی ساخت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کے کسی بھی قسم کے زہریلے اثرات کے ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ اس مطالعاتی تجربہ میں 60 عدد چوہے شامل کیے گئے جن کو 6 عدد گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔

سبزیوں کی غذائی اہمیت

شعبہ: انسٹیٹیوٹ آف ایگری انجینئرنگ، ایجوکیشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ

پنی ایچ ڈی سارل: شفیق الرحمن ضیاء نگران: ڈاکٹر اعجاز اشرف

عالمی ادارے صحت (WHO) نے دائمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ایک دن میں 400 گرام سبزیاں کھانے کی سفارش کی ہے۔ زراعت کے ایک حصے کے طور پر سبزیاں روزگار میں تیزی لانے اور پیداواری صلاحیت بڑھانے میں کسانوں کی اچھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پچھلے مطالعات سے واضح ہے کہ سبزیوں سے بھرپور غذا کیمینس اور دائمی بیماری کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ سبزیوں کی تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کرنا جو خوراک کی کفایت اور خوراک حاصل کی جاسکے تحقیق اور ترقی میں تحقیقات چھوٹے کاشتکار برادری کو مدد فراہم کرنے میں موثر ثابت ہو گئی۔ جو دیہی اور شہری علاقوں کے ان گھرانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ جو غذائیت کا شکار ہیں۔ یہ مطلوبہ ضروریات سبزیوں کے شعبے میں پیداوار بڑھانے سے حاصل ہوں گی۔ عالمی ادارہ تحقیقاتی سبزیات کے مطابق یہ دیہی اور شہری دونوں صارفین کی صحت اور غذائیت کو بہتر بنائے گا اور سبزیوں کے استعمال کے ذریعے غذائیت کی خصوصیات پیدا کرے گا۔

پاکستان کی معیشت کا انحصار واسطہ بالواسطہ زراعت کو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ شعبہ پیداواری لحاظ سے بہتر ہے اور پودے کی کھانے کے قابل حصہ کو سبزی کہا جاتا ہے۔ ان کو پتے، جڑیں، کنو، بلب اور پودوں کی کلیاں کے حساب سے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پیداواری نقطہ نظر سے سبزیوں کی فصل کو ایک اعلیٰ قیمت والی فصل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کی کٹائی کے بعد خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔

سبزیاں صحت مند غذا کے لیے درکار مائیکرو نوتریشن کا ایک لازمی ذریعہ ہیں۔ سبزیوں میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں موجود غذائی ریشہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے جیسا کہ فولک ایسڈ پیدائش نقص کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ وٹامن اے آنکھوں اور جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ وٹامن سی نہ صرف دانتوں بلکہ موڑوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے۔

حضرت محمد بن جبریل نے والد حضرت جبریل بن مطعمؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک میرے کئی نام (القاب) ہیں میرا نام محمد ہے اور احمد ہے اور میرا نام مہدی ہے کہ تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا اور میرا نام حاشر ہے یعنی قیامت کے دن لوگ میرے قدموں پر (میرے بعد) اٹھائے جائیں گے اور میرا نام مقاب ہے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

الحديث

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، چیئرمین شعبہ انٹیمالیوٹی ڈاکٹر محمد جلال عارف میٹینگ ڈائریکٹر ایف ایم سی حبیب عالم، عامر بشیر ملک، اکرم خاں ودیگر زراعت کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، سابق وائس چانسلر بارانی زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود، زرعی یونیورسٹی ملتان وائس چانسلر ڈاکٹر آصف علی، چولستان ویٹرنری یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر سجاد خاں ودیگر یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران کے سالانہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں



رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، چین کی شین یا ٹنگ نائل یونیورسٹی کے نائب صدر پروفیسر ٹو ٹنگ پنگ، پروفیسر محمد جلال عارف، پروفیسر ڈاکٹر محمد جعفر جیکانی، پروفیسر محمد شاقب، ایسوسی ایٹ پروفیسر عابد علی کی ایم او کے موقع پر فوٹو



زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے چینی سکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ چیئرمین انٹیمالیوٹی ڈاکٹر محمد جلال عارف اور ڈاکٹر عابد علی کے ہمراہ رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں سے ملاقات کر رہے ہیں

جامعہ زرعیہ فیصل آباد میں منعقدہ تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کی تصویری جھلکیاں



رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ورلڈ بینک سینئر سوشل ڈویلپمنٹ سپیشلسٹ لی سینی ایم پھیر، ڈاکٹر غلام نقی، عمران الحق، ثناء احمد، ڈاکٹر انوار الحق، عاصم عزیز، ڈاکٹر آصف کامران و دیگر ورلڈ بینک اور سوشل اینڈ انوٹرینٹیل سائنسز کے باہمی تعاون سے انوائرنمنٹل اور سوشل فریم ورک پر منعقدہ دورہ ورکشاپ سے خطاب کر رہے ہیں



میکسیکو کے زرعی ماہرین، ڈیپارٹمنٹ آف انٹو مالوجی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی مختلف لیبارٹریز کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ پرووائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور خاں اور چیئر مین انٹو مالوجی ڈاکٹر محمد جلال عارف بھی ان کے ہمراہ ہیں



ممبر سبک ہائز ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد، ایگزیکیوٹو جنرل (ریٹائرڈ) محمد صغیر رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایکسپونمنٹس میں یونیورسٹی ٹیکنالوجی کا معائنہ کر رہے ہیں



رئیس جامعہ زرعیہ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خاں، ڈین ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، ڈی جی ڈاکٹر عمران پاشا، ڈاکٹر خرم شیاہ و دیگر ٹیچنٹل انیشیٹیو آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام سیمینار برائے ملٹی گرین آٹا سے خطاب کر رہے ہیں

شعبہ تصنیف و تالیف زرعی یونیورسٹی فیصل آباد

فون نمبر 041-9200161-69 Ext. 3405 ای میل اڈریس oubmuaf@gmail.com